

P. CHRIST.
SCHEINER
E SOC. IESV

AD PAVLVM
IORDAN. II. VRS.
BRACC. DVC.

IHS

AVCTORITAS
SACRA

RATIO

VR SINAE CAELVM PRAEFERT INSIGNIA GENTIS

ROSA VR SINAE SIVE
SOL

AVCTORITAS

PROFANA

SENSVS



ROSA VRSINA

SIVE

SOL

EX ADMIRANDO FACVLARVM
& Macularum suarum Phœnomeno VARIVS,

NEC NON

Circa centrum suum & axem fixum ab occasu in ortum annua,
circaq. alium axem mobilem ab ortu in occasum conuersione
quasi menstrua, super polos proprios, Libris quatuor
MOBILIS ostensus,

A

CHRISTOPHORO SCHEINER
GERMANO SVEVO, E SOCIETATE IESV.

AD PAVLVM IORDANVM II.
VRSINVM BRACCIANI DVCEM.



BRACCIANI,

Apud Andream Phæum Typographum Ducalem.

Impressio coepta Anno 1626. finita vero 1630. 1d. Iunij. Cum licentia superiorum.

Quare dies diem superat, & iterum LVX
LVCEM, & annus annum; A SOLE?
A Domini scientia separati sunt FACTO
SOLE, & præceptum custodiente.

SVMMA LIBRORVM SINGVLORVM MONOSTYCHIS
SINGVLIS COMPREHNSA.

Auctorem Primum Primus Liber edit Apellem :
Errandi causas aperit, prohibetq. Secundus :
Observata diu spectacula Tertius offert :
Aetatem moresq. ROSAE dat Quartus & aulam.

Synopses accuratiores singulis Librorum principijs præmissas leges : omnia vero
minutatim Capitum Elenchus paullo post recitandus, & generalis rerum Index
in fine operis, auido Lectori declarabit, præter ea quæ hic in Dedicatione, &
Præfatione dicuntur.

*Arist. Lib. 12. Metaph. cap. 8. secundum vulgares editiones, at secundum editionem
Parisiensem Græcolatinam anno 1619. editam, ita scribit, eodem cap. lib. 14.*

Multitudinem vero Lationum (seu conuersionum cælestium) oportet ex peculia-
rissima (siue maxime propria) philosophia *Mathematicarum scientiarum*, vide-
licet ex *Astrologia* considerare (addiscere:) hæc enim de substantia sensibili qui-
dem, at sempiterna speculatur.

139 309 314

Staatliche
Bibliothek
Passau

ROSA VRSINA

SIVE

SOL.

Ouid. Fast. lib. 1.

Felices animæ, quibus hæc cognoscere PRIMIS

Inq. domos superas scandere cura fuit.

Admouere oculis distantia sidera nostris,

Aethereaque ingenio supposuere suo.

SOL TIBI SIGNA DABIT.

Virg. l. Georg.



VRSINAE Dux Gentis Aue; Tibi plaudit Olympus;
 Currit in obsequium Phœbus & Vrsa tuum.
 Signa genusq. suum mutis incidere faxis
 Si potuere alij, Fors ea magna fuit.
 SIGNA Genusq. tuum Cælestibus indita fulgent
 Orbibus; VRSINOS fixit in axe Deus.
 Maeste animi virtute Heros, genus Alte. Trophæis
 Quod nimis arcta tuis est humus astra petis.
 MOECENATI Auctor.

Sol quoque & exoriens & cum se condet in undas
 SIGNA dabit. Solem certissima SIGNA sequuntur,
 Et quæ mane refert, & quæ surgentibus astris;
 (Quando) nascentem MACVLIS variauerit ortum.
 Virg. lib. l. Georg.

TOTIVS OPERIS

NOTATV DIGNIORA.



P ropugnatur & detegitur Apelles primus Macularum solarium auctor. toto libro primo.	
In eodem primo libro Censoris Apellai errores produntur.	pag. 31. & 42
Tubus opticus à fundamentis explicatur toto libro secundo, & demonstratur.	pag. 127
Ratio & similitudo Tubi cum oculo datur.	pag. 106
Macularum in ipso Sole visarum, & obseruatarum Romæ in Domo Professa Societatis IESV, in Collegio Romano, in Germania Ingolstadii, Friburgi Brisgoia, in Belgio Duaci, à Patribus Christophoro Scheiner, Christophoro Gruëberger, Georgio Schoëberger, & Carolo Malapertio, &c. annis 1618. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. & 1627. Septuaginta Imagines offeruntur. libro tertio.	
Maculas vere esse in Sole, & non fallaciam visus.	pag. 151
Testantur etiam Raphaël Auersta, Marinus Mersennus, Galilaus de Galilaïs, Mathematicus Barcinonensis, & Theses Parmenses. Vide Indicem generalem.	
Macula circa Solis centrum, ab Orientali Solis plaga in Occidentalem mouentur, tredecim ferme diebus motu regulari.	pag. 405
Macula physice mutantur, augentur, minuuntur, obscurantur, clarescunt, in medio Sole enascuntur, & deficiunt.	pag. 490
Macula in Faculas ipso communi Solis nitore, lucidiores abeunt; & è contra in facularum locum succedunt Maculae	pag. 517. Vide Indicem generalem.
Superficies Solis tota semper Maculis & Faculis saltem secundariis infessa est.	pag. 512
Macula & Faculae in ipso Sole sunt.	pag. 537
Maculae Reduces.	pag. 546
Nulla Macula aut Facula extra Solis discum apparet.	pag. 414
Nulli orbes caelestes Maculas in Sole causant.	pag. 408
In nullis circa Solem, seu epicyclis, seu excentricis Maculae mouentur.	pag. 424
Faculae per Solis tralucientiam non fiunt.	pag. 517
Itinera Macularum curuantur sitibus contrariis singulis semestribus, &c.	pag. 161
Itinera Macularum semper sunt concaua versus polum eleuatum, & apparentem: semper conuexa versus polum depressum & latentem.	pag. 225
Machina qua Maculae facile obseruantur.	pag. 349
Theoria motus Phenomeni solaris.	pag. 554
Globus Solis conuertitur.	pag. 601
Solis conuersio annua ab Occasu in Ortum.	ibid.
Celum, Sol, & reliqua astra ignea & elementaris naturae censentur ab Ecclesia, & sanctis Patribus.	pag. 626
Aquas veras elementares super calos esse ex sacra Scriptura, ss. Patres, & Theologi probant.	pag. 641
Celum, Sol, & Stella ex natura sua corruptibiles esse ex mente Ecclesia, & sanctorum Patrum coniicitur.	pag. 660
Celum liquidum ex sacra Scriptura, & sanctis Patribus.	pag. 699
Celum aut liquidum aut igneum multi Neoterici Theologi, Philosophi, & Physiologi defendunt.	pag. 731
Celum liquidum antiqui philosophi tenebant.	pag. 747
Celum liquidum esse tam antiqui quam recentiores Astronomi voluerunt.	pag. 755
Obiectiones pro calo duro diluuntur.	pag. 771

APPROBATIO

APPROBATIONES.

Mutius Vitellefcus Societatis I E S V
Præpofitus Generalis.



VM ROSAM VRSINAM P. Chriftophori Scheiner noſtræ Societatis, Tres eiufdem Theologi, & Mathematici, quibus id commiſſum fuit, recognouerint; & in lucem edi poſſe probauerint: facultatem concedimus, vt typis mandetur, ſi ita ijs, ad quos pertinet, videbitur. In quorum fidem has litteras manu noſtra ſubſcriptas, & ſigillo noſtro munitas dedimus Romæ 6. Iulij M.DC.XXIX.

Mutius Vitellefcus.

Loco * figilli.

Vidit

Bartholomæus Piccaluga Status Bracchiani Generalis Auditor.

Imprimatur ſi placet Reuerendiſs. P. M. Sac. Pal.

Lucas Ricciottus Archiprebyter, & Vicarius Bracciani Reuerendiſſimi D. Epifcopi Sutrini, & Nepesini.

ROSAM hanc VRSINAM ſiue libros de Maculis Faculisq; Solis, à R. P. Chriſtophoro Scheiner Germano Societatis Ieſu elucubratos, iuſſu Reuerendiſs. P. Nicolai Riccardij, Magiſtri Sacri Palatii vidi; nec in ijs quidquam, aut ſanę doctrine, aut bonis moribus pugnans deprehendi. ſed potius multa diuturno, & proprio labore atq; industria comparata, non Mathematicis ſolum diſciplinis ac Philoſophicis perneceſſaria ſolidè diſputata, ſed alia quoq; ad illuſtranda ſacrę ſcripturę Patrumq; monumenta perutiliter tractata reperi: plurima namq; quę ſcriptura ſacra de Solis ac Cęlorum natura & conſtitutione ſecundum genuinam ſanctorum Patrum interpretationem docet, & Peripateticę doctrine addictis dura videbantur; hoc nouo Phænomeno mirificè confirmantur. Quamobrem dignos omnino cenſui, qui in lucem eum bono publico prodirent. In Collegio Romano Soc. Ieſu 28. Maij. Anno Dñi 1630.

Ita iudico ego Ioannes de Aluarado, Soc. Ieſu, Collegij Rom. eiufdem Societatis Præfectus ſtudiorum.

Imprimatur

Fr. Nicolaus Riccardius Sac. Pal. Apoſt. Magiſter.

PAVLO IORDANO II.

VR SINO

BRACCIANI DVCI &c.

CHRISTOPHORVS SCHEINER

SOCIETATIS IESV

Sempiternam Felicitatem.



ROSAM accepimus, cum plerisque Veterum in delicijs; tum apud Indos præsertim in haud vulgari precio fuisse: quorum qui Sapientissimi habebantur, non alia re æquæ, ac ROSA, Principum sibi animos adiungere, affectusq. conciliare se posse crediderunt. Eaque propter non commisere, quin, ubi temporis locique ratio tulisset, oleum indidem expressum, phialaq. RELIGIOSE exceptum, verbis legitimis, stataq. cum cærimonia, SOLI consecrarēt: rati simul eo dein cæromate fuissent peruncti, continuo REGVM se PRINCIPVMQ. potentes fore; sensusq. omnium ac manus in potestate habituros; neque repulsam, quidquid opis gratiæque flagitassent, laturos.

Horum ego motus exemplo, DVX MAGNANIME, cum aditum ad te quærerem, ROSA opus, & mihi fore censuisse m, cuius illecebra PRINCIPI commendarer: ni compertum magnis iam ante documentis fuisset, quam arcte ORDINEM meum vniuersum, TV cum TVA INCLYTA FAMILIA complectereris. Quare versa sententia, credidi, non oportere GRATIAM me quasi NOVAM, hic conciliare

a

liare, sed magis de V E T E R I, nouis obsequijs, firmanda venerandaque laborare. Post enim quàm A L E X A N D E R Cardinalis V R S I N V S, æternæ famæ gloriæque Princeps, immaturo funere elatus est; inque vno illo, & T V, dimidium T V I, fratrem germanum; & ego Mœcenatem longè Optimum, vterque mœsti amissimus: T I B I quidem fratris charissimi iacturam sarcire adhuc potuit nemo: Mihi vero Mœcenatis erepti patrocinium instaurare T V vnus confestim incepisti; fecistisque vt, quamuis P R I N C I P E M A M I S S V M ego nondum eluxerim, T E tamen P R I N C I P E I N V E N T O, meus hic L I B E R sibi gratularetur.

L I B E R inquam, hic meus. Cuius A R G V M E N T V M, sua & nouitate gratum, & difficultate impeditum, vt ex ipsa S O L I S luce, in lucem eruerem; non diffitebor, nullis me neque diurnis laboribus, nec nocturnis pepercisse: dum M V N D I I V B A R I S T V D oculis inconniuis seruo; Astrique pulcherrimi, seu latentes, & fugientes V M B R A S in apertum protractas insequor, siue N I T O R E S insolitos, & vñtato omnibusque obuio Solis splendore L V C V L E N T I O R E S in eodem passim promicantes, atque superficiem inundantes, N O V O eoq; I N V I S O S P E C T A C V L O, attonitus contemplor; necnon cursus quibus circa proprium centrum assidue rotatur ad menstruas annuasque conuersiones, M O D I S A N T E H A C I R R E P E R T I S, exploro; & si nondum ætatem (quod ille) saltem octauum decimum iam annum, inter experimenta consumo. Quo tanto seu tempore, seu labore, quidquid nouæ cognitionis, ex cælo cælique principe Astro, partum mihi est; id omne hoc libro clausum T I B I D O M V S V R S I N A E P R I N C I P I R O S A E Q V E V R S I N A E N O M I N I, non immemor, ingratusue cliens dedicatum eo: S O L E M Q V E adeo ipsum astrorum R E G E M cum R O S A T V A, R E G I N A F L O R V M, sociatum exhibeo. Nam R O S A M ego, dum G R A T I A E T V A E securus, Pœstanis ex hortis decerpere, ceu A L I E N A M negligo; ecce! D O M E S T I C A M è T V I S mihi I N S I G N I B V S oblatam, boni omnis causâ, gestiens, & gratulans saluto: eaque propter, non S O L I R O S A M, neque succum è R O S A expressum (quod Indos fecisse memorauit) sed verso consilio, S O L E M hunc meum, & laborem, quem dixi, in noua I L L I V S exploratione exhaustum, pretiosumq. indidem V E R I T A T I S elicitem L I Q V O R E M in R O S A E T V A E sinum immarcescibilem volens libensque infundo. Vt in posterum T O T V M H O C P H A E N O M E N O N; admirabili partium vmbrosarum, atque lucidarum varietate distinctum, mutuaque ipsarummet transmutatione conspicuum, atque
noua

noua semper progenie floridum **VR SINAE ROSAE** nomen re-
ferat, & Gentis **VR SINAE** Stemma inclytum, radijs suis cælo æ-
ternum inscribat. Id quod cum iure **INVENTORIS**, tum exi-
gente **VR SINAE DOMVS DIGNITATE**, atque adeo ipsa
NATVRA fauente, atque inuitante, me facere posse, censeo.
Quamcumque enim in partem respicio; video vndique, aut cum
ROSA SOLEM; aut cum **SOLE ROSAQVE VR SINAM**
FAMILIAM perpulchrè consentire: vt credam ea, quanquam
cōditione sint diuersa, indole tamen paria, arcanam inter se amici-
tiam coisse. Tametsi id mihi hic nō sumam, vt hæc inter se singula
comparem; neque vt ea, quæ oblectantur, ad mentiendam similitu-
dinem, violentus detorqueam: quorum illud longius æquo nego-
tium; istud compertum inopiæ diuerticulum foret: sed duabus so-
lum in rebus hæc conferam; quas omnium (vt equidem reor) con-
sensus, læta admurmuratione est probaturus.

PRIOR est, **SOLIS** mirificus **SPLENDOR**; quo ille morta-
lia, ceu colore quodam inducto, omnia pingit, & illustrat; resque
ex informibus, & obscuris, formosas illico reddit, ac venustas.
POSTERIOR SOLIS est **CALOR**: quem ille qua terræ ma-
riaque latissimè patent, vltro perliberaliter diffundit; eoque opem
vniuersis, prodigo sinu dispensat. Nec amicos solos gratosque re-
spectat; sed natum ad beneficia fidus, omnes etiam immemores ad-
uersosque assiduè iuuat: Noctuis solum, maleque ominatis bubo-
nibus infestum. Quoties nubes illud iam coeuntes minantesque
placat? quoties in excidium vrbiū coniuratas tempestates calo-
re propitio feremat? Nempe beneficum illi ingenium est, & solius
malefici ignarum. Ab hoc ad æmulam **SOLIS ROSAM** diuer-
to: cuius **COLOR**E, iam in purpuram rubente, iam niuium can-
dori certante, nihil est, quod blandius oculi gratiusque contem-
plentur. Eadem, **ODORE**, quo omnium suauissimo blanditur,
omnem fragrantis Hyblæ, **FLORAEQVE** vernantis inuidiam
triumphat. Nec blandus tamen is magis **ODOR** est, quam salu-
bris. Partem ille quæ in homine præcipua est maximè seruat; ca-
pitique infusus, vires, quas labor exhauserat, morbusue hebetarat,
instaurat: atque vnde plurimum damni humano generi ingruit, ar-
matam in clades temulentiam, arcana vi feliciter exarmat. Hanc
iube aliquis **ROSA** M abesse; de amænissimo Roseto, de forme nu-
dumque vepretum reddes. Eadem simul vaginam ruperit, deq; ca-
lyce suo promicare rursus cæperit, iam senticetum credes omne,
Rosetum esse; iam spinas rudes, in pictos frutices abire; iam horri-
da tesqua, mera tempe fieri. Tantam **SOLIS SPLENDOR**, &
CALOR; tantam **ROSAE COLOR**, & **ODOR** rebus potest
mortalibus gratiam afferre.

Hic ego iam verebor, **VR SINE PRINCEPS**, ne; si **GENTIS**

TVAE Lucem, dixerō nihil huic neque SOLI nec ROSAE concedere; vim afferam MODESTIAE TVAЕ : quæ mauult ILLUSTRIA FACERE, QVAM SVA BENE FACTA PALAM AVDIRE. Sed patere, quæso, hanc tibi necessitatem imponi, ut aliquando coactus audias, quæ de TE, maioribusq; TVIS, sæpe nos, admirationis pleni, memoramus. Inscitum enim habet & GENS VRSINA Colorem Splendoremque suum : quo pridem per omnes omnium terrarum populos conspicua refulsit. Habet & ROSAE SOLISQVE ingenium ; quo quam latè nominis gloriam, tam longè beneficij opisque suæ copiam extendit. Nam seu SACRI, seu PROFANI splendoris decora spectentur; utroque sic eminuit, ut officere alter alteri, nimia luce potuerit, nisi uterque in vnus GENTIS fortunam conspirasset. Vin' à PROFANO (non illo clariori quidem, certe autem vetustiori decore) exordiamur?

Offerunt se continuo FVMOSAE IMAGINES, quibus Atria plena, GENERIS antiquitatem; ab ipsis VRBIS incunabulis arcessunt. Offerunt se magno numero TITVLI, quos vndique illa ex rebus præclare gestis immortales comparauit. Offerunt se CORONAE, plus quam CIVICAE, quas ei belli gloria Patriæque seruata pietas contulere. Quis vnus ad hunc diem Romani aut Populi, aut Imperij tabulas inspexit; & quot quantosq; Heroas, pace belloque claros, Rosa VRSINA, protulerit, non legit? ILLA CAPITOLIO bis extremis difficultatibus laboranti, & legionibus arctè circumfesso, DVCES VRSINOS cum copijs misit: Populoque omnibus gentibus imperanti, suam ubi imperaret, Sedem restituit. IPSA suos Romæ CONSVLES, IPSA Patriæ SENATORES, cum bono publico, quales quotiesq; e stirpe sua produxit? IPSA Vrbi PRAEFECTOS (quid nisi beneficos publicæ rei parentes tutoresque?) quanta cum ciuium approbatione, alios super alios, identidem dedit? idque onus non ante posuit quam PRINCIPES nascerentur, in quorum pares humeros illud ipsa iam EMERITA transferret.

Ipsa demum Vrbe egressa, perq; omnem Europam sparsa, virtutum suarū monumentis HISPANIAE Regna, ANGLIAE littora, GALLIAE Lilia, GERMANIAE Imperia, ITALIAE omnia, latissimè peragrauit. Nam Imperio certè, quot primi nominis PRINCIPES? quot eidē SEPTEMVIROS ELECTORES numerauit? Etsi vix etiā numerauit. Etenim (quod publica mihi monumenta prodidere) cū VRSINOS illa fratres, alterū BRANDENBURGICIS, SAXONIBVS alterum, PRINCIPES dedisset: utrobique ad SEPTEMVIRATVM Imperij euecta, dignitatem semel acceptam ita tenuit; ut eam apud istos, annis amplius ducentis quadraginta: apud illos, annis non minus cētum septuaginta (tabulis fidem adstruentibus) longa Nepotum

Vrsini Electores Imperij.

potum posteritate, nec interrupta VRSINI GENERIS gloria, continuavit. De Regibus porro in sanguinis cognatione adductis, deq; affinibus sceptris, quid memorē? Pleramq; illa EVROPAM complexa; omnium fere Regnorum lucem, sic sibi circumdedit, ut & suam illis haud parcius ipsa commodarit. Quare hinc per Germaniam Galliamq; inde per Hispaniam, omnemq; Italiam, illustri aut cognatione Regum, aut affinitate inclaruit: Bohemiae sibi Pannoniaq; coronas deuinxit: ultra Oceanum prouecta, Britannis Regibus, Suecisq; se ac Danis inseruit: Thessalos etiam Graecosq; potentissimos olim Dynastas, Generi suo, non abnuentes sociavit.

Ad postremum, eo altitudinis, luce sua virtuteq; euasit; ut, (quæ paucorum, tametsi Principum, fortuna fuit) apud Imperatores maximos, plurimū auctoritate gratiaq; potuerit: & in AVGVSTAM PROPINQVITATEM adscita, pæne se ipsam superarit. Quamquā haud satis scio, an nō maiorem hac ipsa gloriam, ex IMPERII DIADEMATE REPVDIATO (quod eius VIRTVTI delatum, ac propē impositum fuerat) dicēda sit retulisse. Nam quod gerere per se ipsa recusarat, pro eius LIBERTATE (quæ proximē periculū fuerat) TVENDA ASSERENDAQ; dimicare nō recusauit: eoq; tā illustri merito suo, INSIGNIA sibi, hinc TRABES AVRO NIGROQ. VARIAS; inde plexūē RVTA SERTVM (quibus, & Saxonum hodie, & Allobrogū Principes gloriantur) honoris causa ab ASSERTO VINDICATOQ. IMPERIO reportauit. Sed quo feror imprudens? de Gloria FAMILIAE VRSINAE ingressus dicere; ad eiusdē MERITA, in Orbem collata, deuoluor. Scilicet ut ROSAE color odorq; aut SOLIS splendor & calor, simul deferuntur sic Maiorum Tuorum Gloria narrari sola non potest, quin simul & eorum MERITA prædicentur.

CETERVM hæc gentis VRSINAE decora, ut maxima fuerint, & omnino talia, quibus ad summorum Principum fortunam videatur nihil defuisse: certe tamen adhuc PROFANA (si fas ita loqui) & civilia fuere. Quare vltius ad SACRAS quoq; dignitates sublata; eas omne genus plurimas ita gessit, ut vix habuerit familiam, nisi se ipsam, qua cum dimicaret: tot ab vna ROSA Episcopi, tot Archiepiscopi, tot alij Antistites extitere. Etenim quod ROSIS familiare cum primis est, ut CAPITI ornando CORONAS sufficiant; id VRSINIS ego PRINCIPIBUS gentile munus ac proprium video fuisse: ut SVMMVM VRBIS ORBISQVE CAPVT, corona purpurea perpetuo circumdarent; dum vnius familiae ROSA Cardinales, numero prope innumerabiles, fertili prouentu, suppeditauit: e quibus, ut ceteri taceantur, plus TRIVM, & TRIGINTA superstes memoria est; quorum purpura, tot seculis identidem spectata, Ecclesiae Romanae Maiestas, longius per Orbem latiusq; effulsit. Neque hic tamen VRSINAE ROSAE felicitas se tenuit: sed eadem (quæ votorū

mortalium summa est) suum Orbi Terrarum CAPVT, tot popu-
lis adoratum, de gentili Roseto, sæpe produxit: ne nimirum FA-
MILIA, quæ fecundissimo partu suos tot gentibus Principes de-
disset, in solis Ecclesiæ Principibus, id est, Optimis Maximisque
Pontificibus gignendis, effæta sterilisq; fuisse, diceretur.

*Ex Roseto
Vrsinomul-
ti illustres
Sancti pro-
germinarunt*

CONSISTERE in his fastigijs vel ipsa AMBITIO debuif-
set; neq; Gentis TVAE gloria plus vltra niti, si mortalis felicitas,
explere immortales animos posset. Igitur VRSINI altius adhuc
ire, & CAELVM ipsum inuadere ausi, colonias eo duxere, no-
uisq; ac magnis rem illam publicam ciuib; impleuerunt. Horum
alii fuere MARTYRVM purpura, alij innocentia prætexta vi-
fendi; vtriq; Natalium lucem, quam ex VRSINIS Principibus
vberem hauserant, vitæ claritudine, funereq; illustri, reddiderunt
clariorem. Atq; vt ex his omnibus sacro quodam silentio prætereā
ADALBERTOS, VOLVSIANOS, IOANNES TRAGVRIENSES
multosq; alios magnarum animarum prodigos & vitæ sanctimonia
spectatissimos VIROS, si Vnum TIBI produxero BENEDI-
*Bonif. Sy-
moneta Be-
nedictinus
l. 1. Chri-
stian. Per-
secut. ep. 7.
Edit. Me-
diolan. 1492
Platina in
Vita Ioannis
I. Pontif. E-
dit. Colon.
& Veneta
1583. &
Louan. in
Indice rerū.
Arbor Vrsi-
na, &c.*

CTVM (quem VESTRA sibi cunabula asserunt) Religiosæ
illum magnæq; Sobolis progenitorem: quis inficias ibit, SOLEM
certe eximium ab VRSINIS extitisse; cuius vnus salubri exor-
tu, præmortua Religio, velut infuso calore, reuixerit? Eundem si
TIBI ostendero, iam è Nobili domo elapsus, iam in auias solitu-
dines deductus, iam inter VEPRIVM aculeos volutatus. quis
denuo negabit, enatam ab VRSINIS ROSAM extitisse; quæ
inter spinas erubescens, pulcherrimo colore oculos, & odore sua-
uissimo omnium in se sensus animosq; raptarit? Quo minus mihi
iam mirum videtur, si Rosam tam fragrantem, etiam DOMESTICI
TVI exciti, in paria hodieq; exempla ruant: nempe à cognato san-
guine trahuntur. Eiusmodi TV ipse, DVX INCLYTE; nu-
per exemplum fuisti: cum duos Familiæ TVAE ocellos, fratres
inquam germanos, lectissimos PRINCIPES, suisq; iam honoribus
magnos, FRANCISCVM alterum, alterum VIRGINIVM,
æquo animo passus es, humanis se omnibus abdicare, spretaq; Aulæ
gloria, in Religiosa latibula, se abdere: Vbi in obscuro siti, longius
iam suæ VIRTUTIS, quam ante DIGNITATIS, radios eiacularentur.
Vestrae hoc artis ingenijq; erat; vt in summo apice constituti, cum
ibi crescere splendor generis VESTRI porro vix posset; ipsa obscu-
ritate RELIGIOSA; clariore illustrorēq; fieri disceretis.

Quapropter æque huius ILLVSTRISSIMAE OBSCVRITATIS, ac
VESTRI Gloriosissimi Splendoris, admirator ego, æquissimum du-
xi, vt, dum in terris PRINCIPES VRSINI conspici à mortali-
bus refugiunt, ROSAM VRSINAM in SOLE mortales omnes
suspicerent. Quam ego ROSAM COELESTEM VRSINAM,
nouum nimirum magnumq; SOLIS PHAENOMENON,

TIBI

*Vita Vrsi-
na pietatis
exempla.*

TIBI MAGNAMINE DVX, venerabundus dedico : in quo, fa-
ne exornando, atque perpoliando, vt OPERAM ego facerem,
magnum TV, liberalèmq; sumptum fecisti. Quo ingenti be-
neficio, vere & TE beneficum PRINCIPEM probasti; & me
TIBI TVAEQVE ILLVSTRISSIMAE GENTI, nouo æter-
noq; nexu deuinxisti; Litterasq; & Litteratos, qui aut fructum,
aut gustum hinc aliquem sunt capturi, omnes arctissime obligasti.
Erunt enim, opinor, haud nulli, quos ad hunc diem cæcus vel er-
ror, vel ignoratio huius PHAENOMENI exercuit, longè
à vero, veriq; tramite abductos : ij si per me in viam fortasse redu-
cantur, gratiam omnem TVAE ROSAE debebunt: palam
prædicaturi; quod sicut in fabulis ILLE admorso ROSAE
FOLIO, pecus Arcadicum exuit; Sic ipsi, ROSAE VR-
SINAE beneficio, errorem ignorantiae suæ dissiparint.
Cum Votis Epistolam finio. DEVS TE, INCLYTE
PRINCIPVM, domumq; TVAM GLORIOSAM,
bono publico, incolumem seruet. Romæ, è Domo Societatis
IESV Professa. M. DC. XXIX. Ill. Non. Iulij.



A D LECTOREM.



OR VVM eius esse naturæ perhibent, ut escam nactus cro-
citatu præpostero statim prodat, eoque tam sibi, quam præ-
dæ acquiræ periculum spontaneum accersat, quo superse-
disset, si oblata fortuna in silentio uti maluisset Vnde,
appositè Lyricus.

*Sed tacitè pasci si posset Coruus, haberet
Plus dapis, & rixæ multo minus inuidiæque.*

Cui quidem aui, naturæ instinctum secutæ facilem dat veniam censura; homi-
nis vero in secretis suis pandendis inconsiderata loquacitas uti culpa, ita merita,
vel poena, vel reprehensione non vacat: lapsus enim arbitrio humano subiecti, in-
dulgentiam tardiorē obtinent, Tua namque ut prodas quis cogit? Et si proprio-
rum quidem arcanorum præmatura reuelatio iustam imprudentiæ notam non
effugit; quid de ijs sentiemus, qui aliena proferre gestiunt, & ut res suas usurpant;
legitimosque Dominos possessis deturbant? Equidem humanissime Lector, uti
propria mea inuenta exigua sane & pauca, neque magnificè circumspexi vnquam
neque impetuosè alijs obtrusi, imo potius texti & neglecti: ita aliorum elucubra-
tiones si commendatione dignas iudico, sua laude libenter exorno, mihi autem
ipsas vindicare, etiam si possem, profecto dedignor, non quia viles, sed quia a-
lienæ sint; æmulus in hoc naturæ atque sagacitatis VRSINAE, quod animal
cum succo viuat suo, iure quoque istud sibi usurpat suo, IPSE ALIMEN-
TA MIHI; quod Symbolum VRSINVM, ego quoque in hac VRSI-
NA ROSA, absque arrogantia, sine iniuria cuiusquam mihi vendico, ex
qua corollas de folijs meis, non alienis necto, succum oleumque Rosaceum sudore
& labore meo, non alieno exprimo: nam quod vna cum meis Obseruationibus,
P. Georgij Schoënberger, & P. Caroli Malapertij Macularum solarium cursus in
ordinem à me digestos adduco; æquum est, ut qui primam à me huius apparen-
tiæ doctrinam atque institutionem olim Ingolstadij hauserunt, industriæ suæ fru-
ctum aliquem nunc referant, dum illorum Obseruationes meis illustro, meritaq.
ipsi

ipsi industriæ suæ laude non carent, tametsi tales eæ observationes non sint vt ex illis solis Macularum cursus pleni & perfecti deducantur; quos impossibile est haberi, nisi contactus horizontales exactissimè consignentur, quibus deficientibus frustra loca motusque veri corporum istorum solarium proclamantur; & sine certitudine mathematica, sola persuasione quadam arbitraria, in Catalogum Planetarum circumsolarium accensentur.

Optassem multo magis vt ad manum etiam fuissent ea quæ mihi P. Ioannes Baptista Cysatus, & Pater Chrysostomus Gall accuratè obseruata Ingolstadtij consignauere, meruerunt enim id eorum strenui & plurimorum annorum labores, mea causâ exantlati; quos tamen in curis secundis, dante Deo, non negligam, sed cum foenore producam, atque ex ijs vna cum meis illorum temporum Observationibus, designationes aliorum supparium, quas collectas in Germania conseruo, euentilabo, friuolasque inde deductas consequentias atque falsam doctrinam non arbitrato meo, aut vulgi præcipitis imperu, sed ex ipso Phænomeno (id quod Mathematicum verum facere oportet) Sole clarius, & vberius quam in hoc Opere præsto, ostensam castigabo. Nam ex quo vel Apelles meus post tabulam suam, vel Vlysses post Aiakis clypeum latuit, prodierunt non pauci, qui sumpto pro subula in manus penicillo alienam picturam perfecturi, infecerunt inertia; alij Phænomenon solare, tanquam castissimam Penelopen absente Vlysse adorti miris artificijs infestarunt, dum quiuis hanc sibi sponsam arripere domumque suam deducere collaborat, & SOLARIBVS sese illustrare TENEBRIS, MACVLISQVE condecorare CAELESTIBVS pulchrum putat: quo factum est, vt historicae veritatis ignarus Lector, merito possit hæsitare, & cuiam in tanta Riualium turba hanc elegantem Helenam adiudicet, haud ita facile discernere. Sunt enim qui ambitione atque odio, sunt qui patriarum atque Nationum suarum studio, sunt qui amicitiae affectu, sunt qui persuasionem mera atque auctoritate sola, sunt qui errore ducti huic potius quam illi faueant; sunt tandem qui veritate victi, id quod æquum est statuunt. Quibus omnibus vt certam veritatis faciem præluceam, breuem, simplicem, & incorruptam rerum circa Phænomeni huius inuentionem gestarum summam, (præter ea quæ lib. 1. cap. 2. & lib. 3. in Notis generalibus Nota 28. & alibi in Notis ad Appendicem Imaginis Observationum XXVI. pag. 222. & sequentibus, necnon alijs locis copiosè dicuntur) candidè subnecto.

Anno igitur 1611. in Vniuersitate Ingolstadiana Matheseos Professor Mense Martio, conscensa Templi nostri turri, Telescopio per Nebulam moderatam in Solem proportionatè hebetatum directo, non ex villo rumore præuio, sed Solis explorandi studio spontaneo ductus, Maculas solares prima vice deprehendi, socio lo. Baptista Cysato, Theologiæ tunc studioso, qui ex illo tempore me pro vitris coloratis parandis vehementer incitauit, quod dum perago, mense Octobri anni eiusdem superuenerunt iterum more suo aliqui dies nebulis temperatis respersi, quibus ad obseruandum Solem inuitantibus Tubum opticum in eundem ex meo cubiculo direxi (quemadmodum lib. 1. pag. 63. ex Apellis Tabula expressum habes) die videlicet 21. hora Astronomica 21. Germanica seu à media nocte 9. antemeridiana siue matutina, in eoque Maculas secundùm vidi, multisque alijs Patribus, & studiosis ad horam 10. vsque ostendi; circa quod idem tempus, P. Adamus Tanner earundem Macularum aspectu primo è suo cubiculo potitus est, (id quod tom. 1. Disp. 6. de Creat. Mundi quæst. 3. §. 5. de Maculis solaribus, num. 69. ipse enarrat) rumore vt ait nescio quo præuio, cuius tamen ne leuissimus quidem sibilus ante Maculas à me primo visas aures meas attigit; Martialem namque illarum eamque primam animaduersionem ad id vsque temporis non euulgaueram. Ab hoc autem die Tubi cærulei ad hoc præparati vsum continuò adhibui, aliosque ob seruandi modos, per immissionem, per reflexionem, in primisque

misq; rationem inducendi perpendiculi statim excogitavi, & alios idoneos discipulos sensim edocui. Nam Macularum per tubum directus obtutus ad physica in ipsarum considerationem seu Quaestionem Quid, & Propter Quid, nullum penitus certitudinis momentum habet: numerum quidem, figuram, magnitudinem, colorem apparentem, situm, ordinem, progressionem, coitionem, dilatationem, augmentum, decretionem, apparitionem, disparitionem, moram sub Sole, & si quae sunt generis eiusdem ab opticis profecta, & ad Opticos per se pertinentia, Tubus in Solem directus oculo indicat in genere, non tamen hæc ideo in chartam proiecta habes; neque si obtineres, idcirco motum, & locum verum inde rectè deduceres; quibus deficientibus, de Physi & Natura Macularum, satis solidè non disputatur: vnde ad projectionem in chartam, & perpendiculi inductionem me protinus applicavi, Patremq; Cysatum observandi socium velut individuum adhibui: cumque novitatibus hisce solaribus multos delectari viderem, observationes quotidianas continuaui, & multis præsertim P. Gretsero, & P. Tannero partim egomet, partim per dictum P. Cysatum communicaui, & quia P. Iacobus Gretserus ea de re prænobilem Virum Marcum Velsærum Augustæ Duumvirum Præfectum in scio me certiore fecit; euenit vt is anno deinde ineunte 1612. quattuor è pluribus meis epistolas vna cum observationibus nonnullis in publicum sub Apellis nomine, emitteret: Reuerendo enim Patri Theodoro Busæo Prouinciæ tunc Superioris Germaniæ curam agenti, Phænomenon quidem nouum arriserat, visum tamen non erat, vt in re subita, multisq; adhuc suspecta nomen meum præfigeretur. Quibus factum est, vt hoc nouum Phænomenon, citius quam vellem in Urbis, & Orbis aliquam notitiam peruenerit, spargente illud in omnes Europæ prouincias Velsæro, & Litteratorum sententias exquirente, quas adhuc in Germania custodio, vsui futuras suo fortassis tempore, inter quas, & Protogenis non minimo loco censenda est.

Censor Apellis præsciuit ante datam suam censuram, quis esset Apelles.

Vnus tamen aliquis ex Italis prius à Velsæro veram Apellis nomenclaturam exorsit, quam suam de ipsius Tabula conscripsit censuram; qua id egerit causa, elucebit in primo libro: placuit nimirum inuentum, non placuit auctor manifestatus, qui si ignotus Censori mansisset, post Tabulam suam utique immunis Apelles latuisset; audacem nimis fecit Censorem patefacta vilis (vt ipsi fortè videbatur) conditio Scriptoris, quem patientia nimirum Christiana criminationes doceret tolerare illatas, repellere prohiberet Obedientia Religiosa. Sustinui quidem, per multos annos, & indignitates in Apellis Tabulam commissas sapienter tuli: interim tamen per me, & meos, seu discipulos, seu amicos pro veritate, & innocentia infestata, suo olim tempore defensanda multas imo continuas, & quasi quotidianas domi forisque Macularum solarium observationes procuraui, quæ vt motui indagando inseruirent, praxin inducendi perpendiculi, tanquam rem secretam neque alijs me inuito communicandam pluribus concedidi, potissimum vero P. Io. Baptiste Cysato meo Ingolstadij successori, P. Chrysostomo Gall. Mathematico postea Olyssipponensi, P. Georgio Schoëberger, qui mihi Fryburgi in Vniuersitate Brisgoica successit, P. Iosepho Blancano Mathematico Parmensi, P. Casparo Rueß in Indias Occidentales missio, P. Gulielmo VVeli, & alijs; in primis vero P. Carolo Malapertio, qui Phænomeni solaris nouitate permotus, cum in Polonia anno 1612. proficisceretur, Ingolstadtum ad me diuertit, vt Maculas nunquam sibi antea visas aspiceret, & modum observandi addisceret, quæ vna cū arte consignandi perpendiculi, seu sectionis verticalis inducendæ libenter impertiui, comuni cum alijs secreti lege, sibi vt seruaret, neq; Phænomenon hoc inconsulto Appelle typis euulgaret, eo quod Apelles suæ tabulæ ultimam quādoque apponere manū ipsemet cogitaret, suas & amicorū observationes auxiliares dignis cū præconijs vna editurus: quæ beneuolis animis, & secūdis auribus ab omnibus sēper sunt accepta. Redux autem idem P. Carolus è Polonia Ingolstadtum denuo accessit, atq; absente me, à P. Cysato Eclipticæ inscribendæ rationē iisdē conditionibus accepti.

Ratio perpendiculi inducendi multis cōcedita.

Huiusce

Huiusce namque arcani P. Cysatum ego ab initio, & P. Georgium Schoënbeger diu post, participes effeci. Vnde si quando nostrorum de hoc solari Phænomeno *Observationes cū perpendiculo ab Apelle originē trahūt.* riuuli aliqui in manus oculosque tuos incurrerint, è quibus ij fontibus profluxerint, haud obscurè iudicabis: nam intra domesticos Societatis nostræ parietes se se res ista multis annis continuit, & sat scio à primo inuentionis anno, qui fuit 1611. ad annum 1618. observationes perpendiculo insignitas, adeoque ad certum quid concludendum maximè idoneas, produci nullas posse quam à Mathematicis Ingolstadianis vel factas vel doctas; quid annis posterioribus, vbi & à quibus quantumque præstitum sit, dies ventura dabit. Taciturnitas porro nimia Apellis æmulos ipsius loquaces si non & mordaces fecisse videtur, nam & reum ipsum e-gère annis posterioribus, & inuentionum alienarum *Raptorem*; à cuius criminis infami suspicione Apellem *Libro Primo* purgo, Censoris Apellæi errores in medium *Vide lib. 1.* afferro, atque Inuentionis lauream ROSAE VRSINAE consecro dicoque: & sic secundum Cardinalis Vrsini Symbolum IPSE ALIMENTA MIHI *Lib. 1. materia.* prouideo, non ab alijs emendico.

Quia vero cum ROSIS & spinarum aculei affatim protruduntur, vt non minus de hac VRSINA quam naturali ROSA alterum symbolum VRSINVM enunciet; VISV BLANDA ASPERA TACTV; idcirco *Libro Secundo* difficultates quæ circa solare Phænomenon ex instrumentis, ex obseruandi ordinan-dique Maculas ratione, è cælo, ipsoque Sole atque Obseruatore occurrunt, indi-co, amolior, leues reddo, eaque occasione multa de organo Visus, multa de Tubo *Lib. 2. summa.* Optico ab alijs non tacta, multa de lentibus opticis earumque Refractione dispu-to, Tubi Optici naturam, fabricam, compositionem vsūque edoceo, Demon-strationem eiusdem succinctam afferro: praxin obseruandi, perpendiculum indu-cendi, Eclipticam inscribendi, cursus Macularum & Facularum obseruatorum, ordinandi, atque errores cauendi fideliter trado, & sic fidem *Libro Tertio* indu-bitatam concilio: in QVO Macularum & Facularum cursus in Sole descriptos multorum continuata annorum, mensium atque dierum serie, velut elegantes Rosarum contextas mutuis nexibus corollas ob oculos pono: quemadmodum enim ROSAS, ita & hanc solarem Apparentiam IPSA DIES APERIT, non simul sed successiue, multorum temporum lapsu, patientia longa, studio inde-fatigabili. Videbis enim Cursum cursui, Maculam Maculæ, Faculam Faculænecti; experieris Maculam Faculæ, aut hanc illi grata vicissitudinis alternatione succedere; contueberis lucem à Faculis nunc ante, nunc pone, mox iuxta admi-nistrari: integros Maculis immixtos spectabis Facularum manipulos, veluti rosa-rum fasciculos carbuncolorum iubare distinctos, nec deerunt ipsis Maculis suæ Facularum candicantes plagæ; quin & ipsas lauri baccas in signum victoriæ na-tura veritatis fidiſſima administra dispensat, dū NVCLEOS NIGRICANTES in ipsis Macularum vmbilicis distribuit; foliorum autem speciem non iniucundam præbent Vmbræ & Maculæ secundariæ, quæ dum toto solaris circuli complexu quasi temerè dispersæ vagantur, Vrsis laureatis, pompamque solarem atque RO-SAM VRSINAM circo cælesti circumuectantibus, iter odoriferum, & stratum molle suppeditant.

Viso exteriori ROSAE VRSINAE habitu incessuque *Liber Quartus* ad interiora progreditur, ipsiusque natalem locum atque incunabula in ipsa Solis regia detegit, quin & ipsius Solis prolem indicijs haud dubijs manifestat: nam & lucis præstantia, & eadem motus pernicitate cum eodem contendit; ipsa eosdem gyros annuos, eosdem choros menstruos, circa sphaeræ solaris centrum proprium vna cum Sole peragit, & modo cæli partibus superis, modo hisce inferis sese læta explicat, quaque id fiat ratione, RATIO IPSA THEORICA è Phænomeno desumpta luce clarius commonſtrat.

Fama est Vrsos informem foetum lambendo formare: vnde illud VRSINVM Emble-

Emblema; INDVSTRIA FORMAT: quod si Vrſorum CONSTANS catulos
INDVSTRIA FORMAT, Huic certe meæ VRSINAE ROSAE tot annis nunc
cultæ, ne quid elegantiae atque venustatis deesset, præter ea quæ ex sensu mani-
festo adduxi, quæ ratione firma conclusi; ornatum etiam aliunde accersiui: in-
calce itaque Operis multa de Solis, Siderum cælique natura vel IGNEA, vel
CORRVPTIBILI, vel denique LIQVIDA, ex Auctoritate tam Sacra quam pro-
fana, tam veteri quam recenti, apertis & in medium allatis ipsis Scriptorum fon-
tibus, Lectori perpendenda affero. Scribunt Ornithologi, & confirmant aucupijs
dediti, Perdices fæmellas steriles oua matribus fæcundis è prolis desiderio surripi-
re, atque surreptis incubando pullos alienos excludere, qui deinde auditam natu-
ralis matris vocem agnoscant, adeoque nouerca protinus deserta parentem ve-
ram sequantur. Multi Phænomeno huic solari, tanquam ouo ex ipso Iouis cerebro
prognato hucusque incubarunt, sapientiamque suam veluti Palladem nouam ex-
cluserunt: multæ auditæ sunt & audiuntur alienæ solarem fætum ad sese allectan-
tium voces: MATER VNA VERA, Veritas vna Phænomeni est: *Quem Phæ-
nomenon solare sequitur, ipse Phænomeni verus Auctor, & quem veraciter sequa-
tur, Tu Lector æquus esto* ARBITRATOR. Romæ in Domo Societatis IESV
professa anno 1629. iij. Non. Iulij.





INDEX

IN QVO NON SOLVM

Summa Capitulorum, sed totius Operis
præcipui tituli habentur.



INDEX LIBRI PRIMI.

Summa Libri.



VRGAT se Au-
ctor ab infami
furto, cuius eum
quidam infimu-
labant, & Phæno-
meni solaris fæ-
tum esse suum,
aduersarijque er-

rores ostendit. pag. 1.

Cap. I. Occasio Auctori scribendi in Vr-
be, pag. 1

Cap. II. Apelles quis sit detegitur, no-
menclaturæ & occultationis ori-
go reseratur, & ex facinore illi o-
bieto respondendi necessitas o-
stenditur. pag. 6

Cap. III. Apellem expositam in sua
Tabula de Maculis solaribus do-
ctrinâ à Censore suo non habuif-
se ostenditur primò ex ipsius Ta-
bulæ constitutione. pag. 9.

Cap. IIII. Apellem suam de Maculis
solaribus doctrinam à censore nō
habuisse colligitur secundo ex
præmissis, per causas quasi mate-

rialem, formalem & efficientem
pag. 17.

Cap. V. Apellem suam de Maculis sola-
ribus doctrinam à Censore non
habuisse demonstratur tertio ex
historia chronologica. pag. 18.

Cap. VI. Apellem suam de Maculis so-
laribus doctrinam à Censore non
habuisse demonstratur quarto, ex
auctoritate testium omni exce-
ptione maiorum. pag. 21

Cap. VII. Apellem primam inuentionis
gloriam Censori auferre non con-
tendisse ostenditur. pag. 23.

Cap. VIII. Apellem se non fecisse primū
Macularum Solarium inuentorem
post Censorem. pag. 26

Cap. IX. Apellem suam Tabulam à
Censore non transtulisse, & Cen-
sorem pro Macularum inuentore
habendum non esse, probatur ex
ijs, quæ huic Phænomeno essen-
tialia Censor prorsus ignorauit &
Apelles habet. pag. 31.

Cap. X. Ex Apellis Tabula & Historia
Censoris, Phænomenoque Solis in
eis descripto, eadem quæ prius
probantur, & principales Censo-
ris errores circa hoc Phænomenō

b

indi-

Index Titulorum, & Capitem.

I.

- indicantur . pag. 42.
Antitheses Censoris, & Apellis. p. 43.
Figura in qua deteguntur errores Censoris in exemplis practicis. p. 47
Corollaria in quibus Censoris errores examinantur . p. 49
Cap. XI. Absolutio Apellis facta per Censorem, siue dum pro illo loqui siue dum illi videtur obloqui . p. 53
Ostenditur primum falsum quod Censor Lectori obtrudebat videlicet Apellis tabulam, & accuratorem disquisitionem præter epistolam ultimam (ex qua tamen nulla comparatio affertur) esse priores & scriptione & impressione maxima ex parte, ipsa prima Censoris epistola . pag. 56.
Et sic demonstratur etiam secundum sc. inter scriptas ab Apelle epistolas continuum filum nexumque intercessisse. pag. 57
Punctum tertium in quo mora temporis, intra quam Apelles ex Censoris virgula, in sententia sua inconstantia arguitur, admodum parua, & nullius fere momenti fuisse demonstratur . pag. 59
Figura Macularum in Sole apparentium ann. 1611. ad latitudinem gr. 48. m. 40. pag. 63
Scriptorum Apellis ex mente Censoris approbatio . pagina 65

INDEX CAPITVM LIBRI secundi.

SVMMA LIBRI.

- Modus** obseruandi Phænomenon edocetur, difficultates eruuntur, atq; pro virili submouentur, & Tubus opticus à fundamētis explicatur.
Caput I. Studium astronomicum Phænomenis indagandis deditum laboriosum . pag. 68
Cap. II. Ex ipso Sole huius Phænomeni parente, tres generales scaturiunt difficultatum fontes . p. 68
Cap. III. Difficultates ex instrumentis. Et primò reijcitur ab hac inquisitione, naturalis oculi potentia, ius, & videndi ratio . pagina 69

II.

- Cap. IV.** Helioscopij inuentio, descriptio, vsus & difficultates . pagina 79
Cap. V. Modus naturalis Solem in papyrus proijciendi, eiusque difficultates . pag. 72.
Cap. VI. Immissio Solis artificiosa, per vnam lentem conuexam, & eius difficultates. pag. 74
Cap. VII. Immissio Solis artificiosa, seu Telioscopica, quæ & transmissio dicitur, & eiusdem utilitates . p. 75
Cap. VIII. Immissionis Telioscopicæ machina, & eiusdem partes, atque stereographica delineatio, atque in vsu impedimenta, pagina 76.
Machina Helioscopica . pag. 77.
Cap. IX. Triplex motus Solis, e quo inter obseruandum difficultates enascuntur, proponitur . pagina 78
Cap. X. Ex motu Solis diurno difficultates & earum cautio . pagina 78
Cap. XI. De motibus Solis & Macularum qui in circulo obseruatorio notantur & eorum difficultates atque remedia. pag. 80
Cap. XII. Motus Solis secundus circa suum centrum eiusque difficultates, & remedia. pag. 81
Cap. XIII. Exemplum motus Macularum circa centrum Solis, ex proprio & diurno compositi, eiusque explanatio, pagina 84
Imago huius motus . pagina 85
Cap. XIV. Motus Macularum spiralis diurnus est retrogradus, stationarius & iterum progressiuus. pag. 86
Cap. XV. Quo diei tempore, & qua hora, datus Solis in Ecliptica locus, eandem supra horizontem mediet? pag. 89
Cap. XVI. Metam temporis, ultra quam se recta circuli verticalis ad Eclipticam inclinatio, in dato quocunque loco non extendit, determinare. pagina 91
Figura Quando Solis locus Eclipticam supra horizontem mediet . pag. 93

Cap.

Index Titulorum, & Capitum.

I.

- Cap. XVII. Difficultates quæ in confignandis Maculis, ex motu illarum proprio occurrunt, atque earum cautela. pag. 95
- Cap. XVIII. Quid faciendum quando obseruandū tempore & loco importuno, pag. 96
- Difficultates e vitris Tubi earumque remedia, pag. 96
- Figura lentium Telioscopicarum, pag. 98
- Cap. XX. Ad discernendas bonas lentes regulæ practicæ, pag. 99
- Regula prima, ibidem.
- Regula secunda, pag. 101
- Regula tertia, pag. 102
- Cap. XXI. Collocatio Lentium in genere & ad eandem necessaria, pag. 103
- Cap. XXII. Machinæ obseruatoriæ verticalis, eiusque partium explicatio vberior, pag. 103
- Figura Machinæ helioscopicæ. pagina 105
- Cap. XXIII. Oculi, & Telioscopij, lentiumque telioscopicarum comparatio, Naturæ & artis mirabilis conspiratio, pag. 106
- Figura in qua Artis & Naturæ, Tubi & Oculi, in speciebus solaribus præsentandis consensus ostenditur, pag. 107
- Cap. XXIV. Vt Tubus oculus, sic oculus in multis arte sequitur Tubū. pag. 112
- Figuræ secundæ B, 1. & B, 2. artis & naturæ, Tubi & Oculi concurrentis explanatio, ibid.
- Cap. XXV. Vterior oculi cum tubo artificioso comparatio ex vsu specilli conuexi, pag. 114
- Figuræ tertiæ C, 1. & C, 2. explicatio, ibid.
- Lentis conuexæ ad conuexam primus positione casus, ibidem pag. 114
- Casus secundus, pag. 116
- Cap. XXVI. Bæcon communium tam confusarum quam ordinatarum, à pluribus lentibus conuexis causatarum, generatio, natura, effectus, nec non collatio ad oculus, & omnimoda vtrunque similitudo demonstratur, eadem pagina 116

II.

- Figura, lentium conuexarum tam inter se, quam cum oculo comparationes, proprietates, & effectuum in repræsentando similitudines, complectens. pag. 117
- Cap. XXVII. De casu tertio, quando lentis, & concursus seu basis communis ante lentem d, absoluitur, pag. 120
- Dictorum applicatio ad oculus, specillo conuexo post situm euersum, vtentem, pag. 121
- Cap. XXVIII. Figura quarta D, 1. & D, 2. explicatur, & occasione illius, vis ex natura lentis cauæ, eiusque cum lente conuexa coniunctæ effectus & proprietates ostenduntur, adeoque Tubus Opticus communis demonstratur. pagina 122
- De Lente Caua, pag. 124
- Figura in qua lentis cauæ species confusa proponitur, pag. 125
- Tubi Optici communis in ordine ad species repræsentandas in charta demonstratio, pag. 127
- Figura Tubi Optici, ibid.
- Cap. XXIX. Figuræ quartæ D, 1. & D, 2. explicatio continuata, in qua oculi Tubo communi vtentis & Tubi è duobus conuexis, & vna lente intermedia conflati, in speciebus recipiendis, similitudo, Tubique optici in ordine ad oculum natura ostenditur, pag. 128.
- Lentium opticarum duæ experientia practica, p. 128.
- Positionis trium lentium casus quartus, pag. 129
- Cap. XXX. Figurarum prædictarum vsus & praxis pag. 129
- Explicatio figuræ septimæ G 1. G 2. de artis & naturæ, tubi & oculi in speciebus repræsentandis consensu. p. 129
- Vsus, & praxis figuræ primæ, pagina 130
- Figuræ tertiæ ibid.
- Figuræ sextæ ibid.
- Cap. XXXI. Vfus Telioscopij in ordine ad Solem, & Planetas, p. 130
- Cap. XXXII. Vfus, & praxis Figuræ quartæ D. 1. & D. 2. pag. 130
- Helioscopium & eius vsus, pag. 132
- b 2 De

Index Titulorum, & Capitem.

I.

- Cap. XXXIII. De Telioscopio obseruatorio ordinando, & feligendis debiteq. imponendis lentibus, p. 133
- Problema I. Lentis datæ conuexæ locū imaginis ordinatæ seu stationem, baseos communis specierum ordinatarum practicè seu mechanicè reperire, pag. 134
- Problema II. Lentis datæ concavæ locū seu distantiam à data conuexa, practicè assignare, pag. 134
- Problema III. Longitudinem Tubi ad datas duas lentes, conuexam & concavam, practicè assignare, ibidem.
- Problema IV. Ad datas lentes, conuexā & cauam, distantiam chartæ practicè assignare, ibidem.
- Problema V. Iisdem Tubi lentibus imaginem obiecti augere. pag. 135
- Problema VI. Eisdem tubi lentibus imaginem obiecti minuire, ibid.
- Problema VII. Eisdem tubi lentibus eādem imaginem in charta semper æqualem præsentare, ibid.
- Dubia practica, pag. 136
- Cap. XXXIV. De circulo solari & obseruatorio, eorumq. difficultates, ibidem.
- Quæst. prima. Vtrum ad praxim obseruandi, melior sit circulus obseruatorius maior an minor? eadem pagina.
- Quæstio secunda. An circulus magnus obseruatorius possit haberi e tubo quolibet etiam paruo? pag. 137.
- Quæstio tercia. Vtrum circulus obseruatorius magnus ex telioscopio paruo sit tam bonus, quam è magno? ibidem.
- Quæstio quarta. Vtrum melius sit circulos obseruatorios facere inter se æquales, quam inæquales? ibid.
- Quæst. quinta. An præstet omnes obseruatorios circulos ab eodem an à diuersis telioscopijs proficisci? ibi.
- Quæstio sexta. Præstetne omnes obseruationes sub vna vnus Telioscopij diductione peragere & diuersos obseruatorios circulos constituere pro accessu & recessu Solis; an multas facere Telioscopij deductiones & contractiones pro conseruando vno circulo obseruatorio, & Solari? pag. 137

II.

- Quæstio septima. Meliusne sit, diuersas obseruationes peragere, sub vno circulo obseruatorio, an singulis obseruationibus dare singulos, sed inter se se æquales circulos obseruatorios? ibidem pagina 137
- Quæstio Octaua. Suntne circuli obseruatorij parui tanquam inutiles penitus eliminandi? pag. 138
- Quæstio Nona. Quid de circulis & obseruationibus quæ ex vnica lente conuexa in chartam deducuntur est sentiendum? suntne alicui vsui? ibid.
- Quæstio Decima. Quomodo circulus obseruatorius practicè est designandus? ibid.
- Figura Machinæ Helioscopicæ. 138
- Cap. XXXV. Modus & praxis obseruandi Maculas & Faculas solares. pag. 138
- De inducendo obseruationi macularum perpendiculo, pag. 139
- Cap. XXXVI. Praxis cæcam atque mortuam obseruationem illuminandi, atque viuificandi, ibid.
- Praxis temporis in obseruatione signandi, pag. 140
- Exemplū obseruationis ordinariæ proponitur, ibid.
- Figura practica obseruandi Solem, & inducendi lineam verticalē seu perpendiculum. pag. 141
- Cap. XXXVII. Obseruationum examina. pag. 142
- Primum examen obseruationum per interualla Macularum, vel à margine, vel à Maculis alijs notata, ibidem.
- Secundum examen obseruationum per plures obseruationes, idque modis varijs, ex loco, tempore, personis. pag. 143
- Cap. XXXVIII. Praxis in obseruationes Macularum solarium inducendi Eclipticam, & circa eandem difficultates. pag. 144
- Primus modus, Quo Eclipticæ cum verticali circulo angulus acquiritur beneficio globi materialis. pagina 144.
- Lemma. Dato in plano circulo æqualem describere in sphaera, pagina 144

Index Titulorum, & Capitum.

I I.

Problema I. Ex altitudine Solis supra horizontem aut hora data, angulum quem Ecliptica ad locum Solis cum circulo verticali, facit, in globo Mechanice inuenire. pag. 144.

Eundem ex sola altitudine Solis deprehendere, pag. 145.

Ex hora sola præcognita, eundem habere, ibidem.

Modus secundus itidem Mechanicus docet eundem Angulum, quem facit verticalis cum Ecliptica, exhibere in globo, vel quouis alio instrumento, in quo datur Ecliptica, & Circulus Aequatori parallelus, per verticem loci ex polo mundi descriptus: idque vel ex habita Solis supra horizontem eleuatione, vel ex data hora. pag. 145.

Lemma. Descripto in plano circulo æqualem exhibere in globo, ibid.

Figura huius descriptionis, ibidem pagina 145.

Problema II. Altitudine Solis supra horizontem aut hora data, angulum quem Ecliptica, ad locum Solis cum circulo verticali facit, in globo mechanicè ex altitudinis complemento aliter inuenire, pagina 146.

Ex complemento altitudinis Solis eundem habere, ibid.

Ex sola hora, ibid.

Prædicti anguli quem verticalis cum Ecliptica, facit inueniendi modus tertius. pag. 146.

Problema III. Angulum quem verticalis cum Ecliptica facit, in Analemmate Eclipticæ inuenire. ibidem.

Constructio problematis pro inueniendo hoc angulo, ibidem.

Demonstratio problematis & vsus, ibid.

Figura problematis ad inueniendum angulum quem verticalis cum Ecliptica facit, pag. 147.

Cap. XXXIX. Quartus, prædictum Eclipticæ cum verticali angulum, inueniendi modus, ex astrolabio Gemmæ Frisij vniuersali, accommodato plano Eclipticæ, ibidem pagina 147.

Constructio & Demonstratio Astrolabij, pag. 148.

I I.

Figura astrolabij, pag. 148.

Problemata practica.

Problema I. In quanta verticalis ad Eclipticam inclinatione, Sol quouis signi gradu oriatur, ostendere practice ex Astrolabio, pag. 149.

Problema II. In quanta verticalis ad Eclipticam inclinatione Sol dato signi gradu occumbat, practice ex Astrolabio ostendere. ibidem pagina 149.

Problema III. Locum in recta A E, assignare, in quo Sol Eclipticam supra horizontem mediat, in dato signi gradu. pag. 149. col. 1.

Problema IV. Determinare in quam astrolabij parte, ad datum Solis in zodiaco locum, mediatrix A E, versetur orientali an occidentali, ibid. col. 3.

Problema V. In dato Astrolabio, ad datum Solis in zodiaco locum, & centrum circuli per verticem, altitudinem Solis meridianam & circulum meridianum assignare, ibid. col. 4.

Problema VI. Macularum regressum, stationem, & progressum circulo per verticem practice ostendere in Astrolabio, ibid. pag. 149. colum. 8.

Cap. XL. Dictorum de Astrolabio applicatio ad praxim obseruandi, p. 149. col. 24.

Problema I. Omnes verticales circulos, quos Sol ad datum diem percurrit, sub oculos constituere. pag. 149 col. 24.

Problema II. Verticalem horizontalem, seu orientis & occidentis Solis ad datum diem ostendere, pag. 149. colum. 26.

Problema III. Ad datum diem, punctum contactus veri & sensibilis assignare, ibid. col. 27.

Problema IV. Arcum regressionis Macularum ad diem datum assignare, pag. 149. col. 27.

Problema V. Altitudinem Solis supra horizontem, ad datum diem & contactum assignare. ibid.

Problema VI. Altitudines Solis duas inuenire, intra quas contactus physicus, ad datum diem contingat. pag. 149. col. 28.

Index Titulorum, & Capitem.

I.

Problema VII. Altitudines duas Solis supra horizontem assignare, quibus ad datum diem, tempore vel ante-meridiano vel pomeridiano, duo anguli inter verticalem & Eclipticam, æquales fiant: oportet autem datum diem assumi in signis borealibus, in nostra sphaera. pag. 149. columna 28.

Problema VIII. Sub quanta verticalis ad Eclipticam inclinatione Sol quotidie oriatur aut occidat enunciare. pag. 149. col. 28.

Problema IX. Sole in horizonte posito, minimam & maximam, totius anni verticalium ad Eclipticam inclinationem enunciare. pagina 149. colum. 29.

Problema X. Sole in meridie constituto, enunciare quando maximas, & quando minimas verticales circuli ad Eclipticam inclinationes faciant. pag. 149. col. 29.

Problema XI. Minimam & maximam Solis altitudinem meridianam enunciare. pag. 149. colum. 29.

Problema XII. Tēpus observationibus maxime opportunum toto anno, mense & die quolibet enunciare. pag. 149. colum. 30.

Problema XIII. Modus quintus, quo angulus inuenitur quem Ecliptica cum circulis verticalibus facit, per triangula sphaerica. pag. 149. col. 33.

Figura triangulorum sphaericorum. ibidem.

Cap. XLI. Praxis angulum dictis modis inuentum, in circulum obseruatorium applicandi. pagina 149. columna 36.

Figura modi obseruandi Maculas & Faculas Solis, ibid.

Exemplum secundum inductæ Eclipticæ, in obseruationes duas diei vnus. pag. 149. col. 37.

Figura exempli ibidem.

Inducendæ Eclipticæ Exemplum tertium. pag. 149. col. 39.

Figura exempli ibidem.

Cap. XLII. Praxis multas vnus Maculae obseruationes, Ecliptica insignitas in vnum circulum redigendi. p. 149. colum. 41.

II.

INDEX LIBRI TERTII.

Summa Libri.

LIBER TERTIVS continet Imagines Solis à diuersis obseruatas, diuersis locis & annis, & ab Auctore in Ordinem Cursuum redactas: Imaginum explanationes; nouam machinam Heliotropij; inuestigationem anguli quem facit Ecliptica cum meridiano ad punctum datum Eclipticæ; inductionem Eclipticæ in Obseruationes, cum demonstrationibus varijs, Tabulam item Ascensionum, rectorum & declinationum vnus quadrantis Eclipticæ per quina minuta, &c.

Phænomenon solare esse, ex ipsis potissimum obseruandi modis, euidenter asseritur. pag. 151.

Demonstratio prima, ex varijs obseruandi modis. ibidem.

Demonstratio secunda. A locorum diuersitate, pag. 152.

Demonstratio tertia. A tempore, ibidem.

Demonstratio quarta. Ex ordine & regularitate. ibidem.

Demonstratio quinta. Ex fallaciæ opticae natura, pag. 153.

Demonstratio sexta. Ex obseruationibus annuis, ibidem.

Notæ generales ad obseruationum imagines rectæ intelligendas per opportuna, pag. 154.

Notæ particulares ad Tabulas seu imagines obseruationum, pag. 163.

Imagines Obseruationum.

Imago Macularum Solarium Mēsis Decembris prima, pag. 165.

Ianuarij 2. pag. 167.

3. pag. 169.

4. pag. 171.

5. pag. 173.

Februar. 6. pag. 175.

7. pag. 175.

8. pag. 177.

9. pag. 179.

10. pag. 181.

11. pag. 183.

12. pag. 185.

Martij 13. pag. 187.

14. pag. 189.

April. 15. pag. 191. & 193.

16. pag. 195.

Index Titulorum, & Capitum.

I.

17. pag. 197
 18. pag. 199
 19. pag. 201
 20. pag. 203. & 205
 21. pag. 207
 Maij 22. pag. 209
 23. pag. 211
 Imaginū 23. & 24. appendix. pag. 227
 24. pag. 213
 Iunij 25. pag. 215
 26. pag. 217
 Imag. 26. appendix 223
 27. pag. 229
 28. pag. 231
 Iulij 29. pag. 233
 30. pag. 235
 31. pag. 237
 32. pag. 239
 33. pag. 241
 34. pag. 243
 35. pag. 245
 Aug. 36. pag. 247
 37. pag. 249
 38. pag. 251
 Sept. 39. pag. 253. & 255
 40. pag. 257. & 259
 41. pag. 261
 Octob. 42. pag. 263
 43. pag. 265
 44. pag. 267. & 269
 45. pag. 271
 Nou. 46. pag. 273
 47. pag. 275
 Dec. 48. pag. 277
 49. pag. 279
 50. pag. 281. & 283
 51. pag. 285
 52. pag. 287
 53. pag. 289
 Ian. 54. pag. 291
 55. pag. 293
 56. pag. 295
 Febr. 57. pag. 297
 58. pag. 299
 59. pag. 301
 Mart. 60. pag. 303. & 305
 61. pag. 307. & 309
 Apr. 62. pag. 311
 63. pag. 313
 Maij 64. pag. 315. 317. & 319
 Imago 65. in qua conferuntur cursus
 Macularum Iunij, & Decemb.
 Imago 66. subcontrariorum cursuum
 Iulij, & Ianuarij pagina 325.
 & 327

II.

Imago 67. subcontrariorum cursuum
 Augusti, & Februarij, pagina
 329. 331
 Imago 68. subcontrariorum cursuum.
 Augusti, & Septembris, pag.
 333. 335
 Imago 69. cursus obseruati Heliotropio
 pag 337. 339
 Imago 70. continens cursus contrarios
 mensium Nouembr. Maij, &
 Iunij, pag. 341. & 343
 Imago Rosæ Ursinæ seu Meditullium in
 quo ex nouo obseruandi modo,
 facies Solis abstrusior, seu Macu-
 læ secundariæ, atque adeo vmbra
 & luculæ alternæ, solarem super-
 ficiem perpetua variatione infi-
 dentes vnaque cum Sole, motu
 regularissimo exhibentur à die
 3. ad 16. Septembris 1628. Romæ
 pag. 345
 Partes huius apparentiæ in Sole, pag.
 344
 Amplitudo huius apparentiæ, pagina
 344
 Duratio huius in Sole apparentiæ. ibi-
 dem.
 De Vmbris seu Maculis secundarijs, pa-
 gina 346
 De Luculis in Sole, pag. 346
 De Plagis in Sole æquabilibus, pagina
 346
 Motus huius Macularū secundariarum
 apparentiæ, pag. ibid.
 Huius apparentiæ obseruandæ modus,
 pag. 347
 De alio instrumento Telioscopico He-
 liotropico à Patre Christophoro
 Gruënberger recens fabricato,
 pag. 347
 De Nomenclatura Telioscopij heliotro-
 pici. pag. 348
 Telioscopij heliotropici fabrica, p. 348.
 Figura Heliotropij Telioscopici, qua
 Machina Macularum cursus ab-
 que vilo perpendiculo aut labo-
 riosa Eclipticæ ad verticalem cir-
 culum inclinatione acquiritur;
 pag. 349
 Officia singularum Heliotropij partium
 pag. 350
 De alia huius instrumenti Heliotropici
 compositione & forma, pagina
 350

Yfus

Index Titulorum, & Capitulorum.

I.

Vfus totius Telioscopij Heliotropici, pagina 352
 Praxis obseruandi per Heliotropicum, pag. 352
 Inuestigatio anguli, quem ad quoduis punctum Eclipticæ, facit circulus horarius vel meridianus, cum Ecliptica, pag. 354
 Dato arcu in triangulo rectangulo, qui recto angulo opponitur, cum altero angulorum non rectorum, inquirere alterum angulum non rectum, & duos arcus circa angulum rectum, pag. 354
 Figura trianguli sphericæ, 355
 Tabula pro angulo quem Ecliptica facit cum circulo declinationis, pag. 356
 Vfus Tabulæ & descriptio Eclipticæ in circulo obseruatorio, ibid.
 Modus analemmaticus prædictum angulum inueniendi, pag. 357
 Constructio problematis ad indagandum angulum quem meridianus cum Ecliptica facit in alia figura, 358
 Aliæ figuræ pro indagando angulo, pag. 359
 Alius modus Geometricus Eclipticam in obseruationum circulum importandi, & angulos prædictos vtriusque inueniendi, per descriptionem radiorum polarium radijs zodiaci similium, quorum vñs apud Astronomos & præsertim Gnomonicos, est quotidianus, pag. 362
 Instrumentum Eclipticam & Angulos quos Ecliptica cum circulo horario seu meridiano per totum annum facit, eorumque complementa dictu citius geometricè indagandi, pag. 363
 Aliæ figuræ dictum angulum inueniendi, pag. 365
 P. Christophori Gruenbergeri demonstratio prima Canonica, ex analogia figuræ quintæ, 366
 Demonstratio secunda, 367
 Theoria & fundamentum sequentium demonstrationum, 368
 Explicatio figuræ septimæ casus primi, ibidem.
 Explicatio figuræ secundi casus, pag. 370

II.

Explicatio tertij casus in figura septima, 370
 Triangula, 372
 Alia inuentio anguli quæsitæ, noua & expeditissima, per tabulas declinationum & ascensionum rectorum, ibidem.
 Inuentio arcus NG, Geometrica per lineas, pag. 374
 Aliæ praxes eiusdem problematis, ex secundaria inspectione Theoriæ tertij casus, deductæ ac demonstratæ, ipsique Macularum Phænomeno singularissime accommodatæ, 378
 Figura 10. 11. & 13. pro inuestigando angulo, 379
 Fundamenta praxis primariæ, pagina 382
 Fundamentum secundariæ praxis, pag. 382
 Praxis primaria, pag. 383
 Eadem compendiosior, 384
 Praxis secundaria, pag. 384
 Circuli polaris, vel circuli declinatorij analemmatis distributio in ascensiones rectas, pag. 384
 Ascensiones rectas inueniendi ratio, pag. 386
 Aliter supposita demonstratione praxis regię, pag. 386
 Postrema & propria regię praxis demonstratio, pag. 388
 Appendix pro solutione Geometrica, triangulorum sphericorum, p. 389
 Tabula Ascensionum & declinationum rectorum, pag. 391.

INDEX LIBRI QVARTI:

Summa Libri.

LIBER QVARTVS in duas partes diuisus est, quarum prima proprietates motus Phænomeni habet; refractionis inæqualitatem causatam per lentes opticas, augmentum & decrementum Macularum physicum, earumque lucem & obscuritatem, deinde examinat Nuculorum in Maculis naturam, figuram Macularum ortum & interitum macularum earumque incipiendi modum, tandem disputat de loco Phænomeni vero & aliquot maculas reductas producit.

Secun-

Index Titulorum, & Capitum.

I.

Secunda pars est de motu Macularum: de via earum Regia eiusque causis; de apparente Solis circulo maximo, & quanto is minor sit arcu latente: de magnitudine diametri solaris: de magnitudine Macularum, de natura Phænomeni, ætate, causa, effectibusque: de luce & colore: denique pro natura Cæli ignea, corruptibili & liquida multi sanctorum Patrum, Theologorum, Philosophorum, & Astrologorum tam recentium quam antiquorum in medium producuntur.

De Motu Macularum locali, pagina 404

Caput primū. Pronuntiatum primum, Omnes Maculæ (quam diu durant neque motu proprio in auersam Solis plagam auertuntur) quotidie cum Sole mane apparenter oriuntur, cūque eodem toto die conuertuntur, & vespere occumbunt, neque Solem deserunt, in vlla orbis terreni parte conspectæ; imo tempore eodem visuntur vbique ab obseruatoribus diuersissimis in locis solaris disci iisdē, progressionibus plane vniformibus, distantijs à centro & marginibus, vel æqualibus vel proportionalibus. pag. 405

Cap. II. Pronuntiatum II. Omnes Maculæ, nulla dempta videntur semper moueri ab Orientali Solis plaga, in eiusdem occidentalem. pag. 406

Cap. III. Ex pronuntiato secundo ostenditur, nullam Lunaris cæli sphæram posse vllam in Sole causare macularum vllarum apparentiam. pag. 408

Cap. IV. Ex eodem pronuntiato ostenditur, nullum Orbem sphæræ mercurialis, vllam posse in Sole causare Maculam suo interuentu. pag. 409

Cap. V. Ex eodem secundo pronuntiato nullus Orbis qui sphæram Veneris constituere finguntur, sua interpositione, vllam in Sole Maculam obijcere potest visui. pagina 410.

Cap. VI. Theoria Mercurij & Veneris circa Solem, pag. 412

Figura Veneris & Mercurij circa Solem moti. pag. 413

II.

Cap. VII. Pronuntiatum III. Nulla Macula, nulla Facula, seu primaria seu secundaria, extra patentem Solis orbem, siue horizontem ipsius conspicuum, vnquam apparet. pag. 414

Cap. VIII. Pronuntiatum IV. Nulla Macula, aut stare in Sole, aut regredi, aut præcipitari visa est, tot nunc annis, pag. 420

Cap. IX. Pronuntiatum V. Omnium Macularum itinera, tempore eodem apparent generis & situs eiusdem, cæteris paribus, pagina 421

Cap. X. Pronuntiatum VI. Omnia Macularum itinera ab eisdem parallelis annue descripta, sunt ad sensum sibi similia, & plerumque tempore æqualia. pag. 422

Cap. XI. Pronuntiatum VII. Omnes Maculæ in parallelis equalibus delatæ, & semestri temporis intervallo à se distantes, faciunt motus quidem ordinarie similes & æquales situ tamen & tendentia subcontrarios. pag. 423

Cap. XII. Pronuntiatum VIII. Omnium Macularum & Facularum itinera bis fiunt in anno rectilinea ad sensum, semel circa finem Nouembris & initium Decembris: & semel intra finem Maij & initium Iunij, pag. 424

Cap. XIII. Sphæram in qua Maculæ circa Solem gyron cogitantur, non esse Sole maiorem & homocentricam. ibid.

Admonitio de sphæris circa Solem compositis. pag. 425

Cap. XIV. Sphæram in qua Maculæ circa Solem gyron cogitantur non esse Sole maiorem & heterocentricam. pag. 426

Excentricas secundum longitudinem, ibidem.

Figura quarta circulorum excentricorum pag. 427

Cap. XV. Excentricitas mixta. sphæram in qua Maculæ circa Solem gyron cogitantur, non esse Sole maiorem, & excentricitatis mixtæ. pag. 428

Cap. XVI. Pronuntiatum IX. Itinera Macularum omnia, ad sensum rectilinea

Index Titulorum, & Capitum.

I.

- Ætilinea*, paulatim abeunt in curuilinea, ita vt ex rectitudine brumali sensim intumescant versus Aquilonem, augescante curuitate continenter per tres menses, Decembrem, Ianuariū, Febr. inde per tres alios eodē modo menses, Martium videlicet, Aprilem, & Maium, vsq. ad initium Iunij, prædicta curuitas decrescit, inque rectitudinem æstiuale sese recipiunt Macularum vestigia itineraria. pag. 430
- Cap. XVII. Quæ possint colligi ex enarratis Motus Macularum proprietatibus. pag. 434
- Cap. XVIII. Pronuntiatum X. Macularum omnium itinera, circa aut paullo post initium Iunij rectilinea paulatim inflectuntur in curuilinea, magis magisque arcuata, donec paullo post initium Septembris, in Austrum maximè conuexa & in æquilibrio constituta fuerint ex quo rursus per tres menses, scilicet Septembrem, Octobrem, Nouembrem ad initium Decembris, pedetentim decrescunt, & sese in rectitudinem annuā referunt, sunt autem curuitates istæ, cæteris paribus, huius æstiuo autumnalis, alterius hybernouernalis in modo crescendi, itemque figura similes & quantitate necnon duratione æquales; situ tamen oppositæ: conuexitas enim arcuum itinerariorum semper vergit in austrum, concauitas semper in boream; & reliqua omnia priore semestri ostensa, fiunt hic etiam, sed situ contrario. pag. 436
- Cap. XIX. Pronuntiatum XI. Omnium cursuum, quos Maculæ describunt, interualla itineraria diurna, apparent circa horizontem maiora, circa medium minora, quam vt sint regularia: supponendo, Maculas in superficie Solis regulariter ferri, vt hoc capite probabitur de rectilineis. pag. 439
- Cap. XX. Apparens irregularitas ostenditur etiam in motibus curuilineis. pag. 442
- Lemma I. Plani pars quædam non est in subiecto plano, quædam vero in

II.

- sublimi. pag. 442
- Lemma II. Duæ lineæ rectæ parallelæ, sunt in vno plano. pag. 442
- Problema. Ex apparenre in circulo obseruatorio, duarum Macularum, simul distantia, vel ex duabus vnius Maculæ in eodem circulo successiue visis, & recte ordinatis locis, distantiam vel loca assignare quæ illis Maculis conuenirent si in superficie Solis fuissent constitutæ & motæ. pag. 443
- Figura in qua interualla macularum, cursus diurna conferuntur, pag. 445
- Difficultas prima Maculæ inæqualiter moueri videntur, pag. 446
- Difficultas secunda, ex hoc inæquali motu Maculæ extra Solem ponendæ videntur, ibid.
- Difficultas tertia, ex motus inæqualitate parallaxis ad Solem constitui videtur, pag. 447
- Cap. XXII. An ex hac apparentia in solare Phænomenon introducendi sint epicycli? qua occasione reijciuntur eidem etiam absolute ab eodem. pag. 448
- Cap. XXIII. Pronuntiatum XII. Prædicta apparentia, id est, interuallorum diurnorum circa horizontem maior debito amplificatio, minor circa medium, adeoque distantiarum diurnarum, in cursibus quos Maculæ conficiunt, stata inæqualitas cæteris paribus deprehensa, prouenit à sola refractionis inæqualitate, quam lentes Telioscopij in transmissam solis speciem inducunt, pag. 451
- Supponuntur ex opticis aliqua principia, vel ex ipso solari phænomeno, & telioscopicis lentibus atque mirificis earundem effectibus, contra refractarium quemlibet efficaciter comprobanda. pag. 451
- Refractionis inæqualitas Maculas in Solem ponit. pag. 455
- Cap. XXIV. Propositio I. Si Maculis extra Solem positis, Refractionis inæqualis apparentia, in motu earundem extra Solem inuento, disparet: Maculæ non sunt extra Solem, pag. 455
- Cap. XXV. Propositio II. Maculæ extra Solem

Index Titulorum, & Capitum.

I.

- Solem vel modicum positæ, tollunt omnem inæqualitatis in refringendo apparentiam. pag. 456.
- Cap. XXVI. Propositio III. Si Maculæ extra Solem ponantur in tali distantia, ut intervallis observationum inter æqualia tempora decursis, æquales arcus respondeant, in assumpto cursu illarum circulo; tunc periodica illarum reuolutio debito maior existit. Atque hoc ipso extra poni non possunt. p. 456.
- Cap. XXVII. Propositio IV. Si Maculæ extra Solem ad vnum, duo, tria aut plura minuta, qualium semidiameter Solis 16. aut 17. circiter esse ponitur, circumcursare permittantur, tunc inter omnes arcus, quos lineæ parallelæ è locis observationum diurnis, in peripheriam circuli extra assumpti egressæ interceptiunt, is qui diurno arcus solaris centrali itineri respondet est omnium maximus, reliquorum deinde quisque versus horizontem utrumque semper minor est altiore, maior humiliore, omnium minimus est horizonti proximus. Suppono autem accipi primo, Puncta Macularum itineraria in lineam sensibilibiter rectam disposita; secundo, Motum apparentem beneficio Telescopij obseruatum, ideoque refractioni obnoxium, tertio Motum Macularum in se spectatum, esse regularem. His autem ita se habentibus, Maculæ extra Solem ad dictas distantias nequaquam incedent, sed necessario eidem viciniore existere probantur. pag. 457.
- Figura in qua prædictæ propositiones ostenduntur. pag. 459.
- Cap. XXVIII. Propositio V. Problem. I. Inæqualitatem refractionis hactenus tractatam, & in obseruationes redundantem, experientia practicè luculenta exhibere. pag. 460.
- Figura Refractionis contingentis per lentes 461.
- Experientiæ refractionis applicatio ad Phænomenon solare. 465.
- Cap. XXIX. Propositio VI. Problem. II. Inæqualitatem Refractionis solaris, alia experientia practica exhibere. pag. 466.

II.

- Cap. XXX. Propositio VII. Problem. III. Refractionis solaris per lentes Telescopicas inæqualitatem alia irrefragabili experientia demonstrare. pag. 467.
- Cap. XXXI. Propositio VIII. Probl. IV. Refractionis solaris inæqualitatem per datam quamcumq. in Sole Macularum, alio experimento manifestam facere. pag. 468.
- Cap. XXXII. Propositio IX. Probl. V. Inæqualitatem refractionis è duarum Macularum inter se distantia venari. pag. 471.
- Cap. XXXIII. Propositio X. Probl. VI. Refractionis apparentiam inæqualem, ex nulla refractionis apparentia demonstrare. pag. 472.
- Eadem demonstrantur ex æqualissima Macularum à polo suo mobili distantia, in schemate eodem. pag. 473.
- Figura in qua ex cursu Maculæ, a, per nudum foramen absque refractione obseruatæ apparens refractionis per telescopium inæqualitas, & verus macularum in physica Solis superficie locus luculenter ostenditur. 475.
- Eadem demonstrantur ex vera paralleli, quem Macula, a, describit, designatione, eiusque periodica reuolutione, & diametri exhibitione. pag. 476.
- Cap. XXXIV. De regularitate Motus Macularum. pag. 478.
- Cap. XXXV. Apparens Macularum solarium augmentatio & diminutio. pag. 480.
- Macularum solarium, uti & Facularum augmentatio apparens optica. pag. 481.
- Cap. XXXVI. Pro Maculis marginalibus, refractione marginali imbutis.
- Regula prima. pag. 483.
- Regula secunda, pro mac. marginalibus ad centrum reductis. 483.
- Propositio in qua maculæ solares rotundæ circa Solem gyratæ, eandem ad visum ex aspectu habitudinem habere ostenduntur, in hemispherio Solis apparente, quam exhiberēt si circa centrum suum cum centro Solis coniunctum.
- simili-

Index Titulorum, & Capitum.

I.

- similiter rotarentur. pag. 487.
 Figura in qua propositio exhibetur. ib.
 Cap. XXXVII. Macularum solarium, augmentatio, & diminutio physica. pag. 490.
 Cap. XXXVIII. Augmentationis & diminutionis physicae proponuntur modi varij. pag. 491.
 Macularum solarium motus alteratiuus pag. 495.
 Cap. XXXIX. Macularum solarium variabilis obscuritas & claritas. pag. 495.
 Macularum ordinarium, ratione claritatis & obscuritatis duplex genus. pag. 495.
 Maculae æquabiles. pag. 495.
 Maculae nucleis foetae. pag. 496.
 Maculae sine nucleis & tamen obscuritatis inæqualis. pag. 496.
 Cap. XL. Nucleus Macularum solarium pag. 497.
 Cap. XLI. Dubium I. An apparens Macularum solarium obscuritas sit mera umbra? pag. 499
 Cap. XLII. Dubium II. An macularum solarium apparens obscuritas, sit merè apparens diaphani opacitas? pag. 500
 Cap. XLIII. Dubium III. An macularum apparens obscuritas, fiat ex obiectu corporis verè opaci? pag. 500
 Cap. XLIV. Dubium IV. Qualisnam mac. solarium apparens obscuritas sit in specie qualitas? pag. 502
 Cap. XLV. Dubium V. Quisnam Macularum solarium sit color? pag. 503.
 Cap. XLVI. Dubium VI. An Maculae solares nigrescant ex condensatione albescent seu clarescant ex rarefactione? pag. 503.
 Cap. XLVII. De Nucleis macularum solarium, aliquot singulares quaestiones. pag. 505.
 Quaestio I. Vtrum apparens macularum nigredo sit mera lucis privatio. an vero color positivus? pag. 505.
 Quaestio II. Qualis apparens Nucleorum nigredo sit color? pag. 506
 Quaestio III. Vtrum nigredo Nucleorum sit tantum superficialis, an in profundo? pag. 506.

II.

- Quaestio IV. Vtrum Nuclei sint corpora densiora, quam illas circumstantes caligo & Faculae? pag. 506.
 Quaestio V. Vtrum nuclei præter revolutionem suam circa Solem, gyrentur quoque circa suum proprium centrum? pag. 507.
 Quaestio VI. Vtrum nuclei in Epicyclis & excentricis circumferantur? pag. 507
 Quaestio VII. Quare nuclei circa margines subalbescent, circa medium instar carbonis sæpe nigrescant? pag. 507.
 Quaestio VIII. Quare nuclei ut & maculae in formam nubecularum intumescent ad marginem circuli observatorii, minuantur ad centrum? pag. 508
 Cap. XLVIII. De luce seu claritate macularum solarium. pag. 508.
 Quaestio Unica. Vtrum lux seu claritas quæ caliginosæ macularum massæ inesse cernitur, sit fixa, permanens, inherens; qualis inest Lunæ, stellis & c. an vero transiens, qualis inest aëri, & sic Sol per illas ad nos tantum traluceat? pag. 508.
 Cap. XLIX. Macularum solarium figura. pag. 510
 Cap. L. Phænomeni solaris alteratio ex alijs etiam apparentijs arguitur. pag. 514.
 Cap. LI. Varij alterationis fontes. pag. 514.
 De Phænomeni solaris ortu & interitu. pag. 515.
 Ex observato Solis Phænomeno summatim proferuntur & expenduntur ea, quæ ad ortum & occasum physicum Macularum & Facularum pertinent. pag. 515.
 Maculas & Faculas nasci & denasci, indicium primum, ex earundem apparitione & disparitione in aspectabili Solis disco, desumptum. pag. 515.
 Maculae sine ortu, sed cum occasu Astronomico. pag. 516
 Maculae sine occasu, cum ortu astronomico. pag. 516
 Maculae absque ortu & occasu astronomico. pag. 516.
 Maculas & Faculas generari & corrumpi, motuum secundum, ex eo quod

Index Titulorum, & Capitum.

I.

- quod non redeant. pag. 517
- Cap. LII. Maculas, & faculas generari & corrumpi, argumentum palmariū, ex eo, quod ex Maculis Faculae fiant; ad cuius argumenti robur, ex professo rejicitur generatio facularum per traluentiam. p. 517
- Fig. in qua Faculas per Solis traluentiam fieri non posse demonstratur. 519
- Refutatur casus ille, quo sphaera Soli circumducta ita subtilis asseritur, ut id quod ex ipsa Solem excedit in visum praetenuitate non cadat. pag. 522
- Argumenta positiua ex observationibus desumenda contra praedictas traluentiae solaris disci phantasias. pag. 524
- Proponuntur aduersarijs quaestiones haud ita facile soluendae. pagina. 527
- Cap. LIII. Impossibile est Maculas solares fieri ex concursu partium opacarum, orbibus duris circa Solem statutis, & perenni rotatione conuersis. p. 529
- De Macularum solarium partibus. pag. 530
- De centri Maculae cuiusque generatione sensibili. ibid.
- Cap. LIV. Maculas & faculas generari & corrumpi, confirmatur ex ipso incipiendi & desinendi ipsarum modo. pag. 534
- De Phaenomeni solaris loco vero.
- Cap. LV. Ex obseruatis haecenus & ostensis de Phaenomeno solari, in unum aspectum recolliguntur potissima argumenta, quibus macularum & facularum solarium in Sole locus verus comprobatur. pag. 537
- Arg. 1. Ex nulla parallaxi. p. 537
- Cap. LVI. Arg. 2. Pro sede Macularum in ipso corpore solari, figenda desumitur ex ipsa apparente refractionis inaequalitate, in motum Macularum per lentes obseruatorias illata. p. 541
- Cap. LVII. Arg. 3. Maculae in Solem ponuntur beneficio facularum. pag. 542
- Cap. LVIII. Arg. 4. Macularum circa horizontem vsitata gracilitas, easdem in Sole collocat. ibid.

II.

- Cap. LIX. Arg. 5. Maculae per examen interuallorum duarum Macularum, vel vnus Maculae dietim progressae, inueniuntur in Solis superficie. ibidem.
- Cap. LX. Arg. 6. Maculae cursu rectilineo incedentes per parallelas e locis visis in Solis superficiem erectas, inueniuntur in eadem moueri. 543
- Cap. LXI. Arg. 7. Maculas solares in Sole esse probatur ex itinere curuilineo quasi elliptico. ibid.
- Cap. LXII. Arg. 8. E curuilineis arcuum itinerariorum a maculis descriptorum, proprietatibus, maculae in Sole esse comprobantur. pag. 543
- Cap. LXIII. Arg. 9. Ex interuallis diurnis vnus cursus curuilinei inter se comparatis, & aequalibus ad sensum in superficie Solis inuentis Maculae eidem inesse probantur. pagina. 544
- Cap. LXIV. Arg. 10. Beneficio circelli polaris maculae solares in Sole esse probantur. ibid.
- Cap. LXV. Arg. 11. Maculae e suo periodico reditu in Sole versari comprobantur. ibid.
- Macula prima Australis. Redux a Martio ad Maium, anno lubilaei 1625. pag. 546
- Macula secunda Boreoaustralis redux anno eodem 1625. obseruata a die 11. Maii. ad 18. Iunii. pagina. 547
- Macula tertia anno eodem 1625. a die octaua Iunii ad 15. Iulij redux ex borea in Austrum. p. 548
- Macula quarta redux anno 1625. a die 12. Iulij, ad 19. Augusti. pagina. 548
- Argumenta Maculae reditum persuadentia.
- A loco. pag. 548
- A qualitate cursuum apparentium. pag. 549
- A tempore. ibid.
- Cap. LXVI. Arg. 12. Maculae in Sole esse comprobantur e secundarijs huius Phaenomeni Phasibus. pag. 550

Index Titulorum, & Capitum.

I.

LIBRI QVARTI PARS Secunda.

- Phænomeni Solaris seu Rosæ Vrsinæ
Theoria. p. 554
- Quæstiuncula I. Quot sint circelli. pag.
555
- Quæstiuncula II. Vbi poli horum circel-
lorum respectu Eclipticæ solaris
consistant. ibid.
- Quæst. III. An circelli duo, Boreus, &
Austrinus inter se sint æquales? ib.
- Quæst. IV. Quisnam sit axis Circellorū?
pag. 555
- Quæst. V. Quantus est Circellus? eadem
pagina.
- Quæst. VI. Quibus potissimum rationi-
bus Circelli quantitas inuestigata
sit. pag. 556
- Quæst. VII. Quare Circelli polaris quā-
titas, aliquando maior, aliquan-
do minor, septem gradibus repe-
ritur? p. 557
- Quæst. VIII. Quanto tempore circellus
suam periodum absoluit? ibid.
- Quæst. IX. Vnde, quo, & qualis est cir-
celli seu axeos mobilis in circello
motus? ibid.
- Quæst. X. Quanta celeritate fertur po-
lus axeos mobilis, vno die, vna ho-
ra in miliaribus & passibus Ro-
manis. ibid.
- Quæst. XI. Vnde faciendum est huius
motus initium? p. 558
- Quæst. XII. Quo anni tempore, mense,
die, hora, initium huius motus
annui est sumendum? ibid.
- Quæst. XIII. Vtrum omnes maculæ eun-
dem axem, & polos mobiles ab
& in circello delatos respiciant?
p. 559
- Quæst. XIV. Vtrum propriæ Macularū
conuersiones sint omnes inter se
temporis duratione æquales, &
quantæ? ibid.
- Cap. II. Systema generale motus Phæ-
nomeni solaris. p. 560
- Figura vniuersalis de motu macularum
solarium. p. 568
- Cap. III. Quantum Solis horizon sensi-
bilis, ab horizonte vero, seu appa-
rens Solis circulus à maximo eius-
dem differat. p. 570
- Cap. IV. Quanta sit visibilis Solis diame-
ter, in minutis Eclipticæ? p. 571

II.

- Figura de magnitudine Solis. pagina.
571
- Cap. IV. De apparente seu visibili Solis
diametro inuenienda, disquisitio.
p. 573
- Visualem Solis diametrum facilis inda-
gandi modus. ibid.
- Vsus siue praxis diametrum Solis inue-
niendi. ibid.
- Demonstratio praxeos prædictæ. pag.
574
- Lucidi Solis circuli per foramen I, im-
missi proprietates, quarum mul-
tæ etiam inferius, vbi de colore
Solis agitur vberius explicantur.
pag. 574
- Figura instrumenti obseruatorij pro ca-
pienda visuali Solis diametro. p.
p. 575
- Cap. V. Instrumentum obseruatorium,
& visuales diametri obseruatæ o-
culis subiiciuntur & explicantur.
pag. 576
- Finis & intentum harum obseruatio-
num, per instrumentum hoc fa-
ctarum. p. 576
- Aliæ circa has obseruationes circum-
stantiæ. p. 578
- Reliquorum in tabula instrumenti ob-
seruatorij comprehensorum expla-
nationes. ibid.
- Diametrorum in instrumento obserua-
torio explanatio. ibid.
- Annotationes in obseruationes in instru-
mento allatas, ex ipsis originali-
bus desumptæ. p. 580
- Annotationes in obseruationem diei 23.
Nouembr. an. 1625. factam. pag.
580
- Annotationes in obseruationem diei 25.
Decembris anno 1625. pagina.
581
- Annotationes in obseruationes factas
anno 1626. p. 582
- Annotationes in obseruationes anni
1527. ibid.
- Cap. VI. De Solis & Macularum sola-
rium comparata inter se magnitu-
dine, tam visuali quam absoluta,
ex hypothesibus Tichonicis. pag.
584
- Tabula in qua terræ dimensio in pas-
sus, miliaria Romana, & millia-
ria Germanica diuisa est. pag.
585

Index Titulorum, & Capitum.

I.

- De Solis diametro & circumferentia maxima visibili in passus & milliaribus reuocandis. pag. 586
- Tabula Solaris diametri in passibus & milliaribus expressæ. ibid.
- De varijs Macularum solarium classibus. p. 587
- Regulæ generales pro metiendis maculis. ibid.
- Macularum Solarium magnitudines in particulari. p. 588
- Macula magna minorum secundorum 143. in sua diametro æqualis ferme Europæ. p. 189
- Macula composita minorum secundorum 285. in sua diametro, maior Africa. ibid.
- Macula composita minorum secundorum 333. in sua diametro æqualis Asiæ. p. 590
- Macula composita minorum secundorum 500. in sua diametro æqualis superficie terrestri. pagina 590
- Cap. VII. Rosæ Vrsinæ, siue Solaris Phænomeni natura mirabilis. pag. 591
- Rosæ Vrsinæ siue Phænomeni solaris ætas. p. 592
- Cap. VIII. Rosæ Vrsinæ siue Phænomeni solaris causæ & effectus nonnulli. p. 593
- Cap. IX. Quomodo Sol deseruiat primæ causæ secundum actionem in inferiora, & ex eius Phænomeno cognito ab alijs obscurius asserta illustrantur & comprobentur? pag. 594
- Cap. X. Dub. I. An si Sol, Luna, reliqui planetæ & sidera starent, aliqua circa terram atmosphæra & qualis esset? pag. 599
- Dub. II. An & quomodo stante Sole & Luna, &c. Sol nihilominus per motus Phænomeni huius proprios perpetuaret & dirigeret vicissitudines generationum & corruptionum? pag. 599
- Solis gyratio circa proprium centrum. pag. 601
- Motus Phænomeni ad quantitatem inferiora mutat. p. 601
- Motus alterationis in Sole multum in sublunaria potest. 601

II.

- Cap. XI. Ex Phænomeno solari veritas patescit, euanescit falsitas. p. 602
- Ex Phænomeno solari, veritates pro Astronomia. ibid.
- Ex solari Phænomeno, veritates pro Astrologia. p. 604
- Veritates gnomonicæ & cosmographi-
cæ, ex hoc Solis Phænomeno eruendæ. p. 605
- Cap. XII. Ad Physiologiam cælestem plurimæ veritates panduntur e Phænomeno solari. p. 606
- Ex motu Solis proprio per hoc Phænomenon patefacto, veritates physicæ. p. 607
- Ex solaris superficie varietate & variabilitate per Maculas & Faculas cognita veritates physicæ. ibidem
- Veritates pro sacra Scriptura & Theologia. p. 608
- Cap. XIII. Phænomeni solaris utilitates. ibid.
- Errores idolatrici circa Solem admissi, per hoc Phænomenon corriguntur. pag. 612
- Cometæ natales suos videntur debere huic Phænomeno. ibid.
- Cap. XIV. De Solis colore ex Phænomeno solari per Telioscopium patefacto, p. 613
- De luce in abstracto, seu sine vilo materiali subiecto considerata, dubia nonnulla. pag. 614
- Conclusiones de Solis colore. pagina 616
- Cap. XV. De alijs radij solaris experimentijs iisque probatissimis. pag. 617
- Experientia prima, per nudum immisionis foramen. ibid.
- Cap. XVI. Experientia secunda per Telioscopium in Solem directâ. pag. 622
- Cap. XVII. Quid ex nostris & alijs modernis Phænomenis circa cælestia deduci soleat. p. 624
- De cæli & siderum natura ignea. pag. 625
- Ad auctoritates S. S. Patrum prologus generalis M. Aurelij Cassiodori. ib.
- Pro natura Solis, astrorum & cæli ignea, Auctoritates Sanctorum Patrum. pag. 626
- Auctoritates Ecclesiæ. p. 626
- Sen-

Index Titulorum, & Capitum.

I.

- Sententia Diui Augustini. pagina 628
- Cap. XVIII. Pro natura Solis ignea, etiam ij citantur Scriptores, qui Solem quarto die ex nube ignea vel lucida creatum asserunt. pag. 629.
- Sancti Dionysij pro Sole ignito, caeloque fluido & corruptibili auctoritates. pag. 635
- Ex Pharo P. Martini Antonij del Rio idem confirmatur. pag. 637
- Cap. XIX. Pro natura Solis, aëtherum, & Cæli ignea, auctoritates Doctorum recentium. pag. 639
- Cap. XX. Pro natura Solis, aëtherum & Cæli ignea, pugnant rationes ob quas SS. Patres, aquas veras elementares, auctoritate S. Scripturæ commoti, supra firmamentum esse contestati sunt. pag. 641
- Cap. XXI. Auctores qui aquas elementares supra firmamentum collocant, absque eo quod cælum ignitæ naturæ asseruerint. pagina 644
- Aquas veras esse supra firmamentum ex Pharo Martini del Rio. pagina 645
- Aquas elementares esse supra cælos ex Ludouico Molina. pag. 646
- Cap. XXII. Pro natura Solis ignea auctoritates ex Sacris litteris & hebraeis fontibus depromptæ. pag. 651
- Faculas solares esse in Sole & partes Solis probatur ex Scriptura deductis Conclusionibus. pag. 652.
- Cap. XXIII. Pro natura Solis ignea, insinuantur, auctoritates philosophicæ, & obiectiones dissoluntur. pag. 653
- Quid respondere Astronomi soleant ad obiectiones quæ contra sententiam allatis auctoritatibus comprehensam militare videntur. pag. 654
- Obiectio prima pro cælo incorruptibili ex eo quod inductis his faculis penitus tandem consumeretur. 654
- Obiectio secunda, à Maculis libero oculo non visis. pag. 655
- Obiectio tertia pro cælo incorruptibili, quod oculus liber aspectum

II.

- Solis non ferat. ibidem pag. 655
- Obiectio quarta, à comparatione nostri ignis. pag. 657
- Cap. XXIV. De cæli & siderum naturali corruptibilitate, auctoritates ex sacra Scriptura. pag. 658
- Pro cæli siderumque natura corruptibili, auctoritates sanctorum Patrum, & Ecclesiæ Doctorum. pag. 660
- Secundum sanctum Ioannem Chrysostomum omnia mundi corpora sunt corruptibilia. pag. 660
- Secundum sanctum Basilium Sol, & Cælum sunt corruptibilia. pag. 662
- Secundum sanctum Ambrosium Sol, Stellæ & Cælum sunt corruptioni obnoxia. pag. 663
- Secundum sanctum Hieronymum Sol, Astra, & Cæli sunt corruptibiles. ex editione Parisiensi. pag. 665
- Cælorum corruptibilitati subscribit etiam sanctus Hilarius magnum Ecclesiæ lumen. pag. 667
- Cælorum corruptibilitatem ex S. Scripturis asserit S. Epiphanius. pagina 668
- A corruptibilitate cælorum stat etiam S. Ephræm. ibid.
- Sanctus Irenæus. pag. 669
- Sanctus Cyrillus Alexandrinus. pagina 669
- Sanctus Ioannes Damascenus. pagina 670
- Andreas Cæsariensis. ibid.
- S. Augustinus. pag. 671
- Hieronymus Vielmus. pag. 673
- S. Augustini cautela in producendis S. Scripturis circa quæstiones de cælo naturales. pag. 676
- Annotationes in S. Augustini citata loca. pag. 678
- Sanctus Gregorius Magnus pro cælo corruptibili, cum alijs SS. Patribus conspirat. pag. 679
- Zacharias philosophus Christianus cælum natura corruptibile probat. pag. 679
- Afcanius Martinengus pro cælo corruptibili passim in sua glossa. pagina 680
- Cap. XXV. Pro natura cælorum corruptibili sancti Petri epistola asseritur, & ex recentiorum commentarijs explicatur: sancti simul Clementis

Index Titulorum, & Capitum.

I.

tis de hac controuersia ex libris
recognitionum doctrina recense-
tur, & rationibus Mathematicis
ex aquis Oceani petitis confirma-
tur; auctoritates demum moder-
norum Theologorum non paucae
producuntur. pag. 682

Rationes ex aquis Oceani & diluuij pe-
titae pro caelo corruptibili. pagina
685

Ex P. Alfonsi Salmeronis tom. 16. disp.
4. in 3. cap. posterioris epistolae
D. Petri de mundi interitu idem
probat. pag. 686

IO: Baptista Laurus Perusinus S. D. N.
Vrbani VIII. ab intimo Cubiculo,
& sacri Cardinalium Senatus à Se-
cretis, pro Caelo corruptibili &
igneo. pag. 687

Item Io. Maldonatus Comment. in
Matth. super illa verba: Et stellae
cadent de caelo. ibid.

Scholia in quantum diem Saliani pro
caelo corruptibili. pag. 691

Pro caelo corruptibili Nicolaus Serra-
rius. 692

Item Fabritius Paulus Foroliuiensis
Episcopus primus Ciuitatis Plebis
pag. 693

Item Fr. Marinus Mersennius. pagina
693.

Aguas naturales supra firmamentum
euehit Ferdinandus Quirinus Sa-
lazar. ibid.

Caelorum substantialem interitum asse-
rit Ioannes Folenghius Romae ap-
probatus & editus. pag. 694

Item Genebrardus. pag. 695

Item Martinus Becanus, ibid.

Ioannes Ludouicus de la Cerda. pag.
696

Cap. XXVI. Pro liquida caeli substantia.
pag. 699

Auctoritates ex sacra Scriptura. pagina
699

Auctoritates Sanctorum Patrum. pag.
701

Pro caelo liquido auctoritas sancti Au-
gustini. ibid.

Scholia in citatos Augustini locos. pag.
703

Pro caelo liquido sancti Basilij auctori-
tas. pag. 706

Item sancti Ambrosij. pag. 710

Pro caelo liquido auctoritates aliorum

II.

Patrum. pagina 711

Magistri sententiarum. pag. 713

Hieronymi ab Oleastro Lusitani. pag.
714

Ruperti Abbatis Tuitiensis. pagina
715

S. Ioannis Damasceni. pag. 716

Sancti Ioannis Chrysostomi. eadem pa-
gina.

L. Caelij Lactantij Firmiani. pagina
719

Sancti Isidori Episcopi Hispalensis. pag.
720

Iunilij. pag. 721

Pro caelo liquido auctoritas D. Bonauē-
turae. pag. 724

Quaestio prima. An luminaria caeli in
eodem continuo locentur? pag.
724

Conclusio. Caeli luminaria posita sunt
in pluribus orbibus in corpore ta-
men vno continuo, quod nomine
firmamenti Sacra Scriptura vo-
cat. pag. 725

Pro caeli liquida substantia auctoritas
sancti Gregorij Nysseni. pagina
726

Pro caelo liquido auctoritas Dionysij
Carthusiani, in qua dictorum co-
pendium habetur. pag. 727

Cap. XXVII. Pro natura caeli vel liquida
vel ignea, vel vtraque auctori-
tes Theologorum Neotericorum,
Philosophorum, & Physiologorum.
pag. 731

Auctoritas Illustrissimi Roberti S. R. E.
Cardinalis Bellarmini, Illustrissimi
atq. Excellentissimi Federici Ce-
sij Principis sancti Angeli auctori-
tate roborata. pag. 731

Epistola Principis Cæsij ad D. Ioannem
Faber Medicum. ibid.

Pro caelo liquido Card. Bellarminus de
Ascensione mentis in Deum gra-
du septimo, ex consideratione So-
lis. pag. 733

Idem pro caelo igneo ex eodem gradu
7 c. 4. ibid.

Pro caelo liquido auctoritas Hieronymi
Vielmij Dominicani. pag. 734

Scholia in Vielmij. ibid.

Pro caelo liquido Ioannes Baptista Fo-
lenghius Mantuanus Monachus
Castinas. pag. 735

Item Fr. Marinus Mersennus Ord. Min.
S. Fran-

Index Titulorum, & Capitum.

I.

S. Francisci de Paulla. pag. 735
 Rationes à Merfeno pro cæli liquiditate recensitæ, ex mente, & sensu astronomorum roborantur & augentur. p. 738
 Rationes pro cælo corruptibili ex optica. p. 738
 Ex apparenti Lunæ inæqualitate. pag. 739
 Ex capite cometarum superlunarium. pag. 740
 Lunæ Solem eclipsantis insolita circa margines trepidatio. ibid.
 Cælum liquidum ostenditur, eo quod Mars cæli solaris antiquus incola sit. 741
 Petrus Hurtadus de Mendoza à cælo liquido non abhorret. p. 742
 Pro natura Solis liquida doctrina Reuerendiss. P. Raphaëlis Auerfæ à S. seuerino Clericorum Regularium Minim. Generalis. p. 743
 Notæ in prædictum Auctorem. p. 744
 Cap. XXVIII. Pro cælo liquido antiquorum Philosophorum auctoritates. pag. 747
 Pro cælo liquido auctoritates ex Seneca pag. 748
 Mens & doctrina Aristotelis de cæli corruptibilitate vel contra. pagina 750

II.

Cap. XXIX. Pro cælo liquido auctoritates astronomorum. p. 755
 Pro cælo liquido Claudius Ptolomæus. 756
 M. Vitruuius. p. 758
 C. Iulius Higynius. 759
 Aratus. 759
 M. Manilius. pag. 760
 Martianus Capella. pag. 761
 Cicchus Esculanus. p. 763
 Nicolaus Copernicus. ibid.
 Christophori Clauii de cælestibus nouitatibus iudicium. p. 766.
 Scholium in dicta Clauii. p. 767
 Noua in cælo phænomena antiquas hypothesis dubias reddunt. pagina 768
 Materia cæli eadem quæ sublunarium. pag. 768
 Antonius Maginus cælum liquidum admittit. p. 769
 Cap. XXX. Obiectiones contra cælum fluidum diluuntur, & libro finis imponitur. p. 771
 Obiectio prima ex nomine firmamenti. ibidem.
 Obiectio secunda. ibidem
 Epilogus totius operis.



Auctores in Libro quarto pro natura Calorum adducti.



Cacius.
Aegyptii.
Albertus Rutilensis.
Alcuinus Flavius.
Alexander Halensis.
Alphonsus Salmeron.
S. Ambrosius.

Anacreontes
S. Anastasius Synayta.
Anaximandrus.
Anaxagoras Philosophus.
Antonius Maginus.
Antonius Honcala.
S. Anselmus
Andreas Casariensis.
Antonius Lucianus.
Apollinarius.
Aratus.
Aristoteles.
Arnobius.
Ascanius Martinengus.
S. Athanasius.
S. Augustinus.
Augustinus Steuchus Eugubinus.
Augustinus Tornielus.
S. Basilus Magnus.
S. Basilus Seleucia Episcopus
S. Beda.
S. Bonaventura.
S. Bruno.
Burgensis.
Caius Iulius Higynius.
Casarius.
Cassiodorus.
Catharinus.
Cedrenus.
Christophorus Clavius.
Cicero.
Claudius Marius Victor.
Cleantes.
S. Clemens.
Copernicus.
Cornelius à Lapide.
Crates.
S. Cyrillus Alexandrinus.
S. Cyrillus Hierosolymitanus.
Diodorus Tarsensis.
Diogenes.
Diones.
S. Dicmyfius.

II.

Dionysius Carthusianus.
Dracuntius.
Drepanius Florus.
Emanuel Sa.
Empedocles Philosophus.
S. Epiphanius.
S. Ephrem.
Eucherius.
Eusebius Emiffenus.
Euthimius.
Fabritius Paulutius Foroliuensis Episcopus primus Ciuitatis Plebis.
Federicus Cæsius Princeps S. Angeli.
Ferdinandus Quirinus Salazar.
Franciscus Forrerius.
Franciscus Mairon.
Franciscus Suarez.
Franciscus Valesius.
Gabriel Vasquez.
Galileus Galilei.
Genebrardus.
S. Gregorius Magnus.
S. Gregorius Nyffenus.
S. Gregentius Tephren. Archiepiscopus.
Guilhelmus Antistodorenfis.
Haymo.
Hermas sancti Pauli Discipulus.
Heraclitus.
S. Hieronymus.
Hieronymus Vielmius Venetus e S. Dominic familia Aenomiae Episcopus.
Hieronymus Magius.
Hieronymus ab Oleastro Lusitanus.
S. Hilarius.
S. Hippolitus.
Horatius Grassius.
Homerus.
Hugo Carenfis.
Hugo Victorinus.
Iacobus Bullius Prunæus.
Iacobus Naclantus Episcopus Clugiensis.
Iacobus Saliarius.
Iacobus Bonfrerius.
Ioannes Antonius Roffenus.
Ioannes Aluarez.
Ioannes Baptista Cysatus.
Ioannes Baptista Folenghius Monachus Cassinas.
Io. Baptista Laurus Perusinus S.D.N.
Vrbani Octauii ab intimo Cubiculo,
& sacri Cardd. Senatus à secretis.
S. Ioan-

S. Ioannes Damascenus.
S. Ioannes Chrysostomus.
 Ioannes Faber S.D.N. ab herbariis.
 Ioannes Keplerus.
 Ioannes Lorinus.
 Ioannes Maldonatus.
 Ioannes Nicolaus à Smogulecz.
 Iosephus Blancanus.
 Iosephus Flavius histor.
S. Irenaeus.
S. Isidorus Episcopus Hispalensis.
S. Iunilius.
S. Iustinus Martyr.
 Iuuenius presbyter.
Lactantius Firmianus.
Latinus Cardinalis Vrsinus.
 Laertius.
 Leo Castrus.
 Lucretius. Lucinus.
 Ludouicus de la Cerda.
 Ludouicus Molina.
 Lyranus.
S. **M**acarius.
 Magister sententiarum.
 M. Viruuius.
 Martinus Becanus.
 Martinus del Rio.
 Martianus Capella.
 Marinus Mersennus.
S. Maximus.
 M. Manilius.
S. Methodius.
 Metrodorus.
 Michael Petrus.
Nicolaus Serarius.
Oecumenius.
 Origenes.
 Ouidius.
S. **P**atherius Ecclesia Romana Notarius.

S. Paulus Apostolus.
S. Petrus Apostolus.
 Petrus Hurtadus Mendoza.
S. Petrus Damiani.
 Petrus Comestor.
 Pererius.
 Pierius.
 Philastrius Episcopus Brixiensis.
 Philolaus Philosophus.
 Philippus Solitarius.
 Pineda.
 Plato.
 Plinius.
 Plutarchus.
 Proclus.
 Procopius Ptolomeus.
Raphaël Auerfa à Sanseuerino Generalis Cleric. Reg. Minor.
 Richardus Pampolitanus.
 Richardus S. Victoris.
 Robertus Cardinalis Bellarminus.
 Rothmannus.
 Rupertus Abbas Tuitiensis.
Seuerianus.
Sarsius.
 Seneca.
 Simon Marius.
 Sybilla.
 Strabus.
Tertullianus.
 Theodoretus.
 Theophilactus.
S. Thomas.
 Tostatus.
 Tycho Braheus.
 Virgilius.
Xenophanes.
Zacharias Philosophus Christianus.
 Episcopus Mitilenes.



ROSÆ VRSINÆ LIBER PRIMVS.



Occasio scribendi in Vrbe.

Cap. I.



VM anno millesimo sexcentesimo vicesimo-quarto, humane Lector, cum Serenissimo Carolo Archiduce Austriæ, &c. pietissimæ memoriæ, in Italiam venissem, atque ab eodem Genua Romam, ad summum Pontificem, ob certa peragenda negotia missus essem, inibiq; inter commorandum amicis communicassem nonnulla de multis, quæ in Sole continuatis ab anno 1623. observationibus annotaueram; institerunt vehementius, ne labores tantos, rei Philosophicæ peritiles diutius suppresserem; quibus quantum per occupationes diceret satisfacturum me spondi, postquam in Germaniam redissem, & Nissenis Collegij res mihi commissas composuissem. Longiores verò moras, inculantibus, proposui id quod res erat, observationes factas maxima ex parte in Silesia relictas, nec tanta locorum intercapedine, iniurijs temporum, itinerumque difficultatibus, exponendas. Re vera tamen præter hoc, animus aliò negotijs, & peregrinatione auocatus, tam seriam alieno loco, & tempore cogitationem auersabatur, nec nisi ad repetendum quanto citius destinatum muneri suo, & studijs locum adspirabat. Verum ex occasione quam mox audies, ea accesserunt, quæ vel inuitum, & stu-

diorum præteritorum subsidio magna ex parte destitutum ad scribendum impulerunt: coegeruntque aliquid subinde obseruare, vt ijs quæ certis temporibus in Facularum, & Macularum motibus recursura bene noueram, per accuratissimas designationes oculatis testibus, & eruditorum censuræ propositis, Solare Phænomenon semel inceptum neque vquam à me dimissum, & maxima ex parte etiamnum in præcipuis etiam ignoratum, suis rite digestum partibus exponerem. Sic enim futurum speraui, vt veritatem publico philosophantium bono, ab erroribus de re tanta confidentissimè vulgatis vindicaret, meq; à calumnijs in latentem, & nulli vel verbo, vel facto molestum acerbè coniectis liberarem, qui forte diuturniore silentio eorum existimationi, quibus cum viuo, & maxime fuerat consulendum, plus nimio obfuissem.

Romæ ergo, prout modò memorauimus, commoranti, supererat aliquid vacui temporis à negotijs, quod cum in alicuius libri lectione incundè, nec sine fructu transigendum celsissem, inquirenti & quidnam noui in Mathematicis prodisset? oblatus est inter cætera liber quidam Italico idiomate anno 1623. Romæ impressus, cuius inscriptio, *Il Saggiatore*; Latine *Trutinatorem seu Libripendem, aut Symbolatorem* diceret: (occasione enim peregrinationis Italicæ, coepi posse aliquid hæc lingua scriptum intelligere, atque latino red-

Apelles manum à Tabula nunquam deposuit.

Apellistaciturnitas diuturnior fuisset noxia.

I.

^aSag. pag. 2.
à versu 19.
ad 24.

Apelli post
Tabulā suā
12. annos la-
titanti ob
bonā famam
iniuriosè im-
petitam, de-
fendendi ne-
cessitas im-
ponitur.

^bIdem pag.
209. à vers.
7. ad 16.

dere) vbi ergo ipsum in manus accepi, vix aperui, & ecce tibi. initio statim Apellem post Tabulam suam de Maculis Solaribus affectam potius quam perfectam, per tot nunc annos etiamnum latitantem impeti, turpisque furti reum agi, (vt o-mittam meas de Sole Elliptico sub annum 1615. atque Refractionibus coelestibus sub annum 1617. editas elucubrationes, operis ^b decursu, in ludibrium, atque puerilem contemptum vocari,) animaduerti.

Atque vt ingenuè fatear, prima statim fronte, non Apellem, sed alios ab Italico Censore perstringi existimabam: nullo enim vnquam vel scripto, vel dicto, vel facto, aut signo auctorem illum ab Apelle laesum sciebam, vt ipse talibus ab illo sine causa criminationibus incesceretur; sed & nonnullorū de Maculis Solaribus commenta euulgata noueram, insuper iampridem videram, & legeram Mundum illum Iouialem Simonis Marij, ideòque ista in ipsum, vel illos à Symbellatore librari tela opinabar: at postquam Marium nominatim atque ex instituto deinde non ob hæc, sed alia in scriptorem delicta excipi, atque castigari vidi, & in propria Apelle Tabulæ materia querelam institui, illud potissimum criminando, quod sibi

Apelles potissimum à Censore impetitus.

PRIMAE INVENTIONIS Macularum Solarium gloriam, ipse licet Censoris, vt ipse aiebat, propriam, aliqui arrogare attentauerint: cum hæc & similia in alios non quadrarent; & præter Apellem, alius Solarium Macularum Inuentor non prodijisset, qui Censori negotium facessere videretur, in huius quam suam proclamati gloriæ, seu professione, seu possessione; in ipsum quoque Censor oculis semper limis singulariter ferretur, & qualibet arrepta occasione, mirum in modum exagitarer, quemadmodum ex huius libri decursu abundè constabit: idcirco vix vllus remansit dubitandi locus, quin extrema clausula querimoniae, quam modo attexam, esset in Apellem directa. Sic enim habet ille in Libripende ad medium paginæ 2.

Sagg. pag. 2.

Fundamentum 1. Apologia Apellea.

Le lettere delle Macchie Solari, e da quanti, e per quante guise fur combattute? e quella materia, che douerebbe dar tanto campo d'aprire de gl'intelletti ad admirabili speculationi, da molti, ò non creduta, ò poco stimata, del tutto

II.

1 „ e stata vilipesa, e derisa; da altri per non
„ volere acconsentire à miei concetti, sono
„ state prodotte contro di me ridicole,
„ & impossibili opinioni; ad alcuni
5 „ costretti, e conuinti dalle mie ragioni,
„ ni, hanno cercato spogliarmi di quella
„ gloria, ch'era pur mia: e dissimulando
„ d'hauer veduto gli scritti miei, tentarono
„ dopo di me farsi primieri Inuentori
10 „ di merauiglie così stupende. Latinè.

„ Litteræ de Maculis Solaribus, à quot,
„ & quam varijs modis fuerunt impetita?
„ & materia illa, quæ intellectui campum
„ ad admirabiles speculationes aperire
15 „ debebat, à multis aut non credita,
„ aut parum æstimata, omnino fuit vilipensa,
„ atque derisa: ab alijs, quod conceptibus
„ meis nollent acquiescere sunt
„ productæ contra me ridiculae, & impos-

20 „ sibilis opiniones, atque nonnulli constricti,
„ & conuicti rationibus meis, conati sunt illa gloria, quæ tamen mea
„ erat, me spoliare, dissimulantesque sibi
„ visa mea scripta, se PRIMOS POST

25 „ ME fecerunt admirabilitatum tam stupendarum
„ INVENTORES. Hæc inquam pleraque in Apellem digitum manifestum intendere videntur. Nam licet
„ Apelles Phenomenon Solare nunquam vili,
30 „ sed maximi semper fecerit, illiusque veritatem,
„ atque existentiam solidissimè in sua Tabula probauerit, in multis tamen
„ quæ partim ex sua, partim è Peripateticorum
„ sententia, idque vel absolutè, vel hypotheticè tantum, & inquirendo disputa-

35 „ uit, à Censoris placitis, discrepauit. Quade causa partim irridetur à Censore Apelles,
„ partim acerrimè oppugnatur. Et quia Apelles circa finem epistolæ suæ quintæ,
40 „ quam anno 1612. & die 16. Ianuarij conscriptam, ad Marcum Vellserum II Virum
„ Augustanum misit, sese Macularum primum Inuentorem insinuare videri fortasse
„ potuit, idcirco Censor statim in prima sua
45 „ epistola anno 1612. ad 4. Maij diem composita, occupat Lectorem, & veluti protestatur,
„ se Maculas Solares, octodecim ante illud tempus mensibus obseruasse;
„ imo vt omnem in hisce inuentis primatum

50 „ Apelli eripiat, atque ad se pertrahat, nullo non lapidem in epistola sua tertia mouet,
„ ita technicè, ita vafre vertendo stylum, vt Lectore in eam inducat persuasionē,
„ ac si ipse suas de Maculis serētias, prima
55 „ & secunda potissimum epistola explicatis, ante

Apelles furti literary reus sit.

Prima Censoris in Phenomenon Solare irruptio & irreptio.

III

II.

ante Apellis epistolas, quintam præfer-
tim, quæ est in accuratiore Disquisitione
secunda, scripto complexus esset. de quo
artificio, pluribus ex instituto agetur in-
fra, circa finem libri huius, capite vndeci-
mo: quo Lectorem remitto.

Fundamentum
1. Apolog. A-
pelles confir-
matur ex a-
lio alibi in
Apellem ex-
tructo.

Porro citatum ex Libripende locum,
potissimum in Apellem depromptum esse
vel illud imprimis confirmat, quod is, qui
communicata cum Censore scriptione sua,
ex illius assensu, si non ore, eandem rem
planè attingit, ea, quæ Censor generali-
ter in suo Libripende, & quasi per obscura
æigmata obmurmurat, atque velut ex in-
sidijs Apelli obiecit, ille palam, & apertis
oraculis manifestat. Discursus siquidem
de Cometa anni 1618. Florentiæ anno
1619. in publicum productus, etiam Apel-
lem post Tabulam suam frustra latitantem
in medium totius Amphitheatri Acade-
mici protraxit, & pag. 3. à versu 8. ad 15.
alienæ gloriæ usurpatorem, alienæ messis
inuasorem, & doctrinæ raptorem apertè
constituit, sic enim ait.

Fundamen-
tum 2. Apol.
Apelles.

Così fosse conceduto à me, di saper-
leui viamète spiegare, che io non pre-
gerei meno la lode di essere stato buon
Copiatore, di quella, che hanno volu-
to usurparsi coloro, che d'altre sue opi-
nioni, si son voluti fare Inuentori, e fin-
gerfi Apelli, quando co' mal coloriti, &
peggio lineati disegni, hanno dato à di-
vedere, che e' non pareggiano nella
pittura, ne anche i Maestri di mezza-
no valore.
Sic liceret mihi (inquit) illius (Cen-
soris nimirum Apellæ) sensa ad vn-
guem vobis explicare; quandoquidem
ego non minorem laudem mihi esse
ducerem, boni fidelisque interpretis
munus præstitisse, quam sit ea, quam
sibi usurpare voluerunt illi, qui alia-
rum ipsius opinionum conati sunt ha-
beri auctores, atque Apelles sese fin-
xerunt; cum tamen suis malè pictis, &
peius delineatis simulacris manifesta-
rent, se quidem neque mediocres in
arte pingendi adæquare Magistros.

Apelles alie-
na laudis at-
que Inuen-
tionis inua-
sor atq. usur-
pator procla-
matus.

Ex hoc loco sequentia sunt satis ma-
nifesta.

Corollaria
ex adducto
Disputato-
ris loco, de-
ducta.

1. Apellem in sua depingenda Tabula
inertem fuisse pictorem: ita enim, & suo,
& Censoris penicillo, depingit illum di-
sputator Florentinus, quem tamen Apel-
lem ille nunquam vidit, nunquam nouit,

neque Tabulam ipsius satis considerauit:
sed non multum irascor illi, neque lapi-
dem in me proiectum mordeor; cum culpo,
cuius solius instigatione Apelles ita male
habetur. Nam reliquis quid negotij cum
Apelle? imo quid Apelli cum villo homi-
num, qui sua sine vllique lensione pinxit,
& proposuit?

2. Apellem suam Tabulam confecisse
post cognitâ, & sibi patefactâ in illa So-
laris Phænomeni materia Censoris opi-
niones.

3. Apellem in sua Tabula se voluisse
facere Inuentorem opinionum Censoris,
circa maculas Solares.

4. Apellem talem haberi non tam ex
mente Interpretis vt modò dictum, quam
ex animo atq; dictamine suggerentis Cen-
soris. Vnde patet quid proprius Censoris
calamus velit in Libripende, qui sui animi
sensa tot ante annos, tam clarè transfudit
in pennam alterius. Conferamus verba,
& concordare videbimus mysteria; nec
ouum ouo tam simile, quam sensum sensui
animaduertes.

Censor ait, quosdam à suis rationibus
circa hanc Macularum Solarium mate-
riam fuisse constrictos, & conuictos; Inter-
pres ait, Apelles esse malos pictores; malas
picturas, & peiores delineationes in medium
protulisse. Idem autem est in proposito,
Apellem à Censore conuictum, & constri-
ctum teneri; & malam Apellis picturam ab
eodem deprehensam.

Deinde Censor ait, quosdam enisos esse
ipsum sua gloria spoliare; Interpretes Cen-
soris asserit, fictos Apelles voluisse sibi dicta-
toris sui laudem usurpare. Hæc autem
coincidunt. Igitur alienæ laudis inuasor
proclamatur Apelles.

Tandem, alcuni, ait Censor, dissimu-
lando d'hauer veduto gli scritti miei, ten-
tarono dopo di me farli primieri Inuentori,
di merauiglia così stupende. Nonnulli con-
strutti, &c. Interpretes Censoris dicit, eho
d'altre sue opinioni, si son voluti fare Inuen-
tori e fingerfi Apelli. Aliarum ipsius opi-
nionum, &c.

Vbi vides, eos quos Censor sub nomine
vago aliquorū taxat, ab interprete apertè
Apelles inscribi. Cætera ita sunt similia,
vt mutua applicatione non indigeant. Si
enim sese Apelles voluerunt fingere & fa-
cere Inuentores opinionum Censoris, de-
buerunt hoc ipso eadem prenouisse; & hoc

Duo addu-
cta Funda-
menta confe-
runtur, &
eiusdem te-
noris cōpro-
bantur.

ipso Inventionem sibi arripuerunt post Censoris, & dum sese Apelles finxerunt, opinioniones Censoris visas dissimularunt. Itaque omnia tam Censoris, quam interpretis allegata loca non aliter conspirant, ac si in vno cerebro concepta, ex vno ore dictata, vna manu conscripta forent.

Solus Apelles in citatis locis perfringitur.

Vnde satis tamen ex interpretatione hac per se manifesta, quam ex optima ratiocinatione constat, sub nomine illorum quorundam, sententias & scripta Censoris, atque primatum Inventionis inuadentium, nullum alium taxatum esse, quam unicum post Tabulam suam abconsum Apellem. Hunc sibi delectum, in quem incurreret in sua historia passim, facto ipso, ostendit Censor, in omnibus suis epistolis eundem vellicans, irridens, ad contradictiones & impossibilia, suo iudicio deducens, experientias & observationes Apellæas sub dubium vocans omninoque inficiens: denique omni modo possibili doctrinam eiusdem elutians, & in nihilum redigens. Sed hæc specialius multo in progressu Operis & libri præsertim huius demonstrabuntur.

Quamobrem cum in hac Solaris Phænomeni materia Censor in specie, expresso, atque nominatim in sua Historia neminem persequatur præter Apellem, atque eidem facto ipso inventionem primam rotundè præscindat, eidem absque, & ridicula, suo quidem iudicio multa obijciat, atque ad impossibilia, ut sæpe Censor iactitat, manifesta deducat; cumque eundem Apellem suis prioribus veluti desertis opinionibus, in sententias postmodum Censoris transisse contendat: cum inquam, Censor omnia fere de quibus in Libripende quiritatur contra quosdam, Apelli expressissimè abscribat in sua passim de Maculis Solaribus Historia: horum autem nullum alium unquam arguerit, aut sibi arguendum proposuerit, signum est: Querelam ab ipso in Libripende generalius institutam, contra Apellem militare, contra Apellem intentam esse. In ea namque culpat aliquorum ridiculas contra se, & impossibiles productas opiniones, id quod singulariter in sua Historia impingit Apelli, & nulli alteri.

Alia coniectura, quibus solus Apelles à Censore lacessitus probatur.

In sua ite Querimonia Censor inuehitur in quosdam, qui postquam rationibus ipsius convicti manus dederant, ut ipse putat, veritati, in Phænomenon inuolantes, inventionis primatum sibi arrogauere: at in

11 materia huius Phænomeni circa hoc punctum cum nullo alio rem habet in sua historia, quam cum Apelle, nullum sibi de primatu competitorem fingit, quam Apellem, hunc solum sibi Antagonistam statuit, hunc solum ab hac palma arcendum sibi persuadet. Neque enim alius fuit, qui tam maturè aut prior, ex hoc Phænomeno aliquid produxerit. Itaque tota illa Trutinatoris lamentatio in Apellis gratiam, vel potius præiudicium instituta apparet: cuius tam diuturna, & fortasse nimia patientia, & vecors silentium, ampliorem Censori insultandi materiam subministrasse videtur.

15 Accinit hisce cum primis vox Angeli, qui in Præfatione ad Historiam macularum, pag. 3. solum Apellem & nominatim quidem, de primatus competentia accersit Censorique longo postponit. Qui tamen Apelli in inueniendis Maculis absque vilius alterius Inuentoris notitia aliquid indulgeat, & in euulgatis ipsidem principatum haud inuitus concedat; tamen ex alio capite, eundem Apellem haud obscure, 25 imò scriptis à Sybellatore conuenienter, & necessario damnat. Audi enim quid de Censore scribat pag. 2. post medium.

30 „E come che si scorga essere à lui solo riservato, non solamente li celesti scoprimenti insieme col mezzo del congegno, ma di più il penetrar con gli occhi della mente tutta quella scienza, che d'essi hauer si puote; stauasi con vniuersal desiderio aspettando il parer suo circa di esse Macchie. Et pag. 3. post medium: Resti per tanto noto à ciascu- 35 „no esser veramente particolare determinatione, ch' in vn solo soggetto caschi nella nostra età, non solo il celeste vso del Telescopio; ma anco gli scoprimenti & obseruationi di tante nouità nelle stelle, e corpi superiori. Et paullo post. 40 „Non deitono dunque chiamarsi accidenti fortuiti, o casuali, le gratie particolari, che vengono di sopra. Latine. „Et quoniam apparet, illi soli reſeruatū esse, non tantum vt celestia detegat vna cum medijs illa consequendi; 45 „sed multo magis vt acie mentis omnē quæ de illis haberi potest scientiam penetret: omnes singulari desiderio tenebantur ipsius de Maculis Solaribus iudicium audiendi.

50 „Et pag. 3. post mediū. Mancat ergo notum

Fundamentum tertium Apolog. Apellæ ex auctoritate, & assertione Angeli de promptum.

Fundamentum tertium.

Detestatio celestium Soli Censori reſeruata.

I.

Ex mente Angeli hac nostra ætate solus Censor est omnium celestium nouitatum Inuentor atq; omniscius Doctor.

„ tum unicuique in rei veritate, ex speciali
 „ prærogatiua determinatum esse, ut hac
 „ nostra ætate in hoc unicum caput cadat;
 „ non tantum usus celestis Telescopij, sed
 „ etiam inuentiones & obseruationes tan-
 „ tarum nouitatum, in stellis, & corpori-
 „ bus superioribus. Et paulo post. Non igitur
 „ fortuitis aut casualibus euentis adnu-
 „ merandæ sunt gratiæ particulares quæ
 „ supernè veniunt. Hæc ille. Quæ si serio
 „ & non adulatoriè, aut hyperbolicè, sed
 „ vera mente, in rei veritate afferuntur:

Ex hoc ipso fundamēto deducta Collaria.

Ex mente Angeli:
 Primo. Omnes Philosophi & Mathematici hac nostra ætate sunt ad celestia cæci.

2 Apelles circa Phænomen. Solare ex proprijs nil potuit habere.

3 Ex Ang. sententia, Apelles suā Tab. à Censoris sublegit.

Fundamētū 4. Apologia Apellæ ex aliorum sensu & consensu desumptum.

Summa diffinitionum.

Certum est primo. Ex mente Angeli, Hac nostra ætate nulli omnino Philosopho nulli Mathematico vel vires suppetere, vel viam ad celestia peruestiganda apertam, vel media commoda ad manum esse posse; sed omnia in rei veritate, & singulari indulto, & prærogatiua diuina uni Apellis Censori collata esse.

Certum est secundo. Ex eiusdem Angeli sententia, Apellem è promptuario suo nec obseruationes, neque modum Maculas Solares obseruandi potuisse desumere; multo minus de ijs peritiam rectè & veraciter scribendi possidere; cum celestis Telescopij usus, detectiones & obseruationes corporum superiorum, & omnis vera de ijs philosophandi ratio penes unicum Apellis Censorem lateat. è quibus:

Certum est tertio. Quæcunque de hoc Phænomeno verè & ex arte attulit in sua Tabula Apelles, ex Censoris gazophylacio hausta. Quod aliud nihil est dicere, quàm Apellem scripta quidem Censoris vidisse, opiniones intellexisse, visa tamen, & intellecta dissimulasse, & suis inde consarcinatis, nomen sibi Inuentoris ex alieno thesauro usurpasse. Et sic elucescit summa sententiarum & animorum in imperando Apelle eiusque Tabula, inter istos concordia.

Tandem allegata Trutinantis quiritatio, non tantum ab ijs qui Apelli fauent, sed & qui à partibus Censoris stant, in Apellè conscripta seriò creditur; neque desunt summi Censoris amici, qui palam affirmēt, Apellem sua haud dubiè à Censore haussisse: & sic eundem manifesta furti suspitione apud multos laborare, in confesso est.

Quare cum tot virorum & quidem non similes solum, sed iidem ab vno fonte derivati sensus in hanc vnam sententiam conspirent, cum ipsemet Censor aliud nihil agat, quàm vt eundem Apellem suspectum

II.

reddat, omnique fide, autoritate, opinione, & doctrinæ possessione exuat: dubium nullum est, eundemet ab eodem citato textu singulariter perstrictum esse. Nam, vt sæpe dictum, qui se Apellem finxerit, præter fictum Apellem, nullus est. Qui se se Macularum primum inuētorem in Censoris putaticium præiudicium fecisse videri possit; præter Apellem nullus est. Qui falsarum, ridicularum, atque impossibilium in hac materia opinionum assertor à Censore identidem redarguatur, extra Apellem in specie nemo est. Hunc conuictum, hunc constriictum à se teneri sæpe gloriatur Censor: ab hoc primam inuentionis gloriam sibi præripit proculdubio conqueritur Censor, & ægrè fert, quod sua visa & lecta scripta dissimulauerit Apelles. Itaque solus Apelles est, in quem tela illa contexta & faba cusa est. Hic solus in oculo fudes, in planta hæret ipina; hunc amotum, hunc auulsum, hunc protritum atque sepultum optat Censor: inde data & arrepta occasione qualibet, suis ludificandum atque subsannandum proponit, & ipsis etiam sutoribus atq; cerdonibus veluti in flagranti delicto prehensum furem, prædam ludumque facit, & tanquam victo atque damnato impunè insultat passim, & singulis ferme paginis in historia Macularum Solarium Romæ 1613. Italicè edita, cum eodem in proscenium exit, orbique toti spectaculum ridiculum exhibet. Ceterum cum huic suæ historiæ Italicæ, Latinum Apellem subiunxerit; omnes in hac Rosa citationes, etiam epistolarum Apellis adiunctarum ex eadem Historia sunt desumptæ. Verum enim vero, cum impostura quæuis omnē hominem maxime dedecet, tum verò in Philosopho atq; homine liberali, sub pia præsertim atque erudita Christi disciplina, à tot nunc annis religiosè educato atque honestè versato, summam cum primis turpitudinem annexam habet: quod is ex eo non tantum sibi improbus, sed alijs etiam existat Magister voluntarius erroris. Furta autem doctrinæ, præsertim solidæ & nouæ, eo amplius quisque detestatur, quo partus ingeniorum, præ reliquis preciosiores habentur, atq; eruditionis fama, nouæq; inuentionis celebritas, in re præsertim abstrusa, atque ab hominū opinione ex æuo cōdito remota, omnibus alijs iure merito longius antefertur.

Apelles igitur homo id ætatis & profes-

A 3 sionis

Obiectionum grauitas atq; indignitas ponderatur.

I.

*Plagij nota
intenta, me-
rito propul-
sanda.*

sionis cum tanquam Plagiarius à Viro cæteroqui graui, & apud doctos celebri haud obscure, & prudentum iudicio, vti modò ostensum, satis aperte traducatur; si Plagium tam deforme admisit, leuissimus; si non perpetravit & tacet, ignauissimus sit oportet: ne dicā in semetipsū improbus, in alios autē parū officiosus, si nō etiā inhumanus, atque iniquus, vt qui eodem veritatis clypeo, & à se propulsare possit intentatam infamiam, & ab illis facilem errandi amputare ansam. Nam qui palam insultantis licentiam aduersus se diu & sæpe exercitam dissimulat; non virtute patientiæ suam innocentiam, sed veritatis telo ictus, atque conscientiae adactus vi, attestari tacendo videtur culpam: hoc præferim æuo.

*Apelles in-
iuriam sibi
viuenti, &
videnti pa-
lam factam,
& socijs in-
fontibus ob-
futuram, de-
bitè præca-
uit.*

Accedit alia eaq. multò vrgentior causa; quòd nimirum cum multis nunc constet, quisnam Apelles sit, eiusq. tametsi latentis notitia paullatim in vulgus emanet; committere nullo modo debui, vt, non tantum præsens currentis seculi atas, sed & fera venturi posteritas, ex incondita Historiæ Censorinæ lectione persuasa, ex me de Socijs coniecturam faciat, qui fucorum instar ignauorum cum non sint mellifici, sint tamen melluori, & corrafo vndique ex alienis apiarijs furtiuè viuant nutrimento. Cum præsertim ex iisdem, vbi cusa est Historia officinis, rumores certi auctoribus conspicuis circumferantur, frustra à Nobis solidam rerum Physicarum & Mathematicarum disciplinam expectari, quorum nulli ijs scientijs probè exculti sint. Quod si viuentem adhuc Apellem tam indignis onerant inter alios criminationibus, quid fiet eidem mortuo & tacenti? Procerto dicent ipsum reum & culpabilem fuisse: alioqui non taciturnum, vel Sociorum ergò. Quare ne ijs quibuscum viuo tamdiu tacendo probrosus, & post Tabulam latendo alicui formidolosus aut inermis appaream, præsertim quòd telorum in eandem euibratorum nullus finis compareat, & sub ipsa fatifcente diutius latere non possim: oportet vt vel ipsam victus inhonestè deferam ludibrium æmulis; aut inuiso & plusquam Pythagorico rupto silentio, post Maculas lucem proferam, & in tenebras, iam quasi præcipientes reuocem ad lucem veritatis ambiguos & poene defecturientes Amicos. Quod qua via præstem communico tibi, Lector æque, tu alijs pro re nata suo loco & tempore, non inuidebis.

*Vrgens scri-
bendi caus-
sa.*

II.

**APELLES DETEGITVR, NOMEN-
clatura & occultationis origo refera-
tur, & ex facinore illi obiecto
respondendi necessitas
ostenditur.**

CAP. II.

ANNO Domini Millesimo sexcentesimo vndecimo, cum in celeberrima Vniuersitate Ingolstadiana scientias Mathematicas publicè profiterer, & ex assidua, diuturnaue inuestigatione præuia, Maculas in Sole opè Telioscopij, primùm Mense Martio Sole per nebulam inspecto, cuius tunc magnitudinem, inquirebam, deinde Mense Octobri iterum Telioscopio, per Nebulā, & sine hac Helioscopij (quod ex vitris ad hunc finem coloratis conuexis & cauis ipsemet elaboraueram) beneficio animaduertissem; earumque tam inter se, quàm ad Solem situm, in dies, numerum, figuram & magnitudinem, quàm potui diligentissimè obseruassē, idque tam immisione naturali per nudum exile foramen, quàm directo intuitu per dictum Helioscopium, & factas obseruationes ex die in diem, & ex horis poene in horas, circulis obseruatorijs comprehensas in chartas coniecissē, indeque obseruationum inter se comparatione facta, apparentem Macularum motum, multasque in figuris, atque magnitudinibus, necnon sitibus mutationes quotidianas, sensim accidere vidissē; alias exire, alias de nouo Solem subintrare; multas in medio cursu deficere; & vicissim nouas in ipso Sole exoriri; attēntus tanta rerum nouitate & vicissitudine, patefeci ea primùm discipulis meis, potissimum vero R. P. Ioanni Baptiste Cysato (in cuius etiam præsentia primam huiusce rei inspectionem Mense Martio ē turri Tenpli fecerā) meo deinde in eadem professione ibidem Successori, tum partim per me, partim per alios, alijs aliarum Facultatum Professoribus: omnium & singulorum tam secundus, & admirabundus applausus, atque rumor est subsecutus, vt etiam si partum adhuc tenerum & nouellum, fascijs infantie inuolutum omni conatu absconderem, donec in nonnullam ætatem prouectus, solidiore aliqua membrorum compage adoleret: tamen ita res hæc celari non potuit, quin ad aures Clarissimi Do-

*Primus Pha-
nomeni Sola-
ris intuitus
Ingolstadij
factus.*

*Apelles Ma-
cularū mo-
tum varia-
tionē, & in-
stabilitatem
primus de-
prehēdit, &
alijs detegit.*

I.

II.

Prima Apellae Tabula depingenda atq. adumbranda origo.

M. Velserus unicus Tab. Apellae confecta, & edita insignator.

Primus Phaenomeni solaris partus, cur letus, & difficilis.

Cur sub Apellis nomine prodierit Phaenomenon Solare.

Apelles ad aliorum potius quam suum genus in multis Tab. sua depinxit.

Varij vario rursus circa proposita Apellis Tabulae sensus.

mini Marci Velseri II Viri celeberrimae Reipublicae Augustanae penetraret; qui cum omnium Litteratorum Mœcenas, & meus singulariter Patronus atque amicus esset, continuis me litteris fatigavit, donec à me Phaenomeni inuenti Nouitatem extorsit. quo aliquot epistolis accepto, statim animum ad illius editionem adiecit, ne quid de gratia nouitatis, ut ipse aiebat, longa mora deperiret, aut *prima inuentionis laurea* alicunde decerperetur. Sed cum res hæc non tantum noua & difficilis, verum etiam Philosophicis opinionibus, in multis dissentanea animaduertetur; ne quid præproperè aut inconsulto, ab aliquo tunc in eadem Academia Professore in lucem emitteretur, cuius deinde retractatio difficilis atque indecora eueniret; censuerunt Superiores mei, procedendum esse cautè & pedetentim, donec & Phaenomenon ipsa aliorum quoque experientia accedente, corroboraretur, neq; à tritis Philosophorum semitis, sine euidencia contraria, facile recedendum; neque obseruata mea in epistolis ad Velserrum destinatis, meo nomine edenda; sic enim futurum, ut maior cuilibet in arbitrando libertas relinqueretur, nulli crearetur inuidia. Hisce cautelis factum est, ut epistolæ multo pauciores quam ad Velserrum exarauissem, in vulgus emanarent; & sub alieno Apellis nomine prodirent; atque plura in his ex Physicorum, quam mea sententia disputarentur. Habes breuiter inuentionem Phaenomeni, rationem Apellis producti, & pictæ ab eo Tabulae originem, modum, causam. Hanc ergo tabulam totius Orbis Censuræ à dicto Domino Velsero propositam, viderunt varij, sensu vario. Accesserunt enim multi aut lippi, aut suffusis oculis, & hi vel male aspexerunt picturam meam, dum viderunt colores oculorum suorum, talemque fecerunt ipsam, quales habuerunt illos; vel peiorè reddiderunt visum suum, dum præfidentia temeraria aquilarum pullos emulati, solis fulgoribus percussi, in degenerem noctuarum censum reciderunt. Nonnulli colores Tabulae meae rectè conspexere quidem, maluerunt tamen ingenio contra me suo indulgere, quam veritati palmam concedere, & ut male esset pictori, imaginem indignis sanè modis collutularunt, & Vrsinam Rosam spinis sepsierunt, fumisque graecolentibus afflauerunt, ut

in radice adhuc contentam propemodum suffocarent; cuius futuram elegantiam, cum quidam essent eminus conspicati, illico tanto eiusdem exarserunt amore, ut seipsos illiusmet auctores haberi vellent, me Raptorem, ut visum capite primo. O factum malè vel à me, si aliena mihi vendicaui, & alijs venditavi pro meis; vel ab improvido Censore, si meam non solum mihi tabulam, sed & bonam ereptum iuit famam. Nam quot facinoris tanti reus iniquè perpetrasset noxas, tot innocenti verus insimulator utique intulit haud leues iniurias. Et ut ad rem accedamus propius; Tabula Apellis, sunt aliquot eiusdè epistolæ ad Marcum Velserrum perscriptæ; imago in Tabula depicta, est Phaenomenon Solare, de Maculis Solaribus prima designatione attentatum. Hanc picturam si ego alteri surripui, iners atque excors haud immerito pictor censear; etenim si eius depingendi artem callerem, alienos labores cum tanto meo periculo, ne dicam dedecore non surriperem; neque tam monstruosam atque deformem, pro venustissima Helena proponerem Megeram, & pro Rosa fragrante massam fætidam sufficerè: ut nō deessent qui indignitate rei animaduersa, ex Italia usque misero mihi insultarent, & Germanus si licet, atque ignotus, Italica conuitia, & probrosa quidem dicerent.

„ Così fosse conceduto à me di saperleui viuamente spiegare, che io non prege-
„ rei meno la lode di essere stato buon
35 „ Copiatore, di quella, che hanno voluto usurparsi coloro, che d'altre sue opinioni, si sono voluti fare inuentori, e
„ fingerli Apelli, quando co' mal coloriti, e peggior lineati disegni loro, hanno dato à
40 „ diuedere, che e' nō pareggiano nella pittura, ne anche i maestri di mezzano valore. Latinè (neque enim si tam male pinxi, peius faciam dissimulando, sed volo ut iterum ac sapius totus id Orbis
45 Latinus resciat, atque ignauissimum Apellem pro merito tractet suo;) Sic liceret mihi, (inquit interpret ex mente Censoris mei) illius sensa ad vnguem vobis explicare, quando quidem ego non minor
50 „ rem mihi laudem ducerem fidelis interpretis munus præstitisse, quam fit ea, quæ sibi usurpare voluerunt illi, qui
„ aliarum ipsius opinionum conati sunt
55 „ haberi inuentores, atque Apelles seiscinxerunt.

Censor ut sua faciat Apellis Tabulā, eiusdè constituit Apellis Raptorem.

Plagii impetati prauitas exaggeratur.

Discursus de Cometis pag. 3.

I.

*Apelles ex
furtiva sua
Tab. Pictor
ignauus es-
set.*

*Apelles ex
furtiva sua
Tabula in-
iustus esset.*

*Apelles ex
Tabula sua
furtiva, im-
postor esset.*

*Apelles ex
Tabula sua
furtiva, sto-
lidus esset.*

*Apelles ex
sua Tab. si-
mulator cal-
lidus infi-
mulatur.*

„ finxerunt, cum tamen suis male pictis;
„ & peius delineatis simulacris palam fe-
„ cerint, se quidem neque mediocres in
„ arte pingendi adæquare magistros. Hæc
ille. En quàm male cesserit Apelli ficto,
seu attetatum, siue intentatum furtum,
ex eo enim præter pudendam ignauissi-
mæ imperitiæ maculam, nihil infelix
reportauit. Et hæc est vna non spina,
sed spiculum trabale, non Rosæ, sed
pupillæ Pictoris, non vitæ, sed famæ
Apellis impactum.

Alterû si ego suos ingenij partus cuiqu-
que tandem abstuli, iniustissimè egi, graui-
ter deliqui, iura charitatis violaui, bonam
existimationem talium laborum comitem
extinxi, censum inde augendum affixi, vno
verbo, bona plurima abstuli, intuli damna
multa: ideòque teneor & satisfacere, & re-
stituere ablata. Et hic secundus est aculeus,
vulnerandæ conscientiae intortus.

Amplius si alteri ablata, alijs vt mea ob-
trusi, imposturâ maximâ admisi; errare vo-
lui, quos docere simulaui Et hoc quâti est?
Malum facinus peiore improbitate tueri?

Insuper alterius Philosophiâ ad Libellâ
nō expensam, pro certa, pro comperta nō
tantum habere, sed & sublegere, atque
toti mundo venales exponere merces non
bene cognitæ; nonnè imprudentiæ summæ,
temeritatis maximæ, dementiæ extremæ
argumentum existit? Quid enim si vitrum
pro gemma, si cristallum pro adamante,
oricalchum pro auro surreptum mercator
imprudens obtrudat alijs? quid si Histori-
cus ipse in Maculis Solaribus digerendis er-
rauit? quid si Apelles ipsius mentem non
est affecutus? quid si picturam eius ex im-
peritia commaculauit? certè potuit & ille
errare, & hic errores pro veritate, pro lu-
ce tenebras amplecti. Stupidum est alterius
partum vt suum deosculari, nec viso vul-
tu, aut membrorum inter se se apta pro-
portione cognita, pro formoso proclama-
re, turpe fortasse naturæ monstrû. Et hæc
sit quarta in quâ stolidus incurrerim spina.

Præterea alterius foetum studio cor-
rumpere, ne ab alijs pro alieno agnoscat, vt
veritatem planam & simplicem inextrica-
bilibus opinionum Labyrinthis obfuscare,
tantum ideo vt aliquid scire, loqui, atque
de tua penu proferre videaris, etiamsi con-
scijs tibi sis te furta, te labores alienos in
medium producere, de tuo præter stylum
fallacem, præter linguam mendacem, præ-

II.

ter verba nihil dari: hoc demum abominan-
dæ est scelus malitiæ, atque simulationis
non ferendæ, ne habearis nocens, inson-
tem accusare, & vt tua errata tegas, alio-
rum rectè facta culpæ: errores feminare,
vt scire & sine errore esse credaris.

Tandè neq. ab ingrati animi infensissimo
vel ipsis bestijs vitio immunis euado, si quæ
ob inuentum Macularum Phenomenon

supra Solem extollere deberem, non tan-
um obliuione profunda obruo, verum
etiam gloria illi inuentionis primæ debita
spoliatum eo, & per hoc iniuria summa
afficio. Et Hæc tanta insunt huic vni facto

cuius culpæ, crimina; ignorantia, iniu-
stitia, impostura, temeritas, malitia, in-
gratitudo; quorum omnium reus sum, si
Tabulam meam ab altero vel eripui, vel
insidiosè depinxi. Ignauus merito vocor

artifex; iniquus iure proclamor peculij
alieni vsurpator; ambitiosus haud imme-
rito impostor vbique habeor; inconsidera-
tus sumiuendus rectè iudicor; versipellis

hypochrita accersor; ipsisque brutis ingra-
tior ab hominum, ne dicam doctorum,
societate eliminandus; si, vt dixi, tam enor-
mis delicti particeps existo. Quod si ab
ista labe purus inueniar, habebunt accusa-
tores, imo inuasores mei, quod deprecetur

apud diuinum Numen, quod apud mortales
obliterent, quod mihi resarciant, quod
sibi de cetero caueant. Ego enim neq. tam
nudus sum, vt coloribus alienis cum gra-
cula Aescopi me vestiam; neque tam rudis

vt ad rectè ducendum penicillum alterius
ductu egeam; neque tam proiectæ frontis,
vt aliena pro meis prostituam, qui naturæ
& conditoris benignitate, ita dotatum,
ita ditatum me, Christiana tamen cum

modestia sentio, vt religionis disciplina
imbutus, aliena sciam intacta relinquere,
Dei & naturæ liberalitate instructus, mea
& possim & soleam sine inuidia alijs com-
municare: vnde & Tabulam meam alijs

contemplandam dedi, non perfectam, sed
affectam, censendam, & melius inde ab-
soluendam, minimè verò carpendam,
lacerandam, vi denique iniusta extorquen-
dam: sed adhuc ego adsto, iuxta illam, ante

fores meas immobilem, frustra atque ir-
ritis conatibus cominus incursum; eminus
telis innumeris, sed caducis, innocuis, sine
ictu appetitam. Meminisse oportuerat ip-
sam & Aiæ clypeum esse, tela quæcum-
que aduersa respicientem. Latuit sub hoc

clypeo

*Apelles ex
sua Tab. Pla-
garius in-
gratus re-
darguere-
tur.*

*Anacepha-
leosis dictio-
rum.*

*Apelles alie-
no fuso non
 eget; qui fuso
 proprio
 cōtentus est.*

*Apelles suâ
Tab. ad cē-
suram, non
ad rapinam
 exposuit.*

I. I

clypeo, quamdiu voluit, fatus Vlisses, latuit post hanc Tabulam securus Apelles, quia in sua domo, post suam Tabulam latuit. Meus est hic clypeus, mea Tabula, mea pictura (absit inuidia dicto, sit locus veritatis) ego illam primus delineavi, primus pinxi, primus produxi, nullo ductore, nullo doctore usus praeuio. Quod clarissime ostendo, quatuor potissimum argumentis ex ipsa rei gestae serae deductis: ex indubitata aliorum fide atque testimonio desumptis; ex ipsa Tabula mea seu Phænomeno Solari; è Censoris denique Historia Phænomenoque Solis in eadem descripto. Quæ dum prosequor scriptione, tu secundis Lector oculis, & amico mentis fauore sequere.

APELLEM EXPOSITAM IN SUA

Tabula de Maculis Solaribus doctrinam à Censore suo non hausisse ostenditur primo ex ipsius Tabula constitutione.

CAP. III.

Quamquam is, qui ab alijs alicuius culpæ reus sit, pro sui defensione satis habeat si factum neget, neque se id non fecisse, planum facere villo modo teneatur; accusator autem, si in obiectis criminibus ostendendis deficiat, hoc ipso causa cadat, & reus statui fortuna, atque dignitati pristinae restitatur: bonus enim habendus est, qui non probatus fuerit malus: & ita sufficeret mihi vel dicere, vel scribere. Quod vos mihi Apelli crimen obijcitis à Critici, à Censori, Nego; Probate. Vbi, quando; quomodo tibi tua, o mi homo, quisquis es, surripui? proba; vel talionem time. Quamquam inquam aduersarios hoscæ tali modo satis arcere, & memet indemnem præstare possem; tamen ne vlla cuiuspiam vel vmbra sinistra de me opinionis oberret, veritatē atque integritatem meam ipso Sole clariorem efficio. Etenim si ego Macularum Solarium inuentionem, earundem digestionem, atque explanationem alteri cuiuspiam furtiue subdixi, necesse est primo, Ut omnia quæcumque ego illi eripui ipsi prius habuerit; secundo necesse est, ut ego sciuerim ipsum hæc habere: tertio necesse est, ut hæc alias non habuerim. Nam si ipse eademmet, ego ante habui, si alium

II.

habere non sciui, imo si alius nullus habuit: certum est me domi meæ plantatam, atque natam, non ex agris alienis euulsam, atque ablatam in apertum duxisse Rosam. Atque ut ad rem propius per singula veniamus. Quænam sunt illa, quæ ego glorioso isti Inuentori abstuli, atque in meam Tabulam transtuli? dicat si quæ hic sunt, quorum se Inuentorem atque dominum priorē iactitat. Aut enim ut in incepta Metaphora persistam, sunt instrumenta pingendi Tabulam Apellæam, aut colores, aut ars, aut pictura ipsa, aut denique omnium horum, vel singulorum conscripta explicatio, atque concinnata doctrina. Instrumentum picturæ huius præcipuum, est penicillum, Conus videlicet Solis radiosus, quem ego coelitus à Sole deduxi, nulli mortalium abstuli, & ante ex radijs Solaribus Helioscopio, nudo foramine atque speculo plano concinnaui, quam æmulo fortassis meo, alteriue vlli innotuerit, nam quod ipse in secunda sua epistola ad Marcum Vellereum Anno 1612. die 14. Aug. data mihi modum quendam penicilli Solaris conficiendi, seu maculas obseruandi ostendit, gratias equidem ago pro liberalitate non petita, tamen illum iam tum sciebam & usurpabam in Germania multis ante mensibus, quam Censoris epistola ad Marcum Vellereum ex Italia pertueniret, quam Vellereus, ut ipsemet in tertia sua epistola testatur anno 1612; die 28. Septembr. data, accepit tandem 5. die Octobris anno eodem. Imo ego maculas meas omnes quas edidi, ad Vellereum expediui à 12. die mensis Nouembr. à 19. & 20. Decemb. anni millesimi sexcentissimi vndecimi; nec non à 16. Ianuar. à 14. April. usque ad 25. Iulij anni 1612. Ut ex ipsismet, Macularum Solarium historiae, Romæ anno 1613 Italicè editæ subnexis, videre licet. Quare patet Censorem Apellis, in hac sententia necesse, nec esse potuisse, me penicillum hoc, seu artificium Solis in papyrum albam deducendi ipsi acceptum referre potuisse; cum illud ipsum, quod me docere voluit habita ratione temporis quo scribebat, quarto scilicet Maij 1612. illis primum mensibus à suo discipulo Benedicto de Castellis hauserit, & mihi ultro proposuerit epistola 14. Augusti anno 1612 exarata & 5. Octobris à Vellero accepta, multo minus potuisse surripere ad meam picturam, cum ego ultra quartum, & sextum Aprilis

Apellem in sua Tab. pingenda alieni nil usurpasse, probatur ex enumeratione partium.

Apelles in sua Tab. pingenda non est usus penicillo, seu instrumento alieno Censoris, sed suo.

In hist. mac. solar. pag. 52

fol. 97.

fol. 98.

ep. 1. fol. 28.

Apelles in hoc Phænomeno eruen- de nullo v- sus est Ma- gistro.

Apelles o- biectum ne- gando pla- gium, se sa- tis purga- ret.

Apelles sua Tab. nulli suffragari po- tuit, ex defe- ctu requisi- tori ad hoc factum ne- cessarium.

I.

Aprilis, anni 1612. diem, omnes meas observationes hactenus euulgaras non extenderim, & nulla talium observationum mearum a me facta sit sole trans Telioscopium in chartam excepto, vti expressè testantur ultimæ meæ literæ, ad Velsrum 25. Iulij perscriptæ; igitur penicillum hoc Italicum ad imaginis meæ efformationem non peruenit. & sic ab hac immunis euado culpa.

Ea autem penicilli Solaris conficiendi ratio, quam expressè docui, epistola ultima 25. Iulij data, anno 1611. item insinuauit apertè in epistola 16. Ianuarij 1612. & consistit in hoc, vt sol per nudum foramen in locum obscurum super chartam mundam orthogonos axi Solaris coni obiectam immittitur, cum omnibus suis maculis exprimitur; ipso statim initio à me excogitata, & adhiberi coepta est; cum ea tempestate species rerum visibilium in loca tenebrosa immittendarum iam diu tractatas, satisque perspectas in manibus quotidie haberem; statim itaque ad Maculas è Sole captandas idem artificium transtuli; sicque eundem per exile atque rotundum foramen intrare, atque arcana sua patefacere coegi, quæ ego in mundissimam chartam foramini seu penicillo Solis radioso orthogonos in longissima distantia oppositam excepi, & quam potui fidelissimè depinxi. Quem depingendi modum cum Auctor Historiæ Macularum ignorauisse videatur eo tempore, quo ego hasce Macularum designationes peregi; manifestum est, ad me eius adhibendi peritiam, ab ipso peruenire non potuisse. Quod autem ignorauerit illuc vsque immisionem naturalem, satis ex ipsomet liquet. Sic enim ipse ait in literis secundis ad Velsrum.

fol. 53.

Quando Apelles suam Tab. euulgauit, Censor Immissionem Solis ignorauit.

Io hò poi riconosciuto la cortesia della natura, la quale mille, e mille anni sono, porse facoltà di poter venire in notizia di tali macchie, e per esse di alcune gran conseguenze; perche senz' altri stromenti da ogni piccolo foro, per il quale passino i raggi Solari, viene in distanze grandi portata, e stampata sopra qualsiuoglia superficie opposta la imagine del Sole con le macchie; ben è vero che non sono a gran pezzo così terminate come quelle del Telescopio, tuttauia le maggiori si scorgono assai distinte, e V. S. vedendo in Chiesa da qualche vetro rotto, e lontano cader i

I I.

lume del Sole nel pauimento, vi accor-
ra con vn foglio bianco, e distesa, che
vi si scorderà sopra le macchie. hæc ille.
quæ sic habent Latine.
Ego postea etiam (nimirum post acquisitum Telescopij usum ingenuam nature facilitatem addidici, cuius benignitate, ab aliquot millenis nunc annis, in harum Macularum, nec non ex ipsis in magnarum consequentiarum notitiâ, deuenire licuit; siquidem absque villo alio instrumento, à quolibet paruo foramine, per quod radij Solares intrant sistit se imago Solis, vna cum maculis supra quamuis superficiem, in grandi distantia oppositam: verum quidem est eas magna ex parte tam præcisas & magnas non esse, atque illæ sunt quæ per Telescopium transmittuntur Maculæ, tamen maiores satis distinctæ apparent; & huius rei poterit V. D. facere experimentum in Templo, vbi si per ruptum aliquod vitrum longè dissitum, Sol lumen suum in pauimentum proiecerit, videbit in obtento & bene distento chartæ folio Maculas Solares.

Hactenus ille. Qui cum post edita mea hæc primum aduerterit, scripserit, atque Velsrum de his à me iam dudum exactè informatum edocuerit; manifestum est hoc penicillum in mea officina inuentum atque perfectum, non aliunde importatum esse.

De Macularum per reflexum à plano speculo Solis radium exceptione, itemque tubis coloratis in Solem directis inspectione, an quisquam ante me vel notitiâ, vel usum habuerit, me fugit; certè vix arbitror: hoc etiam certum, me, de Maculis & Faculis Solari circulo, prout solitus hucusque sum, charta designato includendis, & designandis, à nullo mortaliū quidquam vel notitiæ, vel praxeos accepisse; & antequam quidquam de aduersario cognoscere possem, pictura mea confecta erat, inque Tabula mea publicè prostabat: vt ex hoc capite plane argui non queam.

Ad colores nunc venio, per quos aliud nihil intelligo, quam ipsasmet & Maculas, & Faculas Solis, quarum vtrasque quidem, tanquam picturæ meæ materias tractauimus, illas tamen solas censui aliorum in Tabula Apellis exposui. Quarum conspectus cum sit vbique, de die, passim omnibus obuius atque

Apelles Maculas per reflexionem excipiedas per Helioscopij aspiciendas; circulo obseruatorio includendas, à nullo didicit multos docuit.

I.

atque communis, illas vel eripere, vel præripere nulli potui, quemadmodum neque ullus mihi; lux enim Solis iure Gentium communis est omnibus, neque aspectum eiusdem homini libero prohibere quisquā potest, siue in eundem velit emittere oculum, siue ipsum in chartam ad visum deducere; idque vel libero foramine, vel vitris tubo conclusis. Sicut autem Sol & lux Solis, adeoque etiam Maculæ & Faculæ Solares, speciesque earundem hemisphericæ in totum vniuersum proiectæ, sunt obiectum visus vndeque patens atque obuium, materiaque disputandi, describendi, delineandi, depingendi communis, atque omnibus in toto orbe terrarum libera; ita vicissim eadem Maculæ atque Faculæ certis locis atque temporibus visæ, notatæ, inque ordines certos digestæ, sunt illorum locorum, temporum, atque personarum, ita singulares & propriæ, ut aliis attribui nullo modo debeant aut valeant. Vnde cum neque primo, neque altero genere consideratas Maculas auferre ulli potuerim; impossibile est easdem à me ulli hominum subductas esse neque in his, opinor mihi bellum quisquam mouerit.

Ars ergo pingendi ab Italia ad me fuerit in Germaniam delata. Quænam obsecro illa ars? quando? per quem? scilicet ego Maculas pingere didicerim tum primum, cum easdem pridem pictas alijs obiecerim? Sed quodnam illud pingendi artificium?

Nihil aliud intelligo hic (nam de simplici aspectu Macularum suo loco postea) quam peritiam illas rectè in chartam deducendi, dictorum aliquo modorum, seruata apta cuiuslibet tam ad se, quam alias quasunque, magnitudinis, figuræ, loci, situs, proportionis, habitæ locorum, temporum, atque durationum ratione. Sed & perpediculi, seu circuli, planique verticalis diligenti animaduersa sectione, ut ex hac in penicilli Solaris vestigium, sub circuli figura in charta signatum, inscribere liceat eclipticam, ad locum, & motum Macularum inueniendum necessariam. Hæc inquam omnia, atque hisce affinia, à nullo mortalium ego didici, docui multos. quod patet ex euulgata mea Tabula, in quam recto situ atque ordine Maculas non digressissem, si artis huius Magistrum coelitus reuelante Angelo expectassem. Quamquam Censor Apellis ille, præter vsum, Telioscopio exercendum nihil, vel parum

II.

1 docet. Ego autem ad ea, quæ in Tabula proposui, solo foramine nudo, tubo inspectionis seu Helioscopij, atque artificio reflexionis vsus sum.

5 Caterum quia Criticus Apellis in tota sua Historia apparentem motum Macularum rectilineum tantum, eumque secundum eclipticam parallelum propugnat, curuileum autem penitus ignorat, motusque inæqualitatem, moræque supra horizontem diuersitatem, funditus eradica-
10 tam cupit, prout fufius suis infra locis patebit; euidens est ipsum artem atque viam meam hæc disponendi non habuisse, atque à vera semita non parum exorbitasse; & me ipsam ab eodem nec didicisse, neque infidiosa aliqua machinatione surripuisse. Quorum vnum, & alterum libet tangere. Si quotidie obserues vnā maculam eo
20 tempore, quo locus Solis in Ecliptica ab horizontis sectionibus quadrante circuli distat, & per centrum circuli Solaris in chartam proiecti horizonti parallelam, vel perpendiculo è vertice per centrum misso perpendicularē agas; necesse est illius Maculæ cursum huic lineæ congruere, aut certè parallelum esse; si ad eclipticæ normam incedunt Maculæ. at Censor Apellis hoc non fecit; aliàs motum alium quam
30 rectilineum, aut Eclipticæ parallelum deprehendisset.

Item omnis Macula per centrum circuli obseruatorij transiens, semper necessariò debet ante, & post centrum, ab ingressu ad exitum vsque describere Solaris disci diametrum, si quidem secundum lineas rectas feruntur Maculæ; & reliquæ omnes extra centrum latæ, facient itinera huic parallela: quod tamen non fit prout examinanti constabit: quæ examina Apellis Censor si sciisset, si adhibuisset, aliud utique, quam in sua Historia docuit, atque in praxim mendosissimam, ut suo postea loco patebit, deduxit, inuenisset. Ego igitur ab illo hæc, & similia artificia, de quibus aliàs ex instituto, non accepi.

Neque vltius dici potest quod meam picturam, id est obseruationum mearum in Tabula mea editarum seriem, ab illo abstulerim; oporteret enim autographa apud ipsum esse residua. Necesse igitur esset, illum in Germania Maculas obseruasse; quod nunquam accidit; necesse esset ipsum per foramen immissionis plerasque obseruationes à me editas absoluisse, quod à vero
55 abhor-

Modus vnus apparentem Macularum motum indagandi a Censore vel nescitus vel neglectus.

Alius modus similiter præteritus.

Apelles suā picturam à Censore vel vltro alio, non abstulit, non transulit.

Apelles artem pingendi, nec a Censore neque ab vltro alio didicit, sed à huius & alijs discendi occasione primus didicit.

I.

abhorret: ipse enim naturæ hoc secretum eo temporis ignoravit; necesse esset multos per reflexionem factitasse; quam tamen ipse nullibi agnoscit in sua Historia. Præterea cum fateatur in epistola sua prima 4. Maij data 1612. se ob materiei difficultatem, & quod multas continuatas observationes non potuerit facere, in suspensio, atque ancipiti herere, neq. sententiam decisivam, de re tã lubrica posse ferre: Ego verò à 21. Octob. anni 1611. vsq; ad 7. Aprilis, anni 1612. & observationes aliquot centenas, ne dicam millenas, & continuatas habeo, & sententiam inde certam in plurimis protuli, & in pluribus proferre possum; igitur designationes meæ, ab ipsius desumptæ esse non possunt. Amplius in epistola eadem pag. 11. ait, meas observationes cum observationibus suis atque aliorum collatas conuenisse, ex quo iterum clarum est, meas ab ipsius non esse transumptas, alias etiam ab alijs debebam transumpsisse, vel alij vna mecū ab illo. Vellem autem & ego videre, quomodo historiographi huius observationes cum meis ab 11. Ianuarij anni 1612. vsque ad 16. Martij anni eiusdem conuenirent: per illam enim lacunam implendam se maxime tutari, mihiq; & omnibus alijs satisfacere posset, quisquis primæ uenientis industria mihi coræuus esse affectaret, si id facto non verbis probaret, atq; sicut ego feci, & facere etiam nū. possū, observationes factas promeret. *hic Rhodus, hic saltus*. Deinde optarem, vt tam promendis modo dictis observationibus, quæ à me promptis, lineam eclipticæ induceret, si quidem ego ab illo omnia, vt modestè dicam mutuo. accepi. At dicet forsitan Censor, se plus non dixisse, quam meas observationes editas, cum suis, & aliorum à se visis, in hoc correspondisse, quod sub Sole ab ortu in occasum mouerentur Maculæ, & non nihil à Borea in Meridiem seu Austrum vergerent: quæ omnia stare possint, cum solo Macularum directo atque oculari aspectu per tubum facto, etiam si visas in chartam non retulisset, secundum numerum, situm, magnitudinem, & figuram. Simplicem enim, & consideratum intuitum; mane, & vespere factam, id sufficienter præstare potuisse. Quidquid sit de veritate huius responsi si daretur, hinc denuo mox inferrem, meas observationes in chartam deductas apud

II.

11 auctorem istum exemplar, vel prototypum nullum agnoscere, sed fuisse; & credibile valde esse Censorem hunc, id temporis observationes stabiles, plenas, ordinatas, in chartam coniectas vel pauculas admodum, vel quod verius, nullas habuisse id quod ipse satis expressè confitetur in sua tertia epistola 1. Decemb. anni 1612. ad Velferum perscripta. Qui locus cum multa historica, & ad rem meam proficua contineat ad verbum est inferendus.

15 „ E non posso (ait Censor,) in tal proposito celare à V.S. vn poco di scrupolo, che m'è nato, dall'hauer voluto Apelle in questo luogo produr quelle due macchie, e loro mutazioni, che mandai disegnate à V.S. nella mia prima lettera, e benche io bene intenda, ciò esser deriuato dal suo cortese affetto, desideroso di procacciar credito à loro, 20 „ co'l dir, che molto s'aggiustauano con le sue, e far nascere occasione di mostrar, come egli di me ancora teneua grata ricordanza; non però harei voluto, ch'ei passasse poi tanto auanti, che si mettesse in pericolo di scapitare qualche poco nell'opinione delle lettere, col dire, che dall'incontrarsi tanto esattamente i miei disegni con i suoi, 30 „ massime quei della seconda macchia, si accertaua del mancamento di parallasse, & in conseguenza della loro gran lontananza da noi; perche con gran ragione potrà essere messo dubbio sopra tal sua conclusione, *poiche le figure, ch'io mandai, furon di Macchie disegnate solitarie, e senza rispondenza ad alcuna, ò alla situazione del Sole, che ueramente ne anche fu da me disegnato* il che mi lascia altresì alquanto confuso, onde 40 „ de' egli habbia potuto accorgersi dell'hauerle io precisamente, o no comparate, e disposte. Hæc ille quæ sic reddatur Latine. Et non possum hic V. D. celare vnum paruum scrupulum, ex quo mihi natum, quod Apelles in isto loco produxerit duas Maculas, & illarum mutationes, quas ego V. D. in mea prima epistola designatas misi; & quantum 50 „ quam ego bene animaduertam, id totum ab eius officioso in me affectu profectum, ad conciliandam ipsis fidem, dum dicit eas cum suis multum concordasse, atque hanc veluti occasionem 55 „ ab illo arreptam, gratiui erga me animi signi-

fol. 10. circa medium.
Censor ob difficultatē Solaris Phænomeni fluctuat.

Censor lacunas ab Apelle relictas, implere de suis non potest.

Obiectio qua posset à Censore fieri diluitur.

I.

„significationem dandi; tamen noluiſ-
 „ſem eò progreſſum, vt aliquod pericu-
 „lum ſuæ exiſtimationis apud Lectorem
 „adiret, dum ſcribit propter exactam
 „mearum cum ſuis præſertim Maculæ ſe-
 „cundæ designationibus conuenientiam,
 „in tanta locorum diſtantiâ, certum ef-
 „ſe, eas omni parallaxi carere. Quod me-
 „ritò quis in dubium vocare poſſet, hanc
 „illius inde deductam conſequentiam;
 „*Quandoquidem figura, quas ego miſi,*
 „*fuere Macularum ſeorſim conſignata-*
 „*rum, Et ſine vlla ad alias correfponden-*
 „*tia, aut ſitus in Sole habitâ ratione,*
 „*Cuius neq; circulus etiam à me deſcriptus*
 „*fuit:* quod me pariter nonnihil confu-
 „ſum reddit, vnde ipſi potuerit conſtare,
 „illas à me præciſe vel ſecus diſtinctas
 atq; diſpoſitas eſſe. Hæc ille.

Ego verò pro fama mea ex hoc loco vel
 leſa, vel ledenda, quâ ſuo loco & tẽpore ſa-
 tis tuebor, ſollicitus non ſum, quia cauſſam
 leſionis nullâ dedi, temere ſuſpicandi præ-
 buit Lectori Cenſor Apellis; cuius inge-
 nuam confeſſionem. *Quod nimirum hæſce*
Maculas ſingillatim, nullo ducto Solis cir-
culo ſpectatas ad Vellerum miſerit, libentif-
 ſimè amplector; ex eoque abſque vlla du-
 bitatione deduco, Sugillatorem non tan-
 tum à 5. Aprilis, vſque ad finem eiſdem;
 atque ad 3. Maij, nullas ſtabiles, plenas,
 atque fundamentales Macularum Sola-
 rium obſervationes in chartam conieciſſe,
 è quibus Aſtronomiæ amator aliquid di-
 gni haurire potuiſſet, ſed neque anteriorum
 temporum vllas erudito oculo dignas
 è Sole decerpſiſſe. aliàs enim certò certius,
 eaſdem Marco Vellerò, & ipſi Lynceo vti-
 que communicaiſſet: quis enim credat, re-
 tentis melioribus domi, deteriora tanto
 Patrono, tam perſpicaci Oculo, tam pur-
 gato Cerebro, tam delicato atque faſtidio-
 ſo Guſtui obtuliſſe? quis credat ſi, è qui-
 bus ſuas opiniones ſtabilire potuiſſet domi
 latuiſſent, non producturum fuiſſe? & ad
 Vellerum, hæc ex inſtituto tam inſtanter
 poſtulantem, cum tanta trepidatione re-
 ſponſurum? cui tamen alioquin minora ar-
 cana ſub tectis logogryphis ſpõte obtruſit?
 Sed audire lubeat iſtum alias glorioſum,
 & ſtreperũ nunc vix muſſitantem Nunciũ.

„Queſti, inquit, riſpetti mi hanno reſo-
 „lento in riſponder alle domande di V.S.
 „Iluſtriſſima; e tuttauia mi fanno timi-
 „do in produrre altro, che qualche pro-

II.

„poſition negatiua, parendomi di ſaper
 „più toſto quello, che le Macchie Solari
 „non ſono, che quello, che elleno vera-
 „mente ſiano, & eſſendomi molto più
 „difficile il trouar il vero, che'l conuin-
 „cere il falſo. *Iſti reſpectus, inquit,* (ni-
 „mirum valetudo aduerſa; occupationum
 „multitudo; ſpes ſatiſfaciendi poſtulis;
 „difficultas materiæ circa hoc Phænomen-
 „on; obſervationũ neceſſariarum penuria;
 „& quòd melius ſit cum vniuerſis errare,
 „quàm in rectè ſentiendo ſingularem fieri;
 „quòdque præſtet ſequi cum veritate,
 „quàm cum errore alios præuenire &c.)
 „*Iſti inquit reſpectus me &c.* fecere len-
 „tum ad preces D.V. Iluſtriſſimæ; et omni-
 „no me reddunt timidum, vt aliud pro-
 „feram nihil, quàm ſolam poſitionem
 „negatiuam, quòd citius mihi ſciri poſſe
 „videatur illud, quid Maculæ Solares non
 „ſint, quàm quid ſint verè enunciari;
 „quòd maior mihi multò difficultas oc-
 „currat in eruenda veritate, quam deſit
 „in falſitate conuincenda facultas.
 „Tantas igitur ipſe excuſationes nullo
 „modo afferret, ſi huiſmodi ſuam è prom-
 „ptuario ſuo, melioribus obſervationibus
 „fulcire atque exornare ſciuiſſet. Secus ſi
 „eſt, ad experimentum prouoco, producat
 „obſervationes ab Aprili ad Maium 1612.
 „promat ab 11. Ianuarij ad vſque Februa-
 „rium anni 1612. proferat à primo Februa-
 „rij ad finem eiſdem Menſis & anni; pro-
 „ponat ab initio Martij ad 10. eiſdem; hæc
 „faciat Arbitrè Apellis, & ex illis non ſibi,
 „ſed nobis oſtendat curſum, locum, & alias
 „Macularum proprietates; & tum incipie-
 „mus aliquid de ipſius inuentionibus addu-
 „bitare. Intret in ſuum Adytum ſibi ſoli di-
 „uinitus, nulli alteri teſte Angelo reuelante
 „peruium, & inde aliquid nobis de ſuo the-
 „ſauro octodecim menſium ſpatio collecto
 „in medium proferat, ex eoq. Phænomenon
 „Solare edoceat; ordinem Macularum tanto
 „tempore lapſarum inſtruat, indeq. bene di-
 „ſpoſitum exercitum in aciem producat;
 „naturam, motum, locum, atque innumeras
 „illarum varietates, non dicat verbis, ſed in-
 „tendat nobis digitis, calamo, ſtylo, in obſer-
 „uationũ circulis, quæ, quales, quantæ, quot
 „Maculæ fuerint, quæ Faculæ concurrerint;
 „quo anno, quo menſe, qua die, qua hora ve-
 „nerint, abiuerint &c. eclipticam inducat
 „&c. Sicut me feciſſe vidit, ſicut facere poſ-
 „ſum, & paratus ſum, non tantum ad

*Timiditas
 & lentitudo
 Cenſoris ex
 ignorantia
 Phænomeni
 Solaris.*

*Apelles ad
 obſervatio-
 nes prouocat
 Cenſorem.*

*Cenſor Apel-
 lis octode-
 cim Menſium
 obſervatio-
 nes à ſe fa-
 ctas promat.*

1.

prædictas complendas lacunas, sed per integros annos sequentes, usque ad hunc annum, hunc mensem, hunc diem, hanc horam. *hic Rhodus, hic saltus*. Hoc quisquis non potest, frustra se, de præteritis observationibus iactitat, frustra primum, frustra suparem inuentorem facit.

Non D^{eu}, non homines, non concessere columnæ.

Nisi enim vestigia Maculatum in charta expressa videamus, nudè affirmanti non credimus. Sed ad ingenuam ipsius confessionem redeo, qua Solem circulo inclusum se habere negat, ex qua & illud habeo, impossibile esse Meas observationes, ex ipsius depromptas: *eò quòd meæ omnes sint integra intra Solis circulum, cum apparenti situs, figurarum, & magnitudinum proportionē factæ*, ipsius autem horum nihil præstent. Rursus si Censor Apellis integras observationes vel nullas, vel paucas habet ante tempus hoc, manifestum est, totam picturam meam ab illius designationibus nullo modo desumptam esse. Nam meæ omnes quas edidi, suis numeris absolutæ sunt & perfectæ; illius ad 4. Maii anni 1612. nullæ: meæ omnes 7. Aprilis terminatæ; illius neque inito adhuc Maio inchoatæ. Imo quando Censor meas figuras mense Martio positas oppugnat; suspectas habet epistola 3. pag. 116. 124. 129. 130. 131. &c. dum motuum diuersitatem, moræ inæqualitatem maculis negat, facit id tantum coniecturis, quod facere debuisset, & potuisset adductis in contrarium suis observationibus, si habuisset: eum neget meas rectè factas esse. Euidens igitur est ipsi tunc observationes stabiles, & valoris alicuius nullas fuisse, quando meas edidi, quidquid interim passim in historia sua nugetur, meas observationes cum suis rectè quadrare, quæ nullæ fuerunt. Sed quid ego conquiritis hinc inde rationibus vtor? in præfatione ad Lectorem hæc habentur.

„ A quelli poi , che pretendessero ante-
 „ riorità nelle osservazioni di tali Mac-
 „ chie, non si nega il poter loro hauerle
 „ osservate, senza auviso precedente del
 „ Signor N. com'è anco manifesto, ha-
 „ uerlo essi preuenuto nel farle pubbliche
 „ con le stampe. Illis deinde, inquit, qui
 „ prioritatem in observationibus istarum
 „ Macularum prætendunt, non negatur,

I.1.

1 „ fieri potuisse , vt illas absque præuio
 „ Domini N. indicio obseruauerint ;
 „ quemadmodum etiam hoc manifestum
 „ est , ipsum in iisdem typo publicandis
 5 „ præuentum esse , &c. *MON. HISTORI.*
 Si igitur ego , absque præscito Apellis
 Censore , vel Angelo suffragante , & po-
 tui , & obseruauī Maculas prædictas , &
 edidi ante ipsum ; si Censor obseruatio-
 10 num suarum , ante me , vt ait , factarum
 seriem vllam neque produxit , neque po-
 test producere ; cū teste ipso met. neque
 multas , neque continuatas possuerit fa-
 cere obseruationes ; relinquo cuiusvis æqui
 15 arbitri iudicio ; fieri ne potuerit , aut fa-
 ctum sit , vt ego meas illi sublegerim ?
 factumne sit , vt ipse ante me obseruaue-
 rit ? facta à me , verba stant ab illo , sed &
 contra illum , dum ait , se propter rei dif-
 20 ficultatem , & obseruationum à se facta-
 rum , & continuatarum paucitatem ,
 adhuc suspensum , & irresolutum teneri .
 hoc autem quando dixit ? 4. Maij anno
 1612. At Apelles quando suarum Macu-
 25 larum obseruationes , & de eisdem suas
 resolutiones confecit , & euulgauit ? Pri-
 mas tres epistolas composuit , & absoluit
 anno 1611. mensibus Nouembr. & De-
 cembr. quæ sunt editæ anno 1612. No-
 30 nis , id est 5. Ianuarij , Epiphaniæ Domini
 peruigilio , vt sic eodem quo Christus per
 stellam die tanquam Sol immaculatus
 manifestatus est Orbi , etiam per hasce
 35 umbras appareret istud mirabile & grande
 Solis Maculosi spectaculū . Quidquid igitur
 in hisce obseruauit , quidquid ex obserua-
 tis statuit , id à Censore suo Apelles non
 habuit , neque vilo modo habere potuit ,
 quandoquidem Censor postea primum
 40 illud morosum excusandi sui causā , ad
 „ Velserrum scripsit . Hò anco tacciuto, sù
 „ la speranza di potere dar qualche satisf-
 „ fazione , alla domanda di V. S. intorno
 „ alle Macchie Solari , sopra il quale ar-
 45 „ gomento, ella mi ha mandato quei bre-
 „ ui discorsi del finto Apelle : Ma la diffi-
 „ coltà della materia è l non hauere io
 „ potuto far molte offeruazioni conti-
 „ nuate , mi hanno tenuto , e tengono
 50 „ ancora sospeso , & irresoluto . Ego , inquit
 „ ille , tacui etiam , quia speraui futurum ,
 „ vt aliquatenus satisfacerem petitioni
 „ D.V. circa Maculas Solares , de quo ar-
 „ gumento , illa mihi misit breues ficti
 55 „ Apellis discursus . At materie difficultas
 & quod

*Apelles suas
obseruat-
iones à Censo-
ris observa-
tionibus nō
habet, è cir-
cūstantijs
impossibili-
bus.*

Censor Apellum non oppugnaret in certis coniecturis, si certas habuisset contra ipsum observationes.

Hiß. fol. 3.

*Apelles ex
aduersario-
rum indul-
to suam Ta-
bulā depin-
git absq. vl-
lo præuiso
Cæsar's pro-
totypo cogni-
to.*

Hist. Mac.
lett. 1. p. 10.

I.

„ & quod non potui facere multas obseruationes continuatas, me tenuerunt, & tenent adhuc suspensum, & irresolutum. Clara confessio, magna veritatis vi extorta testificatio, è qua patet

Primo, Censorem iudicare, & rectè quidem ad huius Phænomeni cognitionem, & decisionem aliquam solidam, necessarias esse obseruationes multas.

Secundo, Et has quidem continuatas.

Tertio, Se multas continuatas non potuisse facere.

Quarto, Idcirco sese de hac tota re sententiam suspensam, & indecisam hucusque tenuisse.

Quinto, Et etiam nunc tenere: quæ omnia pro sui excusatione, atque trimestris silentij (quo Maculas meas Solares iam typo vulgatas, sibi que ex professo missas, apud se detinuit, examinavit, discussit, cribrauit, ventilauit) purgatione, ad Marcum Vellereum attulit, 4. Maij anni 1612. Apelles autem 26. Decemb. anni 1611. aliquot centenas Macularum Solarium obseruationes, & continuatas quidem congefferat, sententiamque de ijs suam sequentibus articulis palam declararat, & solidè satis probauerat.

Primo, Maculas Solares esse verum, & reale Phænomenon.

Secundo, Motu proprio ferri ab ortu in occasum.

Tertio, Soli proximas esse, omnique parallaxi carere.

Quarto, Macularum coitionem, & diuisionem, apparitionem, & disparitionem in medio ☉ frequenter fieri.

Quinto, Moram illarum sub Sole inæqualem intra diem vndecimum, & decimum quartum ferè euenire.

Sexto, Periodum totam illarum obiter, & eas ordinariè saltem non reuerti ostendit.

Septimo, Earundem periodum circa Solem eiusq; centrum absolui docuit.

Octauo, Varias illarum affectiones circa magnitudinem, figuram, densitatem, raritatem, lucem, tenebras, colores, opacitatem, transparentiam, gracilitatem, crassitatem, &c. fusè satis explicuit.

Nono, Liquiditatem quoq; cæli ex hisce sequi, satis indicauit.

Decimo, De essentia motuq; apparente dubiè disseruit, certiora ex futuris discursibus, examinibus, obseruationibus, Ta-

II.

bulaque continuanda promisit. Censor autem Apellis in sua ad Vellereum epistola quid? certa paucissima, dubia, & ambigua pleraq; & conditionatè, atque coniectando asserit.

Haftenus, inquit, tacui, quia materiae difficultas, & obseruationum propriarum probatarum penuria, os obstruxit, manum constrinxit, calamum obturauit, aciem

mentis hebetauit; vt titubante intelligentiæ meæ iudicio, quid sentiam, dicam,

„ scribam, non habeam. Io conosco, inquit; d'hauer con gran lungezza di parole, e con poca risoluzione souerchia-

„ mente tediato V.S. Illustriss. la irresoluzione resti scusata per la nouità, e diffi-

„ coltà della materia, nella quale i vari

„ pensieri, e le diuerse opinioni, che per la

„ fantasia, sin hora mi son passate, hor trouandoui assenso, hor repugnanza, e con-

„ tradizione, m'hanno reso in guisa timido e perplesso, che non ardisco quasi

„ d'aprir bocca per affermar cosa nessuna. Ego conosco, ait ipse, me V. Illustriss. D.

„ multa verborum superfluitate, & paucarum rerum decisione, gratis fuisse molestum.

„ Irresolutio tamen excusatur, nouitate, & difficultate argumenti, circa quod

„ variæ cogitationes, & diuersæ opiniones quæ imaginationi meæ hucusque oc-

„ currerunt, nunc ad assentiendum, nunc ad repugnandum, & contradicendum trahendo, tanto timore atque

„ perplexitate me distraxerunt, vt non audeam quasi hucere ad affirmandum

„ aliquid.

Hæc Arbitrator Apellis de se, verè & ingenuè: quia obseruationes ad aliquid certi statuendum necessarias neq; multas, neq;

„ continuatas habuit, quod eas, vt ipse ait facere non potuit. Et tamen Apelles suas

„ Macularum designationes, & inde deductas Conclusiones, diu ante ab ipso suspens-

„ so, & irresoluto mutuat, suffuratus est.

45 O mirabilem Apellem qui à cæco coloris naturam discat, & ab inani crumena thesaurum, è pumice aquam nouo artificio extorqueat! Sed illud mirari subit, quo-

„ modo Ventilatori huic Macularum Solarium argumentum tam sit nouum, tam

„ difficile, tam inopinatum, tam arduum, qui eas iam ab octodecim mensibus, & am-

„ pliùs quasi familiariter nouit, & multis, imò quàm plurimis iam ante annum

„ ostendit? Mirari iterum subit, cur tanto

B 2 tem-

Censor Apel. Tab. typo e-
uulgatâ ali-
quot menses
apud se ha-
buit, quâ vl-
lum verbulû
de hoc Pha-
nomeno con-
scriberet.

Sûma eorum
qua Apel. de
Sole produ-
xit ante Cen-
sorē partim
demonstrauit,
partim pro-
babiliter dis-
seruit in sua
Tabula.

Censor Apel.
ex ignoratio-
ne Phænome-
ni totus ti-
midus, per-
turbatus, an-
ceps, & mu-
sus.

Ros gesta cū
scriptis Cen-
sorinis con-
siliari ne-
queunt.

I.

*Idonea pro
Censoris tar-
ditate & o-
scitantia,
excusationes
nullae.*

*Celum Ita-
licum Ger-
manico con-
stantius &
multo fere-
nius est.*

tempore tam paucas (& fortè nullas) neq;
continuatas observationes fecit. An quia
noluit? At certè Vellero, & amicis suis gra-
tificari omni modo, quo potuit, studuit,
& bono publico propter obseruandi labo-
rem, rem tantam inuidere, & sese prima-
inventionis gloria defraudare non debuit:
fortasse coelum non fuit? at ego ab Octo-
bri anni 1611. vsque ad 4. Maij 1612. quo
Censor ex obseruationum penuria, in-
summa huius Phænomeni ignorantia,
atque obscuritate hæsit, aliquot centenas
quordierum & horarum ferè obseruatio-
nes elaborauit. Si igitur octodecim men-
sium spatio Sol vnà cum Censore turbi-
dus, & nubilus, atque nebulosus fuit, cer-
tè frontem anno 1612. ad 4. Maij explicare
potuit. Sed forsitan Italiae minùs quàm
Germaniae arridet Phoebus? Quæ ergo ra-
tione ille mihi ausus est intra paucos dies
promittere, quod vel coeli inclementia, vel
fortunæ iniuria & sibi, & Amicis non po-
tuit præstare, tot iam elapsis mensibus.
Non potui inquit facere multas obserua-
tiones; quandiù? à quanto tempore? haud
dubiè à Mensium octodecim interuallo, &
tamen; però la supplico, inquit, à salu-
tarlo caramente in mio nome, facen-
dogli intendere, *che fra pochi giorni gli*
manderò alcune offeruazioni, e disegni
delle macchie Solari d'assoluta giustez-
za, si nelle figure d'esse macchie, come
ne siti di giorno in giorno variati, senza
error d'vn minimo capello, fatte con vn
modo esquisitissimo, ritrouato da vn mio
discepolo. Tamen supplico, V. D. Illu-
striss. (inquit ille,) vt meo nomine di-
gnetur salutare Apellem, significando
illi, quod *intra paucos dies* ipsi missurus
sim aliquot obseruationes, & designa-
tiones Macularum Solarium absolutif-
simæ perfectionis, tam in figuris ipsa-
rum Macularum, quàm sitibus de die
in diem variatis, absque errore vel vnus
minimi capilli, *factas modo quodam*
exquisitissimo reperto per aliquem disci-
pulum meum.

Hinc ergo elucescit, quid illud tandem
sit quod Censorem tanto tempore remo-
rabatur, quominus Macularum veras ima-
gines effigiaret: non enim illud erat coeli
tempestas; alias enim tam paucis diebus
non sponderet eas efformare: non animi
voluntas; quia & mihi extraneo in hoc of-
ficiosum sese offert: non rei nouitas; quæ

II.

paucorum dierum accessu nō senescit: non
materie difficultas; quam octodecim men-
sium interuallo durantem, paucis diebus
se perrupturum confidit: non inquam
quidquam horum Censorem à faciendis,
& continuandis obseruationibus retarda-
bat, timidum, perplexum, suspensum, irre-
solutum, & denique ignorantem tenebat;
sed quod ipse ait; faciendi potestas deerat,
non poterat obseruare, *quia deerat discipu-*
lus qui erudiret Magistrum; hoc habito,
iam neque nouitas rei, neque materie dif-
ficultas, neque coeli inclementia, neque
temporis breuitas, aut quidquam aliud
obstat, quominus cum suis obseruati-
bus in publicum prouolet, & Apellem in
hisce iam diu ante exercitatum edocere
gestiat: nihil ergo prædictorum ab eodem
in specie prætenforum, fuit causa vera cur
ipse tanto tempore hæsiraret; alioquin cum
hec omnia adhuc non tantum mense Maio
huius 1612. anni, sed & sequentibus per-
sistent, (sunt enim adhuc noua & scrutatu
difficillima hæc Phænomena) causa posi-
ta & durante, maneret pariter effectus: at
cum effectus, hæsitatio videlicet Censori-
na cessauerit, spesque certa è Labyrinto
emergendi affulserit; manifestum etiam
est, causam illiusmodi formidinis esse su-
blatam. Hanc autem sustulit ipsius disci-
pulus, dum artem obseruandi maculas,
à se repertam Magistro ostendit discipu-
lus, Angelumque variorum de hoc *uni-*
co Capite oraculorum Nuncium inanem
fecit.

Causa ergo quæ Censorem in timore,
atque à sententia dicenda continuit, fuit
quod Solares Maculas, earumq. naturam,
atque proprietates ignorauit; ignorantie
causa fuit, quod illarum multas conti-
nuatas obseruationes ad aliquid certi de
illis proferendum summopere necessarias,
octodecim mensium interuallo facere non
potuit: quam causam, quia discipulus ipsi
ex parte sustulit, atque Solem in chartam
deducere docuit, absterfo diuturno animi
moerore, letus in medium profilit, atque
intra paucos dies sese omnes nebulas di-
spersurum sperat. At qui sperat se aliquid
adepturum, fatetur se illud necdum ha-
bere, ergo dum Censor Apellis, spe huius
Phænomeni scientiam consequendi gaudet,
nondum illam habet, sed adhuc ignorat.
Et hoc est quod erat ostendendum; nimi-
rum Censorem die septimo Aprilis anni

*Censor Apel-
lis, die 7. Apr.
1612. huius
modi maculas
repertit, quod
ipse Censor
non potuit
reperire.*

*Maculae
Solares
reperit
discipulus
Censoris
Magistri.*

*Procrasti-
nationis at-
que trepida-
tionis Censo-
rina vera
& genuina
causa: Igno-
rantia.*

*Ignorantiā
Magistro
Discipulus
sustulit.*

*Epist. 1. fol.
28.v.5.*

I.

16 2. ultra quod tempus observationes à me in lucem prodire non excurrunt, Maculas Solares nec rectè observare potuisse, nec ex observatis quidquam stabile deducere sciuisse: cum tamen ego vtrumque pro re nata præstiterim. Ergo ego à Censore tunc temporis huius Apparentiæ tyrone, nec colligere, nec sublegere quidquam potui, & nihil auferre à non habente. Ergo Censor huius Phænomeni scientiam saltem doctioribus cum aliqua dignitate, & probabilitate communicandā, ante me non habuit. Ergo Ego illi quod illius esset nihil ademi; & stat mihi pictura mea, Rosa mea; manent illi tenebræ, quas alieno nomini offundere studuit, manent vepres, quibus immerentis nec prouocantis famam voluit lacerare.

Apelles ab inscio Censore discere quid potuit.

APELLEM SVAM DE MACVLIS Solaribus doctrinam à Censore non hausisse colligitur 2. ex præmissis per causas quasi Materialem, Formalem, & Efficientem.

CAP. IV.

Materia de qua & circa quam Apelles, circa quam ipsius Censor suam doctrinam statuit, sunt Maculæ Solares, & prout in Sole cernuntur, sunt eæ veluti materia prima, atque remota, prout verò instrumentis certis, atque statis observationibus haustæ Mathematicis disquisitionibus per observationes accuratas aptantur, sic induunt rationem materiæ veluti secundæ, & proximæ. Ego autem in inquirendis, & detegendis in Sole Maculis monitore præuio nullo usus sum, neque oppositum proteruè contendens vlla probabilitatis vmbra palliabit. Inanem autem Censoris gloriationem de sua tam antiqua inspectione Macularum antiquatam videbis infra c. 7. Porro meam de Maculis doctrinam fundavi atque construxi super solas Macularum observationes à me factas & in Tabula exempli causâ, (quia minimam illarum partem produxi) mea ad 4. Aprilis extensas; quia verò Criticus Apellis, observationes circulo Solari inclusas, & continuatas ad aliquid certi de hoc Phænomeno concludendum, etiam iudicio suo simpliciter necessarias (est enim hæc materia

Apelles materia Phænomeni Solaris à Censore accipere non potuit, ex circumstantia Temporis.

II.

1 secunda, & proxima) sese, ad 4. vsq; Maij neque facere vel habere potuisse ingenuè est confessus: igitur ego doctrinam meam de Maculis Solaribus ultra 7. Aprilis non excurrentibus prolatam, atque probatam, ab ipso mutuo accipere non potui. Neque enim à non habente quidquam potest tolli.

Et hoc est primum; quod erat demonstrandum.

10 Causa quasi formalis hic, est qualitas doctrinæ quam de Maculis affero: doctrina autem in Tabula mea, vel ex meo genio absolutè proposita, vel in gratiam tunc Philosophantium sub dubitatione insinuatâ, in plurimis est contraria doctrinæ Censoris mei, ergo mea doctrina in plurimis saltem, non potest esse desumpta ex doctrina illius; Sed ecce tibi ne possim videri quidquam palliandi causâ attulisse, breuem dictorum in Apellæa Tabula syllabum texo.

Apelles sua Tabula formam à Censore suffragari non potuit ex eiusdem dissimilitudine, & contrarietate.

20 Ego dixi; Morus Macularum Solarium apparentes esse inæquales, & adhuc nondicis causâ; sed constantissimè, & feridè idè assero, contra licet plenis castris progrediatur Censor.

Ego dixi; moras Macularum sub Sole esse diuersas; contra totis insonat buccis Censor: ego tamen adhuc idem sentio.

Censor, & Apelles sententijs dissident.

30 Ego dixi; Maculas ab ortu in occasum moueri, & idem simpliciter etiamnum, & sentio, & statuo; contra decernit Censor.

35 Ego dixi; Maculas in parallelo maximo latas, plus moræ insumere ijs, quæ in circulis minoribus feruntur, idem adhuc eodem quo dixi sensu affirmo: repugnat acerrimè Censor.

40 Ego dixi; Maculas tenebrosiores esse antiquis Lunæ maculis, & nunc quoque constanter idem pro comperto habeo; Censor velis remisque repugnat.

45 Ego dubitavi; an Maculæ Solares apparenter tantum, an verè perirent; essent ne stellæ, an quid aliud? remque hucusque indecisam reliqui: Censor illas generat, & corrumpit, & vel pabulum Solis facit, vel excrementa, vel fumum, seu nubes piceas, &c.

50 Ego motum Macularum Eclipticæ parallelum seu congruum sub dubio ad diligentiorē inquisitionem posui: Censor absque formidine oppositi, pro aris focusque turpissimè defendit.

55 Ego maculas à Sole insensibiliter sub

B 3 dubio

I.

dubio abesse dixi, donec res altius à me examinetur: Censor Soli contiguas asseruerat.

Ego globi Solaris conuersionem obiter tactam, nec approbati nec reprobauimus sed suo loco, & tempori reseruauimus: Censor id ostendere omnibus nervis contendit.

Igitur qui hasce meas assertiones, cum placitis Censoris conuenire iudicat, is mea me ab illo mutuatum esse credat. Quae pleraque si olim, iudicio Censoris, animi gratia (quod tamen à vero procul abhorret) nunc uti & semper veritatis causa ferio tueor, propono, defendo, proloquor. Solèque clarius successu operis demonstrat: patet me doctrinam meam, non à Censore, sed ex ipso Phænomeno desumpsisse.

Causa ordinaria efficiens doctrinae alicuius remota est homo; proxima homo intelligens, vsuque rationis pollens; unde oportet intellectum de re aliqua rectè discursurum, illius rei cognitione bene instructum esse: at Censor Apellis 4. Maij de hoc Solis Phænomeno adhuc nihil solidi asserere sciuit, quia totus timidus, dubius, suspensus, irresolutus, inter spem metumque ut scribit ipse de se, haesit; cum tamen ego 14. Aprilis omnem quinque epistolis comprehensam de Maculis Solaribus doctrinam iuri publico, & arbitrio Velseri subiecerim. & rursus Censor primum 14. Augusti aliquid assertiuè affirmare coeperit, cum ego 5. Iulij plura praeferim suis, addiderim meis. Ergo impossibile est, ut meam doctrinam ab illo hauserim: quia ego maiorem eius partem absolui, atque emisi 14. Aprilis anni 1612. quando ipse adhuc totus fluctuauit, & sententiae quasi nullius fuit, sed ut ait, variarum cogitationum, & diuersarum opinionum, phantasiae ipsius identidem occurrentium turbine, vicissitudine, atque conflictu agitata, ita distrahebatur, ut nunc assentiendo, nunc repugnando, atque contradicendo, nusquam certo loco consisteret, ideoque fluctuabundus, inuito licet, & satis sibi praëiudicioso trium mensium silentio obmutesceret; quod quid affirmaret miser, quid negaret, ex imperitia huius Phænomeni exploratum non haberet; tamen is solus, & vnicus esset, Angelo scilicet coelitus patefaciente, cui omnis Inuentio, & scientiae plenitudo de hisce diuinitus Soli reseruata, & communicata fuisset. Qua

Cum Censor huius Phænomeni cognitione caruerit, quando suam Tabulā proposuit Apelles, nil in eam transferre à Censore idem potuit.

I I.

ergo fronte nunc adstruit, me doctrinam meam ab ipso decerpisse, & ab ipso haustam dissimulasse, quando se nullam habuisse sponte confitetur? Ego enim 14. Aprilis quinque

epistolas Velsero transmiseram, quando ipse os aperire de hac apparentia non audebat, nedum scribere; quia nihil sciebat; & me tamen o portentum edocebat. Effectu in actu posito causam esse vel fuisse oportet. Cum igitur Censoris intelligentia eorum cognitione caruerit, quae, & quando Apelles de Maculis edidit, ab ipsa procedere non potuerunt.

15. APELLEM SVAM DE MACVLIS

Solaribus doctrinam à Censore

non hausisse, demonstratur.

tertio ex Historia Chronologica.

nologica.

C A P. V.

25. Censor dicit in suo Libripende; Et alcuni costretti, e conuinti dalle mie ragioni hanno cercato spogliarmi, di quella gloria, che era pur mia, e dissimulando d'hauer veduto gli scritti miei, tentarono dopo di me, farsi primieri Inuentori, &c. prout supra quoque visum est. Nimirum quod aliqui rationibus ipsius de hoc Phænomeno allatis conuicti, tentauerint ipsum spoliare sua primæ inuentionis gloria, ex eo videlicet quod visis ipsius scriptis multum didicerint, eaque pro suis postea adduxerint, & sic palmam illi praeferre voluerint. Hec ego in me coniecta vnà cum alijs omnino arbitror, & initio operis satis probaui: quorum tamen falsitas, & indignitas, ut euidenter emineat; ecce tibi scriptiōis historiam Chronologicam.

Ego tres meas epistolas primas absolui mense Nouemb. & Decemb. anni 1611. Censor suam primam epistolam, qua meas tres, rogatu Velseri examinavit, an examinavit? composuit & absoluit 4. Maij 1612. interfuit quasi quinque menses. Velserus meas tres epistolas publici iuris fecit, 5. Ianuarij, anno 1612. easque impressas Trutinatori misit 6. Ianuarij; hinc Censor eas quatuor mensibus versauit; donec epistolam suam primam titubanti calamo, lubricoque stylo scripsit, ut dum multa diceret, nihil tamen assereret. 55. Unde constat in tribus primis epistolis meis

Conclusio.

Apelles Censorem scriptiōe multo tempore antecurrit.

I.

I I.

meis ex ipsius scriptis haustum à me nihil esse posse; cum scripta ipsius sint primum facta super epistolas meas, & hæc sint causa seu occasio prima ipsius scriptorum, & ipse adhuc rudis circa hoc Phænomenon, & ut aiunt in puris naturalibus hæreret, à nesciente nihil potest disci. Deinde, cum Censor in prima sua epistola exactum illum obseruandi modum, quo Sol per tubum in charta excipitur obscure insinueret, huiusque Phænomeni disquisitionem atque accuratorem obseruationem Velfero, mihi que Macularum exactissimas designationes polliceretur, satis animaduerti (accedente præsertim octodecim mensium anticipata ab eoque iactata huius Phænomeni animaduersione) ipsum in messem meam falcem suam immisurum; unde Amici mei viri docti, & ante omnes Velferus in suis ad me crebris literis, etiamnum apud me extantibus, passim instabant mihi, uti prioribus epistolis reliqua adijcerem, neque permitterem mihi hanc laudem ab alio eripi. Ego quoniam 16. Ianuarij 1612. ad Velferum iam miseram fusam satis epistolam, pleraque Phænomeni huius arcana generaliora clarè & diffusè satis explicantem, in qua mihi ab istiusmodi Harpijs abunde cauebam, hisce verbis:

„Pluribus modò lubens supersedeo:
„hæc etiam arbitror utcumque satisfactura Lectori intelligenti. Nam cum duplex æmulorum sit genus, alterum eorum, qui cum non possint ipsi præclarè quidquam præstare, præclara quæque quomodocunque carpunt: illorum alterum, qui cum possint, sed non fecerint, mox ut alios insigne quid tentasse animaduertunt, aduolant ipsi, & inuolant, ut aliena rapiant: utrosque ab opere nostro arceo hac epistola. Primi enim priora non arguent, si hoc supplemento, pleraque perfecta cernent; potestremi non hæc sibi arrogabunt, si pleraque dicenda dicta, & pleraque obijcienda soluta spectabunt. Vnde cum Phænomenon hoc, multò maius, quàm quispiam facile suspicetur, quemadmodum progressu ipso intelliges, & iam nisi fallor mente sagacissima perspicis, sit futurum: cuique (iudicio meo & pace tamen aliorum) par ostensum sit nullum, neque fortassis etiam ostendendum: maturavi has ad te literas, longo

1 „iam tempore codas, præsertim quoad
„priora, ut eas uti priores cedro illinas,
„& hanc qualemqualem Germania no-
5 „stra, tuæque Augusta gloriam serues illi-
„batam. Quod tum fieri confido posse,
„si editio diutius nequaquam differatur.
„Patia aut maiora his propediem à me
„habebis. Hæc quanta sint, & quò ten-
10 „dant vnà mecum animaduertis, unde
„timeo nisi anteuertas, è manibus ea.
„nostris pæne extortum iri: viso enim
„tanto huiusce rei exitu Mathematici,
„non erit ut se contineant. Continebunt
15 „autem, si tanto à nobis relictos inter-
„uallo semet perpenderit: & sic vel sua
„& propria proment, vel certè aliena.
„non arrogabunt. Quod prohibere pe-
„nes te est totum. Hæc ibidem. Ego
20 „igitur, ut dixi, cum hæc satis apertè pro
„cautela ad arcendas alienas manus præ-
„struxissem, non persuadebam mihi fatu-
„rum, ut vllus tam detrita frontis esset, qui
„meas curas tanto interuallo aliorum ante-
25 „gressas, suis subsecuturis speculationibus
„auderet postponere; multò minus inde de-
„riuatas astruere. Quia tamen importuni-
„tati Amicorum satis esse faciendum, secu-
„ritati consulendum, temporique seruien-
30 „dum, etiam Velfero suafere est visum, a-
„dieci adhuc obseruationes à 16. Martij ad
4. & 7. Aprilis anni 1612. comprehensas,
„vnà cum notationibus meis, easque ad
eundem Velferum misi 25. Iulij, cum bene
35 „potuissem expedire mense Iunio vel Maio,
„aut ipso etiam Aprili. At cum ijs temporibus
„huius Phænomeni nouitas ubiq; Gen-
„tium & terrarum ferueret, volui studio etiā
„alijs spatium dare aliquid ex illis priori-
40 „bus mensibus proferendi; unde & lacunam
„illam ab 11. Ianuar. ad 16. Martij in ho-
„diernum vsque diem reliqui, ut vel Cen-
„sori Apellis, vel cuicumque alteri rerum
„istarum studioso locum & spatium relin-
45 „querem illius explendi, quo toti mundo
„palam faceret, probabili saltem argumen-
„to, se pariter huius Phænomeni, eiusque
„inventionis aliquatenus participem esse,
„neque egomet mihi soli applauderem. Cum
50 „autem nullus hucusque illud præstiterit,
„relinquo cuilibet æquo rerum æstimatori,
„mihine, an elucubrationum mearum car-
„ptoribus atque raptoribus velit addicere
„primæ inventionis lauream, quam tamen
55 „tanti non facio, quanti veritatem, cuius
„gratia hæc disputo.

Etenim

Apelles bor-
tatu Velferi
suam Tabu-
lam auxit,
ne Censor
falcem suam
in alienam
messem mit-
teret.

Lacuna A-
pelleæ expe-
ctant Censo-
rinam sol-
lertiam.

I.

*Apellis po-
strema eu-
ra, antecesserunt Censoris epistolam secundam, & tertiam.*

Obiectioni inani satisfi.

Etenim cum ut dixi 16. Ianuarij, 14. Aprilis, & 25. Iulij posteriores meas epistolas Velfero misissem; absoluit suam secundam Censor meus 14. Augusti. atque ex hoc capite, ab illa ego decerpere, & meis inferere nihil potui: neque enim tam Lynceus ego sum ut vel 16. Ianuarij, vel 25. Iulij legerem scriptum, quod in rerum natura non fuit, sed primum postea 14. Augusti lucem aspexit. tantam mentis aciem non habeo, ut Deo similis quæ non sunt, tanquam sint mihi præsentia sistam.

At dicet aliquis, me potuisse multa colligere ex auditu: nam licet Censor Apellis suas secundas literas primum absoluerit 14. Augusti, fieri tamen potuisse, ut diu ante ipsum Apellem suos in illa explicatos conceptus secum volutauerit, qui ad aures Apellis appellere potuerint, unde ipse suæ imaginis depingendæ idæam fortuitis adumbrandam coloribus hauserit. Ad hæc dico Primo, Me ex Lectore nunc Auditorem fieri. Censor dixit sua scripta lectitata, & tamen dissimulata, non audita, non cogitata esse &c. Secundo, Istas obiectiones esse maleuolorum conficta somnia: Vnde enim, aut quo indicio norunt ad me delatas Censoris circa hanc materiam sententias? Tertio, licet supponeretur, quod tamen neque factum est, neque fieri potuit, me ipsius conceptus audiuisse, scripta vidisse, nunquid inde statuent ex ijs me meam traxisse doctrinam? Multo potiori ratione inferre potuissent, & ipsum Censorem suam de Maculis sententiam hausisse è Tabula mea, quam spatiosius semestri secum habuit, ante historiam suam. Inutilis atque inanis est argutia à posse ad esse. Quarto, At Censoris scripta ante confectam meam Tabulam neque legi, neque cogitata, vnquam ex vlllo intellexi: neque mirum. nam neutra in rerum natura fuerant, cum ego picturam, eiusque explicationem orbis totius arbitrio subieci. Quod ut aperte videas, Quinto, Ego 16. Ianuarij quinque epistolis omnem de Maculis meam sententiam exposueram; nam quæ literis 25. Iulij consignavi, præter confirmatum Phænomeni huius, & prius assertorum stabilimentum, nihil afferebant: Trutinator autem 16. Ianuarij adhuc altissimis tenebris circa hoc Phænomenon immersus palpitabat; eò quod etiam 4. Maij necdum aliquid auderet effutire, (prout ipsomet teste, luculentissime in prio-

II.

ribus est demonstratum) circa quod tempus tamen ei oborta aliqua rationis alienæ scintilla, spem lucis attulit, eò quod natus esset discipulum suum, in arte obseruandi magistrum, à quo & ipse doceretur veritatem, & Angelus in vaticinando vanitatem dedisceret. Hucusque ergo reconditas ipsius de Maculis cogitationes auditu, abstrusas elucubrationes visu percipere non potui; quia nullæ fuerunt. Meos ergo discursus, iam pridem euulgatos, ex illo nullo modo sumpsi. Sexto, Et licet 14. Augusti suam alteram epistolam confecerit Censor, nihilominus tamen Velferus imprimi curauit, & ad eundem ablegauit accuratorem meam Disquisitionem, 28. Septembris 1612. antequam nancisceretur dictam Censoris epistolam, quam ut ex epistola quarta Velferi patet, accepit primum 5. Octobris 1612. Et postmodum Apelles ab illo. Si igitur ego Censorem in obseruationibus Macularum Solarium circulo Solis includendis, si in earundem digestionem, ordinationem, examine, loco, motu, natura, seu inquirendis, seu patefaciendis, atque in publicum edendis antecessi; si ego hæc omnia nullo ductore, nullo doctore præstiti; si dum ego hæc peregi, circa hæc omnia Censor perplexus, suspensus, atque irresolutus fuit; si obseruationes circulo Solari conclusas non fecit, facere non potuit: quomodo obsecro, ego ab illo didici, quod ipse nesciuit? ad 4. enim Maij anni 1612. obseruationem Solaris circulo inclusam nullam se habuisse testatus est. Ergo illo tempore, ex proprijs obseruationibus euidenter asstruere non potuit, Maculas prope margines tardius, ad medium celerius ferri: Macularum ad se situm dicere non potuit: Maculas circulari motu Solem ambire, prodere non potuit: Motus illarum diurnos inter sese conferre non potuit: non potuit inquam ex suo hæc solidè, sufficienter, & mathematicè ostendere; quia sine obseruationibus circulo inclusis, hæc euinci nequeunt: potuit tamen ex meo, certè discendi occasionem habuit, quando quadrimestri integro tabulam meam domi suæ versauit, & intestinum contrariarum cogitationum bellum circa assensum vel dissensum tolerauit, quoad vsq. edoctus à discipulo, non diuino adiutus priuilegio, sibi vni scilicet concesso, accommodas ad rem animaduersiones istius Phænomeni applicare

Quod in rerum natura non est, nec audiri, neq; videri potest.

Quādoquidē Censor anno 1612. ad diē 4. Maij, conclusiones Apellæ à suis obseruationibus asstruere non potuit; neque Apelles easdem ab illo met sublegere valuit.

I.

care coepit, & tum primum ego si Deo placet obseruationes meas, doctrinam meam, & depictam tabulam, spectatum iam dudum expositam, ab ipso didici, ipsi abstuli, & me illi prapofui. O factum lepidum, artificium admirandum! ego edita mea anno 1612. sumpsi ex illius editis anno 1613.

Auditum admissi risum teneatis Amici.

APELLEM SVAM DE MACVLIS

Solaribus doctrinam à Censore non hausisse, Demonstratur quarto, ex auctoritate Testium omni exceptione maiorum.

CAP. VI.

DVM Censor innuit me sua scripta ante vidisse, quàm meaderem, & hanc fraudem in meum commodum exercitam celasse, non tantum veritatis, sed & humanitatis iura vehementer infringit; nam & amicorum omnium optimè de sese meritum, quo viuentem hæc promere debuisset, teterrima infamiae nota inurit, dum grauiissimum atque candidissimum Virum, Marcum Velsrum, ante multos annos fati functum, tam celebris Reipublice Moderatorem sapientissimum, insignis vanitatis, atque pudendae leuitatis sciens & volens accersit. Nam id quod Censor de suis à me lectis, & dissimulatis scriptis, seu conceptibus affirmat, è diametro Velsrus negat. alterutrum ergo necesse est falsitatis redargui. Cum autem Velsrus id perscripserit ad ipsummet Censorem, adhuc superstes, neque Censor vnquam refutauerit, oportet omnino rem ita sese habuisse; alias enim facilem sui nominis iacturam imminentem aduertisset; si Censorem viuum contra sese testem tam imprudenter in causa eidem si non noxia, parum certè fauorabili aut proficua, irritasset. Sed quid prodest quæsitis hinc inde coniecturis fidem facere Velsro, cum eiusdem sententiae sua manu apertissime subscripserit contra semetipsum Censor? audiamus utrumque. Marcus Velsrus epistola sua quarta ad Censorem Apellis anno 1612. 5. Octob. directæ, sic habet in principio.

„ Comparue finalmente la seconda lettera di V. S. di 14. d'Agosto, mandata mi dal Sig. Sagredo. Et circa medium.

II.

1 „ Desiderarei grandemente, che Apelle
2 „ hauesse visto questa scrittura, prima
3 „ che stampare gli suoi vltimi discorsi; &
4 „ pure considero, che per qualche rispet-
5 „ to è forse meglio à questo modo.
6 „ Comparuerunt, inquit, tandem secunda V. D. literæ 14. Augusti datæ,
7 „ ad me missæ à Domino Sagredo. Et sub
8 „ medium. Percuperem supra modum,
9 „ vt Apelles istam scripturam conspexisset, antequam suos vltimos discursus
10 „ typis mandasset; omnibus tamen consideratis, melius est forsitan ob certas
11 „ quasdam rationes, rem ita se habere. &
12 „ addit. Io non mancherò di communi-
13 „ cargliela, faziato che me n'habbia prima vn poco. Ego, inquit, non omit-
14 „ tam illi hanc epistolam communicare, sedata tamen prius aliquantulum fame
15 „ mea. Vbi sequentia notanda sunt.

20 „ Primo, Ex Velsri testimonio certum esse, Meam circa Maculas Solares curam posteriorem, in vulgus emanasse, antequam Velsrus secundam Censoris epistolam Italicam acciperet.

25 „ Secundo ex eodem testimonio constare, me eandem Censoris epistolam non vidisse. alias frustra eius contrarium optaret, & splendide sanè mentiretur Velsrus.

30 „ Tertio, Ob certas tamen causas suum desiderium moderatum esse Velsrum, atque iudicasse, præstare mea in publicum exiuisse, inuisis Censoris epistolæ secundæ scriptis, quàm vt post accepta, conspecta, & lecta, primum publicassem mea. Et licet prudens Lector facile rationes illas Velsri percipere queat, tamen vt ab
35 „ omni dubio illum liberem, dicam quas ipse Velsrus ad me priuatim perscripsit, videlicet ne Censor, aut quisquam alius
40 „ ansam suspicandi, atque proclamandi arriperet, me doctrinam meam ex ipsius scriptis didicisse, rapuisse, edidisse. rectè
45 „ iudicauit Velsrus, quia Censor nihilominus fecit Velsro mortuo, quod forsitan ausurus non fuisset viuo.

50 „ Quarto, Se mihi missurum idem scriptum &c. Ergo, teste ipso, antè non habui.

55 „ Quinto, Deinde subiungit peculiarem mihi positam difficultatem, ex eo quod stylo Italico omnia Censoris scripta ad me perueniant &c. è qua circumstantia noua exoritur Censori difficultas, sua mendacia vero similitudinis aliquo colore ve-

Notanda ex testimonio M. Velsri.

Præfagiu Velsri futuram in Apellem Censoris calumniam.

Censor in Marcum Velsrum iam pridem fati functum iniurius.

M. Velsri pro Apelle contra Censorem testimonium.

I.

Censoris contra seipsum pro Apelle testimonium.

stendi. Quis enim mihi sua Italica scripta extra Velsrum dedit? quis dare potuit? Quis ex Italo in sermonem Latinum transtulit? quo tempore? quo loco? qua ratione? dic fodes; comminiscere aliquid; laulutum luto, & antiquas criminationes dilue nouis. non euades, stat contra te Velsri testimonium, stat tuum ipsius. Audiamus temetipsum. Anno Domini 1612. 1.

Decembris, Censor in Historia sua de Maculis Solaribus epistola ad Velsrum tertia pag. 103. sic ait. Quanto ad Apelle, à me ancora dispiace che e non habbia veduta la mia seconda lettera, auanti la publicatione della sua più accurata disquisizione, e che la mia ambiguità, & pigritia nello scriuere, non habbia potuto tener dietro alla sua resolutione, e prontezza; ben'è vero che buona causa della dilazione n'è stato l'esser trattenu- te le mie lettere più d'un mese in Venezia dalla troppa stima, che di esse fece l'Illustrissimo Sig. Gio. Francesco Sagredo, volendo che ne restasse copia in quella Città.

Quantum ad Apellem attinet (inquit Censor) mihi pariter displicet, quod meas secundas literas antè non viderit, quam suam accuratiorem disquisitionem in publicum emitteret, & quod mea hæsitatio, atq; in scribendo tarditas, non valuerit retinere eius resolutionem, nem, atq. promptitudinem: cum nihilo minus iusta moræ huiusce intercesserit causa, quod litteræ meæ ex nimia aestimatione, quam illis conciliauit Illustrissimus Dominus Ioannes Franciscus Sagredus, plus quam integrum mensem Venetijs fuerint ad describendum detentæ, cum sola ipsius illarum lectione satis honoratus fuisset, quæ ob figurarum multitudinem satis temporis requirebat &c.

Vbi patet Censorem cum Velsro idem sentire, quod secundam ipsius epistolam ante editionem mearum posteriorum litterarum, nec viderim, neque videre potuerim, quod ipsius scriptum hæsisset mense Septembri Venetijs, cum mea à me euolassent omnia 25. Iulij. Contra hunc, opinor, testem, Censor non excipiet, quia maiorem quem pluris ipse faciat, amet, honoret, cui plus confidat, deferat, credat in toto terrarum Orbe non habet. Quæ deinde de lingua Italica subnectit,

Censor contra se Testis omni exceptione maior.

II.

rursus solidissime confirmant, me eo tempore Censoris scriptum Latinum, nec habuisse, nec habere potuisse. Sed ut in ore trium stet omne verbum, en testem tertium, eumque Academicum Lynceum secretorum Censoris omnium conscium, Angelum de Filijs: qui in sua ad Lectorem præfatione, tametsi Inuentionis primas Censori transcribat, tanquam diuino decreto debitas, secundas tamen mihi obtinere potuisse non denegat; & vulgando obtigisse omnino affirmat hisce verbis, etiam supra citatis, In historica Macularum Solarium præfatione ad Lectorem fol. 3.

A quelli poi, che pretendessero anteriorità nelle offeruazioni di tali Macchie, non si nega, il poter loro hauerle offeruate, senza auviso precedente del Signor N. com'è anco manifesto, hauerlo essi preuenuto, nel farle publiche con le stampe &c. Id est, illis porro, qui in Macularum obseruationibus prioritatem prætendunt, non negatur illos potuisse illas obseruasse absq; præuio Auditoris N. indicio, quemadmodum & hoc in confesso est, eum ab ipsis in publica illarum impressione præuentum, &c. Hæc Angelus Lynceus, conscio sine dubio & approbante Censore, è quibus habeo, Primo Me absque eo quod de Censore quidquā scirè, potuisse obseruare Maculas Solares, quod verum non est, si è scriptis Censorinis prius lectis mea de Maculis dogmata deduxi; nam si factum infectum fieri nequit, impossibile est, ut lecta scripta Censoris potuerim non legisse, quod tamen necessarium esset, si mea expediuissem absque præuio vilo indicio ad me è scriptis Censorinis deducto. Secundo Me meæ edidisse typo ante Censorem. Quibus etiam consonat ipse Censor epistola prima fol. 10. ad finem hisce verbis:

Aggiagnesi, che io mi contento più presto di esser l'ultimo à produrre qualche concetto vero, che preuenir gli altri, per douer poi disdirmi nelle cose con maggior fretta, e con minor considerazione proferite. Accedit inquit, quod ego malo vltimus conceptum aliquem, si verum producere, quam præuenire alios, & res cum maiore festinatione, at minore consideratione prolatas postea reuocare. E qua confessione hoc habeo.

Primo Censorem 4. Maij hæc scribentem,

Angeli pro Apelle contra Censorem testimonium

Corollaria ex Angeli testimonio deducta.

Confirmantur dicta ex Censore.

I.

Corollaria dicitur Censoris loco. tem, adhuc non statuisse quid sibi de hoc Phænomeno dicendum esset, & consequenter certa earum cognitione caruisse.

Censor prioris palmæ cecidit Apelli. Secundo Mihi prioritatis palmam haud iniurum concessisse dum ait, malle se cum veritate vltimum, quam cum errore prodire primum.

Tertio, Denique contentum se fuisse, dummodo veritate instructus sequeretur.

„ Dum verò in eadem epistola, Ma la „ difficoltà della materia, e'l non hauere „ io potuto far molte offeruazioni continueate &c. se materiae difficultate multas continuatas obseruationes facere potuisse, atque epistola tertia, circulo Solis inclusas se fecisse negat; absque controuersia me quoque in obseruationibus ad hoc Phænomenon dijudicandum necessario præ requisitis priorem, sese autem posteriorem facit. Nam quo tempore, quarto videlicet Maij ipse hæc scripsit, atque egit, meas obseruationes, atque ex ijs deductas consequentias, ego pridem absolueram, Marco Vellero miseram, & ab hoc acceptas Censor ex magna parte per quatuor ferè menses, oculis, atque manibus triuerat.

Stat igitur etiam hoc Angeli, atque Censoris contra Censorem testimonium. Quæ omnia ex eo quoque confirmantur, quod ego immediatum cum Censore commercium, tametsi id tribus ad ipsum missis epistolis frustra quæsitum, nunquam habui, Sed per Solum Vellum quæcunque ab illo ad me peruenerunt.

Scribit autem Vellus epistola sua tertia. 28. Septembris 1612. ad Censorem. „ in hunc modum. Intendo, che V.S. hà „ scritto vna seconda copiosa lettera sopra questa materia diretta à me, quale „ non mi è ancora venuta vista, ma la stò „ aspettando con singolar desiderio. Intelligo, inquit, V.D. confecisse alteram „ copiosam epistolam super hac materia „ ad me directam, quæ mihi neque dum „ est visa, expecto tamen illam cum singulari desiderio. Cum ergo Vellus meas posteriores Disquisitiones typo mandatas cum hac eadem epistola Censori miserit, ipsius verò secundas litteras nequidum acceperit, aut viderit (hæserunt enim Venetijs) igitur neque ego illas potui vidisse, neque mea inde composuisse. cum illarum rerum ad me nihil peruenerit nisi opera atque manu Velli.

II.

1 Quæ cum ita sint, in propatulo est, me pro mea exornanda Tabula alienis Censoris coloribus, qui tum in rerum natura nulli erant, nec vsum esse, nec vti potuisse; idque testimonio quoque irrefragabili trium modò citatorum testium: quorum auctoritas apud Censorem certè est maxima, dignitas summa, fides indubitata, doctrina selecta: Philosophi sunt omnes, statu præcellsi, dignitate conspicui, genere clari, vno verbo Lyncei Lynceorum principes omnes. Angelus est, Vellus est, Censor est, contra quos neque Hercules sese moueat. Aduersus quos si Censor pugnat, næ ipse cum viuis & mortuis, atque secum ipse bellat: dispiciat ergo qua ratione tam secum ipse quam cum tot, & tantis aduersarijs in gratiam redeat. Nam meum nomen & Tabulam iniurijs lacessitam parum est, veritas patefacta satis ambo facta tecta custodiet; at quod vnica criminatione simul viuorum atque mortuorum fidem in discrimen adducit, Viròque integerrimo famæ notam inurit indelebilem, iura amicitiae obliuiscitur, agnitam veritatem, & seipsum sciens oppugnat, charitatem Christianam violat, dum me planè infontem conficto infamis furti crimine onerat; hoc demum est humanitatis quasi sensum exuere.

APELLEM PRIMAM INVENTIONIS gloriam Censori auferre non contendisse.

CAP. VII.

40 **O** Stendi hucusque meam innocentiam, demonstraui manus, loculos, oculos, officinam meam totam alienis mercibus vacuum, instrumenta, colores, artem pingendi, imagines pictas, Tabulam denique meam, & doctrinam meam esse meam, nihil mutuum inibi, nihil furto sublatum, nihil fucatum, nihil Censorinum reperiri. Planum feci id historia, ratione, testimonio, ipsoque Censore, quid ergo tandem est quod ego Censori inuasi, quod auferre contendis? Prima, inquit, Inventionis gloria. Et alcu- 50 „ ni, inquit, cōstretti e conuinti dalle mie „ ragioni, hanno cercato spogliarmi, di „ quella gloria, ch'era pur mia, e diffi- „ mulando d'hauer veduto gli scritti miei, 55 „ tentarono dopo di me farsi primieri In- uen-

Testiū prædictorū auctoritas inuiolabilis.

Censor deditur litterarum cum Apelle sibi bene noto, commercium.

Aliud Martij Velli pro Apelle contra Censorem testimonium.

I.

uentori. Et aliqui, inquit, constricti, & conuicti à meis rationibus, conati sunt me spoliare illa gloria, quæ tamen erat mea; & dissimulando se vidisse mea scripta, tentarunt post me facere sese primos Inuentores &c. Dic, amabo, dic sodes, quinam sunt illi aliqui constricti, & conuicti rationibus tuis? quænam illæ rationes? quando, vbi, quibus, quomodo, de qua re propositæ? verbone, an scripto? per te, an per alios? Qua ratione constricti? quibus argumentis conuicti? vnde & quomodo nosti illos esse à te constrictos, & conuictos? quinam tandem illi sunt? nam verosimiliter figmenta, & somnia tua tu narras, vt dum cum laruis tuis in umbris digladiaris, Lectori fucum facias. Qui porro sunt illi, qui te gloria tua solius exuere moliti sunt? quænam illa gloria, & quomodo solius? Quando, vbi, quomodo te priuare voluerunt tua gloria? quænam illa tua gloria? nam de ea illi nihil penitus sciuerunt: quomodo ergo spoliare voluerunt? non sequitur conatus voluntatis, nisi prænotionem mentis, vbi igitur nulla vlli de tua tanta gloria scientia affulsit, neque priuandi desiderium nasci potuit. aut doce gloriæ tuæ apud illos cognitionem, & ostende spoliationis intentionem atque conatum, aut resorbe iniuriam, fatere fucum. sed iniussu meo, agente te, præter mentem tuam, Veritate id facis, dum ais: [ch'era pur mia.] gloria enim illa tua, tua tantum erat, alij de ea nec habebant, nec sciebant quidquam, tu solus tibi applaudebas, & intra adyta pectoris tui spontaneas: & gloriosas tibi metipsum pulsabas chordas, suauissimam resonantes tibi soli domi tuæ harmoniam. hæc erat gloria tua solius. sin aliter, ostende sis, quisnam illorum quos tu arguis quidquam de illa nouerit, quibus acquisita sit agonibus, quibus parta prælijs, decantata triumphis, inscripta arcubus, decorata signis, expressa trophæis? altum certe vbi que silentium. Tua fuit, Tua est, Tua erit solius hæc gloria, de illa præter te sciuit nemo, neque rapuit quisquam: & si ego tibi præripui veram, non eripui Tuam, quæ nulla est, quæ falsa est, relinquo tua tibi acroamata. Ecquænam, amabo te, sunt illa tua scripta, & quibus tandem visa, lecta, intellecta? fucum facis ò Censor, & persuadere vis imperito & indocto vulgo, tua commenta aliorum manibus esse trita,

Gloria Censoris, fucata umbratilis, inanis, nulla.

II.

oculis vsurpata, priusquam à cerebro tuo fuere prognata. Age sis scripta tua omnia de Materia hac, nonne complexus es in historia tua? & hæc te ipso teste nonne concinnata est ad instantiam Velseri, vt audiret iudicium tuum super Tabulam meam? Composuistine historiam ante rem gestam? scripsuistine quidquam de Maculis Solaribus ante Tabulam meam ad te missam? ante sententiam ex te à Velsero de ea requisitam? Nihil scripsisti Trutinator, nihil penitus. Nam cum teste Angelo pag. 2. in Præfatione vniuersæ Lynceorum Academia expectaret tuum circa Maculas iudicium, intellexit tandem hanc à te materiam literis quibusdam ad Velsorum priuatim conscriptis, plenariè esse pertractatam. Id quod tunc in tuis ad Velsorum literis vltro fateris. Hò anco taciuto, sù la speranza di potere dar qualche satisfazione alla domanda di V.S. intorno alle Macchie Solari. Tacui inquis hoc quoque nomine, quod sperarem tuæ petitioni circa Maculas Solarum res aliquatenus satisfacere. Et in epistola tertia. pag. 102. Il debito del ringraziare resta in me con molti altri oblighi, che tengo à V.S. Illustri. perche se hauerò inuestigato qualche proposizion vera, farà stato frutto de i comandamenti suoi; e i miei desimi diranno mia scusa, quando non mi succeda il conseguir l'intero d'impresa nuoua, e tanto difficile. Debitum gratias agendi mihi incumbit, cum multis obligationibus, quibus erga V. Illustris. Dominationem obstrictus sum: quia si aliquam veram propositionem inuestigauero, erit ea fructus iussionum suarum, quibus etiam me excusabo, si conatibus meis in re tam noua, & difficili euentus non vsquequaque respondunt. Quia mihi, inquis epistola prima pag. 10. conuenit esse cautum, & nouas res, atque conceptus necessariò abscondere atque tacere, donec demonstrationes plusquam certas, & palpabiles habeam propter infinitos contradictores &c. At euident est ante hanc Velseri instigationem, te certam, & palpabilem de Maculis Solaribus demonstrationem nullam habuisse; imo, nec propositionem veram, multò magis scripto nullo te simile quid complexum esse. Igitur falsum dicis, dum ais aliquos tua legisse, & tuis lectis dissimula-

Sine Marco Velsero fuisset Censor de Solaribus Phenomena nil; litteris nil cōsignasset.

Censor suam de Maculis Historiam Velsero acceptam refert.

I.

mulatis se fecisse primos Inuentores: tales enim nulli sunt, neque cum veritate aut aliqua probabilitate, nominari possunt vlli. Ego solus aliquorum nomine, quos tibi de primatu comperitores inaniter fingis, à te denotor; quia primæ omnium scripturæ quæ lucem circa hanc materiã aspexerunt, fuerunt teste Angelo Tabula Apellis; quo tamen tempore, tui conceptus, tui partus in rerum natura nondum erant. Reliquorum nulli qui de hoc Phænomeno aliquid ediderunt, & qui tua legerunt, vel facto, vel verbo primos se fecisse videri possunt Inuentores. Neque qui tua viderūt, conspecta dissimulant, sed fatentur, & sæpe contradicunt. At Romæ & Florentiæ de Maculis priuatim cū multis cōtulisti, multis ostēdisti. Videbimus paulo post distinctius quid ostēderis, & iā ex tuis citatis cōstat quid conferre potueris omni philosophadi solidè & astronomicè de hoc Phænomeno præsidio destitutus. Interim loqui de Maculis non est scribere, videre Maculas non est proferre tua scripta, quæ neq; cogitata quidē tūc, nedum cōposita fuerāt: inuēta siquidē tua circa hanc nouam & difficilem materiã instantiæ Velserrinæ accepta refers, lapsus secuturos eadem defensurus. Quæ poterant esse illa scripta de quibus nec Velserus, neq; Lyncei quidquam intellexissent? cum quibus tamen tu reliquas nouitates protinus cōmunicares, vt testes inuentionis primæ haberes? quis credat te illa non producturum fuisse, petenti Velsero, instatibus Lincais? imo quis credat producturū fuisse, quod conceptum non esset, sed vt fructus iussionū Velseri tibi meā Tabulā proponētis expectaretur? Neq. tui p̄se, nec Angelus de Filijs tuis, in tua causā, scripta vlla quæ meā Tabulam præcessissent in Historia Macularum edita fingere ausi estis. sed primatū in Macularū inuentione ex ostensione, nescio qua, ipsarum in Sole Macularū in Horto Quirinali certis testibus oculatis facta, & multis ante mensibus in nominatis quibusdam Florentiæ eodem exhibita modo emēdicastis; siquidē quod Angelus absolutè in Præfatione testatur, se Florentiæ priuatā huius Phænomeni notitiā aliquibus dedisse, tu ipse epistola tua prima ad ocularē in Sole Macularū inspectionē restringis, dum ais [Hauendole tatte vedere à diuersi miei intrinseci] Nihil ergo de Maculis scripsisti, quàm id quod

II.

1 Velsero tribus epistolis in Historia cōsarcinasti; nihil ergo Apelles de scriptis tuis vidit, nihil legit, quod in Tabulam referret suam. Quia historia tua, sentētia tua
5 postea primum est cusa, quàm confecta, fuit Tabula mea: vnde non hæc ab illa, sed illa ab hac originem traxit. Censura faciēda, supponit rem censendam esse factam: ergo res censa confici non potuit ex censura. Conceptus tui, scripta tua, sunt Censura tua de Tabula mea, neque ergo hæc ex illa confici potuit, neque illa ante hæc
10 existere. Ex nihilo enim nihil fit, & de eo, quod non est tanquam de præexistente, iudicium sana mente, dari nequit. Impossibile ergo est, vt ego meā Tabulam ex tuis scriptis cōcinnarim, vel tu scripta tua ante Tabulam meā exararis. Vnde gloria tua, quàm ex Maculis Solaribus ante Tabulā meam visam habuisti, fumus est, somniū est, vanitas est, figmentum est. & hanc tibi si ita vis, solus habeas per me licet. Quod autem pergis, illos aliquos, dissimulatis lectis tuis, se fecisse primos Inuentores huiusce Phænomeni: aut loqueris de me, & extra veritatis lineam procul abis; quia quando ego mea proposui Tua scripta necdum concepta erant: aut loqueris de alijs harum rerum tractatoribus, & rursus apertè comminisceris; quia illi se Tua legisse non dissimulant si legerunt, & sese primos Inuentores non faciūt. Primi Macularum Inuentores Tua de illis scripta legere non potuerunt, quia non erant:
35 qui legerunt, primos sese Inuentores non faciunt; vtrumque tu asseris; eademque opera, & veritatem, & iustitiam lædis, & immerentes calumnijs oneras.
Et hæc est illa tua solius gloria, quā tute tibi ex his collegisti. Nisi fortasse malis illam, quā Angelus, nescio vnde missus cēlitus tibi decernit: dum ait (absit inuidia, verbo) *Censori hac nostra ætate soli diuinitus esse datum, vt noua Phænomena ipse solus & primus inueniat, solus & primus detegat.* reliquis pone & à longinquo subsequi vix concessū. Hinc ipse Macularū Solariū ab Orbe cōdito reconditarū mirabile spectaculū primus lustrauit, primus alijs monstrauit. Hæc gloria ipsius solius est. Ain' verò, & fidem à me exigis? Habeo Censori de visis & inuentis Maculis, si Censor de stellis Iouialibus habebit Simoni Mario. At Censor oculatos producit testes.
55 Esto fides penes auctorem; sit ostensum,

Censor ex sola Macularum inspectione, atq; ostensione oculari, non scriptis earū obseruationibus, in primatum irrepit.

Censor immerentes calumniatur.

Solus Apelles à Censore taxatur.

In præf. p. 3. circa med.

Si Censor ante Apellem quidquam de hoc Phænomeno alicuius momenti no- uisset, id Lynceus non latuisset.

Censor primam Inuentionis gloriam testibus obscuris & incertis sibi arrogat.

I.

*Censoris
Macularum
ostensio, su-
specta osten-
tatio.*

*Si aliquid
certi visum,
cur ita cespit
Censor?*

*Prima In-
ventionis
gloria non
debetur vel
dubio, vel
stupido oculi
aspectui: me-
tis intuitus
accedat oportet.*

sed vel non creditum, vel omnino non visum; neque enim annuum silentium tantam rem praestisset, si ipsius animadversio vera intercessisset, & aliquod momentum in oculis atque animis spectatorum posuisset. Nunc post meam expositam Tabulam statim totus orbis ad novae rei miraculum accurrit, vidit, spectavit, probavit? & hoc non annuo, sed paucorum mensium intervallo? Quia ergo Trutinator ipsemet adhuc quarto post meam acceptam Tabulam mense, totus circa hoc Phaenomenon fluctuat, & tenebras suas epistola prima passim deplorat; evidens indicium est, tam ipsum, quam alios ipsius amicos praeterlapso mensium octodecim tempore, & multo etiam ante de hoc eruendo Phaenomeno non multum sollicitos fuisse, vel certe ob irritos conatus desperavisse; alias enim si illud verè perspexissent, & pro vero Phaenomeno habuissent, utique modum eius tractandi inuenissent; cum mea prostante Tabula tam cito Solem per Tubum intrare coegerint. Probabile ergo admodum fit, aut nullo modo visum, aut pro ludibrio atque fallacia habitum, tam à Libripende ipso, quam alijs omnibus, eò quod observationum exempla ad persuadendum idonea nulla extent. Adde quod si Libripens, solum Macularum quaesitum vel ambiguum intuitum primae inventionis praerogativam mereri existimat, Keplerus hanc coronam illi praeripit, praeripiunt antiqui. quia ipse Maculam Solarem sub Sole pro Mercurio vel ipso Censore ita decernente, pridem ante vidit, viderunt antiqui. At non sufficit solus conatus, sed conatui respondeat oportet prosper quoque successus, non sufficit solius oculi aspectus, accedat oportet intuitus mentis. necesse est videre, & intelligere, & alijs demonstrare, quid videas qua tale est. Hoc ubi, & quando, & quomodo fecit Censor, ante proditam meam Tabulam? Licet neque hoc Censori ad vendicandam primae Inventionis gloriam suo ipsiusmet iudicio sufficiat, de quo mox.

APELLEM SE NON FECISSE PRIMUM Macularum solarium Inventorem post Censorem. CAP. VIII.

Quoniam Apelles hanc quaestionem nunquam mouerit, neque magni ad rem momenti esse iudicet: quia tamen Censor illam toties re-

II.

fricat tam per se, quam per suos: ita ut summa causae ab illis in eam verti videatur; ne vllum veritati à falsitate praedictum struatur: accipe sequentia.

5 Primò, Apelles in tota sua Tabula, idest tam in tribus primis, quam in tribus posteris epistolis ad M. Velsorum perscriptis, & ab eodem anno 1612. publicatis, nunquam villo verbo expresso sese primum Macularum aut Facularum Solarium Inventorem fecit vel nominavit. Testis huius rei irrefutabilis est ipsa Apellis Tabula, quae Latine satis loquitur, & legi potest à quovis. In ea ab inuidioso Inventoris multoque amplius *Primi* nomine, studio abstinui. Primò, Edoctus exemplo Christi, qui coepit facere & docere; sicut adhuc quotidie operatur, & factis magis loquitur, quam verbis.

20 Secundò, Quia in Religione tanquam Humilitatis Schola educatus didici inanes istos, & friuolos titulos iam pridem aspernari: turpe est, relictà veritate sectari umbras; quid enim plus habeo, si Inventor Macularum Solarium, & primus quidem habear dicarue? quid perdo si non habear aut ignorem, vel esse neger? Nihil mihi decedit hinc, nihil accrescit illinc: pudet, & puduit semper de hac nominum inanitate contendere: fugi hoc nomen semper, neque unquam ferè usurpavi, nisi quando necessitate subinde compulsus, veritati manum porrigendam duxi. Testes appello omnes eos, quibuscum tot annos ab inuentis Maculis versatus sum, Ingolstadij, Oeniponti, Friburgi Brisgoiae, Vienne in Austria, Pragae in Bohemia, Nissae in Silesia, & tandem hic Romae, an unquam primi Inventoris nomen mihi ambitiosè vendicare fategerim? Annos integros in conspectu Sociorum versor, quotidie cum illis sermones misceo, consuetudine familiarior, & tamen maxima ipsorum pars, quis sit vel fuerit Apelles, etiamnum ignorat. Neque unquam hac causa Apellem meum defendendum suscepissem, materiam hanc, tanquam minutam & puerilem, indignam quod iudicans, propter quam calamum in manus sumerem, & de lana caprina contenderem, nisi annis & scriptis posterioribus tam iniquè summa cum veritatis praedictio tractatus essem. Quod si qui sunt, quemadmodum sat multos esse haud ignoro, qui scriptis suis in lucem emissis,

55 Primum me huius Phaenomeni Inventorē pro-

*Apelles in
tota sua Ta-
bula, ab inui-
diosa primi
Inventoris
Nomenclatu-
ra, semper
cautus absti-
nuit.*

I.

proclamarunt, facti sui rationem sine dubio habebunt veritatis studium, me tamen neque conscio, neque procurante. Tertio, Fieri poterat ut alibi quispiam mihi suppar vel prior eadem erueret, unde temeritatis notam haud effugissem, si primi Inuentoris nomen mihi assumpsissem. prudens igitur ab hac Nomenclatura abstinui. Ingenia præcellentia reperiuntur vbique, Tubi optici nouitas atque præstantia, & quæ per ipsum coelitus passim detecta sunt arcana, multos rerum abstrusarum curiosos ad noua rimanda mirè extimularunt; unde quod ego feci successu haud infelici, poterat etiã alius facere, simili euentu: prout frequenter accidit, ut plures vel simul, vel diuerso tẽpore idẽ reperiunt. neq. enim tã magnificẽ me circũspiciam, ut hoc æuo, me illum solum diuinitus destinatũ esse opiner, aut Angeli præconio denunciẽr, qui coelestia solus speculari, Solis Regiam vnicus intrare valeã, & inde abscondita terriculis mysteria eructare: absit inquam à me tantus fastus: non solum Germanicę, etiã alijs ridet Apollo. Interim tamen hoc postea sciui pro certo hic Romæ circa Solem, illis temporibus dum in Germania Apelles suam Tabulam adornaret, multa à multis esse tentata, sed irritò conatu. Cuius rei laudare possum, si opus est testes omnino idoneos. Sicut autem ego fieri posse libenter concedo, ut duo vel plures simul in re vna inuenienda, non communicatis operis conueniant; ita mihi huius Phænomeni inuentionem, & inueniendi potestatem omnem adimi, turpemq. insuper rapinam adscribi, haud immeritò ægrè fero. Quid enim? Si Censori meo hoc coelitus priuilegiũ obtigit, ut hac nostra ætate ille solus omnis scientiæ coelestis plenitudinẽ nactus sit, ille solus abstrusa, & hætenus ignorata pandat: nonne omnis mihi alijsq. iam via ad hæc eadẽ præstanda interclusa iacet? & si quid tamen præstiti, restat ut ab illo clanculariẽ mutuatus fuerim? Hinc quarto propter inuidiosum & ambiciosum inuentoris nomen, satius esse duxi, aliquantisper post carecta latere, & Tabulam Orbis arbitrio exponere, quàm vanorum vocabulorum iactatione, me hominibus venditare: nam sicut præstat facere quàm dicere, ita melius est esse, quàm dici, aut putari; dici sequitur ad esse, non esse ad dici.

Etiã si dixissem, aut scripsissem, me

II.

Inuentorem huius apparentiæ, non tamen plus credidissent alijs, quàm quantum vidissent in opere: unde melius feci laborando ut Macularum Inuentor essem, quàm haberer nomine; vmbra sequitur præcẽtem, sequentẽ fugit, neq. subsistit sine corpore; frustra affectas nomẽ nisi præstiteris rem. Turba non dat gloriã, nisi factis, fucũ si feceris, fumũ auferes, & laudis vanus captator sãnas & cachinnos tolles. Honor verus à solo Deo est; huic ego sudaui: poeniteret me tantæ impensæ operæ, si propter ludicrum Inuentoris nomen, tanti temporis, & olei iacturam fecissem: veritas, honor Dei, & vtilitas in rem litterariam inde dimanans, tot annorum curricula huic curæ intentum me detinuerunt; pascatur aura populi, qui ventos cum Chameleonte sequitur, & nonnunquam aridam muscam captat; me solida delectant: nomina sectentur, integraque nominum plaustra à Gramaticis conquirant isti titulorum venatores; Philosophum res & veritas ditat. Hanc ego quæsiui, neque exiguam eius partem consecutum me esse confido. Inuentoris vsurpationem, præsertim primi, cautus declinaui; ideòque miror unde Censori in mentem venerit ex hoc capite Apellem tam fedẽ suggillare. Quod si quis fortassis ex epistolæ quartæ fine, quam 16. Ianuarij, anni 1612. ad Velsærum misi, aliquid simile velit elicere, vbi hæc Apelles habet. Hæc quanta sint, & quò tendant vnà mecum animaduertis, unde timeo, nisi anteuertas, è manibus ea nostris poene extortum iri: viso enim tanto huiusce rei exitu, Mathematici, non erit ut se contineant. Continebunt autem, si tanto à nobis relictos interuallo semet perpenderint: & sic vel sua & propria proment, vel certè aliena non arrogabunt: hæc Apelles. E quibus inquam, si quis forsitan effici contendat, Apellẽ sibi primatum arrogare, is à metatongissimè aberrabit, & retundetur verbis hisce: & sic vel sua & propria proment, vel certè aliena sibi non arrogabunt. vbi vides æquissimè Lector, Apellem ibidem nõ excludere labores aliorum, si qui fortassis essent, sed solummodo saluos, & incolumes sibi esse velle suos: & in hoc ipse nemini fecit iniuriã, passus autem est summam, dũ videt peculiũ suum proprium, ignominiosè ab alijs post tot

Facta fortius loquuntur, quam dicta.

Apelles in Historia Macularũ. pag. 35

Apelles sua facta, tecta, illa cupit.

I.

*Censorem
non esse In-
uentorem
Macularū
Solarium,
probatum ex
enumeratio-
ne partium
& modorum
quibus id fie-
ri potuisset.*

*Censor per
Historiam
suam delle
Macchie so-
lari, non est
Inuentor pri-
mus Macu-
larum.*

annos traduci tanquā inhonestum furtū.

Secundò, si Apelles se fecit Macula-
rum Inuentorem post Censorem, neces-
se est Censorem fuisse Inuentorem Macu-
larum ante Apellem: sed Censor non fuit
ante Apellem Macularum Inuentor. Er-
go Apelles se non fecit Macularum inuen-
torem post Censorem. Sequela Maioris
est euidens. Minor probatur. Si Censor
fuit Macularum inuentor ante Apellem,
oportet id ei contigisse vel ex productis
Maculis in tribus suis epistolis, vel ex o-
stensis Romæ in Horto Quirinali anno
1611. vel denique quòd octodecim men-
sibus ante diem 4. Maij anni 1612. ipsas
obseruauerit, & intimis quibusdam ami-
cis ostēderit, prout gloriatur Censor. Nul-
lo horum modorum primatum obtinet
Censor. Ergo non est inuentor Macula-
rum ante Apellem. Non primo modo.

Quia Apelles Censorem pręuenit rite ob-
seruata scribendo, & euulgando: vt con-
stat & passim in hoc libro euidenter pro-
batur. Non secundo. Quia Apelles Ma-
culas Solares prius vidit & obseruauit,
quàm Censor easdem Romæ in Horto
Quirinali &c. alijs exhibere, prout asse-
rit, conatus est. Contigit enim hoc men-
se Aprili, & Maij initio, vt habetur ex
ipsomet Censore in epistola prima, & An-
gelo in Præfatione ad Historiam macula-
rum. Apelles autem maculas mense Mar-
tio anni 1610. inspexit & ostendit: præ-
cedit verò Martius, Aprilem, & Maium
in Calendario Apellis, si in fastis Censo-
ris sequitur, viderit quorum Computo
vratur. De solo tertio controuersia agita-
tur. Quæ cum sit Quæstio facti, & in præ-
iudicium alterius asseratur, nisi solidissi-
mis rationum momentis comprobetur, fi-
dem difficillimam imò nullam merebitur,
& in ore asserentis omnino suffocabitur.
Recolamus parum historiam, & rerum
gestarum seriè ob oculos ponamus, vt rei
veritas euidenter cōpareat. Anno millesi-
mo sexcētesimo vndecimo mense Martio
Apelles maculas Solares conspexit; mense
Octobri & sequentibus annotauit vsque
ad 7. Aprilis; Anno verò 1612. mense Ia-
nuario & Septembri typis euulgauit. Cen-
sor easdem anno 1613. typo edidit, anno
1612. obseruatas & annotatas, à 2. Iunij
ad 8. Iulij, à 19. ad 21. Augusti, à 5. A-
prilis ad 1. Maij, ad Velsèrum misit, con-
signatas epistolis tribus: in quarum pri-

II.

ma die 4. Maij pag. 11. paullo ante me-
dium ait: Et io le hò offeruate da 18.
mesi in quà, hauendole fatte vedere à
diuersi miei intrinseci. Et ego illas,
(Maculas) obseruauit, ab octodecim
mensibus, vsque huc, & in caussa fui vt
diuersi mei Amici easdē viderent. Hæc
de se Censor scribit post Apellem, hæc
de suis, & omnibus inde persuasum vult,
se Maculas ante Apellem conspexisse, i-
deoque primum macularum Inuentorem
esse. An autem, & quid, & quantum hoc
argumentum ex ipsius quoque Censoris
mente valeat, nunc accuratius est expen-
dendum.

Censor anno Domini 1610. die 7. Ia-
nuarij stilo nouo, primum & primus, vt
contendit inuenit sidera Iouialia, eorum-
que exinde obseruationes, atque annota-
tiones à dicta die, vsque ad 2. Martij anni
eiusdem continuatas in Nuncio Siderio
produxit. Eadem sidera à se adinuenta &
obseruata anno 1609. scribit Simon Ma-
rius in suo Mundo Iouiali edito anno
1614. quæ, vt ait, obseruare cœpit men-
se Nouembri anno 1609. & continuauit
Decēbri, cuius tandem die 29. stilo veteri
primā annotationē fecit, & produxit vsq.
ad annum 1614. Testemq. sui facti & in-
uentionis primæ adducit, Virum Nobile
& strenuum, Ioannem Baptistam Lencciū,
à quo in hunc vsum Tubo præstante do-
natus est. Sed audiamus si placet ipsum
Mariū nonnihil. Hæc vitra tubo ligneo
coaptata fuerunt, & à prius nominato
Nobilissimo maximeq. strenuo Viro
mihi tradita, vt quid in astris, *Stellisq.*
prope Iouem præstarent experirer &c.
Hæc est Historia verissima: non enim
de tanto Viro, viuo, præsentē, sic in
publico scripto mētiri impunē mihi li-
ceret &c. Non autem hæc à me eò re-
censentur, quasi ego existimationem
N. extenuare & inuentionem horum
siderū Iouialium apud suos Italos ipsi
præripere velim, neutiquam, sed potius
vt intelligatur, hæc sidera à nullo mor-
taliū mihi vlla ratione commonstra-
ta, sed propria indagine, sub ipsissimum
fere tempus, vel aliquantò citius, quo
N. in Italia ea primum vidit, à me in
Germania adinuenta, & obseruata fuis-
se. Merito igitur N. tribuitur & manet
laus primæ inuentionis horum side-
rum apud Italos,

*Censor ex ia-
stata 18. mē-
sū obserua-
tione Macu-
lar. Solar. nō
est habendus
earū dē pri-
mus Inuen-
tor suomet
iudicio, cal-
culo, & fa-
cto.*

I.

„ An verò quispiam inter meos Germa-
 „ nos ante me ea inuenerit & viderit, ha-
 „ stenus intelligere non potui, nec facile
 „ credidero &c. Hæc Marius. Quæ si ve-
 ra sunt, sine dubio Censorem in obseruan-
 dis & reperiendis Planetis Iouialibus an-
 teuertit. Ad hæc autem quid Censor? In
 suo Libripende à pag. 3. ad pag. 5. refutat
 Marium ex eo, quod siderum Iouialium
 circulos, declinationes & situs illorum tã
 inter se quàm ad Eclipticam, atque motus
 ignorauerit: dicit enim, primò, Marium nò
 obseruasse stellas Iouiales ante se. Secundò
 Neque easdem duos annos post se omni-
 no vidisse. Tertiò, Probabile esse Marium
 stellas Iouiales omnino nunquam obser-
 uasse. Quartò, Simonem Mariũ sibi frau-
 dulenter Calendarij beneficio appropriare
 obseruationes Censoris, & obseruandi
 prioritatem. Quintò, Marium sibi vin-
 dicare falsò Inuentionem motus Perio-
 dici horum Planetarum, cum tamen eos
 Simon Marius iam pridem à Censore e-
 ditos, & visos sibi absque vllò dubio fur-
 ripuerit. Sextò, Ostendit Marium non
 obseruasse illos Iouis Comites ex eo,
 quod neget illos vnquam in linea recta
 reperiri, nisi in summa à Ioue distantia,
 cum tamen anno 1611. à medio Februa-
 rij ad medium Iunij per menses quatuor
 semper inceserint omnes quatuor stellæ
 sub linea recta.

Audisti Lector historiam, & rerum scri-
 ptarum seriem. audi nunc earundem col-
 lationem, & fer æquam pro veritate sen-
 tentiam.

Primò, Nuncius Siderius Marium &
 scripto, & editione publicè præuenit, Ma-
 rius Nuncium in iisdem subsequutus est
 quatuor fermè annis.

Eodem modo, Apelles Censorem ante-
 uertit de Maculis scribendo & edendo
 multis mensibus. Censor subsequutus est
 Apellem multis mensibus scribendo, inte-
 gro anno edendo.

Secundò, Simon Marius scribit, se Io-
 uiales stellas annotare coepisse eodem
 quo Nuncius Siderius, quasi tempore, &
 die; si tollatur Calendarij discrepantia,
 vt bene monet Censor. Simili modo Cen-
 sor dicit, suas obseruationes Macularum
 cum descriptis Apellis obseruationibus
 conuenire.

Tertiò, Censor negat auctoritatem
 hanc nudè asserentis Marij; & Apelles ne-

I I.

gat auctoritatem eandem nudè asserenti
 Censori.

Quartò, Marius non tantum suppa-
 rem se facit in obseruandis stellis Iouia-
 libus, sed etiam aliquantò priorem Nun-
 cio Siderio. Pari ratione Censor in visis
 Maculis se priorem ostendit Apelle, &
 multis quidem mensibus.

Quintò, Censor ex fallaci Marij de
 motu & situ siderum Iouialium doctrina,
 demonstrat ipsum sidera illa neque ante,
 neque longo tempore post se obseruasse;

Ita Apelles, ex erronea Censoris de
 Maculis Solaribus doctrina iure con-
 tendere potest, ipsum nec ante, neque
 cum Apelle in Maculis obseruandis oc-
 cupatum fuisse.

Sextò, Marius suam in obseruando
 prioritatem stabilit testimonio Nobilis
 Domini Lencij: Censor suam præuentio-
 nem in obseruatis Maculis fulcit intimo-
 rum quorundam innominatorum aucto-
 ritate.

Septimò, Censor Mario nudè asseren-
 ti, neque allatis exemplis probatam au-
 ctoritatem explodit. Ita Apelles cæca
 Censoris testimonia, nullis obseruatio-
 nibus roborata non debet admittere.

Octauò, Marius ait se siderum Iouia-
 lium primum Inuentorem in Germania,
 secundas concedit Nuncio Siderio in Ita-
 lia. Censor Macularum primum se, &
 solum Inuentorem venditat; Apelli aut
 alijs, neque secundas quidem concedit,
 sed suorum scriptorum, quæ tamen in re-
 rum natura nulla erant, Inuasorem facit
 Apellem.

Nonò, Tametsi Marius post Censo-
 rem euulgans sua, eidem se non tantum
 supparem, sed priorem faciat in inuentis
 stellis Iouialibus. Quia tamen in Phœno-
 meno probando & stabiliendo non est v-
 sus, nisi obseruationibus Nuncio Siderio
 æquæuis, nullis prioribus, idcirco Nun-
 cius, quod priores suis obseruationibus
 non adducat, non Inuentorem, sed in-
 uasorem facit Marium.

Sic & Censor, suis diu post Apellæ quæ
 de Maculis scripsit, editis, non tantum
 se æqualem, sed & anteriorem consti-
 tuens, Macularum tamen naturam, &
 proprietates non rimatur, nisi ex ijs quæ
 diu post Apellem obseruauit atque edi-
 dit: imo prius aut simul obseruata atque
 consignata nulla promit.

C 3

Hinc

Historia Si-
 monis Ma-
 rij & facta
 in Censorem
 comparatur
 cum historia
 Censoris, &
 factis eius-
 de aduersus
 Apellæ, et eũ
 vtrinq. sũ-
 marum si-
 militudo re-
 peritur; de-
 bet etiam in-
 tercedere i-
 dem pondus
 rationum.

I.

Hinc sicut Censor ex illis non habitis, & non productis à primatu repellit Marium sic Apelles ex non allatis vllis obseruationibus, quæ sint antiquiores quam Apellæ, Censorem à prima Macularum Inuentione haud immerito, remouet.

Decimo, Marius post motuū quos describunt sidera Iouialia rationem à Nuncio Siderio bis euulgatam, & sibi, vt ait Censor perspectam, nihilominus tanquā nouam, tanquam suam edidit diu post Nuncium.

Haud dissimiliter Censor, etiam si Tabulam Apellæ apud sese habuerit, & rationes Phenomeni Solaris ex potiori in Astronomicis rectè explicatas probè cognouerit anno 1612. ante sua scripta, ante edita: nihilominus tamen, ipse subsequens eundem, euulgauit anno 1613. in sua male coagmentata historia, & mirificis logogryphis retruso Apelle, conatus est Inuentionis inuadere primatum. Sed sicut se Censor ex suis prius editis, & à Mario intellectis armat contra Inuasorem Marium: sic se, è prius picta atque euulgata Tabula sua contra Censorem Apelles.

Vndecimo, Censor Marium ex male negato Siderio Iouialium motu rectilineo castigat, & ab inuentione eorundem arcet: Apelles Censorem ex Macularum motu curuilineo male negato, obseruationibus ab ipso rite factis spoliatur, & si valet argumentum Censoris contra Marium, inuentionis primæ gloria Censorem exiit.

Duodecimo, Censor Marium ex asserta circuloꝝ quatuor Mediceꝝ ad Exclipticam inclinatione inuentionis extorrem facit. Apelles eadem poena mulctare Censorem potest, ex negata omnium & singulorum circuloꝝ Maculas deferentium ad Exclipticam inclinatione.

Vidisti Lector, similem vtrinque historiam. Inuenit & produxit Censor sidera Iouialia; inuenit & produxit Apelles Maculas Solares. non contentus Censor sua fortuna, inuasit messem aliorum, conatus Apelli malitiosè extorquere Phenomeno Solare, & vt crederetur alienorum iustus possessor, finxit Apellem suorummet bonorum fraudulentum furem. Sed ecce tibi iustum vindicem Deum, & veras sacri eloqui minas, In quo quis peccat in eodem punietur passus est Censor à Mario (iuste an iniuste, verè an falso, non disputo, viderit ipse Censor, & iudicent boni re-

II.

rum arbitri,) quod iniuriosè intulit Apelli. Et dum affectat alienum, periculo exposuit suum. Quod si vi argumentorum suorum contra Marium vult obtinere, necessario Apelli ablatum reddet Solis Phenomen; hoc si abnuuit, videat ne & Solem non obtineat, & Iouialia astra nihilominus amittat.

Tunc vero, dicat aliquis, audes tanti Censoris affirmationem probationibus licet destitutam, in dubium vocare? quam ipse tam confidenter inculcat, de vniuersorum credulitate securus?

O magnè prorsus apud se auctoritatis virum, qui neque antiquis neque modernis seu Philosophis, seu Mathematicis standum esse pronunciat, vbi naturalis conclusionis scientia stabilienda sit, quia videlicet ratio non auctoritas medium sit scientificè concludendi: vbi vero pro sua ipsius laude tanquam primi obseruatoris Macularum concludendum sit, cuius conclusionis aptum medium sunt obseruationes factæ & exhibitæ, sibi nudè affirmanti in aliorum præiudicium standum existimat, nullis obseruationibus coram, nedum prioribus rite ostensis, vt propterea, quod AYTOS ECH A, quod ipse scribit se obseruasse, se ostendisse Maculas alijs ante Apellem, statim moueamur ad credendum: cum tamen supercilio Philosophico tam seuerè pronunciet. Quanto

„ alla semplice autorità de gl'antichi, e
 „ moderni Filosofi, e Matematici, di-
 35 „ co che non hà vigore alcuno in stabilire
 „ scienza di veruna conclusione naturale.
 „ Quod ad simplicem antiquorum & re-
 „ centium Philosophorum, atque Mathe-
 „ maticorum auctoritatem attinet, di-
 40 „ co (ait Censor) illam nullum penitus
 „ habere vigorem, ad stabiliendam scien-
 „ tiam vllius conclusionis naturalis. Non
 „ igitur agrè ferat, si Apelles & alij, nullius
 „ vigoris esse asserant simplicem ipsius au-
 45 „ thoritatem obseruationibus rite non pro-
 „ latis in stabilienda sibi possessione tanti
 „ Phenomeni. Neque sibi deberi putet,
 „ quod ipse in causa nō omnino dispari de-
 „ negat toti venerandæ antiquitati omnium
 50 „ Philosophorum, & Mathematicorum; toti
 „ huic illustri atq. erudito seculo omnium
 „ Mathematicorum atq. Philosophorum; &
 „ quid ni putet, inquit, cum ipse hac nostra
 „ etate solus ille sit, cui ab Angelo accinatur.
 55 Hic vir est, cui soli ex rei veritate, singula-

*Censor alijs
 derogat sed
 si nudè asse-
 rant: sibi ta-
 men vult
 haberi.*

I.

ri Dei determinatione, & diuino priuilegio gratiæ particulares concessæ sint, vt omnis scientiæ fideralis plenitudinem solus possideat, media illius indipiscende solus calleat, vsum coelestis Telescopij sciat solus; obseruandi modos teneat solus? vt proinde merito plus fidei sibi habende ex hoc capite à nobis exigat.

Imò exigat in cōclusionibus naturalibus stabiliendis contra Philosophicum & Mathematicum decretum, cuius ante meminimus, cum nullis à se obseruationibus propositis, nullo Philosophico discursu ex ijs rite instructo dicat Censor, se Maculas vidisse, & obseruasse; Maculas non esse fallaciam oculi; non esse illusionem vitri, non esse meram in aëre apparentiam; Maculas esse verum ex parte rei existens Phenomenon, & hasce conclusiones naturales pro indubitatis admittendas, quia scilicet, A Y T O S E Q A admitterem omnino si Virum diuinū crederem, si non ab Angelo de Filijs hominū ipsum tanquam vnicum de coelestibus hac tempestate oraculum propositum intelligerem. Nunc cum sua ipsius confessione in tota epistola prima, timidum, dubitandum & nusquam solidum, sed passim errandum animaduertam; cum errasse sæpissime sciam; cum de omni humana Philosophica; & Mathematica auctoritate veteri, noua, in scientificis conclusionibus stabiliendis, loco nullo habenda, Censorina virga decernentem videam; & diuina auctoritas, hominis solum plus æquoblandientis voluntaria assertione stabilatur; magis audiam ipsum Censorem facto suadentem, vt isthæc sibi credi postulantis auctoritas nullo loco habeatur.

Adde quod cum Censor vsque ad annum Domini 1612, diem 4. Maij dicat, epistola prima ad Velferum pag. 10. sibi illuc vsque legem sua abscondendi & necessitatem noua tacendi fuisse impositam amplius quàm alijs, propter aliorum contradictiones, neque vllos conceptus nouos proferre posse, quoadusque non habeat demonstrationes plus quam certas, & palpabiles; certum autem sit, & ferè palpabile, (prout in tota prima Censoris epistola est cernere,) Censorem de Maculis Solaribus nec ante, nec in illa epistola demonstrationes plus quàm certas aut palpabiles attulisse; ex ipsius sibi met præscripta lege, nemo vel Lynceus nouis-

II.

se potuit, quid ille sentiret, quid haberet de Phenomeno Solari, nemo de hoc ab illo audiuisse; ex quo illi vni ad sui commendationem nunc primatum affectanti vniuersi assentiri, seu potius, si credant assentari teneantur; quibus potius certò & palpabiliter constet, nec Apellem post Censorem ex eiusdem præcognitis & excogitatis conceptibus suam Tabulam ante propositam depinxisse, neque Censorem ante Apellem quidquam saltem Apellæ Tabulæ obseruatis æquiparandum vel habuisse, vel alijs ostendisse, vt propterea iure mirum videri possit, quod is non contentus inani, & commentitia, suarum laudum deprædicatione, alijs per calumniam, rerum, quibus caruit, furta sibi facta non cesset affingere; à quo tamen in sui gratiam, si minus veritas placuisset, abstinendum illi fuisset, etiam si Apelles cum sua Tabula, post ipsum prodijisset. Nam si Censor post inuentum Tubum opticum, inuentionem eiusdem nihilominus sibi, licet inaniter, & falso arrogat. nonne se ipsum redarguit, dum Apellem negat posse Macularum esse inuentorem, tamen si post ipsum prodijisset? Sed, sicut in arroganda Tubi inuentione, Censor vanus existit, ita in Macularum reptione nullus fuit.

*Sicut Cen-
sor Tubi o-
ptici non est,
Inuentor i-
ta neq. Ma-
cularū So-
larium.*

APELLEM SVAM TABVLAM A

Censore non transtulisse, & Censorem pro Macularum Inuentore habendum non esse, probatur ex ijs, quæ huic Phenomeno essentialia Censor prorsus ignorauit, & Apelles habet.

CAP. IX.

Sicut ad vitandum Capitis prolixitatem non licet omnia quæ de hoc Phenomeno Censor ignorauit, & omnia in quibus grauitè errauit simul complecti; ita propter errores ignoratis sepius commixtos, necesse erit hoc ipso capite de illis aliquid attingere, qui tamen distinctius Capite sequenti proponentur.

Pariter, data occasione expendendi illius dicta, multa quæ dictis ab Apelle obijcit in sua historia, nonnulla in quibus prolixè velut demonstrandis Præceptorem agit inania, & ex falsis suppositis consarcinata ostendentur; sed ad intentam

pro-

I.

probationem veniamus.

Si ea quæ Phænomeno huic Solari essentialiter conueniunt, in sua Historia non habet Censor; in sua verò Tabula huc vsque continuata, habet Apelles; tunc neque Censor Inuentoris Phænomeni huius Solaris prærogatiua dignus est, neque Apelles, suam Tabulam à Censore transtulit: Sed ea quæ Phænomeno huic Solari essentialiter conueniunt, in sua Historia non habet Censor, & in sua Tabula hucusque continuata habet Apelles. Ergo neque Censor Inuentoris Phænomeni huius Solaris prærogatiua dignus est, neque Apelles suam Tabulam à Censore transtulit Syllogismus totus est bonus, & hypotheticus complexus, cuius totum pondus incumbit in Minorem, nam sequela Maioris ex terminis ipsis satis constat: Minoris verò complexæ, duo sunt membra. primum. Ea quæ Phænomeno huic Solari essentialiter conueniunt, in sua Historia non habet Censor; secundum quod ea in sua Tabula hucusque continuata habet Apelles. Probatur iam Minoris primum membrum.

Phænomeno huic Solarj essentialiter conueniunt Motus, Locus, Tempus, Situs, Aspectus; & si quæ sunt alia huiusmodi; nam licet res ipsa quæ Phænomenon constituit, sint faculæ, Maculæ, & Umbrae Solares, & quatenus physin, & naturam illarum substantialem consideremus, essentia illarum non sit motus &c. sed hæc illis accidant; nihilominus tamen in sensu composito, & quatenus ad forum Astronomicum pertinent, à motu, ab vbi, à Situ & similibus considerationibus ita auelli nequeunt quin principaliter à Mathematico inspiciantur. Itaque Phænomeno huic Solari in sensu composito essentialiter modo dicto conueniunt Motus, Locus, Tempus, Situs, Aspectus &c. Nam si illud consideremus absque his, sed tantum in ordine ad materiam & formam & prout compositum Physicum constituit, iam non tam Phænomenon Astronomicum, quàm alterius est inquisitionis.

Quod igitur ista Censor non habeat, probatur. Motum annum Macularum non agnoscit; incessu curuilineu nescit; inæquales supra Solarem horizon moras non recipit; omnes extra Solem locat; rationem fractionis quæ à lentibus in figuras observationum inducitur præterit, quod ta-

II.

men vnum ex punctis essentialibus in Phænomeno rectè cognoscendo, & ordinando existit; plurima denique ad hoc Phænomenon summè necessaria ipsum penitus effugerunt. in quarum rerum euidentiā è multis nonnulla placet adscribere ex eius historia testimonia.

Epitola secunda pag. 32. hæc ait Censor. Hanno vn' massimo, commune, & vniuersal moto, co'l quale vniuniformemente, & in linee tra di loro parallele vanno, discorrendo il corpo del Sole, da i particolari sintomi del qual mouimento si viene in cognizione, prima che il corpo del Sole è assolutamente sferico, secondariamente ch'egli in se stesso, e circa il proprio centro si ragira, portando seco in cerchi paralleli le dette Macchie, è finendo vna intera conuerfione in vn mese lunare in circa, con riuolgimento simile à quello degli orbi de i pianeti, cioè da Occidente verso Oriente. Habent (Maculæ) vnum maximum communem, & vniuersalem motum, quo vniuniformiter, & in lineis inter sese parallelis percurrunt corpus Solis, ex cuius motus particularibus symptomatibus venit in cognitionem primò corpus Solare esse perfectè sphericum, secundo Solem in semetipso circa centrum proprium girari, deferendo secum in circulis parallelis dictas Maculas, vnàmque reuolutionem peragendo spatio plus minus menstruo, motu tali, qualem describunt Planete, id est, ab Occidente versus Orientem.

Ex hoc loco constat à Censore agnosci Macularum omnium communem motum vnum, eumque vniuniformem, secundum quem ipse in diuersis circulis parallelos incedant, spatio quasi menstruo ab occasu in ortum, more planetarum, secundum signorum consequentiam, idque raptu Solis circa suum centrum girati. Itaque non habet in sua Historia nec agnoscit Motum annum ab Occasu in Ortum contra Signorum successionem, ab omnibus & singulis Maculis participatum, vniuniformem, regularem: qui Motus ita est huic Phænomeno natura insitus, vt eius essentia absque ipso indagari, intelligi, atque explicari non queat. Deinde non habet, sed ignorat Motus menstruos diuersarum Macularum in diuersis circulis

Censor ignorat Macularum motum annum.

Itè apparentiam & rationem atq. diffinitatem motus menstrui prorsus nescit.

Essentialia
Phænomeni
Solaris, quæ
Censor igno-
rat.

II.

II.

delatarum saepe non esse parallelos, nunquam rectilineos, nunquam uniformes, nunquam aequales, quod tamen ad essentiam Phænomeni cognoscendam in primis est necessarium, neque Astronomicè dictum est, motum illum esse simpliciter ab occasu in ortum, cum simpliciter sit ab ortu in occasum, ut suo loco de ortu & occasu Macularum ex professo &c. & quia Maculae extra Solem ab ipso ponuntur, non sequitur necessariò Solem esse sphaericum, neque ipsum circa suum centrum girari, idque spatio menstruo; nam fieri posset, ut citius volueretur: fieri posset ut staret; fieri posset ut tardius nihilominus Maculae suos cursus proprios & naturales perficerent. Ut pariter enucleatius de his differitur, Vbi de Giratione Solis disputatur. Vbi obiter nota, sibi non videri constare Censorem, nam quod hic tam asseueranter affirmat, in Libripende in dubium vocat.

Epistola eadem pag. 42. ad finem, & pag. 43. ad initium sic ait Censor. Le Macchie poi che sono poste in diuersi paralleli, ma sono per così dire, sotto'l medesimo Meridiano, cioè, che la linea che le cōgiūge taglia i paralleli à squadra, e nō obliquamente, nō mutano distanza fra di loro, ma quella che ebbero loro primo comparire vanno mantenendo sempre sino all'ultima occultazione. Maculae postea ait, quae sunt posita in diuersis parallelis, sed eidem ut ita dicam substant Meridiano, quod fit dum linea illas coniungens parallelis ad angulos rectos non obliquos secat, distantiam inter se non mutant, sed quam in prima sui apparitione exhibuerunt, seruant semper ad vltimum, usque occubitum. Contrarium sapissimè accidit in Phænomeno, neque casu aut tumultuariè, prout insinuare videtur in sequentibus Censor, sed ordinatè, & pedetentim summa cum proportionem tam discessu, quam accessu, prout in continuata Apellis Tabula passim est videre; quae cum effugerint Censorem, patet rem magni ad Phænomenon momenti praeteritam.

Epistola eadem pag. 37. initio. e que sto dico, perche dalle offeruazioni, che ho potute far fin qui, non comprendo che la conuersione delle macchie sia obliqua al piano dell'Ecliptica, sotto la

quale è la terra. Et hoc dico, inquit ille, quia ex obseruationibus quas hucusque facere licuit, non inuenio Macularum conuersionem esse obliquam ad planum Eclipticae, cui terra substat. Rursus ignoratum, & omissum in Historia punctum capitalissimum, cuius defectu totus Phænomeni Motus, Macularum situs, & locus ignoretur oportet. Quod si ex factis suis obseruationibus non inuenit motum macularum obliquum ad Eclipticam, certum est malas esse factas à Censore obseruationes. Si verò hae sunt bonae, prout eas mirè extollit Censor, certissimum est Censorem hic hallucinari, & nesciuisse ex obseruatis Maculis apparentem earum motum rectè inuestigare, adhuc anno 1612. mense Augusto, die 14. quando haec scripsit post Apellem; alioquin obliquitatem omnino reperisset, sicut Apelles in suis illorum temporum obseruationibus inuenit.

Epistola eadem pag. 52. non multum à medio. Deuesi drizzare il Telescopio verso il Sole, come se altri lo volesse rimirare, & aggiustatolo, e fermatolo, espongasi vna carta bianca, e pia na incontro al vetro concauo, lontano da esso vetro quattro o cinque palmi, perche sopra essa caderà la specie circolare del Disco del Sole, con tutte le Macchie, che in esso si ritrouano ordinate, e disposte con la medesima symmetria à capello, che nel Sole son situate. Debet, inquit, dirigi Telescopium versus Solem, sicut alias ad eundem intuendum accommodari solet, quo facto & firmato, exponatur vna alba, & bene planata charta ex aduerso vitri concaui, ad distantiam quatuor, aut quinque palmorum, supra ipsam namque cadet species circularis Solaris disci, cum omnibus Maculis quae in ipso reperiuntur ordinatis, & dispositis secundum eandem symmetriam ad capillum, quae in Sole sunt situate. Huius contrarium experitur, tenet, & docet Apelles in sua Tabula continuata, propter lentium refractionem, quam euitari Telescopij vsu est simpliciter impossibile: quae ignorata & neglecta, (quod in sua Historia Censor facit) macularum verum locum, distantiam, situm, & motum erui, enunciarique est laboris stulti, & frustranei. Igitur & hoc punctum

Censor ignorat Macularum motum ad Eclipticam esse obliquum quod est capitale.

Censor aut male obseruauit, aut bene obseruata nesciuit bene tractare.

Censor ignorat et negligit lentium Refractiones, ideoque falsa scribit et docet.

I.

ad plenam Phænomeni cognitionem & expositionem essentialiter requisitum, supinè omisum & nescitum est. Imo hoc Appellem mirum in modum exercuit, magnā ei difficultatē attulit. Errores enim hinc nō tantum vnius capilli, sed integrorū graduum possunt exsurgere; & verò surgunt, nisi caueatur. Vbi nunc manet illud Angeli, che in vn solo soggetto caschi nella nostra età il celeste vso del Telescopio? Tractandi Tubi optici sciētiā residere penes hunc Virum solum hac nostra etate fumiuendus est Angelus, Empor fumi Censor, decipitur vterq; & alijs fucum facit.

Epistola tertia suę Historię pagina 102. circa finē et initio pag. 103. sic ait. Et alcune cose mi restano ancora non bene digeste, ne determinate a modo mio, dalle quali vna principale e l'incidenza dalle Macchie sopra luoghi, della solar superficie, e non altroue; perche rappresentandocisi i progressi di tutte le Macchie sotto specie di linee rette, argomento necessario l'asse di tali conuersioni esser eretto al piano, che passa per i cētri del Sole, e della terra il quale è il solo cerchio dell'eclittica, resta &c. Super sunt mihi adhuc aliquę res (ait Censor,) non bene digestę, neque determinatę ad meū stomachum; in quarum numero principem tenet locum incessus Macularum certis superficiei Solaris limitibus circumscriptus, extra quos alio non vagantur, etenim cum omnium Macularum curricula repręsententur linearum rectarum vestigijs, argumentum necessario sumitur, axem eiusmodi conuersionum esse erectum, ad planum, quod per centrum Solis & terrę incedat, quod est solus Eclipticę Circulus; restat &c. Hic rursus omnium Macularum cursum statuit rectilineum, & eclipticę parallelum infert circa axem ad planum eclipticę rectum. vnde neque tenuit, neque docuit, axem circa quem voluuntur Maculę motu menstruo semper esse mobilem semper ad planum eclipticę inclinatum, cursum illarum nunquam esse parallelum ad Eclipticam, sed eandem plerumque secare bis tantum in anno & merè ad sensum esse rectilineum, & neque tunc quidem omnium inter sese parallelum: hæc inquam cum insint essentialiter Phænomeno, & a

II.

Censore ignorentur, patet illum multa Phænomeno essentialia ignorasse. Sed & hæc, & alia quamplurima hic perperam, admissa notabuntur distinctius sequenti capite. Interim nec possum, neque debeo præterire errores hic a Censore perpetratos, quos neque in Astronomiæ Tyrone intactos, & venia dignos censërem. rappresentandocisi i progressi di tutte le Macchie, sotto specie di linee rette, argomento necessario l'asse di tali conuersioni esser eretto al piano, che passa per i centri del Sole, e della terra, il quale è il solo cerchio dell'eclittica. Ex eo, (inquit Censor,) quod itinera omnium Macularum nobis repräsententur sub specie linearum rectarum, sumitur argumentum necessarium, axem talium conuersionum esse erectum ad planum, quod incedit per centra Solis & Terrę, quod est solus circulus Eclipticę. Taceo nunc falsum esse, quod ait Censor, videlicet omnium Macularum vestigia itineraria esse rectilinea, taceo inquam hoc, neque vrgeoid, quod tamen falso assumit Censor, omnium Macularum itinera rectilinea, inter sese esse parallela, omnibusque omnium Macularum conuersionibus esse vnum, eundemque axem communem; supponamus inquam hæc omnia tanquam vera, licet sint falsa, & videamus quid ex positis his argumento sequatur necessario. Dico igitur, Si supponamus omnia Macularum itinera apparere rectilinea, & sibi met æquidistantia necessario sequi, axem omnibus communem esse rectum ad planum aliquod quod trāsit Solis & terrę centra; hoc enim verum & necessarium ex illis suppositis; Sed dico nihilominus, illud planum non esse solum Circulum Eclipticę. Nam infinita sunt etiam alia plana per terrę & Solis centrum transeuntia, quibus ad rectos insistere potest talis communis Macularum axis; quemadmodum sunt omnia plana circulorum verticalium, locum Solis transeuntium, omnes circuli horarij à Sole infessi &c. Ex datis ergo non est argumentum necessarium; & contrarium de facto fit ad sensum, quando Maculę rectilineę fiunt bis in anno, inter Nouembrem, & Decembrem, itemque Maium, & Iunium; dicere autem Solum circulum Eclipticę per centrum Solis & terrę

tradu-

Angelus, et
Censor fu-
miuendi &
Nugatores.

Censor igno-
rauit axem
circa quem
Maculę vol-
uuntur es-
se mobilem
& ad planū
Eclipticę
inclinatum:
ignorauit
Macularū
motum cur-
uilineum, et
ad Eclipti-
cam obli-
quum. qua
sunt capita-
lia.

I.

I I.

*Intolera-
bilis Censoris
Pseudogra-
phia, vel in
Tyronis A-
stronomiae ca-
liganda.*

traduci; est prima Sphaerae rudimenta-
ignorare: Nōne Sol suum centrum sem-
per in aliquo Verticalium circularum
collocat? nōne in aliquo horario? non-
ne quotidie in horizonte bis? nōne quo-
libet semestri in coluris Solstitiorum, &
æquinoctiorum? & hi omnes circuli ma-
ximi, nōne centrum terræ peruadunt?

Nimis crassa est hæc Sophistica, qua
Censor se non satis peritum in obseruan-
do hoc Phænomeno, & nouum in sphæ-
ricis prodit: falsa ex obseruatis obtruden-
do, & ex illis suppositis peius paralogi-
zando. Hic apello Censoris interpretem,
& argutum disputatorem, an non hoc sit
ex malè factis delineationibus, peiores
imagines pingere; & dum vult Censor
pulchram Apellis Tabulam corrigere,
informia monstra elegantis picturæ loco
reponere? Certè Angelus saccum omnis
scientiæ coelestis plenitudine turgentem,
nimis constrictum tenet, saltem aliqua
minuta rimula scintillam rationis paruu-
lam emicare permetteret. Hic mira sub-
terfugia expecta Lector; non volet regu-
lam ex Solis cursibus apparenter rectili-
neis deduxisse, aut se loquutum esse ab-
solutè de plano per Solis, & terræ centra
transcunte; verum relecto loco ex citata
epistola, vbi alijs ad rem hanc pertinen-
tibus non præmissis more suo doctrinali
isthac proloquitur, facile aduerter Cen-
sorem, dum alienis curiosius excutiendis
aciem omnem intendit, in obuijs ac ante
pedes positis cespitasse.

Epistola eadem tertia pag. 116. Pren-
de Apelle la sua ragione del vederli le
Macchie dimorar tempi ineguali sotto
la faccia del Sole, e quelle che la tra-
uersano per la linea massima passando
per lo centro, dimorar più, che quelle,
che passano per linee remote dal cen-
tro; e ne adduce l'osservazion di due,
l'vna delle quali dimorò giorni 16. nel
diametro, l'altra passando alquanto
lontana dal centro, scorre la sua linea
in giorni 14. hor quì vorrei trouar pa-
role di poter senza offesa di Apelle, il
quale io intendo di honorar sempre,
negare tale esperienza: perche hauen-
do io circa questo particolare fatte
molte, e molte diligentissime osserva-
zioni, non hò trouato incontro alcu-
no, onde si possa concluder altro, se
non che le Macchie tutte indifferente-

mente dimorano sotto'l Solar disco
tempi equali, che al mio giudizio so-
no qualche cosa piu di giorni 14. e que-
sto affermo tanto più risolutamente,
quanto che sarà per auanti in potestà
di ciascheduno il farne senza incom-
modo mille, e mille osservazioni: Af-
fert Apelles suam rationem ex eo, quod
videantur Maculae inæquali temporis
mora sub facie Solis transire, & ea qui-
dem, quæ per centrum maxima linea
incedant, videantur plus morari ijs, quæ
in lineis à centro remotioribus feren-
tur, & adducit duas obseruationes,
quarum quæ secundum diametrum
durauit dies 16, quæ verò aliquanto
remotior, dies 14 insumsit. Iam hic
vellem inuenire verba, quibus sine of-
fensa Apellis (quem honoratum semper
cupio) negarem talem experientiam.
Propterea quod ego circa hoc pun-
ctum factis quàm plurimis, multoque
diligentissimis obseruationibus, non
inuenirim indicium vllum, vnde possit
concludi aliud, quàm quod omnes
Maculae indifferenter æqualem sub di-
sco Solis trahant moram, quæ meo iu-
dicio non nihil excedit dies 14. Et hoc
tantò resolutius affirmo, quantò libe-
rior in posterum erit cuiuslibet potestas
facile & sine incommodo huius rei pe-
riculum per mille & mille obseruatio-
nes faciundi. hæc ille. Et paullo post,
pag. eadem ante finem. Hò fatto so-
pra la moltitudine di più di 100. dise-
gni grandi, & esatti; & hò incontrate
bene alcune piccole differenze di tem-
pi ne i passaggi; ma hò anco trouato
alternatamente esser non meno talhor
più tarde le Macchie de cerchi più vi-
cini al centro del disco, che altra volta
quelle de più remoti. Feci, inquit,
plures quàm centum obseruationum
magnas & exactas delineationes, &
inueni quidem exiles in decursu illa-
rum temporis differentias, sed inueni
etiam alternatim, Maculas quæ agun-
tur in circulis Solaris disci centro vic-
nioribus non lentiùs moueri, quàm a-
lias illæ solent, quæ describunt circu-
los remotiores. Hæc Censor ibidem.
Ex quibus manifestum est, ipsum inæ-
qualem Macularum sub Sole moram nul-
latenus agnouisse; quam tamen Apelles
constanter semper asseruit, quæque Phæ-
nome-

*Censor inæ-
qualem Ma-
cularum
sub sole mo-
ram ignora-
uit, quod est
capitale.*

*Censor quæ
Apellis falsò
impingit, &
per se, &
suos taxat,
ipsemet de-
linquit.*

I.

nomeno huic ita essentialis est, vt etiam si omnium Macularum conuersiones totae, inter se aequalis durationis, etiam si omnes Soli adherere vel inherere supponantur, tamen nulla vnquam sub Sole sit factura moram alteri aequalem: & quod amplius est, etiam si vna eademque Macula in vno eodemque circulo volui aequabiliter, etiam si Soli inherere, vel strictè adherere supponatur, etiam si redire atque perennare concedatur; tamen nunquam nisi bis in anno aequalis durationis, curricula sub Sole hemisphaerico faciet; nunquam nisi annuè similem atque aequè durantem sub Sole nobis apparentem incessum describet. Amplius duæ pluresue Maculae simul sub Sole incedentes, si extra tempora, quibus lineas ad sensum rectas in Sole describunt, moras aequales faciunt, ipse ex necessitate Phenomeni inaequaliter atque improporcionatè mouentur, neque conuersiones suas temporibus aequalibus absolunt. Ea quæ Apelles indefinitè dicit de linea centro viciniorè, & à centro remotiore, intelligenda sunt, si linea remotior versetur in parte poli occultati, siue Australis, siue Borealis; nam Macularum polo apparenti viciniorum cursus ordinariè semper est diuturnior illo quem efficiunt eæ, quæ ab eleuato polo magis discedunt. Deinde per maiores circulos possunt intelligi maiora circulorum segmenta, quam vt sint similia. sed de his etiam alibi ex instituto.

Apelles suas observationes tuetur, & criminationes Censoris diluit.

Vrget deinde Censor Apellem ab exemplo 16. minimum dierum in medium producto, & ab alio dierum 14. vt summum, è quibus Apelles enisus est inaequalitatem moræ sub Sole elicere, easque ab eodem amouere. Sed Censor negat Apelli hanc observationem. Iam hic vellem ad calamum affluere verba, quibus sine offensa Censoris veritatem possem scribere. Nam Censor aut non affecutus est verba & mentem Apellis, aut non bona fide tractauit. Etenim primò Apelles, vt legenti ipsum clarissimè patebit, adhuc in via inquisitionis versans, plurima non assertiue, & absolutè, sed per modum inquirendi differit. Secundo Plurima hypotheticè, atque ex aliorum suppositis sententijs disputat, ipse adhuc iudicio suspensio. Tertiò, id quod probare intendit non facit tanquam ex vnico 16. dierum exemplo, sed illud exemplum adducit tanquam è multis

Apelles in sua Tabula multa inuestigati similia, multa dubitati multa hypotheticè, & ex sensu aliorum differuit etc.

II.

1 vnum. Quarto Neque vim facit aut fecit in diebus 16. Sed in numero maiore quam 14. sufficiunt ad vim argumenti dies 15. sufficiunt 14 $\frac{1}{2}$ &c. Quintò argumentum fuit hypotheticum, atque ex mente Apellis eiusmodi.

10 Sole variabili & duro posito, siue rotetur interim siue non, Motu Macularum Eclipticæ parallelo dato, si Maculae Ω commoratae sunt sub Sole dies 16. & Macula η vt summum 14. tum necessarium est illarum moram sub Sole inaequalem, illasque extra Solem motas esse: atqui Sol, secundum communem Philosophorum & Mathematicorum omnium sententiam (de quo tamen alias ex instituto) est durus & inuariabilis, & secundum Apellis observationes diligentes, Macula Ω sub eodem Sole commoratae sunt minimum dies 16. & Macula η vt summum dies 14. Igitur necessarium illarum sub Sole moram inaequalem, illasque extra Solem motas esse, secundum communem Philosophorum, & Mathematicorum sententiam: de quo tamen Apelles alias ex instituto inquireret.

25 Hic totus Syllogismus est hypotheticus, complexus, & magis inuestigatiuus, atque illatiuus ex suppositis potius alienis, quam suis. Nam vt rum Sol durus, & inuariabilis sit, meritò dubitat Apelles ex ipso met hoc Phenomeno dubitandi sumpta causa. At instat Censor, debere etiam ab Apelle supponi Maculas extra Solem in eadem sphaera similiter ferri, alioquin non secuturum quod Apelles intendit, vt eas extra Solem eiciat.

30 Respondeo, Sole duro, & inuariabili posito, si probetur inaequalitas moræ, & motus, siue in vna sphaera rotentur Maculae siue non, siue in proprijs agantur singulae circulis siue non, semper necessario inferri ipsas intra Solem poni non posse, extra simpliciter locandas. nisi & penetrationem corporum, & aliquam Solis variationem admittere velis. Sed vrget vterius Censor, si Macularum totus cumulus sumatur, prout videtur sumi, argumentum nullam habere vim; etenim fieri posset, vt omnes Soli fixae hærerent, tamen dies sedecim insumerent sub Sole, computando moras ab ingressu Maculae primæ, ad egressum postremæ; Sed hoc est fucum facere, sic enim oportet vnus puncti, seu Maculae moram accipere, & cum

Argumentum Apellis ex hypothese, & aliorum recepta doctrina; concludit.

Apelles veri inuestigationem circa hoc punctum, sibi reseruauit.

Argumentum Apellis etiam in suppositione Censoris suam vim habet.

Frustra relucitur Censor.

I.

I I.

cū alterius puncti mora conferre. Respon-
deo. Argumentum Apellis habere nihilo-
minus suam vim ab eodem intentam, etiā si
nulla Macularum Ω seorsim sub Sole in-
sumpsit dies 16. hoc enim Apelles nū-
quam dixit, nec voluit, sed sufficit, si ex eo
quod 16. dies omnes simul sub Sole hæ-
serint, moram longiorem vnaquaq. illarum
traxerit sub Sole quam Macula M dum-
modo enim dies 15, aut plus quam 14.
acquirantur, satis est ad Apellis propositū,
Apelles enim intendit vnamquaq. ex Ma-
culis Ω , diutius hæsisse quam Maculam
 M &c. Quod autem ex eo quod dies 16.
permanerint omnes simul, necessario se-
quatur vnamquaq. illarum aut saltem ali-
quas certas plus insumpsisse, quam dies
14. sic ex obseruatis ab Apelle conficitur.
» In vtroq. autem aspectu, ait Apelles, vi-
» delicet vltimo & primo præsertim, in-
teruallum inter Maculas Ω , & marginem
Solis visum, fuit amplum satis vnius diei
minimum (si quidē ab experientia aliarum
Macularum licet argumētari id quod hic
licebat) igitur si accipiamus ex Maculis Ω
eā quæ omnes antecessit, ipsaq. faciamus
die 24. Decemb. hora 11. horizontem atti-
gisse, versata est sub Sole à die 10. quo pri-
mū cōspecta fuit intra Solē dies 14. quibus
si addamus interuallum A Ω habebimus
dies 15. Eodē modo si in ortu postremā
accipiamus, ponamusq. omnino horizonta-
lem fuisse die Decemb. 10. h. 10. tūc ipsa ad
diem 24. insumpsit dies 14. quibus adiecta
mora spatij Ω B. vno quasi die decurren-
di, facit dies 15. Et hoc Apelli sufficiebat
ad suum probandū intentū. Quod si adhuc
imminere velit Censor, dicendo spatia ista
non diurna, sed minora fuisse. Respondeo
hinc non premi Apellem, dummodo Ma-
culæ cuiuscunq. duratio fiat maior quam
dies 14. id quod & ipsemet Censor cōce-
dit: cūmq. certum sit, Maculam M dies 14.
non cōpleuisse &c. patet Apellis argumē-
tationem suam neruum habere. Quod si &
hæc negare velit Censor, redarguet seip-
sum, dum ait, omniū Macularum sub Sole
morā, suo iudicio, non nihil excedere dies
14. Quod quidē de omnibus simul & sin-
gulis Maculis Ω seorsim sine dubio est
verum; vniuersim autem de Maculis om-
nino quibuslibet indifferēter sūptis, absq.
vllō dubio falsum, nam Macula M dies 14.
non superauit, neq. arbitror omnino com-
pleuit. Quod autem Censor moræ æqua-

1 litatem tam resolutē asserit, & non tātum
ad futuras obseruationes prouocat, sed &
de suis plures quam centū iactat, possum
ego illi semper pro centum mille & mille
5 & mille ante & post ipsū factas reponere,
neq. meas tātum, sed & aliorum; & vt hic
aliquid habeat ad manum quo possit hanc
veritatē tuto inspicere, consulat, nisi piget,
appositas imaginū Tabulas, fide summa,
10 accuratione plus quā credi potest elabo-
ratas, stant omnes contra ipsum pro A-
pelle.
» Vnde Maculæ omnes ordinariē inæ-
quales sub Sole transitus & moras perā-
gunt, & hoc ipsius Censoris verbis tanto
15 resolutiūs affirmo, quanto liberior impo-
sterū erit facultas, hæc cui libet per quot-
millenas obseruationes experiundi, dum
modus rite obseruandi adhibeatur erro-
20 resq. præcauendi in Rosa Virina commo-
strati, deuitentur. Ego verò ab initio in-
uēti Phænomeni, id est ab anno 1611. huc
usq. ad hoc punctum singularissimē at-
tendi, & motus, moræq. apparentis inæ-
25 qualitatem per multa obseruationum
millia continuata, constanter deprehendi;
neq. verò aliter fieri potest in hoc Phæno-
meno, ob circellum annuū, polos & axem
Macularum continuē in alia, & alia locali
30 deferentem, ex quo semper alia, atq. alia
obliquitas accidit sphaeræ maculosæ a pla-
no Solaris circuli sectæ; & hæc est ratio a
priori demonstratiua huius inæqualitatis,
de qua, suo loco vberius. Non possum au-
tem hic non mirari, cur Censor tam labo-
35 riosē, tam procul petitis coniecturis op-
pugnet Apellem, & ad futuras quoq. ex-
currat Macularum obseruationes; in cam-
pum patentem malè instructum educat
40 militem, castrumq. suum vna cum arma-
mentario, domesticis refertum telis im-
prudens deferendo: cū tamen ex eodem
statim potuisset conficere hostem. Etenim
nonē epist. 1. p. 11. ver. 18. hæc de Motibus
45 „ Macularū scribit Censor? E vero ancora
„ che non restano fisse, nel corpo Solare,
„ ma appariscono muouerli in relazion
„ di esso, & anco di motimēti regolari,
„ come il medesimo autore hà notato
50 „ nella medesima lettera: (& post pau-
„ ca;) il che anco nell' offeruazioni de-
„ scritte da lui medemo, le quali in questo
„ cōfrontano con le mie, e con quæte io ne hò
„ vedute di altri, assai chiaramente si scor-
55 „ ge. Est etiam verum, ait Censor, non
esse

Censor ina-
niter iactat
obseruatio-
num suarū
multitudi-
nem.

Apelles pro
inæquali
Macularū
sub Sole mo-
ra, prouocat
ad obserua-
tiones præ-
teritas, &
futuras,
tā suas quā
aliorum.

Censor
non
est
in
cam-
pum
patentem
malè
instructum
educat
militem
castrumq.
suum
vna
cum
arma-
mentario
domesticis
refertum
telis
im-
prudens
deferendo

I.

„ esse fixas in corpore Solari Maculas,
 „ sed respectu ipsius moueri, & motibus
 „ quidem regularibus, quemadmodum
 „ ipsemet auctor rectè in ipsis litteris an-
 „ notauit; (& paullo post) id quod etiam
 „ in obseruationibus ab ipsemet descri-
 „ ptis, *quæ cum meis in hoc, & cum qui-
 „ busuis aliorum hætenus à me visis con-
 „ ueniunt clarissimè videtur.* Hæc Cen-
 sor. Qui si suas Macularum obseruationes
 cum meis contulit, si motus regulares ex
 conuenientia deprehendit; etiam ex earū-
 dem collatione motuum quantitates, &
 durationes didicit, ex meis enim ista de-
 duci poterant. Aut ergo collatæ obserua-
 tiones cum meis conuenerunt etiam dura-
 tione, aut non. Si primum. Ergo & seipsum
 oppugnat Censor. Si secundum, quid erat
 opus tot & tantis coniecturis obserua-
 tiones Apellis cōuellere? patuisset error pro-
 ducto in contrarium Censoris auctogra-
 pho, obseruationibus ritè cōsignatis, Ecli-
 ptica scite inducta &c.

Quod si contrarium huiusmodi aucto-
 graphum Censor exhibere nequit; quærit
 ex Censore Apelles, Quomodo obserua-
 tiones ipsius & quales cum obseruationi-
 bus Apellis collatæ conuenerint? Aut enim
 illæ obseruationes fuerunt anni, mensis, &
 diei eiusdem tuto & ritè digestæ, aut non.
 Si primum, redit denuo argumentum, &
 dum Censor Apellem petit, seipsum iu-
 gulat. Si secundum, iam nulla potuit fieri
 obseruationum collatarum symmetria, nulla
 inueniri motuum similitudo, nulla
 regularitatis stabilis & solida ratio iniri;
 eum aliæ Maculæ, alij situs, alij extiterint
 motus, tam apparentes quàm veri: & pa-
 tet fraus Censoris, qui imponit Lectori,
 dum vult videri per sua vel prius vel si-
 mul fictitiè obseruata, æqualis aut prior in
 inueniendis Maculis, & earum motibus,
 Apelle. Quæ si vera essent, non statuisset
 suæ doctrinæ cōsolidandæ initium, ex ob-
 seruationibus suis à die 2. Iunii anni 1612
 ad 4. Augusti continuatis, vt ipsemet fa-
 teretur epistola secunda. pag. 42. & pag. 46.
 post medium, qui in suo Musæo quietus
 scribebat, vbi si quæ parauerat, habebat
 ad manum, vt ita, si antiquiores ad motū,
 seu motus durationem probandam habuisset,
 Macularum cōsignatas animaduersiones, vtique illis in contundendum Apellæ
 usus esset. Sed nunc vt ad rem redeam, &
 numeros inchoatos cōtexam. Sexto Apel-

*Censor nun-
 quam obser-
 uata simu-
 lat eū meis
 collata, &c.*

II.

les dixit Maculas Ω sub Sole consumpsisse
 minimum 16 dies. quod verum est, si
 tempus ab ortu Maculæ primæ, ad occa-
 sum postremæ computetur: nam cum Ma-
 nipulus iste Macularum in occasu & ortu
 confluerit veluti in vnum, Apelles totam
 totius Massæ sub Sole moram, secundum
 primam & vitimam quoque partem, com-
 plexus est. Et in hoc sensu, si Censor Apel-
 li experientiam negat, temere, & imperitè
 negat: si verò dies 16. vult restrictos ad
 vnam tantum Maculam, quæ peruagando
 Sole tantum temporis contriuerit, ærem
 non Apellem verberat, laruas umbratiles
 à se confictas sibiq. arbitrariè obiectas nō
 hostem cedit; Lectori fucum, Apelli iniu-
 riā facit. nam Septimò Apelles nunquam
 sensit, nunquam scripsit in tota sua Tabu-
 la (si secus est, proferatur locus, citetur
 textus, omnia toti mundo prostant) vllō
 verbulo, vlla syllaba, vllō vel minimo api-
 culo, nunquam indicio vel minimo insi-
 nuauit, vllam Maculam simplicem à se
 obseruatam, quæ in suo sub Sole decursu
 hæsisset dies 16. Quanquam enim ipse ex
 aliunde obseruatis atq. demonstratis cui-
 denter sciat, esse in Sole Maculas, & Fa-
 culas secundarias, itemq. umbras & pun-
 cta infinita, quæ sub Sole incedendo insu-
 mant dies non tantum 16, sed 18, 20, &
 amplius vsq. ad 27. &c. imo partes polis
 mobilibus vicinas quandoque rotas supra,
 quandoque rotas infra horizontem Sola-
 rem manere, ortus vel occasus nescias, ob
 circelli polaris reuolutionem annuam po-
 los & axem Macularum secum deferen-
 tis: &c. tamen de hisce arcanis quidquam
 adhuc attingere, vel ex ijs argumenta de-
 libare noluit; præsertim quando in iisdem
 indagandis atq. stabilien-
 dis adhuc occupa-
 tus fuit. Quare dum Censor, pag. 122.
 „ scribit. Di qui può esser manifesto, quā-
 „ to vicino ad vn' impossibile assoluto si
 „ conducesse Apelle, nel dir, di hauer' of-
 „ seruato vna Macchia trauersare il dia-
 „ metro del Disco Solare in giorni 16.
 „ almeno, & vn'altra vna minor linea in
 „ 14. al più. Hinc potest esse manifestum
 „ quàm prope semet Apelles ad vnum,
 „ absolutè impossibile deducat, dum di-
 „ cit, à se vnam aliquam obseruatam esse
 „ Maculā, quæ Disci Solaris diametrum 16.
 „ minimū diebus, & vnā aliā, quæ in linea
 „ minore transeūda diebus vagaretur tan-
 „ tū 14. Dum inquā Censor hæc scribit, af-
 fin-

*Censor in
 Apellæ eius-
 que Tabulā
 iniurio ius.*

I.

Censor vel calūniatur fraudulenter, vel minus circumspēctē Apellem criminatur.

fingit Apelli quod nunquam cogitauit; quæ si facit studio, fide non bona; si casu, calamo nō satis circumciso, eiusdem scripta tractat: frustra sese & inutiliter tot neminem ferientibus ictibus intentādis defatigat, Lectorē ludificat, veritati imponit. Nā quod Apelles asserit, ipse nō oppugnat & quod oppugnat ipse, nō asserit Apelles.

„ Epistola eadem pag. 129. circa medium. Come s'è scordato Apelle di quello, che sopra à fac. 18. nel X. notabile scrisse, con tanta resolutione, cioè. Questo esser certo, che le Macchie che trauerfano il mezo del Sole fan maggior dimora sotto di lui, che quelle, che passano più verso gli estremi. Questi sono impossibili assoluti, quando non si volesse dire i mouimenti delle Macchie esser tutti di periodi differenti, il che nē è vero, nē da Apelle supposto, e dato che vero fusse, cessarebbe tutto il vigor del discorso, nel voler egli da tali passaggi dedurre, & inferir il luogo delle Macchie, rispetto al Sole &c. Quomodo, inquit Censor, dissentit Apelles ab eo quod supra cum tanta resolutione affirmauit; nimirum. Hoc certum, Maculas quæ medium Solis transeunt, plus moræ sub illo facere, quam quæ magis vergunt ad extrema. Ista sunt simpliciter impossibilia, nisi dicatur, omnes Macularum motus inter se differre, quod neq. verum, neq. ab Apelle suppositum est; & dato quod verum esset, eneruaretur vis argumenti, quod è tali Macularum decursu vult inferre Macularum locum respectu Solis &c.

Censor ignorantiam suam circa inaequalem Macularum moram, adauget.

Hæc ille. E quibus rursus apparet, quantum Censor moræ inaequalitatem auerferat: cuius contrarium tam mordicus defendit, dum mox post citata subnectit. „ trouaremo i tempi di detti passaggi essere equali fra di loro, e tutti circa 14. giorni. inueniemus, omni seposito vitioso affectu, tēpora omnia dictorū ricularū inter sese æqualia & dierū circiter 14. Sed ad hæc omnia sufficienter in prioribus est dictum: & constat Censorem hoc punctū Phænomeno essenziale ignorauisse: quod probare mihi incūbebat, cum ad primū Minoris mēbrum pertineat.

Censor in eadem sua infestissima persequeratur.

Eadem epist. pag. 131. reciprocatur Censor ferram eandem. E perche, come hò detto ancora, questo è punto principalissimo in questa materia, e la differenza tra Apelle, e me, è grande (poiche le

II.

1 „ conuersioni delle Macchie à me paiono
 „ tutte equali, e trauerfare il Disco Solare in giorni 14. e mezzo in circa, & ad
 „ esso tanto inequali, che alcuna cōsumi
 5 „ in tal passaggio giorni 16. e più, & altra
 „ 9. solamente) parmi che sia molto necessario il tornar con replicato esame, à
 „ ricercar l'esatto di questo particolare;
 „ ricordādoci, che la natura sorda & inforabile, à nostri preghi, non è per alterare, o permutare il corso de' suoi effetti, e che quelle cose, che noi procuriamo adesso d'investigare, e poi persuadere à gli altri, non sono state solamente vna volta, e poi macate, mà sequitate, e sequiteranno gran tēpo il loro stile, si che da molti, e molti saranno vedute & obseruate; il che ci deue esser gran freno per renderci tanto più circospetti nel pronūciare le nostri proposizioni, e nel guardarci che qualche affecto, o verso noi stessi, o verso altri nō ci faccia più to piegare dalla mira della pura verità. Et quia, vt dixi supra, hoc in materia hæc est punctum principalissimū, & differentia maxima inter me & Apellem (quādoquidem mihi quidem omnes Macularū inter se cursus videntur esse equalis, Solisq. Discum emetiri intra 14. dies
 30 „ & medium, plus minus, ipsi verò tam inæquales, vt vna aliqua Macula in transitu Solari consumat dies 16. & amplius, alia verò solummodo 9.) multo maxime mihi necessarium videtur viam relegere, iteratōque examine, hanc ipsam rem longè exactissime denuo investigare; in memoriam nobis reuocando, Naturam surdam, & ad preces nostras inexorabilem, suiq. iuris tenacem, effectuum suorum cursus non alterare aut mutare, neq. res illas, in quarum nūc investigatione desudamus alijs deinde persuasuri, vna tantum vice comparere postmodum deficere; sed tractu continuo sequi & sequuturas esse, eodē stilo atq. tenore à quamplurimis alijs videntas & animaduertendas; id quod magno fræno nobis esse debet, ad coercendum nos, vt tanto cautiore simus in nostris propositionibus pronūciandis sentētijsq. ferendis, prouidē circumspiciendo, ne aliquo affectu vel erga nos ipsos vel in alios à nudo veritatis intuitu vel puncto deflectamus. Hinc rursus patet, Apellis Censorem de Temporis & Motus inæqualitate prorsus ignarum fuisse.

Censor ad naturam cursū pro ignorantia sua tūcda, Apellem audaci sane calamo, ablegat.

Censor omnem sibi ad scientiam, & veritatē regressum obserat.

I.

*Natura sua
pro Apelle
contra Cen-
sorem.*

*Apelles in
Nouitati-
bus huius
Phenomēni
promendis
Satis semper
& ubique
providē in-
cessit.*

*Censor igno-
rat Macu-
las & Facu-
las secunda-
rias: quod
est capitale.*

se, atq. adeo rem Phænomeno huic natura
insitam penitus ignorauisse, quæ cum
inexorabilis sit etiam si Censor suas con-
tra Apellem Demonstrationes, seu magis
Paralogias in immensum exaggeret, mi-
nas & exhortationes in Apellem promat,
rursusque non dicta affingat, tamen ipsa
in suo cursu, & hic in sua sententia persta-
bit. Sicut autem puncta quædam Solem
perambulare possunt diebus 16. 18. 20. &
amplius, ut ante dictum ex parte poli ap-
parentis sita; ita alia versus polum laten-
tem consistentia, suos sub Sole incessus
absolvere possunt, diebus 9, 7, 5, & v-
no; quod si in talibus locis insideant Fa-
culæ aut Maculæ etiam primariæ, omni-
no visui nostro in obseruando per com-
munes Tubos patebunt, & discernetur
illorum motus, vel tantus, vel tantillus.
Apelles, meo quidem iudicio, satis sibi
vbique cauit, sciens in re noua difficili & lu-
brica, valde attendendum, magnopere
prouidendum ne iniurias tentando aperien-
dōq. semitas, in angustias, Labyrintos,
aut præcipitia incidat, hinc vbique fere
locum & spatium receptui, sicubi indige-
ret reliquum fecit, & de substantia Ma-
cularum Solisq; in particulari pauca de
suo, multa è penu Philosophico per mo-
dum dubitantis & inquirentis proposuit,
plurima hypotheticè tantum affirmavit;
vel quia aliter in ijs non licebat, vel ut sic
post Tabulam suam tutus esse, atq. tan-
dem veritate reperta armatus in aciem
prodire posset. Melius esse arbitratus,
vnam post alteram sensim veritatem pro-
mere, quàm pro oraculis omnes conie-
cturas simul effundere, quibus deinde
cum rubore deberet temere assumptam
certitudinis larvam detrahare. Si Censor
idem quod docet fecisset, neque tam pro-
cul progressus omnem retrocedendi spem
sibimet amputasset; melius nunc stare: &
sua Cōcionis fructū primus perciperet.

Turpe est Doctori cū culpa redarguit ipsū.

Verum ut in hoc primo Minoris mem-
bro probando tandem finiam.

Maculæ & Faculæ secundariæ sunt huic
Solari Phænomeno maximè essentielles;
has in Tabula sua continuata, habet &
explicat Apelles, in sua Historia non ha-
bet Censor, neque tantillo iudicio &c.
Igitur aliquid huic Phænomeno maximè
essentiale non habet Censor. Maior patet
& probatur ex sequentibus Rosæ Vrsinæ
Libris. Cum enim tota Solis superficies

II.

1 insideatur, constet & integretur è Macu-
lis & Faculis secundarijs, patet eas huic
Phænomeno maximè essentielles esse, quia
nihil magis est huic Phænomeno essentia-
le, quam ipsa spectabilis Solis superficies
&c. Minor constat è Tabula Apellis con-
tinuata seu Rosa Vrsina explicata; & ex
Historia Censoris &c. Patet ergo Conclu-
sio. Et sic maneat primum Minoris mem-
brum ostensum, quod erat: *Ea quæ Pha-
nomeno huic Solari essentialiter conueniūt,
in sua Historia non habet Censor.* id quod
erat demonstrandum.

15 Secundum; quod scilicet huiusmodi
huic Phænomeno essentialia Apelles ha-
beat in sua Tabula continuata, occasione
primi videri posset satis ostensum, & ipsū
experimentum in lectione sequentium,
cuilibet persuadebit; nihilominus hic ali-
qua ad maiorem confirmationem libet
addere. Etenim anno 1611, Apelles pri-
mæ suæ Tabulæ rudimenta posuit, & li-
neamentorum adumbrationes quasdam
spectatum proposuit, interim ex anno in-
25 annum hucusq; in hunc annum 1627. in
hunc Mensem, qui est in
hunc diem suam eandem
Tabulam continuauit, obseruando, exa-
minando, disponendo, & perpoliando,
30 tandemque fere absoluendo; tametsi vlti-
ma manus non sit amota ab illa penitus:
nam sunt nonnulla adhuc subtilioris peni-
cilli industriam expectantia: mirum enim
quàm ferax nouarū speculationū sit hoc
Phænomenon. In hac itaq; sua inchoata,
35 continuata, atq; aliquatenus absoluta Tabu-
la, prædicta omnia habet Apelles; in in-
choata, multa facta, multa virtute atq; im-
plicitè; in continuata per obseruationes ra-
dicaliter; in absoluta expressè & formaliter.
Nā licet in editis videatur inclinasse
in motum rectilineum Eclipticæ paralle-
lum, renitentibus tamē nonnihil obserua-
tionum suarum prototypis, (prout cuilibet
40 petenti obseruationum auctographa
exhibita fidē euidentem facient;) id cau-
tè, & nō sine oppositi formidine fecit; vn-
de sese sēper in hoc & alijs non paucis, ad
vltiora examina, & posteriora obseruā-
da reiecit, & sic locū tuto receptui reliquū
fecit, neq. vllum repagulū vel sibi vel veri-
tati obtrusit, quod factū utiq; fuisset si hæc
dubiè occurrentia, per vim in Sedē Vernac-
tis tanquam certa intrudendo, doctis ob-
trusisset & ex temeraria præfidiētia, ad ho-
rū errorū propalatores Solem ipsum, to-
tiusq;

*Primum
Minoris
propositæ
membrum,
contra Cen-
sorem est de-
monstratum.*

I.

iusque Orbis eruditi oculos prouocando, suæ stoliditati remedia omnia opportuna instar Censoris, imprudens amputasset: sed audi cautelas Apellis. Epist. 1. anno 1611. die 12. Nouenb. ad Velferum missa, hæc habet. Tertiò quia motu pro-
 „ prio, eoque constanti, vel sub Sole,
 „ vel cum Sole vertebantur, inque alio,
 „ aliòque Solis loco conspiciabantur,
 „ donec ab eodem penitus post multos
 „ dies disparebant, ab ortu (vt mihi vi-
 „ detur) in occasum, vel certè à Borea
 „ ex parte in Austrum: de quo tamen
 „ motu, certiora dabunt obseruationes
 „ diuturniores & exactiores. Quod ait
 „ à Borea in Austrum, fit ratione motus
 „ diurni, & comparatione situs ex aspe-
 „ ctu matutino ad vespertinum illorum
 „ temporum.

Epistola tertia eodem anno die 26. Decembris data habet hæc, pagina 8. post Censoris historiam in editione Romana ad quam citationes, etiam aliæ omnes spectant. Superest vt moueantur motibus proprijs, idque vel fixè, vel erraticè, quorum utrum sit, dicere nondum habeo: hoc certum, volui circa Solem. Item in eodem, pag. 11. sed hæc suo tempore, quemadmodum & de motu &c.

Epistola quarta anno 1612. 16. Ianuarij data pag. 29. num. 10. habentur hæc. *Motus omnium videtur esse parallelus Eclipticæ, de quo tamen sententiam tanquam certissimam nondum tulerim.* Eadem epistola pag. 34. num. 10. de Macula in hæc habentur. *Mota est æquidistanter Eclipticæ. At enim de motu istorum Phenomenon, vt pote Cardine Principe, enucleatiora multo suo tempore proferam.* Quod autem epistola eadem, pagina 44. in fine, 45. ad initium scripsi Maculas sub Sole quotidie sensim ab ortu in occasum in plano vel Eclipticæ, vel Eclipticæ parallelo transire, contra Signorum ordinem, in semicirculo superiore supra Solem ab occasu in ortum, secundum Signorum consequentiam; nihil debet præiudicare loco priori, qui sese extendit ad Tractatum de Motu accuratorem; interim opinionem illam, tanquam probabilem mihi visam, nolui in hac eadem epistola mutare, neque enim promissio mea huc respexit, & hoc eò amplius, quòd Maculæ à 16. Martij ad 4. Aprilis adductæ, si præsertim dierum

I I.

1 itinera à marginibus non nihil remota sumantur, faciant lineas ab Ecliptica fere æquidistantes; quodsi circa margines ad eandem aliquantulum accesserunt, vel
 5 ab eadem non nihil recesserunt, facilis poterat esse suspicio id ex lapsu aliquo in obseruando admissio contingere potuisse cum eo tempore, nec tam multæ, nec tam exquisita cura examinatæ essent obseruationes, quæ firmarent assensum pro veritate.

10 E contra epistola eadem pag. 50. nu. 5. dicitur *Lis esse amplius vix potest an inæqualiter moueantur (Macula)* cum tam sepe id modo deprehenderim &c.

15 Ex his ergo liquet, rametsi in Motum Macularum Apelles Eclipticæ parallelum inclinauerit, assumptam tamen cum dicta cautione tunc opinionem veritati subsequere nihil officere.

20 Primo Quia adhuc in via inquisitionis fuit.

Secundò Quia non sine aliqua oppositi formidine sententiam protulit.

25 Tertiò Quia ad Disquisitiones accuratiores, obseruationes diuturniores sese retulit; & sic quidquid in ijs erat inuenturus, approbaturus, & statuturus, etiam tum implicitè & virtualiter habebat, atque profitebatur. Viso enim in auctographis obseruationum suarum sensim itinera Ma-

30 cularum in diuersas partes deduci, nec ausus est ijs statim adherere, nec tamen ita etiam contradicere voluit, vt errores certos reputaret: voluit ergo cautus in medio procedere, donec obseruandi continuato habitu, & obseruationibus per plura examina expensis, veritatē liquidò agnosceret: id quod anno 1612. circa Aprilem tenuibus initijs & Septembrem maxime

35 patentibus indicijs contigit: quod deinde postliminio in omnibus mensibus & obseruationibus etiam primis tanquā in semine est ab ipso animaduersum: nequid in Apellis obseruationibus dumtaxat veritatem habet, sed in quorumcunque alijs rectè institutis, imo in ipsius quoque Censoris, quando Apelles eas rite à se digestas cum suis olim Ingolstadij contulit. Itaq; quidquid Apelles posterioribus 15. & pluribus annis de Motu Macularū solariū, de loco, atq. situ, vniuersimq. de toto hoc Phæno-

40 45 50 55 quoque in Tabula ipsius prima implicitè inesse

Vnde opinio
 Motus Eclipticæ parallelus irrepsit.

Macularū motus inæqualis Apellis certus.

Cur Apelles in Motu statuendo, tam lentus, & cautus fuerit.

Apelles in sua Tabula Motum apparentē Macularum, eiusque ad Eclipticam situm, nunquam pro certo decidit sed semper in obseruationibus & disquisitionibus futuras reseruauit.

I.

*Tota Rosa
Vrsina est
vna eadēq;
tot annispi-
eta Apellis
Tabula.*

inesse censendū est, in qua inerāt obserua-
tiones ex arte productæ, in quibus id vir-
tute continebatur, & quia ad illud ipsæ
toties prouocarunt. est enim vnā eademq;
Tabula, vna eademque pictura, sed con-
tinuata. Sicut autem prima picturarū li-
neamenta ordinariē crassiuscula, neque
multum concinna, aut eleganti propor-
tione inter se connexa exarantur; super-
uenientibus deinde coloribus, atque arti-
ficiofa luminum vmbrarumque mixtura,
quæ videbantur inconcinna, imo extra
lineam excurrentia, penitus oblitterantur:
sic nemo mirabitur, si Tabula Apellæ
nunc multò venustior prodeat, vt in alte-
ram quodammodo abiisse videri possit ef-
figiem; hæc enim natura picturæ est, vt
quamuis ex delineationibus primis omnia
prodeant, ipsæ tamen in absoluta imagi-
ne vix nisi ab oculatoribus aduertantur;
quod & plantis solenne est, in quibus ra-
dices, vnde initium & vigor, latent, dum
reliqua ex illis enata in lucem prodeunt
& spectantur.

*In prima
Tabula A-
pellæ deli-
neatione om-
nia tanquā
in semine
& radice
comprehen-
debantur.*

Quidquid igitur in tertio, & quarto
Rosæ Vrsinæ plantario efflorescit, id to-
tum Tabulæ Apellis continuatæ acce-
ptum refertur, illic enim promittitur, &
promissum hic exhibetur. Igitur illi ad-
scribendus est Motus Macularum Sola-
rium, è parte rei nunquam rectilineus,
sed semper curuilineus inuentus, Eclipti-
cæ nunquam parallelus: neque omnium
Macularum inter sese parallelus: neque
æqualis, sed vna altera sæpe velocior: &
quod Soli omnes insunt; & transitus sub
Sole inæqualis &c. Et hæc ad probationem
Minoris primi syllogismi dixisse sufficiat,
quæ erat; *Ea quæ Phenomeno huic Solari
essentialiter conueniunt, in sua Tabula hu-
cusque continuata habet Apelles.* Patet er-
go illius Conclusio quæ erat: *Ergo neque
Apelles suam Tabulam à Censore tran-
stulit, neque Censor Inuentoris Phenomeni
huius Solaris prærogatiua dignus est.* Id
quod erat demonstrandum. Si quid

*Censor non
gaudet Pha-
nomeni So-
laris inuen-
ti Titulo.*

tibi Amice Lector occurrit,
quod contra dicta facere
videatur, sustine ad
finem vsq; Ca-
pitis sequē-
tis.

II.

EX APELLIS TABVLA ET HISTO-
*ria Censoris, Phenomenoq; Solis in-
eis descripto, eadem quæ prius
probantur, & principales*

*Censoris errores circa
hoc Phenomenon
indicantur.*

CAP. X.

Non tam est animus, hic aduersa-
rium inuadere, quàm me ab il-
lius iniurijs tutari. Cum enim
sui Phenomeni, suorum laborum, suæ do-
ctrinæ inuasorem me & vsurpatorem va-
nissimè constituerit: Si ostendero ipsius
Phænomenon à meo, ipsius doctrinam à
mea, ipsius sententias, & assertiones à
meis, toto Sole, ne dicam toto Cœlo abi-
re; imo non aliter distare quàm *Verum à
Falso, Scientiam ab Errore, à Figmentis
Experientiam, à Nihilo Aliquid, à Malo
Bonum:*

Si hæc, inquam, Sole clariùs demon-
strauero; nonnè ab ipsius iniurijs peni-
tissimè me exonerabo? Hoc autem effi-
ciam, in medium prolatis Erroribus ipsius,
Veritatibus contrarijs meis; quas cum
non tantum nunquam admiserit, sed per-
ticipatissimè cæco mentis impetu oppu-
gnauerit; falso sibi ablatas clamat. Tu
quicumque Veritatis studio traheris, An-
titheses hæc perlustra oculis, mète rumi-
na, postquam paucula pro merito causæ
præmissa hæc percurreris. Nam parum est
& ignosci potest frequenter, rem aliquam,
præsertim nouam, præsertim difficilem,
& abstrusam, scituque lubricam ignorari
ab eo, qui illius scientiam sibi non vendi-
cat, neque aliunde habere tenetur: at qui
sibi non tantum illius rei cognitionem at-
tribuit, sed insuper Inventionem, & qui-
dem primam arrogat, Solique scientiæ
totius plenitudinem, exclusis alijs, diui-
nitus decretam sibi vanissimè persuadet;
is si in ijs, quæ ad naturam rei illius con-
stituendam pertinent intelligendis defi-
ciat, & neque necessaria quidem pene-
trasse deprehendatur; merito ab omnibus
tanquam rana Oesopica flatu nimio tur-
gescens, irridetur, & inter Ardeliones non
postremo loco numeratur.

Quod si præter ignorantiam accedat
etia n

I.

etiam praua animi dispositio, vt circa rem ignoratam insuper grauiter passim erret; attribuendo eidem, quo caret, auferendo quod habet; & recte sentientes culpet, atque à vero in falsum seducere moliatur quoscunque; hoc demum intolerabile est, neque solum immerentes ab eius calumnijs absoluit, sed illum pro Inuentore sophisticum deprauatorem Phænomeni constituit. Insinuata sunt non pauca precedenti Capite, quæ ignorauit Censor circa Phænomenon Solare, & quidem præcipua: nunc ad errores patefaciendos progredior: qui cum sint & numero multi, & graues magnitudine, singulos non prosequar, sed capita rerum, & scaturigines summam tangam: è singulis enim alij quamplurimi tanquam ex Hydra lerna propullulant. Vt autem res ordinate ob oculos ponatur, in serie sinistra respectu Legentis, colloco fallacias Censoris, in dextra veritates Apellis.

ANTI THESSES

CENSORIS ET APELLIS.

*Ex opinione Censoris,**Ex sententia Apellis.**Error contra Phænomenon.**Veritas secundum Phænomenon.*

1 Poli super quos, & axis circa quæ, Maculæ quasi menstruè voluuntur Fixi.

1 Idem semper mobiles.

2 Idem iacēt semper in apparente Solis circulo.

2 Idem eundem bis tantum in anno & momentaneè insident.

3 Axis Macularum ad circulum & lineam Eclipticæ semper rectus.

3 Idem ad circulum Eclipticæ nunquam, ad lineam bis tantum in anno, & instantaneè rectus est.

4 Motus Macularum apparens omnium & singularum semper rectilineus.

4 Idem ex parte rei semper curuilineus, ad sensum bis in anno tantum rectilineus.

5 Motus omnium & singularum

5 Idem nunquam fit, nisi quando

II.

1 *Ex opinione Censoris.* *Ex sententia Apellis.*

Error contra Phænomenon.

Veritas secundum Phænomenon.

5 Macularum in diuersis circulis delatarum, inter se parallelus.

Maculæ ad sensum incedunt rectilineæ.

10 6 Motus omnium & singularum Macularum ad Eclipticam parallelus.

6 Idem ad eandem nunquam parallelus, sed semper est obliquus; seu rectilineus appareat, siue curuilineus.

15 7 Omnium & singularum Macularum motus apparentes inter se, sunt similes & proportionales, constantes & regulares.

7 Idem, exceptis rectilineis semper dissimiles & non proportionales in diuersis facti circulis.

25 8 Omnium Macularum apparentes motus inter se sunt durationis eiusdem.

8 Idem exceptis rectilineis, durationis semper sunt inæqualis.

30 9 Omnium motuum apparentium interualla seu ab vna, siue à pluribus Maculis decursa temporibus æqualibus, in parallelo eodem inter se sunt vt sinus versi arcubus æqualibus subtensi proportionalia, & durationis eiusdem.

9 Eadem, excepto motu rectilineo, ad sensum nunquam sunt proportionalia, neq. durationis eiusdem, nisi casu fortasse rarissimo.

45 10 Quotcunq. Maculæ simul ortæ, simul occidunt.

10 Nunquam, nisi in motu rectilineo & neque hic semper, aut casu extraordinario.

50 11 Quæcunq. Maculæ simul occubunt, simul quoque exortæ fuerunt.

11 Nunquam, nisi in casu extraordinario, vel motu rectilineo.

55 12 Maculæ simul oriætes, vel sub eodem

12 Sæpe seruant, sæpe etiam non seruant

I.

II.

*Ex opinione Cēforis.**Ex sententia Apellis.**Ex opinione Cēforis.**Ex sententia Apellis.**Error contra Pha-
nomenon.**Veritas secundum
Phænomenon.**Error contra Pha-
nomenon.**Veritas secundum
Phænomenon.*

dem meridiano
existentes, ean-
dem semper ser-
uant inter se vs-
que ad occasum
distantiam.

13 Omnes Maculæ
in eodem paral-
lelo delatæ, eadē
aguntur veloci-
tate &c.

14 Si Macula ali-
qua rediret, vel
perennis esset,
semper in eodē
loco Solis orire-
tur & occumberet.

15 Quævis Macula
in parallelo ma-
ximo delata, sem-
per versatur in
Ecliptica.

16 Quævis Macula
per centrum So-
lis transiens, in-
cedit sub Eclipti-
ca & parallelo
maximo.

17 Nulla Macula
Borealis fieri po-
test Australis, &
vice versa, nulla
Australis Borea-
lis.

18 Parallelus maxi-
mus nihil in Au-
stro, nihil habet
in Borea, sed est
medius, cum E-
cliptica coinci-
dens, in apparen-
te Solis circulo.

Motus

uant, & ad se vel
conuergunt, vel
à se diuergunt sen-
sibiliter. sunt in
promptu exem-
pla plurima.

13 Ordinariè hoc
fit, sæpe tamen
contrarium eue-
nit, sunt in prom-
ptu exēpla plu-
rima.

14 Macula quæli-
bet redux siue
perennis, nun-
quā nisi post 6.
ad summum mē-
ses, eodem loco
oriretur vel oc-
cumberet.

15 Nulla vnquam
Macula in paral-
lelo maximo de-
lata incedit sub
Ecliptica.

16 Nulla Macula
Centrum Solis
transiens incedit
vnquam sub E-
cliptica, neque
in parallelorum
maximo, nisi
quando motus
sunt rectilinei
bis in anno.

17 Plurimæ Macu-
læ ex Austro in
Boream, ex Aquilone
transeunt in
Australium.

18 Parallelus maxi-
mus semper ali-
quam partem in
Austro, aliquam
habet in Borea,
nihil in medio
nisi vel vnum pū.
etum, vel vnam
tantum lineam,

in

*Ex opinione Cēforis.**Error contra Pha-
nomenon.*

19 Motus Maculæ
in parallelo ma-
ximo delatæ, est
semper æqualis
duratione, cuius-
cunque Maculæ
motui in paralle-
lo minore dela-
tæ.

20 Omnes Maculæ
per Telescopium
circulo observa-
torio in charta
designato inclu-
sæ, eandem tam
inter se, quàm
ad circulum ob-
servatorium ha-
bent magnitudi-
num, situum, at-
que distantiarū
rationem ad vn-
guem, quàm eadē
in Sole, tam
inter se, quàm ad
Solem.

21 Quæcūque Ma-
culæ in suo sub
Sole decursu per
centrum tran-
seunt vel breui-
simam à Centro
distantiam equa-
lem successiue,
& versus eundē
polum nanciscū-
tur, sunt in eodē
parallelo.

22 Duarum Macu-
larum, in eodem
parallelo delata-
rum, distantie
apparentes inter
se sunt æquales,
distantie autem
veræ

22 Idem est maior,
Maculæ motu
versus polum la-
tentem delatæ,
minor versus pa-
tentem: idque si-
ue in Austrum,
siue in Boream.

in eodem Solis
apparente circu-
lo.

19 Idem est maior,
Maculæ motu
versus polum la-
tentem delatæ,
minor versus pa-
tentem: idque si-
ue in Austrum,
siue in Boream.

20 Nullæ Maculæ
circulo observa-
torio dicta ratio-
ne inclusæ, ean-
dem tam inter
se, quàm ad cir-
culum observa-
torium habent
magnitudinum,
situum, atque
distantiarum ra-
tionem, neque
ad sensum quidē
multò minus ad
vnguem, quàm
habent eadē
in Sole, tam in-
ter se, quàm ad
Solem.

21 Eedem Maculæ
ijsdem positæ,
sunt in diuersis
atque inæquali-
bus parallelis.

22 Ijsdem positæ,
distantie veræ in-
ter se, semper &
necessariò fiunt
inæquales pro-
pter refractionē;
sæpe etiam pro-
pter

I.

*Ex opinione Censoris. Ex sententia Apellis.**Error contra Pha- Veritas secundum-
nomenon. Phenomenon.*verè inter se sunt pter motus am-
semper æquales. barum inæqua-
les.

23 Si per Maculam 23 Iisdem positis,
centro vicinissi- linea illa neque
mam chorda a- erit motus appa-
gatur, quæ à Ma- rentis vestigium,
cula bifariam se- neque motus ve-
cetur, seu quæ à ri diameter. Cur-
recta centrum & uitas & refractione
Maculam necesse obstant: fietque
te ad rectos se- circulus semper
cetur, illa erit nō vero vel maior
tantum totius in itineribus cō-
cursus apparētis uersis, vel minor
vestigium itine- in concavis ver-
rarium, sed etiā sus centrum: in-
re uolutionis in- solis motibus re-
tegræ & motus ctilineis aliquid
veri diameter. obtinebitur.

24 Præter motum 24 Pleræq. istæ ir-
mensuræ appa- regularitates ap-
parentem regu- parentes in mo-
larem rectilineū, tu Macularum,
vniformem, reli- proueniunt ex
quas omnes in motu annuo re-
motu apparen- gulari, vniformi,
tias, declinatio- nonnullæ indu-
nes, exorbitatio- cuntur à refra-
nes, &c. vocat ctione; aliqua
Censor, Altera- sunt propriæ, &
tiunculas, mi- hæ ipsæ quoque
nutias, motus in- plerumque ordi-
ordinatos & ir- natissimæ.

Habes Lector breuem capitalium erro-
rum non tamen omnium Catalogū, quos
Censor in suis litteris historicis vel expres-
sis verbis consignauit, vel qui sententias
& praxes ipsius in hoc negotio immédia-
tè atque necessariò consequuntur. Et li-
cet nonnullos in priore Capite ad longum
adduxerim; tamen vt vno quasi obtuitu
videas vnde sumpserim illos, adiunxi lo-
corum præcipuorum ex Historia annota-
tionem.

Nam primus expressè habetur epistola

II.

secunda pag. 33. Item epistola tertia pag.
103. vers. 1. Item pag. 118. circa finem,
& pag. 119. initio.

Secundus, Deducitur necessariò è di-
ctis locis. Item ex praxi pag. 36. & 37.
epistola secunda. Item epistola tertia
pag. 118. circa finem, & pag. 119. initio.

Tertius, Habetur expressè epistola ter-
tia, pag. 103. initio, & deducitur ex epist.
2. pag. 37. initio.

Quartus, Habetur expressè epistola
tertia, pag. 102. vers. ult. & pag. 103. vers.
1. Item epistola secunda pag. 32. vers. 10.
11. & pag. 33. post medium. Item pag.
36. vers. penult. & ult. ex praxi. Item epist.
3. ex praxi pag. 118. 119.

Quintus, Habetur & deducitur ex locis
citatis, errore quarto.

Sextus, Habetur expressè epist. 2. pag.
37. initio.

Septimus, Exprimatur epistola secunda
pag. 32. vers. 10. & 11. & ex dictis neces-
sariò sequitur. Item pag. 50. vers. 4. Item
epistola tertia pag. 128. circa finem.

Octauus, Habetur ex dictis, & clarè di-
citur epist. 3. pag. 116. vers. 14. 15. &c. Item
pag. 119. Item pag. 125. vers. 7. Item pag.
129. post medium. Item pag. 131. vers.
12.

Nonus, Habetur expressè, epist. 2. pag.
35. à vers. 5. &c.

Decimus, Sequitur ex octauo.

Vndecimus, Sequitur ex octauo.

Duodecimus, Sequitur ex quinto &
sexto. & habetur expressè epistola secun-
da pag. 42. circa finem, & 43. ad initium.

Decimustertius, Habetur epist. 2. pag.
36. vers. 18. &c.

Decimusquartus, Sequitur ex priore.
& habetur expressè epistola secunda, pag.
49. vers. 19.

Decimusquintus, Habetur epist. 3. pag.
117. vers. 17. Item vers. 26.

Decimussextus, Sequitur ex sexto. & p.
33. epist. 2. post medium, & passim in Hi-
storiæ epistolis.

Decimusseptimus, Sequitur ex quinto
& sexto, & passim innuitur in Historia.

Decimus octauus, Sequitur ex sexto.
& alijs.

Decimusnonus, Epist. 3. pag. 119. & de-
inceps, & sæpius alibi.

Vigessimus, Epist. 1. pag. 28. vers. 19. ep.
2. pag. 31. vers. 13.

Vigessimus primus, Epistola secunda, pa-
gina

I.

gina 36. vers. 20. 21. & 22.

Vigesimalsecundus, Epistola secunda, pag. 36. 37. 38. 39. &c. & sequitur ex prioribus.

Vigesimaltertius, Epistola secunda, pagina 36. circa finem. epist. 3. pag. 118. circa finem ex praxi.

Vigesimalquartus, Epistola secunda, pag. 43. vers. 11. Item pag. 49. vers. 23. epist. 3. pag. 142.

Hi errores sunt ca-

pitales, & Phæ-

nomenon Solare

euertit penitus,

cuiusque proprie-

tates vastant, &

scientiam fundi-

tus eliminant.

Vnde necessariū

Cēlori fuisset vt

antequam ista

tam asseuerāter

toti mundo ob-

truderet, suū

Angelum melius

confuleret, priui-

legium cōstitutū

sibi concessum

penitus introspi-

ceret, scrinia &

adyta Phæbæ

fultraret accura-

tius; vt inde ve-

lur ē Tripode

Delphica, tan-

quam nouus A-

pollo contra A-

pellē ex suā sciē-

tiā plenitudine

oracula veriora

detonaret, & ful-

minaret iacula

certiora.

Porro vt dictorum errorum absurditas & foecunditas ob oculos euidentissimè ponatur, ostendo hoc exemplo practico, & trium Macularum a, b, & c, cursus a, a, a, b b b, c c c, Solari circulo A a B C inclusos in medium statuo. Quorum primus a a a obseruatus est à me anno 1626. à die 30. iunij ad 12 Iulij. fuitque curui-

lineus, borealis, conuexus versus Eclipti-

cam AB, & centrum C, concauus ver-

Hæ sunt Veritates,

& Phænomeno

Solari huic ita

insitæ, vt absque

ipsis neque con-

sistere neque in-

telligi vnquam

valeat. Hæce

veritates, Apel-

les post Tabulā

suam latens, per

quindecim an-

norum curricu-

lum, cura, stu-

dio, labore, vi-

gilantia indefes-

sis, ex ipso Sole

acceptas, erutas,

examinatas, ven-

tilatas, trutinā-

tas, & probatas,

solidas atque cō-

stantes repertas,

nunc denuo Or-

bi vniuerso ex

Urbe contem-

plandas propo-

nit.

II.

1 sus polum boreum patentem. Prima obseruatio contigit die 30. Iunij hora matutina $7\frac{1}{2}$. Vltima, die 12. Iulij hora vespertina $5\frac{1}{8}$. Itaque à prima obseruatione ad vltimam intercessere dies 12. horę 10. scrupula 7. siue $\frac{1}{8}$ horę.

5 Quia verò vtrinque aliquantulum intervalli inter Maculam & limbum residui fuit, si demus cuilibet 7. vel 8. horas; aut summum 10; vt certo constabit ex dicendis, vbi de duratione motus Macularum agemus; tunc apparens cursus Maculæ a, fuit dierum 13. horarum 6. circiter. Macula secunda b, obseruari coepit anno 15 1625. à die 23. ad 29. Maij, cursu ad sensum quasi rectilineo, ad Eclipticam non parallelo sed inclinato. Motus ipsius est dierum tredecim circiter. Vide obseruationum imaginem.

20 Macula tertia, c, reperitur in Obseruationum imagine, quæ facta est mense Decembri anni 1625. & Ianuarij anni 1626. Prima obseruatio peracta est die 22. hora matutina 11. circiter, vltima die 1. Ianuarij, hora matutina 9, scrupulis 22. igitur à prima obseruatione ad vltimam elapsi sunt dies fere decem, quibus si adijciatur id quod debetur intervallis vtrinque marginalibus, peruenietur plus minus ad dies tredecim. Tractus huius curriculi est curuilineus concauus versus centrum C, & eclipticam AB, nec non polum Australem eleuatum. conuexus in partem Borealem. Trium istarum Macularum à centro C apparentes, distantia vicinissimæ Cd, & Ce inter se sunt animaduersæ æquales; quare, per ea, quæ Censor epistola secunda, à pag 36, ad 42. vsque, & alibi passim, vt in errore 23, est annotatum, contra Apellem fusissimè disputat;

40 Primò, Tres isti cursus a a a, b b b, & c c c, sunt descripti ab vno parallelo: quod est impossibile.

Secundo, Circa vnum axem, qui sit ad Eclipticam rectus, cuius poli sint fixi in circuli Solaris perimetro: quod est impossibile.

35 Tertiò, Erunt omnes rectilinei: quod est impossibile.

50 Quarto, Omnes inter se æquales, imo quodammodo iidem: quod est impossibile.

Quintò, Omnes ad Eclipticam AB, paralleli: quod est impossibile.

55 Sextò, Erunt omnes rectæ & curuæ aia,

Absurda & impossibilia ex unico Censoris errore.

M.DC.XXVI.

In Collegio Romano Societatis



Curfus Maculae a, observatus à 30. Iunij, ad 12. Iulij. Iunij, 30. m. h. $7\frac{1}{2}$ O. d. 34. 20.

A, Oriens.

AB, Ecliptica.

B, Occidens.

Deteguntur Errores Censoris, in exemplis practicis

Iulij.

D—H—O, E. I.

1. m. $7\frac{1}{4}$ — 30. 40.2. m. $7\frac{1}{4}$ — 31. 0.

3. m. 7. — 27. 40.

4. m. $7\frac{1}{2}$ — 32. 30.5. m. $6\frac{4}{5}$ — 25. 0.6. m. $8\frac{1}{5}$ — 40. 0.7. m. $7\frac{1}{3}$ — 30. 40.

D—H—O, E. I.

8. m. 8. — 38. 0.

9. m. $7\frac{1}{4}$ — 29. 25.10. m. $7\frac{1}{2}$ — 32. 0.11. m. $7\frac{3}{4}$ — 34. 30.12. m. $7\frac{1}{4}$ — 29. 30.12. u. $5\frac{5}{8}$ — 19. 30.

I.

aia, aaa, bdb, feg, che; inter sese singillatim quaelibet cuilibet aequalis. *quod est impossibile.*

Septimò, Erunt segmenta arcuum Ac, & Bc, inter se aequalia; item Af, & Bg; item Ab, & Bb; item Aa, & Ba; *quae tamen omnia sunt impossibilia.*

Octauò, Erunt arcus Ac, Af, Af, Ab, Aa, inter se omnes singillatim aequales. *Quod est impossibile.* Similiter oppositi Bb, Ba, Bc, Bg, singuli singulis aequabuntur; *quod est impossibile.*

Nonò, Recta Ch, aequabitur rectae Ce; & recta Cd, rectae Ci; *quod est impossibile.* Quod autem haec impossibilia

Dicta Impossibilia ex mente & doctrina Censoris sequi, clarè demonstratur.

omnia & singula ex mente & sententia; atque praxi Censoris sequantur, est euidens; quia ipse ponit omnium parallelorum vnicum axem, in circulo Solari per centrum C ad Eclipticam AB, rectum & immobilem; omnes deinde motus Macularum eidem parallelos; vnde necesse est eisdem vnica linea recta in Solis circulum projici, ideoque si quarundam Macularum à centro C distantiae breuissimae sint aequales, necessariò infertur ipsas in eodem parallelo ferri. Vnde omnium dictorum aequalitates rectè inferuntur, quia distantiae Cd, & Ce, per quas Maculae, a, b, & c in eadem Boreali plaga cucurrerunt, inter se sunt repectae aequales.

Decimò, In cursibus Macularum curuilineis erga centrum conuexis, qualis est aaa, semper assumetur conuersionis periodicae diameter aequo maior; *quod est absurdissimum.* Nam secundum praxim, & doctrinam Censoris, curriculi aaa, inuenitur diameter bdb, quae maior est quam chorda aia; haec autem maior est, quam vera huius curriculi diameter: igitur bdb multò maior eadem.

Vndecimo, In iisdem curriculis reperitur periodicæ reuolutionis ambitus, multò maior aequo; *id quod est absurdissimum.* Sequitur ex priore. ad maiorem enim diametrum describitur maior circumferentia.

Duodecimò, In iisdem omnibus, reperitur necessario longior quam par sit duratio. Sequitur ex priore. vbi enim maior ambitus circuli assumitur, si mensureretur is interuallo diurno circuli minoris, utique saepius illud continebit quam

II.

1 minor. duratio igitur iusto fiet maior &c. *quod est longè absurdissimum.*

Decimotertiò, In cursibus Macularum curuilineis ad centrum concauis semper inuenietur diameter aequo minor, *Quod est absurdissimum.* Vt videre est in cursu ccc, cuius tangens feg, inuenta est diameter minor chorda chc, quae tamen adhuc minor est diametro vera eiusdem circuli ccc, igitur fdg, multo minor est diametro eadem. Quia quod minus est minore, multo magis minus est maiore.

Decimoquartò, In cursibus iisdem, eadem via Censorina elicitur integrae lationis perimenter debito minor. *Quod est maximum absurdum,* deducitur ex antecedente. nam minor diameter exigit minorem peripheriam.

Decimoquinto, Via eadem Censorina, inducitur in Cursus eisdem duratio minor iusto: quia mensura durationis, iusto minor assumitur. *Et hoc rursus inter maxime absurda est annumerandum.*

Decimosexto, Via Censorina, in Cursibus ad sensum rectilineis, diametri, lentius refractione, semper iusto sunt maiores. semper peripheriae iusto maiores fiunt. semper duratio aequo amplior eruitur. semper mensura magnitudinis & durationis nimis parua adhibetur. *Quae omnia & singula absurditates disciplinis Mathematicis indignissimas continent.*

In exemplis elucescet euidencia. Quia enim cursus aaa ex obseruatione & accurata obseruationum digestionem inuentus est eo ad Eclipticam AB situ, quo hic in schemate representatur, nimirum flexu curuilineo ad centrum C conuexo, sequitur necessariò, si duae extremae & marginales stationes Maculae a, orientatissima ex parte A, & occidentalissima ex parte B, à centro C aequaliter remotae, connectantur recta linea aia, hanc lineam totam casuram extra totum iter curuilineum aaa, in circulum Solarem proiectum, & hoc totum casurum inter Eclipticam AB, atque dictam aia. Quare perpendiculares Ci, secabit tam rectam aia, in i, quam arcum itinerarium ada, in d, bisariam; eritque recta Cd, minor quam recta Ci, ideoque ducta tangens bdb, per punctum d, erit maior quam chorda aia. quapropter si rectae ia, ex centro C, abscindatur

Absurdorum & Impossibilium Censorinorum euidencia, in exemplis digito monstratur.

I

datur æqualis CD , & semissi db itidem æqualis CE , atque ad interualla describantur semicirculi $DFGH$; $EIKL$, erit hic maior illo. Cumque iter aaa , sit segmentum Circuli in hemisphærio solari conspicuo inter Maximum parallelum, & polum conspicuum interceptum, erit illud per 19. Theodosij, l. 2. Semicirculo maius.

Si igitur vtriusque ambitus eadem mensura diurna FG vel IK percurratur, inuenientur in minore DFH , dies 13, & horæ 21. in maiore EIL , dies 14, horæ 6. igitur excessus quo maior minorem superat est horarum 9. qui si duplicetur, habebuntur in vna integra periodo 18. horæ plus quam deberent esse, ex praxi Censorina, etiamsi refractionis negotium & alia multa dissimulemus. Tot autem horæ, respectu vnius ambitus totius, dierum 28. horarum 12. qualis circuli maioris EFL esset, qualemque Censor ordinariè solet statuere, si conuertantur in gradus & minuta, efficiant gradus 9. minuta 38. Tantus autem error in magnitudine graduum 9. & semis, eoque amplius in duratione horarum octodecim, etiam in Tyrone Astronomiæ, intolerabilis est; nedum ut in *Viro hac nostra ætate vnicè harum scientiarum perito*, illum feramus.

Iam sicut in cursu conuexo aaa , ex praxi Censoris omnia veris maiora, ita in concauo ccc , omnia reperiemus minora. Nam perpendicularis Ce , tangentem $fe g$, bifariam diuidens, est maior quam Ch , ad chordam $ch c$ perpendiculari. & ideo chorda $ch c$, centro vicinior, quam tangens $fe g$; vnde hæc illa minor. Cum autem curriculum ccc , incedat inter polum occultum & parallelorum Maximum, erit eius arcus segmentum minus semicirculo, per 19. l. 2. sphaericorum Theodosij. chorda igitur $ch c$, minor est quam vera diameter: tangens ergo $fe g$, multo est minor eadem diametro vera.

Igitur semicirculus ad interuallum fe , id est CE descriptus, est minor semicirculo MNO , qui descriptus est ad interuallum CM , seu hc , estque defectus illius ab hoc in duratione, horarum sex. Integra autem reuolutio facit horas duodecim in duratione; gradus autem sex, minuta vigintiquatuor, in magnitudine.

II.

1 Qui rursus est error tam glorioso *Astronomo*, diuinitusque præ reliquis priuilegiato nimis probrosus.

Itaque cum in vno & eodem parallelolo prodeat ex praxi Censorina ambitus quandoque iusto maior, quandoque iusto minor; si in allatis exemplis comparationem instituiamus, inueniemus extremorum DFH , & MNO , distantias esse in duratione horarum vigintiquatuor, in magnitudine graduum sexdecim plus minus. Qui errores in rebus Astronomicis vbi de minutis contenditur inter doctos, veniam nullam vnquam merentur, in eo præsertim, qui hac nostra ætate sese solum & vnicum omnium celestium *Novitatum Inuentorem*, & *Doctorem omniscium venditat*.

Ad cursum bbb quod attinet, fuit iste quidem sensu ferme rectilineus, ideoque cum arcu quem in parallelo decurrit coincidens, nihilominus tamen, propter refractionem à lentibus causatam, in periodicam Macularum conuersionem, non tutò deducens: prout suis libris & locis fusè ostenditur. Nunc ex hisce strictim decursis (nam sexcenta, prudens transilio, sagaci Lectori facile eruenda) deducamus quædam.

COROLLARIA.

35 PRIMVM, Censor in assignanda vnius periodicæ reuolutionis mora, statuit dies plerumque vigintinouem, nam dimidio dedit ordinariè dies quatuordecim & semis: cuius duplum facit dies vigintinouem. Huius autem erroris sunt tres luculentæ causæ.

40 Prima, Quia ipse assumpsit in examen cursus Macularum A , & B , qui fuerunt segmenta semicirculo maiora.

45 Secunda, Quia exposuit illos per Circuli Solaris chordas, cursus punctum centro proximum, tangentes, quæ chordæ sunt multo maiores verà cursus diametro &c.

50 Tertia, Quia assumpsit distantiam diurnam centro vicinam pro mensura, quæ respectu diametri refractæ atque nimium protensæ, subtendit arcus nimis paruos, cum ipsa iuxta centrum sensibili refractione careat, ideoque minor sit, quam

E alia

Errores Censorini apud Astronomos. venia indigni.

Corollarium primum. Cur Censor in assignanda Macularum periodo errauerit

aliae portiones marginibus viciniore,
quae propter lentum refractionem maio-
res fiunt, quam centro vicinae. Cum
igitur haec causae singulae efficiant Cursus
Macularum periodicos nimis magnos,
quid facient simul vniuersae?

SECVNDVM, Cum itineraria
Macularum curuitas ignorata & negle-
cta, tantam pepererit Censori à veri-
tate aberrandi occasionem, maior crea-
bit errores maiores, quia curuitas ma-
ior, tangentem centro magis vel minus
coniungit; unde in Septembri, & Mar-
tio oportet contingere maximos lapsus
secundum praxim eiusdem, in tota sua
Historia contra Apellem usurpatam.

TERTIVM, A Decembri ad Iu-
nium usque, Macularum Borealiū
cursus apparentes semper inueniuntur mi-
niores iusto, Australium semper maio-
res. A Iunio vero ad Decembrem, cur-
ricula Macularum Borealia semper eruen-
tur iustis maiora; Australia minora, se-
cundum viam Censorinam.

QVARTVM, Et quia ex hisce
liquido constat Censorem apparentem
Macularum motum ignorauisse, & fal-
sum finxisse; patet omnia ea quae in
epistola secunda, & alibi passim, prae-
sertim verò pag. 36. 37. 38. 39. 40.
41. &c. ad finem ferme disputat, &
hisce falsis fundamentis superstruit, i-
nania, falsa, nulla, erroribus plena, pseu-
dographa, atque paralogistica esse, vna-
que litura emendari.

QVINTVM, Pari modo omnia
quae Censor epistola tertia à pagina cente-
sima decimatertia, usque ad paginam cen-
tesimam trigesimam secundam de motu,
loco, & duratione motus Macularum,
contra Apellem fusissimè disputat, &
nonnullis in medium adductis pseudo-
graphijs demonstrare conatur, aut fal-
lacia sunt & sophismatis plena, aut ex
falsis suppositionibus, falsa, vel certè ad
rem aliena concludunt.

Nam Censor ex hac sua praxi, & Ma-
culas exponendi ratione, inaequalitatem
morae nolens volens admittebat, aut certè
sciens vidensque situs & loca Macularum
obseruata adulterabit: & nihilominus ta-
men veritatem Phænomeni, non eludet,
multo minus illidet. Nam quod ipse ad
suas exorbitantias, & proprias Macula-
rum alteratiunculas confugiat, non est;

hinc enim.

SEXTVM, Ego deduco Corolla-
rium, istas alteratiunculas & diuerticu-
la Macularum, ex eo Censori inter obser-
uandum obrigisse, quod ipse nescierit
Macularum situm, & locum ad Eclipti-
cam ordinare: hoc enim facto, statim
vidisset motum illarum curuilineum, eū-
que variabilem, neque rectilineum nisi
ad sensum, eumque bis tantum in anno,
fecisset: atque ex hisce notis ac probatis
suas alteratiunculas, & priuatas Macula-
rum digressiones, nunquam commentus
esset, quia nullas animaduertisset. nunc
autem ex eo, quod curuilineos Macula-
rum motus vult redigere in rectilineos,
quia ipsemet Macularum stationes, quas
in obseruationum designationibus rectè
factis obtinent, repugnant, & per vias re-
ctas incedere nesciunt, curuilineis, iisque
regularissimis assuetæ; criminatur illas
Censor, extra metam saltationes imperi-
tè obiectans; utque suos velet, illis quos
non admiserunt, affingit errores. Quae
cum ita sint, si quis epistolas ipsius, qui-
bus Apellem ventilat attentè lectitaret,
admirabitur incredibilem hominis. cum
tanta coniunctam circa hoc Phænome-
non inscitia ut mitissimè dicam praesiden-
tiam. Quod cum nesciuerit praeteritas,
ausus sit prouocare ad obseruationes fu-
turas.

Habes, Lector, specimen practi-
cum errorum Censoris, cuiusmodi pluri-
ma possem dare; sed nolo abuti tua patiē-
tia, neque ingenio tuo frangere, & liber-
tati manum iniicere: lege Apellem, lege
Historiam Censoris, adde si placet Ro-
sam Vrsinam, & multa videbis, plura
Marte tuo erues. Capita enim ego obi-
tertantum delibo; venas inde progressas
persequi, esset infinitum. Satis mihi esto
si demonstrauerim Censorem Phænomeni
Solaris essentialia ignorauisse: Phænome-
ni Solaris essentialia suis erroribus euer-
nisse; id quod erat exemplis practicis o-
stendendum.

Dices: Censor de materia Macularum
multa differuit, conatus est probare
pluribus, esse quid fumidum, variè so-
lubile & congregabile, in quod verè Phæ-
nomenon inclinat: cum Apelles e contra
videatur sapius contendere, esse corpo-
ra consistentia, ad instar reliquarum stel-
larum.

Ergo

Corollar. 2.
Errores Cē-
sori pro
temporum
ratione cre-
scunt.

Coroll. 3.
Quo tempo-
re, & in qua
Solis plaga
Censor ex-
cessu vel de-
fectu erret.

Coroll. 4.
Pleraq. de-
monstratio-
nes Censoris
cōtra Apellē
in Historia
producta
sunt pseudo-
grapha, &
vna litura
corrigitur.

Coroll. 5.
Quae Cēsor
in 3. epist. cō-
tra Apellem
affert, sunt
eiusdē cum
priorib. fari-
na, & in spō-
giam Apell.
inclabunt.

Coroll. 6.
Ignorātia et
inertia Ma-
culas Sola-
res rectè ex-
ponendi, pe-
perit Cēso-
ri volunta-
rias earun-
dem Altera-
tiunculas.

Inconsulta
Cēsoris pra-
sidentia, dū
ad futuras
obseruatio-
nes prouo-
cat.

Summa de-
monstrato-
rum.

Cēsor Pha-
nomeni So-
laris euer-
sor non In-
uentor est.

I.

Ergo plus videtur attigisse de essentialibus Censor, quàm Apelles.

Obiectioni
pro Censore
facta, satis
fit ex mente
Censoris.

Respondeo primo, Ex mente Censoris nullius substantiæ internam essentiam cognosci posse in hac mortali vita; unde ex eiusdem Censoris sententia, neque plus tribui potest Censori de essentiali Macularum cognitione, quàm Apelli; neque huic minus quàm illi. Sed præstat audire Censoris verba. Epistola tertia pag. 101. sic ait.

„ O noi vogliamo speculando tentar
„ di penetrar l'essenza vera, ed intrinseca
„ delle sustanze naturali; ò noi vogliamo
„ contètarci di venir in notizia d'alcune
„ loro affezioni.

„ Il tentar l'essenza l'hò per impresa
„ non meno impossibile, e per fatica non
„ men vana, nelle prossime sustanze
„ elementari, che nelle remotissime e ce-
„ lesti. E à me pare essere egualmente
„ ignaro della sustanza della terra, che
„ della Luna; delle nubi elementari, che
„ delle Macchie del Sole. Aut enim, in-
„ quit ipse, nos tentamus speculando pe-
„ netrare essentiam veram, & intrinsecā
„ substantiarum naturalium; aut conten-
„ ti sumus venire in aliquam notitiam
„ nonnullarum ipsius insitarum affectionū
„ naturalium. Tentare essentiam, habeo
„ pro conatu impossibili, & fatigatione
„ vana, non minus in substantijs proximis
„ elementaribus, quàm in remotissimis
„ coelestibus. Et mihi æquè ignota ap-
„ paret substantia terræ, atque Lunæ; nu-
„ bium elementarium, atque Macula-
„ rum Solarium. Et circa finem. Ma se
„ vorremo fermarci nell'apprensione di
„ alcune affezioni, non mi par, che sia
„ da disperar di poter conseguirle anco-
„ ne i corpi lontanissimi da noi, non me-
„ no che ne i prossimi, anzi tal'vna per
„ aventura più esattamente in quelli, che
„ in questi, &c. Et pag. 102. ver. 6. Voglio
„ per tanto inferire, che se bene indarno
„ si tenterebbe l'investigazione della su-
„ stanza delle Macchie Solari, non resto
„ però che alcune loro affezioni, come
„ il luogo, il moto, la figura, la gran-
„ dezza, l'opacità, la mutabilità, la pro-
„ duzione, & il dissoluiimento non possi-
„ no da noi esser apprese, & esserci poi
„ mezzi à poter meglio filosofare intor-
„ no ad altre più controuerse condizioni
„ delle sustanze naturali. Latine circa

II.

„ finem. Verùm si volumus nos firmare
„ in apprehensione aliquarum proprieta-
„ tum, non video quomodo debeamus
„ in illis consequendis animum despon-
„ dere, etiam in corporibus à nobis re-
„ motissimis non minus quàm vicinissi-
„ mis, quin imo exactius fortassis in il-
„ lis quàm in istis &c. Et pag. 102. ver.
„ 6. Volo per hoc inferre: etiamsi frustra
„ tentetur inuestigatio de substantia Ma-
„ cularum Solarium; non inde tamen fit,
„ vt aliquas illarum affectiones, cuius-
„ modi sunt Locus, Motus, Figura, Ma-
„ gnitudo, Opacitas, Mutabilitas, Pro-
„ ductio, dissolutio, non possimus ap-
„ prehendere, quibus deinde tanquam
„ medijs quibusdam ducamur ad me-
„ lius philosophandum de alijs magis ab-
„ strusis & controuersis naturalis substā-
„ tiæ conditionibus. hæc ille. & rectè
„ quidem de intuitiua substantiæ cognitio-
„ ne, quam nemo hominum in hac vita v-
„ rique assequitur. In quo sensu obiectio
„ Apellem non ferit.

„ Respondeo secundo, Quod si vel simili-
„ tudinarie vel generaliter de substantia
„ Macularum aliquid ex accidentibus præ-
„ sagiuit aut insinuauit Censor, de re qui-
„ dem litteraria bene meritus est probabi-
„ liter diuinando, sed in hoc neque oppu-
„ gnauit, neque præcessit Apellem scienti-
„ ficè demonstrando: qui licet ipso initio
„ aduerteret quo tandem vergeret Phæno-
„ menon, & non paucis tum amicis, tum
„ discipulis id concederet; coactus tamen
„ est, aut Tabulam nullam proponere, aut
„ suos colores secundum receptam & tunc
„ prævalentem Physicorum normam attē-
„ perare; non obicure tamen sæpius indicat
„ se id ex suo non asserere, & malle relin-
„ quere sub dubitatione: nec te moueant
„ verba, *Necessarium, Impossibile* &c. quia
„ semper intelliguntur ex suppositione co-
„ lumnarum Herculis, quas esset nefas per-
„ transire.

„ Respondeo Tertio, Quod si agamus de
„ Phænomeno, vt eius Tractatio Astrono-
„ mica est, atque ita Mathematicum Profes-
„ fori libera erat; eius essentialia sunt Mo-
„ tus, Situs, Tempus, Figura, Magnitu-
„ do, Ortus, Occasus, Numerus, Locus,
„ & hisce affinia; & in istis passim Ta-
„ bula cum sua Continuatione, Verita-
„ tem, solide assequitur, & probat; Cen-
„ soris positiones sæpius non habent,

Apelli ab i-
nitio non
fuit integrū
liberè de
Macularū
natura &
substantia
philosophari.

I.

per ignorantiam; sæpius destruunt per errores: vt partim constat ex dictis, partim ex dicendis distinctius aduertetur.

Cum enim, vti in allatis exemplis demonstrauimus, ignorauerit motum Macularum apparentem, magnitudinem, & durationem eiusdem; stationes, situs, & loca visa Macularum peruerterit; diametros falsas, periodos erroneas produxerit; etiam motus veros & locos veros nescitos oportuit, vnde de substantia physica earundem ex mente quoque Censoris quidquam certi astrui nequiuit. Quod si quidquam tamen prolixis suis excursibus attigit, id casu, non scientia diuinitus, si credere fas est, sibi infusa, euenisse certo certius est.

Instabis de loco quin tu fateris inter essentialia huius Phænomeni astronomicè tractandi Censorem pluribus demonstratiuè probauisse, illas habere maximam vicinitatem ad Solem, in quod licet Tabula vt primo proposita videretur inclinare, non tamen omnino ex professo aut satis constanter id ostendebat.

Respondeo: Accuratiorem de Loco disputationem atque decisionem examini obseruatorum atque obseruandorum exquisitori ab Apelle fuisse studio reseruatum, prout sæpius id inculcat in sua Tabula; neque id sine fructu aut gratis egit, vt Rosa Vrsina docet. cum hoc sit totius Phænomeni caput principalissimum, sine quo nihil, ex quo vnico omnia, quæ ad substantiam rei pertinent, decidi queant. Censorem autem, licet pro veritate laborasse videatur, malè suis eam fulciuisse pseudographicis schematistis; quibus Maculæ è locis proprijs in aliena transferuntur; ex sitibus inclinatis in parallelos ordinantur; ex incessibus arcuatis ad rectos detorquentur; ex itineribus breuioribus in longiora, ex inæqualibus ad æqualia violenter coguntur. Vnde nihil penitus de vero illarum loco, ex hisce elicere valeas: sed eas à Sole æquè citò ex eius fundamentis amoueas, atque adiungas.

Cum igitur Solis Phænomenon è duobus potissimum constet; ex Maculis & Faculis primarijs, ex ijsdem secundarijs; de hisce, sicut nihil scripsit in sua Historia Censor, ita nihil penitus sciuisse credendus est; alioquin rem tantam præ-

II.

1 rere, boni Historici non est; præsertim cum ex ijs giratio Solis, sphericitas eiusdem, Locus Macularum & Facularum, in superficie Solari longè efficacissime 5 demonstrantur, è reliquis non omnino ita liquidò habeantur.

De prioribus multa verba facit Censor, sed verba. nam rem, oleum, operamque 10 perdit. Quia cum totum Phænomenon, eiusque omnis varietas ex motu annuo atque menstruo confurgat, dum illum nescit, vtrumque imperitè tractando, totum Phænomenon miserandum in modum dilaniat, ei que quæ in rerum natura 15 nunquam fuerunt violenter attribuit. Igitur cum ex ignoratione motus annui, errores grauissimos plurimosque admiserit, motum autem menstruum apparentem & verum longè aliū statuerit, quàm 20 ex parte rei existat; insuper & Refractionem circuli obseruatorij rerumque in eo comprehensarum è lentibus Telescopij oriundam nescierit; patet illum totius Phænomeni Solaris substantiam nucleum & naturam ignorauisse: quia præter 25 Maculas, Faculas, & vmbas, tam primarias, quàm secundarias, nec non illarum motus, & quæ independent; itemque præter Refractionem, & quæ inde consequuntur; vix restat quidquam Astronomica indagatione dignum: quæ omnia & singula cum vel ignorauerit, vel 30 diffimis erroribus deprauauerit Censor, liquet ipsum à veritate huius Phænomeni extorrem, & ab Angelo siue alieno, seu Genio suo in auia seductum esse. Vnde pro Apellis innocentia atque integritate sic rursus argumentari licet.

Ab eo qui Solaris Phænomeni cognitionem necessariam non habet, Apelles 40 illam discere vel abalienare non potuit. Censor non habet Solaris Phænomeni cognitionem necessariam. Ergo Apelles à Censore Solaris Phænomeni cognitionem discere vel abalienare non potuit. Maior est certa. Minor probatur. Quicumque Solaris Phænomeni essentialia, & ab essentia profluentia ignorat, ille non habet necessariam Solaris Phænomeni cognitionem. 50 Censor illa ignorat, vt modo in Catalogo ignorantiarum, & errorum ostensum est. Ergo &c.

Item. Quicumque tuctur opiniones quæ essentiam, & proprietates ab essentia Solaris Phænomeni profluentes, euertunt 55 ille

Phænomeni Solaris necessarijs præcognitis; in verâ Phænomeni cognitione & doctrinam peruenire non potuit.

Apelles locum Macularum tamquam caput totius Phænomeni principalissimum, studio accuratioribus disquisitionibus reseruauit.

Maculas et Faculas secundarias, & quæ inde consequuntur ignorauit Censor.

Dictorum Anacephaleosis.

Syllogismus quo Innocentia Apellis ostenditur.

Syllogismus quo irriti Censoris conatus ostenduntur.

I.

ille non habet necessariam Solaris Phænomeni cognitionem. Hoc facit Censor, ut modò ostensum est in elencho errorum & ignorantiarum &c. Ergo manet probata Minor. Ergo stat Conclusio. Quod Apelles à Censore Solaris Phænomeni cognitionem discere vel abalienare non potuit.

Totius controversia de ciso, equisimo Lectoris arbitrio committitur.

Quæ igitur plurima tam laboriosa disquisitione ad veram huius Phænomeni constitutionem spectantia Apelles habet, illius sunt, & ab eo primo proposita. Quare Inuentorem Solaris Phænomeni quem statuas tuum, ex præmissis, liberum esto, Lector amice, iudicium. Id vnum ego pro mea innocentia, & rei veritate inferam. Ergo Apelles suam Solaris Phænomeni cognitionem à Censore ipsius egeno non didicit, non abstulit, neque post Censorem illius Inuentorem se fecit. Id quod erat demonstrandum contra Libripendem.

ABSOLVTIO APELLIS, FACTA
per Censorem siue dum pro illo loqui, siue dum illi videatur obloqui.

CAP. XI.

Videbis hic qui fuerit aliquando Censoris urgente veritate sensus, quæ partim æquè censentis immo censum alienum clam euertere cupientis sensa, & alia Apelli obiecta passim dissoluta.

Epistola tertia Historiæ, pag. 113. ad initium, sic habet. Ma passo ad alcune considerazioni intorno à quello che Apelle in parte replica, & in parte aggiunge al già scritto in proposito delle Macchie Solari, doue in generale mi par, che nelle loro determinazioni e' vadia più presto manco risoluto, che auanti non haueua fatto, se bene insieme si mostra desideroso di presentarle più tosto modificate che diuersificate; anzi che nel fine afferma tutte le cose dette nelle prime lettere restar costanti: con tutto ciò vengo in qualche speranza d'hauerlo à vedere nella terza scrittura d'opinioni intrinsecamente assai conforme alle mie; non dico già in virtù di queste lettere, le quali per la difficoltà della lingua non possono da lui esser vedute, mà perche

II.

col pensare verranno ancora à lui in mente quelle obseruazioni, quelle ragioni, e quelle soluzioni medesime, che hanno persuaso me a scriuere ciò che hò scritto nella prima, e nella seconda lettera, e che aggiungo nella presente. Sed transeo (inquit) ad aliquas considerationes circa id quod Apelles partim replicat, partim ad ea adiungit, quæ olim de Maculis Solaribus scripsit, vbi generaliter mihi apparet ipsum in eorum decisione lentius procedere, quàm olim solitus erat, quanquam satis magnum desiderium ostendit, illas non nihil accidendi, atque aptandi potius quàm mutandi, cum in fine quoque affirmet, omnia in prima epistola dicta sibi constare: nihilominus in spem haud exiguam deuenio, fore, ut in tertia scriptura videam, ipsius opiniones meis intrinsecus quàm maxime consentaneas; non dico iam hoc futurum, ex vi istarum mearum litterarum, quæ propter difficultatem linguæ, ab illo videri vel intelligi nequeunt, sed quòd æquis momentis omnia pensculatius librando in mentem ipsæ quoque venient istæ obseruationes, istæ rationes, & istæ eadem solutiones, quæ me ad ea scribenda impulerunt, quæ ego in prima, atque secunda epistola scripsi, & quæ nunc in hac presente adiungo.

[NB. Lector, ne in fraudem inducaris: omnia ea quæ Apelles in suis quinque epistolis cõformia opinionibus Censoris scripsit, prius esse scripta, ut ex datis patet, quam Censor vel primam vel secundam suam epistolam composuit. & tamen hic fraudulentè vult irrepere, & videri illas prius conscripsisse, prout fusiùs infra quoque videbis.]

Hinc constat ex ipsius Censoris testimonio primo Apellem quæ edidit, mutauit & modificauit, non ex vllò sensu vel scripto Censoris fecisse, cum hæc omnia expediuerit 16. Ianuarij anno 1612. quo tempore Censor neque primam, neque secundam, multò minus hanc tertiam epistolam composuerat, nam primam 4. Maij; secundam 14. Augusti; hanc tertiam prima Decemb. anno 1612. conscripsit.

Apelles autem suas sententias continuauit, ampliauit, limitauit, & modificauit 16. Ianuarij nullius protypum

Apelles ex Censoris confessione, sua, non aliena scripsit.

Apelles sua scripta ex suis nō alienis correxit.

vel exemplar, sed suas observationes & ductum Phænomeni secutus; non ductus aut doctus ab ullo, sed viam nouam aperiens alijs, duas postremas epistolas absoluit 14. Aprilis, & 25. Iulij quæ omnia luci tradidit Vellserus Idibus Septembris 1612.

Apellis scripta futura, etiam si Censorinis fierent similia, tamen a Censoris scriptis non forent desumpta: ita statuit Censor.

Secundò, Ea quæ in posterum scripturus & missurus esset Apelles, non ex vi aut scientia istarum litterarum Censorinarum facturum fuisse, sed ex ingenio proprio, ex observationibus, rationibus, & solutionibus proprijs, vltro menti ipsius occurraturis; & licet intimè conformia fierent ijs, quæ contingerentur in Historia Censoris, non tamen ideo Apellem ea desumpturum ex vi scriptorum à Censore, sed rationes tracturum ex ipsis Phænomeni visceribus manantes.

Si igitur Apellem Censor ab omni laque, furtique suspicione liberat, tam in ijs quæ scripsit in sua Tabula, atque vulgavit, (prout veritate cogente absolueri debet, si namque futura Apellis scripta, à suis factis non vult desumenda, magis fateri cogitur præterita à non factis non esse desumpta :) priusquam suam Historiam contexuisset, atque publicasset Censor, si in futuris quoque scriptis, omnia ingenio, observationibus, rationibus atque solutionibus Apellis proprijs, non ex Historia Censorina neque visa, neque lecta, aut intellecta ab Apelle deducendis attribuit; ipse profectò Apellem simpliciter absoluit; se verò damnat, dum rectè absolutum in Historia, iniquè traducit in Libripende, & iniquius suis primùm, deinde alijs per suos publicè lacerandum exposuit, seseque prodit Iudicem non iustum. Porro Apellem ex hoc capite *Integrum vitæ scelerisque purum*, neque mentem rei alienæ appetitione, neque manus contrectatione temeratas, sed innoxias gestare non tantum prædicto Censoris iudicio, sed ex parte rei, sic demonstro.

Apelles omnia quæ in sua Tabula proposuit, ea ad Marcum Vellserum amicitia priuata non animo edendi misit, nihil cogitans aut sciens de quoquam altero, contra quenquam nihil scribens, prout ipsum sibi velut aduersantem ridiculè producit Censor, sed suam Tabulam vna continua tela pertexens, vti clarè patet ex ipsius epistolarum continuato filo,

11 quarum postrema semper sibi mutuas manus porrigunt, totamque suam scripti-
nem, præter vnicam epistolam sextam, & vltimam (in qua tamen noui nihil attulit, priora tantum stabiliiuit) omniaque ea quæ subreptitia facit Censor multis antè mēsisbus cōponēdo absoluit, quā Cēsor de huius rei conscriptione quidquam cogitaret, quippe qui ingenuè sæpe confitetur, se suam, Vellseri instigatione sententiam tanquam Censuram super Apellis Tabulam promere &c. Sed etiam typo publico eundem anno integro anteuertit. Itaque euident est, Apellem sua quacunque Censori conformia protulit, ab ipso tamen Censore nullo modo traducere potuisse. & hoc est vnum. Cætera verò quæ nunc idem Apelles per tot annos animaduersionibus continuis stabilita adducit, ab eodem Censore non habet; tot eruditis & oculatis testibus, in quorum conspectu Apelles sua palam elaborauit: tum quia pleraque contra opiniones seu potius errores Censoris tendunt, quos tot elapsis annis sine dubio Censor deprehendisset, si obseruandi assiduitate, atque obseruata ordinandi scientia præditus, & studio deditus fuisset; hoc autem ab eo ignoratum & intermissum inde factis colligo, quòd in Libripende suæ Historiæ litteras de Maculis adhuc tanquam verissimas agnoscat, & Apellem opinionum impossibilium redarguat, suamque circa motum Solis, & Macularum, hæsitantionem &c. clarè patefaciat. quam deponere potuisset, si in obseruando sedulus, in rimando accuratus, in ordinando peritus fuisset. Itaque ea quæ nunc prodit Apelles in sua continuata Tabula, Rosæque Vrsina, nulla ratione à Censore transiumpsit, sed neque primorum quidquam. Igitur à Censore accepit omnino nihil. An autem Censor nihil ab Apelle, relinquendo cuiuslibet arbitrio: certè de sede prioritatis, & ex possessione Apellem occultis cuniculis & scriptione captiosa deturbare conatur, Lectoremque Candidum in fraudem deducere. Relegamus textum, videamus technam.

50 „ Epistola tertia pag. 113. sic continuat priora. egiā si vede quanti particolari, e mette in questa seconda scrittura, non offeruari ancora nella prima, 55 „ Stimò auanti le Macchie Solari essere tutte di figura sferica, dicendo che se le

Censor hucusque in Phænomeni Solaris ignorantia hæret.

Apelles nihil à Censore, Censor ab Apelle Inuentionis priuatum extorquere molitur.

I.

le si potessero veder separate dal Sole,
 ci apparirebbono tante piccole Lune,
 altre falcate, altre in forma di mezzo
 cerchio, altre di più che mezzo, & for-
 se altre interamente piene: hora con
 maggior verità scriue, rarissime essere
 sferice, e spessissime di figure irregola-
 ri. Ha parimente offeruato, come rarissi-
 me o nessuna mantengono la medesi-
 ma figura per tutto'l tempo, che resta-
 no conspicue, ma strauagantemente
 altre nascono, altre si dissoluoano anco
 nel mezzo del Sole, come alcune si di-
 uidono in due, e più et all'incontro
 molte si vniscono in vna, i quali parti-
 colari furon da me toccati nella prima
 lettera. Stimò già, che le fossero le stel-
 le erranti, e situate in diuerse lontananz-
 ze dal Sole, sì che alcune fossero meno,
 & altre più remote in guisa, che moltis-
 sime andassero vagando tra'l Sole, e
 Mercurio, e ancora tra Mercurio e Ve-
 nere in debite distanze, facendosi visi-
 bili solamente quando s'incontrano
 co'l Sole. Ma hora non sento raffermar
 vna tanta lontananza, e parmi che e si
 contenti di mostrare che le non sono
 dentro al corpo Solare, ne contigue
 alla sua superficie, ma fuori in lonta-
 nanza solamente di qualche conside-
 razione, come si può ritrarre dalle ra-
 gioni ch'egli usa in dimostrar la sua o-
 pinione. Hactenus ille quæ latinè sic se
 habent. Etiam apparet quot res parti-
 culares ipse ponat in isto secundo scri-
 pto, non obseruatas antea in primo.
 Existimauit an è Maculas Solares om-
 nes esse figuræ sphericæ, asserendo, si
 extra Solem separatæ possent cerni, ap-
 parituras nobis tanquam paruas Lunas
 falcatas, medias, gibbas, & forsan ple-
 nas: nunc cum maiore veritate scribit,
 rarissimas esse sphericas, & frequentis-
 simè figuræ irregularis. Obseruauit pa-
 riter vel nullam, vel rarissimas eandem
 figuram per totum tempus, quo sub So-
 le conspiciuntur retinere, sed prodi-
 giose mutari nunc crescendo, nunc de-
 ficiendo; & quod amplius est, vidit, ex
 improviso alias nasci, dissolui alias e-
 tiam in medio Sole, nonnullas in duas
 pluresue dissolui, & multas vicissim in
 vnam coire; quæ puncta singularia à
 me fuerant tacta in primis litteris.
 Olim existimauit, illas esse stellas er-

II.

raticas, in diuersis à Sole distantijs lo-
 catas, alias vicinius, remotius alias ita
 vt plurimæ inter Solem & Mercurium
 incederent, interque Mercurium & Ve-
 nerem, interuallis debitis illis solis co-
 spicuis quæ Solem subintercurfaret: at
 nunc non audio confirmari tantam in-
 tercedentem, & videtur mihi conten-
 tus fore, si illas à Sole ita exemptas de-
 monstret, vt tamen eundem non at-
 tingat immediatè, sed intantum ab eo-
 dem absint, quantum pro suæ opinio-
 nis stabilimento opus habet.
 Hic ego relinquo Lectoris Candidi &
 cordati iudicio sensum genuinum verbo-
 rum, an non ex modo loquendi, & linguæ
 Italicæ proprietate Lector deducatur in
 istum sensum vt arbitretur Apellem Pri-
 mò, ante nescio quantum tempus in pri-
 mis suis epistolis aliquid sensisse & scri-
 psisse, quod nunc in secundis, seu disquisi-
 tione accuratiore emendet & quodammo-
 do retractet. Secundò, & hanc retractatio-
 nem efficiat saltem post scriptam Censo-
 ris epistolam secundam, qui eadem omnia
 ibidem tetigerit. Iste inquam sensus vide-
 tur obrudi Lectori primà statim fronte, &
 scripturæ huius lectione, & quia ego idio-
 matum illi ci proprietatè vim & naturam
 non ita probè teneo, accessi ad aliquot vi-
 ros peritos, qui neque Historiam de Ma-
 culis, neque Tabulam Apellis vnquam vi-
 derant, vt naturam scriptoris huius vim
 ab illis exquirerem: responderunt vnani-
 mi consensu ex vi textus istius confici,
 Primò, Apellem videri sibi non constare,
 sed per posteriora voluisse emendare prio-
 ra. Secundò, Priora scripta ex vi huius tex-
 tus, fuisse absoluta, neque pendentia à
 posterioribus. Tertio, Aliquam etiam no-
 tabilem moram temporis debuisse inter-
 celsisse. Quarto, Censorem suam primam
 epistolam prius expediuisse, quam scripta
 secunda Apellis prodierint, & sic senten-
 tiam Censoris epistolà primà contentam
 priorem esse, sententia Apellis posteriore
 qua suam primam epistolam ipse castigat.
 Hunc sensum aut esse loci citati sinceri Le-
 ctōres atq. Interpretes. Quod si ita est, fu-
 cum fecit Censor Lectori, vim veritati, in-
 iuriam Apelli. Nam Primò, Apelles omnes
 epistolas primas, quæ fuere tres; & oēs
 secundas præter sextam (ex qua tamen
 cōparatio hic à Censore nulla instituitur)
 prius scripsit, & misit ad Marcum Velle-
 rum;

*Versipellis,
 intricatus
 & Sophisti-
 cus Censoris
 stilius dete-
 gitur.*

I.

rum, quàm Censor suam primam ad eundem destinaret. Secundo, Inter scriptas ab Apelle epistolas continuus nexus, & mutua dependentia, tanquam filorum vnius telæ, & colorum vnius Tabulæ intercedit. Tertiò, Neque magnum aut notabile temporis intervallum accessit, ut idcirco tanta comparatio, quasi nescio quantæ moræ interlapsæ, potuerit, aut debuerit à Censore institui. Quartò, Neque res prout afferuntur & vrgentur à Censore, ita esse scriptas vel prolatas ab Apelle. Singula Sole clariùs ostendo.

OSTEDITVR PRIMVM. VIDELICET, Apellis Tabulam & accuratorem disquisitionem præter epistolam ultimam (ex qua tamen nulla comparatio afferatur) esse priores & scripture, & impressione ex maxima parte, ipsa prima Censoris epistola.

NE mireris Lector, si rem in Historia Chronologica probatam hic repetam, nam ut Censori supersunt technæ ad inuoluendam veritatem, ita deesse Apelli pro veritate patefacienda testificationes non debent.

Apelles primam Tabulæ suæ epistolam absoluit & misit ad Velsrum 12. die Nouembris anno 1611. Secundam die 19. Decemb. an. 1611. Tertiam die 26. Decemb. anno 1611. & sic absoluta & missa est Tabula prima ad Marcum Velsrum: quam idem typis cōcredidit anno 1612. Nonis Ianuarij; quod editionis tēpus tacitum est in recusione Censorina, quod casu an studio, ne prioritas forsitan in edendo a LECTORE notaretur, sit factum ignoro, vtrumque probabili coniectura nō caret. Itaque Prima Apellis Tabula, Primam Censoris epistolam adeoque Historiam totam, & stilo & typo antecessit quatuor minimum mensibus. Nam Impressio finem accepit, die 5. Ianuarij, Historiæ epistola à Censore Prima ad Velsrum, data est die 4. Maij, 1612. quatuor ergo intercessere menses. Tabulam Apellis impressam, id est, tres primas meas epistolas Velsrus postridie Impressionis, qui fuit 6. Ianuarij dies, statim ad Censorem ablegauit, qui responsum ad 4. Maij, rei difficultate absteritus, distulit, quod obseruationibus idoneis destitutus esset, ut ipse in epistola Prima fatetur &c.

Editionis tempus Tabula Apellæ, in recusione Censorina, suppressum.

Tabula Apellis antecessit primam Censoris epistolam & editione, multo tempore.

I I.

Et sic Tabula Prima Apellis, tam concepta, tam scripta quàm edita; ipsam Primæ epistolæ Censorinæ Conceptionem & Natiuitatem antecessit sat longo tempore. & hoc est vnum. Accuratior deinde disquisitio seu Tabula auctior, continet itidem epistolas tres, quarum Prima conscripta & ad Velsrum missa fuit die 16. Ianuarij 1612. Altera die 14. Aprilis anno 1612. Tertia & vltima die 25. Iulij, 1612. Igitur etiam Prima, & Secunda epistola huius Tabulæ siue Accuratioris Disquisitionis prius exarata, prius ad Velsrum sunt legata, quàm Censoris prima fuerit concepta, quæ 4. demum Maij scribendo absoluta est.

Sola tertia & vltima Apellis epistola, secuta est scribendo primam Censoris, sed secundam & tertiam eiusdem antecessit, & tertiam quidem multis mensibus. Etenim Apelles vltimam suam epistolam ad Velsrum misit die 25. Iulij anno 1612. Censor suam secundam ad eundem amandauit die 14. Augusti, anno 1612. & tertiam Historiæq. suæ vltimam, die 1. Decemb. 1612. & sic Tabula auctior, siue disquisitio accuratior maiore ex parte primam Censoris epistolam scribendo antecessit, nam sola vltima subsequuta est, reliquas autem omnes, id est secundam, & tertiam Censoris epistolam præuenit etiam Tota hæc Tabula scribendo; sed editionem præcucurrit adhuc secunda Censoris scribendo epistola. Nam Velsrus euulgauit Accuratorem disquisitionem Idibus Septembris, qui fuit dies 13. epistola verò secunda à Censore conscripta data fuit 14. Augusti. Hanc autem eandem Disquisitionem misit Velsrus ad Censorem mense & anno eodem, die videlicet 28. Septembris: occasione cuius Censor, hanc suam comparisonem in hac tertia sua epistola instituit. Igitur cum Apelles omnes suas quinque epistolas expediuerit, priusquam prima Censoris epistola concepta fuit, hoc hic edocendus eras Lector, ne isto captioso & præpostero scribendi modo in fraudem inducereris, credendo ea quæ in prima Censoris epistola tacta dicuntur, accidisse prius ijs, quæ nunc Apellem scripsisse, vel sensisse vel obseruasse dicit Censor, Nā ea quæ nunc Apelles à Censore, scripsisse, se fuisse vel obseruasse dicitur, nō sūt ab Apelle obseruata nunc, dum Censor hæc

Tabula Apellæ auctioris epistola prima & secunda, antecesserunt etiam primam Censoris epistolam.

Tabula Apellæ auctioris epistola tertia, & vltima, scripta est post Censoris primam, sed ante secundam, & tertiam eiusdem.

Cauendam Lectori a fraude Censoris.

I.

hæc in sua epistola tertia scribit, id est die 1. Decembris, anno 1612. sed die 16. Ianuarij, in epistola sua quarta, diu ante, quam eadem Censor vel hic in tertia, vel olim in epistola sua prima attingeret, quam dedit 4. Maij. Quando igitur Censor dicit, Apellem *antea* sensisse, omnes Maculas esse figuræ sphaericæ; *nunc* scribere, rarissimas esse sphaericas; ipsum pariter obseruasse rarissimas, vel nullam seruare eandem figuram &c. & multa similia particularia, quæ ab ipsomet Censore fuerint tacta in sua prima epistola: si sensus sit, *Olim* Apellem ita sensisse, *nunc* verò aliter; sicut aliter etiam senserit *olim*, in sua prima epistola Censor ante Apellem, *nunc* ita sentientem, sensus est omnino falsus, & imposturam caue Lector: si autem sit sensus *olim* Apellem aliter quidem sensisse & scripsisse quàm *nunc* sentiat, ita ut Censor etiam in sua epistola prima ita scripserit ante hæc, sed post *nunc* ita sentientem Apellem, est sensus ex parte rei verus, sed monstruosè tortus, nec vsitatus loquendi modus, & comparatio à Censore male instituta. Proinde locus hic insidijs refertus apparet. latet anguis in herba. Nunc ad punctum secundum procedo. Quod erat.

INTER SCRIPTAS AB APELLE

epistolas continuum filum, nexus, que mutuis intercedit. Et sic demonstratur secundum.

Epistola Apellis prima anno 1611 die 12 Nouembris data circa medium sic loquitur. Et plurima denique alia, quæ iam libens subitescere, innotescunt: ista enim paucula, nunc degustanda proponere placuit, quæ si sapuerint, de ipso nucleo operam dabimus, ut propediem aliquid eruamus. In fine verò sic habet. His nunc, vt ere, fructuere, alia Deo volente sequentur. Vale. Hæc clausula cum medijs prædictis nectit hanc epistolam sequentibus, & ex vi horum præmissorum, & promissorum, quidquid sequentes dicunt littere, etiamsi vel alteratum, vel modificatum, vel ampliatur, correctum, aut accisum sit, non est habendum repugnans; quia hæc epistola quidquid vtero quasi contentum gestat, in illis veluti pariendo

II.

effundet: non igitur sunt censendæ sibi met contrariari, dum adhuc in via inquisitionis insistitur, & anteriora semper secuturis innituntur, illisque palmas faciles porrigunt, & absolute adhuc nihil decernunt, sed in vltiora se remittunt. Epistola tertia die 26. Decembris, anno 1611, data, hæc habet ad initium. Memini, sti quæ superioribus diebus timide attingi, ea nunc certis & compertis rationibus nixus, quas tui iudicij facio, plane affirmare non vereor; lubet enim &c. Hic vides cordate Lector, quomodo huius epistolæ principium cum fine præcedentis nectatur. Nunc finem inspiciamus eiusdem. Interim an sydera hæc erraticæ, an fixa sint, hæreo &c. Sed hæc suo tempore, quemadmodum, & de Motu, de figura, quantitate, recessu à Sole, & reliquis affectionibus. Igitur neque hic manum de Tabula positam, sed vltius protensam aspicias. Vnde in Disquisitione Accuratiore Epistolæ primæ quæ in ordine omnium est quarta, initium est tale. Quia tamen mustum nonnihil turbidum atque feculentum propinaui, & partum rudem informemque effudi: oportet & illud colare bonorum viticolarum more, & huc *Vrsarū instar* labere, inq. mēbrorū venustam effingere proportionem. Cernis hic iterum, pulcherrimo nexu copulatas sibi inuicem epistolas, & semper priores perfectionem suam à posterioribus expectare. Sed inspiciamus epistolæ medium, vbi sic ait Apelles. Conformato Lucifero, ad ipsum lucis Parentem nos referamus, Solem, videlicet, ipsiusque numerosam prolem, à 10. Decembris (non habita ratione quod nuper aliquid spectandum miserim) vsque ad 12. Ianuarij velut in pompam deducamus. Hic vides Lector obseruationes obseruationibus, & Maculas Maculis necti; nam prima obseruationum Tabula desijt in 14. Decembris hæc à 10. eiusdem inchoat vsque ad Ianuarij 12. Nunc gradum faciamus ad finem huius epistolæ. Pluribus modolibens superscedo: ait Apelles. & paulo post. Vnde cum Phænomenon hoc multò maius, quàm quispiam facile suspicetur, quemadmodum progressu ipso intelliges &c. & post pauca. *Paria aut maiora his propediem à me habebis.* Hæc quanta sint & quò tendant

In comparatione Censorina illius loquendi modus, aut fallax & insidiosus, aut monstruosus est.

I.

„ dant vnà mecum animaduertis, vnde
 „ timeo, nisi anteuertas, è manibus ea-
 „ nostris pene extortum iri: viso enim
 „ tanto huiusce rei exitu Mathematici,
 „ non erit vt se contineant. continebunt
 „ autem, si tanto à nobis relictos inter-
 „ uallo semet perpenderint: & sic vel sua
 „ & propria proment, vel certè aliena
 „ non arrogabunt. Quod prohibere pe-
 „ nes te est totum. Faxit Deus, vt sicut
 „ hæc coepimus, ita in gloriam Nominis
 „ sui feliciter prosequamur, finiamusque.
 „ En concatenatas mutuis retinaculis
 „ epistolas. Dies diei verbum, & Nox
 „ nocti indicat scientiam.
 „ Epistola Apellis sexta, & vltima anno
 1612, 25. Iulij conscripta, pag. 48. circa
 „ medium hæc habentur. Suspiciari eo-
 „ gor, contra quàm multi opinantur,
 „ corpora ista vix nasci, & interire pos-
 „ se &c. quæ tamen ita omnia dixerim,
 „ non vt à sententia hac, in aliam abi-
 „ re non velim aut non possim, si ipsa rei
 „ veritas in aliam nos deduxerit. Vñta-
 „ tiora autem sequimur hætenus, & à
 „ philosophis magis recepta. Et pag. 49.
 „ Quid inde fiat faciliè vides, has videli-
 „ cet umbras in Sole non inesse, nisi So-
 „ lem mari mutabiliorem velis statuere.
 „ Et pag. 50. circa medium. De istis ve-
 „ rò duobus, corpora hæc tenuia esse,
 „ at permanentia siue stellas non esse,
 „ Astronomi certant, & adhuc sub iudi-
 „ ce lis est: sicut lis esse amplius vix po-
 „ test, an inæqualiter moueantur, cum
 „ tam sæpe id modò deprehenderim &c.
 „ Et pag. 53. Tandem vt litterarum fi-
 „ nem faciam, siue Maculas has in Sole,
 „ siue extra eundem, siue generabiles
 „ statuamus siue non, siue nubes dica-
 „ mus siue non, quæ omnia adhuc vacil-
 „ lant; illud certè consequens videtur,
 „ secundum communem Astronomo-
 „ rum sententiam, duriciem & hanc coe-
 „ lorum constitutionem stare non posse.
 „ & ad finem epistolæ. Atque hoc prio-
 „ rum omnium complementum Tuæ
 „ Amplitudini lubēs communicavi &c.
 „ nam reliqua omnia, quæ in prima Ta-
 „ bula exposui, sibi constant. In vnico
 „ adhuc hæremus, vtrum corpora hæc
 „ generentur & intereant, an verò æter-
 „ nent: quod dum eà quæ hominis est,
 „ aut esse potest industria, & sagacitate
 „ inquirimus, tu interim Vir Amplissime

II.

1 hisce sufficienter reuentilatis fructu.

Ex his igitur euident est, Primò Apel-
 lem continuò quodam tractu ita suam
 pinxisse Tabulam, vt semper vnum ab al-
 5 tero penderet, & prima postremis defer-
 rent. Secundò Decisa absolutè non mul-
 ta. dubiè hypotheticè & ex aliorum sen-
 su & mente allata nonnulla. Tertiò Item
 per modum inquisitionis disputata plera-
 10 que; & decisionem absolutam in rebus
 maioribus potissimum esse suspensam,
 atque reseruatam ad obseruationes & di-
 gestiones posteriores.

Quæ cum ita sint, prudenter Apelles à
 15 nullo vnquam vel potuit vel debuit tam
 acriter censeri, quasi qui rem iam indubi-
 tatam atque absolutè à se decisam affe-
 rat, cum contrarium passim testetur; im-
 meritò itaque quasi inconstans, contra-
 20 rius aut contradicens sibi, & prima per
 postrema damnans, à Censore arguitur:
 cum manum de Tabula nunquam depo-
 fuerit. & spontè professus vbique in om-
 nibus epistolis sit, opus inchoatum non
 25 absolutum, affectum non confectum, im-
 perfectum non suis absolutum, numeris,
 in multis quæsitum, & eruendum, non
 omnino erutum dari. Quod si Apelles hæ-
 rum rerum, istorumq. defectuum expres-
 sam & frequentem mentionem non fecis-
 30 set, esset vnde Censor suam seueritatem
 palliaret, præcipitantiamque verisimilitu-
 dinis aliqua specie tegeret: nunc autem
 cum Apelles ipsemet toties profiteatur
 35 se rem quidem nouam afferre, & sibi qui-
 dem quoad OTI certam, alijs verò ve-
 hementer dubiam; quoad ΔΙΑΤΗ au-
 tem, tam sibi quàm alijs omnibus ob-
 scuram & ad huc non satis constantem;
 40 ideirco culpari non potuit, si in quæstio-
 ne, An sit, stabilienda, omnibusque pate-
 facienda ante omnia totus fuit; si deinde
 cetera, quæ ad Quæstionem Quid sit, &
 propter Quid pertinent, ad curas subsequen-
 45 turas reseruauit, si dubia dubiè, probabi-
 lia probabiliter, certa firmiter enunciauit;
 si denique vel omnia, vel maiorem inuen-
 tarum rerum partem lineæ atque culturæ
 posteriori subiecit; si ita cautè, ita proui-
 50 dè in re tam lubrica processit, vt sibi in-
 progrediendo regrediendi copiam non
 intercluderet: quod si, pictorum more, po-
 sterorum subiuncta colorum varietate,
 primorum lineamentorum rudimenta &
 55 vestigia quasi textit; artis id non imperi-
 tiæ

Tabula A-
 pella huc-
 usque con-
 tinuata ne-
 que dum pe-
 nitus abso-
 luta est. Vñ-
 de Censor
 eandem tan-
 quam per-
 fectam
 male cæ-
 pfit.

I.

tiæ est, ita imaginem è rudibus illis lineamentis. ad summam venustatem educere, vt tamen ex illis processeris, videre discessisse. Neque enim ad finem vnquam deueniremus, si in initijs semper hæreremus; à dubijs ad certa, à signis ad res; à coniecturis ad opiniones; ab opinionibus ad certam veritatem; ab inuestigando ad metam; ab hypothesebus ad thesin; ab alienis ad proprias sententias est deueniendum: quæ si Apelles in posterioribus imo in prioribus quam sint Censorina scriptis quandoque fecit, aut facere incoepit; idcirco sibi met aduersarius est introducendus? minimè Gentium. Vfus enim iure suo, præstitit id quod in principio semper promissit, ad quod sese vbique rexit, quod tandem facere intendit & debuit. Pinxit enim vnā Tabulam, neque facta est alia aut diuersa tempore, etenim si ex Horatij præscripto partus in nonum pressus annum perfectior prodit, & vnus manet, non idcirco pictura Apellis deterior aut alia censenda est, quæ nonum Artificis manum pertulit in mensem, non dico iam de Tabula continuata, decimum quintum in annum. Cum nouem mensium spacium nimium fortassis videatur Censori, qui comparationem intra tempora multo eurtiora instituit, prout nunc in puncto tertio videbimus.

PUNCTVM TERTIVM IN QVO

Mora temporis intra quam Apelles ex Censoris Virgula, in sententia sua incōstantia arguitur, admodū parua, & nullius ferme momenti fuisse demonstratur.

Dato, sed non cenceffo, Apellem sibi met contrarium fuisse, si tamen sententiam priorem citò correxisset, venia maiore dignus, neq. ob eam rem culpandus esset: propterea quod error citò cognitus, & sponte quidem emendatus, pro non admissio habeatur: carpis enim, non corrigis, sponte resipiscentem, culpamque iam expiatam si reuocas, exprobras, criminatorem euadis, non corrector appares. Apelles si ante errauit, at sponte, at citò absterxit errorem; quid ergo obstreperit morosus Censor? Sed an interuenerit delictum Apellis vllum, postea exquiretur, nunc *Moram tempora-*

II.

riam metiamur.

Auanti, Ante, (inquit Censor,) existimauit Apelles omnes Maculas esse figuræ sphaericæ &c. *Hora, Nunc*, cum maiori veritate scribit, rarissimas esse sphaericas, & frequentissimè figuræ irregularis. Illud, secundum Censorem, scribit Apelles in epistola tertia, & vltima Tabulæ primæ die 26. Decembris anni 1611. Hoc epistola quarta quæ est prima Tabulæ secundæ, seu continuatæ, in Disquisitione accuratiore, pagina 28. Documento primo, die 16. Ianuarij, anni 1612.

Itaque inter illam & hanc epistolam, inter hunc & illum locum conscriptum, intercurrere dies 22. tres hebdomades; epistola alia intercedente nulla, sed hæc illam immediatè sequebatur ad Velsrum, vt etiam si Apelles per hanc illam voluisset emendare, citius tamen id facere vix potuisset aut debuisset; qui verò in emendandi mora non est culpabilis, culpandus non est demendo.

Et tamen propter 22. dierum interlapsum, audet Censor scribere, *Auanti, Antè*, videlicet die 26. Decemb. scripsit &c. & *Hora, Nunc*, die scilicet 16. Ianuarij scribit. Quasi nescio quantum temporis sit interlapsum; fucum obtrudens Lectori. Si antè ob scripta sua reprehensibilis fuit Apelles, nunc ob correctum tantillo tempore errorem, laudandus iure videtur. Præsertim cum sponte, non admonitus ab illo correxerit. Sed pergamus.

Ait Censor multa ab Apelle Olim non obseruata in Tabula prima, quæ nunc obseruauerit in secunda, qualia sunt, incōstantia figuræ, continua mutatio; augmentum; decrementum Macularum &c. De veritate obiectorum postea videbitur; Temporis interuallum, quo illud Olim ab isto Nunc discriminatur, sunt dies 22. Accedo ad tertiam comparisonem.

Stimò già, *Quondam* (ait Censor) existimauit Apelles illas (Maculas) esse stellas errantes, & in diuersis à Sole distantijs situatas &c. *Ma Hora, At nunc* altum tantæ distantiae silentium. Non excutio nunc fidem & veritatem obiectorum, temporis interpositionem tantum attendo. Itaque inter illud quod Apelles scribit epistola tertia ad finem, *subit opinari*, à Sole vsque ad Mercurium &c. versari errores quamplurimos; & inter episto-

Apelles non fuit in mora temporis culpabilis.

I.

epistolam quartam ubi hæc tacentur, &c. intercedunt dies 22.

At verò inter illud idem *Subit opinari*; & inter corollarium primum in quo Apelles expressè scribit hisce verbis, *Has Maculas à Sole non multum recedere*: quantum interest temporis? Non annus, non mensis, non hebdomadas, non dies, non hora. fortassis vix decem scrupuli vnius horæ; quia eodem tempore, epistola eadem Apelles scripsit vtrumque, calamo eodem, in charta eadem, & prius quidem hoc, *Has Maculas à Sole non multum recedere*; posterius istud ante finem. *Subit opinari à Sole usq; ad Mercurium*, & *Venerem* in distantia & proportionè debita, versari errores quamplurimos, è quibus nobis Soli ij innotescant, qui Solem motu suo incurrant. Si igitur Apelles idcirco arguitur quod *Olim*, id est hic in epistola tertia ad finem *Maculas multum remouerit à Sole*, Censoris iudicio, & easdem tacitè ad eundem, *Nunc* in epistola quarta velut admouerit; multo magis culpandus est, quod in idem delictum cadat in hac vnica epistola; ubi *Ante*, seu *Olim*, Corollario nimirum primo, Ait *has Maculas à Sole non multum recedere*, deinde circa finem easdem, *Nunc*, ab eodem multum, & quidem in diuersis circulis remoueat inter Solem, Mercurium & Venerem: Hæc inquam magis obijcienda fuissent: quia hic Apelles affirmat breuem distantiam, ibi longam tantum tacet. Sed illud *Strimò già*; & hoc *Ma Hora* &c. in vnicam epistolam non videbantur quadrare; ideoque dissimulata sunt.

Insidia & Cuniculi Censoris detecti.

Sed hinc cuniculi patent & erubescunt Censoris. Quod ubi tam breue aut nullum intercurrit tempus audet adhibere vocabula, *Olim*, &c. *Nunc* &c. Sed hæc omnia facta sunt ad fallendum sincerum Lectorem.

Nunc ad antitheseon istarum veritatem, & errorum Apellæorum deformitatem inspiciendam accedamus.

Ait Censor. Et nunc apparet, quot particularia ipse ponat in hisce secundis litteris, etiam non obseruata in litteris primis. Labet in primis interrogare ex Censore, vnde nam illi innotescat, vel vnde appareat, Ea quæ Apelles ponit hic recensita particularia, in secundis litteris, non esse obseruata in primis?

II.

Dicet fortassis ex eo hoc sciri, quod Apelles illa non posuit in litteris primis, & enumerauit in secundis: videamus vim argumenti in forma Syllogismi.

Quæcunque Apelles non posuit vel non annotauit in litteris primis, illa non obseruauit in iisdem.

Sed multa particularia allata in secundis, non posuit vel annotauit in litteris primis, ergo illa non obseruauit in iisdem. Antequam in forma ad argumentum respondeam, aduerte Lector. Primò aliud esse hoc loco, aliquid in litteris ponere aliud obseruare. Illud enim significat rem obseruatam scripto declarare, hoc vel scripto, vel obseruationis designatione aliqua illam continere. Porro cum Phænomenon aliquod tractant Mathematici, plerumque duobus modis loquuntur, pictura & scriptura. Etiam si igitur Apelles multas huius Phænomeni quas vrget Censor, proprietates non explicasset scriptura, sufficeret ob oculos posuisse pictura, & per hoc falsitatis satis redargueretur Censor. Nam pictura rem exhibere, vtrique est illam obseruare. Quod si Censor vult, prout illuc totus elenchus hic alioquin gratis allatus, collineat, Apellem in primis litteris, hoc est, illo tempore, quo primas litteras conscripsit, non obseruasse, seu non intellexisse, atque animaduertisse, quæ deinde in posterioribus describit vberius: sciat & argumentum nullam habere vim; & se Lectori fraudem, Apelli iniuriam machinari. Sciuit enim & hæc, & alia Apelles, quæ tamen iniuria illorum temporum, nec scribere, nec eloqui in vulgus potuit.

Et consequentia Censoris inutilis est, non scripsit, ergo nesciuit. Mali Logici est hæc consequentia. Censori verò omne probum est, quidquid Apellem reprobat. Secundò, Labet sciscitari. Ecquidnam vitij huic facto Apellis inesset, etiam si quædam non obseruata in litteris primis, animaduertisset in secundis, & eadem Velle-ro consignata transmisisset? nunquid idcirco vel malè esset actum cū litteris primis, vel respuendæ secundæ, aut Apelles tanquam imperitus artifex ablegandus? nihil horum sequitur. Nemo nascitur Vir. idcirco secundæ primis, & terciæ curæ succedunt secundis, atque illis aliæ, donec opus inchoatum ad statum perfectum deducatur. Tamen ita fecit ipsemet Censor

Mala Censoris contra Apellem argumentatio.

I.

for in sua Macularum Historia &c. Nonne multa posuit in secundis, quæ ignorauit vel de quibus dubitauit in primis? nonne plurima in tertijs confidentissime perperam propugnauit? Deinde quid contrarietatis hic insit, non video. Apelles quædam dicit in Tabula secunda, quæ non dixit in prima: quid inde absurdi nascatur, Apelles non videt. Quin imo secunda omnia consequuntur, plenitudo Tabulæ, perfectio picturæ, suauitas symmetriæ, & colorum pulcherrimorum, concinnitas perquam elegans, perquam venusta.

Sed ad Syllogismi propositi responsionem veniamus: cuius Maior negatur. Ex eo enim quod aliquis in epistola non omnia aut singula scripto enucleat, non sequitur, illa non esse obseruata. nam vt dictum aliud est obseruare, aliud scripto obseruata explicare. Malè ergo & minus cautè infert contra Apellem Censor, Apellem multa particularia recensere in litteris secundis, quæ non recensuit in primis, ergo ab ipso illa in primis non esse obseruata. Vnde rursus vrgeo. Vnde nam Censor sciat, & tam audacter asserat, Apellem multa particularia afferre in secundis, quæ ipse non obseruauerit in primis? Rem tantâ affirmare, & nō posse probare, nec certitudinem afferre, nimis prouidè factum. Nonne in fine epistolæ Apelles ait, *His nunc frueri, alia sequuntur?* Nonne in medio eiusdem epistolæ hæc clarissima verba leguntur? *Et plurima denique alia, quæ iam libens subicesco, innotescunt.* Vnde Apelles tam confidenter alia promittit, & quidem plurima absque vlla hæsitatione, quæque libens iam subicescit, si præter scripta nihil sciuit? nihil obseruauit? nonne poterat prætere, auctoritatem & ius exactoris? Ea ergo quæ prodita sunt in posterioribus, præscita & promissa fuerunt in litteris primis.

Sed & Minor Censoris negatur, quod nimirum Apelles multa particularia allata in secundis, non posuerit vel annotauerit in litteris primis. Videamus allata à Censore exempla. Hæc parimente obseruato &c. *obseruauit pariter Apelles.* (in secundis litteris) *rarissimas aut nullam Maculam sub Sole inuariata transire figura, sed prodigiosè mutari, augendo, minuendo;* Hoc Apelles ipso actu exercito docet in tota obseruationum Tabula epi-

II.

1 stola primæ à die 22. Octob. anni 1611, ad 14. Decemb. anni eiusdem, vbi variatæ Macularum figuræ sese passim offerunt. Et hoc vnicum sufficeret ad defensionem Apellis, quia pro se & post se habet factum Censoris: audi quid scribat in epistola secunda Censor pag. 32. Le loro differenti densità e negrezze, le mutazioni di figure, e gl'accozzamenti, e le separazioni, sono per se stesse manifeste al senso, senz'altro bisogno di discorso, onde basteranno alcuni semplici rincontri di tali accidenti sopra i disegni, che gli mando. illarum diuersæ densitates, & nigredines, mutationes figurarum, coadunationes & separationes, per se sunt manifestæ ad sensum, absque alia discursus opera, vnde sufficient aliquæ simplices collationes eiusmodi accidentium supra obseruationes factæ, quas illi mitto &c.

Si nudi aspectus obseruationum sufficiunt Censori ad dijudicandas figurarum in Maculis mutationes, & similia sensus accidentia; non est cur ipse aliud ab Apelle exigat, loquitur Apelles æquè pictura atq. scriptura, non minus quam Censor, imo vtriusq. id quod apertissimis significat verbis, prout legenti patebit. Aut ergo seipsum vnâ cum Apelle damnabit Censor; aut Apellem vnâ secum absoluet: vtrum eligat, semper culpabitur ipse. Si damnabit eiusdem culpæ se reum facit, cum tantum pingat non explicet figuræ Macularum. Si absoluet; malè ergo, & iniuste dānauerat prius; addo etiam falsò. Nam Apelles non tantum pictura, sed etiam scriptura, non solum in actu, vt vocant exercito, sed etiam signato docet figurarum in Maculis obseruatis Mutationem. Epist. prima hisce verbis. *Notandū. Maculas, quæ easdem semper adiunctas reuenerunt litteras, semper easdem esse, ita tamen apparuisse tum si, tum pinguntur, quando pinguntur.* Quid hic opus erat admonere Lectorem Maculam illam esse semper eandem, cui eadem apponeretur littera, nisi ex figuræ mutatione Lector de idenditate merito posset dubitare? & illa verba, ita tamen apparuisse tum sicut pinguntur, quando pinguntur. Hisce verbis Apelles voluit significare, sicut expressè significat, Maculas, suas figuras variare. quāquam clariorem huius rei declarationem studio ad Disquisitionem accuratiorē reseruauit. Suffecit hic pau-

Censor facit ipsemet, quod in Apelle fugilat.

Epist. 2. p. 32. Le loro differenti densità e negrezze, le mutazioni di figure, e gl'accozzamenti, e le separazioni, sono per se stesse manifeste al senso, senz'altro bisogno di discorso, onde basteranno alcuni semplici rincontri di tali accidenti sopra i disegni, che gli mando.

Ad Syllogismum pro Censore factum, respondetur in forma: & negatur Maior.

Censoris contra Apellem nimis improvide præcipit.

Etiam Minor Syllogismi Censoris, falsa.

I.

epistolam quartam ubi hæc tacentur, &c. intercedunt dies 22.

At verò inter illud idem *Subit opinari*; & inter corollarium primum in quo Apelles expressè scribit hisce verbis, *Has Maculas à Sole non multum recedere*: quantum interest temporis? Non annus, non mensis, non hebdomadas, non dies, non hora. fortassis vix decem scrupuli vnius horæ; quia eodem tempore, epistola eadem Apelles scripsit vtrumque, calamo eodem, in charta eadem, & prius quidem hoc, *Has Maculas à Sole non multum recedere*; posterius istud ante finem. *Subit opinari à Sole usq; ad Mercurium*, & *Venerem* in distantia & proportionem debita, versari errores quamplurimos, è quibus nobis Soli ij innotescant, qui Solem motu suo incurrant. Si igitur Apelles idcirco arguitur quod *Olim*, id est hic in epistola tertia ad finem *Maculas multum remouerit à Sole*, Censoris iudicio, & easdem tacite ad eundem, *Nunc* in epistola quarta velut admouerit; multo magis culpandus est, quod in idem delictum cadat in hac vnica epistola; ubi *Ante*, seu *Olim*, Corollario nimirum primo, Ait *has Maculas à Sole non multum recedere*, deinde circa finem easdem, *Nunc*, ab eodem multum, & quidem in diuersis circulis remoueat inter Solem, Mercurium & Venerem: Hæc inquam magis obijcienda fuissent: quia hic Apelles affirmat breuem distantiam, ibi longam tantum tacet. Sed illud *Strimò già*; & hoc *Ma Hora* &c. in vnicam epistolam non videbantur quadrare; ideoque dissimulata sunt.

Insidie & Cuniculi Censoris detecti.

Sed hinc cuniculi patent & erubescunt Censoris. Quod ubi tam breue aut nullum intercurrit tempus audet adhibere vocabula, *Olim*, &c. *Nunc* &c. Sed hæc omnia facta sunt ad fallendum sincerum Lectorem.

Nunc ad antitheseon istarum veritatem, & erratorum Apellæorum deformitatem inspiciendam accedamus.

Ait Censor. Et nunc apparet, quot particularia ipse ponat in hisce secundis litteris, etiam non obseruata in litteris primis. Luber in primis interrogare ex Censore, vnde nam illi innotescat, vel vnde appareat, Ea quæ Apelles ponit hic recensita particularia, in secundis litteris, non esse obseruata in primis?

II.

Dicet fortassis ex eo hoc sciri, quod Apelles illa non posuit in litteris primis, & enumerauit in secundis: videamus vim argumenti in forma Syllogismi.

Quæcunque Apelles non posuit vel non annotauit in litteris primis, illa non obseruauit in iisdem.

Sed multa particularia allata in secundis, non posuit vel annotauit in literis primis, ergo illa non obseruauit in iisdem. Antequam in forma ad argumentum respondeam, aduerte Lector. Primò aliud esse hoc loco, aliquid in litteris ponere, aliud obseruare. Illud enim significat rem obseruatam scripto declarare; hoc vel scripto, vel obseruationis designatione aliqua illam continere. Porro cum Phænomenon aliquod tractant Mathematici, plerumque duobus modis loquuntur, pictura & scriptura. Etiam si igitur Apelles multas huius Phænomeni quas vrget Censor, proprietates non explicasset scriptura, sufficeret ob oculos posuisse pictura, & per hoc falsitatis satis redargueretur Censor. Nam pictura rem exhibere, vtrique est illam obseruare. Quod si Censor vult, prout illuc totus elenchus hic alioquin gratis allatus, collineat, Apellem in primis litteris, hoc est, illo tempore, quo primas litteras conscripsit, non obseruasse, seu non intellexisse, atque animaduertisse, quæ deinde in posterioribus describit vberius: sciat & argumentum nullam habere vim; & se Lectori fraudem, Apelli iniuriam machinari. Sciuit enim & hæc, & alia Apelles, quæ tamen iniuria illorum temporum, nec scribere, nec eloqui in vulgus potuit.

Et consequentia Censoris inutilis est, non scripsit, ergo nesciuit. Mali Logici est hæc consequentia. Censori verò omne probum est, quidquid Apellem reprobat. Secundo, Luber sciscitari. Ecquidnam vitij huic facto Apellis inesset, etiam si quædam non obseruata in litteris primis, animaduertisset in secundis, & eadem Velle-ro consignata transmisisset? nunquid idcirco vel malè esset actum cū litteris primis, vel respuendæ secundæ, aut Apelles tanquam imperitus artifex ablegandus? nihil horum sequitur. Nemo nascitur Vir. idcirco secundæ primis, & terciæ curæ succedunt secundis, atque illis aliæ, donec opus inchoatum ad statum perfectum deducatur. Tamen ita fecit ipsemet Censor

Mala Censoris contra Apellem argumentatio.

I.

for in sua Macularum Historia &c. Nonne multa posuit in secundis, quæ ignorauit vel de quibus dubitauit in primis? nonne plurima in tertijs confidentissime perperam propugnauit? Deinde quid contrarietatis hic insit, non video. Apelles quædam dicit in Tabula secunda, quæ non dixit in prima: quid inde absurdi nascatur, Apelles non videt. Quin imo secunda omnia consequuntur, plenitudo Tabulæ, perfectio picturæ, suauitas symmetriæ, & colorum pulcherrimorum, concinnitas perquam elegans, perquam venusta.

Ad Syllogismum pro Censore factum, respondetur in forma: & negatur Maior.

Sed ad Syllogismi propositi responsionem veniamus: cuius Maior negatur. Ex eo enim quod aliquis in epistola non omnia aut singula scripto enucleat, non sequitur, illa non esse obseruata. nam vt dictum aliud est obseruare, aliud scripto obseruata explicare. Male ergo & minus cautè infert contra Apellem Censor, Apellem multa particularia recensere in litteris secundis, quæ non recensuit in primis, ergo ab ipso illa in primis non esse obseruata. Vnde rursus vrgeo. Vnde nam Censor sciat, & tam audacter asserat, Apellem multa particularia asserere in secundis, quæ ipse non obseruauerit in primis? Rem tantâ affirmare, & nō posse probare, nec certitudinem asserere, nimis prouide factum. Nonne in fine epistolæ Apelles ait, *His nunc frui, alia sequuntur*? Nonne in medio eiusdem epistolæ hæc clarissima verba leguntur? *Et plurima denique alia, quæ iam libens subicesco, innotescunt*. Vnde Apelles tam confidenter alia promittit, & quidem plurima absque vlla hæsitatione, quæque libens iam subicescit, si præter scripta nihil sciuit? nihil obseruauit? nonne poterat prætere, auctoritatem & ius exactoris? Ea ergo quæ prodita sunt in posterioribus, præscita & promissa fuerunt in litteris primis.

Censoris contra Apellem nimis improvide præcipit.

Etiā Minor Syllogismi Censorini, falsus est.

Sed & Minor Censoris negatur, quod nimirum Apelles multa particularia allata in secundis, non posuerit vel annotauerit in litteris primis. Videamus allata à Censore exempla. Hæc parimente obseruato &c. obseruauit pariter Apelles. (in secundis litteris) *rarissimas aut nullam Maculam sub Sole inuariata transire figuram, sed prodigiosè mutari, augendo, minuendo*; Hoc Apelles ipso actu exercito docet in tota obseruationum Tabula epi-

II.

istolæ primæ à die 22. Octob. anni 1611, ad 14. Decemb. anni eiusdem, vbi variatæ Macularum figuræ sese passim offerunt. Et hoc vnicum sufficeret ad defensionem Apellis, quia pro se & post se habet factum Censoris: audi quid scribat in epistola secunda Censor pag. 32. Le loro differenti densità e negrezze, le mutazioni di figure, e gl'accozzamenti, e le separazioni, sono per se stesse manifeste al senso, senz'altro bisogno di discorso, onde basteranno alcuni semplici ci rincontri di tali accidenti sopra i disegni, che gli mando. illarum diuersæ densitates, & nigredines, mutationes figurarum, coadunationes & separationes, per se sunt manifestæ ad sensum absque alia discursus opera, vnde sufficient aliquæ simplices collationes eiusmodi accidentium supra obseruationes factæ, quas illi mitto &c.

Censor facit ipsemet, quod in Apelle sugillat.

Si nudi aspectus obseruationum sufficiunt Censori ad dijudicandas figurarum in Maculis mutationes, & similia sensus accidentia; non est cur ipse aliud ab Apelle exigat, loquitur Apelles æquè pictura atq. scriptura, non minus quam Censor, imo vtriusq. id quod apertissimis significat verbis, prout legenti patebit. Aut ergo seipsum vnâ cum Apelle damnabit Censor; aut Apellem vnâ secum absoluet: vtrum eligat, semper culpabitur ipse. Si damnabit eiusdem culpæ se reum facit, cum tantum pingat non explicet figuræ Macularum. Si absoluet; malè ergo, & iniuste dānauerat prius; addo etiam falsò. Nam Apelles non tantum pictura, sed etiam scriptura, non solum in actu, vt vocant exercito, sed etiam signato docet figurarum in Maculis obseruatis Mutationem. Epist. prima hisce verbis. *Notandū. Maculas, quæ easdem semper adiunctas reuenerunt litteras, semper easdem esse, ita tamen apparuisse tum si cut pinguntur, quando pinguntur*. Quid hic opus erat admonere Lectorem Maculam illam esse semper eandem, cui eadem apponeretur littera, nisi ex figuræ mutatione Lector de idenditate merito posset dubitare? & illa verba, ita tamen apparuisse tum sicut pinguntur, quando pinguntur. Hisce verbis Apelles voluit significare, sicut expresse significat, Maculas, suas figuræ variare. quâquam clariorem huius rei declarationem studio ad Disquisitionem accuratiore reseruauit. Sufficit hic pau-

1
eis verbis tanquam semine plurima insi-
nuare magis, quā explicare. Vide in adiun-
cto Schemate: in gratiam tui denique inci-
so, Maculam I. à die 25. Octob. ad 5. No-
uemb. item Maculam M. à die 1. Nouem-
bris ad 12. eiusdem. item Maculam Y. &
alias multas, quæ figuras suas non tantum
ex situ & motu locali, sed re ipsa pluri-
mum variarunt. quanquam in authogra-
phis multò id videtur luculentius, & ha-
beretur annotatum fusiùs, prout fidem ocu-
lis cuiusvis facere possum indubitatum;
hic autem est quidem aliquid, sed calco-
graphus nonnihil aliquando deflexit.
Sed pergit Censor. è quello, che è più,
hà veduto; &c. *Etiā illud, quod am-
plius est, vidit Apelles* (in litteris secun-
dis) *quomodo ex improviso alia nascun-
tur, alia dissoluntur, etiam in medio Sole,
& quomodo aliqua diuiduntur in duas vel
plures, & alia contra sepe multa unun-
tur in vnam.*

Hæc omnia exposuit Apelles in sua pi-
ctura actu ipso, dum Macularum cursus
de die in diem animaduersos proposuit.
Signanter autem hisce verbis expressit.
*Notandum. Quando aliqua Macula cum
suis litteris non amplius appinguntur, illas
tunc in Sole apparere desisse: quando verò
alia cum aliis litteris consignantur, illas
esse alias nouiter apparentes.* En quā cla-
rè dicat Apelles aliquas Maculas in Sole
desinere, alias oriri. Exempla suppetunt
non pauca. Vide Maculam K. hæc in me-
dio quasi Sole exorta est de nouo. Item
Maculas P. Item Maculas Y, quæ perie-
runt ante occasum: taceo plurimas alias,
mirificè mutatas, variatas, auctas, minu-
tas, prout intuenti apparet. Itaque hæc ma-
lè allata sunt à Censore, tanquam ea non
obseruasset Apelles, cum diligentissime id
præstiterit, prout clarè est euictum. Sed
Censor ea vel non intellexit, vel neglexit,
ut sic obijceret glaucoma ob oculos Le-
ctori, quasi ipse multa protulisset, non
animaduersa ab Apelle; & sic primas in-
inueniendo eriperet Apelli, vendicaret fi-
bi: cum tamen Apelles & hic & in episto-
la quarta, nimis clarè eadem ad Velsærum
conscripterit quatuor integros menses an-
te primam Censoris epistolam, & typo
mandauerit annum fere integrum ante
ipsum eundem. Quam tamen prioritatem
libenter suppressam, & non animaduersam
à Lectore videtur velle habere Censor. ne

Censor ve-
ritatem dis-
simulat &
premit; ut
hoc astu in
Inventionis
primatum
laienter ir-
repat.

ipse potius didicisse, & accepisse videat-
ur ab Apelle, quam Apelles ab ipso. Quia
ipse Tabulam Apellis impressam habuit
secum quatuor integros menses, antequā
vllam litteram de hisce Maculis conscri-
beret. Nunc ad oppositiones progredior.

Prima Antithesis. Stimò auanti le Mac-
chie Solari essere tutte di figura sferica &c.
Hora con maggior verità scriue, rarissime
essere sferiche. &c.

Antea (inquit Censor) existimauit (A-
pelles) *omnes Maculas Solares esse figura
spherica &c.* Nunc cum maiore veritate
scribit, *rarissimas esse sphericas.* Posterior
rectè habet, prius autem membrum vel-
lem cum maiore veritate scripsisset, Cen-
sor.

Etenim primò Apelles nec cogitauit
quidem vnquā, *Omnes Maculas esse spheri-
cæ figuræ.* Deinde particula, *Omnis*, nun-
quam est vsus Apelles. Verba illius in e-
pistola tertia Corollario 4. sunt hæc. Si per
splendore Solis liceret partes illarum col-
lustratas à non collustratis discernere, vi-
suros nos plurimas circa Solem Lunulas
cornutas, gibbas, nouas, & fortasse etiam
plenas. Hæc Apelles. Vbi nunc ista propo-
silio, *Omnes Maculae sunt figuræ sphericae?*
Nusquam dixit, nusquam cogitauit Apel-
les. Imò de figura non spherica satis clarè
pinxit & scripsit epistola 1. verbis his, dum
dixit, E multis sepe Maculis paruis vnam
magnam constari, ut proinde videatur vna
longa, aut etiam triagula, sicut fit in Ma-
culis A & C. quæ tamen per tubos multæ
virtutis discernuntur, sicut ego feci in Ma-
cula A, quæ conflatur ex tribus; at verò
C, ex quinque; D ex quattuor, quas
proinde ut & reliquas coniunctas, vnicis
litteris consignauit. Hæc Apelles, qui po-
stea statim de singularum circa figuram
mutatione subiungit, prout in prioribus
etiam ostendi. Itaque Apelles non agno-
uit neque asseruit hic, *omnes Maculas
esse figuræ sphericæ, & falsum commisit*
Censor. Neque ex eo, quod dixit Apelles
visum iri plurimas circa Solem Lunulas,
sequitur necessariò omnes Maculas esse
figuræ sphericæ; nam etiam si non omnes
Maculae sint aut ponantur esse figuræ
sphericæ, nihilominus si extra Solem
à nobis aspici possent, apparerent pluri-
mæ Lunulae; Primò, quia plurimæ Ma-
culæ ex tanto numero, successiue possent
apparere sphericæ.

Vnde


Censor tex-
tui & sensui
verborum
Apelleorum
affingit.

MACVLAE IN SOLE APPARENTES OBSERVATAE


anno 1611. ad latitudinem grad. 48. min. 40.

63.

b



a c, horizon. a b c, arcus Solis diurnus. Sol oriens ex parte a, maculas exhibet quas uides occidens uero c, easdem ratione primi motus, nonnihil inuertit, et hanc matutinam uesper tinamq; mutationem, omnes maculae quoti die subeunt Quod semel exhibuisse et monuisse, sufficiat.



I.

Possent Maculae instar Lunularum apparere, etiamsi non essent corpore sphaerico praeditae.

Vnde si multū impetraret vis argumenti, obrineret plurimas Maculas sphaericas esse, non *Omnes*. Sed ad Lunulas constituendas neque hoc requiritur, ut figuram sphaericam tam strictè & rigidè sumamus, sufficit enim qualisqualis sphaericitas ad hanc Lunularum apparentiam constituendam. Itaque Documentum primum, epistolæ quartæ quod tale est, *Maculae sphaericae ad visum sunt rarissimae, creberrimae mixtae, oblongae, polygonae*; nihil penitus repugnat huic assertæ apparitioni Macularum Lunari circa Solem; quia ad hunc aspectum constituendum, sufficiunt Maculae oblongae, dummodo aliquam sphaericitatis similitudinem praesferant. Nihil ergo præter rem dixit Apelles, nihil ad rem attulit Censor, dum ex apparentia Lunularum imperitè & contra historicam veritatem, falsò affirmat, Apellem existimasse. *Omnes Maculas esse figurae sphaericae* id quod nunquam in mentem illi venit. Nimis hoc est alienum à veritate. Neque porro ad Lunæ aut Sideris cuiuscunque constitutionem requiritur omnimoda sphaericitas. Luna non desineret esse Luna, etiamsi sphaeroidalis esset. Neque Saturnus, Saturnus esse desisset si oblongus perseverasset. Sic ergo aliquantulum rotunda corpora tametsi non sphaerica, sed oblonga possent variationem Lunarem in splendore imitari, quamvis perfectè sphaerica non essent. Censor ergo Lectori fucum parat, dum Apelli tales nassas ponit.

Oppositio secunda. *Apelles in primis litteris putavit Maculas à Sole valde esse remotas; in secundis contentus est, ut eas tantisper à Sole eximat, ut non multum distent &c.* Primò, Apelles in primis epistolis nunquam dixit, neque opinatus est, Maculas à Sole multum esse distitas. Neque ex loco quem pro se Censor adducit, id quod vult Censor, elicitur. audiamus textum.

„ *Subit opinari, à Sole usque ad Mercurium & Venerem in distantia & proportionem debita, versari Errones quam plurimos, è quibus Nobis soli ij innotescant, qui Solem motu suo incurrant &c.*

Tota difficultas est in duobus verbis, *Subit opinari*, quis sit illorum sensus; nimirum Vtrum sit idem, *Subit opinari*, quod lubet opinari, placet opinari, volo

II.

dicere, opinor, sentio, existimo? An vero alia harum vocum sit vis, significatio, & sensus? Primo proposito modo, intellexit illa Censor, & sic contrarietatem obiecit Apelli.

Prima significandi energia, quam attribuit Censor verbis hisce, *Subit opinari*, non inest. Neque enim subire apud Latinos aliud propriè significat, quam intrare, subingredi &c. Quæmodum pleni sunt omnium Scriptorum libri. Deinde per Metaphoram & Translationem significat *Subire*, in memoriam venire, occurrere menti, cogitare. Id quod etiam omnes Classici Scriptores probant. Apelles autem verbum *Subeundi* adhibuit secundo significatu, seu Metaphoricè. Et est sensus. *Subit opinari à Sole usque ad Mercurium versari Errones &c.* idem, qui, *Pulsat animum cogitatio opinandi; Occurrit menti cogitatio opinandi; Occurrit, venit in mentem existimare &c.* Et huius translatitiæ significationis sunt pleni omnes optimorum Auctorum libri.

Quod ergo Apelles hoc & non Censorino significatu usus sit vocabulo *Subit*, probatur Primò, Quia significatio altera Censoris non est Latina sed barbara, peregrina, nulli bono Auctori usitata, quod Apelli satis constabat. Nam *Subit*, non est idem quod *lubet, placet*. Quo autem sensu vocem illam adhibuit Apelles, eodem frequentarunt Auctores Latinitatis passim.

Adde, quod etiamsi vox hæc, significaret quoque *lubet, placet &c.* Tamen Apelles eandem hoc sensu, hic loci non usurpavit. quiuis autem suorum verborum est interpres. & sufficit Apelli ad malam interpretationem Censoris refutandam, si ipse pro se sensum commodum & obuium afferat suorum verborum. Melior est enim conditio possidentis. Sed quid de vnus vocis sensu pluribus, cum Apelles suam sententiam expressissimè explicet epistola eadem, Corollario primo „ hisce verbis? E quibus omnibus deducuntur ista Corollaria. Primum. *Has Maculas à Sole non multum recedere.* Oportebat igitur Apellè nimis immemorem aut stolidum esse, si modò scripta, vellet euertere, sensu & verbis contradictorijs, & priorum nullam penitus facere mentionem. non est stilius hic neque Apellis, neque cuiusquam sensati.

Apelles

I.

Apelles Marco Vellero & alijs ista lecturis aliud nihil voluit insinuare, neque ex vi verborum, & modo loquendi aliud innuit, quàm cogitationem & ansam, quâ vel Apelles, vel quisquam alius posset induci in suspicionem, coniecturam vel opinionem, inter Solem, Mercurium, atque Venerem vagari plures Planetas; ansa sumpta ex hoc Macularum Phænomeno. Et propterea absque persona atque tempore indefinite, idque summo studio est locutus. *Subit opinari siue Apellem, seu quemlibet alium &c. versari Errones &c. & hæc est cogitatio, & nihil ponit in re, cui Apelles assensum non præbuit ut constat ex scriptis paullo ante, & paullo post epistola sequente, vel ipso Censore teste. Interim utrum sint Errones isti nec ne, relinquit Apelles cuiusvis iudicio; ipse non negat fieri posse, non affirmat esse, sed tenet & docet Maculas has à Sole non multum recedere.*

Falsum ergo scribit Censor dum ait, Stimò già che le fossero Stelle erranti, e situate in diuerse lontananze dal Sole &c. Existimauit olim Apelles, Maculas esse Stellas errantes in diuersis à Sole distantijs, intra Solem, & Mercurium, & hunc atque Venerem. Nunquam existimauit hoc Apelles, sed simplicem huiusce rei cogitationem exposuit Vellero, An forte ita esse posset, an sic aliquis suspicari? an ferri coniectura probabili? Interim pedem à lata iam sententia non mouit, sed fixum tenuit. Non est idem, Subijt opinari Errones versari inter Mercurium & Solem, & Existimauit Apelles &c. Occurrit Apelli existimare; ergo existimauit Apelles. Negatur hæc consequentia, quæ si valeret, malè ageretur in rerum natura. Occurrit furari; venit in mentem cogitatio, maledicendi. Ergo furatus est, ergo maledixit. Non sequitur, est fraus, & fallacia argumenti. Vellem ut Censor melius latinitatem addisceret, tum demum Apellis picturam Latinius idest verius censeret.

Tandem dato sed non concesso illo Censoris sensu, nihilominus non sequitur, Apellem sensisse Maculas à Sole multum recedere, etiamsi sensisset multum recedere Errones; quia illi qui Solem eclipsant, & Maculas efficiunt, semper sunt vicini in sententia Apellis; remoti So-

II.

lem nunquam subintrant, in hac supposita Apellis sententia. Cur autem hoc fiat ratio inuestigatur; quod fiat, sensus & experientia cum ratione habetur &c. Nihil ergo obtinet contra Apellem Censor, & vitiosas oppositiones fingit.

Ex hætenus disputatis abunde opinor, Veritas circa Inuentionem huius Phænomeni elucescit, motum Apellis, Tabulæque integritas constat, cuius Pictura si nãuis nonnullis aspersa, si debitam colorum temperiem atque distributionem in multis desiderare visa est; cogitandum, motum successiue fieri, & inter multas spinas, eniti rosam, sensimque aperiri; quæ Vrsina cum sit, partus delicta, si quæ commissa sint, lambendo emendari posse. Ea porro quæ in Censoris animaduersiones allata sunt, defensionis inculpatæ intuitu, non offensionis ergo, ipsiusque Censoris bona voluntate facta sunt quemadmodum ex subiectis patet.

Apelles inculcata tute la defensione suscepit.

25 SCRIPTORVM APELLIS EX mente Censoris approbatio.

Censor in fine Epistolæ suæ tertiæ pag. 150.

30 „ Non desiderando altro che'l venire
„ in cognizion del vero, hò liberamente
„ spiegata l'opinion mia, la quale son an-
„ co disposto à mutare qualunque vol-
„ ta mi sieno scoperti gli errori miei; e
35 „ terrò obligo particolare à chiunque
„ mi farà grazia di palesargli e castigarli.
„ Cum aliud nihil desiderem, ait
„ Censor, quàm in cognitionem veri de-
„ uenire, liberè sententiam meam ex-
40 „ posui, (contra Apellem videlicet) quam
„ etiam mutare paratus sum, quandocun-
„ que errores mihi fuerint ostensi mei,
„ singulariterque illi obstrictus ero, qui
„ hoc me beneficio affecerit, ut illos dete-
45 „ gat, & castiget.

Censor paratus est suos patefactos errores cū gratiarum actione agnoscere & emendare.

Sed ut in ore duorum stet omne verbum: accipe etiam ad stipulationem Angeli, qui pag. 4. ad finem sic protestatur.
50 „ Non però s'aspetta talmente il tuo fa-
„ uore, & applauso, che si ricusino le
„ tue censure, e contradizioni in quel-
„ le, che dubbie, e non ben conferma-
„ te ti apparissero: anzi ti rendo certo,
„ che al Signor N. non meno le correz-
55 „ zioni, che le lodi, non meno le con-
tra-

Ignoratio latinitatis multas saepe præbet impingendi occasiones.

Censor contra Apellem etiam in sua sententia ex hypothesi data, nihil obtinet.

I.

„tradizioni, che gl'assenti faranno sem-
 „pre care: anzi tanto più quelle che
 „queste, quanto, quelle nuoua scienza
 „possono arrecargli, e questi la già
 „guadagnata solamente confermarli.
 „Non tamen, inquit, ita expectatur
 „tuus (pro Censore) fauor & applau-
 „sus, vt tuæ interim recusentur censu-
 „ræ, & contradictiones, in ijs quæ tibi
 „dubia & non bene confirmata viden-
 „tur. Quinimo te certum reddo, Do-
 „mino N. nō minus correctiones, quàm
 „laudes, non minus contradictiones,
 „quàm assensus semper gratos fore. &
 „tanto quidem gratiores illas, quàm

II.

„istos, quanto ampliùs ex illis noua:
 „scientia colligitur, ex his solum iam o-
 „lim acquisita confirmatur.
 „Fecit Apelles quod optauit Censor,
 „quod Angelus probauit, Veritatem osten-
 „dit, errores patefecit in quibus perseuera-
 „se Censorem, constat ex Simbellatore, vbi
 „doctrinam suam de Maculis Solaribus in
 „Historiæ epistolis comprehensam, nō tue-
 „ri solum nititur, sed calumnijs in immeren-
 „tem sparsis, noua velut cerussa allinere af-
 „fectat. Veri igitur amplexum expectat A-
 „pelles, paratus à quocunque pariter cdo-
 „ceri similique beneficio affici.

Omnia ad maiorem Dei Gloriam.




COAST


WILSON

NO 301

NEW YORK



NEW YORK



ROSAE VRSINAE SIVE SOLIS LIBER SECVNDVS.



Summarium Libri.



Vrosa inter spinas, ita doctrina enititur inter difficultates; quæ in hoc Phænomeno offeruntur copiosissimæ; partim è Sole ipso: nam sicut Rosa tactu, sic Sol visu est difficillimus: partim ex instrumentis, quorum acquisitio, vsus, & infusus defectus, obseruatori multum laboris, tædij & curæ creant: partim ex ipsa obseruandi praxi, nec non obseruatorum ordinatione; quæ si molli bracchio peragantur, Phænomenon eruditorum theatro, deprauatum atque indignum obtrudunt, vti visum libro primo: si studio seuerò contrectetur, limaque accuratiore subigatur, sui cultorem tantum non enecat: ita argutam, ita indefessam operam exigit. In hoc igitur Libro ego difficultates ex obiecto; difficultates ex instrumentis necessariis; difficultates ex vsu enatas eruo, enodo, & pro virili caueo: eaque occasione Tubum opticum, è fundamentis opticis, quod hactenus fortasse multi desiderarunt quasi per transfennam demonstro. Tu quisquis hæc legis, vera & bona Deo, lapsus mihi attribuito; & homo cum sis, humanitatis memor esto. Vale & conatus bonos boni consule.



Studium Astronomicum, Phænomenis indagandis deditum, laboriosum. Cap. I.

I.



I humano & naturali sciendi modo, secundū Philosophum, nihil est in intellectu, quod non aliquando, & aliquo modo, fuerit in sensu id peculiari ratione cū in omnibus illis sciētijs verum est, quæ circa res sensibiles inuestigandas occupantur; tum verò maxime locum habet, in ijs quarum omne studium in cælestium rerum inquisitionem dirigitur. Vnde qui vult Phænomeni huius solidam, fundamentalem atq. exactam consequi scientiam nequaquā se id obtenturum speret cogitando, dum cerebrum caputq. suū meris speculationibus, absq. præuio sēsus aut alicuius physici seu Mathematici experimenti sagaci atq. explorato ductu, ad dolorem vsq. inaniter contorquet: qui hoc inquam philosophandi genere vtitur fixū pedē nusquā firmabit, insuperabile veritatis palmā nūquā apprehendet: quia talis pro scopo suo nō veritatem, sed suam sibi præfigit vanitatem. Quo tamē tenore, multi nihilominus hoc æuo incedentes, satis sese in hac palæstrā egisse putāt, si, quod animo semel conceperunt, atq. defendēdum mordicus susceperunt, ad tempus & in speciem tueri valeant, non aduertentes idem non esse, commissas, sibi arces atq. tradita militiæ propugnacula viriliter defendere contra oppugnantem inimicum, & arbitrias nec non impetu spontaneo sæpius arreptas potius opiniones, quā maturo rationis iudicio libratas, & in philosophia studiosè exquisitas, sapiēter propugnare veritates. cum hic semper vera defendantur atque teneantur fortitudine militari castra: illic frequenter ad similitudinem veritatis excogitata cū magno applausu publicis afficiantur honoribus figmenta. Neq. enim res asserta, ideo tenenda est vera, quia ab oppugnatore non potuit monstrari falsa: cum experiamur quotidie, tam falsum, tamq. absurdum reperiri ferè nihil, quod nō soleat aut possit aliqua probabilitatis & verosimilitudinis specie colorari.

Sed vera & solida philosophandi ratio, quā & sacrae litteræ passim cōmendant & ratio ipsa suadet, & tenuit antiquitas, moderniq. solidiores naturæ inuestigatores

II.

sequuntur, ab effectu ante oculos posito, ad ignotas rerū causas indagādas progreditur. effectus autē vel sēsu indubitato, vel infallibili aliorū traditione, atq. doctrina diuturnis, necnon frequētatis experiētijs stabilita hauriuntur. De Cælestibus autem rebus plurima hucusq. tradita, accepta & facile credita sunt potius, quā firmis rationibus cōprobata, vel certis sensuū experimētis suffulta: quod ob nimiam illorū ab orbe terreno remotiōē, sēlu experiri pauca admodum fuerit cōcessum.

Nunc autē, post nobis patefactū, diuino beneficio, ex Germania primitus oculum illū perspicacissimū Tubū inquā optici, fas est etherias intrare domos, & rutilantia illa corpora viciniore obtutu obire, quin & ipsa penetralia & adyta cælestia secretius aliquāto lustrare intimiusq. peruadere; vt quæ priora sæcula neq. sensu aliquo stabili, neq. ratione certa aut euidēti attigerunt, velut præsentē aspectu, palpabiliq. contactu liceat nobis attrectare.

EX IPSO SOLE, HVIVS PHÆNOMENI Parente, tres generales scaturiunt difficultatum fontes.

CAP. II.

Qvo in genere primū atq. præcipuū sibi Sol locū vendicat, qui cū à nobis in terra degentibus per se & immediate solo visu percipiatur, ab hoc et vnico illius penitus obeundi, potissima subsidia sunt petenda. Sed quæ daret miser, indigus ipse? quid doceret oculus mentem de Sole, quod discere ab eodem haud valet. Nā quod lux diei noctuæ hoc Sol est oculo, qui tot in eundem spicula euibrat, quot à se radios emittit; qui dum illustrat visum, excæcat.

Tamet si enim Sol intra latitudinē eorū quæ vsu percipiuntur, cōprehenditur: tñ vt loci immēsitare, ita naturæ suæ Maiestate sensus nostros in tantum excedit, vt sicut ipsum non attingit manus, ita Oculus noster non ferat, sed à fulgoris abundantia fulminis instar ictus, aciem in ipsum suam figere nullatenus possit. Lux igitur Solis, Oculo nudo inuidenda, omnem quoq. certam de Sole cognitionem ex aspectu libero eliciendam. homi-

Tubi optici beneficio multa panduntur.

Sol obiecti Visus & ex eo Difficultates.

Difficultas prima enim lucis Solaris intensione.

I.

ni præscindit: & hoc est vnum:

*Difficultas
secunda ex
anguli viso-
ry exiguita-
te.*

Deinde etiam si totus Sol oculo illæso pateret, id quod ordinariè in crepusculis cōtingit, quid inde notionis auferret oculus? scimus Solem molis esse vastissimæ, nihilominus tamen incredibilis quæ is à nobis distat intercapedo, ipsum ferè totū absorbet, vt Astronomi eum sub quo videtur, angulum præ paruitate vix estimēt radiosq. ab extremitate & centro Solis allapsos, pro vno quodammodo habeant, dum omnia ipsius puncta superficialia in circulum quodammodo confidentia per lineas ad planum Solis perpendiculares interq. sese parallelas sine errore sensibili mensurant. Et hoc est secundum.

*Difficultas
tertia ex pe-
rennii Solis
motu.*

Amplius neq. lux, neq. visa Solis magnitudo obstat quo minus incōnuēti obtatu oberrare eundem visus noster possit tamen perpetuus ipsius ab ortu in occasū motus, eiusdem cōtemplatoribus meliori præsidio destitutis negotia infinita faceffit, omnesq. obseruandi modos admodum difficiles & lubricos reddit.

Et hæc tria capita in Sole reperta inuehunt in instrumenta, in tempora, in loca quibus Sol obseruatur, difficultates haud vulgares: quæ in ipsam pariter obseruationem ipsumq. obseruandi modū passim redundant: vt hic taceam ipsas explanationes, & loci atq. itineris Macularū tam veri, quam apparentis situs atq. constitutiones, suis difficultatibus nequaquam immunes esse: quas proinde omnes breuiter & singillatim perstringere, operæ precium duxi.

DIFFICULTATES EX INSTRUMENTIS & primo reuocatur ab hac inquisitione naturalis oculi potentia, & videndi ratio.

CAP. III.

Omnis igitur, vt dixi, hoc phænomenon obseruandi modus procedit & pendet ab oculo. Oculus autem in quamlibet rem fertur, vel si maius, res quæuis ad oculum tendit, vel directè atque immediatè, vel mediatè & refractè siue reflexè.

Priore modo venit hoc Phænomenon ad oculū intuitu libero & naturali, radijs ad oculū nulla arte infractis aut reflexis. Posteriores vel radijs arte refractis, quod fit vitris ad hanc rem idoneis & artificio.

*Multiplex
Solis viden-
di ratio.*

II.

sè preparatis & dispositis: vel deniq. reflexis, vbi triplex iterum ratio inuenitur. Aut enim oculus solem per nudum foramen in chartam naturaliter illapsū ex eadem tāquam reflexum excipit; aut per tubum eodem artificiosè deductum con-
tuetur; aut ex speculo, alioque modo re-
percussū cernit: vbiq. labores, vbiq. difficultates.

Nam velle solem libero oculo intueri, atq. hac ratione apparentiam hanc inuestigare: præterquāquod superuacaneæ, & damnosæ id esset stadium operæ. Cum enim Sol oculum in se, nisi matutinis vel vespertinis septus vaporibus, aut aliqua nebula vel nube æqualiter humida & perpicua obtectus nō admittat, neq. sic quoque nisi maximas Maculas ostendat: minores autē Maculas umbras, aut Faculas, quibus Phænomeni pars non minima cōstituitur, nunquam frustra sese fatigat, quisquis hoc modo istam rem affectat; nisi cum oleo operaq. etiā visus iacturam quis velit facere. Quemadmodum primū tubi inuētores relatione haud improbabili aliorum aliquoties nunc didici. Qui cum frequēti Tubi vsu Solem inspexisset, inflammatum tandem amisisse oculum, atq. ex eiusdem cōtagione alterum deinde infectum vna cum vita perdidisse narratur. Certè si hæc difficultas superabilis esset, antiquorum in obseruando Sole industriam atq. pertinaciam, haudquaquā elusisset, qui cum à summo mane in serum vespere fixis in eundem ferrentur obtutibus, tamen eorum, quæ nunc beneficio nuper repertorum instrumentorum clarissimè quotidie visuntur, nihil penitus animaduertērūt. Dato tandē, sed non

concesso, dictis temporibus matutinis, & serotinis omnia in Sole limpidissime spectari; quia tamen tunc sol semper ouiformi seu quasi Elliptica schemate, continēter variabili, vna cum sibi adiūctis Maculis apparet prout in meo sole Elliptico, atq. refractionibus, Cælestibus fuscis tractaui, inde ad propositum nostrum vel parū, vel nihil omnino solidi concluderēs. Sed demus prælibatas difficultates omnes vel nullas vel sublatas esse, sit Solis iubar oculo cum amēnitate spectabile: esto Solaris circulus ad multa milliana eidem expansus motus quotidiani varietas nil inferat molestiæ: circularis figura semper obuerfetur: omnia in eo clare, dilucide, sine vlla turbatione spectentur: detur inquam

*Difficultas
alia ex figu-
ra Solis or-
ta.*

I.

hæc omnia: nihilominus tñ ex hoc solo intuitu Astronomus sufficienter ad certas inde deducendas consequentias satis instructus non est. Nisi enim eadem proportionem oculares illas suas observationes in chartam circulo inclusas ad vnguem transferat, solidi nil efficiet. Hoc autem neque solo aspectu, neque libera manu per imaginationem solam directam fit: igitur aliorum instrumentorum adminiculis opus est. Quemadmodum fieri videmus, in rebus procul positis mensurandis: quarum magnitudines oculo solo comprehendimus quidem, sed non itidem mensuramus. Manet ergo, nudo liberoque Oculo, hanc apparentiam atque experientiam sufficienter hauriri, indagari, examinari, tractari non posse. Quare ad aliorum instrumentorum idonea necnon necessaria subsidia omnino est confugiendum.

HELIOSCOPII INVENTIO,
descriptio, usus, & difficultates.

C A P. IV.

VT igitur Oculus in hoc totius vniuersi nobilissimum atque maximè refractarium obiectum, Solem inquam, aliquid immediatè, seu intuituè possit, oportet instrumento eiusmodi illum muniri, quod & splendorem Solis sufficienter retundat, & tamen apparentem molis exiguitatem in amplam vastitatem diducat: sic enim visus eundem libere lustrabit. & quidquid in eo hucusque absconsus fuit, phantasiæ atque intellectui sincere manifestabit. Illud autem instrumentum, quia ad solum Solem ex instituto à me excogitatum olim atque elaboratum est, atq. ad alia obiecta visenda vix adhiberi solet, *Helioscopium per Antonomasiam* appellare volui: quemadmodum quod ad omnia indifferenter obiecta assumitur, ob efficacem quam circa eandem exercet vim, *Telioscopium*. Nomine porro illius intelligo Tubum opticum vitris coloratis cum debito artificio ad istud elaboratis adornatum, ut colorum ipsis inhærentium beneficio vehementior Solis radius fractus atq. hebetatus, ad visum moderatior minusque noxius penetret. atque ob hanc prærogatiuam merito huiusmodi instru-

*Helioscopij
descriptio.*

II.

1 mentum *Helioscopii* nomenclaturæ gaudet. Nam alij quicunque tubi diaphanis lentibus præditi, id per se non præstant. *Helioscopium* igitur vitris constat coloratis
5 minimum duobus, conuexo & concauo, materia bene crassa, pura, solida, non bullis, non arenulis, minimè verò venis, tractibus, seu vndis infessa, elaborata in segmentum seu frustum perfectè
10 sphæricum, quorum alterum sit vel vna ex parte, vel vtrinque conuexum; alterum concauum, vel vtrinque, vel concauoplanum, prout in tubis non coloratis fieri consuevit. Nam confectio istarum
15 coloratarum lentium, ab aliarum perspicuarum elaboratione, nihil penitus differt: quemadmodum neque collocatio in tubos. Quod si crassities duarum lètium Soli retundendo non sufficit, addatur vitrum similiter coloratum, & vtrinque
20 planum sed tersum & apprime politum, aut plura, prout res exegit. Perinde autem est, quo loco eiusmodi in tubum inserantur, siue ante, seu post, seu deniq.
25 inter lentes adiungas; dummodo sint omnia hæc vitra tam inter sese quam cum lentibus parallela, & ad axem coni solaris per sua centra singula erecta. Color omnium quantum fieri potest sit vnius
30 generis, verbi gratia cæruleus, viridis, flauus, fureus, aut quicunque tandem alius quod si vniusmodi color haberi nequit, accipiantur mixtim qui possint. Talem ego tubum ab initio composui, è fragmentis cæruleis laminarum vitrearum,
35 quo & Maculas in Apelle meo editas obseruaui, sed & faculas optime discreuit qui tandem tubus virtutis sanè non vulgaris Sereniss. Arch. Maximiliano, pient. mē. Tyrolis Domino, atq. Ord. Teut. Magn. Magistro, cessit eidemq. Maculas & Faculas Solares sæpe ostendit.

Quo autem Tubus in se fuerit potentior, eo ad hanc rem aptior existet: potentiam tubi metior, penes obiecti magnam & distinctam representationem; quod plerumq. imo cæteris paribus, sēper præstant ij, qui sunt lōgiore, seu quorum vita cōuexa sunt sphærarum maiorum segmenta. de qua tamē re ex instituto in posterioribus agetur. Hoc tamen hic obiter aduertat velim, quo tubus visam obiecti partem magis amplificat & accuratius distinguit, hoc minorem obiecti portionē
55 vno obtutu semper repræsentat in oculo, cæte-

*Helioscopij
lentes à lentibus Telioscopij, solis coloribus differunt.*

*Dispositio
lentium.*

I.

ceteris paribus, ita ut in simili praxi necesse sit Solem totum per partes & sensim lustrare; quæ res nec parua nec pauca parit incommoda. Sed cur hoc accadat, percipies alibi in libri huius decursu.

Comparatio ergo talis Helioscopij, requirit magnam industriam, laborem, patientiam; sollertiam & sumptus non adeo exiles; quæ difficultates multos ab huius Phœnomeni inspectione arcent, quod de simili instrumento sibi non provideant. Obuiatur tamen huic malo non nihil, si communem tubum, seu Telioscopium bonæ virtutis, quod tolerabili pretio passim venditur, tibi compares, & vitris planis colore tinctis interiectis efficaciam lentium diaphanarum pro re nata contemperes; sic enim Solis aspectu etiam potieris. Sed quia hac ratione Solaris conus per multa media traducitur, quæ positione & tam multiplici refractione, conum Solis radiosum facile labe aliqua possunt inficere, præstaret ipsas lentes crassas & colore satis denso infectas esse. quas artifices eadem sanè opera possent formare, polire atq. conficere, quæ alteras solent. Sed, quæ est morum nostrorum deprauatio, gratificari nolumus alijs, etiam quando absq. vlla iactura possumus. nec nisi cum vtilitate nostra, alijs prodesse solemus. Mercatores isti lucra sua æstimant, solam emptoris voluntatem, & ex rei emendæ vsu per industriam emptoris reperto, pretium in immensum augent. Vtus autem & fructus quos ab Helioscopio quis percipiat, sunt sequentes.

Primò, Possunt Macule, & Facule melius & distinctius immediatè discerni, quam villo alio modo seu instrumēto, quo oculus in Solem dirigitur, quia color materiæ arcet Solis fulgorem; figura autem lentium solaris corporis mirum in modum amplificat molem. Et profecto iucundissimum est per talem tubum in Sole aspicere Faculas, quæ respectu circumstantium superficialium haud aliter obueniunt oculo, quam si quis ex editissimo loco in planitiem terrestrem despiciens multos, & diuersimodos hinc inde intueatur lacus, piscinas, paludes. aut mane vel vespere, sereno alioquin cælo, sparsas hinc inde tenues nubeculas, præ reliquo æthere, ex imbibito Solis radio, fulgidas atq. albicantes. aut sicut serenis noctibus, via lac-

II.

tea, sereni cæli plagas intermicanti veluti chrystallo distinguit, ita ex alijs phœbei disci campis, carbunculorum instar, effulgescent istæ flammularum luculæ de quibus hic innuisse ista sufficiat, cum in progressu copiosius sit disputandum.

Secundò, Tam Macularum quam Facularum, magnitudo densitas & raritas, præcisio, inæqualitas, lux & tenebrositas, admodum præcisè notatur Helioscopio, sed probo & excellenti.

Tertiò, Situs atque interualla earum inter se, & ad Solem respectu centri & marginis, itemque numerus optimè peruidetur.

Quartò, Figuræ, magnitudinis, loci situsque habitudo & mutatio quotidiana, nec non ortus, & occasus illarum tam mathematicus, quam Physicus in ipso Solo nascentium, & pereuntium, haberi potest.

Quintò, Motus earum & motus itinera ab orientali Solis plaga in occidentalem continuus, & ordinatus pulchrè aduertitur.

Sextò, Tempus etiam & duratio motus singularum, facili animaduersione dignosci potest, & multæ quidem hac ratione conspiciuntur, quæ alias omnem sensum effugerent: excipio semper transmissionem Solis per Telioscopium, quæ omnino anteferenda videtur, teste experiētia.

Septimò, Duratio earum ab ingressu ad exitum vsq. per hanc inspectionem exactè admodum & singulariter deprehenditur ex quo maximè cursus periodici indagatio pendet: plurimumq. adiuuenti nanciscitur. Moræ etiam & intercapedines diurnæ, necnon inter sese collationes ad sensum aliquatenus haberi possunt, ex quibus utcūq. colligas, omnesne æquali tēporis spatio Solē percurrāt, an secus.

Octauò, Macularum gracilitatem atq. attenuationem, itemq. apparentem & veram tam augmentationē quā diminutionem, simulq. apparentem coitionem atq. adunationem, vicissimq. separationē atq. discessum excellentissimè datur venari.

Nonò, Nuclei Macularum & nimbi Facularū luces & caligines, totius deniq. Solis habitus, varietas, & vicissitudinarie affectiones perquam optimè dignoscuntur.

Decimò, Denique si Helioscopio maximè virtutis vsus fueris, hæc nouissima, & hætenus nulli cognita aut

Ex Telioscopio Helioscopium facit.

Helioscopij vtilitates.

I.

euulgata videbis. primò, Totam Solaris Hemisphærij apparentis superficiem heterogeneam, ex umbris atque luculis cōflatam. secundò, Aspectabis eundem Solem tanquam mare fluctibus asperum, & fluctuantibus vndis crispum, neque id modo eodem, tempore diuerso, sed hodie aliter quam heri, & cras aliter atque hodie, & sic nunquam eodem schemate, eodem vultus habitu, quod mirabilissimum, sidus illud aureum, aspicias. Sed hanc verissimam nouitatem & veritatem nouissimam hic per transennam tantum delibo, postea ad finem tractaturus ex professo ad longum.

*Helioscopij
usus ad vi-
dendum so-
lare Phæno-
menon secu-
rus, non au-
tem ad trans-
ferendum
in chartam.*

*Linea verti-
calis certa
positio, He-
lioscopio so-
lo, non obti-
netur.*

Et hætenus quidem hæc opportunitates & commoditates Helioscopium Solis obseruatorij certissimo affert, ea tamen quæ ipso infallibiliter conspiciuntur in Sole ab oculo, non perinde eadem necessario dexteritate à manu transferuntur in chartam, vt inde tanquam ex idea stabili fixa, secuta, atque authentica, motum tam apparentem quam verum, & ex motu Macularum, inter se, & à Sole distantiam, vel contra eruas, & sic alia innumera ex hisce pendentia, irrefragabiliter traducas. ex sola quippe Solis per Helioscopium inspectione, Maculas libera manu sola imaginatione firmatas in papyrum describere, est opus laboris ingentis, longi, incerti: dato enim, quod tamen casu potius eoque rarissimo eueniat, omnes Macularum, & Facularum, magnitudines, situs ad se & Solem, optimè transumptas, proportionem omnino vera; quod tamen pro certo nunquam scies, nunquam asseuerabis: non tamen ideo obseruationum schematismis, Verticalis plani sectionem ita inscribes, vt absque erroris omni suspitione esse possis, vel alium facere. Quare etiam si istud instrumentum plurimas in hoc obseruando Phænomeno difficultates aut omnino tollit, aut vehementer lenit, præcipuam tamen, quæ motui Macularum cum securitate reperiendo atque statuendo obstat, relinquit cuius tollendæ gratia, aduocandus est in auxilium alter Solis in chartam deducendi modus, & videndum quid in illo facilitatis, quid difficultatis ad præsens nostrum institutum insit.

Figuram huius Tubi contemplari poteris in Machinæ Thelioscopicæ scenographia, cap. 8. in summitate, ad lit-

II.

1 teras a b m n, expressam.

MODVS NATVRALIS SOLEM
in papyrum proiiciendi eiusque
Difficultates.

C A P. V.

10 **D**Vplex est Solis immittendi modus. Alter simplicissimus, naturalis, & absque vllò fermè apparatu; alter artificiosus, ingenij, sedulitatis atque impendij maioris. de primo nunc disseram, paullo post de secundo.

*Naturalis
Solis per fo-
ramen immis-
sio.*

15 Prior ergo modus est is, quo Sol per exile foramen rotundum, in locum obscurum intromissus atque distantia à foramine debita radio suo cono in chartam ad angulos rectos oppositam exceptus, totum suum vultum, vna cum Maculis, Faculisque in eo contentis ita clarè atque dilucidè explicat, vt quidquid in illo est notabilius pro tuo libito & intueri & annotare valeas, seruatis Macularum inter sese & ad marginem Solis interuallis: quæ res quemadmodum sua commoda non pauca, ita etiam multa habet incommoda.

Commoda sunt hæc.

30 Primò, Ad huius rei praxim aliud agere nil est necesse, quam in conclauis alicuius domus, vel sub tecto, factis tenebris, valuam aliquam perterebrare, vt Sol per foramen factum ingredi valeat; & 35 afferculo alicui plano, mundè dolato chartam mundam cerâ aliove glutine allinere, cuius obiectu ad axem coni Solaris orthogonalis, radiū Solis excipias in basin dicti coni terminatum, circulo lucido arbitrario, magno vel paruo; prout à foramine procul vel prope abfueris: quo tamen magis abscesseris, eo Solis discum maiorem, & quæ in Sole latent arcana manifestius cernes. Vt autem inter obseruandum de cono solari orthogonos excepto securus sis, ex centro circuli obseruatorij stilum æquabilem erige ad angulos rectos, altitudinis libere: hic si nullam umbram in subiectum circuli planum proijciat, sed in semetipsum eandem resorbeat; situs tabulæ chartiferæ, 50 optimus erit.

Secundò, Peracta obseruatione. (de cuius praxi peculiaris erit dicendi locus) nota-

I.

Linea ver-
ticalis in-
ductio.

notatisque centraliter Maculis, atq. Faculis, facile & sine errore in obseruationis circulum, situ & loco immutatum, induces sectionem Verticalis plani, eo tempore à centro Solis per centrum baseos con Solaris, in circulum obseruationis congruè proiecti, centroque terræ necnon puncto verticis quod Zenith appellatur, infessi; si nimirum alicuius perpendiculi à seta aliqua vel filo tenui pendens, umbram à radio Solis per centrum figuræ solaris incedentem, in peripheria eiusdem signes, supra vel infra, vel vtrinque huius namque beneficio, locum postea Maculæ & Faculæ cuiusvis in solaris disco illo tempore consignatæ vna cum Ecliptica facile inuenies, atque hac ratione per continuatas obseruationes motum apparentem, & quæ cum illo connexionē habent, deprehendes: prout ego in Apellis tabula feci.

Tertiò, Macularum progressus quotidianos, & eorum inter sese distantias, vel auctas in ascensu, vel descensu imminutas liquido aduerteres: & quod solo Helioscopij vsu per directum obtutum firmiter assequi non vales, id hac adiutus naturæ & manuali opera, sine difficultate, absque hallucinationis metu, cum gaudio atque admiratione assequeris.

Quartò, Præcipua autem & singularis huius praxeos laus atque gloria est, quod apparentes Macularum insigniorum saltē cursus, stationes & loca visā, obtinebis. absque vllō refractionis, alioquin intercurfantis & negotia plurima facientis, interuentu. Vnde & cursus atque loca Macularum vera, sine vlla erroris aut fallaciæ vllius suspitione assignabis. Quæ res, sicuti huius Machinationis propria, ita momenti est maximi. Nam hac ratione, si vlla alia, proterius aduersarius in loco vero Macularum assignando, nolens volens constringitur. vt suis locis plenius differetur. Sed hisce sua nihilo minus vt dixi interueniunt, *Incommoda* nam.

Difficultas
prima ex
magna distantia.

Primò, Licet foramen factū sit facile, tamen donec immissus Solis radius ita sese explicet, vti Maculas obtutui in aliqua maiore & satis perceptibili quantitate, atque forma ad hanc rem necessaria re præsentet, omnino magna ab eodem exigitur, ad 10. 15. 20. & plures passus, distantia: locus autem tantus, solaribus ra-

II.

dijs vndique patens, id quod ad rem ferè est necessarium, quia omni diei tempore oportet in procinctu stare, & ridet Phœbo, fauente cælo ostium referare, communiter haud ita facile reperitur: qui tamen si habeatur, non facile obtenebrabitur, vel qua parte Sole obuertetur, fenestras aut valuas foramini faciendo idoneas habebit, & si Sol altius supra horizontem eleuatus fuerit, oportebit ex alto foramen aperiri; vbi autem sunt tam alta habitacula? quod si sub tectum ascenderis, plerumque loci obseruandi difficultas maior oborietur.

Secundò, Sol continuo suo motu à directo foraminis ingressu sensim abit, quo autem maior distantia, eo celerior erit motus, & sic nisi ipsum foramen ad Solem recta possit semper obuerti, fit vt eius vsura non sit futura diuturna, vel certè obliqua, atque ideo fallax, discum enim Solis non circularem, sed ellipticum eumque semper varium procreabit, ad obseruandum inhabilem. Versatile autem foramen efficere, est artis, laboris, sumptusque non vulgaris: oporteret enim habere tam longam, sed rigidam periticam &c.

Tertiò, Amplius ipsa tabella chartifera, con radiosi axi semper debet necessario ad angulos rectos insistere, ita vt axis ad planum chartæ congruum semper rectus incidat, & hæc circulo Solis apparenti parallela semper incedat. huic modo remedium affert stilus erectus.

Quartò, Sed & circulus obseruatorius in charta semel assumptus eadem magnitudine pro vna obseruatione retineri debet, cui deinde con solaris basis, seu lucidus Solis discus æqualis affulgeat oportet, hoc verò obtinere est admodum difficile, & tamen ita necessarium, vt si negligas, fallacem obseruationem edas: nam Macularum inter sese distantia statim ampliantur, quamprimum Solis figura fuerit maior admissa: igitur dum vnam obseruationem facis, ex qua situs & distantias Macularum ad Solem & inter se venaris, operam dabis, vt eadem à foramine immissionis distantia circulus obseruatorius teneatur, qui solarem conum rectè secet, & sectionem circulo obseruatorio æqualem faciat; horū quolibet neglecto, vitiosa obseruatio fiet.

Hæc autem inuiolata in obseruando præstare

Difficultas
secunda ex
velocitate
motus.

I.

stare, est res in praxi difficillima. Porro vni obseruationi vnus tantum necessario debetur circulus obseruatorius, in modo obseruandi quocunque; siue vnam tantum siue omnes, siue multas seu paucas maculas obserues.

Quintò, Insuper istis omnibus euitatis, ipsa Solis effigies in chartam allabitur circulo non adeo munditer ad margines præciso; neque Maculas aut faculas exactissimè terminatas & distinctas in extremitatibus suis offert, sed confuso quodam & nebuloso confinio. Quod ideo fit, quia ad singula foraminis facti assignabilia puncta, fiunt intersectiones radiosorum Solis conorum, qui postea singuli in directum à foramine progressi sese paulatim dilatant, & radios speciem Solis, Macularum, atque facularum deferentes, mutuis congressibus atque intersectionibus miscent, dictamq. immunditiam atque confusionem pariunt. Quod tamen naturæ peccatum inuitabile corrigitur vsu Helioscopij, sicut vicissim, huius in collocandis aptè Maculis impotētia atque incertitudo iuuatur, nec non errandi procliuas euitatur, per hanc naturalem Solis in charta depingendi peritiam, & inductum arte prædicta perpendiculum, & sic alter ab alterius nempe iuuatur ope. Nam ex hac pictura accurate instituta acquiritur Macularum & Facularum apta in Sole positio, distantia ab Ecliptica, magnitudo & figura, iter diurnū, inducti perpendiculi beneficio eruendum: figurarum autem munda præcisio, & densitatum atque raritatum ratio, eruantur Solis inspectione per Helioscopium, atque calami deinde designatione: id quod ego in toto meo Apelle perquā studiosè feci, vsus vtroque semper in obseruando artificio: de qua re fusius egi in libro primo. Huius immisionis figuram require & inspicere Cap. ad num. 7. G. 1. vbi naturam oculi cum arte confero, & hunc modum artificiosum voco, ratione facti foraminis.

IMMISSIO SOLIS ARTIFICIOSA,
per vnā Lentem conuexam, &
eius difficultates.

CAP. VI.

MODVS iste à priore nihil differt, nisi in hoc; quod vbi Sol immissus

II.

1 ante fuit nudo foramine, hic in ipso adhibetur lens conuexa, quæ solares radios directo alioquin progressuros acceptos infrangit nonnihil, & refractione dilatat, 5 totamque Solis speciem, mundam præcisam & naturali maiorem, in basin communem defert.

Commoda huius immisionis artificiosa sunt hæc.

10 Primò. Species mundissima & præcissima in chartam allabitur, cum vegetissima Macularum expressione, ita vt elegantius vix possis quidquam in hoc genere imaginari.

15 Secundò. Imago Solis fit maior, ideoque chartæ à foramine distantia potest haberi paullo minor.

20 Tertiò. Lux etiam multo vegetior & illustrior affulget in basin communem, quam ex nudo foramine fieret.

Quartò. Hoc immittendi & speciem Solarem excipiendi modo, refractione, vel parū vel nihil negotij facessit cursui Macularum recte indagando. Nam in vsu 25 Tubi, vti videbitur suis locis, interueniunt multæ refractiones; lentis videlicet conuexæ, deinde cauæ, quæ plerumque vtrinque caua, radiorum diuersionem auget; hic caua semper exulat, & si conuexoplana magnæ sphaeræ portio adhibeatur, refractione valde æquabilis efficitur, propter similem quodammodo radiorum incidentiam, ita vt extremorum in refringendo vis, à medijs discrepare 30 non sentiatur: quæ res magnum utique ad hanc rem quam tractamus, afferre potest momentum.

Sed huic Solis excipiendi artificio, obstant sua incommoda.

40 Primò. Solaris basis in satis amplum circulum non explicatur, nisi lente magnæ sphaeræ.

Secundò. Et magna nihilominus à foramine distantia, ad obseruandum valde 45 importuna interuenit.

Tertiò. Axis coni Solaris semper debet esse ad ambas lentis superficies erectus; igitur cum Sol axem semper mutet, oportet lentem in foramine semper esse 50 mobilem: hoc autem sine pertica, à foramine ad chartiferam Tabellam vsque protensa, fieri nequit. & hic est potissimus difficultatis cardo: quem quis superat, rem non vulgarem consequitur.

55 Hæc eadem lens vsus longe vniuersaliorem

*Helioscopij
& foramen
naturale se
mutuo iu-
uant.*

I.

liorem præbet, ex quo ad Solem à me restricta est; nam rerum omnium species extra positarum, in obiectam obscuro loco chartam, ordine & pictura multo venustissima deducit: quam pictor imitari, sed gratis adæquare conetur. Has autem species videri & obiectum visus esse, res ipsa loquitur; nec dubitat, nisi qui illas non vidit.

Quod si quis intus positus, inter chartam & lentem oculum applicet, videbit res externas multo maiores situ erecto, & nonnihil confuso: si in loco imaginis, aut chartæ admoueat oculum, intuebitur chaos; si post chartæ & picturæ locum, spectabit omnia maiora & distinctiora situ euerso. Vnde patet inanitas illius discursus, quo sibi de Inuentione tubi optici applaudit nescio quis; cum idem rerū visibilium augendarum effectus, possit etiam luculenter haberi lente vnica concueta, magna & sphaeræ magnæ. Sed de hisce alias fusius; quære figuræ 1. & 3, A 1, & C 1. explicationem, in Comparatione Oculi & lentium.

IMMISSIO SOLIS ARTIFICIOSA,
seu Telioscopica, quæ & Transmissio dicitur & eiusdem utilitates.

CAP. VII.

IMMISSIO Solis artificiosa, est eiusdem per suum conum seu species visibiles in debite obiecto plano genuina representatio: fit Telioscopio seu Tubo communi, ex artificiose elaboratis & apte dispositis lentibus constructo; quas debita inter se distantia collocatas, & ad Solem excipiendum applicatas, Solis conus illustris orthogonos fertur in oppositam chartam, (seu planum quodcunque album) suasque in eadem diuitias exponit, spectandas cuilibet. Reperitur videtur hoc compendium eodem fere tempore in diuersis prouincijs, ab huius rei studiosis atque peritis pluribus. Nam illo vsus sum diu ante, quam Velfero id Galilæus communicauit, nactus post assiduam & diligentem eiusdem indagacionem.

Hoc artificium fert plurima commoda, & difficultates in Sole aucupando occurrentes plerasque tollit. Etenim vnicū præstat, quod magno labore dat Helio-

II.

scopium, & immissio simplex seu naturalis simul. Figuram Solis ita sinceram in papyrum defert, & maculas ita præcisas, vt Solis intuitus directus planè non desideretur.

Qui licet per vitra crassissima fiat, tamen oculis plerumque aliquid molestiæ, & subinde nonnihil damni, homini verò aliàs occupato, multum semper laboris affert, plurimumque aufert temporis.

Hic autem modus ex eo quod Solem non immediatè, sed eius simulacrum in charta intuetur, visui sano nullum penitus grauamen creat; tametsi debili forsitan siue ægro posset, ob lucis in chartam

delatæ præcellentiam. Itaque beneficio huius artificij penitus exhauritur primus difficultatis fons, è nimio Solis fulgore

Tollit plerasq. difficultates.

scaturiens: quia Sol per conuexum & concuum Telioscopij vitrum in chartam traductus ita radios suos vitrorum superficiebus refractos attemperat, vt visui planè proportionati fiant. Deinde quia eadem vitra intra tubum apte disposita figuram Solis non tantum magnam

pro voto, sed & præcisam offerunt tollitur secunda difficultatis scatebra, quæ Sol ob nimiam distantiam sub angulo nimis exili ad sensum venit; cui accedit, quod omnia ignea, lucida, luminosa adeoque alba & splendentia procul vi-

sa, in oculo ob radiationum visibilium istorum æqualem veluti vigorem, confusionem pariant, vt videre est in Luna, Venere, stellis alijs, facibus,

candelis accensis atque ignibus eminus conspectis. Horum autem protuberantem & tumultuariam in Visu redundantem radiorum luxuriam præscindit radicitus præcellens ista Solis deducendi ratio: quæ ipsius ideam pro voto cuiuslibet

ampliat, varijs modis, vt postea dicetur; & Maculas omnes atque faculas sub aspectum vno obtutu, clarè, distinctè & mundè deducit. Itaque modus hic,

Primò. Omnibus incommodis ex abundantia Solaris locis obortis, efficaciter medetur.

Utilitates Telioscopij.

Secundò. Tollit omnia impedimenta à visa Solis paruitate promanantia.

Tertiò. Sub vnum conspectum dilucide, expresse & bene terminatè collocat, quidquid in Sole latet.

Quartò. Laborem in obseruando adhibendum plurimum imminuit.

Quintò. Tempore pro signandis inter

I.

ter obseruandum Maculis breuiore continetur.

Sexto. Loco quocunque, tempore quouis, splendente Sole utiliter exercetur.

Septimo. Opportunior est prioribus pro inducenda Verticali linea, & eius ope indagandis motibus Macularum.

Octauo. Obseruatorem de ratione obseruandi, factisque obseruationibus, & Macularum positione ita securum, ita certum reddit, vt omnes errandi ansas amputet, dubitandi scrupulos eximat, dummodo, prout in sequentibus explicabitur, necessaria industria adhibeatur.

IX. Difficultates è motu Solis causatas, multum subleuat. Nam tubus opticus instrumento seu ferculo obseruatorio aptè impositus, Solis motum facile sequitur, ab artifice paullisper exercitato, & sedulo directus.

X. Pro circulo eodem obseruatorio retinendo, nulla penitus molestia occurrit.

IMMISSIONIS TELIOSCOPICAE

Machina, & eiusdem partes, atque stereographica delineatio, & in usu impedimentis.

CAP. VIII.

Partes & descriptio machinae telioscopicae.

MACHINA autem obseruatoria, seu Telioscopica, constat hisce partibus. Tigillo seu dorso parallelepipedo G, H, cuius vtrunque bases sint vel quadrata vel quadrangula altera parte longiora: cui suis locis insistant duo vel plura retinacula, I, K, Tubo sustinendo aptata. Amplius vna tabella seu asserculo chartifero B. Præterea asserere D, qui tabellam chartiferam E gestet, & immissum sibi dorsum, quasi totius Machine pes atque basis sustineat. Accedit hisce vel ex charta crassiore, vel asserculo tenuiore vmbraculum R. Tandem fulcro bifurcato, O, cui superincumbens totum instrumentum, facile quauersus, in omnem loci differentiam super planum horizontale seu pavimentum, aut asserem bene dolatum horizonti æquidistantem, moueatur. Quod tamen ita necessarium non est, vt absque eo rectè obseruari non possit: æquilibrium

II.

enim istud compensari potest, asserculi chartiferi circa clauum suum volutione, prout suo loco dicetur; imo æquilibrium nullum est, necessarium, cum perpendiculari vmbra in circulum obseruatorium inducta, omne æquilibrium compenset. Ex eo autem quod Machina hæc totius suæ directionis originem à plani verticalis linea, è perpendicularo in chartam proiecta trahat, ipsamque veluti totius navigationis gubernaculum respiciat; haud opinor, inconsulte hoc ipsum instrumentum appellabitur, Telioscopium verticale; ad differentiam illius, quod in fine libri tertij allaturi Heliotropium æquatorium dicemus.

Totum instrumentum vides in adiecto schemate, Num. 1. per partes descriptum singillatim, deinde compositum & scenographicè proiectum, vna cum quadrante horario q r s, ex latere basis pendulo, qui horam scilicet & altitudinem Solis supra horizontem obseruationis tempore indicet. Cætera particulatius suis locis infra exponentur.

Hac igitur instructus machina, cælum ipsiusque adeo Solis animosè aggressus Regiam, expugnabis haud dubie, sed non sine sudore, & crebris insultibus.


Pugnabit enim aduersus te Sol, non tantum spiculis suis fulmineis, sed in arma contra te suscitabit tempestates, opponet nubes & nebulas, vaporibus sese inuoluet; & si tandem in apertam aciem prodibit, continua tamen sua fuga, ita te fatigabit, vt nisi longamini patientia, & labore improbo pertinacissimus ipsum insequaris, herbam victori non sit porrecturus. Errores ergo, ambages & insidias, quibus incautum induere queat nunc detegam, vt salebris atque deceptionibus euitatis, planissima veritas omnibus obuiam proftet.

Vnam tamen, & quidem peculiarem ex hoc ipso ingenioso obseruandi modo, enatam difficultatem, dissimulare non debeo; quam parit Refractio à lentibus Telioscopij in figuram Solis illata. quæ licet adeo sensibilem differentiam non afferat, ab exacto tamè obseruatore ignoranda & negligenda non est. Sed de his suis locis ex instituto.

Impedimenta & remedia obseruandi.

Difficultas ex lentium refractione.

TRIPLEX



I.

TRIPLEX MOTVS SOLIS, E QVO
inter obseruandum difficultates
enascuntur, proponitur.

CAP. IX.

SI Sol staret, posset eiusdem facies in charta absque vlla difficultate per singula depingi, non aliter atque domus vel regio per vitrum conuexum in cameram obscuram immissa, solet. at quia is continuè mouetur, euehit statim imaginem sui, è deputato atque occupato chartæ loco: vnde eadem proportionem est mouendum instrumentum, qua Sol promouetur in cælo: alias vno eodemque loco non continebis circulum Solis, non signabis Maculas:

Motus Solis triplex.

Inuenio autem triplicem motum, qui huic curæ faceffit negotium. Solis diurnus ab ortu in occasum. Eclipticæ, per quam centrum Solis semper incedit, & Solis locus in Ecliptica seu Zodiaco appellatur ad quem Ecliptica cum plano verticali semper aliam atque aliam inclinationem facit. Tandem Macularum ipsarum, seu magis Solis ipsius motus proprius. de singulis agendum.

EX MOTV SOLIS DIVRNO
difficultates, & earum cautio.

CAP. X.

SOL Horizonti insidens aut eidem vicinus, tam in ortu quam in occasu, semper est quasi Ellipticus, prout in Sole meo Elliptico satis ostendi, ideoque ad hanc obseruationem pro inquirendo Macularum loco & motu, omnino ineptus vt enim Solis circulus, ita & Macularum inter sese situs coit refractione vaporum in Atmosphæra confidentium; loco igitur suo Maculæ semper sunt emotæ, & apparent alieno, consequenter nec apparens neque verus illarum cursus potest colligi. Similiter & Sol debito eleuator existit supra finitorem, ex quo falsus Verticalis cum Ecliptica ad locum Solis angulus inueniretur, & consequenter erronea Macularum itinera. de quare pluribus egi in meis Refractionibus cælestibus. quas, si placet, consules.

Solum ad hoc seruit status hic, vt Maculæ possint cerni æque vt Sol Ellipsin

II.

patientes, ellipsisque solaris notari, & si sunt magnæ Maculæ, libero etiam obtutu animaduerti.

Sed quantum, inquires, Solis ab horizonte interstitium requiritur, vt securus ipsum in chartam quis deducat? Certum præcisè dari nequit, propter aliam atque aliam cæli & Atmosphære temperiem. Nam ego hic Romæ Maculas in chartam circulo pleno excepi, Sole sex, imo semel quattuor tantum gradus altitudinis supra horizontem erecto; & rursus alijs temporibus contractum reperi, etiam decem, duodecim, & quindecim altitudinis gradus & amplius tenentem: Ingolstadij sæpe non potui sub eleuatione graduum triginta perfectè sphaericum adipisci. Itaque certa in hoc casu præscribi nequit regula:

generalis hæc datur. Quicunque vult cautè & securè Maculas intra circulum solarem locis suis designare, oportet vt ante omnia eiusdem magnitudinis circulum in charta descriperit, cuius magnitudinis esse voluerit solarem obseruandum; illumque in perimetro notare debet pluribus quam tribus punctis, hisce peractis, intromittat Solem, & aduertat vtrum circulus Solaris illi, & ille Solari per omnia congruat, & quattuor puncta cardinalia in hunc finem impressa simul & præcisè attingat, quattuor autem puncta cardinalia voco, exempli causa, (nam possunt etiam assumi alia,) Zenit, Nadir, dextrum, sinistrum, peripheriam circuli in quattuor quadrantes distinguentia; si igitur Sol per tubum in chartam transfusus, atque ad circuli inibi descripti capacitatem aptatus, omnia puncta non assequitur, sed ab vno illorum deficit, certum est in Refractione versari, supposita tamen lentium parallela & debita dispositione, si omnia attingit, & nusquam excedit, securus obserua. Atque hæc de vicinia Solis ad Horizontem: nunc ad remotiora loca transeamus.

Si Solis motum diurnum præcisè spectamus, nusquam ipsius cursum instrumento obseruatorio facilius assequemur, ipsumque intra præscriptos in charta terminos stabilius coërcebimus, quam illo tempore quo ipse minimas faciet in circulo verticali altitudinis promotiones, siue quando valde oblique mouetur; hoc autem tempus semper est Meridianum, quia licet, ibi Sol multum progrediatur secundum

An Sol sit ellipticus, quo modo deprehendatur?

I.

secundum longitudinem, tamen videtur stare quoad altitudinem adeoque latitudinem, & sic in designato circulo observatorio facile continebitur ab observatore sedulo. Accedit quod circa hoc tempus ordinariè facies Solis ferenior arridet, & extra omnes refractionis sensibilis metas existit; quod vaporum transitus fiat sub lineis multo brevioribus, & minus inclinatis quam circa horizontem. Sed huic observandi temporis obstant sequentia.

Incommoda
Temporis
meridiani.

Primò. Altitudo Solis Meridiana plerumque ita exaltat Solem, ut in habitacula, æstivo præsertim tempore, nisi altissimis fenestris prædita, radium suum perpendiculari fere affinem, non immittat. observare autem sub dio, in illustri & non aliquatenus obscurato loco, multum obest ideæ solari in chartam exceptæ, quæ à circumstante vehementissimo lumine ita obfuscatur, ut oculus Solis familiam non valeat bene discernere: quod ideo fit, quia sensibile maius oblitteat minus. Taceo nunc Solis meridiani insanam vehementiam, communiter ab omnibus ubique Gentium tanquam bonæ valetudini adversam, maximopere declinari solitam.

Secundò. Tanta Telescopij cum instrumento observatorio ad Solis radium aucupandum erectio per se valde est difficilis, & observationi admodum incommoda: aut enim fulcrum bifurcatum dorso machinæ sustinendo ordinarium retinet, & quia cum dorso in angustum angulum coiens pæne coincidit, illud idem lubricè sustentat; aut altius adhibes, & vel dorsum ut eidem incumbat, non erit satis longum, vel locus in quo excipientur Sol, toti Machinæ non satis amplius. Pes etiam qui dorsum & omnia gestat, & super pavementum ad Solis circulum totum instrumentum dirigit & movet, ob nimiam ad illud inclinationem, vacillante motu agitur, & ob nimiam asseris charitiferi à perpendiculo remotionem, vitiosam Verticalis inscriptionem facillime causabit, & sic totam observationem inficiet, id quod est capitale. nam non tantum huius temporis labores perduntur, sed & aliæ bonæ observationes, per tales vitiosas, pro bonis tamen habitas, valde periclitantur, præsertim apud huiusce rei imperitos adhuc & rudes.

II.

Tertiò, Eleuatio Solis supra horizontem, quæ semper accuratè est sumenda, hoc tempore difficillimè iuste acquiritur in minutis, & facillimè 5. 10. 15. aut 20. etiam minutis primis à vero aberratur, eo quo perpendiculum eodem sensibili loco diu stare videatur, quæ res maximam in horis erudiendis varietatem affert, & Inclinationem Eclipticæ ad Verticalem plurimum perturbat, & quod inde consequitur, Macularum itinera falsa inducit.

Quartò, Eliptica totius anni tempore circa tempus meridianum, ab hora 10. antemeridiana, ad 2. pomeridianam, maximam semper variationem subit, & motus veloces, atque obliquitates ad Verticalem circulum minimas, angulos vero maximos, & gradus præcipientes facit moris exiguis, atque ad exiles Solis eleuationes tempore brevissimo, sumit augmenta & decrementa angulorum maxima: è qua re fit, ut Maculæ, & Faculæ in Sole etiam diligentissimè notatæ, suis tamen locis statim euehantur; quæ res huius artis Magistro laborem & tædium infinitum, & ipsi artificio plurimas præbet errandi occasiones. Itaque Argum oportet agat, qui hoc meridiei tempore, observationes Solis inculpatas facit. Exemplis si vellem, planum id facerem plurimorum.

Tempus
Meridia-
num obser-
uationibus
peragendis
incommodè
intermediis
aptius.

Præstare igitur videtur, omnibus spectatis, tempore inter Refractionem matutinam & vespertinam atque meridiem intermedio, huic studio vacare. Sic enim Sol motum ex ascensione recta & obliqua æquabiliorem atque tractabiliorem offeret, & Machina observatoria eleuationem Solis mediocrem nacta, eiusdem cursui obsequentiore se se præstabit, & altitudo Solis, tempusque horarium quadrantis beneficio sumendum, securius in minutis notabitur.

Quia tamen aliquando usu venit, ut circa tempus meridianum necessario instituenda sit observatio, vel quia occupationes alias, aut cæli inclementia obstiterunt, vel quia Macula aliqua hoc tempore oritur aut occumbit, aut alia ratio vrget; idcirco dictis incommodis oportet etiam pro posse obuiare.

Maculas ergo in disco Solis super chartam descripto lineis cæcis annotatas & inclinatione Eclipticæ loco suo emotas,

Quid facto
opus si ex ne-
cessitate sit
observanda
meridie tem-
pore?

I.

ras, restitues sola giratione afferculi chartiferi, circa suum centrum, B, vel C, vel E, quodcū cētro circuli solaris cōgruet donec Maculae suis in charta notatis locis, & circulus Solis suis cardinalibus punctis simul exacte congruant; tunc & linea verticalis, a, b, per vmbra i o, perpendiculi, i p, & altitudo Solis supra horizontem vna cum hora, actutum sunt consignanda. Et hoc remedium esse securum, certum, & facile, frequenti & diuturna plurium annorum experientia didici.

Aliud remedium.

Præterea utile est, vnam Maculam vna obseruatione notare, sic enim nulla sensibilis temporis mora intercedet, dum Solis eleuationem, perpendiculum & horam notaueris.

Amplius quoniam horologia multa solaria circa meridiem horas intercipiunt spatijs valde magnis, facile illa possunt subdiuidi in scrupula & minuta, & sic quod in eleuatione Solis supra horizontem sumenda lubricum & periculosum existit, facile & expeditum ex animaduersione temporaria fiet. Sed de hisce suis locis fusius.

DE MOTIBVS SOLIS, ET

Macularum, qui in circulo obser-

uatorio notantur, & eorum

difficultates, atque

remedia.

CAP. XI.

Dixi quædam in genere de motu Solis apparente in circulo obseruatorio, qui per Macularum progressionem potissimum animaduertitur. Disci igitur Solaris in chartam proiecti inuenio vniuersum motum triplicem, quemadmodum & Solis in cælo. Quorum primus, & quotidianus est, quo Sol super axem & polos mundi in hemisphærio quolibet patente ab horizonte orientali, per meridiem in occasum fertur; & quia ob ortu in meridiem Sol semper ascendit, ab hoc semper descendit ad occubitum vsq. motus hic in charta expressus, ascensus & descensus quotidiani appellari potest.

Alter Macularū deprehenditur motus, quotidianus est, circa cētrū Circuli obser-

II.

uatorij; ita vt si instrumentum obseruatorium, tabella obseruatoria & charta inuariatis, toto die Soli obuertas, & Macularum stationes in circulo obseruatorio per singulas horas notes; vesperis omnes in locis longe alijs reperturus, quam mane: quod si horarias singulorum consignatas stationes, lineis conneris: inuenies omnes & singulas quotidie circa centrum obseruatorij circuli girari.

Tertius tandem Motus, est singulorum Macularum ad centrum circuli obseruatorij, & ab eodem, ex oriente Solis plaga in occidentem: qui est Macularum vel potius Solis, maximè proprius. De singulis nunc est ordine aliquid agendum.

De Motu Solis & Macularum primo & quotidiano ascensus & descensus multa dixi in capite præcedenti, sed hic oportet quædam magis particularia subiungere. Est igitur is omnium primo & maximè notabilis in charta, quia totam Solaris disci lucidam basim secum trahit, eo modo, quem Sol ante meridiem tenet ascendendo supra horizontem, recte vel oblique, prout latitudo loci in quo obseruas, fuerit, vel recta, vel obliqua: post meridiem vero descendendo versus eundem. Igitur prout Sol in cælo, ita se mouebit Solaris coni basis lucida, recepta in charta, idque motu proportionato quidem, sed sitibus contrarijs, propter euersum foramine Tubi & lente conuexa Telioscopij, coni Solaris penicillum; & sic dum Sol ascendit in cælo, descendit species Solis in charta, dum descendit ille, ascendit ista, semperque in contrarium tendit, refractaria suo parenti filia nec huic rei remediū per hasce lentes: illud vnicum quærendum, vt circulus Solis ab obseruatore continuo etiam, & Solem sequace motu, in suo chartæ circulo constanter teneatur, id enim ad consignandas Maculas apprime est necessarium: quod tum assequemur, cum Machinam Telioscopicam talē fecerimus, quæ sine difficultate possit in omnem partem ita versari, vt axem coni Solaris semper possit habere centro propositi circuli obseruatorij correspondentem. Hæc autem omnia habentur facili negotio, per Machinam obseruatoriam paullo ante ob oculos positam.

Nam

I.

Nam pes super pavementum planum, vel suppedaneum dolatum. Q. & dorsum, QS, apici fulcri, S, innitens mobile, ita hanc rem faciunt, ut amplius quid desiderari, vel aptius excogitari, meo iudicio, vix posse videatur, hoc quidem observandi modo. Habes enim eo modo promptissimam ad motum Solis sequellam. Simile instrumentum videbis in meis Refractionibus Coelestibus anno 1617. Ingolstadij editis, cap. 38. 39. 40. 41. à pag. 91. ad 94. Sed & de hoc ipso, inferius in praxi observandi, pluribus agam. Dixi hoc observandi modo: quia Heliotropium, de quo in fine libri tertij fufe agam, hac Solis sequendi difficultate minus laborat, quandoquidem Zodiaci beneficio, Tubus in radium & parallelum Solis directus est.

Habet hic solaris baseos motus, etiam alium usum, ad indagandam visualem circuli solaris magnitudinem. Quandoquidem enim una cum Sole semper aliqua portio paralleli diurni per tubum in chartam transit; si Solem allapsum statuas ut circulo observatorio exactissime congruat, deinde dum motu spontaneo exit ad contactum, temporis interlapsi moram accuratissime numeraveris, per horologium quodcumque exactum seu solare, seu mechanicum in scrupulis, & minutis; eademque deinde in minuta magnitudinum converteris; scies quæsitam solaris vultus magnitudinem. Sed hæc obiter alias fortassis ex instituto.

Quod si punctum contactus, quo basis lucida circum observatorium egressa radit, linea recta per centrum iunxeris, exhibebit eadem incessum paralleli, seu æquatoris ad sensum, ex quo facile erit inducere Eclipticam, per radium ex centro ad datum Solis locum emissum. unde & alium, Eclipticæ importandæ, habes modum, seu saltem non multum aberrantem. Sed hæc per transennam.

Quia vero propter lubricam puncti huius stationem, res hæc factitatu difficilis admodum existit, in usum satis commodum redigi potest per Maculam Solis quamcumque in eo tunc versantem: si namque eandem Maculam in puncto quocumque periphæriæ orientalis circuli observatorii posueris, & no-

II.

taueris, deinde basi solari cursum spontaneum permiseris, quoadusque eadem Macula in punctum occidentale eiusdem circumferentiæ inciderit, erit linea per ista puncta transiens, linea paralleli solaris, ad sensum. sed hæc insinuo hic tantum. plura fortassis alibi. Nunc progrediamur ad motum alterum, qui fit circa centrum circuli observatorii.

MOTVS SECVNDVS CIRCA

centrum, eiusque difficultates, & remedia.

CAP. XII.

Alter Motus qui sese in observando quotidie offert, consistit in eo, quod etiam si Solem in suo designato circulo ad amussim retineas, nihilominus tamen Maculae, & Faculae à suis notatis locis & punctatis centris plerumque expacientur, tempore quandoque brevissimo, quo vnius horæ scrupulus vix elabatur. Quod cum fit, & Maculae suo loco non restituuntur, necessario in earum motu & cursu assignando errabitur. Et in hanc loci euagationem sepe inciditur, dum duarum, trium, pluriumve Macularum locus magnitudo & figura diligenter circumscribitur: ergo aut festinandum est in dictarum rerum inquisitione & exacta consignatione, quæ hoc ipso exquisita non erit, quia festinatur; vel in dictam exorbitantiam incurrendum: vel alio aliquo remedio opportuno huic errori occurrendum. Sic autem delicta omnia cauebuntur.

Primò, Si asserculum chartiferum circa centrum Solaris circuli, vel æquivalenter volubilem facias, ut Maculas extrauagantes in sua loca signata restituas; secure per omnia ages.

Remedium primum.

Secundò, Si vnam tantum vel alteram Maculam notes, & statim per te vel alium altitudinem Solis & horam sumas, & sic per singulas pergas: augebis quidem numerum, sed securam efficies observationum operam.

Remedium secundum.

Tertio, Si tali obserues tempore, quo Maculae loco notato per iustum spatium,

Remedium tertium.

I.

tium, ut quadrantem, semihoram aut plus, ad sensum non excedunt, securissima iterum incedes via. Quando autem hoc tempus occurrat, doceberis ex instituto postea.

Nunc motus huius apparentis causam & rationem indagemus. Mirabile enim est videre, quomodo Maculae omnes quotidie in charta observatoria describant sua itinera: seu vestigia quotidiana, lineis curvis spiralibus circa centrum circuli observatorii inflexa, proportionem sanè admirabili: quæ res uti non est statim obuia, ita suspensum merito tenere potest spectatorem. Sed spero ita clarè me propositurum, ut dubij nihil sit ulli remansurum. Vnde,

Hunc motum in charta observatoria euenire, probabis sequentibus experimentis. quorum

Primum Est, si vno aliquo die per frequentia temporum intervalla observes, vel vnam, vel plures Maculas, ad vnum idemque perpendicularum; sic enim curvilinea Macularum circa centrum vestigia sponte prodibunt.

Secundum, Si in eundem quidem circulum observatorium, sed ad distincta perpendiculara diuersas diei observationes includas, situs Macularum perturbatos acquies, mox tamen ut omnia perpendiculara super vnum accommodaueris, itinera circa centrum curua, & ordinata habebis.

Tertium, Si diuersas observationes, dictis diei temporibus peregeris, & circulos observatorios inæquales ad æqualitatem reuocaueris: tum omnia perpendiculara ad vnum applicaueris, notatis singularum observationum locis; inuenies Macularum circa centrum Solis girationem.

Huius rei causa prima & generalis refertur in situm Solis quem diuersum ad nos acquirit, ex motu circulari diurno.

Altera videtur ex Ecliptica promanare: propterea,

Notandum est primo. Cum Ecliptica tota intra vigintiquattuor horas vna cum primo motu, circa terram, conuertatur, & ab horizonte quolibet semper bifariam secetur, per propositionem I. l. I. apud Clauium in Theodosium; fit ut quodlibet ipsius punctum supra horizontem vnoquoque die eo tan-

II.

dem loci perueniat, ut vno quadrante circuli ab horizontis cum Ecliptica sectionibus vtrique absit, quod quando euenit, Verticalis loci per illud punctum transiens, Eclipticam ad rectos angulos secat, & vicissim Ecliptica Verticalem. Sol igitur cum centrum suum in Eclipticæ peripheria semper circumferat, quotidie semel in eum locum tempusque deuenit, in quo Ecliptica angulos rectos cum Verticali per centrum Solis extenso facit. Quod cum fiat, ut mox videbitur, non multum ante, vel post, vel circa meridiem ipsam, & tunc Sol secundum motum diurnum in suo parallelo velocissimos passus faciat, fit ut Eclipticam raptim in alias, atque alias cum Verticali inclinationes deuoluat. quæ quo maiores sunt tempore breuiori, hoc observationibus periculosiores existunt, & Maculas è loco suo in charta designato, in alium chartæ locum statim traiciunt, etiamsi industrius observator Solem in preparato chartæ circulo semper fixum retineat.

Quod ideo accidit, quia Sol in Ecliptica residens, cum sit corpus globosum, aliquantam eiusdem portionem occupans, vna cum ipsa situm suum ad nos, & inclinationem ad Verticalem momentaneè mutat. Quare cum planum verticale & planum Eclipticæ per centrum Solis, & centrum terræ semper transeant ipsa tam in cælo, quam in Sole sectionibus suis circulos maximos semper efficiant, & in centro Solis sese semper secabunt, facientque cum circulo solari sectiones communes, quæ sint diametri eiusdem. Et ex hac causa, omnia in Sole puncta, præter vnicum centrum, alium aliumque situm ad lineam verticalem, semper acquirunt, & sitibus ad verticem in centro Solis oppositis ad eandem vel accedunt, vel recedunt, & si vestigia sui in plano circuli Solaris impressa relinquerent, lineas curvas spirales siue helicas ostenderent, prout de facto in charta fit, si crebris per diuersa temporum intervalla observationibus ad idem vmbrae perpendicularum factis, consignata Macularum puncta continuata, quadam linea connectas, quæ ductu suo curuo lineam spiralem referet. Quod ut bene intelligas;

Notandum est secundo, Planum per

Quare Macula circa Meridiem locis suis cito eijciantur?

I.

per apparentem Solaris hemispherij Circulum actum, ad radium visualem pervadentem eiusdem centrum, semper est erectum: & quod hinc sequitur, rectum ad verticalem, & Eclipticam, necnon quemvis alium circulum maximum, per dictum radium visualem incedentem: supponendo, propter summam Solis distantiam, oculum obtinere locum centri mundani, iuxta communem Astronomorum sensum & consensum.

Notandum tertio. Eandem ob causam circulus, quem planum verticale, necnon Eclipticæ in globo Solis facit, apparet in linea eiusdem diametrali.

Notandum quarto. Etiam si circulus apparens Solis, ut & ipse Sol totus, propter motum diurnum, situm suum ad nos & ad planum lineamque verticalem perpetuo mutat, prout in obiectis observationum chartis, & per Helioscopium in Solem intendenti manifestè apparet: tamen planum Solare, per circulum Solis transiens, ita stabile est cogitandum, ut tametsi illud à Sole circumferri cogitur, & Sol ipse circa suum centrum veluti girari: illud tamen sectionem suam cum verticali semel factam, nunquam variet, sed eandem mordicus retineat: ex quo mente concipere licet, quomodo itinera Macularum diurna in illud planum imprimerentur, si Maculae realia, sui vestigia post se descripta relinquerent in illo plano.

Notandum quinto. Charta quæ Circulum observatorium inscriptum gestat, & solari plano parallela existit, ut omnes Macularum positiones & situs in illum circulum similes immediatè excipiat, motumque istum curvilineum præsentet; debet ita in tabella chartifera accommodari, ut omnes illius diei observationes fiât, ad unicam lineam verticalem, siue ad unum perpendiculum: quæ linea verticalis virtute multiplex est, & respondet omnibus in cælo lineis verticalibus, per quas Sol transit illo die. quod inde probatur: Quia si omnes illæ verticales lineæ sibi congruere cogitentur, ostendent Maculae easdem positiones & vias decursas, quas in charta reperimus: prout manifesto apparet, si in chartis separatis observes, & easdem deinde in unum circulum coniicias; reperies enim centris & verticalibus lineis sibi congruentibus eadem

II.

1 Macularum curricula, quæ sub observationibus diuersis in vna charta, ad unicam verticalem lineam peractis inueniuntur. Motus ergo iste curvilineus apparens, & ex aspectibus diuersis enascens, dictis in charta modis, exprimitur: aspectum autem varium causat motus diurnus.

10 Notandum sexto. Hunc apparentem & diurnum Macularum motum circa centrum Solaris circuli contingentem non esse circulare perfectum, sed curvilineum, è varia Eclipticæ ad verticalem lineam inclinatione, & propria Macularum progressionem compositum. Quod manifestum experieris ex eo; quia si ita observes, ut ad singulas observationes perpendiculum mutes, assequeris quidem in margine solaris & observatorii circuli (qui semper æquales & sibi mutuo congrui esse debent) aliud & aliud punctum perpendiculi, seu lineæ verticalis, adeoque arcum ex perpendiculi sectionibus perfecte circulare; in charta verò intra circulum observatorium iter seu progressionem propriam Maculae, illorum temporum, parvam vel magnam, prout tempora & cursus tulerint, non circulem, sed spiralem, &c. de qua re, progressu istorum tractatum plenius intelliges. ubi tamen,

20 Notandum septimo. In hoc casu accuratissimam esse dandam operam, ut Sol in sua puncta cardinalia exactissime cadat, alioquin in proprio Macularum progressu facile hallucinaberis.

35 Causa est in promptu: quia Macularum progressio propria in hoc motu spirali non est nisi ad centrum vel à centro; progressio autem diurna est circa centrum: unde quam sensibilis est motus diurnus, in horas singulas, tam sensum fugit accessus ad centrum vel recessus ab eodè, propter tardam Macularum sub sole progressionem: quæ cum spatia diurna, & semidiurna exigua perficiat; accuratus sit oportet observator, qui intervalla horaria sensui offerre tentat. Et hoc est quod dixi, Solis basin & circulum observatorium debere sibi mutuo ad vnguem coincidere, nisi loca Macularum nimis prope vel procul à centro statuere velis. Exemplum autem experimenti istius hucusque descripti practica occurrunt quotidiana; ego ex infinitis observationibus, rei elucidandæ causæ, adducam unicum.

I.

EXEMPLVM MOTVS MACV-
larum circa centrum Solis, ex pro-
prio & diurno compositi; eius-
que explanatio.

CAP. XIII.

ADDVCO diem quartum
Augusti anni 1625. in quo
per distincta temporum inter-
ualla à mane in vespere absolui obser-
uationes 8. ad eandem lineam vertica-
lem AB, circa quas obseruationes rectius
intelligendas sunt aduertenda sequentia.

Explicatio
figura.

Primò, Quando dico cursum istarum
Macularum in Plano Solis describi noue-
ris illud planū stabiliri intellectu, & curri-
cula ista mente formari, in re tamen fun-
damentum esse, & ipso facto à Maculis
tales vmbrae in chartam proijci, atque in
eadem à sollerte artifice ingeniosa imita-
tione depingi, prout ex dictis satis liquet.

Secundò, Scias Macularum Nume-
rum distinctionem, & Nomina; itemque
obseruationum & cursus initium esse de-
signata a litteris maiusculis A, B, C, D, &c.
vsque ad L, inclusiue, adeoque Maculas
distinctas annotatas esse I I.

Tertiò, Aduertas velim, Characte-
res numerales, ab 1, vsque ad 7, & 8, si-
gnificare ordinem & numerum obserua-
tionum, quarum tempus, & locum seu
altitudinem Solis inuenies, in tabella è
regione cuiusq. numeri notatum. In ex-
plo, apud omnes litteras Maiusculas repe-
ries characterem vnitatis appositum: igitur
si nosse desideras quid sibi is velit, as-
pice tabellam, ad cuius partem sinistram
videbis litteram M, quae significat Mane,
supra numerales notas inuenies Obser. si-
gnificat Obseruationem; ad dextram in-
uenies sub H, hasce notas $7\frac{1}{2}$. &c. sub hoc
hoc signo ☉ Eleu. reperies 22. 30. con-
sensus omnium est. Maculas & faculas in
tota hac figura numerali signo 1, notatas,
obseruatas esse Die 4. Augusti, Mane,
Hora Astronomica 7, cum vna sexta par-
te vnius horae, quae faciunt 10. scrupula,
Sole supra horizontem eleuato 22. grá-
dus minuta prima 30. Et illo, tempore
solaris schematis in caelo aspectus & con-
stitutio in caelo ad verticalem AB, talis
fuit qualem charta repraesentat, & si quis
Helioscopium in Solem direxisset, vidis-
set in illis locis, vbi adscripta est vnitatis

II.

1 nota, & Maculas solis punctis centrali-
ter indicatas, & Faculas vmbrae permix-
tas, prout designatio praefert.

Eodem modo, vbi character 4. existit,
5 ibi puncta sunt Maculae Mane hora 11. &
 $\frac{2}{3}$, id est 33. scrupulis supra vndecimam
obseruatae, Sole supra horizontem tenen-
te gradus 64. & minuta prima 40. &c.
Quo tempore Macula A, ex 1, peruenit in

10 4. vt & reliquae seruata proportionem. vnde
Quarto Notandum, Omnes Maculas
in plaga Solis Orientalis versantes, ex B.
Nadir ascendere versus A, Zenith, circa
centrum Solis O, vt videre est in Maculis
A, B, C, D, E, F, & G, similiter adiunctis
15 circa A, & B, Faculis; vice versa, existen-
tes in plaga Solis Occidua, circa idem cen-
trum O, descendere ex A, versus B.

Quinto Notandum, Arcus siue itinera
à Maculis centro O vicinioribus describi
curuiora, seu secundum circulos minores,
remotioribus ab eodem, rectiora, seu se-
cundum circulos maiores.

Sextò. Initia itinerum à Maculis plage
25 Orientalis decursarum sunt remotiora,
à centro O, quam fines: contra Macularum
in parte occidentali commorantium, ca-
pita sunt centro O, propiora quam termi-
ni. Pone alterum circuli pedem in O, cen-
trum, extende alterum in 1, Maculae cu-
30 iuscunque, & hanc distantiam confer
cum alijs eiusdem Maculae obseruationi-
bus, & inuenies in singulis differentes à
centro O accidere distantias.

Septimò. Vt Maculae, ita suo modo de-
35 currunt Faculae, prout initia circa L, &
fines obseruationis atque curriculi earun-
dem ad numeros 7, & 8, denotant, in cur-
su Maculae L, occidentalissimae. Om-
nium autem Facularum, (plures enim
40 erant) designationes omisi, neque huius
vnius totam singulis obseruationibus ad-
ieci: nam ad intentum ista sufficiebant.
Et haec quidem de hoc motu girali stri-
ctim percursa sunt. Vbi diligenter ani-
45 maduertas velim, quando in Tabula dici-
tur *hosc Macularum & Facularum cur-
sus in plano Solis describi, ratione motus
diurni, singulis per annum diebus*; illud
planum Solis assumi, transire quasi per cen-
trum Solis, & sensu cum apparente Solis
50 circulo coincidere, re autem eidem &
chartae obseruatoriae, parallelum esse, &
cum Sole ita circumferri cogitari, vt se-
55 ctionem quam cum verticalibus planis
per

M.DC.XXV.

Romæ in domo Professa Societatis IV.

Augusti die quarto:

Cursus Macularum et Facularum Solarium, cuius modi in Plano Solis
describunt, ratione motus diurni, Singulis per totum annum diebus.

Die 4. Augusti.

Obser: H. — O. Eleu.

M	1.	—	7 $\frac{1}{2}$	—	22.	30.
	2.	—	8 $\frac{1}{4}$	—	34.	30.
	3.	—	9 $\frac{3}{4}$	—	47.	0.
	4.	—	11 $\frac{5}{8}$	—	64.	40.
V	5.	—	1 $\frac{3}{4}$	—	57.	40.
	6.	—	3 $\frac{1}{4}$	—	41.	30.
	7.	—	4 $\frac{3}{4}$	—	26.	0.
	8.	—	5 $\frac{3}{4}$	—	16.	0.

AB, Linea
Verticalis.

N. 2.



I.

per centrum Solis successiue transeuntibus communem habet, semper retineat eandem: sicut retinetur idem in charta perpendiculum: sic enim huius motus apparentia in illo plano exprimeretur, sicut in charta, si Maculae sui post se vestigia in illo relinquerent; prout antequoque dictum. Planum ergo illud, licet cum Sole circumferri cogitetur, in sectione nihilominus verticali libratum & suspensum, situque inuariatum cogitatur, sicut & charta obseruatoria. Deinde non imagineris tibi huiusmodi motus apparentias esse tales quotidie per annum in indiuiduo, sed in specie. nam vt aliae Maculae alijs, & motus diurni alij alijs, succedunt; ita & girationum istarum vestigia, longiora vel breuiora, prout dies longi breuesue existunt. Similitudo ergo in hoc consistit, quod omnes Maculae, nulla dempta, die quolibet describant tales arcus, circa centrum Solis, maiores, vel minores, prout magis vel minus distant à centro, dies longiores vel breuiores fuerint: si quidem Obseruationes diei vnus, ad vnicum perpendiculum sumantur. hæc te monere habui. Nunc aliud multo admirabilissimum ex hoc ipso motu afferro experimentum.

*MOTVS MACVLARVM
Spiralis diurnus, est retrogradus, stationarius, & iterum Progressiuus.*

CAP. XIV.

HANC apparentiam ab initio statim per Helioscopium etiam Ingolstadij deprehendere cæpi, sed quia illi Soli tantum fidere ausus non eram, vt aliquid in re subesse pro certo asseuerarem, idcirco etiam Telioscopij securiorem praxim, & rationis solidum firmamentum adiunxi. Hæc autem experientia vna est ex ijs, quæ mihi non parum molestiæ & negotij plurimum inter obseruandum attulit. Videbam enim eodem mane, eodem vespere, die, Maculam eandem respectu centri, O, & verticis, A, modo descendere modo veluti stare, & postea contrario iterum motu ascendere, aut vice versa, omnibus reliquis inuariatis, situ chartæ

II.

1 eodem, perpendiculo seu linea verticali eadem; & sic ex ista apparentia multum sanè turbabar; modo dubitans de requisita priorum obseruationum diligentia, 5 & pleraque in dubium apud me reuocans: modo instabili Macularum incessui id attribuens: modo alias veras, fictasque causas & rationes errandi in suspensionem trahens: donec omni adhibito tam in obseruando, quam in indagando studio, 10 verissimum deprehendi, Maculas & Faculas omnes, hanc affectionem in sphaera præsertim obliqua, & tempore æstuali præcipue, quotidie mane & vespere certis temporibus pati; ita vt omnino contrarijs progrediantur viis, & deinde satis diu in statione quodammodo eadem sensibili hæreant, horæ quasi vnus spatium, tum demum ordinarijs semitis ferantur. Exempla sunt in adducta figura 20 matutina ad Maculas omnes, ex 1. in 2. vsque & vespertina ad fines cursuum Macularum, B, C, H, I, K, L, ex numeris 7. ad 8. non quod omnes & singulae id non præstiterint, sed quod ego ad omnes inter obseruandum studio non attenderim. 25 Ex hac igitur stabili, certa, sollemnique experientia, concludo primò. Hunc motum non esse arbitrium, fictum aut phantasticum, sed omnino in rei natura 30 fixum & fundatum.

Secundò. Esse quid diuersum, ab ipso motu & itinere diurno, nam Sol nunquam regreditur, prout hic apparet, sed semper 35 ab ortu in occasum fertur.

Tertiò. Id prouenire maximè ex situ Solis, quem acquirit ex motu diurno, & positione ad tale planum, vnde vt breuiter tota hæc res ob oculos ponatur. Motus iste curuilineus non prouenit aliunde, 40 quam ex varia positione & aspectu Solis ad nos, quem Sol acquirit ex motu quotidiano super polos mundi in sphaera obliqua. Exemplum huiusce rei oculare poteris haurire ex Luna tam corniculata 45 quam dimidia, videbis enim cornuum aut diametrorum lunarium positionem matutinam, esse quodammodo contrariam vespertinae: idem experieris in duabus stellis vicinis firmamenti, quod si 50 adhuc certius hanc rem experiri desideras, assequeris id globo aliquo vel sphaera hoc modo. describe in charta circellum, qui representet Solem. hunc circellum ex centro affige ad datum quemcunque

M.DC.XXV.

Romæ in domo Professæ Societatis IV.

Augusti die quarto:

Cursus Macularum et Facularum Solarium, cuius modi in Plano Solis
describunt, ratione motus diurni, Singulis per totum annum diebus.

Die 4. Augusti.

Obser: H. — O. Eleu.

AB, Linea
Verticalis.

M	1.	7 $\frac{1}{2}$	22.	30.
	2.	8 $\frac{1}{4}$	34.	30.
	3.	9 $\frac{3}{4}$	47.	0.
	4.	11 $\frac{5}{8}$	64.	40.
V	5.	1 $\frac{3}{4}$	57.	40.
	6.	3 $\frac{1}{4}$	41.	30.
	7.	4 $\frac{3}{4}$	26.	0.
	8.	5 $\frac{3}{4}$	16.	0.

N^o 2.

ANNO MDCXXV.
Die 18. Iulij Vespertina.

Angulus Solis c- ex astro lapio.	Angulus Solis c- ex astro lapio.	Angulus Solis c- ex astro lapio.	Angulus Solis c- ex astro lapio.	Angulus Solis c- ex astro lapio.
11	0 31	26	34	17
20	0 29	20	30	0
33	0 27	49	28	7
40	0 26	11	26	32

Eodem anno, Mense Iulij
die 14. tempore
Matutino.

ANNO MDCXXV.
Die 22. M. Vespertina.

Angulus Solis c- ex astro lapio.	Angulus Solis c- ex astro lapio.	Angulus Solis c- ex astro lapio.	Angulus Solis c- ex astro lapio.	Angulus Solis c- ex astro lapio.
29	0 32	10	32	20
38	0 31	44	32	0
77	0 36	22	36	20
77	0 38	23	38	42

Eodem anno, Mense Iulij
die 22. tempore
Matutino.



I.

que Eclipticæ locum, & obserua quem circulus verticalis situm habeat per centrum Solis incedens, in ortu, in occasu, in meridie, in eleuationibus intermedijs: videbis enim manifestè ea etiam omnia contingere in cælo, quæ hic instrumenti verticalis vsu experimur in charta. aspicias motum Macularum diurnum curvilineum, videbis earundem regressionem, stationem, & progressionem; quia cernes regredi, stare & progredi circulum verticalem respectu Eclipticæ. Sed ad hoc experimentum sumendum oportet adhibere magnum globum seu sphaeram, ut angulus verticalis cum Ecliptica fiat sensibilis, deinde quadrans sphericus exactus rite applicandus est. Verum ut omnis scrupulus hæsitationis tollatur, fac sequentem huius rei explorationem.

Expone sphaeram siue globum Soli lucenti, deinde suspensum è seta, siue filo serico perpendiculum libera manu pendulum ita adapta, ut umbra ipsius, in pun-

II.

1. Etum verticale & locū Solis cadat, (sphaera autem rectè librata consistat) tum si sphaeram circa polos & axem mundi circumduxeris, & umbram setæ semper in Zenith & loco Solis retinueris, videbis manifestissime umbram in circulum. caracteum proiectam, ad Eclipticam accedere, stare & recedere ab eadem modo dicto; umbra autem à perpendiculo proiecta, lineam verticalem refert, &c. Quod si Sol in promptu non est, accende candelam, umbramq. verticalem in circulum Eclipticæ affixum projice: & experieris, ea quæ dixi vera esse.

15. Sed veritas huius rei multo magis elucet in ipsa praxi tam Arithmetica quam Geometrica, dum ad datas observationū Solis altitudines, anguli quos Ecliptica cum circulis verticalibus facit, inquiruntur: ibi enim nemine cogitante, natura, duce, regressio ista, statio & progressio se in apertum dat: cuius rei exempla aliquot proferre libet.

ANNO MDCXXV.
Die 22. Maij Vespertino.

Soliseleuatio.	Angulus è calculo.	Angulus ex astrolabio.
44	0 27 21	27 20
39	0 26 17	26 25
17	40 27 10	27 5
10	0 29 18	29 10

Eodem anno, Mense Iulio,
die secundo tempore
Matutino.

Solis eleuatio.	Angulus ex calculo.	Angulus ex astrolabio.
29	0 32 10	32 20
38	0 31 44	32 0
55	0 36 52	36 50
57	40 38 53	38 45

ANNO MDCXXV.
Die 18. Iunij Vespertino.

Soliseleuatio.	Angulus è calculo.	Angulus ex astrolabio.
39	0 39 5	39 0
32	30 34 26	34 45
25	0 35 26	35 50
13	0 38 48	38 50

Eodem anno, Mense Iulio,
die 14. tempore
Matutino.

Solis eleuatio.	Angulus è calculo.	Angulus ex astrolabio.
11	0 31 56	32 15
20	0 29 20	30 0
33	0 27 49	28 5
40	0 28 11	28 39

ANNO MDCXXV. Mensis Augusti, die quarto.

tempore antemeridiano.

Solis eleuatio.	Angulus ex calculo.	Angulus ex astrolabio.
19 30	23 10	23 40
22 30	22 54	23 25
34 30	23 23	23 55

tempore pomeridiano.

Solis eleuatio.	Angulus ex calculo.	Angulus ex astrolabio.
41 30	57 24	57 40
26 0	55 0	55 0
16 0	55 53	55 50
36 20	55 57	56 0

I.

Itaque in omnibus hisce, Mensis Maij, Iunij, Iulij, Augustique adductis exemplis manifestè vides, anguli obseruatorij tam mane quam vesperi, decrementum & rursus augmentum, quod in circulo obseruatorio regressio, statio & progressio Macularum circa centrum itineraria indicat; & per hoc vicissim indicatur. De apparèntia igitur huius veritate, tot experimentis & rationibus comprobata, dubitandi in posterum opinor, nullus erit locus. Quare autem & vnde aut quomodo fiat, in qua spheræ constitutione quibus mensibus, quo diei tempore, & quantum dureret? subtilioris & operosioris est inquisitionis, quam vt hic, interrupto intentionis meæ cursu, expediatur. dabitur suo fortassis loco & tēpore, vt Theoria ipsius in medium afferatur.

Simul etiam intelligis, calculi cum praxi geometrica in angulo obseruatorio inquirendo conuenientiam satis præcisam ad hoc negotium: nam in minutis discrepantia, sensibilem in itinera Macularum deuiationē non inducit id quod ad propositum meum sufficit. Iſtam autem anguli variationem hætenus expertus sum mane ab hora 5, vel 6, non multum ultra octauam, imò à 6. ad 8, erat quasi statio; sic vesperi à 3, non multum ultra sextam, & intra 4, & 6, contingebat statio. Sed hæc modo non enucleo, sed tantum insinuo ex praxi.

Nunc quia locus Solis Eclipticam supra horizontem bifariam diuidens, aliquem in obseruando præbet vsum, aliquid amplius de eo philosophemur.

II.

1 QVO DIEI TEMPORE, ET QVA hora, datus Solis in Ecliptica locus, eandem supra horizontem mediet?

CAP. XV.

10 Cvm certum sit, Eclipticæ semicirculum semper supra horizontem existere; certum etiam, quemcunque Solis locum in sola Ecliptica versari; necessarium est, quotidie eodiueneri, motu diurno, vt locus ille Solis in duos eandem quadrantes diuidat, quod cum fit, verticalis circulus per locum Solis incedens, facit angulos rectos cum Ecliptica: vnde si tempus hoc præsciatur, potest sedulus obseruator Eclipticam solius perpendiculi beneficio in circulum obseruatorium inducere: si hoc ipso tempore Maculam aliquam obseruet; nec opus est, vlla alia vel geometrica, vel arithmetica reductione. Quæ res cum sit momenti non parui, hic expediendam duxi. Igitur Quæstio capitæ, cum hac coincidit: Quando verticalis loci circulus quicunque per centrum & locum Solis incedens, exaltatum Eclipticæ semicirculū in duos quadrantes & arcū eius semicircularē in 90. vtrinq. gradus diuidat, faciatq. cum eadē inclinationem rectā, seu angulos vtrinq. rectos?

Respondetur primò, Quando Sol est in initio ☊ vel ☋, Tempus quæsitum est Meridies.

Respondetur secundò, Quando Sol existit in Semicirculo ascendente, qui completitur 6. signa à ☋. inclusiue vsq. ad ☊. exclusiue, Tempus est ante Meridia-

Sensus Quæstionis.

I.

ridianum:

Respondetur tertio, Quando Sol versatur in Eclipticae semicirculo descendente, Tempus quaesitum semper est Pomeridianum.

Quale autem & quantum hoc tempus sit, habeto è sequentibus.

Esto Horizon, A C B D, in figura numero 1. expressa, cap. 16. Meridianus A B, Polus Mundi F, vertex loci siue Zenith, E, Ecliptica, C G D, cuius Quadrantes sunt, C G, D G, & intelligatur Sol in, G, ultra Meridianum, A B, versus occasum, D, ita ut existat in semicirculo descendente, sitque, G, exempli gratia, 23. gr. & 30. min. Sagittarij, respondens. anno 1624. diei 15. Decembris. Oportet igitur inuenire horam qua Sol in puncto, G, constitutus post Meridiem centro suo Eclipticam diuiserit bifariam, itemque, in duos aequales arcus, C G, & G D, nec non Verticalis, E G H, angulos, E G C, E G D, cum eadem fecerit aequales.

Quæro primo locum Eclipticae respondentem puncto D, hoc modo. Ab γ usque ad Sagittarium intercedunt 8. signa integra, hoc est gradus 240; additis ergo gradibus 23 30, quos Sol confecit in Sagittario, distabit punctum G, ab initio γ , gradibus 263. 30. & ablato quadrante graduū 90, remanebunt pro puncto D, gradus 173. 30. in quibus continetur 5. signa, & insuper gradus 23. min. 30.

Quaestum primum.

Cum igitur 5. signis distet ab γ Virgo, spectabit punctum D, ad grad. 23. min. 30. η .

Quæro secundò, Angulum, D F A, qui cum nihil sit aliud quam Angulus arcus semidiurni, procul dubio eadem ratione habebitur, qua arcus semidiurnus, beneficio differentiae Ascensionalis, cuius analogia est talis.

Vt sinus totus ad tangentem altitudinis poli, ita est tangens declinationis ad sinum differentiae ascensionalis: quæ si addatur quadranti ut postulat ratio punctorum borealium, quale est punctum, D, necessario producit arcus semidiurnus eiusdem puncti, D, hoc est angulus, D F A.

II.

1 Altitudo poli Romana est Gr. 42. Tangens 90040. Declinatio Borealis puncti D, 45 12. & hæc ducta in 5 est gr. 2. 35. Tangens 40608
45 12. & hæc ducta in 90040. facit 4062. 60480; abiectisque 5. figuris dextris, eo quod diuisio fiat per sinum totum 100000. remanet sinus differentiae ascensionalis 4062, vel potius 4063; cui respondent gr. 2. m. 20. & hæc addita ad 90. faciunt angulum DFA, Gr. 92. m. 20.

15 Tertiò. Quæro angulum D F G, ex triangulo sphærico D F G, cuius F D, est complementum declinationis puncti D, cuiusq. sinus est 99898. Arcus F G, est compositus ex declinatione puncti G, & ex quadrante. est enim punctum D, australe. declinatio est 23. 20. ergo arcus F G, est 113. 20, cuius complementum ad semicirculum est 66. 40. ergo sinus arcus F G, est 91822. Denique arcus D G est quadrans, cuius sinus versus est 100000. Differentia inter arcus, F D, & F G, est 25. 55. eiusque sinus versus est 10057. & differentia

35 inter hunc sinum versus, 100000 & sinum versus arcus D G, est 89943
40 eadem cum sinu complementi arcus differentia, 91828 | 34156 | 3
25. 55. eo 9189.943.0.0.000
45 q. sinus versus quadrantis sit sinus totus. & sinus versus arcus 25. 55, sit differentia inter sinum complementi arcus 25. 55. & sinum totum. 825552.
81738780
733824
0 514.9.5600
458640
4369600
366912
2688
100000
98054
55 & sinum totum. 1946

Quaestum secundum.

Ex

I.

Ex his autem inuenitur angulus DFG, duplici analogia.

Prior analogia. *Ut sinus totus ad sinum arcus FD, 99898. ita sinus arcus FG, 91822. ad Quartum 91728.*

Posterior analogia. *Ut hic Quartus, 91728, ad sinum totum: ita 89943. differentia sinus versæ arcus DG, & sinus versæ arcus quæ inter se differunt arcus FG. FD. ad sinum versum anguli DEG, 98054.*

Qui sublatus ex sinu toto, relinquit sinum complementi anguli DEG, 1946.

88. 53 cui respondet arcus,

Gr. 17. Vnde angulus

DFG est Gr. 88. m.

53. Est autem totus

angulus DFE, Gra-

duum 92. m. 20. Ergo

angulus distantia hor-

aria est Graduum 3.

27. hoc est hora 0. minut. 13. 48. post

meridiem.

Est autem manifestum in hac hypo-

thesi, verticalem EG, esse rectum ad

Eclipticam CGD.

Quando Sol existit in semicirculo Eclipticæ ascendente, hoc est quando punctum G, est ex parte orientali, tunc loco puncti D, debet assumi punctum C, ipsi D, diametraliter oppositum, & eiusdem puncti D, debet inueniri arcus semidiurnus.

Atque ex his demonstratum esto, quando & quo tempore anni, quodlibet Eclipticæ punctum, in quo Sol versatur, nonagesimum ipsius gradum ab horizonte numeret, seu quadrante Eclipticæ ab Horizonte absit, & quomodo illud tempus sit in specie inuestigandum. Quibus habitis si eodem momento Maculas Solis in Charta excipias, assequeris sequentia.

Primò. Diameter circuli solaris in charta obseruatoria, horizonti parallela, erit etiam Linea Eclipticæ, erit sectio communis horizontis, & circuli maximi, ex centro seu loco Solis descripti, in quo obseruatorius in charta circulus solari parallelus iacet.

Secundò. Umbra setæ per centrum obseruatorij circuli proiecta, erit verticalis & circuli illius Maximi, è loco Solis

II.

ad 90. descripti, communis sectio: quam in posterum sæpe Lineam verticalem nominabimus, circulus autem in chartam à basi conij solaris projectus, certisque punctis notatus, dicatur Obseruatorius, quemadmodum & angulus ille, quem sectio Eclipticæ, & horizontis, cum communi verticalis obseruatorij circuli sectione facit, atque inclinatio Eclipticæ ad verticalem dicitur, Angulus Obseruatorius vocetur.

Tertiò. Sectio ista mutua Eclipticæ atque verticalis ad angulos rectos horizonti parallela, contingit in die tantum semel ad vnicum momentum, & hæc vnicà à plano horizontis etiam participatur; reliquæ omnes faciunt inclinationes inæquales in plano obseruatorio.

Quartò. Hoc momento, si quis Maculas iuste obseruet, absque vilo alio labore, vilo alio calculo, exactissima illarum itinera, situm & positionem ad Eclipticam acquireret, & consequenter,

Quintò Videbit, An itinera Macularum sint rectilinea, necne?

Sextò. An secundum Eclipticam & eidem parallela nec ne?

Septimò. An & quando & quomodo Eclipticam secent?

Octauò. An & quando & quomodo & quantum curuilinea?

Nonò. An omnium Macularum motus inter sese paralleli nec ne?

Decimo. An motuum diurnorum interualla inter se æqualia nec ne? &c.

Nam hæc & similia ex eiusmodi obseruationibus infallibiliter elici possunt, sine alijs adiumentis prout à me factum est sæpius, atque ob hanc causam difficultatem hanc adduxi, eamque enucleatius aliquanto tractavi, ut harum rerum studiosus fundamentum motus certo eruendi atque inuestigandi habeat: dummodo prout monui, attendas, ut & tempore accurate cognito expedite obserues, & Solis altitudinem per alium, dum tu Maculas aucuparis, haurias.

Quæ quidem idcirco adhibenda est, ut ex ea angulum obseruatorium etiam inuestigies, ad cognoscendum, an cū tempore dicto congruat; quod est necessarium, si quidem praxis absque errore fuerit instituta.

I Cum

Quæstum
tertium.Vtilitates
inuenti hu-
iustemporis

I.

Cum verò in prioribus dixerim, hanc verticalis circuli ad Eclipticam æquilibrium seu rectangularem inclinationem contingere ex observatis prope meridiem, idest, nec multum ante, nec multum post, & in ipso quandoque; merito quis dubitet & certo scire desideret; An & quousque tempus illud extendi queat, & quinam sint certi illi limites, quibus constringatur?

Respondeo omnino certas huic excursioni à natura & auctore nature Deo, metas positas esse, illasque sciri posse, ad datam loci latitudinem: quod cuiusmodi, explanabitur capite sequenti, est enim res digna scitu.

METAM TEMPORIS, UL-

tra quam se recta circuli verticalis ad Eclipticam inclinatio, in dato quocunque loco non extendit, determinare.

CAP. XVI.

TAMETSI quotidie Solis in Ecliptica locus, innumeros circulos peruagetur, vnicus tamen inter illos est die quouis, qui Eclipticam in duo æqualia secat, & is quidem, qui per polos & axem eiusdem traducitur. Cum autem polus Eclipticæ extra circulum polarem nunquam euagetur, euident est, nullum circulum verticalem, qui extra circulum polarem in sphaera incedit, secare Eclipticam in duo æqualia; nullus enim eiusmodi circulus transire potest per polos Eclipticæ, qui semper hærent in Circulo polari. Omnium autem verticalium circulorum, qui in circulum polarem veniunt, à meridiano remotissimus est is, qui circulum polarem tangit: reliqui enim omnes, si sumuntur extra, sunt quidem remotiores, sed Eclipticam non dimidiant; si sumuntur introrsus versus meridianum, dimidiant quidem aliquando Eclipticam sed sunt hoc ad eundem meridianum viciniore: quare cum iste solus sit omnium verticalium, qui Eclipticam toto anno bifariam secant à meridiano remotissimus, nec ad datum locum, vllus a-

II.

lius remotior possibilis: penes ipsum stabit meta temporis, intra quod totius anni singulis diebus ista æqualis Eclipticæ diuisio contingat, præfigenda. Quod quemadmodum fiat, explicandum est paullo accuratius.

In apposita figura, numero 2. signata.

A, est vertex seu polus Horizontis, loci cuiuscunque dati.

B, polus Mundi, eleuatus, ideoque AB, Meridianus.

AC, AD, verticales tangentes circulum arcticum CD, in C & D.

In quæ puncta cum singulis annis motu proprio & singulis diebus semel motu communi quotidiano perueniat polus Eclipticæ, intelligamus nunc ibidem existere; & propterea arcus BC, BD, sunt portiones Coluri Solstitiorum, qui cum sint circuli maximi, & per polum B, & contactus, C, & D, transeant, transibunt etiam per polos circulorum CM, & DL, qui cum sint verticales, suosque polos in horizonte contineant; E, & F, communes Colurorum cum horizonte sectiones, dabunt polos istorum verticalium. Igitur cum ex E polo, descriptus sit circulus maximus MGAC; & ex F, LHAD; arcus EG, EC; item FH, FD, erunt quadrantes: cumque poli Eclipticæ sint C & D; initium ꝑ erit E & F: & si polo Eclipticæ existente in C, ex E per G in I, transeat arcus, erit is Ecliptica, & sicut CE est quadrans, ita erit CG; eodem modo, existente Eclipticæ polo in D, ductoque arcu FHK tanquam Ecliptica, DH linea, erit quadrans circuli maximi.

Rursus cum verticales AC, & AD, tangant parallelum CD, & arcus BCE, BDF transeant per contactum C & D, fiunt necessario anguli ECG, FDH, recti.

Porro, quia puncta E & F, spectant ad initium ꝑ, estque punctum G, respectu E occidentalius, spectabit punctum G ad æ; & quia punctum Capricorni F, est occidentalius puncto H, procul dubio punctum H, spectabit ad initium γ.


Quod autem his iisdem positis puncta ꝑ, E & F, existant in Horizonte, ita præter dicta, ostenditur. Ecliptica ducta

N. 8.

Ad Caput XV.



Quando Solis locus Eclipticæ
cam supra Horizontem mediet?

2. Ad
Caput XVI.

I. Sta per punctum G, secat horizontem
in punctis E & I, unde arcus EMI, EGI,
sunt semicirculi, quos circulus CAGM,
per amborum polos C, A, incedens,
secat bifariam, & ad angulos rectos in
G, & M.

Patet igitur arcum GE, esse quadran-
tem, quem tunc ex Ecliptica abscindit
Horizon, abscindit autem eundem qua-
drantem etiam Colurus BCE, estque
punctum E, initium Capricorni; igitur
initium Capricorni, est in Hori-
zonte ex parte orientis, quando pun-
ctum α , est in verticali AG, tangente
circulum polarem in C. Et idem pun-
ctum Capricorni erit in Horizonte ex
parte occidentis, nempe in F, quando
punctum γ , fuerit in verticali tangente
HAD.

Ex his patet, Gradum nonagesimum
Eclipticæ numeratum ab horizonte, qui
maxime distet à meridiano, siue distan-
tia hæc accipiat penes verticales, siue
penes circulos horarios, esse necessario

II. punctum γ vel α . Quia omnes vertica-
les transeunt per nonagesimum gradum
Eclipticæ, sunt ad eandem Eclipticam
perpendiculares, & ideo transeunt per
polum Zodiaci, qui non potest esse ex-
tra circulum Arcticum, suntque duo tan-
tum verticales, qui tangunt eundem cir-
culum arcticum; reliqui igitur omnes
cadent intra istos verticales tangentes &
Meridianum: & ipsemet Meridianus subi-
bit vicem verticalis, quando gradus no-
nagesimus fuerit punctum α vel β , &
quando γ & α sunt in horizonte. Regu-
la igitur generalissima est dictis & hucus-
que demonstratis hæc deducitur.

Quando Sol in æquinoctijs versatur,
& Eclipticam supra horizontem mediat,
metas, intra quas toto anno mediatio il-
la contingit, ipso facto designat; pome-
ridianas quidem in α , antemeridianas in
 γ . Iam nosse distantiam Solis à Meridia-
no, quando ipse initio Arietis aut Libræ
Eclipticam supra horizontem bifariam
diuidit, est nosse metas quæsitæ.

I 2 Ista

I.

Ista autem acquiruntur ex triangulo sphærico ABC, cuius enucleatio talis est.

ANGVLVS BAC.

In dicto sphærico triangulo ABC, angulus C, est rectus; basis AB, est arcus complementi altitudinis poli, BC, æqualis arcui maximæ declinationis; ergo per primum problema triangulorum sphæricorum apud Claviū lib. 1. Astrolabij, Lem. 63. modo 20. Si fiat, ut sinus totus ad sinum BC, qui est 3987491. ita secans complementi basis AB, 13456326. ad sinum anguli; vnica perfecta multiplicatione, prodibit sinus 5365697. anguli quæsitī BAC, qui est gradum 32. minutorum 27. & tanta distantia est verticalium, qui vtrique à meridiano, per puncta æquinoctialia incedentes, Eclipticam ad rectos secant, in altitudine poli Romana: horum angulorum hinc, & hinc mensura, est arcus horizontis inter Meridianum & dictos verticales interceptus.

ANGVLVS ABC.

Inuenietur ex problematis secūdi modo primo ibidem, si fiat, ut sinus totus ad tangentem complementi basis AB, hoc est ad tangentem altitudinis poli Romani, qui est 9004040. ita tangens 4348124. lateris BC, maximæ declinationis, ad sinum complementi anguli; qui prodibit 3915068. & promerit angulum ABC, graduum 66. minutorum 57.

Ex hoc angulo eruto, facile elicietur tempus horarium, metis prædictis comprehensum, ex angulo ABG, etenim cum totus angulus EBG, sit angulus ascensionis rectæ EG, & arcus EG, sit quadrans; consequenter etiam ascensio recta erit quadrans, & angulus EBG, rectus. quod etiam probatur hoc modo. Arcus CG, est quadrans, quia C, est polus Eclipticæ, & G, punctum in Ecliptica; similiter BG, est quadrans, quia B, est polus æquatoris, & punctum G, nempe $\cap$, est in circulo æquinoctiali: ergo anguli GCB, GBC, sunt æquales & recti, & consequenter angulus ABG, est complementum an-

II.

guli ABC, hoc est, graduum 23. m. 3. hoc est horæ vnus, scrupulorum 32. secundorum 12. Et sic patent & limites, & tempus intra illos comprehensum, quod est in Vrbe Romana, exempli causa allatum, ante & post meridiem, simul, horarum trium, scrupulorum quattuor, secundorum vigintiquattuor. Et intra hanc latitudinem oportet omnem Eclipticæ supra horizontem eleuatæ sectionem æqualem fieri, id est ante meridiem ab hora circiter dimidia vndecimæ ad duodecimam vsque, (numerando moræ Germanico, prout in toto opere facio) & à duodecima meridiana, ad dimidium secundæ vsque.

Dubitatur nunc primo. Vtrum ista metarum positio sit immutabilis? Respondeo, ad vnumquemque locum, dari vnā istiusmodi & immutabilem verticalium à meridiano discessionem, & hanc pro illo loco esse inuariabilem.

Dubitatur secundo. Vtrum hic verticalium per æquinoctia incedentium dum Eclipticam supra horizontem bifariam secant, à Meridiano recessus sit idem in omnibus locorum latitudinibus? Respondeo non esse sed pro altitudine poli varia variari; variatur enim angulus A, ad verticem ex arcu contingente AC, & Meridiani AB, comprehensus; qui semper sit Minor, quo minor est altitudo poli, maior quo hæc amplius assurgit. Vnde,

Dubitatur tertio. Vtrum istorum angulorum verticalium, CAB, minimi & maximi termini possint assignari?

Respondeo, in sphæra recta, omnium minimam in Parallela omnium maximam, in obliqua intermediam istorum verticalium discessionem fieri. Nam in sphæra parallela, declinatio Solis maxima, seu arcus DC, declinationi Solis maximæ æqualis, hanc rem determinat; vbi tamen nota, temporis extra Meridiem excessum in æquinoctijs nullum fieri; postea tamen, in accessu verticalium ad meridianum, temporis discessum euenire, ut sphæram inspicienti patebit. In sphæra parallela, Ecliptica intra medium annum semel tantum bifariam secatur, quando in colum solstitiorum deuenit, in qua tamen angulus ABC, exulat: quemadmodum in omnibus verticalibus intra circulum polarem sitis.

Vltimum

I.

Vltimum & maximum anguli BAC, argumentum est in loco, cuius verticem Circulus polaris tangit; ibi enim angulus ad meridianum rectus est, & verticalis circulum tangens, Eclipticam in horizonte iacentem bisecat.

Alijs autem sphaerae positionibus obliquis, in Zona inter torridam & polarem, intermedia; si vertex ad aequatorem accedit, minuitur angulus, si recedit augetur. Atque haec de Ecliptica supra horizontem eleuatae per circulum verticalem in duo aequalia sectione, dicta & demonstrata sunt. Nunc ad difficultates alias reuertamur.

DIFFICULTATES,

que in consignandis Maculis

ex motu illarum proprio

occurrunt, atque

earum cau-

tela.

CAP. XVII.

Expeditis ijs, quae circa motum Solis quotidianum & variam Eclipticae exaltationem, eiusque ad verticalem Circulum inclinationem eueniunt difficultatibus; restat vt huius artis studiosum admo- neam, ne nimiam in vna obseruatione peragenda moram trahat: quia tamen si tempore tali huic rei vacet, quo Ecliptica Maculae suo loco non emoueat; nihilominus tamen, si vltra mediam horam infumat, Maculae & Faculae motu proprio progressu, omnino locum alium infidebunt, quam initio obseruationis fuerat notatus.

Eae enim quae versantur in parte Solis orientali, versus centrum processisse; quae in occidentali, ab eodem recessisse animaduertentur, illae praesertim, quae ab horizonte Solari propius abfuerint; centro viciniores; quarum potissimum causa, haec afferro: nam earum quae horizontem propinquum habent, intra horam promotio sensu vix percipitur, via saltem ordinaria, ob nimiam decliuitatem, vbi Maculae quasi stationariae videntur: in medio autem, ob rectam itineris ad visum oppositionem, Maculae celerissimo cursu incitatę, sensibilem vnus aut

II.

- 1 medicę horae promotionem obijciunt. proinde opportuna in obseruando sunt adhibenda remedia. Quorum primum & praeipuum est, totam obseruationem intra quartam horae partem, aut non multo plus expedire. Quia tamen nonnunquam euenit, vt vel multitudine, vel Macularum consignandarum perplexitate, tempus vltra horam excrescat; idcirco, ne Maculae centrales locum consignatum amittant, obserua & nota primum omnes Maculas marginales, & vltimo tempore assigna centralibus sua loca. & sic cum tempore obseruationis recte concordabunt omnia vel diuide Maculas in duas vel plures obseruationes.

Quid si omnes Maculae fuerint centrales, & multi in obseruando temporis huic rei sic occures. Nota singularum

*Obseruatio-
nes punctim
factae utiles.*

- 20 Macularum puncta tantum centralia, (haec enim sunt illarum loca visa, quae nonnisi ex positu centrali sumuntur) id quod facili opera & mora breuissima exactissime conficitur, neglectis aliis omnibus illarum accidentibus, quo facto, statim illi obseruationi induc perpendiculum, horam & altitudinem Solis diligenter acceptam adscribe: & perfecisti obseruationem intentioni tuae peraccommodam. Caetera deinde, quae ad magnitudinem, figuram, & densitatem pertinent; semper potes addere, reducto Maculae centro supra punctum notatum, & versata quantum oportet chartifera tabella: quia figurae, magnitudinis, & densitatis sensibilis mutatio, tam cito non fit. Vbi tamen aduerte. Si ex situ Eclipticae mutato, notabilis quoque Tabellae chartiferae rotatio contingeret, non esse notandum aliud perpendiculum, neque sumendum aliud tempus, aut altitudinem Solis, sed omnia debere accommodari ad illam obseruationem, qua sola puncta centralia consignata fuerunt. Quod si hisce modis vti pigeat, & Maculae e loco notato processerunt, superest vltimum remedium, vt nouum locum, in quem Maculae primo notatae circa finem obseruationis superue- nerunt annotes.

QVID FACIENDVM QVAN-
do obseruandum tempore, &
loco importuno.

C A P. XVIII.

*Importuni-
tas temporis
compensatur
tabella char-
tiferi girati-
one,*

EX necessitate, hyeme praesertim, tempore & loco importunis saepius instituenda est obseruatio, vel quia caeli inconstancia melius nil pollicetur, vel quia dierum breuitas aliud nil patitur, vel quia locus, negotia, & tempus aliter haud sinunt, vel quia nouiter exorta vel postremo egressura Macula ita vrget, &c. quando igitur, horum aliquo interueniente, tempore importuno est instituenda obseruatio, quod tum fit, quando Sol, & Ecliptica Maculas è vestigio locis suis in circulo obseruatorio praefixis abripiunt, prout plerumque euenire solet hyemalibus horis, &c. tunc oportet in eiusmodi casibus vel vnam tantum Maculam vnica obseruatione accipere, illique perpendiculum suum, horum & Solis altitudinem assignare; vel asserculum chartiferum identidem girando motui & situi Maculae signatae, accommodare, vt semper loca primitus notata, suis subsint Maculis, conique solaris basis, circulo obseruatorio perfecte correspondeat, & tunc simul altitudinem solis, simul perpendiculi umbram, per circuli obseruatorij centrum incedentem excipere: quae si feceris, aequae bene procedes, atque tempore alias opportuno. Experto credas, licet. Lucra-beris hac asserculi giratione multum temporis, multum laboris, nec ulli errori solers subiacebis. Importunitas loci, in quo obseruandum, prout saepe occurrit, compensatur asserre instrumenti pedi substernendo, & umbraculo proprio, vna cum Ferculo portatili. Nam si pauimentum cui pes feretri innititur sit scabrum, vel lacunosum, impediatur mobilitas pedis, qui Solis motum semper debet subsequi, vt radius ipsius Solis in circulo obseruatorio ad amussim contineatur, motus ergo pedis debet esse facillimus & lenissimus, cui obstat asperitas pauimenti, quam emendat asser suppedaneus Q, mundissime dolatus. Lacunae vero instrumentum & circulum obseruatorium inconstanter & difformiter inclinant, ita vt Macularum loca

1 nunquam fixa permaneant, quae res facile totam obseruationem inficiat; eidem periculo medetur, dictus asser suppedaneus, qui instrumentum eodem modo 5 inclinatum retinet.

Alia ex loco incommoditas est, quando sub dio obseruandum, vt desit necessaria obscuratio; cui remedium affertur, si ipsa machina obseruatoria ita sit comparata, vt possit vndiquaque circumuestriri umbraculoque proprio cooperiri, vt obseruator nihilominus immisio capite intus Solem excipere & consignare Maculas valeat, prout in magna Tabula inferius 15 declaranda videre est, ad initium Libri tertij. Atque haec de difficultatibus ex luce Solis, ex eiusdem apparenti magnitudine atque continuo motu obortis, dicta sunt; nunc ad alias transgredior.

20 D I F F I C V L T A T E S E V I T R I S
Tubi, earumque remedia,

C A P. XIX.

25 **V**T Sol motu suo perpetuo negotia multa facessit instrumento obseruatorio, sic vicissim instrumentum non parum incommodi affert Soli. Facileque posset fieri, vt imperitus rerum 30 artifex adscriberet Soli, quod vitio vitri eueniret: & rursus huic daret, quod illi tribuendum foret. Vt igitur suum cuiilibet maneat, & verum a falso, ludificatione ab experimento discernatur, ostendo veritatem, patefacio fallacias.

Vitia à vitris in oculum Solis spectatorem inducta, satis explicata sunt ab Apelle, epistola vltima, anno 1612. die 25. Iulij ad Marcum Velsorum per- 40 scripta; nunc illa persequor, quae tubus in chartam, non in oculum immediate confert. Et ne nimius fortassis aut minutus alicui videar, sciendum me non semper doctis, sed etiam tyronibus horum studiosis scribere.

Et in vitris Telioscopio adhibendis tria considerata sunt, Materia, Forma & collocatio.

50 Materiam requiro perspicuam, homogeneam, continuam. Perspicuitas in vitro perfecta, omnem tollit colorem, imperfecta aliquid in eodem colorati relinquit: vnde species Solis ab ipso simili colore tingitur: quia lux seu spe-

I.

species Solis, diaphani per quod transit, tincturam sibi associat, & sic per alia media in obiectum terminatum alapsa, rubrum viridem, fuscum, cæruleumque Solem representat, prout vitrum ipsum habet, cuius species una cum radijs Solis in chartam promanans, apparet. Ratio à priori; Quia color similem sui speciem à sese propagat, viridis viridem, cæruleus cæruleam, albus albam, flauus flauam. Quod manifestum est ex eo, quia omnes rerum coloratarum imagines cum viuis similium colorum simulachris in chartam mundam obscuro loco obtentam sese ad vnguem sistunt, vbi per lentem conuexam (vel nudum etiam foramen) nudo foramini oppositam illas intromiseris. Certum autem est in simili spectaculo colores ipsos non adesse, adsunt ergo illorum ideae, quæ semet in charta spectabiles faciunt, & alias à se suimet formas quauersus propagant, & spectabiles quidem, quando cursus illarum in corpore adiphano sistitur, quemadmodum hic fieri in comperto est.

Color Maculis à vitro affricus. Quando igitur Sol per vitra colorata. Maculas suas, seque ipsum tinctum ostendit, scias illud non Soli, non Maculis, sed vitris, radijsque solaribus à radijs specierum coloratis, inesse, indeque in basin coni solaris deriuari.

Lentes autem omnino perspicue, nullis coloribus tinctæ, satis paucae apparent, si tamen aliquæ apparent. Nam ex lente quauis conuexa, u. g. radios refractione colorari certum est; an autem hoc ex colore lentis, vel certa quadam specierum visibilium commixtione fiat, posset merito in dubium reuocari, quod nunc tamen non determino: interim colorem illum apparentem, esse aliquid ex parte rei existens, nihil ambigo.

Materia uniformis. Materia insuper homogenea sit oportet; vnde excluduntur lapilli, arenulæ, bullæ, & diuersæ densitatis aut perspicuitatis partes, aliæque immunditiæ: quæ omnia speciem Solis infestant, & fucatas Maculas, vti postea dicetur; sæpe obijciunt.

Continua. Præterea æquabiliter cōtinua, quæ proprietas facit, vt per totū solida, & minime porosa aut ventosa existat. Dixi materiā debere æquabiliter seu vnifotmiter continuam, vt excludet venas, spiras, vn-

II.

dulationes, giros, vortices, nebulas, fumos &c. ex artificum incuria in vitrum inducta, dum materiā ignitam atq. mollem ollis exceptam diuersimodè trahūt, agunt, girant, torquent, versant, carpunt, corrumpunt. hæc enim res vna pestem & perniciem affer ordinationi & munditiei specierum visibilium. Quare enim per tranquillam aquæ mundæ superficiem, quidquid in fundo est limpidissimè aspicimus? quidquid extrinsecus à circumiectis corporibus specierum accidit tersissimè ad visum reuerberatur? contra modicum turbata seu agitata aqua, vel nil priorum, vel summam cum confusione & monstrositate cernitur? non aliam vtique ob causam, nisi quod illa agitatione aquæ, variæ effectæ superficies æquabilitatem continuationis tollunt, situs atque inclinatio mutant, & varias super diuersas superficies specierum incidentias & refractiones, atque reflexiones efficiunt, quæ semper eodem modo turbulentæ manerent, si aqua illa tali situ, ordine & figura solida atque congelata consisteret: id quod vitro è fornace exempto & sensim refrigerato accidit. Vnde videmus pocula vitrea ex arte aspera, quæ propter glaciæ similitudinem congelata dicuntur, item rotulas fenestrarum, plurimum quidem luminis ex illa perturbata radiorum & specierum congerie afferre: at rerum coloratarum distinctè transuindendarum, parum aut nihil. Vitrorum ergo materia eiusmodi anfractibus, mæandris, tractibus aut venis infecta, huic negotio omnino inhabilis, & noxia existit. Quæ verò limpidè perspicua, munditer homogenea, continuè atque vniformiter solida per totum euadit, casine dubio huic negotio aptissima, maximi facienda, & gemmarum instar habenda.

Hæc enim huic Phænomeno perfectè cognoscendo summam facilitatem affert, propter Maculas & Faculas secundarias in conspectum limpidum deducendas, qui sine tali materia, admodum laboriosè, neque cum tanta perfectione elicitur. Loquor autem de materia simplicissimè homogenea, integerrime continua, nullis omnino poris, ne minimis quidem infecta, densitate æquabilissima temperata, coloris omnis ex-

per-

*Materia
ad peruesti-
gandas Solis
umbras.*

I.
parte; talem inquam materiam ad Maculas & Faculas secundarias in profectum educendas iam diu conquistam, adipisci non potui. Patent quidem semper eę Maculae & Faculae, sed praedictis materiae inquinamentis partim asperguntur, partim omnino confunduntur, & suffocantur. ut suis locis, melius edocebitur. Neque chrystallus ipsa e mon-
tibus eruta, quantumvis defecata, pura, syncere, & perfectissime perspicua videatur, voti compotem facit: quando enim ad rem venit, intus venis & meatibus naturalibus, inaequaliter diaphanis, difformiter continuatis passim infessa reperitur, quae Maculas, & umbras secundarias, magis implicat, quam explicat. Et haec de materia: nunc ad Formam, venio,

*Forma len-
tium qualis
esse debeat?*

Forma, quae huic materiae inditur, est artificialis, superficies nimirum vel plana, vel sphaerica (de reliquis enim figuris nolo hic inquirere;) eaque vel caua, vel conuexa; & tam haec quam illa vel vtrunque in lente eadem; vel ut vna quidem facies sit conuexa & altera plana in lente vna eademque; aut altera caua, plana altera: vti in adiectis figuris est cernere. Vbi, a b c d, est lens vtrunque conuexa; superficiebus duabus sphaericis, a b c, & c d a. Quod ut melius intelligas, sciendum, lentem hoc loco nil aliud esse, quam sphaerae segmentum seu frustum, sectione plana vel sphaerica, factum. ut si sphaera, e a b c, secetur alia sphaera, f g d h, sectio communis, a b c d, erit frustum solidum vtrique sphaerae commune, a b c d, duabus superficiebus sphaericis, a b c i, a d c i, circulari, peripheria, a i c, semet interfecantibus, comprehensum. & quia frustum eiusmodi figuram lenticularem praefert, solet appellari lens. Componitur autem e duobus segmentis sphaericis, a b c i a, & a d c i a, sectione plana, a i c, factis. Lens igitur integra, semper conflatur e duobus eiusmodi segmentis; quorum communis basis est circulus. Eiusmodi lentes constant e segmentis vel aequalibus vel inaequalibus, si aequalibus, sectio est a sphaeris aequalibus; quales sunt, e b, & f d, si inaequalibus, etiam sphaerae se mutuo secantes erunt inaequales, cuiusmodi sunt, e b, & f l; e quibus nascitur lens, b k l m, conflata e segmentis, k b m n, & k l m n,

qualis etiam est lens, o p q r, ex sphaeris, e r, & f p, inaequalibus sese secantibus conflata.


Quando sphaera secatur plano, exurgit lens dimidia, seu segmentum sphaerae simplex; quale est, g d h, superficie sphaerica, & circulo, g t h, comprehensum. Quales etiam lentes sunt, K l m n, u x y z, &c.

Magnitudo, amplitudo, & latitudo lentium desumitur a circulo, qui est superficierum sphaericarum basis, cuius magnitudinem offert semidiameter, a i, vel i c, quae semper aequatur sinui verso, dimidium arcus maximi superficiei lenticularis subtendenti.

Altitudo lentium, est perpendicularis linea e centro baseos ad superficiem lentis emissa. qualis est linea, i d, vel i b.

Crassities lentis spectatur penes maiorem vel minorem altitudinem.

Forma lentium Telescopicarum.



I.

Qua crescento, crescit superficies in eadem specie lente, decrescendo decrecit.

Eadem specie lentes sunt, quæ sunt eiusdem sphaeræ segmenta, ut a b c. k b m.

Superficies lentis æstimatur, penes semidiametrum sphaeræ cuius lens segmentum est. Ut, g d h, superficies censetur ex semidiametro, f d, & ex s p, semidiametro æstimatur superficies o p q.

Globositas seu sphaericitas lentis spectabuntur ex comparatis ad se sphaerarum diametris vel semidiametris: Non ex magnitudine, aut crassitie lētis. Nam lens lente potest esse crassior, potest esse maior, non tamen globosior, ut k l m, non esse globosior quam a b c, tamen maior o p q, est globosior quam k l m, tamen minor. Nam minorum sphaerarum segmenta seu lentes sunt globosiores, quam maiorum. Ut lens, o p q, globosior est quam, u x y z, &c.

Lentes concavae sunt segmenta sphaerica ex solido diaphano ablata, vel duabus superficiebus sphaericis ad verticem oppositis, vel sphaerica & plana terminata. ut videre est in caua vtriusque, k l m u x y, & g a b c h t, vel k l m y e b.

Minorum sphaerarum cavitates faciunt lentes acutiores quam maiorum.

Maiorum sphaerarum excavata segmenta, efficiunt lentes obtusiores.

Lentes, cauae duplicatae seu integrae plus possunt quam simplices; quod intelligendum est, etiam de lentibus conuexis, certo modo ad certos effectus applicatis.

Ex his lentium figura tubo apta satis innotescit, est enim vel sphaerica tota, vel partim sphaerica, partim plana. qui si perfectæ tales extiterint, lētes in suo genere optimæ euadent. An autem figura bona vel mala lenti adhæreat, patet sola praxi & vsuali experientia. nam huius rei dignotio ita subtilis, ita abstrusa est, ut bonitas hæc vel malitia nullo sensu, nulla ratione antecedenti, sed solo vsu atque experientia practica disci, sciri atque doceri queat.

Tubo igitur ad Solem debite applicato, si eiusdem imago mundè circulariter, præcisè in obiectam orthogonos

II.

chartam resultabit, bona erunt vitra & figura illorum rectè facta. Si Sol figura alia quam circulari, obtuseque allucebit nauci erit vitrorum forma.

Ad figuræ bonitatem atque perfectionem ultimam, etiam laeior, & politio pertinet. fieri namque saepe solet, ut bona sit superficiei extensio, sed expolitio rudis atque obitanea, quod apparet quando intuenti ex obliquo, quasi cinere & pulueribus minutis respersa apparet, aut cauernulis atque prominentibus tuberculis vicissim fluctuat. Sunt enim illæ lacunulae ex arenulis in vitri frictione obortæ & relictæ. Talia igitur vitra parum conducunt, quia speciem neque fortem neque mundam offerunt. Non fortem, quia ob superficiei inæqualitatem, & ut ita dicam cruditatem, media quasi radiorum pars retunditur & transitu prohibetur, ibidemque suffocatur, aut alio diuertitur: non mundam, quia magna pars ab ordinato incessu diuisa in locum alienum diuellitur, & sic specierum confusio generatur, quæ imaginis ordinatæ obfuscationem atque debilitatem affert.

Vitra ergo omnia, debent esse expolitionis tersissimæ atque æquabilissimæ, figuræque exquisitissimæ. Hoc autem ut fiat in elaborando, diligentia artificis, instrumentorum bonitas, & bona fortuna facit; ut cognoscatur, vsus omnium rerum Magister edocet potius, ut dixi, quam vlla vel industriæ sollertia, vel ingenij doctrinae subtilitas.

Quia tamen harum rerum studiosis gratum me facturum confido, si aliquā lentium discernendarum praxin ostendero, accipe sequentes regulas.

AD DISCERNENDAS BONAS lentes, Regula practica.

C A P. X X.

Regula I.

AD discernendas vndas & vortices in lente conuexa. Nam hoc vitium ita saepe latet, ut politura atq. nitoris præstantia visum eludat. Statue igitur lentem inter obiectum aliquod certum & oculus, & eo vsque vel accede ad lentem, vel recede ab

Lentium laeior atque expolitio.

Discretio vorticum et vndarum.

Vsus & experientia optima Magistra.

Formae bonae examen.

ab eadem, donec obiectum in punctum confusionis deducas: tunc enim videbis, quidquid in lente vorticosum & flexuosum existit. Obiectum in punctum confusionis tunc deductum erit, quando illud oculo neque situ erecto, neque everso, sed omnino confuso apparebit; ita ut neque figurarum species, neque colorum qualitates, neque lucis à tenebris & umbris discretionem internoscere valeas: huius puncti locum & stationem, oculo doctore, statim addisces: ab hac statione si accedas ad lentem, habebis obiecti situm erectum, si recedas, eversum inuenies.

Aliter: Obuerte noctu lentem lucernæ vel candelæ accensæ, donec eam in puncto confusionis aspicias, quod fiet si lentem totam æquali lumine perfusam intueberis, tunc simul aspicias, quidquid vitiosum lenti meritis & miraberis in diaphano alioquin tam nitido, tam mundo, tam perspicuo, prout antea videbatur, &c. Inherere tantam immunditiam tantas sordes, tantas feces, tantam confusionem atque intemperiem: ut mirum sit, quomodo lux omnia, & singula minutissime patefaciat, quæ alioquin omnem visus aciem effugiant: imo miraculum naturæ maximum, quia ratione per materiam tam faculentam species visibiles tam mundæ, tam ordinatæ in chartam depingantur.

Dubium solutum.

Quæret aliquis, primo. Cur vitri vitia tam patenter ostendantur in loco confusionis; cur non prodantur in loco rectæ ordinationis, quando obiectum distinctè cernitur situ primum erecto, aut post confusionem situ everso? Respondeo, Omnino etiam videri ante & post confusionis locum, sed tamen non ita distinctè circa res minimas, præsertim in vitris magnarum sphaerarum: in confusionis loco fit hoc maxime, quia visus illuc in vitrum terminatur, & consequentur omnia quæ eidem insunt, optimè perlustrat.

Dubij intricati solutio.

Queret secundò. Cum in visione confusa nihil ordinatum, sed omnia disturbata accidant: qua ratione fieri potest, ut ea quæ in materia & crassitie lætis latent, ut videantur, & si videntur, an & quare ordinato situ conspiciantur? Respondeo horum accidentium causas & rationes à priori postea, quando oculi

cum tubo cōuenientiam declarabimus, melius & fusius explicatum atque intellectum iri; nunc breuiter hæc dici.

Primò. Experientia certum esse, in statione confusa ex obiecto distinctè nil cerni, sed alba expandi in quandam confusam albedinem, nigra in nigredinem; mixta in aliquod confusum chaos, ita tamen ut non liceat distinguere partem à parte, totum à parte, aut à toto, nam nulla figura, nullus terminus, nullus color ab altero seiunctus aut distinctus, sed omnia simul & vbiq; comparent, totamque lentem tingunt.

Secundò. Certum esse, lentis partes omnes ordinatas & distinctas videri.

Tertiò. Istarum visionum causam esse proximam & immediatam, præsentationem seu picturam factam & receptam in tunica retina: obiecti quidem confusam, lentis autem ordinatam: certum vero est, actum videndi, sequi modum & qualitatem representandi: si præsentatio visibilium confusa antecedit, sequitur visio confusa; si limpida & ordinata imprimatur species, exprimitur à visu similiter sincera & distincta.

Quartò. Cur autem obiecti species in dato casu sit confusa in retina, & lentis ordinata, causa est, quia hæc est in humore crystallino confusa, illa distincta & ordinata. Certum autem est, humorem crystallinum omnes species confusè allapsas ordinare, & omnes ordinatas confundere.

Quæret aliquis, tertiò. Cur si species omnes confunduntur, non etiam confunditur lux? nam nulla lucis mutatio apparet, in statione & situ lentis quocunque, semper enim lens illustris apparet, siue obiectum rectum, seu eversum siue denique confusum aspicias, lucis tamen sensibilis aliqua & localis mutatio non comparet. Responderetur, primò,

Hoc idem argumentum pugnare contra quoduis obiectum homogeneum & unicolor. Nam si lentem obuertas in album aliquem maximi palatii parientem, ut ipse solus eandem respectu visus occupet, non senties ullam situs mutationem, in statione quacunque, sed semper alborē uniformem cōspicies; sic cæruleum cæli colorem: sic subobscurum montis, igitur hoc lucis non est peculiare, quod non eueratur, vel eueri non sentiatur; euer-

titur

Cur lux confusa, non appareat confusa?

Confusio specierum in unicoloribus non notatur.

I.

titur enim : quod autem euersio non sentiat, causa est, quod lux homogenea & similis cum sit, etiam si radij eiusdem stationem varient, tamen id oculus non percipit, quia semper simili luce afficitur : id quod manifesto experimento elucescit in trochi conuersione velocissima, quem visus stare putat : & tamen rotatur. quare rotationem non sentit? quia cum trochus unicolor supponatur, specierum successiva migratio non sentitur, similis simili succedit. Aliud exemplum euidentius habemus in agitatione illius caerulei, quod videmus oculo ad caelestia conuerso : illius enim aliam, & aliam partem visui obuerti non est dubium, & tamen partium distinctionem oculus non notat. quia quantumuis pars parti succedat, vt multis placet, tamen oculus motum illum non notat, propter similitudinem radiorum & specierum. sic in luce, sic in unicoloribus obiectis omnibus accidit quae cum totum oculum occupent, uniformi semper colore tingunt, & sic rectitudo, confusio vel euersio specierum non notatur.

Respondetur secundo. Tam lucidi, quam reliquorum unicolorum rectos, euersos & confusos situs cognosci ex terminis illorum, & locis visis. Deinde ex ipsius lentis aspectu. quae satis prodit situs rerum per ipsam visarum.

Quaeritur quarto, Quare & quomodo, cum lux sit specierum inimica, easque quodammodo deuoret suffocando, & obliterando, speciem lentis non extinguit? & cum ipsa sit confusa ex hypothese, secum patitur lentis speciem ordinatam? Est ne possibile, vt idem subiectum simul & semel imbuatur specie confusa, & distincta? vt in eadem oculi parte pingatur imago confusa & distincta?

Respondeo, Lucem non esse tam inimicam speciebus, vt eas non ferat secum cum & ipsa prout à lucido in aërem propagatur sit species, & coloratorum speciebus in ordine ad visum velut animam addat, eo quod species coloratorum non sentiantur sine aliqua saltem luce. itaque sicut lux nulla speciem licet presentem oculo insensibilem relinqueret, ita nimia insensibilem facit : maxima sui excellentia, ad se namque sensum prouocat, qui relictis debilibus speciebus luci adharet,

II.

1 & sic lux nimia species obliterat, haud aliter. Quando autem mediocritatem non excedit, prout in presenti casu euenit, lux seu directa, seu confusa, seu euersa, speciem lentis, quo minus sentiri queat, haud impedit. Cur autem species lucis in humorem cristallinum ordinata recipiatur, facit lentis dispositio & ab humore cristallino distantia, & cur lentis ipsius species confusa radiet in eundem humorem, facit ipsa libera & naturalis & confusa radiorum in cristallinum incidentia, prout paullo post expressius ostendetur. Et hinc fit, vt cum lux confusa totam lentem suo splendore oculo illustrem obijciat, simul etiam omne id repraesentet, quod eiusdem lucis uniformitatem, atque similitudinem impedit, turbat, interpellat : id quod faciunt bullae, rimae, arenae, pulueres, vnde quorum aspectus tamen ordinatus affluit. Vnde nihil nouum aut incredibile debet videri, si diuersissimae rerum imagines simul & semel in eodem subiecto inhaerent, dico imagines rerum visibiles, qui cum sint naturae tenuioris & non colores rebus inhaerentes atque fixi, bene possunt esse simul in eadem subiecti parte, non secus atque lux Solis, lux Lunae, simul illabuntur in locum eundem.

Hinc deduco primum, Euidentius ex hoc experimento esse, visionem non fieri in humore cristallino, sed in tunica Retina alioquin, in dato casu, lens ipsa, confusa, & lux ordinata appareret, cuius contrarium fit.

Secundum. Maximum tam ex hoc quam prius dictis, elicitur argumentum, species visibiles videri. nunc ad institutas Regulas me recipio.

Regula II.

Ad discernendam bonam figuram in lente quauis. Obuerte lentem ad obiectum rectilineum, si rectitudo non fuerit incuruata, praesertim immediatè ante vel post euersi situs stationem, conspecta, scias lentem esse figurae nobilis. si rectitudo monstruosè fuerit incuruata, lens nihili erit. Aliter.

Per lentem aspice obiectum circulare, vel quadratum, vel triangulare aut figurae cuiuscunque tandem. deinde gira lentem circa suum centrum, omnibus reli-

Simul & semel in eadem subiecti parte species confusa & ordinata inhaerent.

Visionem non fit in humore cristallino sed in tunica Retina.

Discretio bona figura.

I.
reliquis inuariatis, & attende an circulus per circumactam lentem semper representetur sub figura circuli, an non in ellipsin conformetur, an exactum quadratum, triangulum aut figura quaecunque proposita inuiolata transpareat: si hoc, probam habes lentem quoad figuram: si secus; reprobam.

Dubij solutio.

Quæris qua arte lentem, ita tenere & circumagere valeas, ut situ tamen eodem semper ad oculum maneat? nam axis lentis, & oculi coincidere semper debent; quia inclinatio quaecunque lentis, variat figuras visibilium. Respondeo, hoc manu libera, nisi ab huiusce rei peritissimo, atque exercitatissimo fieri vix posse: facile tamen & securè futurum, si lentem tubo imponas, ut axis tubi seu arundinis, lentis & oculi sit idem: nam si ad alteram tubi partem oculum apposueris in debita ad lentem impostam distantia, circumuolutus vna cum lente tubus, voti cōpotem efficiet. vbi nota, hanc lentis examinationem eō futuram meliorem, quo obiectum per eandem melius atque expressius contuitus fueris. Deinde eam obiecti partem quam semel centro lentis obuenteris, semper in eadem esse retinendam: alioquin examen vitiosum posset euadere. His ita se habentibus, si circumgirata lens, obiecti figuram semper sibi similem & æqualem oculo exhibuerit, bonarum censum augebit: si mutauerit, adnumerabitur malis.

Hac eadem via duas lentes tubo inclusas tacite, nullo aduertente examinabis. Si namque circumuolutus dicto modo tubus, omnia similia æque magna & clara transmiserit; probus est. si secus, gira illam arūdinem cui inhæret conuexa lens, solam; quæ si nil in obiecto variat, proba erit, & concavæ vitium inhærebit, quod deprehendes circumductu ipsius solo. Quod si in conuexæ rotatione obiecti varietas inuenietur, illa quidem praua censebitur; non tamen idcirco caua omnis labis expers erit. quæ proinde nihilominus erit exploranda.

Regula III.

Discretio boni laudis.

Ad inuestigandam lentis exactam polituram. Aliud est in lente bona materia, de qua examinanda dedi regulam.

primam, aliud bona superficies siue figura, de qua in Regula secunda, aliud denique læuor probus seu tersa & munda expolitio. Quia fieri potest, ut optima materia induatur prauissima superficie, peiore læuigatione. Fieri potest ut materiam atque formam optimam, inhabilem reddat expolitio mala. Denique & splendor nitidissimus in superficie distorta, aut materia inidonea, ad rem non facit. Quare ut lens ad vsum deferuiat, necesse est materiam aptam, rectè figuratam, nitidissimè atque æquabilissimè esse perpolitam. Hæc autem an adsint in oblata lente sic intelliges.

Accipe lentem, & illam faciem cuius læuorem experiri cupis, ita obuerte luci vel Solis (quanquam hæc nimis vehemens erit forsitan) vel diei per aliquam fenestram ingressæ, quod erit apertissimum, vel lucernæ accensæ noctu, vel denique obiecto cuicunque tandem albo à Sole illuminato, ut species illa lucidi vel illustrati corporis in superficiem lentis allapsa ad oculum tuum reflectatur; qui simul vitri superficiem acutissime ab illa specie luminosa veluti illustratam intuebitur, & accuratissimè animaduertet, quidquid tersum, quidquid sædum; quidquid plenum, quidquid vacuum; quidquid perspicuum, quidquid opacum; quidquid æquum, quidquid iniquum; quidquid continuum, quidquid discretum; quidquid laudabile, quidquid vituperio dignum in illa extremitate apparuerit. Vbi nota, duplicis generis imaginem allapsæ lucis reuerbarari: alteram à patente superficie, quam examinas & ob oculos habes, & huius species maior sed magis tenuis & rarior apparet, ad præsens tamen examen videtur commodior, quia visum mollius tractat, & in superficie obtutu suauiter detinet, altera refunditur ex auersa & latente superficie, & minor quidem sed tamen vegetior existit, huic autem examini minus opportuna, quia visum à superficie conspectu in vltiora abducit. Prioris ergo imaginis extremitates seu terminos diligenter considera, an mundi, præcisi & constanter similiterque protensi per totam superficiem traducti maneant necnè? si vniiformes & tersi vbique compareant, optimam sortitus es in lente polituram: si vero asperi, lacunosi, laceri, distorti vacil-

I.

vacillantesque obuersantur: parum valebit inductus leni laeuor. nam tales in speciem apparentiae inducuntur ab inaequali prauaque politura. Præterea dum hoc modo imaginem lucidam lenti incidentem aspicias, eadem opera, ipsam lentem eiusque extremitatem videbis vel laeuam, vel iniquam & veluti cauernulis aut arenulis plenam, ac cineribus superfusam, prout in Regula prima satis dictum, Nam nolo eadem hic repetere: sed neque omnes examinandi modos ponere; vltus Magister multa melius docebit.

Cauæ lentis bonitatem examinabis optimè, per lentem conuexam, quæ sit sphaeræ maioris segmentum. Si namq. hasce duas lentes in tubum debitè locaueris, & Solem per ipsas traieceris in chartam, illustrabit radius lentis conuexæ lentem concauam, & simul quidquid in illa vitiosum est, in chartam obiectam deducet. Hoc modo deprehendi nœuos lentium crystallinarum: hoc modo examinabis quoque lentem quamcunque conuexam. Sed & cauam iisdem examinibus subijcies, quibus conuexam. Multos alios modos, quos vel praxis vel ingenium suppeditabit, sciens & volens, prætereo.

Et hæc quidem obiter & breuiter, de materia, deque figura lentium dicta sunt. Nunc ad earundem Collocationem accedo.

COLLOCATIO LENTIVM IN genere, & ad eandem necessaria.

C A P. XXI.

Non sufficit habere lentes bonas, apta illarum inter se dispositio & collocatio multo magis requiritur. Quemadmodum enim ex latere & calce arenata domus efficitur, domum tamen non habet qui arenam calcem & lateres habet; sed artificiosa constructione est opus; sic si lentes habeas, vt proportionē debita illas colloces omnino necessarium est. Alia vero lentium collocatio est immediata, alia mediata. Prior in eo consistit, vt ipsæ tubis debitè imponantur, de quo suo loco. Posterior in eo consistit, vt ipsæ tubus vna cum lentibus aptè accommodetur ad chartam pro Sole excipiendo; & charta appositè firmetur ad Solem per tubum excipiendum

II.

Igitur qui Solē vult intromissum in chartam sine errore obseruare, oportet omnino vt sit instructus ante omnia ab ijs omnibus, quæ pro Telioscopio sustinendo sunt in primis necessaria. alioquin, nec tubus optimus, nec lentes optimæ, neque scientia perfecta, neque praxeos dexteritas vlla, ipsum quidquam ad magna desideria iuuabunt. Quare, vt votis Practici Obseruatoris quantum possum obsecundem, antequam & chartæ collocandæ, & Circuli obseruatorij in eadem designandi, & tubi in Ferculo obseruatorio ordinandi, lentiumque in tubo disponendarum rationes singillatim, speciales percurro; ipsam Machinam obseruatoriam eiusque partes, in prioribus cap. VII. rudiori calamo perstrictas, nunc articulatiùs explanabo; vt quilibet, eorum quæ posterioribus libris afferro, & examen solidum & periculum proprium per se, si placet, possit instituere: nec iam mihi scribenti, aut alteri dicenti, sed sibi met experienti, atque adeo rei ipsi fidem discat habere.

MACHINAE OBSERVATORIAE

Verticalis eiusque partium explicatio uberior.

C A P. XXII.

IN adiecto Diagrammate, N. I. signato, exprimuntur omnia singillatim, quæ ad Fabricam, qua Phœnomenon solare obseruatur, pertinent. Itaq. A, folium chartæ denotat, Solari radio excipiendo deputatæ. Tabella chartifera, B, est asserculus, æque crassus vbiq. planus & bene dolatus vtrimque; superficiebus quantum potest candidissimis, propterea, quod chartæ albedinem iuuat. Nam album tenue albo superadditum, apparet albius: charta igitur albo asserculo substrata fit albior ad aspectum, teste experientia; ideòque imagini Solari excipiendæ multo aptior. Nam licet Maculæ in quacunq. obiecta superficie, etiam nigra sese sistant, suffragante experientia: nusquam tamen id distinctius faciunt, quam cum hospitium album sunt nactæ; ideòq. si Tabula chartifera non sit ex sese alba, soleo ego eandem superinducta alia aliaq. charta dealbare. Hic asserculus quo leuior, hoc erit tractabilior, vnde magnæ crassitiei esse non

K debet

I.

debet, neque tamen ita tenuis, ut incuruetur: quo dato casu, Solarem conum non circulo, sed alia quapiam figura vitiosa secaret, & sic deprauatas Macularum projectiones offerret, quod diligenter est cauendum. In medio ad, B, foramen rotundum, maius & minus habet, ad mensuram clauis ferrei striari & capitati, F. Et maius quidem respondebit ad vnguem capiti clauis, tam profundè in asserculum immisum, quanta est crassitudo capitis clauis: minus æquet crassitiem stili clauis. fit hoc ideo, ut Tabula chartifera possit circa hunc clauum tanquam axem circulariter verti propter motum Macularum diurnum. vnde si anguli Tabellæ girationi officerent, possunt abscindi, in formam octogoni, aut denique circularem. Immittitur caput clauis in crassitiem tabellæ, ne promineat quidquam ex eo, sed præcisè sit in eodem cum Tabellæ superficie plano, ne charta deinde super affigenda, aliquid incommodi patiatur. Charta vero asserculo affixa: exprimitur in figura, C. Affixio chartæ non debet fieri per totum, aut tenaci aliquo glutine, sed in angulis & marginalibus partibus vbi opus est cera molli vel lento visco; ita ut charta non sit rugosa, non lacunosa, sed plene & plane distensa: ut absolutis observationibus possit commodè refigi.

Pes & Caput totius fulcri obseruatorij, est vnus idemque asser parallelepipedus, D, satis crassus, ut dorsum fabricæ, & reliqua omnia firmiter atque immobiliter sustinere valeat. est quadrangulus altera parte longior vtriusque bene dolatus. Certa autem ipsius altitudo seu longitudo est cuiuslibet libera, prout longis vel breuibis tubis magnis vel paruis circulis obseruatorijs aliquis vti desiderat. Inferior ipsius pars dicitur pes totius Feretri seu instrumenti; quia ille solus Machinam obseruatoriam sibi commissam gestat, & solus infimam eiusdem partem occupat, solus pavimento iunctus inambulat, motuque suo instrumenti oculum in Solem dirigit. Superiorem huius asseris partem, voco Caput, quia supra omnes reliquas partes attollitur, & Tabellam chartiferam, sustinet, in eamque Solem, per tubum tanquam oculum suum receptum admittit. Duo habet foramina, quorum

II


1 superius minus & rotundum, clauo, F, aptatum est, ut appensam Tabellam, C, sustineat cuiusmodi factum vides in, E. à dorso lamella & matrix apud clauum, F, consignata in stylum clauis striatum. 5 immittuntur, ut chartam & Tabellam, E, fixas, sed prout oportet, volubiles contineant. G H, est rostrum seu dorsum vel spina Machinæ, tubo sustinendo necessarium, cui proinde committuntur duo 10 retinacula lignea, I & K, qualis autem sit commissura satis discernere potes apud, M, illuc enim immittendum est retinaculum, K, quæ ambo rostro, G H, ad, 15 I, & M, insistent ad angulos rectos; non quidem ex necessitate, sed pro commoditate fabricæ. Neque ad duo tantum, eiusmodi retinacula te adstrictum velim, sed si vltus & necessitas secundum magnitudinem vel longitudinem Telioscopij 20 plura requirat, poteris adhibere quot voles. Dorsum ergo, G H, hoc modo aptatum, ut perfectè parallelepipedum existat, immittitur altero extremo apud, H, ad hanc rem rectè acciso in foramen Maius, & inferius, D, & in prominentia à dorso foramina immittuntur 25 duo cunei, L, repagulorum vice fungentes, ut tota Machina firmissimè colligata, nullo modo hiet, vacillet aut instabilis existat: sed vna parte mota, moueantur omnes. Rostrum autem 30 pedi, D, committi debet ad angulos exactè rectos.

35 N, est asser suppedaneus, satis crassus & politè dolatus, ut loco pavimenti asperi, vel lacunosi, pedem, D, facile mouendum sustineat.

O, est fulcrum rostri, figura trianguli isoscelis elaboratum, in vertice & bascos angulis præfixo ferro acutum; illic quidem, ut rostrum superincumbens apprehensum teneat, & inde veluti ex centro volubile reddat: hic ut totum instrumentum pavimento innixum, exaltari & 45 deprimi queat. horum enim duorum motuum compositione, & beneficio centrorum, tota machina quaua versus volubilis, & motus solaris compos absque labore efficitur.

50 In hunc ergo modum absolutè Machinæ, P Q R S T, imponitur tubus aptè dispositus, f g, retinaculis, R T, ita, ut axis tubi, axis lentium tubo inclusarum, 55 & axis coni solaris, sit vna eademque linea

Tubi in Machinam obseruatoriā aptatio.



nea recta, $e f g h$, per centra solaris baseos & circuli obseruatorij, $a d b e$, itemq. lē-
tium & Solis incedens, ad plana illorum
erecta, longitudinem, $i K m$, rostri, $Q S$,
parallela.

Lentium in
tubo dispo-
sicio.

Qualis autem lentiū tubo. inclusarum
fit dispositio, patet ad aspectum in tubo,
 $a e m n f b$. in quo conuexa lens, c, d , in-
serta est arundini maiori, $a c f b$, concaua

1 $K l m n$, minori, $e K l f$. Sol per tubum ex-
ceptus, p , cuius axis radiosus, $p g$, in di-
rectum fertur cum axe tubi, $g h o$, ex cē-
tro Solis, p , per centra lentium, i & o , ad
5 quarum plana perpendiculariter erectus
est. Et hæc est necessaria & bona Tubi
seu Telioscopij cuiuscunque constitutio.

Verum enim vero, quia hæc sunt val-
de generalia, & interim ex his de hoc

K 2 vcl

I.

vel illo tubo certum aliquod & stabile iudicium ferri nequit; neque virtus & bonitas Telioscopij elici: neque distantia chartæ à lente conuexa sciri; neque lentis ad lentem natura dignosci: interval- lum determinari: præterea quia aliud est quando Sol per tubum in chartam im- mittitur; aliud quando oculus per tu- bum emittitur in Solem: & horum ta- men vsus atque praxis in hoc negotio millies occurrit, scientiaque tum per se valde utilis, cum huc per necessaria est, & admiranda sanè oculi cum tubo, Tubiq. cum oculo affinitas & necessitudo inter- cedit: idcirco, quæ sparsim & multis partibus confusè sæpius cum tadio fuis- sent huius operis processu ingerenda, & cum nausea forsitan regerenda; operæ pretium me facturum arbitratus sum, si hic omnia simul & semel, collecta sed succinctim afferrem.

OCVLI ET TELIOSCOPII,
lenticumque telioscopicarum compa-
ratio, Naturæ & artis admi-
rabilis conspiratio.

C A P. XXIII.

VT hæc, mirifica & discors na- turæ cum arte concordia, ab vnoquoque melius introspice- retur, necessarium duxi, rem tam vti- lem non verbis tantum in aures, sed figuris potius in aspectum ingerere: vbi tamen moneo, me naturæ nomine intelligere omnia ea, quæ in oculo & ab oculo sano, naturæ ductu, sine artis vl- lius adminiculo fiunt; artis autem appel- latione, velle intelligi, quidquid visum specierum visibilium applicatione, ad me- lius videndum iuuat. Deinde hoc quoq. noueris, in lineis seu radijs visualibus re- fractione à lentibus aut humore crys- tallino inflexis, non esse accuratissimam habitam rationem, cum hic exempli caus- sa adducta, tam subtiliter accurata non sint: neque enim hic refractio ex institu- to docetur: de qua re vide oculum meum.

Habes in adiecto iconismo, signato, expressas septem diuersas Tubi cum ocu- lo, & huius cum Tubo, in speciebus vi- sibilibus recipiendis & præsentandis ra- tiones & comparationes. In quibus om- nibus cernis oculum per medium sectum

II.

1 cum suis tunicis & humoribus. In quinq. autem artificialibus habes sectionem tu- bi per axem & centra lentium: in duabus postremis adest sola, lentium & forami- num sectio præsentata. Nunc ad singula- rum expositionem veniamus.

Prima Comparatio sub, A, 1. & A, 2. instituta, offert eam tubi constitutionem quæ simpliciter & per omnia oculum re- fert. Nam in figura, A, 1. obiectus Sol, a b, mittit conum radiosum, a c b, per lentem conuexam, d, tubo, e f, inclusam, in obscuram cameram, g h, desinentem in basin, i K, receptam obiecta charta,

Oculus est
tubus natu-
ralis; Tu-
bus est ocu-
lus artificia-
lis.


15 l m. Hæc tota tubi, e f g h, constitutio, simillima est oculi, n o p, fabricæ, quoad specierum visibilium receptionem etenim Sol, q r, simili ratione suum co- num radiosum, q s r, per tunicam pri- mum corneam, t, deinde humorem cry- stallinum, u x, transmittit decussatum, in puncto s, ad fundum retinæ, y z, sic idem Sol, a b, per apertum tubi orifi- cium, a b f, quod tunicam corneam, n t p, 25 representat, procedit ad orbem, r d s, ibique impactus, plus radiorum non immittit, quam quantum apertus circel- lus medius, d s, permittit; sic oculus tan- tum de radio solari accipit quantum tunica 30 vnea s r d x, quæ orbiculo, r d s, correspo- det suo foramine s r, recipit. Tota camera g h, præter radium, a i K b, immissum, lucem nullam habet, sic oculi concame- ratio a u, obscura est. & sicut admissa, 35 lux altrinsecus in, g h, speciem, i K, obfu- scat, sic in oculum ingressæ aliæ luces, speciem, y z ad sensum hebetant, si sit species illa alterius rei quam Solis. quia per accidens est, quod Solis species ab 40 alia non elidatur, eo quod fortior non de- tur de facto, si vero daretur, utique e- tiam obliteraretur.

Igitur, vt dixi, in artificiosa specierum visibilium per vnicum vitrum conuexum 45 in locum obscurum intromissione, atque in obiecta charta representatione multo iucundissima, genuinam atque viuacis- simam oculi ideam videmus; & est spe- cierum visibilium per vnam lentem con- uexam immissio, nihil aliud quam oculi 50 in iisdem potentia visuæ præsentandis artificiosa imitatio. Nam tunicam cor- neam, n o p, refert totum tubi orificium a b f. Humorem aqueum, n t p d x s, om- nes 55 nes cavitates intra tunicam corneam,

Specierum
visibilium
artificiosa
per vnicum
conuexum
immissio.

&

Artis et Naturæ, Tubi et Oculi, in speciebus solaribus, præsentandis consensus. N.º 3.



I. Unius len-
tis conuexa
effectus, ad
oculum ap-
plicatur.
& humore crystallinū explentē exprimit
aër & d. s. f. omnia ad lentē, d. usq. occu-
pans. Tunicam vucam, n. s. p. imita-
tur orbiculus chartaceus, vel coriaceus,
& sic lux & rerum species per totam
corneam liberē sese infundunt super exte-
riorem vucæ superficiem, n. s. p. ita per
totam tubi capacitatem, a. b. f. affluunt

II. in anteriorem faciem annuli, & a. s. sed si-
cut vucæ deinde suo interuentu opaco,
oculum totum in anteriorem & postero-
rem, in illustrem & obscuratam partem
diuidit; ita lamella, & a. s. tubum in ex-
ternam & internam, in claram & tene-
bricosam portionem dispescit: foramen-
que, d. s. pupillæ, a. s. simile efficit.

I.

post quod in oculo humoris aquei interior pars humori crystallino, & in tubo aër lenti conuexæ, d, incumbit: quæ humorem crystallinum, u x, situ, figura, loco. & officio omnino æmulator. Vitreum deinde liquorem x s u, in tubo sufficit aër, h e m, & fundum oculi, n o p, vna cum tunica retina, n z y p, paries camerae obscuratæ, h g, & charta speciebus opposita, l k i m. & in his est maxima similitudo.

Iam sicut in naturali rerum oculo obiectarum perceptione plurimæ interueniunt varietates, ita accidit quoque in earundem transmissione artificiali in chartam. Nam,

Proprietates obtutus directi, & specierum immissionis similes.

Primò. Sicut oculus simul & semel immotus consistens, omnia ea, quæ ex directo secundum vel iuxta axem obuersantur, cæteris paribus, clarius, & distinctius intuetur, quàm ea quæ ad latera secedunt, ita species per lentem in chartam deductæ, distinctiores sunt quo axi viciniore, obtusiores quo remotiores ab eadem: etiam si distantia eadem ponantur. ratio à priori. quia vtrunque, tam in lente, d, quam in humore crystallino, u x, per axem & iuxta axem alapsæ species vel parum vel nil refractionis patiuntur: ideoque species exacte pinguntur. qualis autem est specierum in oculo pictura talis etiam sequitur visio clara claram, hebes hebetem.

Secundò. sicut oculus immotus & inuariatus consistens, obiecta inæqualiter à se dissita. inæquali visione percipit, alia clarè, & distinctè, alia obscurè & confusè; ita & lens conuexa immota consistens, in chartam immotam projicit rerum extrinsecus positarum species effectum planè diuerso, prout scilicet, vel vicinæ, vel remotæ fuerint. Nam si vicinissima clarè & distinctè fuerint præsentata, remotissima malignius apparebunt. idem omnino euenit in oculo obtutu vno. Contra si remotiora bene pingentur in charta, vicinissima peius habebunt; idem fit in oculo, aspectu vno. Ratio à priori in vtrisque: quia obiecta vicina projiciunt distinctam specierum basin, quæ visibilia ordinatè præsentat, à lente aut humore crystallino longius, remota autem breuius: igitur cum in tubo basin illam excipiat charta, in oculo fundus retinæ: impossibile est, vt simul

II.

& semel, vel charta vel Retina tunica excipiat vtramque basin. & viciniorem, & remotiorem; nam simul & semel non potest magis & minus distare à lente vel humore crystallino; sed vnam tantum habet distantiam. Vnde,

Tertiò. Sicut oculus solo motu circulari, conuersus ad obiecta lateralialia, eadem optimè discernit, prius hebetato aspectu percepta, & prius directè atque distinctè visa, nunc ex laterali obtutu ægrè admodum atque confuse assequitur: sic in specierum intromissione, si charta vna cum lente & axe circa centrum lentis giretur, vt obiecta lateralialia directæ, & quæ prius erant directæ fiant lateralialia; videbuntur hæc obtusè, illa acutè &c. Ratio à priori, ex nulla vel parua radiorum refractione sumitur.


Quartò. Sicut oculus ad obiecta longe dissita distinctè videnda, tunicæ retinæ ab humore crystallino distantiam, vel abbreviat, vel producit vt distinctè conspiciat obiecta proxima; ita si lenti immotæ admoueat charta, l m, pingentur in eadem distinctè obiecta remota, quæ antea non nisi confuse apparebant; vicissim si eadem charta à lente conuexa procul amoueat, cernentur proximè posita distinctè, quæ in distantia chartæ breuiore apparuerant confusa; vel certè lentes aliter formatæ erunt applicandæ.

Ratio explorata: quia obiecta remota suam speciem ordinant in basin communem minus distantem, vicina in eandem magis dissitam. igitur vt oculus dictæ obiecta bene percipiat, oportet vt tunica retina cum basi communi coincidat, vnde maior minoruè ipsius accessus & recessus exigitur; quemadmodum & chartæ maior minoruè admotio vel remotio à lente.

Quintò. Quòd si, dum oculus tunicam Retinam vel admouet vel remouet ab humore crystallino, vt dictum, idem humor simul ciliarium processuum à quibus pendet, astrictu, vel relaxatione attenuatur vel conglobatur; quod fieri in multorum oculis ego vix dubito: tunc idem crystallinus humor æquiualeat pluribus lentibus in tubo. nam globosior respondet lenti, quæ sit minoris sphaeræ segmentum: dilatator autem lenti maioris sphaeræ assimilatur; vtrunque enim paria

Crystallinus humor æquipollet aliquando multis lentibus.

Artis et Naturæ Tubi et Oculi, in speciebus solarib, præsentandis consensus. N.º 3.



I.

paria aut similia fient in pingendis speciebus. Humor rotundior breuiore distantias pro basi picturæ exiget, sic & lens globosior. Humor latior, maiores patietur baseos communis recessus, sic & lens rector. Et in hoc casu vnici humor crystallinus, æquiualeat multis lentibus.

Sexto. Sicut oculus idem obiectum, reliquis omnibus inuariatis, aliter videt in distantia alia atque alia; & in proportionata clarissime & distinctissime; in minus proportionata ægrè admodum & malignè; sic lens quælibet, habet vnā certam ab obiecto eodem distantiam, sub qua species ab eodem perfectissime in chartam traicit; sub alijs autem maioribus vel minoribus, hebetius easdem refert. Ratio efficax. Quia obiectum in distantia vicina basin communem remotiorem; in remota, viciniore format, tam in oculo, quam in lente conuexa: vnde datur tandem experientia teste, vbi nihil sensibile formetur; electæ sunt enim omnes species lentis refractione. Vnde,

Septimo. Sicut obiectum in distantia tādē aliqua remotissima ab oculo quocunque penitus non videtur, & in vicinissima non discernitur; sic in specierum per lentem intromissione, datur tandem aliquis tantus recessus, vt species in charta penitus euanescant, datur tantus accessus. vt nequeant discerni. Ratio à priori in vtrisque, quæ hætenus in reliquis etiam casibus data est, quia basis communis, in qua species bene ordinatæ repræsentantur, cadit extra retinam in oculo, extra chartam tubo vel lenti obrentam, & ab obiectis longinquis cis, à nimis vicinis trans eandem.

Presbyta & Miopes quæ li sint præditi humore crystallino.

Octauo. Qui sunt visu longo & presbyta vocantur, præditi sunt humore crystallino satis lato & lenticulari; eumque imitatur lens planior conuexa, spheræ maioris portio. Qui sunt visu breui, & Miopes dicuntur, adepti sunt humorem crystallinum globosorem, ex minorum sphaerarum segmentis compositum; eumque ad viuum imitantur, lentes conuexæ sphaerarum minorum portiones. Tametsi credibilius est, segmenta humoris crystallini sensim in figuras alias, quam sphaericas abire.

Atque ex hisce manifestum est, quam specierum per lentem conuexam intro-


II.

missio, graphicè in omnibus naturale oculi organum imitando exprimat; cuius ratio à priori vnica fere, & potissima est, specierum per humorem crystallinum, & lentem, similis & proportionata Refractio: hæc enim radios alioquin temere & gratis diffluxuros, frangendo in ordinem cogit, & ita in basin vnā disponit, vt obiecti picta imago venustissima resultet. de qua re pluribus egi in meo Oculo, quem consulas velim. in hoc sola difformitas aliqua reperitur, quod charta lenti prætensa, sit plana; tunica retina concava: si charta lenti homocentrice concava existeret, specierum intromissio, picturæ oculi similior esset, teste experientia: nam etiam hanc rem experiri voluit, (sicut innumera alia, pro suo singulari in res Mathematicas affectu) Serenissimus Archidux Austriae, Maximilianus, pietiss. memoriæ: qui in palatio suo Oenipontano, maximum globum, ad semidiametrum multorum pedum extruxit, in quem introgressi, admittebamur rerum externarum per lentem conuexam in parietem concavum species; quæ ob id ipsum longè ordinatius & ampliore spatio visebantur bene & distinctè compositæ, quam si in superficiem aliquam planam allapsæ essent. Vnde patet, quantā benignitate fabricator oculi Deus, naturæ eiusdem prouiderit, qui specierum picturam, non in planam, sed concavam tunicam, coordinari voluit, vt hac ratione, visui magis consuleretur. quanquam eiusdem quoque concauitatem non sphaericam, sed aptiore aliqua superficie curua præditam existimem.

Cæterum decussationem radiorum fieri antequam imago obiecti in Retina y z effigietur, non tantum in Oculo meo multis euidentissimis experimentis atque rationibus demonstraui, sed etiam in oculo humano hic Romæ anno Iubilæo apertissime vidi, vbi abrafa in fundo oculi sclerode, immissum candelæ per pupilam lumen radijs decussatis in tunicam Retinam accidit: id quod in multis brutorum oculis sæpius expertus eram. Facta est autem hæc Oculi Anatome à

in præsentia R. P. Nicolai Zucchi, in gratiam meam instituta. in qua duo alia, in dubium ab aliquibus vocari cepta, & vidi & alijs monstraui. alterum, Tunicam Corneam non esse

Artis et Naturæ, Tubi et Oculj, in speciebus solarib, præsentandis consensus. N.º 3.



I.

esse directum axi, sed ab hoc multum in
latus abire, eo prorsus modo, quo in meo
Oculo vtrumque docui.

A D M O N I T I O.

Antequam ad vltiorem huius sche-
matis & figurarum in eodem compre-
henfarum explicationem progredior,
admonendus es Lector, (id quod obiter
in priore capite etiam praestiti) radios &
lineas à Sole ad lentes & oculum, vel ex
his ad Solem non esse expressos ijs angu-
lis, quos refractionis ratio postularet,
sed directo plerumque incesu, quod ideo
feci, quia hic refractionis ex professo ra-
tionem non tracto, & multitudo angu-
lorum magnam confusionem peperisset,
satisque pro meo instituto fuerit, vlti-
mum refractionis conum aliquantulum
dumbrare, reliqua verbis sufficientibus
explanare. Nam cetera ad refractionem
pertinentia, in Oculo & refractionibus
caelestibus abundè explicavi.

VT TVBVS OCVLVM, SIC
Oculus in multis arte sequitur
tubum,

CAP. XXIV.

IN prima figura vidisti, quomodo
Tubus accommodanda lente con-
uexa in speciebus visibilibus sisten-
dis imitaretur Oculum, ars nimirum na-
turam; nunc in sequentibus videbis, qua
ratione Natura in auxilium adsciscat ar-
tem, Oculusque sequatur tubum.

FIGVRA II. B. 1. & B. 2.

In hac enim figura secunda B, 1. & B,
2. id est, B, primo, & B, secundo signa-
ta, habes expressam imaginem tubi in-
uersi, solius, sine oculi ad ipsum accessu,
prout species acceptas solus reddit; in
quo ad lentem conuexam d, accedit lens
caua v , cuius beneficio per refractionem
conus à v c b, fit longior, ideoque ba-
sis i K in qua pictura distincta formatur,
magis à lente d, propius ad chartam
l m protruditur: & quia angulus ad in-
tersectionem, c, acuitur & basis, i K, con-
trahitur, fit imago minor. Eadem om-
nino in representandis speciebus accidunt


II.

1 in oculo, s, ad B, 2, id est B, secundum
expresso, vbi ad naturam in auxilium
acceritur ars. quod inscriptio, *Natura
cum Arte*, declarat. id enim quod ars
5 sola, tubo inuerso praestat, hoc facit na-
tura in oculo si assumatur extrinsecus spe-
cillum cauum $\circ$. Quo vtuntur soli ij,
qui Miopes dicuntur, & visu breui pol-
lent. Cum enim ipsi gestent humorem
10 crystallinum è parua sphaera segmentis
conglobatum, quarum natura est, radios
acceptos refractione intra breue spatium
cogere, inde fit, vt imaginem distinctam
quidem & accuratissimam semper pin-
15 gant, sed quæ formale visus sensorium,
tunicam videlicet Retinam saepissime
non assequatur, sed intra humorem vi-
treum absoluitur; quo fit, vt oculus o-
biectam rem, vel omnino non, vel valde
20 confuse percipiat, quia basis seu sectio
coni radiosi communis, in qua species in
picturam distinctam concurrunt, vel om-
nino tunicam Retinam, non attingit, vel
iam confusis inter sese radijs assequitur.
25 Oculus autem nil sentit, nisi quod à spe-
ciebus visibilibus offertur, & eo modo
prout offertur. si clarè, clara; si distincte,
distincta; si confuse offeruntur, confusa
videt. In Miopibus igitur, cum obiecta
30 remota, per se radios citius in basin com-
munem colligant, quàm vicina; fit, vt
eiusmodi homines, proximè posita ordi-
nariè optimè videant, remota admodum
caliginosè: quia illa species suas in basin
35 longinquorem configurant, hæc in vici-
niorem; & sic illa tunicam Retinam as-
sequitur, hæc in vitreo suffocatur. Quia
igitur lens caua hanc proprietatem ha-
bet, vt radios refractione dilatet, & per
40 hoc vna cum lente conuexa species ver-
sus Retinam producat; accidit vt Miopes
ascito tali specillo iuuentur quidem egre-
giè ad remota bene videnda, sed tamen
sub magnitudine apparenti minore; & hoc
quidem quia anguli ad decussationem
45 minores efficiuntur; illud autem quia
basis communis ad retinam vsque ex hu-
more vitreo protrudito. Similia accidunt,
in lente conuexa d; hæc enim humoris
crystallini loco est; quæ si distincto spe-
50 cierum simulachro, chartam oppositam
non assequitur, quod nimium distet à
lente, assequetur praefixa inter lentem,
& obiectum lente aliqua caua. Vbi se-
55 quentes accipe regulas.

*Quare Mio-
pes vtantur
specillis ca-
uis?*

*Tubi inuer-
si, & oculi
lente caua-
rentis, si-
militudo.*

Artis et Naturæ Tubi et Oculj, in speciebus solarib9 præsentandis consensus. N.º 3.



I.

*De Tubo in-
uerso, Regu-
la practica.*

Prima. Non omnis lens caua seruit omni lenti conuexae, sed requiritur aliqua inter illas sphaericitatu in ordine ad radios refractos, quoru beneficio imagines eleganter depinguntur, proportio. quemadmodum etiam in oculo, non quodlibet specillum cauum, aptum est cuilibet humori crystallino; sed alijs omnino aduersantur omnia caua; alijs aptantur magis, alijs minus acuta. Quamquam hoc ferè ex accidenti eueniat. Nam si tunica Retina posset antrorsus aut introrsus pro libito collocari; fortassis ad vitrum quoduis accommodaretur oculus quiuis: dixi fortassis, quia sensus & experientia in tubo videtur reclamare. cuius rationes modo non expendo, pertinet enim hoc proprie ad refractionum, vel tubi optici tractationem.

Secunda. Vitrum cauum lenti conuexae proportionatum, si applicetur debite versus obiectum, reddet picturam Solis sensibiliter minorem, & exiget distantiam chartae à lente conuexa maiorem, quam fuerat per solam lentem conuexam. Idem fit oculo, lente caua instructo.

Tertia. Si eadem lens caua proportionata, mota fuerit à conuexa versus Solem, Sol semper apparebit minor minorque in charta, quo magis magisque abierit lens caua. Idem facit specillum cauum ad oculum.

Quarta. Seruata eadem inter conuexam lentem & obiectum distantia, si interponantur successive ad idem intervallum duae lentes cauae, quarum una sit acutior siue minoris sphaerae, altera obtusior siue maioris sphaerae secundum superficiem cauam portio; acutior minorem ostendet Solem sed chartam amplius protrudet, obtusior maiorem, sub breviori chartae distantia; idem fieret in oculo Miopis, si polleret tunica Retina versatili, imo de facto accidit id non paucis, qui tractabili humorum & tunicarum temperie sunt à natura, vel consuetudine donari.

COROLLARIUM.

Ex his licet concludere, oculum lente caua vtentem, nil aliud esse, quam Tubum inuersum, ex arte & natura com-

II.

positum; Tubum autem inuersum, esse oculum artificiosum.

VLTERIOR OCULI CVM

*Tubo artificioso comparatio, ex
usu specilli conuexi.*

CAP. XXV.

Comparavi Cap. 23. Oculum nudum, cum una sola lente conuexa tubo inclusa, & similes vtriusque in speciebus praesentandis effectus ostendi: simile quid praestiti Cap. XXIV. de Tubo inuerso, & Oculo lente caua armato: nunc haud absimile melior, de Oculo lente conuexa gaudente, & Tubo è duobus conuexis vitris compacto.

Figura tertia, C. 1. & C. 2.

In hac figura tertia represento in tubo duas lentes conuexas; in oculo humorem crystallinum cum una lente conuexa, & vtriusque effectus similes ostendo vbi nota tres dari positione casus, lentis conuexae, ad lentem conuexam.

Primus Est, quando lens conuexa, ante lentem, d, ita vicinè collocatur, ut radiorum ex ipsa, refractorum concursus seu intersectio, siue basis picturae communis, non fiat ante, vel intra, sed post lentem, d.

Secundus, Quando idem concursus lentis, incurrat in ipsam lentem, d, seu humorem crystallinum.

Tertius, Quando cis lentem, d, inter utramque concursus iste lentis, accidit.

Primum & secundum casum hic in pictura non expressi, quia per se cuius facillime est obuius, uti ex ijs quae dicam, planum fiet. nam vtriusque nihilominus proprietates & inter oculum atq; Tubum consonantias explicabo. Tertium adduxi, quia plus difficultatis & nouitatis, addo etiam utilitatis habet.

*Lentis conuexae ad conuexam primus
positione casus.*

Primus ergo casus, ut dixi, nullam in experimentando vel artem vel difficultatem habet quam ut lentem aliquam

*Lentis con-
uexae ad con-
uexam tres
sunt casus.*

*Casus pri-
mus.*

I.

quam, & ita colloques ante lentem, d, vt intersectio radiorum primum fiat post lentem, d, non ante, nec in ipsa. hoc autem semper fit, si lentem lenti proximè coniungas (excipio sphaerularum minutarum segmenta, in quibus concursus breuissimi fiunt, sed hæc ad hunc usum non sunt) vbicunque igitur intra casus huius latitudinem, quæ in lentibus planioribus, magna esse solet, lentem, & debito situ locaueris, semper formosæ radiorum picturæ distantiam corripies; sed imaginem ampliorem efficiēs. idem omnino in oculo adhibito specillo conuexo, fieri vel hinc euincitur.

Primus casus.

Quia si res vicina (vt in presbytis contingit) vel maligne vel omnino non spectetur, adhibito specillo conuexo & maior & clarior & distinctior videbitur. Experientia clara & omnibus obuia & ad iuuandos presbytas vtilissimè adinuenta. qui cum habeant humorem crystallinum valde latū, & ex maioris sphaeræ segmentis compactum; fit vt obiecta præsertim vicina speciem seu picturam visibilem vltra formale visus instrumentum, quod est tunica Retina, transmittant; & sic videndi potentiam eludant: quam tamen voti compotem efficit suo aduentu lens conuexa, hæc enim speciem illam liberius exspaciantem reuocat; atque intra præscriptos limites coercet: id quod in tubo similiter euenit. de qua re accipe sequentes Regulas practicas.

De lentibus duabus conuexis, Regula practica.

Prima. Lens eadem conuexa lenti priori vicinissima, & quasi contigua, præbet picturam in charta debite obtenta, maiorem, & distinctiorem, quam sit illa, quæ ab vna tantum lente in eadem chartam sub hac distantia projicitur; & omnium ampliatarum minimam, sed clarissimam, & distinctissimam, & quo magis à lente versus obiectum accedit refert immota charta picturam semper quidem maiorem, sed sensim confusorem atque obscuriorem; maximam vero ac malignissimam, quando in vltima Casus primi capacitate atque distantia consistit. Idem fit, applicato ad oculum proximè conuexo speciliari. Nam teste experientia, obiectum vicinum male visum solo oculo, optimè percipitur adhibito specillo conuexo, visui proportionata, & sub maio-

Lentes duæ conuexæ idē faciunt, quod oculus cum vna.

II.

re quantitate, quam antea. quod si specillum sensim ab oculo versus obiectum moueas, crescet visibilis quantitas apparens, sed in videndo limpiditas deficiet, donec ad punctum euerfionis proximè accedas. Ratio à priori, in ambo-
bus est hæc; quod communis picturæ ordinatæ basis, seu quod idem est, pictura vel species ordinata, antequam lens ad tubum, vel speculare conuexum ad oculum adaptatur, hic trans Retinam, illic trans chartam excurrit, adeoque vtriusque picturæ sedes, quæ in tubo charta, in oculo fundus tunicæ Retinæ existit, pingenti humori crystallino, seu lenti conuexæ nimis vicina adiacet. Vnde extrinsecus adiecta lēs vtriusque proportionata, imaginem in chartam, & Retinam retrahit primum; & abscellū versus obiectum in anteriora auocat, augendo quidem ideam, sed interim quoque confundendo.

Secunda. Lentes conuexæ, maiorum & minorum sphaerarum segmenta, vt in charta bene pingant ad lentem tubi aptatæ, vel diuersas distantias requirunt chartæ à lente, & minor quidem minorem, maior maiorem, id quod in oculo vt plurimum fieri non potest, quia tunica Retina tam trusatilis vel conuolubilis non est; vel positiones diuersas ante lentem, immota post lentem charta, id quod fieri solet in oculo. nam a motione ab eodem, multæ lentes quadrant, quæ alias ineptæ fuissent. Imo vix est lens conuexa, quæ hoc remedio, non possit aliquo modo aptari Oculo; nam si sunt maiorum sphaerarum portiones, facile ad visum accommodantur, vt experienti planum erit; si sunt minorum, oportet obiectum ad lentem prope attrinere; & sic tandem etiam à Miopo dignoscetur.

COROLLARIUM I.

Ex his concludo, Oculum lente conuexa præmunitum, esse Tubum partim naturalem partim artificiosum, & lentibus duabus conuexis adornatum, humore videlicet crystallino & conuexo specillo: Tubum vero, duabus conuexis lentibus instructum, esse velut Oculum merè artificialem, inanimatum.

COROLLARIUM I.

Hinc ratio datur, cur specilla conuexa, ad obiecta remotissima raro seruiant; quia horum species ordinatae trans tunicam Retinam rarissime excurrunt, atque ideo non indigent reuocatione, quae per sola conuexa vitra contingit.

EXPLICATVR CASVS II.

Casus secundus.

Casus secundus, Quando altera in tubo lens ita interponitur, vt in charta nullum obiectum sed mera lux per vitrum ingressa compareat: aut specillum conuexum ab oculo tanta distantia abscedit, vt ex viso antea obiecto, praeter lucem oculus hauriat nihil. Hoc tum accidit, quando tam in lente chartae vicina, quam humore oculi crySTALLINO, species ab altera lente efformata, basin suam communem, seu ordinatam picturam collocat: seu quod idem est, quando confusionis punctum in chartam & tunicam retiformem peruenit.

Itaque in hoc quoque casu tam oculi quam Tubi summa conuenientia spectatur: neque huius casus varietas aut remedium est vllum. Nam in eo lens interiecta seu specillum communem suam basin expandit in humorem crySTALLINUM, atque lentem praecedentem, ibique picturam ordinatissimam, atq. perfectissimam depingit; quam lens praecedens, seu humor crySTALLINUS rursus a se dimissam refractione confundit, vel diuidendo & spargendo vnumquodq. punctum totius visibilis & ordinatae picturae in totam basin communem; vel congregando totam imaginem ordinatam, in quoduis baseos communis sensibile punctum: idem enim fit confusionis chaos, siue vnumquodque visibilis & ordinatae speciei punctum dispergatur in totam communem basin, siue tota species & Imago ordinata, in singula communis baseos puncta transfundatur; semper enim pars quaelibet coincidit cum qualibet; & pars quaelibet dilatabitur in totum, & totum colligetur in partem vnamquamq. quae res quia certissima est, & incredibilis tamen fortassis apparet, accipe schema & demonstrationem sequentem.

Baseos confusa generatio.

1 BASEON COMMVNIVM TAM
confusarum quam ordinarum, a pluribus lentibus conuexis caussatarum, generatio, natura, effectusque, nec non collatio ad oculum, & omnimoda utrimque similitudo demonstratur.

CAP. XXVI

10 Q Vandoquidem res haec per se intricata & obscura, neque diagrammate vilo in schematismo haecenus explicato, expressa est; oportet eam hic singulariter enucleare; quia non tantum toti Opticae & Operi huic aliquam lucem afferet, sed ad 15 tubum de meris lentibus conuexis adornandum, & penitus intelligendum, ad species erigendas, ad Microscopia, & multa alia Thaumatoscopia fabricanda est id multo maxime necessarium, 20 vbi tamen aduerte, me in ipsa lentium, crassitie lineas, refractionum non exprimere, sed supponere factas; confusio enim in tantillo, tantas minutias non patitur.

30 Igitur sit obiectum visibile, a b c; quia ergo quodlibet illius punctum, ex se emittit sphaeram radiosam, si in exemplum assumantur tria puncta spectabilia, a, b, & c, non est dubium, 35 ex a, casuros radios infinitos in totam lentis, d e f, superficiem conuexam, qui sint, exempli causa, a d, a e, a f, & omnes possibiles intermedij, & sic vnicum punctum, a, effusum est in totam, d e f, superficiem globosam.

40 Eodem modo punctum visibile, b, radio suo penicillo, b d e f b, occupat eandem totam superficiem, d e f.

Simili ratione punctum, c, mittit 45 conum radiosum, c d e f c, in eandemmet superficiem; & quia radiationes istae non sunt figmenta phantastica, sed verissimae, & naturales specierum visibilium ex obiecto effusiones seu emanationes; hinc verissimum est, visibilis punctum quoduis esse cum quouis alio in superficie eadem, d e f, & cum omnibus simul: & omnia rursus atq. singula, 50 collecta cum quouis, quae res absq. dubio simulachrorum visibilium confusione

Confusionis generatio.

nem

Figura

1
a b c

tres ad

2



a b c

casum

3

a b c

secūdy.



Lentium Convexarum tam inter
se, quam cum Oculo comparationes,
proprietas, et effectuum in repræ-
sentando similitudines.

I.

*Prima confu-
sionis sta-
tio.*

nem summam parit: & hinc istam ego omnigenam colluuiem voco primam confusionis stationem; propterea quod omnium prima sit siue ab obiecto procedat & efficiatur: sicut in ipso obiecto est omnium prima & ordinatissima statio earundem.

*Totum obiectum visibile est in tota confu-
sionis superficie, & parte quavis.*

Eodem modo, quia totum obiectum, a b c, mittit conum vel pyramidem radiosam in punctum quoduis superficiei conuexae, d e f, cuius coni seu pyramidis basis sit visa obiecti superficies, a b c, vertex autem punctum quodlibet vel, d, vel, e, vel, f, superficiei eiusdem: hinc rursus necesse est, totum obiectum, a b c, conuenire in vnum punctum, d, per radios, a d, b d, c d, & omnes intermedios, coni radiofi, a d c b a. Neque aliter idem totum obiectum affluet in vnicum punctum, e, radijs, a e, b e, c e, coni radiofi, a e c b a. pari ratione in punctum colligetur idem obiectum, a b c, beneficio radiofi coni, a f c b a: & sic totum obiectum affluet in totam superficiem, d e f, & in singulas eiusdem partes possibiles, eritque totum in toto, & totum in parte qualibet, cum summa, vt ante dictum, rerum & specierum visibilium confusione; in qua & radorum, & conorum interfectio incipit fieri; non tamen in directum sed obliquum: quia cum plerique radijs in superficiem, d e f, oblique incidant, iidem ob mediorem diuersitatem refracti ab itinere directo, nonnihil alio diuerunt. cum igitur lens conuexa, d e f g h i, sit densior aere vtriusque circumstante, radij ex, a b c, allapsi, refringuntur ad perpendicularem in eandem; ex eadem vero progressuri discedent a perpendiculari, (id quod modo non tracto, sed ex certissima atq. euidentissima Opticorum doctrina & scientia suppono, vberiusque in Fundamento optico seu Oculo explanauit) atq. idcirco, a d, ex, d, perueniet in, i, (apud, i, sunt diuersa puncta, sed propter paruū discrimē coniuncta repraesentantur.) & hinc in, K, appellet, punctū superficiei conuexae, k l m, lentis, K n. sic radius, a e, per, h, tendet refractione in idem, K, neq. aliam stationem eliget radius, a f, qui per, g, refringetur itidem in, K; Sic radij, b d, & b f, per i, & g, refracti, coibunt in, l. Pariter omnes radij puncti, c, c d, c e, c f, per, i, h, & g, refractione coadunabuntur in vnicū punctum, m. Et sic omnia radiofa singu-

II.

lorum punctorum visibilium penicilla, quae fuerant in lente, d g, confusa, & per totam dissipata, eiusdem refringentis beneficio, perfectissime iterum, situ tamen euerso ordinantur, venustissimaq. specie disponuntur, quam pictor chartae inuideri possit, imprimere ad viuum non possit. Punctum autem, a, peruenit cum omnibus suis radijs in, K: punctum, b, collectū est in, l: & punctum, c, coiuit in, m. Sicut autem haec tria puncta post confusionem atq. intersectionem primam quae circa lentem, f i, contigit, in partes contrarias summo ordine atq. elegantia disposita fuerunt, ita de singulis atq. omnibus alijs intermedijs inter, a, & b, inter, b, & c, omnino est ratiocinandum.

Istam vero superficiem, seu metam siue terminum, in quem istorum singulorum punctorum coordinatio excurrit, atq. in formosissimam imaginem confidet, voco ego omnium totius obiecti radioforum conorum sectionem seu basin communem ordinatam, quia in eam omnes totius obiecti coni radiofi sese expandunt, atque aequaliter (ad sensum saltem) dilatant, ante vero & post ipsam sese intersecant.

In qua re hoc reperitur inter totius obiecti conos radiofos, & singulorum punctorum penicilla radiancia discrimen, quod semper contrarijs vijs & effectibus procedunt. Nam vbi se tota basis, a b c, per singulos conos, a d c, a e c, a f c, vnit in singula puncta, d, e, atq. f, ibi sese in totam superficiem diffundunt singula puncta baseos, a, b, & c, & hinc specierum chaos exoritur. Contra quando sese singulae penicillorum radioforum bases, d e f, rursus intersectione facta vniunt in singula puncta, K, l, & m, tunc coni radiofi baseos, a b c, ex suis verticibus, d, e, atq. f, decussatim sese dilatant singuli in suos conos radiofos, ad vnam communem basin, K l m, castra metantes: & hinc bonus iterum ordo atq. distinctus singulorum situs & locus exurgit: quia tota basis, K l m, toti visibili, a b c, & singula baseos puncta, K, l, m, singulis obiecti punctis, a, b, c, tantum respondent. Punctum enim, a, ex, a, dispersit suum penicillum per totam lentem, d g, sed hinc tanquam ex basi confusionis comuni, refractionis beneficio collectū est cono, d e f k, in vnicū verticem seu punctū, k. Sic, b, ex eodem, d e f, in, l, sic c, in, m: adeoque quilibet suū & competentem sibi

Basis communis ordinata generatio.

Basis communis ordinata, Quae?

Discrimen inter conum radiosum vnius puncti, & conum radiosum totius obiecti.

I.

sibi locum occupat, absque consortio & commixtione alterius: ideoq. & tota basis, $a b c$, toti basi communi seu superficiei representatiuæ, $K l m$, respondet, sitibus tamen inuersis, propter sectionem conorum in communibus verticibus, $d e$, & f . E quibus quia coni euerfi in vnicam communem basin, $K l m$, dilatantur, necesse est vt sicut ex vna basi, $a b c$, omnia in vnum apicem, d , coegerunt ita ab eodem diducendo in suos digerant ordines atque stationes.

Præterea vbi singulorum punctorum penicilla radiosa suas constituunt bases, nimirum in superficie, $d e f$, illic baseos, $a b c$, coni radiosi, $a c d$, $a c e$, $a c f$, suos collocant vertices: & vice versa, quando euerfi coni, $i K m$, $h K m$, $g K m$, ex base, $a b c$, suas bases simul collocant in superficie seu sectione, $K l m$, ibidem punctorum radiosorum penicilla suos terminant apices, K, l , atq. m . Atque hanc superficiem, seu transuersam ad rectos axi angulos sectionem, basin communem ordinatæ picturæ statuimus atq. nominamus, ob dictas rationes: quæ quidem basis ex lente refractoria, $d e f g h i$, suos præstitutos terminos habet fixos & immutabiles, quamdiu obiectum, $a b c$, eadem magnitudine & distantia ex aduerso obstitit situ firmo; quorum vel vnus immutatione, etiam baseos illius limites situsq. variari certum est, (licet hoc in lentibus maiorum sphaerarum ad sensum non ita cito aduertatur,) propter variatam radiorum ab obiecto visibili incidentiam, quæ variabilis etiam refractionis occasionem subministrat, ex quia deinde alia atq. alia radiorum atque conorum conuergentia vel diuergentia, baseosque communis mutata statio, aucta vel immutata area, atque simulachri visibilis imago enascitur. In cuius sedem semel stabilitam, $K l m$, si intromittatur mundissima charta, vel simile quid, efferet sese, tanquam in solio proprio illic species illa venustissima atq. oculis amatorum suorum spectandam præberet, & quanquam filia lucis ipsa sit, tamen alienam odit, propria solum multo illustrissima euadit. & hæc de speciei intromissione atque in opposita charta formosissima effigiatione secundum situm euersum per vnicam lentem satis dicta & demonstrata sunt, occasionaliter. Nunc ad

II.

Rhombum.

Quando in locum Imaginis ordinatæ, $K l m$, coincidit lens aliqua conuexa, $K n$, seu quod idem est, quando lens, $d g$, suo à lente, $K n$, discessu, & ad obiectum, $a b c$, accessu, picturæ ordinatæ simulachrum in superficiem, $K l m$, lentis, $K n$, deduxerit, tunc in charta, $q r$, post lentem, $K n$, obuersa, nulla penitus species expressa visitur: sed merissima lucis cuiusdam non limpida, sed turbulentæ & tristioris imago. Ratio à priori. Quia recte collocatæ & bene ordinatæ speciei imago residet in superficie, $K l m$, illuc translata lentis, $f i$, interiectu & recessu. iam lens, $K n$, quia perspicua est, hospitium stabile ideæ ordinatæ non præbet, sed eandem ulterius translegat; quia verò ipsa densior conuexa superficie amicitur, speciem & radios eiusdem sub quibus defertur, refractione ita attemperat, vt in chartam, $q r$, eadem confusione accidant, sicut ab obiecto, $a b c$, in lentem, $d e f$. nam quodlibet punctum, K, l, m , exsinuatur iterum in integrum penicillum, cuius basis quidem sit area, $f t u$, in chartam, $q r$, explicata, vertex autem punctum vel, p , vel, o , vel, n , &c. post factam in lente radiorum sectionem. Sicut autem singula puncta, intersectione & refractione explicata, in vnam communem superficiem seu basin, $f t u$, diffiunt; ita vicissim tota pictura ordinatæ, $K l m$, in singulorum conorum radiosorum vertices, f, t , & u , confluit, tota ergo species, $K l m$, in tota basi opposita, $f t u$, & tota in quolibet eiusdem puncto residet; contra quodlibet speciei punctum, vel, K , vel, l , vel, m , in quolibet puncto eiusdem baseos, atq. in tota basi inhæret. & hæc est secundæ, atque perfectæ confusionis altera sedes, atque imago; & per omnia respondet confusioni, $d e f$. Et eodem modo se habet in representando, $K l m$, ad, $f t u$, quo, $a b c$, ad, $d e f$, & rursus, $d e f$, ad, $K l m$, sicut se habet, $f t u$, alia lens loco chartæ, ad, $x y z$, aliam chartam, & sedem picturæ ordinatæ, in qua species conuersas, & erectas aspicias.

In hoc secundo duarum lentium casu, confusio semper manet, & chartæ, $q r$, secundum accessum & recessum variatio nil facit; non discedendo,

L 3 quia

Vnde & quomodo pictura confusa seu charta imaginis in charta oriatur

Sedes confusionis secundæ.

I.

quia radiorum perseverans sectio & di-
varicatio, omnem speciei vigorem iam
ante attenuatum penitus dissipat: non
accedendo, quia intersectio eorum ad
lentem usque, n o p, durat; & licet in
vicinia ipsius aliquid appareat, tamen
id ipsum debile & nebulosum existit,
atque praesenti intentioni non satisfacit.

Quae de lentibus haecenus artificiose
in tubo ad sedes confusionis & distinctio-
nis compositis dixi, valent etiam omnia
in oculo, prout est cernere in figura 2.
in qua locum lentis, K n, in tubo posita,
occupat in oculo humor crystallinus m
p, totamque picturam ordinatam à se
haustam, transmittit in tunicæ Retinae
fundum, s t u, ibique nil nisi meram lu-
cem refert. in tertia vero figura, ubi hu-
mor crystallinus stationem confusam,
q s t u r, occupat, eandem speciem in or-
dinem redigit, ideoque imaginem pere-
legantem, x y z, in fundo Retinae, q x r,
efformat.

COROLLARIA.

Primum. Ex his manifestum est pri-
mò lucis diffusionem & propagationem
esse fluxum rectilineum, alioquin tam
præcisa, munda, ordinata & distincta spe-
cierum coordinatio per radios refractos
non fieret. Secundo, Lucem minorem
maiori superadditam in eandem subiecti
partem, splendoris intentionem augere.
Tertio, Lucem luci superadditam phy-
sicè non misceri, etiamsi eandem subie-
cti partem occupet vtraque.

Secundum. Eadem manifesta sunt de
speciebus colorum. Similia enim agunt
& patiuntur, mutuis intersectionum
consortijs.

Tertium. manifestum est, actum viden-
di non esse idem, quod speciei visibilis
praesentatio. nã quâdocunq. species euer-
so situ pingitur; visio recta elicitur; quan-
do pictura erecta cõsurgit, visio fit eversa.

Quartum. Visio sequitur picturam,
clara olaram, distincta distinctam, con-
fusa confusam.

Quintum. Evidens est, ex his humo-
rem crystallinum non esse formale visus
organum, sed solam tunicam retinam.

Quia quando pictura distincta humo-
ri crystallino inhæret, nulla fit visio, vl-
lius obiecti discreta, cum deberet tum

II.

1 maximè fieri, quod species visibilis or-
dinata illi infideat.

Sextum. Eodem modo nulla oculi pars
post tunicam Retinam est formale visus
organum; quia quando pictura trans illam
versus celebrum exporrigitur, tum ex o-
bieto visibili nil percipitur. Contra quan-
do imago speciei ordinata tunicam Reti-
nam occupat, visio perfectissima efficitur
10 quâdo tota extra eandem versatur, nulla fit
visio; quâdo demum medio sese modo ha-
bet, visio imperfecta & confusa cõsurgit.

DE CASU TERTIO, QUANDO
15 lentis, v l, concursus seu basis com-
munis ante lentem, d, absoluitur.

CAP. XXVII.

20 **H**ic casus expressus est, in sche-
mate communi, modis septem
distincto, propterea hic figu-
ram specialem ipsius non adduco. Proin-
de effigiem, C 1. duarum lentium, d, &
25 v l, & C 2. Oculi, u x, nec non lentis,
o n, præfixæ, dum hæc explico, consi-
derabis.

Casus ergo tertius est, quando ante
lentem, d, lens v l, ita collocatur, vt in-
tersectio, l, seu communis basis distin-
ctionis quam facit lens, v l, ante lentem
d, terminetur; tunc enim hæc idest lens,
d, incipit subintrare conos confusos, à
lente, v l, interposita proiectos. quia basis
communis picturæ ordinatæ, tametsi ad
sensum latitudinem aliquantulam habeat
eaq. valde differens sit, propter sectionem
radiorum, & conorum inter sese vel ma-
gis vel minus obliquam, (quia quo sectio
40 illa obliquior, hoc bases communis ad
sensum statio est rursus & prorsus lon-
gior; quo decussatio rectior, hoc brevio-
ris intervalli & moræ statio inuenitur)
vniuersim tamen, qualescumq. tandem
45 lentes convexæ existant intervalla lon-
go non continetur: hinc fit vt lens, v l,
interiecta, atq. versus obiectum promota
picturam ordinatam lenti primæ cito eri-
piat, inq. locum speciei distinctæ, offerat
50 imaginem radijs & conis sese passim in-
tercurfantibus confusam: ex quo ipsa lens
d, eandem incipit quamprimum ordina-
tam in chartam debitè oppositam depin-
gere. de qua re accipe regulas sequentes
55 certissimas.

Regu-

I.

REGVLAE PRACTICAE.

Prima. Omnis lens conuexa à speciebus visibilibus quibuscunque confusis & perturbatis infessa, easdem in chartam debitè oppositam ordinat atque distinctè præsentat; siue species illæ sint acceptæ immediatè ab ipso obiecto visibili, siue ab alia, alijsuè lentibus conuexis inter obiectum & dictam lentem interceptis.

Ratio à priori, & data & demonstrata in prioribus, ex radiorum & conorum radiorum ordinatione, beneficio refractionis.

Secunda. Omnis lens conuexa à speciebus visibilibus quibuscunque tandem ordinatis atque distinctis infessa, easdem in chartam oppositam confusas atque sine ordine traiecit, siue species illæ sint ab obiectis immediatis, siue ab alijs lentibus allapsæ. Ratio horum à priorore in prioribus est data. Quia specierum ordinatarum singula puncta sese expandunt in totam confusionis basin chartæ congruam.

Tertia. Quamprimum lens interposita, sedem totam distinctionis versus obiectum à lente, d, extraxerit, lens d statim imaginem intra se acceptam, apud chartam ordinato, distincto & conuerso situ refert.

Quarta. Quo magis lens, sedem distincti & euersti situs à lente, d, versus obiectum abripit, hoc pingit lens d imaginem syncenorem, & minorem, sub distantia chartæ breuiori. seu, quod eodem, recidit, facit conorum breuiorum basin communem semper minorem picturam vero puriorem & fortiolem. Ratio à priorore. Quia cum lens d, sedi distinctionis adhuc vicina existit, minor conorum & radiorum confusio accidit, & sic imago ex eadem minus purgata, nascitur. nam confusissimus radiorum in conuexam lentem d, affluxus, parit imaginem ordinatissimam, ordinatissimus, confusissimam; minus ergo ordinatus, minus distinctam dabit. Maior autem hic & remotior pingitur species, quia obiectum, quod est imago lentis interpositæ, &c. est vicinius, & radijs agit lateralibus. Discessu vitri, obiectum in eodem elongatur, & confusio ampliatur, plurimi radij ad latera in auram abeunt, sicque minori distantia, purior & minor imago

II.

nascitur: quia minus de lente conuexa occupatur.

Dictorum applicatio ad oculum, specillo conuexo post situm euersum vtentem.

Quomodo se habeat humor oculi crystallinus ad specillum seu lentem conuexam in statu erecto, in situ confuso, dictum est paullo ante in prioribus; nunc eundem consideremus in statione euersti situs ad lentem conuexam; & experiemur eadem quæ modo de lentibus inanimatis asseruimus, simili ratione euenire in Oculo. Nam quamprimum oculi lentis alicuius conuexæ statum confusum exceßerit, statim incipiet obiectum, euersto tamen situ, magnum quidem, sed adhuc informe satis intueri; sensim vero, lentis ab oculo, vel huius à lente abitione, minuetur, sed vehementer mundabitur & discernetur res ab oculo per lentem situ euersto conspecta. Euidens igitur est, eandem in tunica retina fuisse repræsentatam, talem qualis cernebatur situ conuerso: nam speciei in oculo præsentatio differt ab ipsa visione, & semper sitibus contrarijs perficitur. Itaque similitudo oculi cum tubo non consistit in visione, sed in specierum visibilium receptione: sicut enim species visibiles per lentes duas conuexas in chartam, ita per lentem vnā conuexam & humorem crystallinum pinguntur in tunicam retinam: actus autem videndi superueniens, non est ista pictura, sed est picturæ vitalis & animata comprehensio. In præsentatione igitur specierum visibilium, cæteris paribus aut similibus, comparatio & paritas consistit.

Oculi lente conuexa situ euersto vtentis, cum lētibz duabus cōuexis, germana similitudo.

COROLLARIUM I.

Ex hisce facile, ingeniosus Lector, construet sibi tubum pro speciebus in charta erigendis. Sunt enim duo vitra conuexa prædicto modo disposita.

COROLLARIUM II.

Colligitur Oculum vno conuexo, dicta ratione vtentem, esse tubum ex arte & natura conflatum; tubum vero lentibus

I.

tibus duabus constantem, dici posse, oculum mere artificiosum.

COROLLARIUM III.

Etiam pro Microscopio aliquid hinc peti potest.

FIGURA QUARTA D. 1. D. 2. 10
explicatur, & occasione illius, vis ex natura lentis cauae, eiusque cum lente conuexa coniuncta effectus & proprietates ostenduntur, adeoque Tubus Opticus communis demonstratur.

CAP. XXVIII.

Figura 4. D. 1. & D. 2.


In D. 1. representatur lens conuexa, d, lens caua *u* 1, & conuexa *v* 2. est eadem constitutio, quam habet oculus per Helioscopium in Solem, vel Telioscopium in visibile aliud. Vtrobique idem fit radiorum, & conorum radiosorum situs, utrobique praesentatio speciei eadem. Nam in D. 1. radij per *v* 1, & *u* 1, deferuntur toti adhuc confusi, & neque dum plenè decussati in lentem, d, & ob hanc causam lens, d, confusionis sedem ingressa, eosdem ordinat & situ euerso distinguit in, iK, forma maiore, quam alioqui contingeret. Sic oculus in schemate D. 2. picturam, y z, euerso situ recipit, sed obiectum Solem

II.

q r, recto percipit. Caterum, licet oculus admotus tubo vehementer iuuetur, teste toto mundo, tamen Telioscopium ipsum per se nude spectatum, praepositione lentis, d, ante lentem cauam *u* non adiumentum sed impedimentum accipere videtur. Quia si solus tubus, ef, in Figura 6. F, 1. Soli, a b, obuertatur, Sol maior est illustrior incidet in iK, quam si idem fiat per lentes *v* 1, *u* 1, praeposita, d. Sol enim minor & sub breuiore distantia videbitur. Quod si natura oculum sine humore crystallino dedisset, prout representatur in F, 2. idem faceret Helioscopium in Oculo, per pupillae apertum foramen ux, ingressum, Solem excipiens in fundum Retinae, o, quod facit Telioscopium e f, Solem, a b, per lentes *u* 2, & c d, transmittens in chartam, l m. Igitur in figura 6. accommodatur tubo F, 1. perfecto, Oculus mancus F, 2. Natura manca arte adiuta, arti soli. Et haec quidem generatim dicta sunt, de hac figura quarta, quae cum Tubum opticum communem, in manibus omnium versantem, lentemque cauam completatur, oportet de ipsis paullo altiore disputationem instituere.

Igitur, ut dixi, in Figura 4. accommodamus & comparamus oculo D. 2. integro, accessione Tubi perfecto, Telioscopium D. 1. praeposita lente, d, ut ex omni parte paritas positionis & effectuum similitudo compareat. Quae omnia ut à fundamentis rectius intelligantur accipe sequentia.

Artis et Naturæ, Tubi et Oculi, in speciebus solarib, præsentandis consensus. N.º 3.



De Lente Caua.

*Lentis caua
natura in
refringendo.*



PRIMO. Lens caua vnica, siue deinde planocaua, seu vtrunque concava existat, seu paruae sphaerae siue magnae segmentum fuerit, obiectum

visibile quodcunque accipit & traiecit ad distantiam chartae quamcunque confusae.

Sit enim vel numero primo, lens cauo plana, vel numero secundo, vtrunque caua, a b, cuius cavitatis centrum sit, c, obiectum visibile, d e f, quod per prius dicta, radiabit in ipsam totam ex singulis punctis, d, e, & f, facietque punctum, d, penicillum, a d b, & sic occupabit cauam superficiem, b a, totam: nec dissimili effectu punctum, e, totam sibi vendicabit, penicillo, a e b: idemque praestabit punctum, f, penicillo, a f b; & sic est retrocinandum de singulis radiosus punctis obiecti, d f.

At vero ipsum totum obiectum, d e f, corradabit in singula cauae superficiei puncta, a, b, & g, conosque radiosos colliget; ideoque tota obiecti visibilis superficies insidebit cuilibet superficiei cauae puncto, & quodlibet visibilis punctum diffundetur super cauam superficiem totam. Ergo summa erit & conorum & penicillorum & radiorum confusio.

Deinde quia radij, d a, e a, f a, in crassitie lentis franguntur ad perpendiculararem, c a, procedent iidem secundum lineas, a h, a i, a K, in alteram lentis superficiem, h i k, & inde rursus ex iisdem punctis, h, i & K, egressuri in aërem diaphanum tenuius, discedent refractione à perpendicularibus, ideoque à se inuicem amplius abibunt lineis infinitis h l, i m, K n. Eodem modo ferentur radij, d b, e b, f b, secundum radios, b o, b p, b q; & hi progredientur, secundum o r, p f, & q t. Non secus radij, d g, e g, f g, profluent secundum refractos, g u, & g x, & hi pergent secundum, u y, & x z. nam solus radius, e g, per centrum, c, transiens, à refractione immunis est. cum igitur vnus puncti radij in aërem egressi non colligantur, sed ex maiore parte amplius dispergantur, in

1 nullam vnquam sedem seu stationem ordinatam conuenient. Nam radij puncti, d, verbi gratia, post lentem sunt, K n, & q t, qui nunquam coeunt: puncti, e, radij sunt, a m, & b f, qui magis semper diuaricantur: & puncti, f, radij, f a, f b, desinunt in radios, a h l, b o r, qui pariter nunquam coeunt, propter incidentiarum diuersitates &c. Igitur etiam post transitam lentem singulorum quoque punctorum penicilla, & radij nunquam amplius coadunantur, sed mutuis irradiationibus implicata, chaos & confusionem perpetuam caussant.

15 Lens igitur caua vna & sola, species acceptas semper dissipat & confundit, id quod erat demonstrandum. Et in hoc lens concava à conuexa semper discrepat quod conuexa confusam speciem acceptam & transmissam distinguat & bene 20 ordinet; lens autem caua, eandem traiectam, perpetuo confundat.

Secundo. Lens caua quaecunque ante lentem conuexam quamcunque, versus obiectum posita, tradit eidem conuexae 25 species confusas. sequitur id ex priore. Hinc lens conuexa easdem confusae acceptas in debita secundum suam potentiam distantia distinguet & ordinabit. de qua re pluribus est actum circa expositionem figurae secundae.



Et hinc sumitur ratio specillorum cauorum ad oculum adhibendorum; quae cum in humorem crystallinum species semper confusas deducant; fit vt ipse eadem in tunicam Retinam, recte ordinet, si ab oculo teneantur in distantia proportionata: & hinc est quod istae lentes cauae dicuntur visus conseruatrices; quod 40 nimirum semper species bene ordinent in Oculo.

45 Tertiò. Lens concava quaecunque, post lentem conuexam in stationem ordinatae & distinctae speciei collocata simulachrum. in chartam confusum proiecit. Patet experientia, & probatur ratione à priori: quia singula visibilis puncta in sede illa vnita, lens caua accepta disgregat, & basis communis conorum radiorum, quae sola pulchram picturam exhibet, mutuis sectionibus & diuaricationibus dissipatur, & in chartam omnia 50

*Lentis caua
à conuexa
in refringen
do discrimē.*

*Lens caua
ante conue
xam.*

*Lens caua
post conue
xam, in sta
tionem ordi
natam collo
cata, con
fundit.*



I.

confuse deuehantur. Ex lente conuexa
a b, allabatur in concuam, c d, obie-
ctū visibile, e, f, cuius punctū, e, occupat to-
tā lentē, a b, penicillo, a e b, & punctum, f,
eādem penicillo, a f b: quod obiectum to-
tum cadit in punctum, a, lentis, a b, cono
e f a, & in punctum, b, cono, e f b; & sic
de reliquis quoque punctis & basibus
est philosophandum. Iam rursus ex lente
conuexa, a b, sedem confusionis obtinen-
te, punctum obiecti, e, dispersum secun-
dum totam conuexitatem, a b, post subi-
tam refractionem recolligatur in pūctum
d, lentis cauæ, d c; & simili ratione pun-
ctum, f, ex, b a, coadunetur in, c: vicissim
autem punctum, b, ex toto obiecto, e f,
collectum dispergat se in basin, c d; &
punctum, a, itidem ex toto, f e, con-
gregatum sese expandat in eandem, d c,
fiatque, c d, pictura distincta, prout fie-
ri solet similibus hypothesebus concur-
rentibus: quam si occupabit concua-
lens, c d, punctum collectum, c, refractione
tendet per, e g, in, h, & c i, in, K; sic
collectum punctum, d, diuicabitur per
l, in, m, & per, n, in, o, & conus totus
h c b d m, secabit totum, K e a d o, & sic
summa partium singularum atque totius
distractio summam confusionem dabit.
quod multo magis in duplicatis, aut mi-
nimarum sphaerarum cavitatibus accidit.
Quæ dissipationes cum nūquam amplius
colligantur ex vi huius lentis, manet in-
tentum.

*Lens eaza
post lentis cō
uexa Ratio.
nem distin-
ctam posita,
confundit.*

Quartò. Lens concua quæcunque,
Post lentem conuexam, & post stationem
picturæ distinctæ constituta, semper con-
fundit. Patet experientia, & ratio datur
à priori. Quia ipsa radios vnus puncti, seu
penicilla singulorum obiecti punctorum,
à sese diuergentia excipit, ideòque natu-
ra suæ refractionis amplius diuidit; è con-
trario totius obiecti conos à communi
basi euēctos, amplius dissociat, qua re

II.


omnium specierum summa perturbatio
& confusio existit.

Quintò. Lens concua quæcunque,
post lentem conuexam proxime tenta,
speciem confusam in chartam proijcit. Pa-
tet experientia, & ratio à priori est. Quia
radios ita confusos excipit, vt illos in or-
dinem redigere nequeat, sed transmissos
amplius perturbet. Nam licet ista posi-
tio talis sit, vt initium bonæ imaginis fiat,
propter radiorum vnus puncti ad se con-
uergentiam, tamen lens concua ita huic
negotio in data positione obstat, vt nulla
picturæ communis basis, certe nullus sen-
sus fiat; quia maior pars aliorum radio-
rum vel dissipatur extra basin commu-
nem, vel mixtione perturbatur, vt ea quæ
fit, tenuitate, & lucis vel circumfusæ
vel offusæ claritate suffocetur, visusque
debilitas illam assequi nequeat. Con-
firmatur hoc duplici experientia, oculi
altera, altera lentium.


Prima, Oculi hæc est per lentes. Si len-
ti conuexæ ita admoueat cauam, vt obie-
ctum per vtramque erectum videas in di-
stantia illius quacunque, & accessu qui-
dem maius recessu minus, euident est in
toto spacio imaginem confusam hæere,
alioquin in humorem crystallinum in-
curreret species distincta, & sic in tuni-
cam retinam confusionem induceret;
quod tamen non fit in casu proposito.
*quamdiu autem Oculus distinctè videt, tam
diu in humore crystallino fit presentatio
confusa.*

Secunda, Solarum lentium est hæc. Si
lentem conuexam post vtramq. attineas,
pinget eadem obiectum in obtenta char-
ta situ euerso, sed distinctè. Accipe can-
delam accensam, & lentes conuexam
& cauam iunctas, tum per conuexam
aliā seiunctam, traijce lumen in char-
tam obuersam, videbis quod dico verum
esse.

*Confusa spe-
cierum in
humore cry-
stallino re-
ceptio, facit
distinctam
visionem.*




Lentes cauae ad numerum I.



Lens caua

ad numerum 3.



ROS AE VRSINAE

Tubi Optici communis in ordine ad species re- præsentandas in charta, demonstratio.

III.

VI. LENS concava post convexam, non multum ante sedem ordinatæ imaginis collocata, eandem imaginem in charta ostendit maiorem, distinctiorem, & in distantia maiore, quam sola lens convexa fecisset. Patet experientia, & probatur à priori. Quia ipsa singulorum penicillorum vertices in sede ordinationis communi iam iam alioquin concursuros, dilatat & sic etiam producit amplius illorum concursum, donec in basin communem remotiorem confideant. In exemplo; a b c, obiectum, venit in lentem convexam, d e f g, confusum; & hinc egressum, sensim sese recipit in ordinem, ad locum ordinatæ imaginis, h i k, progrediendo, ita ut puncto, a, respondeat punctum, K, puncto, b, punctum, i, puncto, c, punctum, h: lens igitur caua l β, interuentu suo, radios f l, f m, f n, itemque, g o, g p, g q, ita refractione ordinat, ut aliquantulum distracti, basin communem ulterius prorogent, & maiorem multo efficiant, speciesq. distinctius præsentent. Nam, f l, per r, venit in s; v. g. & f m, per, t, in u; & f n, per x in y.

*Tubus opti-
cus demon-
stratur.*

Eodem modo, radius g o, per z in s; g p, per, a, in, u; tandem, g q, per, e, in y. & sic punctum, a, sola lentis convexæ, d g, refractione statuum in, K, sedem accessu caua, l β, firmabit in puncto y; b, alioquin futurum in, i, migrabit in u; & tandem, c, hæsurum in h, protrudetur, in s. Atque hæc est vera & genuina Tubi optici ad repræsentandum constituendi ratio, ex qua experientia fere omnes, & difficultates sciri & dissolui possunt. Quod autem species hac ratione distinctior consurgit, ex eo proficiscitur, quod multi radij ad latera gratis exituri, retenti caua lentis beneficio, in locum ordinationis educuntur; multi qui in medio brevioribus intersectionibus ordinem turbauissent, nunc à lente caua apprehensi, in aciem, & stationem communem cum alijs collocantur.

Sed dicet aliquis ex hoc sequi, tubum hac ratione acceptum, non esse in usu communi, adeoque non esse demonstratum Tu-

IV

1 bū opticum; prout oculus per ipsum in res obiectas fertur, q̄ videtur magis expeti.

Respondeo primo, ut Tubi cum oculo coniuncti vis & efficacia cognoscatur; necesse est, ut prius intelligatur, quid per se in præsentandis speciebus valeat, id quod hoc capite conatus sum ostendere.

Respondeo secundo, Tubi hic demonstrati usum esse fere vnicum & maximum quo Solare Phænomenon indagavi, cuius proinde demonstrationem si assero, ex instituto meo facio. quanquā inficias haud iuerim; eius in speciebus alijs immittendis praxin non ita vigere.

15 Respondeo tertio, Tubi optici veram & genuinam naturam, prout oculo applicatur, capite sequenti 29. fusissime explicari, per casus applicationis omnes quasi possibiles: in quibus nihil ad hanc rem opportunum mihi omisisse videor.

20 Sed nunc ad propositæ figuræ explanationem vberiore veniamus.

25 Hæc lentis caua positio, inter stationē basimue communem, h i K, non consistit in indivisibili, sed magnā latitudinē patitur, vagando intra lentem convexam, e f, & locū distinctæ imaginis, h i K; ubi tamen hæc proprietates animaduertas velim.

30 I. Eadem lens caua, stationi bascos communis, h i K, proximè statuta, dabit picturā in charta minimam, sed syncerissimā, & faciet chartæ distantiam ab eadē lente, quæ haberi potest breuissimam.

*Lens caua
ante stationē
ordinatam
vicinissima.*

35 II. Eadem lens caua, quo magis ad convexam accesserit, hoc imaginem maiorem in charta efficiet, sed claritate & puritate priorem non adæquabit; chartæ quoque distantiam longiorem requirit.


*Lens caua
ante stationē
ordinatam
remotior.*

40 III. Eadem lens caua, lenti convexæ ita vicina, ut absq. pleno confusionis statu vicinior esse nequeat, offeret imaginem & distantiam chartæ maximam, sed picturā non sincere terminatam: quæ accidunt propter radiorum commixtionem, & maiorem conorum dilationem, incidentiamque obliquiorem.

*Lens caua
ante stationē
ordinatā re-
motissima.*

45 IV. Eadem pictura, su y, à lētib, d g, & l e, in charta expressa, si reliqua omnia immota ponas, scilicet obiectum & eius à lentibus distantiam, lentes & earundem distan-

*Charta soli-
us accessu vel
recessu ima-
go ordinata
perturbatur*



I.

distātiā, semper confunditur, siue char-
tam admoucas ad lentem cauam, siue a-
moucas ab eadem. caussa vtrunque eadē:
quia tam antè quam post, species pictu-
ram deferentes sunt inter se confuse; si
igitur charta in loca confusarum specie-
rum accedit, imaginem confusam accipit.

Vbi tamen nota, esse etiam hic aliquā
latitudinem, & non statim motione char-

II.

1 tæ quavis imaginem sensibilibiter confun-
di, præsertim in maiorum spherarum len-
tibus rectè applicatis.

Quinta. Eadem imago rectissimè in charta depicta, confundetur, si omnibus
5 reliquis firmiter stantibus, sola lens caua vel accedat, vel recedat, extra modo dictam proportionis latitudinem; semper enim confusionis statio tam in lentem,

M. 2

quam

ROSAE VRSINAE

I V.

III.

quam in chartam perueniet . ratio ex dictis petenda est. vbi tamen nota, lentis ad lentem accessu, imaginem confundi in-
rufum & furuum atque tristem lucis statum; cuius ratio, quod species mutuis congressibus addensentur in vnum. eiusdem lentis abscissu, imaginē primum nigra, tum caeruleam, tandem tenuem & albam fieri. Ratio, quia species mutuis radiorum diuergentijs attenuatae, lucis abundantia diluuntur.

Idem facit sola lens conuexa. Sexta. Omnibus immotis, si sola lens conuexa vel promoueatur vel admoueatur, fient quae prius.

Idem facit, solum obiectum. Septima. Omnibus reliquis intactis, si obiectum solum sensibilibiter accedat vel recedat, eadem contingent quae prius.

Octaua. Lens caua quae sit minoris sphaerae portio maiorem distantiam exigit a conuexa minorem a charta, speciemque praesentat ampliorem, quam lens caua sphaerae maioris. haec enim distantiam breuiorem a conuexa requirit, & longiorem chartae, speciemque minorem, sed intensiorem refert.

Nona. Ad cauam eandem, lens conuexa minoris sphaerae breuiorem distantiam exigit, & imaginem in chartam minorem projicit. Maioris sphaerae maiorem.

Explicata nunc obiter lentis cauae natura, tam secundum se spectatae, quam coniunctae cum vna lente conuexa; redeamus nunc ad ordinem, & videamus quid eadem efficiat, si inter duas conuexas lentes interferatur, nam hoc proprie ad figuram quartam, & Tubum opticum in ordine ad oculum spectatum, pertinet, & huius quoque gratia quae capite priore dixi, allata sunt.

FIGURAE IV. D. 1. & D. 2. EXPLICATIO continuata, in qua Oculi Tubo communi utentis, & Tubi, e duobus conuexis & vna lente intermedia conflatu in speciebus recipiendis, similitudo, Tubique optici in ordine ad oculum natura, ostenditur.

C A P. X X I X.

Explicetur vberius Figura IV. D. 1. & D. 2.

Tubus opticus contra-ctus inutilis in casu primo.

Lens caua inter duas conuexas habet varios casus. Primus est, quando immediatè

1 coniunguntur omnes lentes, mediae cauae. & hic casus quia parum vtilitatis habet, parum attenditur. ideoque & nos illum intactum relinquamus. Quia nil aliud est, quam tubus opticus, non diductus, per quem admotus oculus nil videt; & haec res multos fefellit, vt optimos tubos tanquam inutiles damnarent.

Secundus Casus, quando lens caua immediatè iungitur lenti conuexae, quae obiectum respicit, & lens, d, ab eodem remouetur, tunc obiectum semper apparebit in charta debite obtenta situ euerso, in distantia lentis, d, a lente, quacunque; maior tamen distantia semper offerret speciem minorem; minor semper maiorem. Eodem modo oculus per duas lentes coniunctas conuexam & cauam, rem sibi praesentatam euerso situ in retina, apprehendet visione recta. & semper minorem & obtusorem recessu, maiorem & limpidiorem accessu. Patet experientia, & ratio a priore, petenda est ex vitro concauo: quod sic applicatum species distrahit, & confundit, confusasque lenti alteri & humori crystallino tradit; qui confusas acceptas ordinat, ordinatas confundit. Hic casus in figura non est expressus, neque in praxi communi visitatus, tamen verus est.

30 Tertius Casus est priori contrarius. quando cauum semper est coniunctum lenti, d, qui expressus est in schemate 4. D. 1. & D. 2. & occurrit quotidie in Te-
lioscopio communi ad obiecta terrea, Lunam & Stellas applicito, & in Helioscopio ad Solem. Quia tunc humor crystallinus, u x, vicem lentis d, obtinet.

Positio huius casus potest esse triplex. 40 Primò. Quando lens caua, & conuexa, d, consistunt ultra siue extra locum distinctionis lentis, & tunc vel nihil, vel confusum idolum apparet in charta, spectaturque obiectum ab oculo confuse. Hæc experientia est clara, & quotidiana. 45 Cuius rationem do, quia lens caua in confusos radios incidit iam ante attenuatos & dispersos, quos amplius ipsa attenuat & dispergit, vt conuexa illi hæres nil possit accipere quod chartae vel retinae rite tradat. 50

Hinc pater, cur Tubus nimium diductus nil faciat; quia diductione nimia, lens caua extra basin ordinatam lentis conuexae emouetur.

Secunda

Casus secundus ad oculi accommodationem

Tertius casus exprimit usum eodem Tubi optici.

I.

Secunda positio contingit in ipsa confusione sede, cuius ultimum versus chartam, si caua lens infederit, nil efficitur, vt ratio modo allata atque experientia docet.

Collocatio
apta pro o-
culo.

Tertia collocatio habet initium sedis ordinatae seu finem interualli, quod inter lentem, & basin ipsius communem seu sedem ordinatam intercedit. & ab hoc ad lentem, & magno spatio accedendo, fit pictura in charta, & intuitus ab oculo cauae coniuncto distinctus: cum hac lege e Regulis generalibus duabus.

Regula ma-
gni momen-
ti.

Prima. Quando lentes coniunctae, d, & e, accedunt ad conuexam, o, charta non nihil recedit, & fit pictura maior.

Secunda. Quando discedunt a conuexa, charta, accedit, & pictura fit minor.

Duae experientiae practicae.

Prima. Lens conuexa minoris sphaericitatis coniuncta cum eadem caua, facit picturam minorem & requirit distantiam chartae breuiorem, quam conuexae sphaericitatis maioris, quae maiorem facit imaginem & distantiam longiorem exigit.

Secunda. Lens caua sphaericitatis minoris, coniuncta cum eadem conuexa, facit imaginem maiorem, & maiorem requirit tam sui ipsius a conuexa, o, quam chartae a se distantiam, quam lens caua sphaericitatis maioris, quae minus distat a lente conuexa, e, & minus amouet chartam, picturamque minorem facit. Patet haec res, experientia quotidiana, & ratio a priore ex dictis facile eruitur.

Et in hac tertij casus positione, necnon explicatione, spectatur fere vsus quotidianus Tubi Optici, in Telioscopium & Helioscopium distributi, & omnigena oculi Tubo communi vtentis, cum Tubo e duobus conuexis vitris & vno cauo, composito, similitudo in representandis speciebus visibilibus, reperitur. E quibus plurimarum difficillimarumq. Quaestionum solutiones facillimae & rationes clarissimae statim dantur.

Cur Miopes
breuiore tu-
bi diductio-
ne vtantur
quam pre-
sbytae.

Primo. Cur Miopes eundem tubum ad obiecta eadem contuenda magis contrahant quam Presbytae? quia videlicet Miopes humorem crystallinum globosorem sunt nacti, cuius in ordinatam speciem concursus breuior sit quam vt tunicam Retinam attingat, ne igitur in

II.

humore vitreo innatans pulcherrima illa obiecti pictura potentiam videndi voto suo frustratur, ars subuenit, & lentem, cauam conuexam nonnihil admouet, cuius accessu fit vt, iuxta ea quae dicta sunt collocatio tertia, Casus tertij concursus communis prorogetur & dilatetur, atque hoc modo in tunicam Retinam ipsam visus Regiam atque Thronum deducatur. ex quo rursus habes efficacem demonstrationem, humorem vitreum non esse illum, in quo videndi potentia minus suum exerceat, &c.

Secundo. Cur Presbytae eundem tubum

ad obiecta eadem contuenda magis diducunt quam Miopes? Fit hoc ideo, quod cum ipsi polleant humore crystallino planiore quam Miopes, si eadem qua

Cur presby-
ta longiore
Tubi diduc-
tione vtan-
tur, quam
Miopes?

hi vtantur apertura, communis imaginis ordinatae concursus, nimis longus accidit, adeoque tunicam retinam transcedit iuxta Regulam primam collocat.

tertia. vnde vt communis illa basis in sedem visus, quae est Retina, reuocetur,

recedit lens caua, o, a conuexa, e, nonnihil, & sic picturae locum corripit, inque Retinam y z, imaginem deducit. Hinc rursus euidenter concludo, in oculo post Retinam actum videndi non elici, sed in

sola Retina. Amplius infero, tubum quemuis dummodo vitiosus non sit, pro oculo cuiusuis, dummodo sanus existat, aptari posse, vt ope tubi melius videat, quam sine. Praeterea duorum vel homi-

num quocumque visus naturam, necnon videndi efficaciam, itemque humorum crystallinorum configurationem absque errore examinabis atque enunciabis tubo eodem. Etenim si omnes eadem vtentur

ad obiectum idem apertura, visu atque humore crystallino simili pollebunt. Si diuersa, qui cernent obiectum idem sub apertura seu diductione tubi maiore, & presbytae, & lata pupilla erunt: qui sub minore, erunt Miopes, pupilla globosa, &c.

Tertia. Cur ad obiectum distans oculo eadem tubus opticus sit contrahendus, cur producendus ad vicinum? Quia ob-

iectum distans picturam in oculo ita corripit, vt fundum Retinae non assequatur, contractione autem tubi, per Collocat. tertiam producit imago, & sic obiectum ab oculo percipitur, quia species in Retinam collocata sentitur. Contraria

eveniunt ex obiecto vicino: quandoquidem ne

Corollaria
practica v-
tilia.

ROSAE VRSINAE

I V.

III.

quam in chartam perueniet. ratio ex dictis petenda est. vbi tamen nota, lentis ad lentem accessu, imaginem confundi in rufum & furuum atque tristem lucis statum; cuius ratio, quod species mutuis congressibus addensentur in vnum. eiusdem lentis abscissu, imaginē primum nigra, tum caeruleam, tandem tenuem & albam fieri. Ratio, quia species mutuis radiorum diuergentijs attenuatae, lucis abundantia diluuntur.

Idem facit sola lens conuexa. Sexta. Omnibus immotis, si sola lens conuexa vel promoueatur vel admoueatur, fient quae prius.

Idem facit, solum obiectum. Septima. Omnibus reliquis intactis, si obiectum solum sensibilibiter accedat vel recedat, eadem contingent quae prius.

Octaua. Lens caua quae sit minoris sphaerae portio maiorem distantiam exigit a conuexa minorem a charta, speciemque praesentat ampliorem, quam lens caua sphaerae maioris. haec enim distantiam breuiorem a conuexa requirit, & longiorem chartae, speciemque minorem, sed intensiorem refert.

Nona. Ad cauam eandem, lens conuexa minoris sphaerae breuiorem distantiam exigit, & imaginem in chartam minorem projicit. Maioris sphaerae maiorem.

Explicata nunc obiter lentis cauae natura, tam secundum se spectatae, quam coniunctae cum vna lente conuexa; redeamus nunc ad ordinem, & videamus quid eadem efficiat, si inter duas conuexas lentes interferatur, nam hoc proprie ad figuram quartam, & Tubum opticum in ordine ad oculum spectatum, pertinet, & huius quoque gratia quae capite priore dixi, allata sunt.

FIGURAE IV. D. 1. & D. 2. EXPLICATIO continuata, in qua Oculi Tubo communi utentis, & Tybi, e duobus conuexis & vna lente intermedia conflatu in speciebus recipiendis, similitudo, Tubique optici in ordine ad oculum natura, ostenditur.

C A P. X X I X.

Explicetur vberius Figura IV. D. 1. & D. 2.

Tubus opticus contra-ctus inutilis in casu primo.

Lens caua inter duas conuexas habet varios casus. Primus est, quando immediate

1 coniunguntur omnes lentes, mediae cauae & hic casus quia parum utilitatis habet, parum attenditur. ideoque & nos illum intactum relinquamus. Quia nil aliud est, 5 quam tubus opticus, non diductus, per quem admotus oculus nil videt: & haec res multos fefellit, ut optimos tubos tanquam inutiles damnarent.

Secundus Casus, quando lens caua 10 immediate iungitur lenti conuexae, quae obiectum respicit, & lens, d, ab eodem remouetur, tunc obiectum semper apparebit in charta debite obtenta situ euerso, in distantia lentis, d, a lente, quacunque; maior tamen distantia semper offeret speciem minorem; minor semper maiorem. Eodem modo oculus per duas lentes 15 coniunctas conuexam & cauam, rem sibi praesentatam euerso situ in retina, apprehendet visione recta. & semper minorem & obtusorem recessu, maiorem & limpidiorem accessu. Patet experientia, & ratio a priore, petenda est ex vitro 20 concauo: quod sic applicatum species distrahit, & confundit, confusasque lenti alteri & humori crystallino tradit: qui confusas acceptas ordinat, ordinatas confundit. Hic casus in figura non est expressus, neque in praxi communi vsitatus, tamen verus est. 25

30 Tertius Casus est priori contrarius. quando cauum semper est coniunctum lenti, d, qui expressus est in schemate 4. D. 1. & D. 2. & occurrit quotidie in Te- lioscopio communi ad obiecta terrea, Lu- nam & Stellas applicito, & in Helioscopio ad Solem. Quia tunc humor crystallinus, u x, vicem lentis d, obtinet.

Positio huius casus potest esse triplex. 40 Primò. Quando lens caua, i n, & conuexa, d, consistunt ultra siue extra locum distinctionis lentis, & tunc vel nihil, vel confusum idolum apparet in charta, spectaturque obiectum ab oculo confuse. Haec experientia est clara, & quotidiana. 45 Cuius rationem do, quia lens caua in confusos radios incidit iam ante attenuatos & dispersos, quos amplius ipsa attenuat & dispergit, ut conuexa illi haerens nil possit accipere quod chartae vel retinae rite tradat. 50

Hinc patet, cur Tubus nimium diductus nil faciat: quia diductione nimia, lens caua extra basin ordinatam lentis conuexae emouetur.

Secunda

Casus secundus ad oculum accommodatio

Tertius casus exprimit usum eodem Tubi optici.

I.

Secunda positio contingit in ipsa confusione sede, cuius ultimum versus chartam, si caua lens infederit, nil efficitur, ut ratio modo allata atque experientia docet.

Collocatio
apta pro o-
culo.

Tertia collocatio habet initium sedis ordinatae seu finem interualli, quod inter lentem, & basin ipsius communem seu sedem ordinatam intercedit. & ab hoc ad lentem, & magno spatio accedendo, fit pictura in charta, & intuitus ab oculo cauae coniuncto distinctus: cum hac lege è Regulis generalibus duabus.

Regula ma-
gni momen-
ti.

Prima. Quando lentes coniunctae, d, & e, accedunt ad conuexam, o, charta non nihil recedit, & fit pictura maior.

Secunda. Quando discedunt à conuexa, charta, accedit, & pictura fit minor.

Duae experientiae practicae.

Prima. Lens conuexa minoris sphaericitatis coniuncta cum eadem caua, facit picturam minorem & requirit distantiam chartae breuiorem, quam conuexae sphaericitatis maioris, quae maiorem facit imaginem & distantiam longiorem exigit.

Secunda. Lens caua sphaericitatis minoris, coniuncta cum eadem conuexa, facit imaginem maiorem, & maiorem requirit tam sui ipsius à conuexa, o, quam chartae à se distantiam, quam lens caua sphaericitatis maioris, quae minus distat à lente conuexa, o, & minus amouet chartam, picturamque minorem facit. Patet haec res, experientia quotidiana, & ratio à priore ex dictis facile eruitur.

Et in hac tertij casus positione, necnon explicatione, spectatur fere vsus quotidianus Tubi Optici, in Telioscopium & Helioscopium distributi, & omnigena oculi Tubo communi vtentis, cum Tubo è duobus conuexis vitris & vno cauo, composito, similitudo in representandis speciebus visibilibus, reperitur. E quibus plurimarum difficillimarumq. Quaestionum solutiones facillimae & rationes clarissimae statim dantur.

Primo. Cur Miopes eundem tubum ad obiecta eadem contuenda magis contrahant quam Presbytae? quia videlicet Miopes humorem crystallinum globosorem sunt nacti, cuius in ordinatam speciem concursus breuior sit quam ut tunicam Retinam attingat; ne igitur in

II.

humore vitreo innatans pulcherrima illa obiecti pictura potentiam videndi voto suo frustratur, ars subuenit, & lentem, cauam conuexam nonnihil admouet, cuius accessu fit ut, iuxta ea quae dicta sunt collocatione tertia, Casus tertij concursus communis prorogetur & dilatetur, atque hoc modo in tunicam Retinam ipsam visus Regiam atque Thronum deducatur. ex quo rursus habes efficacem demonstrationem, humorem vitreum non esse illum, in quo videndi potentia minus suum exerceat, &c.

Secundo. Cur Presbytae eundem tubum

ad obiecta eadem contuenda magis deducunt quam Miopes? Fit hoc ideo, quod cum ipsi polleant humore crystallino

*Cur presby-
ta longiore
Tubi diduc-
tione vtan-
tur, quam
Miopes?*

planiore quam Miopes, si eadem qua hi vtantur apertura, communis imagi-

nis ordinatae concursus, nimis longus accidit, adeoque tunicam retinam transcen-

det iuxta Regulam primam collocat. tertia. vnde ut communis illa basis in

sedem visus, quae est Retina, reuocetur, recedit lens caua, o, à conuexa, e, non-

nihil, & sic pictura locum corripit, inque Retinam y z, imaginem deducit. Hinc

rursus euidenter concludo, in oculo post Retinam actum videndi non elici, sed in-

sola Retina. Amplius infero, tubum quemuis dummodo vitiosus non sit, pro

oculo cuiusuis, dummodo sanus existat, aptari posse, ut ope tubi melius videat,

quam sine. Praeterea duorum vel hominum quocumque visus naturam, necnon

videndi efficaciam, itemque humorum crystallinorum configurationem absque

errore examinabis atque enunciabis tubo eodem. Etenim si omnes eadem vtentur

ad obiectum idem apertura, visu atque humore crystallino simili pollebunt. Si

diuersa, qui cernent obiectum idem sub apertura seu diductione tubi maiore, &

presbytae, & lata pupilla erunt: qui sub minore, erunt Miopes, pupilla globosa, &c.

Tertia. Cur ad obiectum distans oculo eidem tubo opticus sit contrahendus, cur producendus ad vicinum? Quia ob-

iectum distans picturam in oculo ita corripit, ut fundum Retinae non assequatur, contractione autem tubi, per Col-

locat. tertiam producitur imago, & sic obiectum ab oculo percipitur, quia species in Retinam collocata sentitur. Contraria

veniunt ex obiecto vicino: quandoquidem ab ipso

*Corollaria
practica v-
tilia.*

*Cur Miopes
breuiore tu-
bi diductio-
ne vtantur
quam pre-
sbyta.*

ROSAE VRSINAE

III.

ab ipso basis picturæ longius projicitur quam tunica Retina possit sua extensione assequi, idcirco productio tubi subuenit, & sedem imaginis hac ratione correptam Retinæ accommodat. Id autem quod hac ratione fit, nolim impotentia tubi, sed oculi incapacitati seu necessitati adscribas. nam tubus in eandem aperturam idoneam compositus, omnia obiecta etiam remota immota apertura, ostendit, dummodo charta admoueat ad remota, amoueat ad vicina. Quod si oculus similiter tunicæ Retinæ fundum in simili proportionem attrahere, & remouere aut humor crystallinus sese antrorsus seu retrorsum collocare pro sufficientia posset; tubi adductione & reductione non tantopere esset opus.

Quartò. Cur cum obiecta eodem modo, & simili proportionem pingantur tam in charta, quam Retina, visio tamen sitibus picturæ contradicat. nam quando eoque imago in chartam euerso situ projicitur, semper oculus eandem erecto situ apprehendet: & quando imago statuitur in chartam erecta, oculus tanquam euersam cernit, &c. Respondeo huius rei experientiam, causam & rationem à me fuisse tractatam & datam esse in meo oculo, seu Fundamento Optico. Interim breuiter sed verè dici, hoc ideo fieri, quia oculus imaginis ingressam percipit secundum ultimos radios refractos & formaliter visorios, quorum tendentiam extrorsus in apprehensione obiecti sequitur oculus, cum igitur radius in oculo dexter respiciat sinistram obiecti partem, & sinister feratur in dextram, itemque superior inferiorem & contra; necessario videndi actus ita rem cognoscit, &c. Hinc infero Primo actum visionis, quem speciem expressam vocant, longissimè differre ab imagine seu pictura, quam dicunt specie impressam. Secundo. Fieri posse, ut species impressa sit absque expressa, ut fit in oculo hominis dormientis aperto.

Quintò. Cur, cum species in charta, v.g. solis aut alterius obiecti tota præsentetur, eadem ab oculo applicito tota non in Tubum, videatur? Respondeo solam & vnicam causam esse, quod foramen pupillæ totam speciem simul non recipiat, propter suam paruitatem. quod si dilataretur ut totam hauriret, utique tantam videret rem, quantum perciperet oculus ideam, quod autè

IV.

hoc ita sit, patet tubis magnis & longis, ubi conuexæ lentes sphaerarum magnarum segmenta, solent conos radiosos diffusiores mittere, qui sepiissime capacitatem foraminis ante cauam lentem excedunt; quo euentu, idem fit in charta, quod in tunica Retina. nam imago per partes allabitur. idem sæpe etiam fit, ut rupto foramine chartæ & ampliato, coni tamen radiosi amplitudo nihilominus excedat totam lentis cauæ capacitatem, quo casu, idem rursus fit in charta, quod in oculo, ut obiectum per partes sit intromittendum & lustrandum. Idem euenit si post lentem cauam conuexa minor sit, quam species per conuexam ab obiecto transmissa. Itaque causa vniuersim, cur minus ab oculo vno intuitu videatur, quam in charta præsentetur, est, quia vel foramen pupillæ totam speciem non intromittit, vel ipsemet humor crystallinus; (dato quod pupilla esset maximè dilatata) totam simul non capit.

COROLLARIUM.

Hinc patet, illud quod passim in oculum Tubi optici naturam rejicitur, videlicet, quod quo obiectum magis ampliat, hoc de illo Oculo minus præsentet, non esse ex natura Tubi, sed incapacitate & impotentia Oculi, qui totum quod Tubus vnica præsentatione offert, simul acceptare nequit.

Sextò. Cur vitrum maius & sub apertura seu detectione maiore, quatenus maiorem patitur, sine confusione, obiectum fortius depingat, & cæteris paribus, non maius? Quia videlicet ex singulis conuexi punctis procedunt totius obiecti coni radiosi in vnicam basin communem, & quia singuli vnā speciem deferunt, semper intensionem quælibet superaddita, augeat. hinc quo maior est lens. eo plures eiusmodi coni suos radios & per radios picturas conglobant. & hoc imaginem vegetam efficit. Quod autem non fiat maior, saltem sensibilibiter, referendum est refractioni. &c.

COROLLARIUM.

Ex hoc patet, lucem, aut colorem minus intensum, superadditum magis intensum, augere intensionem.

Atque hætenus Tubi Optici naturam & vsum

Cur maior
vitri dete-
ctio, fortior
pingat spe-
ciem?

Cur tota o-
bicti species
in Tubum,
& chartam
veniat, ab o-
culo autem
arceatur?

I.

& vsum communem pro instituta breuitate, vtcunque satis explicasse mihi videor: plura eruet, qui hisce intentus erit.

POSITIONIS TRIVM LENTIVM, CASVS IV.

Quartus positionis Casus est, quando omnes tres lentes inter sese separate existunt & caua inter ambas conuexas liberè vagatur. vbi rursus diuersæ positiones inveniuntur. Aut enim ambæ id est conuexa, d, & concaua, i x, versantur intra concursum ordinatum alterius, v, i, aut ambæ sunt extra aut caua quidem intra & conuexa versatur extra.

Positio prima.

Positio prima. Quando ambæ versantur intra lentis conuexæ, v, i, seu quæ obiectum spectat, concursum communem ordinatum &c. tunc in chartam debite oppositam, semper pingetur imago situ euerso, ab oculo videbitur situ erecto, & imago illa augebitur si conuexa lens ad cauam accedet, recedente charta; minuetur, si discedet, accedente charta. Patet experientia & ratio à priore. Quia lens in hoc casu, accipit à caua species confusas, hinc ipsa illas in chartam ordinat, & quia nondum erant decussatæ, ipsa illas in chartam proijcit sectas, & sic euersus situs contingit. Habet hæc positio magnam latitudinem, pro natura lentis conuexæ, v, i, & ratione obiecti multum vel parum distantis.

Positio secunda.

Positio secunda. Quando ambæ tam caua quam conuexa ponuntur, extra concursum communem lentis, v, i, tunc imago in charta per conuexam, d, semper erigitur, in oculo semper eueritur. quæ accessu conuexæ vel oculi, ad cauam, & recessu chartæ augetur; discessu illius, accessu huius imminuitur. Experientia certa, & ratio à priore. Quia in hoc casu lens caua species semper in chartam confundit, quas conuexa ordinat, & quia iam semel decussatæ fuerant, secundo secut, atque ex hoc capite erigit in charta, ideoque oculus illas euerfas aspicit; quia visio seu species expressa, speciei impressæ situ semper contrariatur. prout visum supra. Probabis hanc veritatem tubo quouis, si cauam à conuexa, v, i, extra basin illius commu-

II.

nem protrahas, & oculum à caua plurimum amotum in obiectum dirigas.

Positio tertia. Quando concursus à lente, v, i, factus, inuenitur inter caua & conuexam, d; tunc imago in chartam semper allabetur situ euerso, spectabitur ab oculo situ erecto, & fient quæ prius dicta sunt in positione prima, ob rationes easdem. quia lens caua defert species confusas, in lentem conuexam, d, & vna fit tantum illarum intersectio.

Ex hætenus allatis facile est videre oculi cum Tubo, & Tubi cum oculo admirabilem sanè conuenientiam in specierum visibilium accipienda & presentanda pictura.

Tubi, & Oculi similitudo.

Deinde facile est videre, aut inde deducere, singularum compositionem, & structuram. Præterea vsum & praxim ingeniosus haud difficulter eliciet. Quia tamen hæc inexperto & harum rerum ignaro difficillima factu, & mirabilia forsitan videbuntur, per singula breuiter pro instituti mei ratione, percurram: accommodando ad res meas, insinuando breuiter ad quid & quomodo vnumquodque seruiat.

FIGVRARVM PRAEDICTARVM VSVS, & PRAXIS.

CAP. XXX.

Explicauimus hætenus quidquid ferè Oculo cum Tubo commune esse reperi; nunc quid vtilitatis inde sperari queat, & quomodo in praxin dirigi valeant, paucis aperiam: vbi Figuram prius septimam, G, 1. & G, 2. etiam explanauero: quam ob simplicitatem vna cum visu coniungo.

Explicatio, & vsus figura septimæ, G, 1. & G, 2.

Est hæc figura omnium simplicissima atque inertissima; nam præter locum obsecrum, nil penitus habet, quam vt aliquis terebra paruulum foramen efficiat, atque in obiectam chartam distantia longa. Sex scilicet, decem aut viginti passuum, Solem vel alia obiecta forinsecus lucentia aut illustrata, intromittat. videbit enim in obiecta charta, quidquid

III.

ab ipso basis picturae longius projicitur quam tunica Retina possit sua extensione assequi, idcirco productio tubi subuenit, & sedem imaginis hac ratione correptam Retinae accommodat. Id autem quod hac ratione fit, nolim impotentiae tubi, sed oculi incapacitati seu necessitati adscribas. nam tubus in eandem aperturam idoneam compositus, omnia obiecta etiam remota immota apertura, ostendit, dummodo charta admoueat ad remota, amoueat ad vicina. Quod si oculus similiter tunicae Retinae fundum in simili proportionem attrahere, & remouere aut humor crystallinus sese antrorsus seu retrorsum collocare pro sufficientia posset; tubi adductione & reductione non tantopere esset opus.

Quarto. Cur cum obiecta eodem modo, & simili proportionem pingantur tam in charta, quam Retina, visio tamen sibi- bus picturae contradicat. nam quando eum- que imago in chartam euerso situ projicitur, semper oculus eandem erecto situ apprehendet: & quando imago statuitur in chartam erecta, oculus tanquam euer- sam cernit, &c. Respondeo huius rei ex- perientiam, causam & rationem a me fu- se tractatam & datam esse in meo oculo, seu Fundamento Optico. Interim breui- ter sed verè dici, hoc ideo fieri, quia o- culus imaginis ingressam percipit secun- dum ultimos radios refractos & forma- liter visorios, quorum tendentiam extror- sus in apprehensione obiecti sequitur ocu- lus, cum igitur radius in oculo dexter re- spiciat sinistram obiecti partem, & sini- ster feratur in dextram, itemque superior- inferiorem & contra; necessario videndi actus ita rem cognoscit, &c. Hinc infero Primo actum visionis, quem speciem ex- pressam vocant, longissimè differre ab imagine seu pictura, quam dicunt specie- impressam. Secundo. Fieri posse, ut spe- cies impressa sit absque expressa, ut fit in oculo hominis dormientis aperto.

Cur tota o-
bicti species
in Tubum,
& chartam
veniat, ab o-
culo autem
arceatur?

Quinto. Cur, cum species in charta, v.g. Solis aut alterius obiecti tota prae- sentetur, eadem ab oculo applicito tota non videatur? Respondeo solam & unicam causam esse, quod foramen pupillae totam speciem simul non recipiat, propter suam paruitatem. quod si dilataretur ut totam hauriret, utique tantam videret rem, quan- tam perciperet oculus ideam, quod autè

IV.

hoc ita sit, patet tubis magnis & longis, vbi conuexae lentes sphaerarum magnarum segmenta, solent conos radiosos diffusio- res mittere, qui sepiissime capacitatem fo- raminis ante cauam lentem excedunt; quo euentu, idem fit in charta, quod in tuni- ca Retina. nam imago per partes allabi- tur. idem saepe etiam fit, ut rupto fora- mine chartae & ampliato, coni tamen ra- diofi amplitudo nihilominus excedat to- tam lentis cauae capacitatem, quo casu, idem rursus fit in charta, quod in oculo, ut obiectum per partes sit intromittendū & lustrandum. Idem euenit si post lentē cauam conuexa minor sit, quam species per conuexam ab obiecto transmissa. Ita- que causa vniuersim, cur minus ab oculo vno intuitu videatur, quam in charta prae- sentetur, est, quia vel foramen pupillae to- tam speciem non intromittit, vel ipsemet humor crystallinus; (dato quod pupilla esset maximè dilatata) totam simul non capit.

COROLLARIUM.

Hinc patet, illud quod passim in oculi- tam Tubi optici naturam reijcitur, vide- licet, quod quo obiectum magis ampliat, hoc de illo Oculo minus praesentet, non esse ex natura Tubi, sed incapacitate & impotentia Oculi, qui totum quod Tu- bus vnica praesentatione offert, simul ac- ceptare nequit.

Sexto. Cur vitrum maius & sub aper- tura seu detectione maiore, quatenus ma- iorem patitur, sine confusione, obiectum fortius depingat, & caeteris paribus, non maius? Quia videlicet ex singulis conue- xi punctis procedunt totius obiecti coni radiofi in vnicam basin communem, & quia singuli vnam speciem deferunt, sem- per intensiorem quaelibet superaddita, auget. hinc quo maior est lens. eo plu- res eiusmodi coni suos radios & per ra- dios picturas conglobant. & hoc imagi- nem vegetam efficit. Quod autem non fiat maior, saltem sensibilibiter, referendum est refractioni. &c.

COROLLARIUM.

Ex hoc patet, lucem, aut colorem mi- nus intensum, superadditum magis inten- so, augere intensiorem.

Atque hactenus Tubi Optici naturam & usum

Cur maior
vitri dete-
ctio, fortior
pingat spe-
ciem?

I.

& vsum communem pro instituta breuitate, vtcunque satis explicasse mihi videor: plura eruet, qui hisce intentus erit.

POSITIONIS TRIVM LENTIVM, CASVS IV.

Quartus positionis Casus est, quando omnes tres lentes inter sese separate existunt & caua inter ambas conuexas liberè vagatur. vbi rursus diuersæ positiones inueniuntur. Aut enim ambæ id est conuexa, d, & concaua, i x, versantur intra concursum ordinatum alterius, v, s, aut ambæ sunt extra aut caua quidem intra & conuexa versatur extra.

Positio prima.

Positio prima. Quando ambæ versantur intra lentis conuexæ, v, s, seu quæ obiectum spectat, concursum communem ordinatum &c. tunc in chartam debitè oppositam, semper pingetur imago situ euerso, ab oculo videbitur situ erecto, & imago illa augebitur si conuexa lens ad cauam accedet, recedente charta; minuetur, si discedet, accedente charta. Patet experientia & ratio à priore. Quia lens in hoc casu, accipit à caua species confusas, hinc ipsa illas in chartam ordinat, & quia nondum erant decussatæ, ipsa illas in chartam projicit sectas, & sic euersus situs contingit. Habet hæc positio magnam latitudinem, pro natura lentis conuexæ, v, s, & ratione obiecti multum vel parum distantis.

Positio secunda.

Positio secunda. Quando ambæ tam caua quam conuexa ponuntur, extra concursum communem lentis, v, s, tunc imago in charta per conuexam, d, semper erigitur, in oculo semper eueritur. quæ accessu conuexæ vel oculi, ad cauam, & recessu chartæ augetur; discessu illius, accessu huius imminuitur. Experientia certa, & ratio à priore. Quia in hoc casu lens caua species semper in chartam confundit, quas conuexa ordinat, & quia iam semel decussatæ fuerant, secundo secat, atque ex hoc capite erigit in charta, ideoque oculus illas euersas aspicit; quia visio seu species expressa, speciei impressæ situ semper contrariatur: prout visum supra. Probabis hanc veritatem tubo quouis, si cauam à conuexa, v, s, extra basin illius commu-

II.

nem protrahas, & oculum à caua plurimum amotum in obiectum dirigas.

Positio tertia. Quando concursus à lente, v, s, factus, inuenitur inter caua & conuexam, d; tunc imago in chartam semper allabetur situ euerso, spectabitur ab oculo situ erecto, & fient quæ prius dicta sunt in positione prima, ob rationes easdem. quia lens caua defert species confusas, in lentem conuexam, d, & vna fit tantum illarum intersectio.

Ex hætenus allatis facile est videre oculi cum Tubo, & Tubi cum oculo admirabilem sanè conuenientiam in specierum visibilium accipienda & presentanda pictura.

Tubi, & Oculi similitudo.

Deinde facile est videre, aut inde deducere, singularum compositionem, & structuram. Præterea vsum & praxim ingeniosus haud difficulter eliciet. Quia tamen hæc inexperto & harum rerum ignaro difficillima factu, & mirabilia forsitan videbuntur, per singula breuiter pro instituti mei ratione, percurram; accommodando ad res meas, insinuando breuiter ad quid & quomodo vnumquodque seruiat.

FIGVRARVM PRAEDICTARVM VSVS, & PRAXIS.

CAP. XXX.

Explicauimus hætenus quidquid ferè Oculo cum Tubo commune esse reperi; nunc quid utilitatis inde sperari queat, & quomodo in praxin dirigi valeant, paucis aperiam: vbi Figuram prius septimam, G, 1. & G, 2. etiam explanauero: quam ob simplicitatem vna cum vso coniungo.

Explicatio, & vsum figuræ septimæ, G, 1. & G, 2.

Est hæc figura omnium simplicissima atque inertissima, nam præter locum obscurum, nil penitus habet, quam vt aliquis terebra paruulum foramen efficiat, atque in obiectam chartam distantia longa. Sex scilicet, decem aut viginti passuum, Solem vel alia obiecta forinsecus lucentia aut illustrata, intromittat. videbit enim in obiecta charta, quidquid

ROSAE VRSINAE

III.

quid in eisdem inhæserit. similis pictura fieret in oculo manco, cui ademptus esset humor crystallinus, & arte aliqua foramen vuae aperiretur, vt species ingredi posset. Hinc ego in hoc casu, vocavi Naturam mancam cum arte. non quod radiorum naturalis configuratio sed quod eorundem talis per angustum foramen immissio, atque in chartam exceptio esset artificiosa. Duos vsus habet ista res ad propositum meum.

Vsus primus.

Primus. Quod Maculae solares isto artificio exceptæ, careant omni refractionis per lentes caussatæ incommodo, & ad motum Macularum tam apparentem quam verum, itemque locum visum & verum inquirendum atque demonstrandum sint aptissimæ. dūmodo obseruationes sint accuratæ & circulo satis magno inclusæ: de qua re egi etiam in immissione naturali &c.

Vsus secundus.

Secundus Vsus, priore non minor, & ad res astronomicas maximi momenti; quod visualis Solis magnitudo infallibiliter, atque sine vilo errandi periculo exactissima acquiritur, si per minimum foramen ad distantiam magnam eiusdem conus excipiat: de qua re seorsim atq. ex instituto dicetur suo loco. nunc attingisse, satis est.

Vsus, & praxis Figura prima, A, 1. & A, 2.

Immissio per unum conuexum, præfertur immissioni puræ naturali.

Conuenientiam Lentis conuexæ cum oculo iam ostendi; nunc breuiter vsus illius lentis atque praxin in immittendis speciebus perstringo. Nam hæc res ad Solem in chartam deducendum affert momenti plurimum. Quia primo mundiorum & præcisiorem exhibet, quam nuda per foramen intrmissio. Secundo. Et licet ob refractionem, quæ adhibitis vitris semper interuenit, ipsa præcisißima visualis magnitudo Solis tam facile determinari nequeat, situsque & distantia Macularum, atque motus proprii veri & apparentes, nonnihil varietatis ex parte rei afferant; tamen si lens conuexa sit magnæ sphaeræ portio, & altera parte plana, imaginem Solis magnam offeret, & refractione vel nihil vel parum officiet erit enim ea quasi vniformis. Atque ex hoc, tertio. Cursus Macularum apparentes sine vilo errore sensibili efficies.

Vsus vnus lentis ad refractionis difformitatem euitandam.

Et licet ob refractionem, quæ adhibitis vitris semper interuenit, ipsa præcisißima visualis magnitudo Solis tam facile determinari nequeat, situsque & distantia Macularum, atque motus proprii veri & apparentes, nonnihil varietatis ex parte rei afferant; tamen si lens conuexa sit magnæ sphaeræ portio, & altera parte plana, imaginem Solis magnam offeret, & refractione vel nihil vel parum officiet erit enim ea quasi vniformis. Atque ex hoc, tertio. Cursus Macularum apparentes sine vilo errore sensibili efficies.

IV.

Quarto. Ad quam rem mirè conducet si lens non tantum sit magnæ sphaeræ portio, cuius semidiameter 20. 30. aut plures palmos Romanos cōplectatur, sed etiam ipsa sit ampla satis, vnus minimum aut duorum palmorum; sic enim eadem aliquid digni præstabis, dūmodo in materiam probam, forma inculpabilis inducatur.

Hac eadem lente vteris speciebus in chartam excipiendis rerum terrestrium. quod si chartam firmes, delineabis & in eandem species rerum caducas coloribus exprimes, & habebis Tabulas chorographicas, Topographicas, Prætopographicas &c. Eadem lente, minuta, & sphaeræ paruæ, res paruas maximas intueberis. Eadem lente magna & sphaeræ magnæ, litteras paruas, visui maximas obijcies. Taceo nunc vsus alios, vel tritos vel abtrusiores, ne nimis à proposito abire videar.

Vsus, & praxis Figura tertia, C, 1. & C, 2.

Quam conuenientiam oculus Præbytae præfixo specillo concauo, cum lenticulis duabus artificiosè inter sese compositis habeat, satis est indicatum in superioribus, nunc ad vsus & praxin nostram subiungo rem, à multis quidem hætenus, quesitam & desideratam, sed à nemine ante me quod sciam inuentam; quam nunc tibi hic libens volensq. aperte communico. Tametsi id in Oculo meo, à cap. XX. ad cap. XXVI. satis clare præstiterim. Sed quia multi illum librum, aut non habent, aut inibi dicta fortasse non satis perpendunt, hic placet rem illam sine ambagibus proferre.

Primo. Si post concursum ordinatum seu locum imaginis, quam conuexa lens ab obiecto haurit, applicaueris lentem aliam connexam; hæc suo concursu ordinato in obuersam chartam situ erecto speciem projiciet: & respondebunt dextra imaginis dextris obiecti; sinistra sinistris, supera superis, infera inferis, eo prorsus modo, quo euenire solet, in speculis planis. quas tamen imagines si in chartam lineamentis seu coloribus transferas, fient iterum ad obtutum tuum dextra sinistra, & sinistra dextra; quod euitabis in nostra praxi, si per fossa charta, in

Vsus vnus lentis conuexæ, pro rebus graphicis.

Per duas lentes conuexas specierum in chartam erectio.

I.

ta, in auersam superficiem, picturam conuertas.

Hac arte secundarias Solis Maculas, & Faculas illustrare, atque visui subijcere soleo.

Hac arte species rerum intronissarum ante annos tredecim Serenissimo Maximiliano Archid. Austr. & postmodum Sac. Cæs. Maiestati &c. erexi; de qua re proprio Opusculo ex instituto, si Deus dederit, aliquid dicam, vide Oculum meum locis citatis.

Secundò. Si similes duas lentes eodem modo aptaueris in Tubum, oculumque debite applicaueris, videbis euerso quidem situ, sed magnitudine, claritate, & amplitudine incredibili obiecta quæcunque terrea: sed & astra quælibet in obsequium visus coges: nam cum ea omnia rotunda sint, euersio situs totius aspectum, quoad configurationem visua-lem non turbat, id quod secus est in obiectis terreis: quemadmodum in luna quoque idem animaduerti potest, cum neque rotunda semper, neque homogenea existat.

Tertiò. Si pari ratione lentes duas conuexas coloratas tubo oculoque accommodaueris, habebis Helioscopium mirificum, & protrahes quidquid in Sole absconditum fuerit.

Quartò. Eadem arte natum est illud admirabile Microscopium, quo musca in Elephantum, & pulex in Camelum amplificatur, & ea quæ alias paruitate oculi aciem effugiunt, magna comparent, de qua re, dante Deo, suo loco ex professo.

Multa alia breuitatis ergo pertransco, erit fortassis aliis ea promendi locus, erit vt ingenioso occasionem dederim, plura sponte eruendi. Ex allatis tamen vnum euidentius deduco.

COROLLARIUM;

Videlicet discursum illum, quem Trutinator in suo libro, pro Tubi Optici Inuentione sibi stabilienda, affert, esse fallacem & nullum. Ait, enim, se audita Tubi fama, conclusisse, ad res optice amplificandas, necessario requiri duo vitra, quorum alterum sit conuexum, alterum concauum: cum duo conuexa id excellentius præstent, quam conue-

II.

xum cum cauo. Cum igitur falsus sit discursus; de veritate arrogatæ inuentionis ex hoc etiam capite multi dubitant.

Quod si de erecto situ quis velit mouere scrupulum: habes per duo conuexa situm erectum in charta; per tria conuexa, ritè collocata, situm erectum in oculo transpiciente. Igitur vanus discursus, inuentionem inanem & suspectam reddit: vt alia taceam.

Vsus, & Praxis Figura sexta,
F, 1. & F, 2.

Figura F. 1. non habet exemplum practicum ab vel in oculo, quia nullus oculus caret humore crySTALLINO, quod si vel in oculo intra crySTALLINUM & Tunicam Retinam, debito interuallo humor quidam similis lenti cauæ consisteret; vel oculus humore crySTALLINO caret, & tubo applicito species per apertum vueæ foramen acciperet; omnino talis oculi constitutio eadem in Tunica Retina pateretur, quæ obiecta tubo optico charta: de qua re satis est dictum in superioribus. nunc ad vsum & Praxin tubi optici solius veniamus.

VSVS TELIOSCOPII IN ordine ad Solem & Planetas.

CAP. XXXI.

Primò. Primus & præcipuus eius vsus est, cuius gratia hæc omnia occasionaliter adduxi, quod Solis Maculas & Faculas in chartam excellentissimè deducat, quando cauum paullo ante basin seu concursum communem ordinatum conuexi adhibetur, & charta debite apponitur. & hoc modo omnes fere Romanas obseruationes, vltra duo millia excurrentes peregi.

Secundò. Idem Helioscopium accessum Solis ad terram, & recessum ab eadem annuam, euidentissimè ostendit. Nam si eundem in Machinam obseruatoriam applies, Solisque circulum in Capricorni initio notes, deinde omnibus variatis, idem facias, in Aquario, idem in Piscibus idem in succedentibus signis vsque ad Cancrum, & hinc denuo per semicirculum descendentem attendas, videbis circa initium Capricorni ipatio fere

Solis eccentricitas per Telioscopiū indagatur.

ROSAE VRSINAE

III.

fere menſtruo, circulum Solarem obſer-
uatorium Maximum ; circa initium
Cancri ſimili ſpatio temporis minimum;
& vtrumque quidem quaſi ſtabilem in
ſua magnitudine permanere. tum ſenſim
animaduertes illum quidem Sole per A-
quarium in piſces procedente, ſenſim &
ſemper magis magisque decreſcere, hūc
autem in ſignis oppoſitis augeri ; maxi-
ma autem & velociffima decrementa at-
que augmenta contingere circa æquino-
ctia. E quibus manifefſtiſſimus Solis acceſ-
ſus, & reſſus, punctaque Solſtitialia
atque æquinoctialia euadunt. Nam alioquin
neque Solis circulus hybernus in
ſua magnitudine, neque æſtiuus in parui-
tate tādū perſeueraret, neque æquinoctia-
les tam magnas & veloces magnitudi-
num viciffitudines ſubirent. Cum autem
Sol æſtate minorem proijciat baſin ſeu
circulum, hyeme maiorem, neceſſe eſt
aliquid interueniſſe vel in ipſo, vel in Te-
lioſcopio. hoc autem inuariatum manſit
inuariata charta, inuariata apertura, in-
uariata diſtantiæ, & poſitiones omnes
omnium partium : Sol igitur ſi æſtate
non reſſit, ſi hyeme non acceſſit, ſi au-
ctus ſi imminutus non eſt ; oportet ea-
dem orbita alluceat hyeme qua æſtate ;
non autem allucet eadem, ſed maiore in
hyeme, minore in æſtate, neceſſe ergo
eſt, vel loco vel magnitudine mutatum
Solem. Non eſſe mutatum magnitudine,
ſaltem ſenſibiliter conſtat : quia eadem
ſemper apparens ipſius quantitas quotan-
nis redit in Capricorno, eadem quotan-
nis redit in Cancro ; niſi quis ſemper eo-
dem modo velit pingueſcere hyeme, æ-
ſtate macileſcere.

*Sol apparet
eadem an-
nue magni-
tudine, loco
Eclipticæ eo-
dem.*

*Solis ſenſi-
bile augmen-
tum & de-
crementum
apparens, eſt
Opticum.*

*Solis viſua-
lem magni-
tudinem fa-
cilis inda-
gandi ratio.*

Igitur neceſſe eſt, ipſius decrementum
non phyſicum ſed Opticum, non verum,
ſed viſum eſſe : ea enim quæ magis diſtant
apparent minora, quam ſi vicina ſunt,
licet magnitudinem non mutant. Vnde
cum Sol hyeme maiorem ſpargat con-
i ſui baſin, neceſſe eſt, hyeme nobis vicini-
orem eſſe quam æſtate, qua nos minore
radioſi ſui con-
i orbita illuſtrat. Et hoc ſit
ſecundum Telioſcopij in rem Aſtrono-
micam inſigne emolumentum, multo-
rum annorum conſtanti atque vniſormi
experimento mihi cognitum, effectu fa-
cillimum. neque enim opus eſt, vt ob-
ſervationes quotidianas, ſicut ego feci,
adhibeas : poteris totum clariffimè nau-

IV.

ciſci, ſi initijs ſignorum Solem intromit-
tas, & circulum ipſius in eadem charta
annotes. experieris enim manifefſtas il-
lorum inter ſeſe differentias, & augmen-
torum atque decrementorū, magna vel par-
ua, cita vel tarda diſcrimina, prout dixi.

Confirmatur hæc res alia manifefſta
experientia. Nam, ſicut in prioribus dixi
obiecta remota per eundem tubum ad-
miſſa aliter allucent quam vicina, & vi-
cina quidem maiorem chartæ remotio-
nem à cauo deſiderant quam remota ; &
ſi vicina quidem rectum ſtatum obti-
nent, remota peiuſculè habebunt in char-
ta, aut vice verſa ; ſi proportionatam tu-
bi compositionem naſta ſunt obiecta re-
mota, male habebunt vicina : quod idem
ſucceſſiue fit circa obiectum idem in di-
ſtancia vicina & remota. vnde ſi Solem
ad Telioſcopium ita componas vt hyeme
Maculas & Faculas limpidiffimè oſten-
dat in charta, ſi omnia immutata relin-
quas vſque ad initium Cancri, non idem
impetrabis à Sole æſtuali, quod hyema-
lis ſponte indulſit. nam totam baſin mi-
nus nitidam, & Maculas Faculasque lon-
gè nebulioſiores, atque hebetiores offe-
ret quam fecerat in Capricorno. Contra
idem præſtabit in Capricorno, ſi hoſpi-
tium rectè aptaueris in Cancro. Hæc
autem, teſte perpetua experientia, nun-
quam fiunt, niſi ſolius diſtantiæ muta-
tione, quamdiu enim eadem lentium,
tubi, atque chartæ diſpoſitio, eadem o-
biecti magnitudo, figura, ſitus, lux, co-
lor, atque diſtancia, manent &c. impos-
ſibile eſt, vllam omnino in tām ſmiſſa ima-
gine variationem euenire. igitur cum in
Sole tralucente baſeos qualitas ſtatis an-
ni temporibus mutetur, nulla circa tu-
bum mutatione facta, nulla Solis circa
figuram, nulla circa colorem, ſitum,
nulla circa magnitudinem intrinſecam,
oportet omnino hoc euenire à ſolo Solis
acceſſu & reſſu, quemadmodum in
omnibus alijs viſibilibus quotidiana ex-
perientia euenire videmus.

*Solis acceſ-
ſus & reſſus
alio ex-
perimento
probatur.*

Terriò. Idem Telioſcopium ſeruit ap-
prime ad comparandas Solis Lunæque,
& nonnullorum planetarum inter ſe ma-
gnitudines viſuales. nam ſicut Sol, ita
etiam Luna per eundem Tubum ſatis bo-
num iſdem retentis aperturis pulcherri-
mè intrat. id quod ego frequenter feci
vnde Lunam modo maiorem, modo mi-
norem

*Planetarū
magnitudi-
nes viſuales
Tubi bene-
ficio inter ſe
conferuntur.*

I.

morem, modo æqualem Soli reperies. Eadem arte, ipsas Lunares Maculas assequeris. Eadem arte, insigniorum quoque planetarum, præsertim perigæorum magnitudines tubo transmissas excipies, & cum Sole Lunaque conferes, sicut in Apelle meo, aliasque sæpe feci.

Quartò. Insignis quoque Telioscopij usus est ad obseruandas Solis, Lunæque Eclipses. In Solari Eclipsi Luna Soli, qua parte est subiecta, putabitur esse una magna Macula, nam nigredine simili pollet. Experientia sæpius comprobata.

Quintò. Quidquid autem Conuexum simplex, circa obiecta terrea operatur in immittendis speciebus, hoc idem operatur Telioscopium apte dispositum & applicatum. Vbi tamen nota, si ad hanc rem tubum adhibere fructuosè velis, oportere vitrum conuexum satis amplum, & aperturæ magnæ, & cauam lentem totius radij circa concursum capacem esse.

Sextò. Visa Solis & Lunæ magnitudo præsertim circa æquinoctia, & tempore meridiano solet indagari, Telioscopio. Si videlicet, dum Sol vel Luna diametrum sui circuli percurrit, interim minuta temporis currentia accuratissime obserues, ex iisdemque deinde minuta circuli elicias: nam sicut se habet dies naturalis, quem Sol in æquinoctio decurrit ad illa scrupula; ita se habet æquatoris circulus ad arcum, quem Solis diameter in Ecliptica subtendit. notis igitur tribus prioribus, innotescet quartum. Eadem fient circa Solstitia, sed quia illic paralleli diurni non sunt circuli maximi, qualis est æquator, erit procedendum proportionem quadam.

Septimò. Distantiæ obiectorum Telioscopio produntur, prout euident est ex Sole Perigæo & Apogæo. Si enim Sol idem ad eandem tubi diductionem suum discessum manifestat, diminutione visuali, & præsentatione obtusiore: si accessum contrarijs ostendit: si idem Luna in Apogæo, idem in Perigæo præstat, præsertim, circa magnitudinem, &c. nunquid hoc alijs planetis, alijs sideribus negabimus? nunquid in obiectis terrenis eadem fieri inficiabimur? contra manifestam experientiam? nunquid omnem in hoc negotio varietatem ad

II.

1 vnicum milliare Italicum, addo ad Germanicum, addo ad Horizontem sensibilem sine ratione & contra sensum restringemus? nunquid à milliario Italico, à 5 Germanico, ab Horizonte visibili, dicemus omnia obiecta visibilia eiusdem tenoris, eiusdem vigoris ad Tubum eundem sub apertura eadem, aut Tubum eundem ad omnia illa obiecta esse efficaciam atque potentiam eiusdem? prout 10 in suo Libripende nimis fidenter non nemo contendit. Etenim reclamatione natura, reclamatione Telioscopia, repugnant montes, diuersimode disiti, obmurmurant syluæ aliter & aliter distantes aspectu- 15 strui ad hunc finem arces, mare eiusdem fluctus, in eodem vela naualia, accessi nubes in aëre, applicavi Tubum ad Lunam, ad Venerem, ad Solem, ad Martem, ad reliquos tandem erroneos, denique ad sidera tam erratica quam vaga sed errorem hunc omnia refellunt; & aliter distantia, aperturam aliam exegerunt. Ratio est, quia omnia obiecta re- 20 mota per lentem conuexam transmissa aut aspecta, ceteris paribus, minorem requirunt elongationem eius quod species excipit, vicina maiorem appetunt. Vnde euident est, eandem diductionem 30 tubi eiusdem tam remotis quam vicinis non satisfacere.

Dices. Tamen dantur aliqui Tubi Optici tam boni, qui sub vna & eadem Tubi apertura ad omnia remota satisfaciunt: & ita stat adhuc suus alteri opinioni nervus.

Respondeo me non latere, id quod ex hactenus demonstratis satis elucet, fieri posse ut vnus aliquis Tubus, sphaeræ magnæ portio, inueniatur, qui sub vna inuariata apertura, & Solem & reliqua sidera admittat, id tamen doctrinam illam nil iuuare, qua negatur, Tubis optici obiectorum distantias argui. nam si 40 aliquis eiusmodi Tubus sit, qui ferat distantias siderum ut nunc se habent, certè non ferrer, si altero aut tertio tanto remouerentur; id quod in communibus Telioscopijs, quæ à tribus ad 4. aut 5. palmos longitudinis, extenduntur, vsuuenire solet. Vnde regula, quæ procedit ab experientia extraordinaria præstantissimi alicuius Tubi non valet, si extendatur ad Tubos omnes: communes enim 55 Tubi omnes aliam aperturam exigunt ad

Obiectorum
inter se di-
stantia à Tu-
bo differen-
tes, cogno-
scuntur.

ROSAE VRSINAE

III.

ad Lunam, aliam ad Iouis Satellites &c. Vnde consequentia ista, quam Astronomi de distantia Cometæ, qui an. 1618. apparuit, ex aperiendo Tubo sumpserunt ex hoc capite non inanis, sed; cæteris paribus, solida & efficax fuit.

Octauo. Eodem Tubo visuales siderum diametros satis præcisè æstimabis, & inter se comparabis, si semel ipsius capacitatem pro vno obrutu, exploratam habueris, in minutis primis. Tunc enim facile æstimabis, quod Tubi minuta capiat datum sidus, si artenderis quantam in eodem diametri partem occupet. Et licet hæc mensurandi ratio, eam quæ per intermissionem fit, certitudine non adæquet, superat tamen omnem illam, quæ Oculo libero, absque tubi ope sumitur. Quia oculus liber sidera non præcisè, sed confusa videt &c. & debito maiora facit &c.

Nono. Vnius ferme effectus eximij, quem Telioscopium facit oblitus essem; quod videlicet Solis & Lunæ horizontalis contractionem, & figuram quasi ellipticam ostendit, & deceptiones oculi circa apparentes horum siderum in vaporibus horizontalibus positorum magnitudines, necnon aliorum errores multo euidentissimè refellit.

Cum enim diameter Solis secundum latitudinem eiusdem magnitudinis semper appareat, seu mane, seu meridie, seu vespere per tubum intret Sol: siue in vaporibus constitutus siue extra visatur, seu magnus seu parvus, rotundus aut ellipticus appareat, vno tamen die, eiusdem mensuræ diametrum semper excipies. vnde euident est, apparentias non Soli aut vaporibus, sed alijs causis tribuendas. & Censorem vna cum alijs quibusdam sædum in modum hallucinari: vt suo loco ex professo ostendetur.

VSVS, ET PRAXIS FIGVRÆ
quarta, D, 1, & D, 2.

C A P. XXXII.

HArmoniam inter Oculum & tubum ostendi in prioribus, nunc ad vsum practicum venio. Telioscopij trium lentium, conuexæ, in D, 1. expressarum vsus hucusque ignoratus & insuetus, idem facit, quod

IV.

1 Telioscopium prius, F, 1. si lenti causæ quodammodo adhæserit aut valde vicina fuerit lens conuexa versus chartam; nam interuentu huius lentis, imago minuitur nonnihil & distantia chartæ abbreviatur.

Quod si lentem, d, ponas extra locum chartæ, i K, exhibebis tam Solis quam aliarum rerum picturas in charta obiecta situ pulcherrimo erecto, & maiores atq. sub distantia chartæ breuiore, quam fuissent exhibitæ à solis lentibus conuexis duabus, dempta caua. Et hoc naturæ secretum hæcenus nulli patefeci.

15 Nunc ad figuram, D, 2. progredior, in qua oculus, o p, ad Tubum opticum adhibetur, & ars cum natura copulatur. Tubus autem ratione vsus, & lentium atque obiectorum à me distribuitur in Telioscopium & Helioscopium. Telioscopium intelligo ex vitris diaphanis compositum, & ad omnia visibilia, præter Solem accommodatum. Helioscopium voco Tubum è lentibus coloratis, Solis fulgori attemperando opportunis, adornatum.

Iam Oculus Telioscopio more solito applicitus, omnes res intuetur situ erecto, magnitudine & claritate maiore, quam alioquin accideret. secundo, Ad res diffitas est contrahendus, ad vicinas ampliandus; si quidem distinctè in eadem intendere gestiat. tertio, idem facit directus in Lunam, & ab hac in Venerem præsertim apogæam; & ab hac in Martem aut Ionem, aut Saturnum. Nam prout inter se hi planetæ distant, ita etiam tubo diducto vel contracto opus est, si, vt dixi eosdem distinctissimè contemplari velis. Nam eadem atque inuariata Tubi boni apertura, posse videri distantia atq. vicina, certum est: sed certum etiam est non posse videri claritate & distinctione eadem; & certum quoque est, si oculus idem velit omnia, & singula obiecta tam proxima quam vicinissima obire distinctione, & claritate eadem, omnino oportere ad diffita contrahere Telioscopium, ad prope posita, amplius diducere. Huius rei experientiam ab inuento tubo habeo constantissimam: nam si Iouis Comites, exempli causa distinctius aspexi, & eundem deinde tubum omnibus inuariatis in Lunam deduxi, non ita seruiebat huc, quemadmodum illuc

Modus ad
aus species
erigendi

Vsus oculi
cum Telioscopio.

Res à visu
& inter se
notabiliter
diffita, eadē
Tubi apertura
distinctissime non
videntur.

Tubus fallax
etiam circa
Solem in vaporibus
visum admis-
sam, detegit.

Trium len-
tium in ob-
seruando So-
le vsus.

I.

illuc, sed amplius fuerat diducendus. Idē à Ioue ad Canem maiorem directus, vt distinctam ipsius visionem efficiat, contrahendus est. Et hæc experimenta cuiuslibet quotidie sunt obuia. Vnde certum est, obiectorum distantias differentes, ex huius contractionis atque productionis necessitate, rectè concludi atque statui, quidquid nonnulli frustra & malè in contrarium tendant. tametsi certum quoque sit, dari quosdam tubos tam perfectos, qui vnica etiam apertione omnibus obiectis, atque oculis omnium satisfaciant; obiectis inquam, prout se nunc habent; fieri enim potest, vt aliqua ita Deus à nobis separaret, vt etiam distantia illi, Tubus datus non sufficeret. Interim tamen non contendo, distantiarum differentias ex eiusmodi Tubo statim in specie aut indiuidua mensura sciri debere aut posse: sufficit sensibiliter à Tubo indicari magis aut minus distare, cæteris paribus.

Quartò. Si oculum à caua lente Tubi reducas omnibus alijs inuariatis, minues semper obiectum, & tandem amittes præ exiguitate, & situ euertes, in distantia satis longa. nisi Tubi sint valde breues. Quia sicut lens conuexa erigit in charta, sic oculus euertit rem visam in Retina, vbi ad talem distantiam discessum est, vt pictura ab humore crystallino efformata, sedem Retinæ occupet: quod tandem fieri debet recessu, in quo sicut lentis à caua distantia augetur, ita chartæ discessus imminuitur; quod idem cum fiat ab humore crystallino, tandem ad talem locum deuenietur, in quo concursus ordinatus specierum retinam consequatur.

Quintò. Si huius Tubi conuexam lentem ita tegas, vt nil nisi paruulum foramen apertum relinquant, Oculus cauo applicatus, Solem feret; ratio à prior, quia omnes alij radiosi coni, qui ab alijs lentis conuexæ punctis arradiassent, & sic speciem fulgidiorē atque oculo intolerabilem effecissent, sunt exclusi; & sic oculus quodlibet Solis punctum in tanta distantia sensibile percipit sub vno quasi sensibili radio ad se delatum, vnde Solem sine damno & formidine perlustrat. quæ res vti visu digna, ita speculatu admiranda offert.

Nam primò. Totus Sol tenuis & de-

II.

bilis apparet.

Secundò. Margines non mundos, sed in tenues veluti radios & molliter asperatos offert.

Tertiò. Splendor circum circa ad margines debilissimus, & subobscurus, atque nebulosus visitur, tum sensim versus centrum accedendo, illustrior atque lucis densioris purgatorisque euadit; circa medium tandem fulgentissimus existit. Et hæc fulgoris differentia semper animaduertitur, siue immixtas aperturam conuexi, siue amplius Fulgor quoque non candidus, sed magis igneus apparet.

In hac quoque splendoris attenuatione, figura & circuli Solaris magnitudo sensu eadem perseuerat. Maculæ & Faculæ nullæ prorsus discernuntur. Et ne oculi fallaciæ hanc rem adscribas, eadem & modo eodem omnia per Telioscopium in chartam traduces. eadem, & eodem modo omnia experieris, si Solem per nudum minutissimumque foramen, imo quasi punctum transmissis. Imo similia dabit, immixtus per tubum in chartam Sol, sub apertura valde parua, &c.

HELIO SCOPIVM,

& eius usus.

Voco omne instrumentum ex lentibus coloratis ad Solem indemni oculo contruendum fabrefactum, Helioscopium. Quotcunque verò modis res aliæ per vitra & instrumenta diaphana artificiosè spectantur, tot etiam Sol per Helioscopia lustrari potest. Siue conuexo vno; seu concauo & conuexo; seu conuexis duobus; siue denique pluribus artificiosè constructis; prout hactenus fusè satis est declaratum.

Vsus & praxis istiusmodi Helioscopij est, omnia quæcunque in Sole sunt intueri & patefacere, siue ea sint partes Solis illustriores, quas Faculas, seu obscuriores quas Maculas & umbras nominamus; siue denique figura, magnitudo visualis, & perimeter, siue Solaria deliquia in considerationem veniant.

ROSAE VRSINAE

III.

COLLIGENDA.

Primò. Ex his tam varijs & tot obseruandi modis, stabilitur solidissime Phænomenon solare, contra pertinaciam quamcumque humanam; nam si quis, cum ratione, vti dicitur, insanire velit, & rem negare, non quia eandem non esse sciat, sed quia esse fateri nolit: cum hoc mihi bellum non est. iudicio certamus, non affectu: veritatem quærimus, non victoriam. Reponatur Tabula magna, in qua A, est Telioscopium in Solem B, per nebulam directum. En primum Solis obseruandi modum Ingolstadianum.

D, est Helioscopium in Solem E, purum emissum. En modum alterum.

F, est Sol per foramen liberum G, exceptus in chartam H, loco tamen obscuro; en modum tertium.

I, est Sol in speculum K, planum incidens, & ab eo in L, reflexus, atque Maculas exhibens. En modum quartum.

P, repræsentat aspectum Solis I, in vaporibus constituti liberum, & visas in illo Maculas. Ecce tibi quintum Solis obseruandi modum.

Q, est Sol per lentem conuexam R, immixtus in chartam obiectam S, ibique Maculas suas obscuro loco explicans. En modus sextus.

V, est conus radiosus Solis per tubum X, seu conuexa & caua, seu duabus conuexis lentibus compositum, in chartam Y Z, sub circulo obseruatorio c d f g, exceptus. En modum septimum, eumque non simplicem sed varium.

Qui Solare Phænomenon tot visum, tot videndum modis, non videt, aut oculis aut mente captus est. Cætera suis locis explicabuntur melius.

Secundò. Ex disputatis hucusque constat etiam, species visibiles seu colorati seu lucidi esse non tantum veras res, sed etiam videri. & consequenter speciem coloris intra obiecti visibilis adeoque latitudinem coloris contineri, & speciem lucis esse lucem vel lumen in aëre; &c.

Nam omne quod tanquam obiectum proprium ab oculo percipitur, vel lux vel color est.

Tertiò. Sol per Telioscopium non tantum maior in Chartam affulget, sed etiam

IV.

ordinariè lucidior. Patet experientia quotidiana.

Ingolstadij enim omnes obseruationes sub libero dio feci intromisso Sole, &c. quod non fieret, si basis solaris non tantum maior, sed multo quoque illustrior, quam esset circumstans Solis iubar, &c. & ratio à priori. Quia quo maior est conuexæ lentis apertura, hoc semper fit illustrior Solis imago; cum enim totus Sol in quodlibet illius superficiei punctum colligatur, ex eoque rursus in basin communem, quam circulus obseruatorius insidet, diffundatur: patet totum Solem toties in illam basin effundi, quot sunt in apertura lentis assignabilia puncta. Certum vero est, in ampliore lentis detectione plura puncta esse Solis collectiua, quam in arctiore. Vel, si maius, è radijs solaribus ab vnico Solis puncto profluentibus argumentari, idè hac ratione efficies. Maior lentis conuexæ detecta superficies accipit plures radios ex vno puncto allapsos quam minor, quia ipsa fit basis maioris penicilli, quam superficies minor. igitur cum beneficio refractionis omnes isti radij denuo colligantur in vnicum punctum, ad basin communem stationis ordinatæ, inde fit, vt simul fortius repræsentent speciem, quam si pauciores fuissent, sub detectione minore. Hinc.

Quarto. Datur ratio, Cur obiectum quoduis à Telioscopio illustrari videtur, non tantum ampliari; quia si obiecti aliquam partem libero oculo intueor, ex vno illius puncto plures in pupillam meam radios non haurio, quam ipsiusmet pupillæ capacitas admittit, reliqui omnes extra diuergunt alio; Tabus autem longe plures alios quos capit refractione in pupillam deducit, &c. quo autem oculus vnum punctum visibile per plures radios haurit, ita certum est, illustrius ab eodem videri: quia pictura in retina ad videndum determinans, ex confluxu plurium radiorum in suis punctis est illustrior. Quod autem decepit nonneminem, est, quod totum obiectum, Luna v.g. dum sub maiore magnitudine per tubum spectatur, ex illa quasi explicatione partium, apparet luce magis dilutum; sicut è contra inuerso tubo, si aspiciamus obiectum remissè illuminatum, eadem opera sub multo minore apparente magnitudine, videbimus quasi intesum ex illa veluti partium conflatione.

Quin-

I.

Quintò. Rursus, ex eadem fonte desumitur ratio species visibiles ita fortes introducendi, ut etiam aperta fenestra nequaquam diluantur, sed perbene perspiciantur; &c. id quod amplis lentibus assequeris. res certa, & visenda.

Sextò. Ex eodem capite artifices adhibent specilla conuexa, ut res minutissimas tanquam maximas & illustrissimas intueantur, & in aptam partium proportionem discescant: sic videmus incisores æris; sic gemmarum & sigillorum effectores; sic minutiarum tornatores, oculum munire, & in rerum alioquin poene inuisarum, aspectum venire.

Curiosa & abstrusa quæstiones soluantur.

Septimò. Plurimæ abstrusæ & curiosæ quæstiones expeditè solvantur. Quare enim aliqui sunt, qui vicina non bene discernunt, nisi valde prope oculum admoveant? Quia eiusmodi homines habent humorem crystallinum nimis globosum, qui proinde rerum plusculum dissitarum species nimis cito contrahit, ita ut statio imaginis ordinatæ tunicam Retinam non assequatur, quod tamen fit, accessu obiecti ad visum, sic enim illa statio producit. &c.

Quare aliqui conuexis specillis non iuuantur, si naso, ut fieri solet admoveant, iuuantur tamen si amoveant? quia specilla conuexa humori crystallino proxima, speciem visibilem nimis & ultra Retinam propagant, amota curtant, donec tandem in eandem sistant. Et tales sunt ordinariè Miopes.

Quare aliqui conuexis remotis non iuuantur, quibus, si oculo apponant, acutè cernunt? Quia specilla conuexa ab humore crystallino remota, speciei picturam abbreviant & citra Retinam finiunt in humore vitreo, eadem admota ad crystallinum eiusdem concursum propagant, quoadusque in Retinam collocant. Et tales ordinariè sunt Presbytæ.

Quare aliqui specillo conuexo usitatè adhibito, obiectum distans non vident, vident autem valde propinquum? Quia obiectum distans picturam ante retinam finit, propinquum longiorem protrudit, & sic videndi Organum, Retinam videlicet, assequitur.

Quare specillum cauum, rei visæ situm in oculo nunquam euertit, sicut conuexum solet? Quia cauum radios nū-

II.

1 quam colligit, sicut conuexum facit, sed semper eodem modo & ad vnam partem dissipando proijcit, & humori crystallino tradit.

5 Quare cauum obiectum semper præsentat, etiam remotum ab oculo, sed eo minus, quo remouetur amplius? Semper repræsentat, quia humori crystallino semper confusas species tradit, & quia remotio facit, ut medijs tantum radij, & directiores, ad pupillam perueniant, alijs dilatatione gratis euolantibus, inde fit, ut res semper minor, minorque præsentetur & videatur.

15 Quare fit, ut aliquando per cauum oculo propinquum nihil videas, videas autem idum illud paulisper amoveas ab oculo? Quia specillum propinquum rem obiectam in basin ordinatam colligit trans Retinam, nonnihil remotius, eandem curtat, & in Retinam debitè coordinat.

20 Quare aliqui cauis valde acutis, aliqui valde hebetibus, aliqui mediocribus iuuantur? Quia pollent crystallino maxime, minime, & mediocriter globoso: primi indigent primis, secundi secundis, postremi medijs; quia valde acuta speciem obiecti ordinatam multum prolongant, quam crystallinus paruus & valde globosus breuissimam facit; minime globosus, satis longiusculam, & ob hanc rem, acuto satis remisso optime iuuatur; medijs medijs delectantur. Et hi omnes ex Miopum genere sunt.

35 Quare alioqui etiam cauis acutissimis videntes, nihilominus tamen rem videntam oculo quam proximè admouent? Quia eiusmodi humines nacti sunt humorem crystallinum aut nimis globosum qui etiam adiutus à cauo pro proroganda specierum ordinata sede in Retinam, eandem tamen non assequitur; quia

40 vero obiectum vicinius longiorem basin proijcit;

hinc ipsius ad oculum

accessu,

species

tandem sufficienter produci-

tur, & picturam bonam

in Retinam col-

locat.

ROSAE VRSINAE

III.

DE TELIOSCOPIO

*observatoria ordinando, & seli-
gendis, debiteque impo-
nendis lenti-
bus.*

C A P. XXXIII.

ANTEQUAM ad circulum observatorium designandum progrediar, oportet paucis explicare conditiones lentium pro Telioscopio observatorio, & modum easdem debite in tubos collocandi.

Expono autem hic Telioscopium observatorium ordinarium, quo haecenus usus sum, & utuntur alij, quod non pluribus quam duabus constat lentibus, quarum convexa Solem, concava chartam spectat.

Quoniam verò in ordine executionis practicae, necessarium est habere lentes, necessarium quoque est easdem in Telioscopium recte impositas, necessarium illud idem in retinacula debite impositum atque firmatum esse prius, quam ullam operi exercendo manum admoveas; idcirco praeterea quae hucusque generatim de lentibus differuimus, nunc ad magis particularia Telioscopij descendemus: idque in gratiam Tyronum potius, quam in hisce rebus exercitatorum.

*Telioscopij
partes & co-
positio.*

Telioscopium igitur ob efficaciam atque perfectionem res visibiles in obiecta charta distincte representandi ita dictum, constat partibus materialibus & formalibus. Materiales sunt, tubi, annuli, opercula; formales duae lentes, convexa & concava. Tubi Telioscopij possunt esse multi vel pauci, longi vel breves, ampli vel graciles, pro magnitudine atque efficacia lentium. Nam lens ampla, requirit tubum amplum, parva angustum, & sphaerae magnae segmentum, longum, &c.

Materia harum arundinum potest esse vel chartacea, vel lignea, vel metallica: prout animus, vel sumptus cuiusque tulerit. Ita debent esse sibimet subordinati ut minimum & intimum occupet lens caua, convexa maximum & supremum; omnes ita appositae fabrefacti, ut minoris convexa superficies cylindrica maioris concavam adaequet; sic

IV.

enim fiet, ut sibi omnes strictè haereant, & aperti non aliter atque unus in directum rigescant; quod si luxi atque elumbes labascerent, lentes excentricae fierent, & circulus solaris vitaretur: id quod sedulo est cauendum.

Annuli vel chartacei vel lignei, aut Metallici, habent usum triplicem. *Annuli Te-
lioscopy.*

Primò. Ut lentes hinc & inde, ante, & pone, firmiter contineant. unde interiores plerumque solent agglutinari, exteriores autem ita aptari, ut arcuè intrusi lentem custodiant, in casu tamen necessitatis eximi valeant, ad lentem vel purgandam, vel mutandam.

Secundò. Ut requisitam lentibus, praesertim convexae detectionem manifestent, atque conseruent. Quævis enim lentes, detectione certa & commensurata gaudent, hanc semel cognitam conseruant in medio excisi circulariter annuli. Prout autem lentes erunt elaboratae, ita maius, vel minus foramen apertum patientur. de qua re paulo post habebis regulas practicas. nunc officia & usum annulorum prosequor. quos proinde multos & diuersimodè apertos esse oportebit, ut appareat, quis illorum maximè idoneus existat, id quod oculus ex solari in chartam coniecto circulo optimè dijudicabit.

Tertiò. Ad tenebras tubo iniiciendas, & radium Solis purgandum, profunt etiam annuli, si certis tubis, praesertim intimo & minimo ita pertusi imponentur, ut coni radiosi extrema radant, non carpant, in profundum multum intrando; sic enim lucēs superfluas subingressas, & radios maligna refractione vagos, arcebunt, atque ad imaginis solaris munditiem plurimum conducent.

Quæres, primò quanto circulo excindendi sint isti annuli?

Respondeo, eum qui arundini minimae imponitur, posse esse paullo maiorem, circello solari in caua lente fulgido. qui verò penultimae, paullo minorem, circulo convexae lentis patenti. qui verò medijs arundinibus imponuntur, proportionem ad extremos habita incedere.

Ratio, quia cum radius Solis prouehatur in modum coni, cuius basis est patulus convexae lentis circulus vertex autem post lentem cauam desinat, patet omnium istorum

I.

istorum circularum minimum esse in caua, reliquos pro distantia inter minimum & maximum crescere, &c.

Quæres secundo. Vbinam isti circuli excisi sint collocandi? Respondeo, In arundine minima posse vbiuis consistere; quia cum illa sit vacua ab alio sibi immitendo tubo, potest loco quouis insertum annulum recipere: reliqui intermedij non habent locum nisi in orificio ultimo versus obiectum spectante; alterum enim arundinem minorem intrusam excipit; quæ annulum in interiora receptum, clauso Telioscopio extrusum non pateretur, hære in medio, &c. Annulorum etiam istorum vsus est iste, vt totus cylinder obseruatorius fortior existat & firmior, atque rectior conseruetur. Huc quoque reuocatur illa vtilitas, vt lentis concauæ diaphanitatem lateralem, si quæ esset, arceant. nam in hac lente, præter superficies cauas; aut cauam, & planam cavitati commensuratam, transpicuum oportet nihil esse: cuius si quo casu contrarium eueniret, cauetur similibus vtrinque applicatis annulis, prout vsus ipse melius edocebit.

Opercula
Telioscopij.

Nunc ad opercula Telioscopij venio. Sunt ea excogitata, pro munimine lentium atque adeo totius Tubi. Etenim non tantum à puluere lentes, sed multo magis ab iniuria & vi totum Telioscopium defendunt. Sunt autem duplicis generis: alia namque sunt plana orbicularia, orificijs Telioscopij ante & pone arcè intrudi solita: alia sunt in modum cylindri, altera base clausi efformata, arundinibus superingeri consueta. Materia constant eadem, qua Tubi ipsi. Atque hæc de partibus Telioscopij materialibus breuiter dicta sunt; nunc ad formales seu lentes me reuoco. hæc enim dant formam, & Tubum veluti animant; atque ad harum normam, vt dixi tota materialium partium, magnitudo, multitudo, longitudo est desumenda, &c.

Telioscopium igitur ordinarium, non constat nisi lentibus duabus; conuexa & concaua: de bonitate, de vitijs, de natura atque effectibus illarum in genere satis multa dixi, nunc oportet ad magis specialia descendere, illasque in ordine ad praxim & obseruationem examinare, idque per problemata quædam

II.

practica. Vbi præmonuero, non omnem lentem cauam cuiuslibet lenti conuexæ ad vsum æque accommodam, sed alias alijs conuenientiores reperiri.

PROBLEM. I.

LENTIS DATÆ CONVEXÆ LOCUM imaginis ordinatæ, seu stationem baseos communis specierum ordinatarum practicè seu mechanice reperire.

Per lentem datam immitte species vel Solis vel rerum aliarum in chartam; locus enim chartæ species distinctè representantis, est locus imaginis quæsitus. Aliter; per lentem datam aspice obiectum quodcunque, donec in locum confusio- nis incidat oculus; quo facto, crystalli- nus oculi tui humor, occupabit verum imaginis ordinatæ seu chartæ locum. Veritates harum assertionum satis constant ex demonstratis. Locorum hac ratione inuentorum distantias à lente caua facile notabis in aliqua certa & stabili mensura, vt vsui sint deinde pro sequentibus.

PROBLEM. II.

Lentis datæ concauæ locum seu distantiam à data conuexa practicè assignare.

Locus conuexæ per prius problematione repertus, assignabit locum cauæ: nam, vt demonstraui in prioribus, locus cauæ habetur paullo ante stationem baseos communis ordinatæ. Hinc patet locum lentium cauarum non esse æstimandum penes ipsam cauarum potentiam, sed penes concursum communem lentis conuexæ, adeoque si locus pro vna habeatur, haberi pro quauis ad sensum. Non sum ignarus, aliquantulam locorum & distantiarum mutationem interuenire, variarum vsu lentium; nihilominus tamen, etiam hoc noui, vltimam communem à lente caua non ex- curri.

III.

Obijcies; tamen si caua acutior adhibetur in Telioscopio, diducenda semper est arundo sensibilibiter. Ergo omnium cauarum ad eandem lentem conuexam non est vnus sensibilibiter locus, sed plures. Respondeo; concesso antecedente, nego consequentiam; quia quod cauae acutioris vsu, diducendus sit tubus si accedat oculus, hoc non fit, quod ille locus pro illa caua non sit aptus; sed quod oculus percipiendae speciei in illa cauae lentis statione sit inidoneus; quod ideo fit: quia vt in prioribus demonstraui, lens acutior in eadem statione ad eandem conuexam, proijcit basin communem longius quam hebetior. igitur si oculus Tubo vsus sit sibi opportuno, necesse est speciem seu picturam ordinatam Retinae conuenisse; iam si acutius accedat vitru, eadem producet, ideoque oculus vel nil vel parum videbit: quare? quia pictura trans Retinam excedit: igitur vt eadem reuocetur, diducendus est quantum oportet tubus. quae omnia in charta locum non habent; cum, quod disparitas rationis ex eo intercedat, quod ante cauum non praefigamus aliud conuexum hoc loco, tractamus enim Telioscopium ordinarium; tum quod chartae recessu, species ordinata & munda habeatur vt prius, & aliquanto maior. si quis autem vellet eandem chartae distantiam immotam retinere, tum omnino necesse esset, cauum aliquantisper a conuexo amouere, hac enim ratione imago contraheretur, & in chartam munda depingeretur; sed hoc non ideo eueniret, quod prior cauae situs ineptus esset ad representandum, sed quod charta inidoneo loco ad recipiendum; id quod experientia vtrobique manifestum facit. nam charta retracta, semper picturam elegantem excipiet, etiamsi tubi ductio non fiat. Quod amplius confirmatur experientia; nam si lens eadem ad conuexam accedat amplius, tamen imaginem distinctam proijciet in papyrum: quanto ergo amplius, in statione remotiore? &c.

PROBLEM. III.

Longitudinem Tubi, ad datas duas lentes conuexam & concauam, practice assignare,

Distantia lentis concauae à lente conuexa

IV.

per Probl. 2. reperta, dabit longitudinem tubi praecisam. Quia tamen arundo arundini est inferenda, longitudo paullo maior etiam erit assumenda. Praeterea cum saepe accadat vt concaua multae virtutis adhibeantur, ideo bonum est, si longitudo talis adhibeatur, qualis multis lentibus vsui esse possit.

PROBLEM. IV.

Ad datas lentes, conuexam & concauam, distantiam chartae practice assignare.

Distantia chartae à lente concaua melius & securius assignatur practice & Mechanice, quam Theorice & speculatiue. quia haec res scientificè tractari nequit, absque perfecta refractionis scientia & doctrina. Scientiam huius rei plenam & exactam hactenus non vidi, doctrinam hic de ea re fusam instituere, esset confundere alieno loco materias; vt taceam, de singularibus scientiam non dari, sed sensum potius consulendum esse. vnde namque scies datas lentes esse recte formatas, esse talis vel talis figurae, sphaericitatis, potentiae, &c. nisi à sensu & laboriosissimo experimento? vnde enunciabis bases communis pro ordinata pictura stationem, quam ex ostensa in charta imagine? vnde vero imaginem discernes, elegans an turpis, mundane an faeculenta existat, nisi per interiectam chartam.

Quare in ordine ad praxim expeditam, haec mechanice breuius, citius, atque securius expediuntur, quam si ex multis praeeptionibus Theoricis procedamus; quae ipsamet tandem vel suam laudem reportant, vel vituperium auferunt ab iisdem, quae modo persequimur experimentis. imò, quod amplius est, ad scientiam solidam perueniri est impossibile, humanitus, nisi prauijs innumeris sensus experientijs: haec enim viam aperiant, & intelligentiam quasi manu ducunt, ad multa abstrusa & mirabilia eruenda. Itaque distantiam chartae à lente concaua habebis optimam, quando oculo iudice picturam optimam expressam in eadem conspexeris. quam diiudicabis, chartae ad motionem ad cauam lentem & remotionem ab eadem: videbis enim hac ratione, in quanam statione pictura

I.

tura omnium nitidissima occurrat; & illam utiq. seruabis ad tuum propositum.

PROBLEM. V.

Isdem tubi lentibus imaginem obiecti augere.

Admoue lentem cauam ad conuexam, remoue chartam à caua, quantum satis est per Probl. 4. & assequeris intentum.

PROBLEM. VI.

Isdem tubi lentibus imaginem obiecti minuire.

Amoue lentem cauam à conuexa, (ita tamen, ne locum euerfionis transilias) admoue chartam ad cauam, donec satis est, per Probl. 4. & voti compos efficiaris.

PROBLEM. VII.

Isdem lentibus eandem imaginem in charta semper equalem presentare.

Si obiectum seruat eandem sensibilem distantiam à Tubo, facile est eandem sub magnitudine eadem picturam exhibere. retentis etiam omnibus distantijs immotis habetur intentum.

Si obiectum discedit, sensibiliter, certum est, immotis omnibus alijs, Tubo, lentibus in tubo, & charta, imaginem non tantum minorem, sed etiam confusorem pingi, quia obiectum sensibiliter abscedens, projicit conum post conuexam breuiorem, vnde caua respectu huius imaginem minorem, & ad chartam immotam confusorem transmittit; cui rationi suffragatur perpetua experientia. Remedium est, vt lens caua ad conuexam accedat, donec imago æqualis & formosa in chartam affluat.

Si obiectum ad Telioscopium sensibiliter accedit, certum est augeri picturam ob rationes contrarias prioribus, quia concursus vltra cauam prorogatur, & sic caua conuexæ vicina imaginem ampliat in chartam, adeoque non debite distantem confundit &c. cuius contrarium fiet, si caua à lente conuexa sensum

II.

discedat, donec omnia vt prius limpida & æqualia euadant. Et sic eiusdem magnitudinis picturam retinebis, in distantia quacumque &c.

Et hoc artificio sub eiusdem Circuli obseruatorij æquali capacitate, excepti semper tam brumalem quam æstiualem, tam perigæum, quam apogæum Solem.

COROLLARIUM.

Ex his euidens est, eundem numero tubum seu Telioscopium & esse & dici debere vnū, quamdiu lentes numero eadem inhærent, siue tubus diducatur siue contrahatur amplius. Nam apertura maior vel minor, intuitus distinctior vel confusior, clarior vel obscurior alium numero tubum non facit. Quia quod oculus alius atque alius, aliam aliamque aperturam requirat, id ad alium aliumue tubum constituendum nil facit, sed est ex incapacitate oculi, cuius tunica Retina si tatum remoueri aut adduci ad crystallinum, vel crystallinus ad ipsam posset, quantum pro statione ordinata tubi satis est, omnia bene haberent. Telioscopium enim imaginem optimam etiam tum pingit, cum oculus nullus quidquā per illud apprehendit, immediate applicitus: quod probatur duabus experientijs euentissimis: altera est, si lentem cauam à conuexa in tantum amoucas, vt quasi in locum euerfionis conuexæ cadat & imagines paruas sub distantia breui exhibeat, tūc applicitus oculus parum vel nil videbit, ratio à priore, quia in humorem crystallinum ordinatæ species receptæ confundunt in Retina picturam.

Experientia altera desumitur per ipsum oculum; nam si oculum applies in ead statione circiter, in qua charta excipit rerum obiectarum imagines confusæ, intuebitur oculus easdem, sed situ contrario, neque simul, sed per partes. Vno verbo, oculi humor crystallinus applicitus loco chartæ, speciem distincte pingentis, semper contrarium effectum producet. vnde tantum abest, vt ex oculi arbitrio Telioscopium pro rebus representandis constituamus, vt potius omnem eius vim & naturam ex hac regula destruamus.

Quod

Idem numero Tubus ex isdem numero lentibus constituitur, non ex apertura diuersa.

III.

Quod amplius confirmatur ex vnica lente conuexa: quæ semper obiecta inæqualiter diffita, inæquali efficacia in conspectum adducit. Igitur qui Telioscopium ex diductione atque contractione maiore vel minore, ex præsentatione clariore vel obscuriore, vult aliud atque aliud efficere, is eadem ratione ex eadem numero lente, ex eodem numero oculo faciet oculos plures, faciet lentes plures; nam eadem lens simul & semel alias res clarè, alias confusè refert; idem oculus alias malignè, alias expressè percipit: item eæ quæ per axē aut radios axi vicinos accidunt, multo syncerius percipiuntur ijs, quæ radijs in latera decliuis visuntur, &c. & tamen ob hæc causas, nullus qui opticam vel à primo limine salutauit, inferet eandem lentem fieri diuersam ex diuerso representandi modo, aut oculum, vel humorem oculi crystallinum alium effici, ex alio aliò que rerum aspectu.

Et cōfirmatur multo amplius, ex euerso & recto specierum situ, per vitrum idē conuexum, quod vi refractionis ista alioquin inter se contraria operatur, vnum idem que permanens: sic & Telioscopium idem cum sit, multo diuersissima posse atque operari censendum est. &c.

DV BIA PRACTICA.

Primum Dubium. An lens conuexo-plana aptior sit huic negotio, quam vtrunque gibba?

Respondeo. Videri præferendam planoconuexam. Quia minus refringit radios Solis, & mundius colligit in basin. communem rerum visibilium species. patet ab experientia, & ratio desumitur à refractione minus violenta; quia superficies plana lineas radiosas indulgentius tractat, quam curua; hæc enim immitius illas frangit.

Secundum Dubium: An lens caua vtrunque sit commodior, quam cauoplanæ.

Respondeo. Cæteris paribus, semper præferendam concuoplanam. Ratio eadem quæ prius, ob euitandam magnam refractionem. Quia tamen quandoque opus est habere cauam magnæ virtutis, ea compensatur, si inducatur vtrunque cavitatis virtutis mediocris.

IV.

Quod autem hoc necessarium sit, ex eo euincitur. Quia si lentem ex vna tantum parte cauam potentia maximæ adhibeas, illa non potest esse nisi sphaeræ minimæ portio: quam si adhibeas ad conuexum sphaeræ magnæ segmentum, penicillum, radiosum à conuexa in cauam allapsum, maius erit, quam vt totum simul ab eadem capiatur: vt ergo locum habeat, assequeris si accipias cavitates duas sphaerarum maiorum, quæ simul adæquabunt vnā sphaeræ minoris cavitatem, & simul tamen, maiore basi circulari aperientur.

Tertium Dubium. Qua ratione practice vis lentis cauæ cognoscatur, maior n minor sit, quam alterius?

Respondeo. In genere, omnis lens caua acutior, certo quodam modo, videtur plus posse, quam caua hebetior. Dixi certo modo. Nam omnibus paribus positis, caua sphaeræ maioris plus potest, quam caua sphaeræ minoris. Omnium enim sphaerarum portiones similes, seu caua, seu conuexæ, sunt inter se vt earum sphaeræ. Certum autem est, maiore sphaeram in præsentando plus posse minore. &c. propterea dixi, lentes acutiores plus posse hebetioribus certo quodam modo; nimirum vt imaginem obiecti maiore reddant tui distantia breuiore, id quod in hac praxi sæpe quæritur; addo quod sæpe etiam fortiolem, quia minor lens Solem sub maiore portione refringit quam maior, &c. Igitur talem lentis potentiam discernes hoc modo. Accipe duas lentes, & æquali ab oculo distantia obuerte versus vnum obiectum, quæ maius refert, erit hebetior, quæ minus erit acutior. si æquale, erunt æqualis virtutis. &c.

Quartum Dubium. An perinde sit, lentes breues seu minorum sphaerarum adhibere atque longas, seu maiorum?

Respondeo. Non esse perinde. Nam longæ lentes, cæteris paribus, melius & distinctius representant, quam breues; deinde minus negotij à refractione causant.

Quintum Dubium. Quam longi debeant esse ad obseruandum Solem tubi?

Respondeo. Hanc rem esse sitam in voluntate & arbitrio cuiusque; & modū, sicut

I.

sicut in omnibus rebus, ita etiam hic tenendum, & mediocritatem etiam in hoc negotio auream futuram. Nam tubi nimis longi, sunt difficulter tractabiles, propterea quod instrumentum observatorium longum, & consequenter ne inflectatur, satis robustum atque magnum exigant: deinde quod Solis motum valde concitatum experiantur; Tandem, quod lentis cauae capacitatem sufficientem vix inueniant, & eiusdem vitia in Solis imaginem nimis patenter infundant.

Vicissim lentes nimis breues, raro ita mundè ita distinctè, prout quæritur, rem offerunt; deinde aut nimis refringunt; aut nimis paruum Solem exhibent, minutiasque occultant; Solemque diu sub eadem apertura non ferunt.

Mediocrates igitur pro praxi quotidiana præcellunt. quam longi autem sunt hi? Tubus quo triennio isto Romæ Maculas observaui, est longitudinis quatuor circiter palmorum Romanorum, cuiusmodi communiter solent fieri & haberi, quia seruiunt tales tubi ad omnia obiecta tam terrestria quam celestia. Non interim nego, observationes etiam exactissimas fieri breuioribus & longioribus, prout suis locis indicabitur. Vniuersim, tubi mediocres, quos à tribus ad plus minus, palmos Romanos extendo, maximum in hoc Phœnomeno observando usum habent.

DE CIRCVLO SOLARI & observatorio, eorumque difficultates.

CAP. XXXIV.

ALIVD est Circulus Solaris, aliud Circulus observatorius. ille est coni radios Solaris recta sectio, seu basis, hic illius in charta descripta sedes. vnde oportet ambos, commensuratos sibi atque æquales esse, ex quo difficultas oritur, vndenam hæc æqualitas & quomodo sit instituenda? Etenim si ad certam magnitudinem determinaveris circulum observatorium, difficultatem senties ex parte Telioscopij; quia non omne Telioscopium statim obsecundabit proposito tuo, & basin suam ordinatam accommodabit dato circulo, sed vel excedet, vel excedetur.

II.

Quod si consilium à Telioscopio petes, rursus in difficultates incidēs: quia basis ordinata ex Tubi optima diductione resultans, non statim erit magnitudinis eius, quam tute tibi præfixisti. Dato tamen, quod accurrat in data amplitudinis ratione: nihilominus occurrant sæpe incommoda alia ex eo, quod vel Maculae & Faculae minus perfectè conspiciantur, vel intercapedo inter cauam lentem & chartam tanta non sit, quanta ad praxin observandi requiritur. Quamobrem, ut omnibus difficultatibus occurratur, sit

QVÆSTIO I.

*Vtrum ad praxim observandi, melior sit
Circulus observatorius maior,
an minor?*

Respondeo, Circulum observatorium maiorem præferendum esse minori.

Primò. Quia maior exactum numerum tam Facularum quam Macularum, etiam minimarum refert.

Secundò. Quia figuras omnium distinctè refert.

Tertiò. Quia nucleos, & circumfusas illis nebulas, Faculasque vel adiunctas, vel emicantes ex medio, accuratè distinguit.

Quartò. Quia Macularum & Facularum differentias, raritates, densitates, intensiones, remissiones, æquabilitates & difformitates ad vnguem exhibet.

Quintò. Quia indicia generandarum, & veltigia desitarum manifesta ob oculos ponit.

Sextò. Quia Augmenta & decremēta tam Macularum quam Facularum, modo cita, modo tarda, aliàs magna, aliàs parva, pulcherrimè ostendit.

Septimò. Quia ortus & occasus Macularum & Facularum tam Physicos, quàm Astronomicos infallibiliter docet.

Octauò. Quia spatia diurna Macularum & Facularum facit etiam circa horizontem sensibilia.

Nonò. Quia Maculas & Faculas etiā in horizonte tam orientali quàm occidentali conspicuas reddit.

Decimò. Quia secundarias Solis Maculas, & Faculas clarissimè detegit, & totum omnino Solem patefacit ita, ut nulli latebræ locus existat.

Hæc

Circuli Solaris & observatorii distinctio.

ROSAE VRSINAE

III.

Hæc igitur pleraque vel effugiunt circulum minorem; vel ita caligant & dubie sistuntur, ut absque maioris opera & consortio, multa certo asseri, multoque minus decidi non queant. ut mirum sanè sit, nonnullos meris circulorum minorum observationibus fretos, voluisse, absque vlla oppositi formidine, Maculas stellarum censui ex ipsarum inutilis cursibus annumerare, qui tamen tantillis circellis plene vix vnquam habentur.

Maiores igitur circuli maiora & certiora indicat; melior igitur est minor, neque de hac re vllus ambigendi locus relinquitur, quam praxis quotidiana, ut in libro sequenti videbitur, nimis certam efficit.

Sed quæret aliquis, quanta tandem circuli obseruatorij diameter esse debeat, ut huic negotio satisfactura videatur?

Respondeo id prudentis obseruatoris iudicio relinqui: regulam tamen generalem hanc satis securam posse dari: ut si Macule mediocres, & faculae omnis generis durabiles in horizonte spectabiles fiât, ad itinera & cursus Phænomeni explorandos, capacitatis abunde habere videatur circulus obseruatorius. id quod meus præclare præstitit. Et licet Maculas, & Faculas secundarias, præsertim sub minore conuexæ lentis detectione satis etiam præsentauerit, id tamen circulus obseruatorius maior, è duabus conuexis adornatus, multo amplius præstitit, & in Sole minutissima quæque in apertum stitit; ita ut purum ab impuro, lucidum ab ymbroso, tenebrosum ab illustri potuerit quam optime discerni: id quod ad motum singulorum, & totius Solis obseruandum sufficit; quod si per circulum quemcunque obtinetur, is vtique ad Phænomeni inuestigationem satis amplius erit.

QVAESTIO II.

An Circulus magnus obseruatorius possit haberi è Tubo quolibet etiam paruo?

Respondeo posse. idque vel lente caua vnica, sed chartæ distantia maiore, & lentium interuallo minore: vel lentibus cauis diuersis, ad eandem conuexam applicitis; acutior enim lens, magis remouet chartam, & circulum auget.

IV.

QVAESTIO III.

Virum Circulus obseruatorius magnus ex Telioscopio paruo, sit tam bonus, quam è magno?

Respondeo magnitudinem tubi esse duplicem, Longitudinis alteram, alteram Latitudinis; Magnitudo ex longitudine profecta desumitur penes conuexitatem lentis globosæ; latitudinis magnitudo, penes detectæ portionis amplitudinem, non autem iuxta circulum totum lentis conuexæ. Nam multæ sunt conuexæ lentes amplissimæ, quæ tamen in vsu vix exiguum sui portione detegi sinunt, eo quod statim colores, confusiones & similia offerant. hisce præmissis, datur triplex in omni Telioscopio casus: Aut enim illud simul longum simul amplum est, aut longum tantum, sed non latum; aut latum tantum sed non longum.

Dicendum primò. Omnis Tubus longus & latus simul, melior est, quam tantum longus, vel tantum latus, cæteris paribus. Ratio, quia qui tantum longus non æque latus est, deficit claritate & intentione: qui tantum latus & non æque longus est, deficit magnitudine & distinctione; quod vtrumque cum habeat datus noster tubus ex hypothese, patet præualere. Nota bene, hanc conclusionem procedere in tubis vel eiusdem speciei, vel certè aperturæ æqualis, &c. eiusdem autem speciei tubi sunt, qui continent lentes speciei eadem. lentes speciei eadem, sunt sphaerarum earundem segmenta, vel caua, vel conuexa.

Dicendum secundò. Fieri potest, ut Tubus breuior sed latior, æquet aut superet longiorem, sed angustior. Ratio quia claritas cum distinctione sufficiente coniuncta, sæpe melior est, quam sola magnitudo & distinctio obscura.

Dicendum tertio. Fieri etiam potest, ut angustior sed longior tubus, superet latiorē breuiorem, quia longi cum sufficiente detectione, fortius agunt propter radios minus refractos, ideoque præcisius pingunt & repræsentant sub circulis maioribus. &c.

Dicendum quartò. Tuborum æque latorum longior semper est melior. quia clarius & distinctius repræsentat.

Dicen-

*Quinam tubi & quibus sint antepo-
nendi.*

I.

Dicendum quinto. Tuborum æque longorum latior semper est melior. quia æque distinctè, sed clarius præsentat.

Dicendum sexto. Idem tubus sub breuiore diductione maius sed remissius idolum præsentat quam sub longiore.

Dicendum septimo. Idem tubus sub breuiore diductione magis refringit quàm sub longiore.

Dicendum octauo. Similium tuborū circuli meliores sunt maiorum quam minorum, quia maiorem, clariorem & distinctiorem imaginem projiciunt.

Dicendum nono. Maiorum Telioscopiorum circuli cæteris paribus, sunt semper minus refracti quam minorum: ideoque semper meliores.

QVAESTIO. IV.

Verum melius sit circulos obseruatorios facere inter se æquales, quam inæquales?

*Æqualitas
circulorum
obseruatoriorum præ-
stat.*

Respondeo. Si bonitas & ratio Telioscopiorum, tempus & locus patitur ut omnes obseruationes circulis æqualibus includantur, sine dubio id est melius: quia paritur tempori, labori, & errandi periculo in exponendo: prout patebit in dicendis.

QVAESTIO. V.

An præstet omnes obseruatorios circulos ab eodem, an à diuersis Telioscopiis proficisci?

*Præstat om-
nes circulos
obseruatorios ab eodẽ
Telioscopio,
cæteris pari-
bus præstare.*

Respondeo. Si Telioscopia sunt eiusdem speciei seu longitudinis atque potentiae, adeoque refractionis æqualis, perinde est, vno an pluribus vtaris tubis, sub circulis æqualibus, quia idem ab omnibus fiet. Si vero specie differunt, & alia alijs sensibilibus longiora existunt, posset fieri ut aliquam differentiam in præsentando afferrent, ob differentem refringendi vim, si circulos valde magnos, & caua valde acuta adhiberes. Vnde pericula & errandi suspensiones euitaturus cautius ages, vno vel vnus speciei tubo vsurus, quam multis & diuersis atque ex hac caussa ego toto hoc triennio vsus sum vnico ferè semper Telioscopio, sub Circulo obseruatorio æquali.

II.

QVAESTIO VI.

Præstetne omnes obseruationes sub vno vnus Telioscopii diductione peragere & diuersos obseruatorios circulos constituere, pro accessu & recessu Solis; an multas facere Telioscopii diductiones & contractiones, pro conseruando vno circulo obseruatorio, & Solari?

Respondeo. Melius esse, vnum conseruare circulum obseruatorium, per latitudines tubi diuersas, quam sub vna tubi diductione circulos diuersos acquirere. Primò, Quia vnica Telioscopij diductio Soli tam Perigæo quam Apogæo ordinariè non seruit, sed necessario mutationem aliquam requirit, in accessu, vel recessu tubi à charta, vel huius à tubo.

Deinde etiam si in tubo aliquo longissimo & potentiae extraordinariae, iste Solis accessus & recessus imperceptibilis esset, tamen neque tanta distinctio in imagine Solis semper eueniret, neque æquales, sed inæquales magnitudine fierent circuli, ex quo tandem maior labor in æquandis illis ideis accresceret, quam fuerat in obseruandis. Melius igitur est, circulos obseruatorios æquare, quam imagines inæqualiter obseruatas.

*Præstat per
diuersas la-
titudines v-
num semper
retineri cir-
culum ob-
seruatorii.*

QVAESTIO. VII.

Meliusne sit, diuersas obseruationes peragere, sub vno circulo obseruatorio, an singulis obseruationibus, dare singulos sed inter sese æquales Circulos obseruatorios?

Respondeo. Melius esse multas obseruationes in vnum congerere circulum, quam singulas in singulos. Quia temporali labori, chartæ, & errandi periculo paritur; & Macularum progressio diuturnius melius animaduertitur, ipsæque obseruationes anteriores in conspectu posita obseruatorem multum iuuant & dirigunt. Si tamen eo peruentum, ut vel vnus circulus impletus, vel vacua Maculis designandis loca non restent, tunc omnino semper nouus in munda charta & priori æqualis est assumendus circulus obseruatorius.

*Præstat mul-
tas obserua-
tiones in
vnum circu-
lum obser-
uatorium
congerere.*

QVAE-

ROSAE VRSINAE

III.

Hæc igitur pleraque vel effugiunt circulum minorem; vel ita caligant & dubie sistuntur, ut absque maioris opera & consortio, multa certo asseri, multoque minus decidi non queant. ut mirum sane sit, nonnullos meris circulorum minorum observationibus fretos, voluisse, absque vlla oppositi formidine, Maculas stellarum censui ex ipsarum inutilis cursibus annumerare, qui tamen tantillis circellis plene vix vnquam habentur.

Maiores igitur circuli maiora & certiora indicat; melior igitur est minor, neque de hac re vllus ambigendi locus relinquitur, quam praxis quotidiana, ut in libro sequenti videbitur, nimis certam efficit.

Sed quæret aliquis, quanta tandem circuli obseruatorij diameter esse debeat, ut huic negotio satisfactura videatur?

Respondeo id prudentis obseruatoris iudicio relinqui: regulam tamen generalem hanc satis securam posse dari; ut si Macule mediocres, & faculae omnis generis durabiles in horizonte spectabiles fiant, ad itinera & cursus Phænomeni explorandos, capacitatis abunde habere videatur circulus obseruatorius. id quod meus præclare præstitit. Et licet Maculas, & Faculas secundarias, præsertim sub minore conuexæ lentis detectione satis etiam præsentauerit, id tamen circulus obseruatorius maior, è duabus conuexis adornatus, multo amplius præstitit, & in Sole minutissima quæque in apertum stitit, ita ut purum ab impuro, lucidum ab ymbroso, tenebrosum ab illustri potuerit quam optime discerni: id quod ad motum singulorum, & totius Solis obseruandum, sufficit; quod si per circulum quemcunque obtinetur, is utique ad Phænomeni inuestigationem satis amplius erit.

QVAESTIO II.

An Circulus magnus obseruatorius possit haberi è Tubo quolibet etiam paruo?

Respondeo posse. idque vel lente caua vnica, sed chartæ distantia maiore, & lentium interuallo minore: vel lentibus cauis diuersis, ad eandem conuexam applicitis; acutior enim lens, magis remouet chartam, & circulum auget.

IV.

QVAESTIO III.

Virum Circulus obseruatorius magnus ex Telioscopio paruo, sit tam bonus, quam è magno?

Respondeo magnitudinem tubi esse duplicem, Longitudinis alteram, alteram Latitudinis; Magnitudo ex longitudine profecta desumitur penes conuexitatem lentis globosæ; latitudinis magnitudo, penes detectæ portionis amplitudinem, non autem iuxta circulum totum lentis conuexæ. Nam multæ sunt conuexæ lentes amplissimæ, quæ tamen in vsu vix exiguum sui portione detegi sinunt, eo quod statim colores, confusiones & similia offerant. hisce præmissis, datur triplex in omni Telioscopio casus: Aut enim illud simul longum simul amplum est, aut longum tantum, sed non latum; aut latum tantum sed non longum.

Dicendum primò. Omnis Tubus longus & latus simul, melior est, quam tantum longus, vel tantum latus, cæteris paribus. Ratio, quia qui tantum longus non æque latus est, deficit claritate & intentione: qui tantum latus & non æque longus est, deficit magnitudine & distinctione; quod vtrumque cum habeat datus noster tubus ex hypothese, patet præualere. Nota bene, hanc conclusionem procedere in tubis vel eiusdem speciei, vel certè aperturæ æqualis, &c. eiusdem autem, speciei tubi sunt, qui continent lentes speciei eadem. lentes speciei eadē, sunt sphaerarum earundem segmenta, vel caua, vel conuexa.

*Quinam tubi & quibus sint antepo-
nendi.*

Dicendum secundò. Fieri potest, ut Tubus breuior sed latior, æquet aut superet longiorem, sed angustior. Ratio quia claritas cum distinctione sufficiente coniuncta, sæpe melior est, quam sola magnitudo & distinctio obscura.

Dicendum tertio. Fieri etiam potest, ut angustior sed longior tubus, superet latiorē breuiorem, quia longi cum sufficiente detectione, fortius agunt propter radios minus refractos, ideoque præcisius pingunt & repræsentant sub circulis maioribus. &c.

Dicendum quartò. Tuborum æque latorum longior semper est melior. quia clarius & distinctius repræsentat.

Dicen-

I.

Dicendum quinto. Tuborum æque longorum latior semper est melior. quia æque distinctè, sed clarius præsentat.

Dicendum sexto. Idem tubus sub breuiore diductione maius sed remissius idolum præsentat quam sub longiore.

Dicendum septimo. Idem tubus sub breuiore diductione magis refringit quàm sub longiore.

Dicendum octauo. Similium tuborū circuli meliores sunt maiorum quam minorum, quia maiorem, clariorem & distinctiorem imaginem projiciunt.

Dicendum nono. Maiorum Telioscopiorum circuli cæteris paribus, sunt semper minus refracti quam minorum: ideoque semper meliores.

QVAESTIO. IV.

Utrum melius sit circulos obseruatorios facere inter se æquales, quam inæquales?

*Æqualitas
circulorum
obseruatoriorum præ-
stat.*

Respondeo. Si bonitas & ratio Telioscopiorum, tempus & locus paritur ut omnes obseruationes circulis æqualibus includantur, sine dubio id est melius: quia paritur tempori, labori, & errandi periculo in exponendo: prout patebit in dicendis.

QVAESTIO. V.

An præstat omnes obseruatorios circulos ab eodem, an à diuersis Telioscopiis proficisci?

Præstat omnes circulos obseruatorios ab eodem Telioscopio, cæteris paribus præstare.

Respondeo. Si Telioscopia sunt eiusdem speciei seu longitudinis atque potentiae, adeoque refractionis æqualis, perinde est, vno an pluribus vtaris tubis, sub circulis æqualibus, quia idem ab omnibus fiet. Si vero specie differunt, & alia alijs sensibiliter longiora existunt, posset fieri ut aliquam differentiam in præsentando afferrent, ob differentem refringendi vim, si circulos valde magnos, & caua valde acuta adhiberes. Vnde pericula & errandi suspensiones euitaturus cautius ages, vno vel vnus speciei tubo vsurus, quam multis & diuersis atque ex hac causa ego toto hoc triennio vsus sum vnico ferè semper Telioscopio, sub Circulo obseruatorio æquali.

II.

QVAESTIO VI.

Præstatne omnes obseruationes sub vno vnus Telioscopii diductione peragere & diuersos obseruatorios circulos constituere, pro accessu & recessu Solis; an multas facere Telioscopii diductiones & contractiones, pro conseruando vno circulo obseruatorio, & Solari?

Respondeo. Melius esse, vnum conseruare circulum obseruatorium, per latitudines tubi diuersas, quam sub vna tubi diductione circulos diuersos acquirere.

Primò, Quia vnica Telioscopii diductio Soli tam Perigæo quam Apogæo ordinariè non seruit, sed necessario mutationem aliquam requirit, in accessu, vel recessu tubi à charta, vel huius à tubo.

Deinde etiam si in tubo aliquo longissimo & potentiae extraordinariae, iste Solis accessus & recessus imperceptibilis esset, tamen neque tanta distinctio in imagine Solis semper eueniret, neque æquales, sed inæquales magnitudine fierent circuli, ex quo tandem maior labor in æquandis illis ideis accresceret, quam fuerat in obseruandis. Melius igitur est, circulos obseruatorios æquare, quam imagines inæqualiter obseruatas.

Præstat per diuersas latitudines vnus semper retineri circulum obseruatorium.

QVAESTIO. VII.

Meliusne sit, diuersas obseruationes peragere, sub vno circulo obseruatorio, an singulis obseruationibus, dare singulos sed inter sese æquales Circulos obseruatorios?

Respondeo. Melius esse multas obseruationes in vnum congerere circulum, quam singulas in singulos. Quia temporali labori, chartæ, & errandi periculo paratur; & Macularum progressio diuturna melius animaduertitur, ipsæque obseruationes anteriores in conspectu posita obseruatorem multum iuuant & dirigunt. Si tamen eo peruentum, ut vel vnus circulus impletus, vel vacua Maculis designandis loca non restent, tunc omnino semper nouus in munda charta & priori æqualis est assumendus circulus obseruatorius.

Præstat multas obseruationes in vnum circulum obseruatorium congerere.

QVAE-

ROSAE VRSINAE

III.

QVAESTIO VIII.

*Suntne Circuli obseruatorii parui
tanquam inutiles penitus
eliminandi?*

*Utilitas par-
uorum Cir-
culorum ob-
seruatorio-
rum.*

Respondeo, Circulos obseruatorios paruos, in longis praesertim Telioscopijs suis vsibus & commoditatibus non care-
re, & omnino etiam adhibendos. Quia obseruatio sub circulo paruo est longè expeditior ea quæ fit sub magno. Quia Solis motus in paruo non est tam velox, quia Maculae sibi met viciniores ab oculo certius in suis locis collocantur, quia Sol in sui circuli punctis constantius retinetur. Quia tandem refractionis minor ibidè contingit: quæ res magno est adiumento dum motus verus indagatur. Et per minores centra Macularum etiam magnarum accuratius habentur: fiunt enim ipsæ quasi vnum punctum. Maiorum quoque motus, per minores, & vice versa confirmatur. Denique sepe copia maioris Telioscopij deest; Vnde minora non sunt penitus negligenda; neq. circuli minores, praesertim si sumantur ex Telioscopijs longioribus. Cæterum in quibus rebus isti parui circuli deficient, leges passim & intelliges ex ipsa praxi libri sequentis, in quo comparationem obseruationum Ingolstadianarum cum Romanis institutam cernes. &c.

QVAESTIO IX.

*Quid de Circulis & obseruationibus quæ
ex vnica lente conuexa in chartam
deducuntur, est sentien-
dum? suntne alicui
vsum?*

*Species seu
pictura ex
vnica lente
conuexa de-
ducta, præ-
stabile.*

Respondeo, Circulos & obseruationes ex vnica & sola lente conuexa in chartam traductas, habere vsum non exigui momenti, quia in illis refractionum differentia fere nulla sensibilis contingit, praesertim si lens adhibeatur planoconuexa, sphaerae magnæ segmentum. Cur, autem in eiusmodi lentibus refractionis poene nihil officiat, causa est, quia lens caua deest, quæ refractionem vehemētissimè auget; deinde quia radij omnes, propter lentis deuexatatem, transeunt ad angulos pa-

IV.


rum differentes, & quasi rectos, & hinc refractionum discrepantia parua intercedit: ex quo fit vt curricula Macularum itineraria, sint quasi vbique sibi conformia & loca motusque veri absque erroribus vllis sensibilibus. inde deprehendantur. Talium autem lentium circuli difficillimè obseruatione acquiruntur, propter nimiam lentis à charta, siue huius ab illa distantiam; quæ lens & charta, prout supra dictum, debent semper esse sibi parallela & ad eundem axem concentrica, &c. hæc autem sine magno instrumento fieri nequeunt. Itaque speculatio facilis & plana, sed praxis ardua est. Species istarum lentium sunt valde intensæ, & si lens bene figurata & polita, admodum mundæ & præcisæ.

QVAESTIO X.

*Quomodo Circulus obseruatorius practicè
est designandus?*

Ante omnia oportet vt à Telioscopio probo & Machina obseruatoria sis bene instructus. Tum vt in schemate numero primo vides, Tubum a b m n, vel f g, rectè distractum inferre retinaculis R & T hoc modo, vt axis tubi f g sit parallelus rectæ i K m, & perpendiculares i c, K l, & m n, ex i, K, & m, ad axem erectæ, sint omnes inter se æquales, punctumq. c, sit simul centrum Circuli obseruatorij, simul baseos solaris. Quibus ita constitutis, applica totam Machinam ad Solem, vt orificium Telioscopij g, radium Solarem h, exceptum transmittat in chartam c, cuius basin annotabis duobus circini cruribus simul si commodè fieri potest m a, & b, deinde transuersim in punctis d, & e, ita tamen vt diligentissime attendas, ne lineam minorem accipias quam sit baseos diameter. quod si ob amplitudinem baseos duo simul puncta marginalia commodè assequi nequeas, nota primo, vel supremum punctum a, vel infimum b, tum retento Sole in statione eadem, (quod fiet si manu sinistra basin prehensam secundum Solis motum sensim mouendo dirigas) notabis oppositum b. postea laterale d, Sole semper in duobus punctis a, & b, notatis firmiter retento, tandem ad punctum quartum, e, perges ex tribus notatis. quo facto, vtraque

*Machina
obseruato-
ria necessa-
ria.*



que manu apprehende pedem machinæ,
& Solem in quatuor annotata puncta
superinducito, diligenterque arbitrator,
nusquamne Sol excedat puncta, vel hæc
Solem: si bene omnia correspondent, exi-
me Tabellam chartiferā, & per quattuor
inuenta puncta ducito circuli periphæ-
riam cæcam: quæ si per omnia quattuor
puncta transit, basis Solaris bene habet,

1 & instrumentum bene collocatum est,
lentes rectè dispositæ. Si peripheria cæca
per inuenta baseos puncta non trāsīt, ba-
sis nō est circulus, & vitiū latet vel in dispo-
sitione instrumentorum, vel in colloca-
tione lentium vel in earūdem figuris quæ
proinde examinanda & cauenda sunt: nisi
applicatio eorundem ad Solem horizōti
vicinum fiat, tum enim, vt supra dixi,
O omni-

○

omni-

III.

omnibus rectè habentibus, Solis imago circularis nunquam apparet &c.

Quod si hac ratione inuentus circulus obseruatorius placet, rectè habet: si non placet, sed maiorem vel minorem exoptas designabis eundem ad beneplacitum in Tabella chartifera, C, & in octo puncta, a, b, d & e: maiora & cardinalia, itemque alia quattuor intermedia minora distingues: tum Tabellam ad Caput instrumenti referes, Solemque transmissum eo usque mouendo Telioscopio aptabis, donec basis Solaris circulo obseruatorio ex amissim æquetur. quibus factis ad ipsam obseruandi praxin accedes.

MODVS ET PRAXIS
obseruandi Maculas & Facu-
las Solares.

CAP. XXXV.

OMnibus ordinatis & rectè collocatis, Machina obseruatoria, Telioscopio, Charta, Circulo obseruatorio. vmbraculis obductis, in loco vmbroso, & si placet aut res patitur, suboscuro, traice Solem, g h, in chartam c, & diligenter ante omnia duc totam basin in 8. vel plura notata peripheriæ puncta, & da operam diligentem, vt puncta cum extremitate baseos perfectissime coincident, & hoc semper initio cuiusque obseruationis facies, propter sequentes rationes. Primò, Quia fieri potest vt obseruationis tempore Sol in vaporibus patiatur defectum seu ellipsin. Secundò, quia fieri potest, vt ex interuentu aliquot dierum Solis basis sit sensibilibiter ampliata vel coacta. Tertiò, quia euenire potuit, (vt saepe fit,) vt aliqua tubi commorio vel diductio &c. accesserit. quæ omnia baseos solaris inæqualitatē aduehant. vnde necesse est, vt semper obseruandi initio, æqualitas circuli obseruatorij cum basi solari examinetur & comprobetur.

*Margines
Solis explo-
randa.*

Deinde perlustra diligenter basin solarē in charta allucentem (reliquus splendor Solis aut dici oculum ne fento) præcipueq. margines orientalis atq. occidentalis plagæ pererrato, & accuratè ubiq. inspicito, sicubi vel vmbra, vel Macula, vel splendor alicuius Faculae in conspectum sese prodāt. Quod si quieto visu,

IV.

1 quieta charta nil apparet, moue parumper machinam, & si quid in Sole latet, prodetur illo motu. sic multas Maculas, multas Faculas, multas vmbas, quiete torpescētes, excitaui agitando chartam, & in visum tam proprium quam alienum vel inuitas protraxi.

Motus autem iste saepe seruit, ad indagandum ingressum Macularum, ad conseruandum & continuandum exitum. Nam Maculae plerumque sub ortum, & occasum, luce multa perfusæ, ægrius, quandoque omnino non dignoscuntur. Quæ tamen agitatione hac sese sistunt. 15 Accedit, quod circa margines sese diffundunt & nebularum instar visuntur, retractæ vero sub medium circuli, colliguntur & nigriore habitu conspiciuntur. Et hæc quidem circa baseos solaris inspectionem dicta sunt. Quod si hisce omnibus adhibitis ibidem nihil intueberis, dices Solem illo tempore apparuisse vacuum, & diem annotabis &c.

Ad consignandas Maculas, vtor ego 25 pede circini vel chalybeo, vel æricalcheo, acuto sed molliter tereti; illud quidem, vt possim transfixa charta, infigere puncta pro centris Macularum & nucleorum &c. hoc vt ducam molles sed cæcas lineas pro ambitu Macularum & Facularum, 30 pro nucleis, & vmbis indicandis. Nam vti calamo scribente, vel plumbagine, vel simili aliqua re, quæ tingat & coloret, meo quidem iudicio est obnoxium erroribus, & factitatu quasi impossibile: propter inclinationem chartæ, & moram temporis nimiam, nam præter id, quod 35 Maculae ordinariè suis locis motu diurno euoluuntur, raro contingit, vt primo statim assultu Maculam suo loco configas. Charta igitur infinitis lituris infarta, errores & errorum ansas innumeras subministrabit.

Quare satius est graphio sicco lineas 45 cæcas & vestigia Macularum innoxia effingere; sic enim & citius expedies negotium, & delicta sine fæditate emendabis.

Initium designandi faciendum est à 50 Maculis, quod stabiliores, & præcisiores ordinariè compareant, inter ipsas autem Maculas, si multæ sint, selectus habendus est.

Nam ego fere semper aliquam certam 55 seligo, secundū quā per totam obseruationem

*Modus si-
gnandi Ma-
culas.*

I.

nem me dirigam. ea autem sumitur à me non casu aut fortuito, sed summo studio. Vt sit bene aspectabilis, ut sit parua, ut sit horizonti, & si fieri potest orientali vicina.

Macula una parua pro directione in seligenda initio.

Prima conditio facit, ut visum cito feriat, nec sit magno requirenda conatu; ideòq. sine difficultate loco semel notato possit reddi.

Secunda facit loci designationem valde securam, qua quo minor est Macula, hoc spatij minus occupat, ideòq. minor in illius loco assignando errandi occasio prebetur. quod in Maculis maioribus non accidit, in quarum assignando præcise centro, satis diu est desudandum.

Conditio tertia totam observationem securiorem reddit. cū enim Maculae marginales motu diurno omnium citissime & maximè è sedibus suis euehantur, contra verò motu apparente proprio tardissime progrediatur; fit ut quamdiu assumpta marginalis Macula loco designato consistit, de reliquis tanquam loco euectis nulla penitus esse valeat suspicio: id quod non fieret, in assumpta aliqua Macula centrali. nam tales Maculae propter flexum diurnum iuxta centrum insensibilem, non proderent, nisi post vnam alteramue horam, aliquam ex diurno motu baseos esse mutationem factam. cum interim motu proprio faciant breui tempore notabilem progressum. Igitur cum Maculae horizontales secessum suum statim manifestent, ex ipsis semper aliqua pro directione totius observationis prudenter & vtiliter adhibebitur; sic enim asserculi chartiferi giratione notatus Maculae locus progressam Maculam pulcherrimè subsequetur, quibus congruentibus, ad aliarum atq. aliarum notationes procedetur. nequopus est, dum singulas notas, semper oculum & basin Solis ad puncta cardinalia reflectere; sed satis est, si Macula directrix suum locum insideat, dummodo is per motum Solis diurnum necdum sit amissus. Post absolutam Macularum designationem ad Faculas pari modo proceditur. quibus peractis, antequam ad temporis notationem proceditur, tota observatio sedulo illustratur, si nimirum vtraq. manu prehendas pedem Machinae, & Solarem circulum in circulum observatorium comittas, atq. Maculam directricem loco suo primitus designato superponas; quod si fit, congruentibus cir-

II.

culo & base, attende num etiam reliquae omnes & singulae Maculae, Faculaeq. suis quaq. locis corresponsdeant: si sic, recte facta est observatio: si secus, corrigenda sunt perperam posita; tum absq. mora, inducendum perpendiculū & annotandum tempus; quae quomodo sint peragenda, accipe paucis.

De inducendo observationi perpendiculo.

Perpendiculum hoc loco nihil est aliud quam circuli seu plani verticalis per axem conis solaris incedentis, communis cum circulo observatorio sectio. Voco autem hanc sectionem lineam verticalem, seu perpendiculum, non quod linea verticalis aut perpendiculum sit, sed quod ex umbra perpendiculi è seta lineaque verticali penduli, in circulum observatorium per centrum proiecta inducatur. Quod fit hoc modo.

Inductio perpendiculi.

Sinistra manu apprehende perpendiculum, ex equina seta vel filo subtilissimo suspensum, & in conum radiosum immitte, ut eius umbra per centrum circuli observatorii incedens, vel supra vel infra secet perimetrum circuli, quam sectionem diligenter apice circini notabis. Habes autem perpendiculi figuram in schemate N. 1. in quo perpendiculum, p, i, dependet ex vncò, o, p, & per centrum, c, facit umbram, a b, cuius punctum, a, supra, aut, b, infra est notandum. quod autem hic facit vncus, hoc in observando solet agere mea sinistra manus, supra caput asseris, P Q, ad punctum, o, innixa, contra vacillationem. Similia & ad viuum expressa habes, in magno observationum variarum systemate, ad Machinam observatoriam, V X Z, & pyramidem, L M, & ibi quidem dependet perpendiculum, a b, proijciatque umbram, c d, in circulum, c d f g, per centrum, e, hinc autem, L N, in circulum reflexione procreatum. nam in omnem observationem eiusmodi, inducendum est perpendiculum, tanquam motor primus ad indagandum cursum & motum Macularum. Quia hinc est sumendum primum positionis principium pro indaganda sectione Eclipticae, quam facit cum Circulo solari seu observatorio.

O a Cum

ROSAE VRSINAE

III.

Cum enim certissimum sit, Solis centrum in linea Eclipticae semper haerere, & haec sit circulus maximus, per centrum terrae traductus, quae tota sese ad illum instar centri habet; certum quoque est, sectionem quam Ecliptica cum Circulo solari communem habet, esse lineam rectam; unde ut huius lineae in circulo observatorio positio habeatur, debet id à certo aliquo & dato positione puncto sensibili fieri: quo certius, stabilius atque facilius dari nequit, quam plani verticalis cum circulo solari, & observatorio sectio, haec autem sensibilibiter & statim absque ulla errore habetur, solius perpendiculi ymbra, ut dictum, quae in plano verticali iacet. Scio lineam rectam horizonti parallelam posse etiam induci per æquilibrium, & hanc lineam respondere illi, quam in Sole facit planum per centrum Solis, & circuli observatorii ad verticale planum erectum, &c. sed quia huius lineae consignatio plus operæ & periculi adiunctum habet, cum nisi beneficio verticalis fieri nequeat, &c. idcirco compendiosior & facilius est ipsius verticalis inductio.

Praxis observandi Temporis.

Tempus in fine observationis annotandum.

Tempus observationis nunquam accipiendum vel annotandum est, initio observandi. Quia cum observatio quavis facta non facienda, sit alliganda ad tempus, & inter observandum saepe multum moræ intercedat, Maculae quoque sedes suas facile mutant, & charta observatoria sit giranda; necesse est, tempus tum annotari, cum tota observatio peracta, & perpendiculum rectè constitutum fuerit, Maculaeque in suis locis annotatis ad punctum confederint. alioquin, si haec aut horum aliqua præterieris, in motu & loco vero assignando difficultates, aut etiã errores experieris. omnibus ergo rite absolutis, accipe quadrantem linearem, prout in magno schemate, vel horarium, q, r, s, prout in Machina observatoria pensilem aspicias, & altitudinem Solis in gradibus & minutis, simulque horam accuratissimè annota. Etenim altitudo Solis, quemadmodum infra videbis, est necessaria in hoc observandi genere, ad motum Macularum indagandum; horarum autem cognitio, ad periodicam definitio-

IV.

nem, &c. Quod si horologium ad manum non habeas, aliunde vel ex data altitudine horam indagabis. Ego in observationibus meis horam saepe non addidi, quia non semper licuit ipsam accipere. deinde non est ita necessaria, sicut altitudo Solis. Consignandus autem est ad quamlibet observationem, annus, mensis, dies, hora astronomica, & horæ scrupula saltem prima. Item altitudo Solis vel ante vel post: vel meridiana, in gradibus & minutis, saltem primis.

PRAXIS CAECAM ATQUE mortuam observationem illuminandi, atque vivificandi.

CAP. XXXVI.

CAECAM & mortuam observationem voco, quae Solis constat cæcis linearum Maculas Solares, & Faculas exprimere delineationibus, nullo accedente typo aut scripto. Typus ergo colore effigiatus animam quodammodo & vitam addit, scriptura loquelam, & sua cuique nomina dat vel Maculae vel Faculae, per characteres ab edarios, vel numerales, singulos singulis Maculis in observatione quavis adscriptos: ita ut eadem Macula diuersas sortiatur appellationes, in observationibus diuersis, quae quibus diebus temporibus & horis conveniant, & sub qua Solis elevatione, item ad quod perpendiculum sint factae, consignantur singillarim & diutim per ordinem extra circulum observatorium in marginibus chartae observatoriae, modo supra, modo infra, modo dextra, modo sinistra, idque continuato ordine & situ eodem chartae, modo inuerso; prout macularum designandarum ratio & locus postulat. Nam si Macularum observandarum loci cum observatis concurrunt, inuertitur charta, ut locus animaduersioni detur. si neque sic habeatur, differtur observatio super hanc chartam, donec tempore pomeridiano aut die alio locus acquiratur. Si omnia plena sint, ablata charta, sufficitur noua vacua. Sed haec per accidens: nunc ad colorandas Maculas redeamus.

Maculae calamo subtilissimo ita sunt in charta exprimendae, quemadmodum apparuerunt ipsamet in eadem projectae. tenues, & raræ, tenuiter, crassæ

Quid sit cæca observatio.

Macula sit conformiter coloranda.

I.

crassæ & densæ fortiter & compactæ. nuclei prout apparere, nigri, solidi, continui vel seiuncti, vmbra molliter, lucula & facula suauiter, ita vt sua cuique figura, raritas & densitas ex ipso velut a spectu elucescat. quæ tamen omnia & singula ita dextrè ita enucleatè cõformari vix possunt, imo ab incisioribus aliquando non solent, quemadmodum à natura repræsentantur, vnde ad consortium calami & scripturæ explanationem est confugiendum, in rebus præsertim alicuius momenti, aut repræsentationis difficilis. quis enim Maculas luci solari immerfas, & semialbas, &c. bene ob oculos proponet? quis facularum distinctam lucis intensiorem & quis vmbra à Maculis tenuibus discernet, nisi scripto moneatur? præsertim si, vt dixi, incisores rerum istarum imperiti, distinctionem parvam adhibent.

Exemplum Observationis ordinariæ proponitur.

Viuum huius rei exemplum habes in adiunctis duodenis dierum quattuor observationibus, Mensis Decembris, circulo vni obseruatorio C D E F G H I K inclusis, vbi vides. Primò ipsum circulum obseruatorium punctis quattuor cardinalibus maioribus C E G, & I, insignitum, intermedijs alijs quattuor minoribus, D F H, & K, cæteris cæca, seu fracta linea repletis; & hoc ideo, quia oculus æqualitatem & cõgruentiam baseos solaris cum circulo obseruatorio exactius istorum punctorum beneficio internoscit, meliusque Maculis suas sedes adiudicat, &c. quam si integræ peripheriæ essent descriptæ. experientia vsuque praxeos vtriusque didici, hanc esse faciliorem, & tutiorem. & ratio statim in promptu est, quia cum arcus circularis sit linea vbique vniformis & æquali crassitie protensa, visus differentiam nullam in eadem reperiens, difficulter intuitum figit magis hic quam illic; & sic dum vbique luctatur, lucis excessum vel defectum ægre aduertit. in punctis autem inæquali præsertim corpulentia depictis, hæret stabiliter, & præcisum baseos solaris attactum nullo negotio vndique simul & semel aduertit, &

II.

1 hæc res, minuta quidem apparet, in hoc tamen negotio, si negligatur ingentes errores, aut certè labores, in exponendis & ordinandis Macularum cursibus caussat: qui omnes horum punctorum beneficio, nullo negotio euitantur. vbi tamen aduerte, hæc puncta ita esse peripheriæ circuli obseruatorij inscribenda, non vt illam secent, sed tantum tangant
10 extrinsecus constituta.

Secundò. Aduertis has omnes obseruationes esse peractas, anno 1625. Mense Decembri, in Collegio Romano, diebus 7. 8. 9. & 11. Et die quidem 7. duas
15 matutinas, & duas vespertinas; die octauo quattuor matutinas, & vnā vespertinā: die verò nono vnā vespertinā: quas omnes decem obseruationes peractas habes, vno chartæ situ erecto: duas verò reliquas, die vndecimo perfectas, conuerso chartæ schemate annotatas. quid in singulis animaduersi dignum acciderit, enucleabitur paulo post. nunc,

25 Tertiò. Præter diuersa perpendicula, singulis obseruationibus propria, offendes fere quidquid in hoc Phænomeno occurrere consuevit. Sunt enim hic Maculae omnis generis, cum Faculis, sine Faculis, cum nucleis & sine; æquabiles & diffformes; orientales, mediæ & occidentales; magnæ & parvæ; densæ & raræ; nascentes & intercuntes. Sunt Faculae coniunctæ cum Maculis, & Vmbrae, sunt
30 solitariae & puræ; sunt debiles & intensæ. Sunt denique Vmbrae variæ & multiplices. nunc ad singularum descriptionem veniamus.

Septimo igitur Decembris die, M, id est, mane, hora nona $\frac{7}{8}$, sub eleuatione Solis graduum 21. & semis, obseruatæ sunt Maculae & Faculae & Vmbrae, occidentales a, b, c. & a, quidem est sola, sed non noua Macula; reliquis autem
45 comitatus b, sunt Vmbrae tenues cum Faculis, c, verò Faculae puræ, quæ die quinto, sub vespertinis, & quarto sub matutinis obseruationibus, & omnino præcedenti, tempore non comparuerunt. prout videre est in 49. Obseruationum
50 Imagine, quæ est Nouembris quarta, & Decembris secunda, in qua descriptum habes cursum Maculae a, sub nomine seu littera c, à die 28. Nouembris, vsque ad octauam Decembris, vbi vides
55

ROSAE VRSINAE

III.

Maculam primis quidem diebus auctam sed posterioribus sēsim defecisse, faculasque quibus ante caruerat, acquisuisse.

Insuper Faculam nouam C, hic exhibitam, illic omissam esse, id quod saepe facio, ut scias me nullo modo, quidquid in autographis obseruatum & annotatum habeo, in æs incidi curasse.

Sunt præterea occidentales Maculæ d, e, quarum cursum expressum inuenies in Obseruationum Imagine 51. Decembris tertia, sub littera a, à die Decembris tertio, vsque ad nonum: nam ante tertium nulla fuit, sed nata est tunc, & apparuit minima atque tenuissima, semperque ad exitum vsque creuit; ubi obiter nota, incisoris incuria, eius figuram die 3. repræsentatam esse nimis magnam & nigram. tenuissima, & minima fuit, sed celerimè creuit & intensa est nigrore: id quod frequens est in hoc phænomeno, & cum die tertio vnica enata esset, multiplicata est ad diem hunc septimum in nouem distinctas Maculas, situ & figura talibus, quales ob oculos positas contemplaris.

Ad litteram f, habes Maculas tres orientales, non magnas quarum orientiores duæ se mutuo contingunt, licet incisori id non expresse, & harum cursum videbis in prædicta Obseruationum Imagine tertia Decembris. Mirè autem sese variarunt hæ Maculæ à septimo ad vndecimū Decembris. nam vltius non durauerunt, sed in medio Sole generatæ, in eodem interierunt, post vitam trium dierum.

g, sunt Maculæ tenues & æquabiles orientales, illarum cursum, mutationes, & in faculas conuersionem, &c. videbis in prædicto schemate, sub littera d.

h, i, K, sunt omnia noua, antea non visa. apud h, est vna Macula notabilis, multarum paruularum dux; deinde sequitur mira umbrarum & Facularum luculentarum congeries. Cursum huius massæ ab hoc die 7. vsque ad 14. præsentatum habes, sub dicta imagine littera f.

l, m, sunt itidem Maculæ plures orientales, quarum maiores duæ nucleum gestant, sed ortum, & interitum illarum, augmentum & decrementum, est cernere in eadem dicta imagine, sub littera C.

n, o, p, sunt Maculæ minimum decem, densiores & rariores, circumfusus Faculis

IV.

inclusæ, intermixtis passim, & adiacentibus umbris, quarum cursum plenarium, ad decimum sextum vsque diem, require in Obseruationum Imagine 52. quæ est quarta Decembris, sub littera a, & miras mutationes aspicias.

q, est noua & luculenta Facula, umbris exilibus circumdata.

Et sic descriptam habes obseruationē primam, diei septimi, hora nona $\frac{7}{8}$ matutina.

Secunda Obseruatio contigit eodem die & mane, hora $10\frac{1}{4}$, sub eleuatione Solis 23. gr. o. & quia parum temporis intercessit ab obseruatione priore, non omnino media hora, idcirco Maculæ & Faculæ omnes loca sua versus centrum progrediendo sensibilibiter non mutarunt, quod patuit giratione Tabellæ chartice, qua facta, omnes Maculæ prioribus notatis locis ad sensum coinciderunt, ideoque eadem conscriptæ sunt. quia vero circumacta Tabella aliud perpendiculum acquirit, idcirco pro hac obseruatione est perpendiculum, &c.

Tertia Obseruatio eiusdem diei est V, seu Vespertina hora $3\frac{2}{3}$, Sole eleuato gradus 11. minuta 20. ad perpendiculum r.

Vbi nota semel pro semper, me perpendiculo ordinariè adiungere illam litteram vel notam, quæ conuenit illius obseruationis Maculæ seu Faculæ primæ, seu occidentalissimæ. Vt, quia Macula occidentalissima est r, idcirco primum numerando locum & primam à præcedente litteram, acquirit, nimirum r; & ob hanc causam sortitur perpendiculum eandem. Maculæ igitur & Faculæ a b c, sub Obseruatione prima descriptæ, progressæ sunt versus C, vsque in r, & s, propter motus diurni & chartæ in plano horizontali stantis rationem, id quod omnes maculæ & Faculæ transcetricæ seu occidentales semper faciunt, extra Stationis tempus; cuius contrarium euenit ab orientalibus seu ciscentricis, hæ enim motu contrario tendunt versus G. Nota hic, quomodo concurrerint in vnum continuum tractum, tam Maculæ quam Faculæ & Umbræ. nam a, & b, faculæ ante meridiem separatæ, nunc coniunctæ apparent. id quod huic Phænomeno, in decliuitate Solis ortiua, atque occidua, est vsitatissimum. Sed & umbræ auctæ sunt.

N. 7.

Menſe Decembri.

In Collegio Romano

Dies. Hora. O. Elen. Perpend. Mac. et Facula. et umbra.

M. 9 $\frac{1}{4}$ - 21. 30. - a. - a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. n. o. p. q. plerq. noua.M. 10 $\frac{1}{4}$ - 23. 0. - p. - eadem.V. 3 $\frac{1}{2}$ - 11. 20. - r. - r. s. t. u. x. y. z. & . β . γ . δ . ϵ . ζ .V. 3 $\frac{1}{2}$ - 9. 0. - t. - eadem.M. 9 $\frac{1}{4}$ - 15. 10. - h. i. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. x. y. z. & . β . γ . δ . ϵ . ζ .

M. - 23. 0. - u. - eadem.

M. - 24. 30. - u. - eadem.

M. 11 $\frac{1}{4}$ - 25. 0. - ϕ - eadem.V. 2 $\frac{1}{2}$ - 17. 0. - ω - 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

Praxis obſeruandi O.

et inducendi lineam Verticalem

ſeu Perpendicularum.

Die 9. Vesperī Hora 3 $\frac{1}{4}$.

Sub Elevatione Solis gradus 12.


Minutorū 40. ad Perpendicularum.

obſervatę ſunt Maculę et Faculę

occidentales 15. 16. item 17. item

18. 19. Centrales 20. Orientales

21. 22. 23.



ROSAE VRSINAE

III.

t, u, sunt antemeridiana, d, e, aliquan-
to amplius conuoluta apud, t, & euolu-
ta apud, u.

x, sunt tres antemeridiana, f, quarum
duae orientiores iam separari inci-
piunt.

y, z, etiam aliquantulam euolutionem
maiores ostentant.

a, similiter vmbra post g, tractam
amisit, & sese in duas Maculas aequabiles
conformauit.

b, est vnica, loco hodiernarum h, te-
nuis & euanida, licet nimis fortiter illam
expresserit Incisor; sed & Faculae atque
vmbrae, parua sui vestigia reliqua fecer-
unt.

c, d, e, f, sunt antemeridiana, n o p,
& Faculae g, adhuc vmbrae circumue-
stuntur.

*Observatio
quarta.*

Observatio quarta, diei septimi à prio-
re non differt, nisi paruo tempore, sci-
licet 12, scrupulis horarijs, quae dant $\frac{1}{2}$
horae, & 2. gradibus 20. minutis altitu-
dinis solaris; & perpendicularo t, quod in
priori fuit r: loca Macularum eadem,
quae prius.

Observationes diei octauae.

*Observatio
prima.*

Prima. Antemeridiana, contigit hora
 $9\frac{1}{4}$, eleuato Sole 15. gra. 10. min. ad
perpendicularum H. Maculae, vmbrae, &
Faculae occidentales sunt H, omnia ve-
hementer imminuta comparuerunt, e-
rant heri a, b, c, &c.

d, & e, erant heri d, & e; interme-
diarum quaedam defecerunt; & quod be-
ne est notandum, duae extremae d, & e,
hodie aequae distant atque heri d, & e:
id quod aspectui soli non debetur.

Centrales sunt f, quae heri fuerat prae-
cedens f. pedissequis duabus amissis: ite-
rum, quae heri fuerant l m, multum
nunc ab illis mutatae. nam l, heri fuit
vna informis tenuis massa, nunc hodie
in duas secessit Maculas, vel si malu-
mus auctam hesternam mediam, & pri-
mam l, imminutam; certe m, hesternam
anterior, & tenuis, hodie n, in multas
paruulas abiuit. Sunt etiam centrales p, q,
hodie maiores & plures atque formosio-
res, quam heri apud g, augefcunt.

Orientales sunt r, s, o, p. heri erant
n, o, p, totae intra Faculas, hodie extin-
ctis Faculis antelucanis, trahunt reliquas

IV.

à tergo, conuersis in Maculas nonnullis
vmbrae ad o. quaedam autem Maculae
sunt auctae, quaedam nucleis grauidatae,
nonnullae attenuatae, & situ alieniore,
apud q, noua sequitur Facula, vmbra
longa & tenui prioribus tanquam vincu-
lo colligata. cum è contrario facula q,
nusquam alluceat.

r, est valde parua, hesternam h.
Inter occidentales exorta est noua du-
plex & tenuis vmbra s.

Secunda Observatio matutina, caret
tempore horario, habet autem altitudi-
nem Solis graduum 23. o. adeptaque est
perpendicularum t, & Macularum occi-
duarum nomina & loca sunt r, v, eius-
dem cuius ante inter sese distantiae.

Centralium q, x, item v, item o.
vbi vides quomodo intra breue tempus
locum in circulo obseruatorio mutaue-
runt. Quod autem ad o, non omnia com-
paruerint vt ante, fieri potest vt velinte-
rierint interim, vel visum effugerint, quia
erant vmbrae vel potius vestigia tenuissi-
ma: quod frequenter euenit in hoc Phaenomeno.

Orientales Maculae sunt 1. & 2. &
haec quidem noua & ex hesternis vmbrae
Kenata est.

Item Maculae 3. 4. 5. quarum faculas
studio neglexi, vt illae melius appare-
rent.

Vbi nota quomodo apud z, plurimae
paruae, ex r, resoluuntur.

Tertia Observatio, est veluti prioris
repetitio, ad aliud perpendicularum v, &
eleuationem Solis 24. 30. Itaque medius
tantum quadrans intercessit, ideoque se-
des Macularum priores sensibilibiter non
sunt mutatae, solum verò perpendicularum,
ex r, in v, transiit, giratione tabulae
chartiferae.

Quarta Observatio itidem matutina,
duas priores paullo post subsecuta, abso-
luta est, hora 11 $\frac{1}{2}$, Sole 25. altitudinis
gradum tenente. ad perpendicularum v
ideoque Maculas prioribus adhuc locis
sensibilibiter euectas non reperit, vnde ijs-
dem characteribus signatas accepit: solum
perpendicularum giratione aliud emerfit.

Quinta Observatio vespertina fuit,
hora 2 $\frac{1}{2}$, ad Solem exaltatum grad. 17.
o. Sortita est perpendicularum v. Macu-
lae occidentales, 6. vestigium tenue; sed
certum Maculae H.

Item

I.

Item Maculae 7. & 8. quarum sola 7. est secundum magnitudinem & figuram completa; reliquarum sola puncta centralia, & nucleus postremae 8. sunt expressa.

Maculae centrales, sunt 9. eadem quae hesternae.

Item 10. 11. Vbi nota, quomodo deficere videntur, & numero, & magnitudine.

Item tenues Maculae 12. quas tamen incisor nimis plenas fecit.

Orientales sunt 13. & 14. quas omnes punctim tantum secundum centra notavi.

Hunc autem notandi modum adhibere soleo, vel quando ex necessitate proponendum est; vel quando alioquin Macularum magnitudo & figura sufficienter habetur; vel quando locus illarum summa accuratatione inuestigatur.

Diei 9. Observatio.

Mane caelum non fuit. Vesper hora 3 $\frac{1}{4}$, Sole grad. 12. min. 40. tenente, ad perpendicularum 1, accepi Maculas & Faculas occidentales 15. & 16. eo habitu quo vides descriptas. coierunt mirabiliter, & induerunt se Faculis valde luculentis. sed & umbrę, atque nouę Maculae accreuisse videntur. Præterea apud 17. Macula sequens, reuixisse videtur, cum per aliquot dies conspectui sese subtraxerit. Amplius 18. & 19. auctiores comparent, nucleusque apud 18. maior & densior euasit. & cum heri apud 10. duę separatae extiterint, hodie in vnam magnam & oblongam coaluisse videtur. sed & quę heri apud 11. valde exiles fuerant, hodie & mole & intervallis ampliatę sunt. Considera cursum illarum, in Imagine 3. Decembris, sub littera C, & videbis, quomodo extremae, 18. & 19. intervalla sua auxerint, ad exitum usque, & in quales ymbras & faculas degenerarint, &c. cum tamen in primo sui exortu, qui contigit die 5. Decembris horum nil ostentarint.

Diei 11. Observationes.

Dies 10. non fuit, ob cæli inclementiam.

Die 11. resumpsi curam, & quantum

II.

per caelum licuit feci observationes duas, circuloque observatorio inclusi inuerso chartę situ, quod sepe factito, ita suadente spatio intervacio, &c.

5 Sole igitur grad. 12. insidente, ad perpendicularum A, consignavi Maculas occidentales a, & b, itemque c; præterea centrales d, e, & f, raptim, quia Sol nubilus & obrusus fuit, ideoque exacte omnia discernere non licuit, locis tamen satis fidendum videtur, quorum præcipuam rationem duxi; figurę autem, vel exacta magnitudo, densitas & raritas, ex hac observatione non eruuntur; quarum vna cum locis signatis constitutionem ut certius adipiscerer, repetiui sub elevatione Solis graduum 13. minorum 10, observationem ad perpendicularum B, & reperi quidem locorum positionem bonam; sed ob hebetatum vaporibus adhuc Solem, figurarum præcisiones, densitatum rationes, aliasque Macularum, Facularum, & Vmbrarum minutias persequi non fuit integrum.

25 Et hoc quidem specimen observandi, observationes consignandi, consignatas explicandi, ob oculos proponere placuit, ut videas, quisquis hæc legis & arbitraris, qua industria & cautela quæque tractauerim, quidque fidei animaduersionibus meis, & Observationum Imaginibus habere possis, & an inde desumpta doctrina solida satis & stabilis censeari debeat. Sed nimis prolixus & accuratus fortasse potius nonnullis videar in hisce minutijs, quam res & ratio postulet. Ego quidem si in hisce explicandis modum excedo, longe amplius transgressus sum in practice tractandis. Nam certissimum est, curam, diligentiam, atque accuratationem, quam in observandis, & consignandis Maculis atque Faculis &c. adhibui, calamo æquari, verbisq. vllis sufficienter explicari non posse. Tractavi hoc Phænomenon, nunc per annos 16. & amplius, vnoque sepe die effeci observationes 10. 20. 30. & plures, idque modis diuersissimis, circulis observationum differenti-
bus, &c. ita ut multi diuturnitatem temporis pertesi, & multitudinem observationum intuiti, in eam deuenerint pensesententiam, me vel nihil certi & stabile in hoc Phænomeno deprehendere, vel contraria, quam olim ediderim inuenire, ideoque moras voluntarias necere. Sed
vt

*Prolixitas
nimia excu-
satur.*

III.

Ut ingenuè quod res est eloquar, lubri-
citas & subtilitas, ipsaque Phænomeni
vbique & semper sese effundens veritas,
tam sedulum, tam constantem, tam diu-
turnum, tam exactum in obseruando me-
fecerunt. cum enim Phænomeni licet ma-
ximè varij tenorem tamen eundem &
suis temporibus sibi similem semper ani-
maduerterem, ex alia verò parte, vel
contradictores innumeros & potentes,
vel obseruatores oscitantes & Solem atq;
veritatem obscurantes potius quam illu-
strantes, nonnullos etiam aliorum auri-
bus seruietes intelligerem; ne veritas op-
primeretur vllò modo, siue per vim siue
per ambitionem: necessarium omnino
dixi, omnia quam posset fieri minutissi-
mè persequi, atque studiosissimè inue-
stigata in lucem protrahere. Nam alioqui
cont. a ingeniosam pertinaciam, vel ob-
firmatam contradictionem parum omni-
no effecissim. Addo, impossibile esse,
absq. exquisitissima harum minutiarum
ventilatione & notitia, in motum & lo-
cum verum huius Phænomeni penetrare.
Igitur cum hoc Phænomenon nec pru-
denter asseri, neque solidè stabiliri, neq;
indemne conseruari atque defendi valeat
absque ipsomet: illud autem non habea-
tur aut possideatur, nisi sola ipsius co-
gnitione, hæc enim est, quæ Phænome-
ni possessorem genuinum facit: cognitio
verò sine sedula ipsius peruestigatione,
per assiduitatem obseruandi instituta,
nullatenus (nisi Deus singulari priuilegio
aliquem donare, aut nescio quis Ange-
lus cælitus id reuelare dignaretur) obti-
neri queat: hinc vt ipsum Phænomenon
haberem, vt aduersus impugnatores tue-
rer, vt ab iniuria Sutorum & Sartorum,
vulgique imperiti rabiosis vnguibus, rem-
tantam indignissimè lacerantibus eripe-
rem, totique mundo & litteratorum Se-
natui, ipsam merissimam nudissimamq;
veritatem, sed irrefragabiliter ostende-
rem: tantum laborem adhibui, tantum
temporis insumpsi, tantum olei operæq;
impendi. Hinc rerum minutissimarum,
sed vt patebit, à quibus maximæ depen-
dent, tam pertinax, tam scrupulosus,
tam curiosus rimator & arbitrator solici-
tus euasi. Quod si non fecissem, Phæno-
menon nobilissimum ignobilissimè tra-
ctari, & dirum in modum pessumdari,
oculis nequidquam illachrumantibus

IV.

conspicarer, frustra veras quidem, sed
surdis & ignauis irrisoribus obiectans la-
mentationes. Nunc pro Phænomeno si
opponam ipsissimum Phænomenon, &
ex ipso ipsum validissimè propugnem;
nemo opinor erit, qui meis succenseat
industrijs; qui boni non consulat nauita-
tem, sine qua nec ignauos arcere, neque
obluctantes compescere potuissem. Ad
Rhombum igitur, & Obseruationum
examen redeo.

*Phænomenon
non solare
seipso defen-
dendum est.*

OBSERVATIONVM
Examina.

CAP. XXXVII.

I. *Examen Obseruationum per interual-
la Macularum, vel à margine, vel
à Maculis alijs notata.*

Maculæ distant vel à Margine
Circuli solaris, vel à Maculis
alijs. Per vtraque solet loco-
rum notatorum examen institui. Nam
si altero circini pede centrum Maculæ,
altero breuissimam limbi solaris distan-
tiam, quæ nil est aliud quam segmentum
radij à centro baseos solaris per Maculæ
centrum emissi in marginem &c. aucupe-
ris, base non multum extra obseruato-
rium circulum emota; deinde inuentam
hanc distantiam ex loco Maculæ signato
in radio ex obseruatorij circuli centro per
locum notatum egresso, menses: si v-
trobique æqualitas inuenitur, rectè no-
tasti locum obseruatæ Maculæ; si inæ-
qualitas, corrigendus est error. Nam
vt Macula ad limbum Solis, ita locus no-
tatus se debet habere ad periphæriam
circuli obseruatorij in distantia breuis-
sima.

*Examen per
distantiam
à limbo.*

Per distantiam Maculæ à Macula sic
proceditur. Accipe vtroque circini pede
vel distantiam datarum Macularum, vel
locorum signatorum, & acceptam trans-
fer in alteram; si æquantur, rectè ob-
seruasti: si inæquales inueniuntur; resu-
menda operatio & corrigendus error.
Hoc examen adhiberi potest vel inter ob-
seruandum, si Maculæ non sint multæ,
vel postquam rota obseruatio vna cum
notatione temporis & perpendiculi fue-
rit absoluta. Dixi Maculas examinandas
non esse multum à locis signatis abdu-
cendas,

*Examen per
distantiam
Macula à
Macula.*

I.

cendas, & hoc ideo, quia si versus centrum, aut à centro notabiliter abscesseris, refractione vel maiorem vel minorem æquo distantiam inuenies, & sic cauturus hosce scopulos, in medio nauigabis æquore, Maculasque examinandas non multum à locis illarum annotatis amoue-
bis.

2. *Examen Observationum per plures observationes, idque modis variis ex loco, tempore, personis &c.*

Vt verum vero nunquam contrariatur, sed semper concinit, ita si ea quæ de Phænomeno hoc eiusque motu & varietate afferro, vera sunt, si ex parte rei subsistunt, & fortuitis atque fatuis apparitionibus non accensenda; necesse est, observationes atque designationes ipsius, in omni loco, ab omni obseruatore, Telioscopio quouis, modo obseruandi quolibet, dummodo probatus & legitimus sit factas, inter sese conuenire. Nam si non concordarent, aut Phænomenon fallax, aut obseruator falsus esset. Quod si autem consonent, observationes legitimas extitisse quis ambigat? Non enim videtur possibile, ut vel duo tantum, ne dicam 10. 100. aut mille, in tam diuersis rebus aspiciendis, inque chartam transferendis, &c. ad vnguem contineant in situ, in loco, in figura, numero, magnitudine, raritate, densitate, &c. & tamen à veritate omnes in errores uniformes cadant. &c. Porro cum maxima in hisce varietas interueniat, obiter singula perstringam.

Considerari verò possunt observationes Macularum vel ex loco, vel ex tempore, vel ex personis, vel ex instrumentis & obseruandi modis.

Examen ex locis obseruandi diuersis.

Primò. Sumamus locum & cætera ponamus rite peracta. Locus ergo vel idem est astronomicè vel diuersus. Locum astronomicè eundem dico, qui est sub longitudine & latitudine loci eadem; ut Roma, Tibur, Tusculanum, est vnus obseruandi locus Astronomicè, quia sub eadem sensibili versantur hi loci longitudine & latitudine, licet physicè omnino sint diuersi: quia alius est locus Romæ Domus Professa, alius Collegium Romanum, &c. & vtriusque est physica

II.

1 locorum diuersitas pro habitaculorum à se distantia.

Dato ergo loco eodem astronomicè, si observationes in eo factæ ad vnguem correspondent, si cursus Macularum iidem proportionaliter sunt obseruati &c. bene factæ sunt censendæ observationes. si non concinunt, erratum est in obseruando. & hoc examinandi modo discussi omnes
10 observationes Romanas tam meas quam aliorum, atq. probas reperi.

Datis locis diuersis astronomicè si factæ observationes aut semper aut ordinariè similes euadunt, absque vlllo dubio in
15 obseruandi ratione erratum non est, & observationes sese mutuo probant. Quemadmodum factum cernis in propositis meis schematibus, vbi observationes locis diuersissimis factas, sibimet
20 consentientes aspicias, in plurimis observationum Imaginibus libro sequenti propositis. Nam natura ita constitutum est vt dum multi circa idem errant, raro in erroribus vel errandi modis conueniant. igitur cum circa hoc Phænomenon ob-
25 seruandum omnes vbique & semper conueniant, ab omnibus, vbique, semper & eodem modo errari impossibile est.

Secundò. Consideremus Tempus. *Examen ex tempore.*
30 Dupliciter potest in hoc negotio spectari tempus, Astronomicè & Physicè. illud aspicitur secundum progressionem Macularum sensibilem, ita vt quamdiu Macula vna motu proprio sensibilibus non
35 promouetur, dicamus moram illius temporis eandem, illud autem tempus, cuius lapsu Macula aliqua secundum motum proprium sensibilibus loco suo emota est, voco tempus aliud Astronomicè; quia Macula iam processit, & alio sui
40 curriculi sensibili loco hæret. Physicè spectatum tempus semper est aliud, siue notetur Macularum progressio siue non, quibus notatis.

Dato eodem tempore astronomicè Maculae vbicunq. locorum à quibuscunque, modo quocunque, dummodo rite obseruatae, in eodem proportionaliter appatenti circuli loco debent reperiri, si
50 secus, observationes vel omnes vel quædam mancas esse certum est, si vero hæreant eodem, pro legitimis admitto. Suppono autem hic, alias probatum, Maculas respectu Solis, carere paral-
55 laxi.

Dato.

III.

Dato diuerso Astronomicè tempore, Maculas diuersis proportionaliter insidere locis oportet. si secus, peccatum est in obseruando.

Pro Maculis centralibus aut centro vicinis, idem astronomicè tempus censi potest, horæ pars quarta aut summum dimidia. Quia $\frac{3}{4}$. aut vna hora, in meis obseruationum Circulis incipit fieri sensibilis; secus est in paruis, vbi etiam horæ spatium non sufficit ad Maculam loco sensibilibus emouendam.

Pro Maculis marginalibus, plus assumendum est temporis, vt aliud esse dicatur astronomicè, quia Macula diutissimè loco eodem sensibili immorantur, ad vnam, duas, tres, & plures horas, pro situ scilicet & declinatione paralleli, nec non qualitate cursus & temporis.

Examen ex diuersis personis.

Tertiò, Obseruatores possunt esse vel diuersi vel idem: si diuersi Maculas eadem obseruant, & in motu, loco, situ, magnitudine, figura, & numero conueniunt vtrique vnus obseruationes ab aliorum, & horum ab illius egregiè confirmantur; quemadmodum tot annorum nunc obseruationes in diuersis regionibus factæ, & postmodum collatæ testantur; & huius rei exempla plurima practica in libro sequenti afferuntur. Quod si in locis visis eodem tempore annotatis aliquid discrepantiæ intercederet, erratum alicubi esse, haud dubiè noueris, si cætera omnia paria ponerentur.

Examen ab obseruatore vno.

Si vero idem sit obseruator, probabit vnamquamque obseruationem, per alias antecedentes & consequentes; nam obseruationum ordinatio, & vnus Maculae de die in diem progressio, & ad Eclipticam habitudo, pulcherrime vel defectum vel bonitatem obseruationis cuiusque antecedentis, & consequentis detegit.

Expediitissimus examinandi modus.

Quod si quis vel antecedentibus, vel consequentibus obseruationibus destituatur, & tamen de sua obseruatione rite peracta securus esse velit; statim atque illam absoluit, antequam notabile tempus effluat, id est, intra dimidium horæ quadrantem aut citius eandem resumatur, & circulum obseruatorium cum circulo solari committat, tabulamque chartiserauoluat, quoad vsque & Maculae signatae Maculis solaribus, & circuli circulis perfectissimè congruant, quod si

IV.

1 aliqua consignatarum Macularum discordarent, alijs conuenientibus inter se, emendandæ essent sedes exorbitantium: quo facto signa perpendicularum, & obserua altitudinem Solis. Semper enim in exponenda obseruatione & imponenda Ecliptica, debes inuenire Eclipticam vnam & eandem, quia vnus & idem in vtraque obseruatione seruatur
10 Maculae cuiusque locus, quamdiu autem Macula eundem sensibilibus locum occupat, declinationem ab Ecliptica non mutat. Si diuersam Eclipticam reperis iisdem manentibus Macularum
15 locis, pro certo teneas, te vel in obseruando Maculas, vel in consignando perpendicularum aberrasse. Hoc ego examine expeditissimo maximam mearum obseruationum partem felicissimè expediui.

Examen per instrumenta & modos obseruandi.

Quartò, Instrumenta & obseruandi modi, maximam quoque huic difficultati afferunt expeditionem. Etenim, si diuersa instrumenta eandem Maculam eodem Solis loco exhibeant, vtrique vnus obseruatio alterius obseruationem vehementer roborat; sicut à me factum esse vides, anno 1625. Mense Ianuario, & Februario; idem in specie distinctis obseruandi modis, multo maxime elucet; prout praxis edocet, anno 1627. mense Martio exercitata; quæ tibi earundem Macularum cursus exhibet, modis omnino distinctissimis obseruatorum: quemadmodum suis locis, libro sequenti abunde edoceris.

Atque hos in obseruata inquirendi modos sufficere puto, cuiuslibet studium hoc vel aggredienti, vel ponderanti: nam qui manum operi admovent, plura docente vsu Magistro experietur. omnia namque singillatim persequi non est pro instituta breuitate huius operis.

45
50
55

PRAXIS IN OBSERVATIONES

*Macularum Solarium inducendi**Eclipticam, & circa**eandem difficul-**tates.*

CAP. XXXVIII.

VT Ecliptica inducatur, oportet ex observata & annotata vel hora, vel elevatione Solis supra horizontem, elicere angulum, quem Verticalis linea in observationem inducta, cum linea Eclipticæ ad centrum Solis in circulo observatorio comprehendit: idque singillatim in observationes singulas. Angulus autem iste varijs modis potest inquiri, idcirco illos breuiter percurramus.

Oportet autem prænosse, altitudinem poli, seu latitudinem loci, in quo observatio accepta fuit. deinde annum, mensem, & diem observationis, itemque tempus antemeridianum vel pomeridianum. Præterea locum Solis in Zodiaco. Quæ omnia habentur passim ex Ephemeridibus, aut alijs bonorum auctorum libris.

Horas autem cum scrupulis, itemque gradus, & minuta altitudinum solarium supra horizontem, suppono haberi consignata ad singulas observationes. Nam in singulas illarum inducendam esse Eclipticam, non est dubium, eo quod angulorum quos quærimus, in momenta mutationes fiant. Alij autem modi sunt Mechanici; alij Geometrici; alij Arithmetici siue Astronomici. Omnes tamen boni & demonstratiui. Incipiamus à Mechanicis, quibus olim Ingolstadtij vsum sum.

PRIMVS MODVS,

Quo Eclipticæ cum Verticali Circulo angulus acquiritur, reperitur beneficio Globi materialis, quo maioris, hoc melioris, Circulis vsitatis bene instructi, & ad poli dati elevationem constituti. Cuius doctrina & vsus vt solide tradatur, præmitto sequens

LEMMMA.

DATO IN PLANO

Circulo, æqualem describere in sphaera.

Sit datus circulus in 1. figura, ABCD, cui oporteat æqualem describere, in data sphaera figuræ 2. EFG, ex polo F.

Ad diametrum Circuli dati BD, protractam, ex puncto C, ultimo diametri alterius orthogonalis AC, applica, sphaeræ semidiametrum HE, vt fiat CI, applicata æqualis ipsi HE, tum ad interuallum IC, describatur arcus CA, secans IB, in K; quo facto, si arcui KC, æqualem abscideris FL, in circulo sphaeræ maximo ELF, atque ad interuallum FL, circulum describeris LMN, ex polo F, erit is, dato circulo ABCD, æqualis.

Demonstratio.

Circulus ICA, est æqualis circulo maximo EFG, propter æquales diametros; igitur si intelligatur esse rectus ad circulum AB, quandoquidem ipsum bifariam secat in diametro AC, transibit ipsius polum in K. Igitur circulus ABC, est in sphaera, quæ sit sphaera EFG, æqualis, cumq. arcus KC, sit æqualis arcui FL, patet & circulum FLN, circulo ABC, esse æqualem. dato igitur circulo in plano descripto, æqualem in sphaera statuimus, id quod erat faciendum.

PROBLEMA I.

Altitudine Solis supra Horizontem, aut hora data, angulum quem Ecliptica ad locum Solis cum circulo verticali facit, in globo mechanicè inuenire.

In sphaera HEFG, sit Horizon EO GP. Meridianus EFG, Polus mundi F, vertex loci Q, Ecliptica ORP, locus Solis in Ecliptica S, verticalis per locum Solis incedens QST, horarius per eundem locum transiens FSU. Igitur si in datum circulum observatorium XY, figuræ 3. inscribere desideras, Eclipticam, statues illi circulo in sphaera EQG, ad datum locum Solis S, ex eodem S, tanquam polo, æqualem per præmissum Lemma Z^a.

P. Cumque

III.

Cumque ex observatione nota sit altitudo Solis, vel hora, observationis tempore, ex alterutro obtinebis intentum, hoc modo:

Ex Altitudine Solis.

Angulus θ sola Solis altitudine.

Locum Solis eleua, vel deprime versando sphaeram, donec in datam altitudinem S T, incidat locus Solis S, quo facto, videbis vbi Ecliptica, R S O, & vbi verticalis Q S T, secent descripti circuli peripheriam, in punctis nimirum supra Z, α , infra γ , δ : nam vtriusque isti arcus, id est, vel Z, α , vel γ , δ , mensurant angulum quaesitum. vnde si vel arcui Z, α , abscideris aequalem X, β ; vel, γ , δ , aequalem Y, ϵ , in circulum obseruatorium X, η , Y, ex infra scripta verticali linea X, Y, induxeris, & rectam, ζ , coniuuxeris, erit ζ , η , linea Eclipticae, ad lineam verticalem; X, Y, debite collocata, & angulus X, θ , β , vel, Y, θ , ϵ , quem Ecliptica tempore observationis cum verticali fecit ad centrum Solis S, est is qui quaeritur.

Practice vero haec res facile, & cito fiet, si ex vertice Q, quadrantem sphaericum Q S T, superficiei sphaerae contiguum, e puncto Q, mobilem habueris, is enim in 90. gradus distributus, initio facto a T, versus Q, semper ostendet angulum Z S α , vel γ , S, δ , si altitudinis solaris T S, inuentus terminus S, constitutus fuerit in dato Eclipticae loco S. Res in se certa, secunda & facilis est, si instrumenta sint accurata. Et hoc fere modo usus sum Ingolstadij.

Ex Hora sola praecognita.

Angulus θ ex sola hora Solaris.

Certum est, circa axem, H, F, quotidie circumuolui Solem cum Horario F, S, V, per locum Solis, S, traducto: mensura autem huius motus est aequator, & omnes circuli aequatori paralleli, qualis est etiam L, M, N, diuisus bifariam a Meridiano L, N, G, estque punctum L, summum Meridiei, N, infimum mediae noctis. hunc ergo circulum cum quotidie percurrat horarius

IV.

per locum Solis S, ductus, si datur hora statuatur horarius in illa, quale est punctum ϵ , quo facto, firmetur globus, & per locum Solis S, agatur verticalis Q, S, T, is enim statim ostendet angulum cum Ecliptica, Z, S, α , &c.

Quaeritur ergo angulum ex altitudine Solis, & hora praecognitis, inter Eclipticam, & verticalem constitutum, assignauimus, id quod erat faciendum.

Practice non est opus circulum horarium P, S, V, habere descriptum, sed sufficit si ex polo F, prodeat indiculus horologarius, F, ϵ , qui locum Solis S, respiciat, quod fiet, si eodem Solis loco sub Meridianum, E, Q, G, traducto, etiam indiculum, F, ϵ , eidem accommodes; tunc enim pro illo die seruiet, & horas in circulo L, M, N, ostendet, quemadmodum in praesenti exemplo datam horam ostendit in ϵ , quo praestito, si Quadrans sphaericus, Q, S, T, per locum Solis S, traiciatur, acquires vt ante angulum sphaericum Z, S, α , & arcum, α , Z, qui metitur angulum quaesitum in plano. Ex hora igitur data, angulum verticalis cum Ecliptica eruimus, id quod erat faciendum. Hoc etiam modo, valde expedito, Ingolstadij frequenter usus sum.

Circellus & index horologarius.

MODVS SECVNDVS.

Idem Mechanicus, docet eundem Angulum, quem facit Verticalis cum Ecliptica, exhibere in Globo, vel quouis alio instrumento, in quo positione datur Ecliptica, & Circulus aequatori parallelus, per Verticem loci ex polo mundi descriptus; idque vel ex habita Solis supra horizontem eleuatione, vel ex data

hora. Prius tamen ostendendum

est, vnū

etiam Lemma superioris conuersum.

LEMMA

Demonstratio.

Intelligatur enim recta γ^d , ad planum circuli β^e , recta; igitur, cum circulus γ^e , secet circumulum minorem H , bifariam in β^e , ipse per eius polum d , transibit; ideoque in sphaera ambo constituti erunt. cum autem arcus d^e , & $Y Z$, sumpti, sint æquales, etiam circulos β^e , Z^e , oportet æquales esse, &c. Maximus in sphaera circulus describitur intervallo quadrantis, & si sit describendus per duo puncta data, polus inuenitur per intersectionem duorum quadrantium. Vide Theodosij lib. I. His habitis, esto

PROBLEM. II.

Altitudine Solis supra Horizontem, aut hora data, angulum quem Ecliptica ad locum Solis cum circulo verticali facit, in globo mechanice, ex altitudinis complemento, aliter inuenire.

In figura 4. $ABCD$, sit Ecliptica; Colurus Solstitionum AMC ; Polus mundi M , punctum β , A ; Cancri C , Arietis B , Libræ D ; & arcus MF, MH , sint gradus 48. eritq. $FGHI$, circulus ex polo M , descriptus, æquatori parallelus, per verticem Romanum F ; ideoq. dabuntur positione Ecliptica $ABCD$, & parallelus per verticem, $FGHI$, ad latitudinem Romanam; quibus habitis ita intentum assequeris.

Ex Complemento altitudinis Solis.

Sit locus Solis in O , & obseruatio altitudinis Solis sit exempli gratia, facta post meridiem, ita vt respectu circuli horarij MO , quem Sol tunc insidet, meridianus sit versus partes orientales B, C . Si igitur circino capiatur arcus OP , æqualis complemento altitudinis Solis, & posito vno pede circini in loco Solis O , alter extendatur appliceturque parallelo FGH , versus partes orientales Horarij MO ; erit procul dubio punctum P , vertex Romanus, & Meridianus erit MPN ; & angulus PON , erit angulus inclinationis, quem facit verticalis OP ,

Angulus ex complemento Solis.

1 cum Ecliptica OB , quemue metitur arcus PR , si is intelligatur descriptus ex Polo O , per punctum P , hoc est intervallo complementi altitudinis Solis.

5 Vt autem hic arcus PR , habeatur in gradibus, necesse est habere ipsius diametrum, quam exhibet recta SR , si in Ecliptica sumantur arcus OR, OS , complemento altitudinis Solis æquales; hæc autem in praxi acquiruntur, si per lemma præmissum, circulo PR , in sphaera ex O , polo descripto, exhibeatur in plano alius æqualis, & deinde ex eius circumferentia abscindatur arcui PR , æqualis, qui ad centrum subtendet quæsitum angulum; quem porro applicabis ad circumulum obseruatorium, ex inuento perpendicularo.

20 Ex his patet primo; non esse necessarium globum, sed plano tantum Eclipticæ $ABCD$, cum parallelo $FGHI$, sustentato ab aliquo fulcro, omnia posse perfici.

25 Ad praxin enim, non requiritur aliud, quam duæ circumferentiæ $ABCD, FGHI$, in ea positione datæ, quam habent in globo.

30 Patet & secundo. Hunc inueniendi anguli modum procedere ex complemento altitudinis, sicut prior operatur primario ex altitudine Solis.

Patet tertio, Cuilibet loco diuersæ latitudinis, deberi proprium statui instrumentum.

35 Patet quarto, In utroque modo, procedi per circulos sphaericos è loco Solis tanquam polo descriptos, arcusque illorum inter Verticalem & Eclipticam interceptos indagari; & illic quidem eundem semper seruari circumulum, nempe obseruatorium; hic autem in momenta mutari; itemque hunc reuocandum ad obseruatorium, illum vltiore reductione non indigere. Vnde magis illi quàm huic, in praxi adhæsi.

40 Et hætenus quidem è data Solis supra horizontem altitudine, vel potius eius complemento processum est,

nunc idem faciamus,

&

doccamus.

Compendiū instrumenti



Expositio instrumenti

I. I.

II. I.

*Ex hora data inuenire euidentem.**Angulus ex
sola hora.*

Positis prioribus, id est sphaera seu globo A M C D, in quo datur Polus Mundi M, & locus quem Sol in Ecliptica A B C, post prandium occupat, superponitur O, & quia in hoc casu ex sola hora cognita proceditur, oportet in circulo F G H I, per verticem ducto, nosse punctum X, quod circulus horarius in illa data hora insidet, circulus autem horarius, M O, in globo describetur, si ex M, & O, intervallo quadrantis maximi circuli, designentur in eodem globo duo arcus, eorum enim intersectio, quae semper cadit in aequatorem, dat polum, ex quo per locum Solis O, describendus est horarius O M, aut si per datum Solis locum & ambos mundi polos describas circulum in superficie Globi, erit is horarius O M, qui secabit circulum F G H I, in puncto horario X, & quia hora ponitur post meridiem, Meridianus stabit ex parte orientali X G H, hora est autem hora, unde cum circulus F G H I, sit aequatori parallelus, si diuidatur in gradus, possunt in eo numerari horae & partes horarum, numerentur ergo ex X, in P, vsque, datae horae pomeridianae cum suis scrupulis, &c. Igitur ubi finis numerationis statuitur in P, illic necessario est punctum verticis per quod Meridianus, M P N, transit, est enim arcus, P X, arcus horarum à Meridie, quem ostendit circulus horarius, M X O, horaeque à meridie in arcu Circuli paralleli F X P H, per verticem acti, interceptae sunt, X P, igitur punctum P, ut dixi, est vertex, transit enim per illud Meridianus, M P N, arcus ergo P O, erit complementum altitudinis Solis, quo habito, inuenietur, ut ante, angulus P O R, &c. Non est autem necesse, huius arcus O P, magnitudinem determinatam scire in gradibus & minutis, sed sufficit extensionem eius ex O, in P, nosci. Illam tamen dabit circulus cuius maximus in dato globo, per gradus & minuta diuisus: nam & hic arcus est circuli maximi, videlicet, verticalis portio,

Quod si circuli diuisi non sint, ad intervalum E A, vel E C describe semi-

circulum A F C, ex eoque diuiso absconde aequalem arcui O R, quod fit applicata chorda O P, &c. & sic habebis arcum cognitum in datis partibus, &c. Ex data igitur hora, Angulum verticalis cum Ecliptica inuenimus, id quod erat faciendum.

PRAEDICTI ANGVLI INVENIENDI

Modus Tertius.

Expositis duobus Mechanicis anguli praedicti inueniendi modis, proponamus nunc alium in

analemmate Eclipticae, quod in

PR. OBLE M. III. q non iup

Angulum, quem verticalis cum Ecliptica facit, in Analemmate Eclipticae reperire.

Si in praecedenti figura circulus F G H I

intelligatur perpendiculariter imprimi plano Eclipticae A B C D, incident eius puncta

eta valuerit in peripheriam Ellipticam, propterea, quod plana istorum circulo-

rum, Eclipticae nimirum & paralleli per verticem traducti, ad se mutuo sint in-

clinata: Ellipseos igitur futurae, maior minorque axis definiuntur hoc modo:

Constructio Problematis.

Est Ecliptica A B C D, eiusque & coluri solstitorum communis sectio sit dia-

meter A C, & semicirculus coluri ad Eclipticam rectus intelligatur esse A M C,

in eoque polus Mundi M, & arcus M F,

M H, complemento altitudinis poli aequales: eritque F H, diameter paralleli per verticem descripti, & perpendiculara-

res F G, H I, dabunt minorem axem G I, & punctum eius, medium L, dabit

centrum, & si ex L, erigatur perpendicularis R L S, & L S, L R, fiant aequales

semidiametris X F, X H, erit maior axis R S, & Ellipsis circa hos axes descripta,

erit in Analemmate, parallelus per verticem descriptus, cuius beneficio

absoluitur Problema.

propositum hoc modo.

P 3 Demon-

*Descriptio
paralleli per
verticem.*

ROSÆ VRSINAE

III.

Demonstratio Problematis, & usus.

Sit iterum locus Solis in O, & complementum altitudinis sit arcus ON, OQ, neclaturque occultè NQ, quæ extra tempus meridiei secabit Ellipsin in duobus punctis, ex quibus punctum orientalius P, seruit tempore pomeridiano; reliquum tempore antemeridiano: Cuius ratio est, quia, cum ista projectio sit analemmatica, recta NQ, representat in Globo circulum ex loco Solis O descriptum, & ad intervallum complementi altitudinis Solis, qui in eodem globo, necessario transit per verticem qui non potest non existere in parallelo per verticem traducto, qui projicitur hic in Ellipsin GRCS. Ergo etiam punctum P, in quo NQ, secat Ellipsin, est punctum verticis, & consequenter, Ellipsis descripta per OP, & punctum oppositum puncti O, refert verticalem ductum per Solem O. Quod natura Astrolabij Elliptici tales ellipses exigat, vt videre est, apud Clauium, initio lib. 2. sui Astrolabij.

*Compendiè
praxios.*

Et quia ad determinationem anguli quæsi opus esset diametro OE, & alia ad ipsam OE, perpendiculari; poterunt earum loco semper assumi diametri AC, BD, si punctum P, transferatur ad punctum Y, id quod fit, si triangulo OPE, fiat æquale triangulum AYE. Quo facto applicabitur ex puncto Y, ad diametrum BD, recta YK, æqualis semidiametro Eclipticæ; eritque segmentum eius YZ, interceptum, inter punctum Y, & diametrum AE, sinus complementi anguli quæsi, & consequenter, si Ea, sit æqualis YZ, & ad BE, perpendicularis; erit arcus Be, arcus anguli quæsi.

Ratio huius est, quia Ellipsis per AYC, descripta, esset eadem cum Ellipsi, quæ describeretur circa diametrum OE, per punctum P, & hæc Ellipsis in hoc Analemmate, respondet circulo verticali, eo quod punctum P, sit vertex loci: ergo etiam Ellipsis AYC, potest representare eundem. cum igitur recta YZK, sit æqualis semi axi maiori EA, sitque angulus AEK rectus; erit recta YZ, vel Ea, ipsi YZ æqualis, per ea quæ demon-

IV.

strata sunt ad Lemma 50. primi libri Astrolabij, minor semi axis eiusdem Ellipsis, in quam circulus verticalis procumbit, hoc est, punctum a, supposita translatione puncti P, ad Y, & loci Solis O, ad A. erit illud punctum, in quod cadit, perpendicularis circuli verticalis, quod a punctis, A, C, distat quadrante, & consequenter Ea, erit sinus complementi anguli inclinationis, quem idem verticalis facit cum Ecliptica.

Quod si recta YK, esset regula diuisa in sinus, & gradus, nonagesimus ponatur in K, tunc partes segmenti ZK, numerabunt immediate gradus inclinationis.

SCHOLIUM.


Praxis huiusce rei est satis expedita & facilis vt experienti patebit constructio, & demonstratio difficilior fortasse, & spinosior alicui appareat. at postquam tale analemma exactum in promptu habetur, angulus ex altitudinis solaris complemento, cito reperitur, dum segmentum ZK, idest, sinus versus a B, arcus quæsi Be, eruitur. nam arcus hic, dat angulum BEc, qui est, inclinatio verticalis ad Eclipticam.

Patet ex hoc, ad quamlibet loci latitudinem, seu poli altitudinem debere eiusmodi Analemma proprium constitui.

Cæterum de Ellipseos forma, natura, & descriptione, consule Guidum Vbaldum in Planisphærio; Clauium in Astrolabio, lib. 1. Lemmate L. LI. & LII. Practicæ Ellipsis cito delineatur, si regulam habeas, cui infigas indicem scriptorium, deinde ad distantiam semiaxis minoris clauiculum, & alium ad distantiam maioris semiaxeos ab eodem indice transfigas, & vtroque clauiculos inter, gnomonem mouendo regulam teneas, &c. id quod tantum insinuo, nam apud artifices res est vstitata: per duos etiam focos, si ex illis filum figas, ad semiaxem minorem extensum, & indicem beneficio fili directum circumagas, &c. foci semper sunt quærendi in maiore axe vtrunque, quos dat maior semiaxis, ex minoris extremo puncto, vtrunque ad maiorem applicitus, vbi enim sectio, ibi erit vtrunque focus. Eadem inueniuntur etiam passim in gnomonicis, & opticis, apud Clauium & alios, &c.

In Exegetibus meis inuenies nouum, descri-

*Modi descri-
bendi Elli-
psin.*



I.
describendæ Ellipseos, Paraboles & Hyperboles modum, vnico tractu, cumque facilem & expeditum.

Multa hic breuitatis ergo omitto, quæ alibi fortassis dicentur vberius.

QVARTVS PRAEDICTVM ECLIP-
tica cum verticali angulum inuenien-
di modus, ex Astrolabio Gemma Fryſii

II.
uniuersali, accommodato plano Ecli-
ptica.

CAP. XXXIX.

PROBLEM. IV.

9 **A**NGVLVM quem facit Ecli-
ptica cum verticali, ex applica-
tione Astrolabij inuenire.
Circulus

ROSÆ VIRSINAE

III.

Circulus igitur $ABCD$, est Ecliptica, in quem ex polo E , proiecti sunt, more solito alij circuli, secundum longum & latū, per denos tantū gradus: nā exēpli & docendi causa hæc tantum afferimus; in vsum oportet per singulos gradus procedere, & formam maiorem adhibere. Quid autem officij singuli circuli hic expressi habeant in præsentī negotio apparebit vbi ea, quæ huic Astrolabio sunt addenda, absoluerimus.

Constructio, & Demonstratio.

Primò igitur omnium definiendus est quoque parallelus per verticem dati loci incedens, cuius diameter in recta AC , quæ hic est communis sectio Eclipticæ, & Coluri solstitiorum, inuenitur hoc modo.

In semicirculo AMC , ad Eclipticam recto, si punctum C , sit punctum $\odot$, & arcus CM , Graduum 66. min. 30. æqualis complemento declinationis $\odot$: erit punctum M , polus Mundi; & D, B , poli Eclipticæ; sumptisque arcubus MF , MH , graduum 48. erit recta FH , diameter paralleli, per verticem Romanum: & rectæ BF , BH , eductæ ex oculo B , constituto in polo Eclipticæ B , dabunt in recta HC , puncta G, I ; & recta GI , erit diameter circuli, qui in Astrolabio repræsentat parallelum verticis. Diuisa igitur GI , bifariam, in K , habebitur centrum eiusdem circuli, & KI , vel KG , erit semidiameter. Non est autem hic circulus descriptus, quia in vsum & solutione huius nostri problematis, non debet hære eodem loco: quia recta AC , non est semper communis sectio Coluri & Eclipticæ, sed perpetuo fere transfertur ad alia atque alia puncta Eclipticæ, vt punctum A , possit semper esse locus Solis, angulum quæsitum terminantis. Vt, v. g. Sole existente in 20. gradu ϕ , punctum ϕ , intelligetur viginti gradibus distare à puncto A , versus occidentem, hoc est versus D , & diameter Coluri tunc erit $\phi, E, \odot$, & centrum circuli seu paralleli per verticem tunc erit punctum N , in quo circulus KN , descriptus ex E , centro Astrolabij per K , secat rectam $\phi, E, \odot$; eodemque modo inuenitur centrum paralleli, in quacunque alia diametro Coluri $\phi, E, \odot$, ita vt operæ precium sit, totum circulum KN , qui centrum circuli

IV.

per verticem acti circumfert, in hoc Astrolabio exprimere.

Inuento autem centro N , nullo negotio describitur ipsemet parallelus, eo quod eius semidiameter sit semper recta, KI , vel KG ; non est tamen opus ipsum describere, quod sine ipso possit haberi punctum ad solutionem problematis necessarium: quod inuenitur hoc modo.

A loco Solis A , computentur in Ecliptica, hoc est in ipso circulo Astrolabij, arcus complementi altitudinis Solis, exempli gratia, Gradus 70, acceptoque beneficio circini, interuallo semidiameteri KI , vel KG , ponatur alter pes, in inuento puncto N , & reliquus transferatur ad parallelum Graduum 70. vrrinque v. g. vsque ad O , vel P , alterutrum enim horum est punctum quæsitum. & tempore quidem pomeridiano seruit punctum O , quod altero est orientalius, alterum vero, P , quod est occidentalius, seruit tempore antemeridiano, & tam hoc quam illud repræsentat punctum verticis; & idcirco arcus AOC , APC , circuli maximi, repræsentant circulum verticalem, quorum inclinationes ad Eclipticam, metiuntur rectæ, seu potius arcus in rectas proiecti, pomeridiani QB , antemeridiani RD , & gradus quos hæc segmenta continent, sunt gradus anguli qui quæritur: quos adscripti vtrinque numeri statim indicant.

Atque hæc ratio videtur omnium expeditissima, si in Astrolabio tam circuli maximi, quam paralleli descripti sunt per singulos gradus. Certè expeditior est quam Analematis: quamuis constructio Analematis sit facilior, cum vnico circulo, & vnica tantum Ellipsi sit contentum. Priores denique supponunt instrumentum non planum. Hoc autem semel rectè constructum, præferri potest etiam globo, qui difficillime paratur perfectus.

Ex his facile est intelligere nomina & officia partium in hoc Astrolabio descriptorum.

Circulus enim $ABCD$, est Ecliptica. in quam ex A , & C , coniecti paralleli, abscindunt complementa altitudinum solarium supra horizontem, numerata ex A , versus B, E , & D , tam in Ecliptica, quam singulis circulis maximis per AC , ductis, & in planum Eclipticæ projectis.

Idem

Vsus circuli per verticem.


Hoc Astrolabium in praxi alijs præfertur.

Officium Eclipticæ.

Officia parallelorum.

Descriptio paralleli per verticem.

Locus Solis in Astrolabio est punctum A .



I.
Iidem paralleli singuli vna cum maxi-
mo parallelorum DEB, ostendunt ver-
ticalium à quibus secantur, ad Eclipti-
cam inclinationum angulos ad A, locum
Solis comprehensos, inter Eclipticam &
verticalem quemcunque, &c. id quod
numeri ex B, versus E, aut ex D, versus
E, ipsis quoque applicandi, satis indi-
cant: sunt enim ij communes totis arcu-

II.
bus circulorum maximorum, &c.
Arcus circulorum A, 10. C, A 40. C, Officia ver-
& alij inter D, & E, E, & B, referunt ticalium.
circulos verticales, & eorum ad Eclipti-
cam varias inclinationes, per singulos
5 gradus, si sint descripti, è quouis Eclipti-
cæ loco A, toto anno exhibendos.
AGKC, præterquam quod sit vnus
9 verticalium, est quoque, vt in principio
diximus,

III.

diximus, Colurus Solstitionum, in quo existit K, centrum circuli per verticem acti, mobilis, ideoque dum istam lineam circumgiramus, per omnia signa, idem fit atque si stante linea volueremus Eclipticam.

Officia lineae AGKC, mobilis.
Ipsa ergo dum ex A, versus D, & hinc versus C, atque ab hoc per B, rursus in A, peruenit, & trans centrum E, punctum K, hoc est centrum circuli per verticem traducti, secum in circello KN, circumducit, tria officia praestat.

Primum.
Primo. Coluri solstitionum situm, habitum & locum respectu Eclipticae, & loci Solis A, necnon Astrolabij in Ecliptica induci, ostendit.

Secundum.
Secundo. Signum & diem signi in quo Sol apud A, versatur denominat. dum enim Sol in Ecliptica caelesti ex ϕ quotidie vnum gradum progreditur, ita linea Coluri hic ex A, loco Solis, & initio ϕ , versus ω , & ita deinceps promouet per omnia signa, ita vt in quo signo & loco signi in Zodiaco inuenitur in caelo, illic constituatur linea Coluri promotae apex A, quae, vt dixi, quotidie vno gradu progreditur, initio facto ex A, Capricorni principio. A vero, est Solis locus, stabilis per omnes & singulos totius Eclipticae gradus, vnde Ecliptica per ipsum non ipse per Eclipticam moueri cogitatur, ideoque Colurus solstitionum mobilis assumitur.

Tertium.
Tertio. Centrum Circuli per verticem & quaecunque inde pendent, exhibet. habito autem positione centro, datur etiam positione ipse circulus ad interuallum KI, describendus.

Locum Solis in Zodiaco dare.
In exemplum, scire lubet, quantum Solis locus A, recesserit a Coluro AGKC, in 15 $\times$, &c. quere gradum decimumquintum Piscium apud S, ex eo demitte per centrum E, rectam ST, & illa erit Coluri pars, in T, centrum circuli per verticem ducti terminata. Iam si videre desideras constitutionem quam Sol & Astrolabium die illo ad illum verticis Circulum habent, ex T, ad interuallum KI, describe circulum, & videbis ante oculos omnem istorum illo die ad sese habitudinem & positionem.

Officia Limbi.
Limbus in tres annulos distinctus, continet extimo signa Zodiaci; medius habet numeros gradibus signorum debitos, infimus ipsos gradus. Numeri ex A, secus quadrantes Eclipticae versus B, & D, ita

IV.

1 in recta AE, expressi, designant complementorum altitudinis Solis gradus, a loco Solis A, ad verticem vsque designatos. Etenim ad locum Solis numeratur eiusdem altitudo, a Sole ipso in A, posito, 5 numeratur ad verticem vsque Complementum altitudinis, quod in gradum 90. potest summe extendi, Sole nimirum existente in Horizonte. Sole vero supra 10 Horizontem eleuato, complementum altitudinis nonagesimum gradum nunquam assequitur; vnde recta BD, est terminus Orientis, & Occidentis Solis; Sole enim in A, & in Oriente posito, ubi 15 altitudo est nulla, Complementum altitudinis, hoc est arcus inter Solem & verticem est, & ideo necessario ad rectam ED, terminatus; rursus Sole A, in occidente constituto, Complementum altitudinis ob eandem causam finiret recta EB. 20

Et quia mediatio semicirculi Eclipticae abscissi ab Horizonte in loco Solis, necessario fit a verticali ad Eclipticam recto, & inter omnes verticales vnus tantum AEC, 25 est ad Eclipticam rectus, Sole posito in A, erit omnino recta AE, terminus huiusmodi Mediationum. E quibus omnibus deduco sequentia.

PROBLEMA TA
Practica.

PROBLEMA. I.

35 *In quanta verticalis ad Eclipticam inclinatione Sol quouis signi gradu oriatur, ostendere practice ex Astrolabio.*

40 Sit gradus 15. Piscium, inde deduc lineam Coluri ST, & ex T, ad interuallum KI, extende circinum in ortiuam lineam DE, ad V, vsque, segmentum igitur DV, dabit verticalem AVC, in quo Sol oritur, simulque eius ad Eclipticam inclinationem DAV, recta DV, 45 Astrolabice mensuratam, & numeris adscriptis expressam, qui erunt gradus plus minus 65. Sic procedes, die & gradu signi quouis.

PROBLEMA. II.

50 *In quanta verticalis ad Eclipticam inclinatione Sol dato Signi gradu occumbat, practice ex Astrolabio assignare.*

Sit

Linea AE, est Mediationum Ecliptica terminus.

Angulum Orientis Solis ostendere

I.

Angulū or-
eidentis So-
lis dare.

Sit datus gradus 15. Piscium, ex T, i
centro, extende secundum interuallum
KI, alterum circini pedem in rectam oc-
cidentalē EB, vbi secta fuerit in Y, illic
habes & verticalem occasus AYC, & e-
ius ad Eclipticam inclinationem YAB, li-
nea YB, expressam, graduum quasi 20.

COROLLARIUM.

Ex hisce duobus problematis intelli-
ges quando facilius & securius sint obser-
uandæ Maculæ, antemeridiano an pome-
ridiano tempore: Si nimirum ex T, cir-
cinum applies ad eundem parallelum, 15
60. verbi gratia, in parte orientali, ad Z,
inuenies sub altitudine Solis, Verticalem
AZC, graduum inclinationis 80. post
meridiem in eodem parallelo 60. sub al-
titudine eadem 30. graduum, ad pun-
ctum α , reperies verticalem α C, ha-
bentem inclinationem graduum 35. cir-
citer. Igitur cum ex praxi perpetua mihi
certo constet, multo facilius & certius
obseruari maculas, quando Sol ad Ecli-
pticam angulos minores facit, difficilius
quando magnos; secure enunciabis, hoc
tempore, sub eadem Solis altitudine, ob-
seruationes post meridiem facilius insti-
tui, quam ante. Magnum habet hæc res
ad obseruandum momentum, & à sedu-
lo Obseruatore est singulariter aduertenda;
inde enim per totum annum sese-
scit dirigere, & tempus obseruationi op-
portunius reseruare.

PROBLEM. III.

Locum in recta AE, assignare, in quo Sol
Eclipticam supra horizontem mediat,
in dato signi gradu.

Sit datus signi gradus, 15. Piscium X;
extende circinum ad interuallum KI, sta-
tue alterum pedem in T, alterum appli-
ca super rectam AE, in punctum, ϵ , &
illud erit, in quo Sol illo die positus, E-
clipticam in duo æqualia diuidet, quia
versatur in verticali A β EC, qui ad Ecli-
pticam est rectus, ideoque vtrinque ab
horizonte ipsius quadrante distat, & con-
sequenter mediat.

Locum me-
diationis de-
signare.

II.

COROLLARIUM I.

Hinc intelliges, sub quanta Solis alti-
tudine debeas obseruare, vt in Circulum
obseruatorium Eclipticam sine vlllo alio
calculo, solius perpendiculi ope impor-
tes; id enim assequeris, si Sole Vertica-
lem AEC tenente, præstabis; vt autem
id facere possis, prænosse oportet, alti-
tudinem ipsius supra horizontem, quam
dabit, in proposito, arcus A β , qui est
complementum altitudinis, graduum
videlicet 55. quibus demptis ex 90. ma-
net Solis altitudo, graduum 35. igitur si
illo die, quo Sol 15. Piscium, gradum ob-
tinet, sub altitudine Solis antemeridiana,
gr. 35. aliquam Maculam obseruaueris,
perpendiculum induxeris, & huic per cē-
trum circuli obseruatorij diametrum ad
angulos rectos statueris; erit ipsa Ecli-
ptica, & Macularum obseruatorum re-
ctus ad ipsam situs.

Altitudinē
Solis Eclip-
ticæ median-
tis enuncia-
re.

Hæc praxis in se est certa, prærequi-
rit tamen, altitudinem præcisē ex A β ,
præcognitam, vnde necesse est Astrola-
bium magnum & accuratum esse. dein-
de exigit quadrantem pro altitudine su-
inenda egregium, & obseruatorem mini-
me fallacem. Tandem, illum qui Ma-
culas obseruat, oportet esse expeditum,
& securum. Et hæc omnia ideo præmo-
neo, quia res hæc debet ferme in mo-
mento perfici, propterea, quod Ecliptica
ab isto mediationis æquilibrio, motu diu-
no celeri, statim euehitur, & consequen-
ter obliquos inclinationum angulos fa-
cit. Vnde si quis hanc praxin sine felici
successu exerceret, hisce difficultatibus,
& suæ forsitan tarditati aut inertia, erro-
rem adscriberet. nam res, in se certa, sed
ad hoc temporis punctum alligata, ar-
dua est.

COROLLARIUM II.

Ex hoc solaris loci æquilibrio, habes
iterum vnā regulam certam & vniuer-
salem, pro cognoscendo & determinan-
do ad obseruandum tempore commo-
diore; quæ talis est.

Quicunque Verticales Circuli, à Sole
sub eadem altitudine insecsi, sunt loco æ-
quilibrij seu mediationis viciniore, ij sine
dubio, habendi sunt ad obseruandum in-

Regula pro
commodo ad
obseruandū
tempore no-
scendo.

optiores

III.

Regula pro
noscendo tē-
pore incom-
modo.

eptiores; qui verò sunt remotiores, ij
multo sunt habiliores: vt, quia in propo-
sito exemplo, dum Sol, ante meridiem,
altus grad. 30. verticalem A Z, insidet,
est puncto β , longe vicinior; quam dum
eundem post prandium occupat, in α , al-
tus itidem gradus 30. Hinc alia rursus
practica & generalis pro hac re regula e-
ruiitur; videlicet, in quam partem lineæ
mediatricis A E C, segmentum Circuli
per verticem acti, minus cadit, illud uti-
que ad obseruandum tempus importu-
nius subministrat, quia segmenti minoris
arcus est secanti vicinior, quam maioris,
& consequenter verticales viciniore de-
signat, quam illius; vt in priore exemplo,
segmentum β E V Z β , est minus, quam
segmentum β E Y α β , & arcus illius V Z β ,
est mediatrici secanti A β E, multo vici-
nior, quam arcus β α Y; atque ob hanc
causam, verticales circuli, qui designan-
tur ab arcu β Z V, sunt rectæ A E, longe
viciniores, quam qui intercipiuntur ab
arcu β α Y.

PROBLEM. IV.

Determinare, in quam Astrolabii pla-
ga, ad datum Solis in Zodiaco locum,
mediatrix A E, versetur,
Orientali, an Occi-
dentali?

Prænotan-
da.

Certum est Solem semper in aliquo cir-
culo verticali hæere, certum etiam est,
arcum diurnū à Meridiano bifariam diui-
di, & altitudinibus antemeridianis æqua-
les fieri pomeridianas, ideoque per pa-
rallelas altitudinum arcus diurnos secari
in omnibus altitudinibus æqualibus, in
vnica meridiana tangi: vnde certum etiā
est, similia euenire à parallelis comple-
mentorum respectu circuli per verticem
acti, quem vnicus tangit in Complemen-
to altitudinis Meridianæ, reliqui omnes,
qui complementis maioribus definiun-
tur, ipsum secant. Igitur sicut quotidie
Sol, duas supra horizontem altitudines
æquales facit, momentis quibuscumque,
vnā ante, alteram post meridiem, in
meridie autem medio loco & altitudine
summa consistit; ita necesse est, ipsum
quotidie, complementa pomeridiana
antemeridianis æquare, meridianum au-
tem vnicum constituere, & omnium qui-

IV.

dem minimum, quod sit altitudinis ma-
ximæ, &c. his præsuppositis.
Sit vt ante, datus signi gradus, 15. Pi-
scium; posito igitur circini ad K I, exten-
ti, altero pede in T, extende alterum ad
lineam A E, in punctum β , & considera
quotus ex adscripto numero complemen-
ti parallelus, tum circumducto circino,
explora an in eundem denuo recidas in α ;
si sic, certus sis, punctum β , esse orien-
tale; punctum α , occidentale. Quod si
parallelus non secaretur bis à circino, sed
tantum tangeretur; Mediatix A E, esset
ipsamet in Meridie. Si vero ante ipsam,
versus D, fiat paralleli sectio, & ipsa po-
stea in eodem interfecetur, ipsa utique in
plaga occidentali versabitur.

COROLLARIUM.


Hinc pro opportuno obseruandi tem-
pore datur rursus Regula practica genera-
lis. Versante centro K, circuli per ver-
ticem acti, in semicirculo K N, siue
versante Sole in semicirculo ascendente
ex β , per Y, in ω , vsque, obseruatio-
nes pomeridianæ, cæteris paribus, expe-
ditius fiunt, antemeridianis. Contra,
transiente Sole ex ω , per α , in β , per
semicirculum descendente, secumque
traducente centrum Circuli per verticem
transientis, ex γ , per A, in K, obserua-
tiones securius fiunt tempore antemer-
idiano periculosius pomeridiano. Vno
verbo, cuius temporis plagam occupat
centrum K, illius obseruationes peragun-
tur promptius, cæteris paribus, quia
temporis alterius regionem occupat linea
mediatrix A K, & minorem Circuli ad se
rapit portionem, maiorem vero semper
centrum.

Regula pro
opportuno
obseruandi
tempore.

PROBLEMA V.

In dato Astrolabio, ad datum Solis in zo-
diaco locum & centrum circuli per
verticem, altitudinem Solis me-
ridianam & circulum
meridianum assi-
gnare.

Sit datus Solis in Zodiaco locus, gra-
dus 15. Piscium, & ex eo, centrum cir-
culi per Verticem inuentum T; extende
circinum ad distantiam K I, positoque
vno



V.

vno pede in T,extende alterum versus A, quoadusque contingat aliquem ex parallelis complementorum, & non secet; ipse enim dabit in AE,numerum complementi, quo subducto ex 90.residuum erit altitudo meridiana;& verticalis per inuentum contactus punctū, erit circulus meridianus. Quod sic probo;quia si hic qui tantū per cōtactum transit non erit meridianus

VI.

erit aliū,qui vel omnino nō tāgitur à circulo per verticē actō,& sic cōplemētū altitudinis meridianaē est equo minus;& cōsequenter altitudo debito maior, adeoq. falsa:vel dū tangitur simul quoq. secatur;& sic dabuntur vnus diei duo meridiani; item altitudo meridiana debito minor,circulus enim qui nude tangitur dat altitudinem quocunque bis secto maiorem.

Q. Ista

Altitudinis
verticalis
meridiani
inuentio.

ROSAE VRSINAE

VII.

Ista autem sunt absurda, igitur non admittenda, & stat adhuc, à parallelo purè tacto, per punctum contactus & altitudinem Meridiani & Meridianum inueniri.

Punctum contactus meridiani inuenire.

Quia tamen contactus ad sensum saepe magnam latitudinem occupat, ut nescias ubinam illud reponendum sit, sic verum ipsius locum nancisceris; firmato altero circini pede in inuento circuli per verticem centro, alterum extende ad maiorem quam sit KI, distantiam, ut parallelus, qui nude fuerat contactus, secetur vtrinque; arcum deinde inter binas sectiones interceptum diuide accurate bifariam, nam diuisionis punctum, erit etiam contactus; quia linea ex habito centro per illud protracta, transibit etiam per centrum paralleli contacti.

COROLLARIUM I.

Angulus meridianus.

Hinc facile est, Meridiani die quouis ad datum locum, inuenire ad Eclipticam inclinationem. quæ ostenditur in linea, BED, vbi verticalis per communem paralleli, & circuli per verticem tracti, contactum incedens, ipsam secat. nam segmentum maius, mensurat angulum inclinationis.

COROLLARIUM II.

Eadem opera habebis prædictæ inclinationis complementum, quod mensurat in segmento minori lineæ EB, distantiam Meridiani à Mediatrix AEC, id est, inclinationem planorum per axem Eclipticæ, & axem Mundi, nec non locum Solis datum incedentium. Nam locus Solis est A, communis omnibus verticalibus; in AEC, polus Eclipticæ est E: In verticali quocunque, qui sit meridianus, inhæret polus & axis mundi, igitur illorū ad se inclinatio sumenda est penes segmentum vnius rectæ BE, vel DE.

Meridianus autem semper inuenitur ex ea parte, in qua centrum circuli per verticem reperitur. bis autem in anno, concurrunt omnia hæc, in vnicum verticalem AEC, quando nimirum Sol in ☊, vel ☋, versatur.

Plurima possent hic inquiri, scitu dignissima, sed quia in prioribus sunt multa tacta, dum de Mediatione agerem,

VIII.

1 censeo in aliud tempus reliqua reijcienda.

PROBLEM. VI.

5 *Macularum regressum, stationem, & progressum, circulo per verticem, practicè ostendere in Astrolabio.*

10 Omnes meas obseruationes in ordinē redege, per hanc Astrolabij figuram, & circulum per verticem tractum; in quo labore dum noctes diesque versor, experior frequenter, eodem die, tam mane, quam vespere, idque in æstate potissimum, verticalium ad Eclipticam inclinationes, maiores & minores fieri, & sub diuersis Solis eleuationibus æquales, intermedias autem longo satis tempore vix variari sensibilibiter, quam rem dum conféro cum obseruationibus, inuenio omnino, iisdem temporibus Macularum in circulis obseruationum, regressum, stationem & progressum esse factum. Quam rem dum sæpe verso, & diu tracto, probe aduerto, Circulum in Astrolabio per verticem tractum, & annue circa centrum Astrolabij, dum obseruationes de die in diem expono, circumductum, practice, ac luculenter & quasi vltro ob oculos ponere, quidquid in ea latet, & rerum istarum studiosum, veluti manu in abdita naturæ, & rerum admirabilium speculationes abducere. Id quod me quodammodo cogit, hic aliqua saltem ex ijs, quæ isto assiduo tot annorum vsu, & summa cum modis hisce, quibus obseruata expono & in ordinem redigo, conuenientia, didici, pinguiori quadam, ut aiunt Minerua, quantum satis est, ad institutum meum, pro recta & commoda obseruandi praxi, percurrere: nam breuitas temporis, in tam abstrusa materiæ istius subtilitate, addo etiam lubricitate, exquisitam huius theoriæ, quam latissimè patere non sum nescius, & pleniorē tractationem, mihi modo non permittit. Quod si accuratas eadē super re speculationes, quas P. Christophorus Gruenberger elaborauit, & mihi promisit nactus fuero, eas in grati animi signum, & boni litterarij publici commodum, tuique Lector, gratiam, lubens volensque, opportuno loco subnectam.

Etenim

IX.

X.

Etenim sicut ego illi, hoc Phænomeno, Macularum præsertim regressione, statione & progressione, (quas Phænomeni affectiones, licet æstate quotidianas difficiliter tamen, & non nisi post manifesta experimenta à me exhibita, in censum verarum apparentiarum admisit,) multa præclara excogitandi occasionem dedit ita vicissim dare illi locum, & quidem honestissimum, in hoc meo opere, mecum semper in animo destinaui.

Vt, quod debeo illius auctoritati, qua laboribus meis approbatis hederam apposuit; & industriæ, qua me iuuit in inventionem modi facilioris ad determinandum angulum verticalis cum Eclipticæ, non solum priuatim agnoscam, sed publice contestatum relinquam posteritati.

Interim ad ea quæ sequuntur, rectius intelligenda.

Præmitto primò. Circulum in figura Astrolabij Ecliptici, per verticem, tractum, à linea B D, in duas partes diuidi, quarum illa, quæ versus A, iacet, est & dicitur à me portio diurna, quia ex A, in ipsam vsque, omnis tam parallelorum, quam Verticalium Circulorum vsus diurnus completur: etenim quamprimum Circulus per Verticem lineam B D, transilit versus C, vsus illius prorsus nullus est, quia tunc Sol infra, non supra horizontem versatur; ideoque portionem versus C, iacentem, voco segmentum Circuli per verticem, ducti, nocturnum: ipsam vero lineam, B D, si placet, haud incongrue, vel finitorem, vel noctudialem appellabimus.

Præmitto deinde secundò, solos illos parallelos, & verticales Circulos ad vsum assumi posse, quos perimenter Circuli per Verticem diurnus attingit; nam qui omnino extra cadunt, inidonei existunt.

Præmitto tertio, circellum K T, à centro K, circuli per Verticem ducti, circa polum Eclipticæ E, descriptum, diuidi ab eodem B D, per A, bifariam quarum eam AK, quæ est versus C, portionem, appello semicirculum centri hyemalem, vel si mauis australem; quia Sol tum percurrit signa austrina, quæ nobis brumam afferunt: oppositam, voco semicirculum centri æstiuam.

lem siue borealem; quia dum centrum istum arcum semicircularem percurrit, interea Sol signa arctica, quæ nobis æstatem afferunt, perambulat.

Præmitto quartò, Omnia & sola illa puncta, in quibus paralleli per verticem periphæria, cum verticalibus alicubi concurrunt, esse verticalia; reliqua vero, quæ intra vel extra illius circumferentiam assumuntur, non esse verticalia, pro illa saltem Circulorum positione. His prænotatis.

DICO Primò. Centro circuli per verticem acti, in semicirculo australi versante, nulla contingit in parte eiusdem circuli diurna, regressio, vel statio, sed mera progressio. *Quando nulla regressio vel statio fiat.*

Quia nullus Circulorum Verticalium, in parte diurna à Circulo per verticem bis secatur, propterea, quod circuli per verticem centro K, in parte australi C, posito, altera cuiuscunque verticalis sectio, cadat in partem nocturnam, eandem videlicet, in qua centrum K, existit. quod sic probatur. Omnium verticalium centra consistunt in recta B D, vtriusque protracta, & eorum quidem qui inter E, & D, incedunt, quod sint concaui versus E, centra reperiuntur ex parte E B; eorum vero qui feruntur inter E, & B, quod sint concaui versus E, centra consistent in linea E D, protracta: igitur si detur nunc vnus circuli Verticalis inter D, & E, incedentis, altera sectio versus partem A, in segmento circuli per verticem diurno, si agatur per vtrorumque circulorum, id est verticalis, & qui est per verticem, centra, linea recta, illa ex parte E B, concurret alicubi cum linea E B, ibi nimirum vbi circuli verticalis centrum esse supponitur, igitur cum hæc linea per centrum alterius circuli, quod in parte C, versari ponitur, etiam transeat, ipsa cadet tota inter D, & C; cumque ipsa inter duas istorum circulorum communes sectiones ad eandem partem D, factas incedat media, & in parte circuli per verticem nocturna consistat, alteraque versus A, reperiatur; euidentius est, alteram multo magis in portione nocturna versus C, vergere. In exemplo practico res tota elucescet.

Dum Sol vigesimum Capricorni gradum obtinet, centrum circuli per verticem est in N, ex quo per circinum ad inter-

Verticales
quæ cadunt
extra paral-
leli per ver-
ticem, ad hoc
negotium non
seruiunt.

ROSAE VRSINAE

XI.

interuallum KI, secetur verticalis aliquis in oriente diurno, ad punctum γ ; & si cogitetur per N, incedere recta aliqua versus centrum verticalis circuli A γ C, quod existit in recta EB, producta, patet rectam per centrum verticalis & dictam N, facere angulum in parte Australi, & ab eadem EB, recedere versus C, cumque illa recta per N, producta secet verticalem A γ C, in aliquo puncto θ , cadet illud in medio duarum sectionum; & cum prior γ sit in parte orientali diurna, posterior necessario erit in nocturna ad μ .

Eodem modo, si ex eodem centro N, secetur aliquis verticalis occidentalis diurnus in γ , altera ipsius sectio, per rectam N λ , amborum circulorum centra nequentem, & duas illorum sectiones bifariam diidentem in λ , probabitur casura in portionem nocturnam versus C, ad punctum μ .

Confirmantur hæc perpetua & antecedenti experientia in obseruando cum dictis conformia.

Quando regressio, statio, & progressio fiat. DICO Secundò. Centro circuli per verticem ducti, in semicirculo γ A, boreali versante, continget Macularum regressio, statio & progressio, tam circa ortum, quam occasum diurnum.

Sit centrum circuli per verticem acti in μ , & distantia KI, id est, eius semidiameter ex μ applicetur ad ED, incidat in 60. tangatque verticalem A 60. C, cumque centrum μ , iaceat in diametro verticalis A 60. C, quæ ex centro in E B, protensa alicubi collocato prodire intelligatur, erit μ 60. maior alijs quibuscunque inter ipsam & reliquam diametri intercurrentibus, per 7. tertij. igitur si circulus ad interuallum μ 60. intelligatur describi versus A, ipse verticalem A 60. secabit semel in 60. & iterum in ν , quod linea centra vtrorumque circulorum nequens, & arcum inter duas sectiones interceptum bisecans, tota versetur in parte diurna A, & semper magis magisque diuerget à noctudiali BD. Ex iisdem rationibus idem circulus per verticem ex μ , ad solitum interuallum KI, in plaga diurna ABE, vespertina descriptus, secabit verticalem A 30. C, in binis punctis ξ , & θ , atque adeo totus arcus $\theta \xi$, cadet intra verticalem. quandocunque autem hoc contingit, necesse est, diuersis temporibus

XII.

duobus, dum scilicet istæ sectiones in eodem verticali contingunt, æquales ad Eclipticam inclinationes intercedere; intermedio autem tempore ascendere, stare, & descendere. Quod cum mane & vespere fiat, quotidie, dum centrum in semicirculo boreali vagatur, necesse est regressionem, statum & progressionem itidem euenire; cū hac tamen discretione; quod mane prima sit regressio, deinde statio, tandem progressio; vesperi vero, primum locum semper obtinet ordinaria progressio, secundum statio, vltimum regressio.

Confirmantur hæc ex antecessis in obseruando experimentis, stabiliuntur ex subsequituris.

DICO Tertio. In æquinoctiis versante centro Circuli per verticem, nulla fit regressio, aut statio, sed mera progressio.

In æquinoctiis est sola progressio.

Quia cum circulus per verticem habeat suum centrum in noctilucana BD, in quam omnes verticales circuli sua collocauerunt, patet aut nudos contactus fieri inter verticales & circulum per verticem, aut sectiones vtriusque æquales, in parte diurna & nocturna.


DICO Quarto. Initium regressionis immediate fit, post æquinoctium vernum, dum Sol γ intrat, & centrum Circuli per verticem, semicirculum diurnum γ A, aggreditur; finis regressionis contingit in æquinoctio autumnali; rationes ex dictis satis patefunt.

Initium, & finis regressionis.

DICO Quintò. Regressiones ab æquinoctio verno ad solstitium usque æstiuale tam mane quam vesperi semper crescunt; in ipso vero solstitio sunt summa, & exinde, ad æquinoctium autumnale usque, augmentis antecedentibus proportionaliter decrescunt.

Ratio vna augmenti ad solstitium, & inde proportionalis decrementi, sumitur ex tempore, quo regressiones istæ durant, quod ab æquinoctio verno semper crescit ad solstitium, ab hoc vero eadem prorsus ratione decrescit ad æquinoctium autumnale. Altera ratio, sumitur ex arcu paralleli per verticem inter contactum & finitorem intercepto, qui semper augetur ab γ , ad θ , & hinc eadem proportionem ad θ , decrescit, iste autem arcus, mensurat regressiones, &c.

Confirmantur hæc omnia, ex æquabili centri in circello γ A, reuolutione, unde



XIII.

de & ipsum circulum per verticem vniformiter circumferri, adeoque similium proportionibus constare oportet. Accedit omnibus constans & conformis ex observationibus experientia, quæ horum omnium prima occasio, motrix, ductrix, & inuentrix fidelissima extitit.

DICO Sextò. Progressionis ordinaria & continua termini à mane in vespere,

XIV.

sunt matutini & vespertini verticalium Progressionis continua qui sunt termini.

Quia contactus sunt vltimum quod isti circuli commune habent, & inter hosce contactus nullius verticalis fit gemina ad eandem orientis, vel occidentis partem intersectio, sed vnus vnica tantum, continuo angulorum incremento,

Q 3 à con-

XV.

*Varia pro-
gressionis ac-
ceptiones ex-
plicantur.*

à contactu matutino vsque ad vesperti-
num, si eandem Eclipticæ partem AFD,
versus orientem respicimus; vel continuo
decremento, si oppositam AB, in occa-
su toto die consideramus: si verò angu-
lum inter Eclipticam & verticalem ad re-
ctum tantum extendimus & quadrante
finimus, Progressionis anguli matutini
à puncto contactus, orientali ad lineam
AE, mediaticem crescunt, hinc ad con-
tactum occidentalem decrescunt: at ve-
ro si progressionem æstimamus à conta-
ctu ortiuo ad meridiem, & hinc ad con-
tactum occiduū, tunc aliquando angu-
li antemeridiani excrefcunt super rectum,
pomeridiani ab eodem deficiunt, aliquan-
do pomeridiani super rectum ampliatur,
deficientibus ab eodem antemeridianis.
In exemplis omnia clarescent.

Esto centrum Circuli per verticem in
parte diurna vespertina & occupet pun-
ctum α , si igitur ex eo ad distantiam KI,
more solito describatur parallelus per ver-
ticem, is in plaga orientali ad aliquod pū-
ctum ϵ , tanget & non secabit Circulum
aliquem verticalem A ϵ C, & vicissim ab
eodem verticali tangetur & non secabi-
tur in puncto eodem ϵ : sic in parte diur-
na australi, similis contactus accidet in
puncto σ , cum verticali A σ C, & dicto
Circulo per verticem; & similes matuti-
ni, & vespertini contactus inter se tamen
differentes fiunt quotidiani, quamdiu
Centrum in semicirculo σ γ A, versatur.
differunt autem inter se singuli propte-
rea, quod Circuli per Verticem quotidie
sūt alius ad verticales in planum Eclipti-
cæ proiectos situs.

Iam inter ista duo contactus puncta ϵ ,
& σ , exempli causa adducta, omnes reli-
qui interiecti pergunt ordine ex ϵ , vsque
ad σ , & nullus illorum secatur bis, quia
complementa altitudinum ad meridiem
semper decrescunt, & hinc crescunt vs-
que in σ . Hoc ergo dum fit, anguli in-
ter Eclipticæ arcum AFD, & verticalem
tangente matutinum A ϵ C, itemque
sequentes quoscunque A σ C, &c. vsque
ad tangentem vespertinum A σ C, com-
prehensi, semper crescunt, vel si eodem
verticales cum arcu Eclipticæ occidenta-
li AB, conferas, perpetuo decrescunt:
nam angulus ϵ AB, utique maior est,
quam σ AB, & hic maior quam σ AB:
at vero si arcum AD, orientalem respi-


XVI.

cimus, minor est angulus ϵ AD, quam
 σ AD, & hic minor quam σ AD: igitur
cum à contactu matutino ad vespertinū
anguli versus orientalem Eclipticæ arcū
considerati sine interruptione crescunt,
versus occidentalem spectati eodem teno-
re decrescant, voco ego hoc angulorum,
vel incrementum, vel decrementum pro-
gressionem ordinariam, respectu Macu-
larum ad vnam lineam verticalem obser-
uatarum; & huius progressionis termi-
nos constituo duos istos contactus: quia
quamdiu complementa altitudinum so-
larium inter illos versantur, tamdiu Ma-
cularum in circulo observatorio circa
centrum giratio versus eandem partem
tendit sine vlla retrogradatione. & in
hoc summam semper convenientiam de-
prehendi, tam hic, quam olim Ingol-
stadij.

Si vero quis angulum rectum, siue 90.
gradus, pro istorum angulorum mensu-
ra constituat, tunc in progressionem hac,
anguli à contactu matutino semper cre-
scunt, ad verticalem AE, qui Eclipti-
cam mediat, ideoque faciet angulum
 σ AD, rectum. Hinc alium Eclipticæ ar-
cum AD, respiciunt verticales circuli, &
angulos rectis semper minores consti-
tuunt, continuo decremento, vsque ad
angulum σ AB, qui ex contingente ver-
ticali cum Ecliptica instituitur, & omniū
illius diei versus illam partem minimus
efficitur. Et licet Macularum giratio cir-
ca centrum, respectuum hoc augmen-
tum & decrementum non attendat, in
expositione tamen Macularum & ordina-
tione cursuum, obliquorum in Ecliptica
angulorum minorē semper sectatus sum,
adeoque angulum rectum pro summa
mensura habui.

Tandem si verticalem meridianum, &
in Maculis observandis altitudines Solis
supra horizontem attendimus, id quod
ego semper feci, in indagando Verticalis
cum Ecliptica angulo, certum est, angu-
lum antemeridianum ϵ AD, crescere vl-
tra AE, quamdiu centrum inharet qua-
dranti σ , adeoque maiorem fieri recto,
verticalis enim Meridianus tunc tempo-
ris versatur etiam intra σ , & γ , at vero, si
centrum reperitur in quadrante orientali
 γ A, evidens est, ibidem quoque detineri
meridianum, vnde apertum est, angulos
antemeridianos ad rectam AE, non per-
uentu-

*Progressio
ordinaria
qua? & quo
cum Macu-
larum in
charta obser-
vatarū pro-
gressionem con-
cordet?*



XVII.

uenturos, adeoque rectis minores futuros; dum tamen contraria euenient in angulis pomeridianis.

Itaque progressio ordinaria est stabilis, varietates subit, vel ad semicirculum, vel ad lineam mediatricem, vel demum ad Meridianum collata. ista autem in re non variant progressionis statum.

XVIII.

1 sed ex varia relatione, varias etiam rei eiusdem denominationes pariunt. Continuus autem progressus à contactu ad contactum constat ex observationibus ad idem perpendiculum factis, aut etiam per Helioscopium ex inspecto Sole, prout ab initio inuēti Phænomeni Ingolstadij quotidie, à summo mane, in serum vespertini feci.

feci. Nam ista progressio & regressio Macularum manifestissime solo oculi iudicio notatur.

DICO Septimò. Contactus verticalium circularum cum Circulo per verticem Matutini, & vespertini, ex una, ex altera vero parte finitoris B D, cum eodem circulo per verticem concursus tam Matutini, quam vespertini, definiunt Macularum regressiones.

Quia regressiones Macularum tum fiunt, quando anguli progressionibus contrarij eueniunt, quod mane semper fit ab ortu Solis ad contactum vsque, & vesperti à contactu ad occasum Solis: & sic regressio nihil est aliud, quam arcus Circuli per verticem, inter finitorem & contactum interceptus; in exemplo; si centrum sit σ , dum Sol horizontem ortiuum occupat in A, verticalis circulus tanget circulum per verticem in α , postea sensim perueniet ad contactum ρ , eritque arcus $\alpha\rho$, regressio illius diei in ortu; vesperti vero, regressio erit, arcus vespertinus, $\rho\beta$, inter contactum vespertinum ρ , & finitorem B β , interceptus.

In regressione Matutina anguli minuentur, augentur in vespertina.

In regressione Matutina, anguli inter verticales & Eclipticæ arcum orientalem A D, intercepti, semper decrescunt, vsq. ad contactum illius diei, v. g. ρ . In regressione verò vespertina, à contactu vespertino semper crescunt, vsque ad occasum Solis. Itaque puncta orientis & occidentis Solis ex una, & puncta contactus matutini & vespertini ex altera parte, ostendunt lineas regressionis. Scire igitur punctum ortui Solis die quouis, & contactus matutini; Solis item occumbentis & contactus vespertini, est nosse arcus & quantitates regressionum: hæc autem cognita non sunt difficilia, vt postea videbimus: nunc filum per texamus.

Quando autem & quamdiu regressio fit, tunc & tamdiu Macularum cursus in charta circa centrum spiralis regreditur in circulo obseruatorio, si obseruationes ad idem perpendicularum fuerint institutæ: simul enim currunt, regressio in charta, & anguli hic mane decrescentes, augescentes vesperti. Idem animaduerti olim etiam Ingolstadtij Helioscopio, dum mane maculas ad verticalem accedere, vesperti recedere sensi, contra ordinarij diei cursum. Hæc tum quidem animaduerti, sed rationum, ignarus, effectum admiratione

prosecutus sum. Vide cap. 13, & 14. huius libri.

DICO Octauo. Arcus regressionum ab æquinotio verno augescunt quotidie tam mane quam vesperti, vsque ad solstitium; & ab hoc ad æquinotium autumnale, simili proportionem decrescunt.

Quia quo magis centrum à finitore B D, hoc amplius etiam contactus ab eodem recedit; & sic arcus regressionis inter vtraque augescit, cumque in σ , initio, quo fit æstiuale solstitium centri recessus summus eueniat, pater etiam maximum ibidem regressionis arcum contingere.

In figura res tota ad oculum patet. γ , est punctum solstitiale σ , & centrum circuli ρ , per verticem ducti; punctum contactus orientalis ρ , per rectam $\rho\gamma$, designatum, punctum contactus occidentalis χ , recta $\chi\gamma$, designatum; punctum orientis Solis in finitore B D, expressum, δ , nota numeri 50. punctum Solis occidui δ , nota itidem numeralis numeri 50. arcus igitur regressionis matutinae dum Sol σ initium occupat, est $\rho\delta$, arcus regressionis vespertinae, est $\chi\delta$. Igitur, vt breuiter dicam, Regressio Macularum est arcus Circuli per verticem, inter punctum contactus, & ortus vel occasus, interiectus; vel inter duos verticales quorum alter sit contactus Circuli per verticem, alter orientis vel occidentis Solis comprehensus: vel denique, est arcus Circuli per verticem, inter finitorem, & lineam per centra se tangentium Circulorum transeuntem comprehensus.


Hunc ergo arcum in σ , initio summum esse, clarum est, ob summam centri remotionem; quotidie vero, ob eiusdem centri accessionem ad B D, in quadrante $\gamma\alpha$, minui; ob secessum in $\gamma\chi$, augeri per se notum.

Sed & hæc ipsa ex antecedentibus obseruationibus semper expertus sum videlicet æstate diebus longissimis, iater obseruationes Maculas recursus longiores agere, quam breuioribus; tametsi certas metas definire ex illis præcisè non potuerim. Illæ tamen horum inueniendorum origo & causa fuerunt.

DICO Nonò. Omnes verticales circuli, qui inter verticalem contactus & orientis seu occidentis Solis, (quem generalius appellare possumus verticalem horizon-tem) intercedunt, secant circulum per verticem

Augmentum & decrementum ta regressio- num.

Verticalis horizontalis quis?



XXI.

etiam bis, atque ob eam causam bis fiunt anguli cum Ecliptica aequales, quorum alter in arcu regressione alter in progressionis efficitur. Tota autem istorum binorum angulorum aequalium latitudo comprehenditur, intra verticalem horizontalem.

Nam ipse est primus & postremus omnium verticalium, qui Circulum per verticem in eadem parte diurna tam orientali, quā

XXII.

I occidentali, bis secant. Cæterum etiam si binæ istæ vniuscuiusque verticalis circuli sectiones vtrinque punctum contactus circumstent, æqualibus tamen arcubus, vel interuallis temporum ab eodem recedere non videntur.

Notandum tamen hic est, vniquemque istorum verticalium bisecantium, æquiuale re duobus diuersis in cælo; qui cum faciant

faciant angulos æquales cum Ecliptica, 1
exprimi in plano Astrolabij non possunt
nisi per vnum arcum, eo quod duo æqua-
les anguli ad idem punctum A, & eundē
arcum A D, vel A B, non possint consti-
tui nisi per lineas sibi congruentes.

Vnde cum Anguli ω A D, & ψ A D,
in cælo, & situ & lineis verticalibus dif-
ferant, hic tamen in plano Astrolabij, ni-
si angulo vnico, & verticali arcu A ψ , in- 10
 ω , vsque producto, referri nequiverunt.
& quod exempli causa de hoc arcu A ω ,
insinuavi, id de singulis binas sectiones
facientibus intelligatur.

DICO Decimò. *Tametsi punctum 15*
contactus sit locus & sedes stationis Ma-
cularum, ipsa tamen Macularum statio,
solo & vnico contactus puncto non conti-
netur.

Quia punctum contactus est indiui- 20
duum quid, sedes autem Macularum
stationaria extensionem quandam deno-
tat; punctum contactus moram tempo-
ris nescit, Statio aliquid aliud innuit.
Itaque Macularum statio, Temporis ali- 25
quantam durationem, & motus diurni
promotionem fieri significat interim,
dum Maculæ solares obseruatæ in loco
Circuli obseruatorij eodem immobiles
consistunt; & neque porro, neque retro- 30
gradiuntur, quamdiu in statione versari
dicuntur.

*Contactus du-
plex, physi-
cus & Ma-
thematicus.*

Statio igitur Macularum contactu nō
geometrico & rationali, sed Physico &
sensibili definitur, sensibilis autem & 35
physicus contactus is esse censeatur, qui
duos circulos verticalem & per verticem
ita coniunctos tenet, vt sensu discerni non
valeant, & angulorum verticalium cum
Ecliptica physica & sensibilis differentia 40
non percipiatur: quod cum fiat, multo
temporis interlapsu, sub varia Solis altitu-
dine; hinc accidit, vt Maculæ tanto tem-
poris interuallo stare, & neque progredi,
neque regredi notentur & censeantur, si- 45
cut videre est ad contactus ϕ , & χ , circa
quos læua, dextraque ad magna satis in-
terualla excurritur, donec sensibilis ar-
cum sese in punctis ϕ , & χ , contingen-
tium, diuaticatio animaduertatur. Cer-
tum igitur definitumque sit, stationem
Macularum solarium physico & sensibili
tempore circumscribi, atque ex arcubus
regressionis progressionisque componi;
& angulum cum Ecliptica sensu eundem 55

quodammodo constituere.

Certum deinde est, ipsas quoque istas *Stationes a-*
stationes inter se differētes inueniri, quia 1
lia aliis lon-
cum circuli verticales centro viciniore 2
giores & bre-
rectis lineis similiore euadant, patet cir- 3
uiore.
culum per verticem cum illis contactus
sensibiles multo breuiore efficere, quam
cum illis, qui ad perimetrum Eclipticæ
A B, vel A D, magis propinquant. ratio
huius, quod lineæ rectæ & circuli maio-
res à contactu minorum citius discedere
notentur sensu, quam curuæ & minores.

Hæc Macularum in circulo obseruato-
rio consistentia, ita est obuia, vt etiam
Helioscopio, iudicio sensus animaduerti
possit. & quando illa sit, tunc semper
anguli inter Eclipticam & verticem fiunt
ad sensum æquales; ideoque Ingolstadtij,
temporibus his, quando ipsi contingebāt
in obseruando mane & vesperi, frequen-
tissimus fui. Itaque experimentorum
antecedentium, cum hisce doctrinis ex
Astrolabio consequentibus, summam cō-
sonantiam, qui viderit; de ijs quæ dicta-
sunt, deque eorum veritate, ambigere,
meo quidem iudicio, nullatenus po-
terit.

DICTIONVM APPLICATIO
ad praxim obseruandi.

C A P. X L.

Paullo prolixior fui in Astrolabio
explicando, quia ex eo omnia
ferme quæ in vsu obseruandi oc-
currunt facienda haberi, euitan-
da caueri possunt.


Quia circulus per verticem annuè cir-
ca E, mobilis, ostendit quotidie totam
verticalium circulorum per quos Sol de-
currit, ad Eclipticam constitutionem: que
res vt practice bene percipiatur, expediē-
da est, nonnullis problematis.

PROBLEMA I.

Omnes verticales circulos, quos Sol ad da-
tum diem percurrit, sub oculos
constituere.

Sit datus dies primus $\odot$, circini ad
K I, extensi, pone vnum pedem in γ ,
centro pro illo die, altero describe circu-
lum

N. 12.



XXV.

Verticales
vniuscuius-
que diei cir-
culi, qui

lum per verticem $\phi \omega \chi$, qui à recta BD, diuidetur in duas portiones, diurnam, & nocturnam, quarum quæ diurna est, $\phi \omega \phi \chi 5$, ostendet & designabit omnes verticales, quos Sol illo die percurreret, ab ortu in occasum vsque; & sunt omnes ij, qui gremio arcus $\phi \phi 2 \chi 5$, intercipiuntur, & per singula ipsius puncta traduci cogitantur. Sic diei cuiuslibet alterius

XXVI.

1 verticales in conspectum deduces, & deinde mira quædam enuntiabis.

PROBLEMA II.

5 Verticalem horizontalē seu Orientis & Occidentis Solis ad datam diem ostenders.

9 Orientis vel occidentis Solis verticalis est

ROSAE VRSINAE

XXVII.

est is, quem Sol Oriens vel Occidens infidet. Apta ad datum diem circulum per verticem, vbi is lineam vel finitorem B D, secuerit mane & vespere, illic verticales quæsi transibunt: vt si datus dies sit initium ☉, verticales quæsi erunt A 5 C, mane, A s C, vespere, &c.

PROBLEMA III.

Ad datum diem, punctum contactus veri & sensibilis assignare.

Punctum contactus exhibere.

Sit datus dies primus ☉. Colloca circulum per verticem suo loco, & statim videbis quem verticalium in Oriente, & Occidente diurno tangat ad sensum, huius contactus sensibilis quæres punctum verum hoc modo; extende circinum ex γ , vt verticalem sensibilibiter tangentem secet vtrinque, arcum inter duas sectiones conclusum diuide bifariam, & habebis in sectione illa verum contactus punctum. Hoc habito puncto, sensus vtrinque indicabit contactum sensibilem. Quo modo autem verticalem, qui circulum per verticem verè contingat, possis demonstratiuè assignare, docet Clavius lib. 1. Astrolabij, Lemmate XLI.

PROBLEMA IV.

Arcum regressionis Macularum, ad diem datum assignare.

Sit dies datus quicumque, primus ☉, verbi gratia, collocato rite circulo per verticem, quære punctum contactus veri ϕ , & χ , deinde puncta ortus & occasus δ , & ϵ , arcus enim intercepti ϕ δ , & χ ϵ , sunt arcus regressionis quæsitæ tam matutinae, quam vespertinae.

PROBLEMA V.

Altitudinem Solis supra horizontem, ad datum diem, & contactum assignare.

Sit datus dies primus ☉, & datus contactus vel matutinus ϕ , vel vespertinus χ , aspice in quemnam parallelum incidant, & eius complementum dabit altitudinem Solis quæsitam.

XXVIII.

PROBLEMA VI.

Altitudines Solis duas inuenire, intra quas contactus Physicus ad datum diem contingat.

Quære contactum rationalem, & sensibilis seu Physicus vtrinque sese sponte offeret, per cuius extrema incedentes paralleli complementorum, dabunt complementa quæ mensurant altitudines Solis quæsitæ.

PROBLEMA VII.

Altitudines duas Solis supra horizontem assignare, quibus ad datum diem tempore, vel antemeridiano, vel pomeridiano, duo anguli inter verticalem & Eclipticam æquales fiant: oportet autem datum diem assumi in signis borealibus in nostra sphaera.

Quære verticalem, qui ad datum diem & tempus circulum per verticem bis secet; paralleli igitur complementorum, per puncta sectionum transeuntes, ostendent complementa altitudinum solarium, quibus subductis à 90. habebis altitudines. In exemplo:

Dato die primo ☉, & tempore diei antemeridiano, verticalis A ψ , secat circulum per verticem semel in α , & iterum in ψ , quibus sectionibus angulus idem ω A D, efficitur; parallelus igitur per α , transiens, dat vnā altitudinem Solis, in arcu ω , 40. cuius complementum est arcus A ω ; altera altitudo ψ , 40. offertur ex complemento A ψ , per parallelum ψ , transeuntem cognito.

Altitudines Solis pro angulis æqualibus.

PROBLEMA VIII.

Sub quanta verticalis ad Eclipticam inclinatione Sol quotidie oriatur aut occidat, enunciare.

Verticales qui per quotidianas Finitoris & circuli per verticem sectiones transeunt, ostendunt quæsitæ illorum ad Eclipticam inclinationes, in finitore B D, vtrinque ab Ecliptica versus E, numeratas.

Angulus sub ortum & occasum.

PRO-

XXIX.

PROBLEMA IX.

Sole in horizonte posito, minimam & maximam totius anni verticalium ad Eclipticam inclinationem enunciare.

Quando Sol in æquinoctio verno horizontem occupat, inclinatio matutina est omnium totius anni maxima, vespertina minima: Sole vero horizontali æquinoctium auctumnale tenente, orientalis inclinatio est omnium totius anni minima, occidentalis maxima. ratio, quia illis temporibus centrum circuli per verticem versatur in finitore B D, ideoque ipse per centra tam verticalium quam circuli per verticem, adeoque puncta communis vtrorumque contactus transit, quæ sunt omnium remotissima, quæ possunt attingi à circulo per verticem, & consequenter verticales per ista traiectionis, Eclipticæ, aut sunt proximi, aut ab ea maxime diffiti.

PROBLEMA X.

Sole in meridie constituto, enunciare quando maximas, & quando minimas verticales circuli ad Eclipticam inclinationes faciant.

Quando Sol initium γ, in meridie tenet, tunc Meridianus ad Eclipticam versus ortum A D, facit maximam inclinationem, & minimam versus occasum A B, omnium Meridianorum totius anni, quando idem Sol versatur in α, principio, Inclinatio Meridiani versus arcum Eclipticæ A D, est minima totius anni, versus A B, est maxima.

PROBLEMA XI.

Minimam & maximam Solis altitudinem meridianam enunciare.

Quando circuli per verticem centrum versatur in K, & Sol in solstitij hyberni initio, minima fit eiusdem altitudo meridianæ, in 1, &c. Quando idem centrum in γ, & Sol in α, initio existit, fit altitudo Solis maxima in 2, per complementum A 2, ostensa, &c. Reliquæ altitudines Meridianæ ostenduntur ab alijs complementorū parallelis, circulum per verticem ad diem illum accommodatum tangentibus, &c.

XXX.

PROBLEMA VII.

Tempus observationibus maxime opportunum toto anno, mense, & die quolibet enunciare.

Id quod tot annorum continuis experientijs didici, ad oculum pulcherrime demonstrat hoc Astrolabium, vna cum circulo per verticem inducto. Itaque fit:

EFFATVM primum. Totius anni tempus ad obseruandum illud est aptissimum, in cuius plaga centrum circuli per verticem versatur. Hinc sequitur medio illo anno, qui à 70, ad 80, euoluitur, Maculas securius obseruari post meridiem, quam ante. At vero altero medio anno, qui ab initio 80, ad 70, vsque euoluitur, Macularum obseruationem securius fieri ante meridiem, quam post: quia in vtriusque temporis plaga versatur centrum circuli per verticem, &c.

EFFATVM secundum. In quocunque tempus, contactus physicus verticalium cum circulo per verticem contingit, sub illo tutum est obseruare Maculas: & tutius quidem, quam alias, vbi & quando contactus iste non accidit.

Ratio prioris, quia quando iste contactus accidit, Maculae suis locis non euehuntur, & anguli quos verticales cum Ecliptica efficiunt, sub altitudinibus etiam diuersis ad sensum nil variant, vnde tali tempore sine errandi magno periculo huic negotio operam dabis. ratio posterioris, quia aliud quodcunque tempus, vel regressioni vel progressionis subiaceret. In regressione errandi pericula sunt ex ipsa regressione, quia tunc Tabella characterifera est in contrarias partes giranda, deinde quia Sol ab horizonte non adeo exaltatus est, vt veloces ascensiones faciat, & Ellipsis fortassis subiectus.

Quod si in progressionem versetur Sol, tunc imminent varia errandi pericula, è nimia Solis altitudine, & vicinitate ad lineam mediatricem A E, vt dictum in prioribus, &c. Præstat ergo, tale tempus eligere, in quo Maculae stationem faciunt vel ab ea non multum absunt.

Hinc sequitur primò. Tempus æstiuale semper opportunius esse tempore hyemali, quia hoc semper stationes aliquas habet, illud nullas vnquam.

R Sequitur

Aptum tempus in specie

Regula generalis pro apto tempore.

Tempus contactus, & stationum obseruationibus aptum.

ROSAE VRSINAE

XXXI.

Sequitur secundo, Tempus æstiuale tam ante quam pomeridianum esse obseruationibus accommodum, quia in utroque statio, seu contactus sensibilis satis magnæ moræ reperitur, in qua vna exacta obseruatio institui commodissime potest. Qua vero hora, tam ante quam post meridiem cuiusque diei eueniat ille contactus, sciri potest ex eleuatione Solis, quam prænotasse in prioribus docui. Quod si horam præscire nescis, sufficit ipsa præcognita eleuatio Solis, circa quam obseruationem aggredi debeas.

Regula generalis pro omnium aptissimo obseruandi tempore.

EFFATVM Tertium. Tempus omnium ad obseruandum opportunissimum, est illud, in cuius plagam tam centrum circuli per verticem, quam statio Macularum simul concurrunt: quia ubi utrumque concurrit, illic non tantum stabilis Macularum consistentia, sed multo magis medioeris Solis supra horizontem exaltio, ad obseruandum valde idonea reperitur; & omne præcipitationis periculum, ex lineæ Mediatricis (quod caput est) vicinia procul remouetur. hinc isto tempore, ad obseruandum accommodatius nullum sanè reperitur.

Hinc sequitur, ab æquinoctio verno ad Solstitium æstiuum, per menses Martium, Aprilem, Maium, securissimam obseruandi praxin exerceri horis pomeridianis, quando Sol loca Macularum stationaria decurrit, quod qua die quouis hora, qua supra horizontem eleuatione contingat, ex prioribus erui satis potest.

Sequitur rursus eadem ratione, à Solstitio æstiuo ad æquinoctium autumnale, tempora ad obseruandum opportunissima assumi antemeridiana, quia in illa plaga conueniunt & centrum circuli per verticem & statio Macularum antemeridi-

XXXII.

diana, suis horis & eleuationibus, per priora, bene cognoscendis.

EFFATVM IV. Obseruationes quæ extra stationes prædictas sumuntur, sunt laboriosæ & satis difficiles & sæpe periculosæ; si fiant circa Meridiem lubricæ; si in lineâ mediatrici, plerumque erroribus obnoxia; si in horizonte, nunquam bonæ, sed semper vitiosæ. Rationes istorum ex præcedentibus satis liquent, & copiose sunt allatæ; qui mihi asserenti non credit, experiatur, & discet suo malo.

Hinc sequitur in hyeme semper operosius & difficilius huic curæ insudari quam æstate; quia isto tempore stationes Macularum sunt nullæ, altitudines Solis vicinæ meridiei, & in Eclipticæ mediatio- nem frequenter incidentes. Ego tamen hisce omnibus incommodis facillime obuiare soleo, vnica Tabellæ chartiferæ versatione; quanquam vt superfluis curis, & errandi occasionibus supersedeam, tempora stationibus Macularum destinata, præ reliquis cordi habere soleam.


Atque hæc quidem de plano Eclipticæ & circulis verticalibus, necnon parallelo per verticem traducto, in eam coniectis, multiplicique illorum vsu & praxi, in gratiam eorum, qui hisce sublimibus studiis ducuntur, ex praxi, & experientia certam ducta, disputata sunt: multis prudenter quorum mentio hic fieri posset, dissimulatis, & ingeniosi arbitri, sollertia relictis.

Omnia vero, quæ dicta sunt de Astrolabio, fieri etiam possent in analemmate Ecliptico, si suis constaret Ellipsis, verticalium circulorum loco in planum proiectis: vt consideranti patebit. Ellipses autem omnes describere, res valde operosa est, & satis intricata.

Remedium contra pericula errandi

MODVS

N. 13.



XXXIII.

MODVS QVINTVS!

*Quo Angulus inuenitur, quem Ecliptica
cum circulis verticalibus facit, per
Triangula sphaerica.*

PROBLEMA V.

Quamquam haec res institui potest eū-
dem angulū inuenire per triangula sphæ-
rica multis vijs, hic tamen vnam princi-
palem & inter alias facilem propono.

Resumatur figura quarta, modo secun-
do proposita, in qua considera Triangu-
lum O M P, quod constat semper tribus
lateribus cognitis. Arcus enim O M, ho-
rarius, est distantia Solis à polo mundi
M; quæ distantia habetur ex declinatio-
ne Solis: est enim arcus O M, arcus com-
plementi declinationis, quādo Sol est bo-
realis, vel componitur ex declinatione &
quadrante, quādo est australis: & arcus
O P, est complementi altitudinis Solis:
denique tertius arcus M P, est semper æ-
qualis complemento altitudinis Poli. Er-
go per 21. Probl. lib. 1. Astrolabij, Lemate
53. dabitur angulus MOP, in hunc modū.

Primo. Fiat vt sinus totus ad sinum ar-
cus O M, ita sinus alterius arcus O P, ad
Quartum. Secundo. Fiat vt Quartus ad si-

XXXIV.

num totum, ita differentia inter sinum ar-
cus M P, & sinum versum arcus, quo duo
arcus M O, O P, inter se differunt, ad alium
Quartum, qui semper erit sinus versus an-
guli MOP. & ex ipso Quarto inuento sem-
per constabit vtrum angulus quæsitus sit
maior vel non maior recto, pro ut sinus
versus fuerit maior vel minor sinu toto: &
quādo est minor, & consequenter angu-
lus quæsitus est acutus, tunc Quartus nu-
merus inuentus sublatu ex sinu toto,
semper relinquit sinum complementi an-
guli quæsit: quādo vero est maior, tunc
abiecto sinu toto, relinquitur sinus illius
arcus, qui cum quadrante facit arcum
anguli quæsit.

Deinde in triangulo A M O, semper
angulus M A O, est rectus, & omnia
tria latera sunt cognita. nam arcus A M,
inter punctum β , componitur ex qua-
drante, & maxima declinatione: arcus
O M, similiter ex quadrante, & declina-
tione Solis existentis in O, nisi forte lo-
cus Solis sit borealis, & punctum A, tri-
buatur cancro, tunc enim vterque arcus,
A M, O M, est complementum decli-
nationis maximæ, & loci Solis; Ar-
cus vero A O, est arcus Eclipticæ
inter locum Solis, & punctum β ,

R 2. vel

vel $\odot$, qui tamen ad calculum non est ne-
cessarius, sufficiunt enim duo arcus prio-
res, ut inde per primum Problema, lib. 1.
Astrolabij, Lemmate 53. eliciatur angulus
M O A. Ut enim sinus totus ad finum la-
teris M A, quod angulo quæsito opponi-
tur, ita secans complementi basis M O, quæ
opponitur recto, ad finum M O A, qui est
acutus, quando latus M A, est minus qua-
drante, obtusus quando est maius.

Denique ex angulis MOP, quem verti-
calis PO, facit cū horario MO, itē MOA,
quem horarius M O, facit cum Ecliptica
O A, dicta ratione inuentis, addendo vel
subtrahendo eruitur angulus inclinationis
verticalis O P, ad Eclipticam A B C.

In præsentī exemplo adduntur, & ex
additione fit Angulus P O A, maior qua-
drante, & ideo pro angulo inclinationis
sumitur eius complementum ad semicir-
culum, seu ad gradus 180.

Quando vero P, est occidentalius arcu
M O, nimirum versus F, tunc angulus M
O P, ex M O A, subtractus relinqueret an-
gulum quæsitum. Neque opus est omnes
casus singillatim percurrere, præsertim si
adsit vnum aliquod præcedentium instru-
mentorum, in quibus horum angulorum
constitutio manifestior apparet.

In quorum absentia opus esset nonnū-
quam etiā inuenire, angulos OMP, OMA,
quorum hic est differentia Ascensionū re-
ctarum puncti A, & puncti O, & ille angu-
lus distantie Solis à Meridiano, qui po-
test haberi ex altitudine Solis cognita, vel
etiā ex ipsa hora cognita. Imo quando
habetur angulus OMP, ex ipso potest ha-
beri etiā ascensio recta puncti N, quod
cælū mediat, & consequenter arcus O N,
imo & arcus N M, qui vel erit arcus com-
plementi declinationis, vel componetur
ex declinatione puncti N, & quadrante: &
quia notus est quoque arcus MP, ergo &
arcus PN, & consequenter ex tribus arcu-
bus OP, ON, NP, poterit haberi aliter an-
gulus inclinationis N O P; sed operatio
est multo prolixior.

Ex his ergo patet, ut angulus PON, quē
verticalis P O, cum Ecliptica facit, habeat-
ur, debere prius inquiri angulū POM, quē
idem verticalis O P, conficit cum horario
currente MO; deinde angulum MOA, quē
horarius currentis MO, efficit cum Eclipti-
ca O A, ad punctum O, his ergo duobus
habitis, habetur totus POA, qualiscunque

is tandem sit, adeoq. & illi deinceps PON,
siue acutus, siue obtusus, &c.

In hoc calculandi modo, supponitur
Tabula declinationū Solis, quæ apud Cla-
uium, & alios auctores passim habetur.

Dixi initio, esse alias multas hunc angu-
lum supputandi vias; nam & ego alia vsus
sum Ingolstadij, & alia Friburgij; & de fa-
cto alijs vsi sunt & vtuntur discipuli mei;
quibus nunc recensendis supersedeo, erit
fortasse, cum occasione opportuna, de his
vberior scribendi locus; nunc festinanti ad
alia, in hisce diutius & superflue inhæren-
dum non censeo. Et omnes isti modi an-
gulum Eclipticæ cū verticali ad datum tē-
pus, aut Solis altitudinē constituendi, sūt
præstantes, & tuti; in praxi tamē vnus alio
expeditior & errandi periculo minus ob-
noxius est. Ego angulos plerumq. in Astro-
labio Gême Frysijs Problemate 4. explica-
to, indagaui. Tametsi tertius in Analem-
mate Elliptico explicatus, æque securus,
& in praxi facilis videatur, angulumq. geo-
metricè tantū, sine numeris inueniat: alter
autē per numeros tātū, &c. sed quartus ob-
vsū copiosiorē, mihi sēper amplius arrisit.

*Praxis angulum dictis modis inuentum, in
circulum obseruatorium applicandi.*


C A P. XLI.

OMnes Maculæ obseruatæ per Te-
lescopiū, proijciuntur in chartā
situ euerso: vnde duplici modo
potest angulus applicari in obseruationē,
vel euerso vel conuerso situ. Si Maculæ si-
tum euersum retinent, etiā Angulus, &
Ecliptica retinebunt, de qua tamen re mo-
nendus est Lector. Si conuersum, etiā
ista rectum induent.

Exemplum situs vtriusq. habes in adie-
cto schemate, in quo ad diem 7. Iulij, ho-
ram septimam matutinam $\frac{1}{2}$ vnus hore,
habes obseruatas Maculas & Faculas a, b,
c, &c. situ euerso, ad perpendicularum C E,
cuius cum Ecliptica angulus euerso situ
est CAF; eadem Maculæ, Faculæ atque E-
cliptica sunt situ recto a, b, c, &c. & lineam
HI, pro Ecliptica respiciunt, vbi vides sum-
ma infimis & ima supremis permutari. Fit
autem hoc propter decussationem natu-
ralem radiorum, & specierū solarium. Eo
autem modo, in situm rectum ordinaui,
omnes Obseruationum mearum Imagi-
nes libro sequenti producendas.

Exemplum

*Situs euer-
sus & con-
uersus.*



ROSÆ VRSINAE

Exemplum Secundum inductæ Eclipticæ, in obseruationes duas diei vnus.

XXXVII.




N adiecto 2. sche-
mate 2. offe-
runtur ad diem
4. Augusti obser-
uationes duæ, fi-
tu conuerso, an-
temeridiana vna,
pomeridiana al-
tera, ambæque habent verticalem ean-
dem AB, & est Ecliptica antemeridia-
na CD, comprehenditque cum linea
verticali, ad N, centrum circuli obserua-
torij angulum CNA: & sunt Maculæ
antemeridianæ A, B, C, &c. vsque ad
Faculam M, horizonti occiduo incum-
bentem. Ecliptica vero pomeridiana est

XXXVIII.

EF, & Maculæ eadem quæ ante pran-
dium sunt a, b, c, &c. sub litteris alijs,
& in situ circuli obseruatorij alio; & hoc
fit propter conuersionem Solis diurnam,
& ipsius varium ad nos situm atque aspe-
ctum, ex eadem conuersione causatam.
Vbi vides omnes Maculas dum iuxta E-
clipticam motu suo proprio ab ortu in
occasum progrediuntur, simul motu isto
quotidiano apparente, quasi proportio-
nali, girari circa centrum N, ex A, per
C, & E, versus B, & ex B, per D, & F,
versus A; de qua apparentia, simulque
eius statione & retrogradatione, dictum
est fuse in prioribus. Nunc ad alia pro-
cedamus.





ROSAE VRSINAE

Inducendæ Eclipticæ Exemplum

Tertium.

XXXIX.



CONTINET hoc exemplum observationes tres, ad diem 2. 15. & 29. Iunij, anni 1625. observatio diei secundæ cōtigit hora $6\frac{2}{7}$ mane, diei decimæ quintæ, hora $7\frac{3}{7}$ mane, diei vigesimæ nonæ, hora $7\frac{2}{7}$ mane; itaque horæ fuerunt ferme eadem, non tamen altitudines Solis, neque anguli inter Eclipticam & lineam verticalem contenti æquales, sed Ecliptica CD, die secunda, à perpendiculo AB, omnium maximè abfuit, angulusque CIB, vel AID, maximus extitit; die 29. Ecliptica GH,

XL.

abfuit ab AB, omnium minime, & angulus AIH, vel GIB, fuit omnium minimus; die autem 15. Ecliptica EF, & angulus EIB, vel AIF, medio sese modo habuere. Impositis ergo hoc modo in observationes singulas angulis, facile est, Macularum cursus & itinera, figuras, & habitudines ad Eclipticam indagare. Omnes enim observationes ad vnam Eclipticam & in vnum circulum rediguntur, & sic apparet Macularum de die in diem progressio, atque ad Eclipticam vel accessus, vel recessus: practice autem hoc eoque securissimo compendio vteris.



ROSÆ VRSINAE

XLI.

PRAXIS MVLTAS VNIVS

*Maculae observationes Eclipticae
insignitas, in unum circu-
lum redigendi.*

CAP. XLII.

Suppono omnes datarum observa-
tionum circulos esse inter sese æ-
quales ad vnguem. Si non essent, 10
erunt redigendi ad æqualitatem,
vel augendo, vel minuendo proportiona-
liter, prout necessitas exigit. Postea
describe in charta munda circulum, om-
nibus observatorijs in ipsum colligendis 15
æqualem, ductaque diametro, quæ sit
futura Ecliptica, infige in substratum as-
ferem plantæ acum aliquam, quæ per

XLII.

1 circuli centrum transeat, quo facto fir-
ma chartam sublita cera. tum observa-
tiones singulas ordine temporum seruato
superpone, vt, Ecliptica observationis præ-
cisè congruat Eclipticæ chartæ substratæ,
centraque centris & peripheriæ periphe-
rijs respondeant: quibus factis: transfi-
ge ex observatis quidquid lubet; deinde
calamo transfixa describe secundum exē-
plar, & sic acquies cursus Macularum si-
ne errore, labore facili, tempore breui.
id quod absque hoc artificio, factu est
quasi impossibile. quo si vsus non essem,
tanto labori, solo circini vsu, absque vlllo
dubio, pridem luccubuissem. id ergo, quo
tanto tempore adiutus sum, tibi libenter
& sine invidia communico amice Lector,
Vale & fruerere.



AB. Verticibus Plantæ cum O. sectione
Eclipticæ die 12. EF. Maculae 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PRESS

ROSA
V R S T N
S I Y M
L I T T E



to our first...
Quia...
prehendit...
qualitatem...
sum copiam...
florum...
Phenomena...
peruenit...
hic...
finit...
finit...

XLI.


PRAXIS MVLTAS VNIVS
*Maculae observationes Eclipticae
in signitas, in unum circu-
lum redigendi.*

CAP. XLII.

Suppono omnes datarum observa-
tionum circulos esse inter sese æ-
quales ad vnguem. Si non essent, 10
erunt redigendi ad æqualitatem,
vel augendo, vel minuendo proportiona-
liter, prout necessitas exiget. Postea
describe in charta munda circulum, om-
nibus observatorijs in ipsum colligendis
æqualem, ductaque diametro, quæ sit
futura Ecliptica, infige in substratum as-
ferem plantam acum aliquam, quæ per

XLII.

1 circuli centrum transeat, quo facto fir-
ma chartam sublita æra. tum observa-
tiones singulas ordine temporum servato
superpone, vt Ecliptica observationis præ-
cisè congruat Eclipticæ chartæ substrate, 5
centraque centris & peripheriæ periphe-
rijs respondeant: quibus factis: transfi-
ge ex observatis quidquid lubet; deinde
calamo transfixa describe secundum exē-
plar, & sic acquies cursus Macularum si-
ne errore, labore facili, tempore breui.
id quod absque hoc artificio, factu est
quasi impossibile. quo si usus non essem,
tanto labori, solo circini usu, absque vllō
15 dubio, pridem succubuissem. id ergo, quo
tanto tempore adiutus sum, tibi libenter
& sine invidia communico amice Lector,
Vale & frue.



AB Verticalis Plantæ cum O. scilicet
Ecliptica die 12. ET Maculae signi-
ficantia
Observata tempore
Observatio
Die 12. 28. 22.
29. 31. 8. 10.
CE. G. plaga Orientalis Maculae
DE. H. Occidentalis

ROSAE
VR SINAT
SIVE COLLE
LIBER VERITAS

ROSAE


VR SINAT

SIVE COLLE

LIBER VERITAS

VERITAS

LIBER VERITAS



Accum hinc et hinc...
Quia omnia...
prehendi...
quasi...
rum copiam...
horum...
Phonon...
per...
ter...
inter...
una...
libra...



R O S A E
V R S I N A E
S I V E S O L I S
L I B E R T E R T I V S.



Summa Libri.



Abetur hic ipsum Solis Phœnomenon, primo ex varijs obseruandi modis demonstratum; tum obseruationes plurimorum annorum, tam meæ quam alienæ; tam Romanæ quam Germanæ ob oculos positæ, & quibus variæ *Facularum Solarium, Macularum & Vmbrarum* circuitiones innotescunt, earundem admirandæ varietates, mutationes perpetuæ, summaq; instabilitas, & cum hisce omnibus summa motus & ordinis constantia cernetur. Quæ omnia, vt à quocunq; non illaterato Lectore, satis possint comprehendere, præmitto in principio, Notas quasdam Generales, quibus quasi manu in Phœnomeni cognitionem deduco quemuis rerum istarum cupidum; tandem ipsis singulis obseruationum in ordinem digestorum iconismis, addo Notas speciales, vt nihil eorum quæ ad plenam Phœnomeni studiosissimè obseruati, fidelissimèq; digesti explicationem pertinent, vel omissum esse à me, vel desiderari à quoquam posse videatur. Hæc est Epitome Libri. Singula fusius inueniuntur suis locis. In fine tandem noua Phœnomenon Solare obseruandi Machina, eaq; facilima librum claudo: & sic habebitur exitus libri, ingressui minimè dissimilis.



V R S I N A E
S I V E S O L I S
R O S A E
L I B E R T E R T I V S



Summa Libri.

Abest hic ipsum Solis Phenomenon, primo ex varijs
observandi modis demonstratum; tam observatio-
nes plurimum annorum, tam nec dram alienis;
tam Romanarum Germanarum ob oculos posita, &
quibus variis Testibus Solaribus, Mathematicis & Astronomicis
circumstantiis innoscent, earundem adhibitis va-
rietates, mutationes perpetuas, summasque instabilitas,
& cum hisce omnibus summa motus & ordinis constantia cernitur.
Quae omnia, ut a quoque non illiterato Lectori, satis possint com-
prehendi, permitto in principio, Notas quasdam Generales, quibus
quasi manu in Phenomeni cognitionem deduco quatuor rerum ista-
rum capitulum; tandem ipsis singulis observationum in ordinem dige-
storum iconibus, addo Notas speciales, ut nihil eorum dux ad plenam
Phenomeni studiosissime observandi fidelissimè digesti explanationem
pertinent, vel omnium esse a me, vel desiderari a quopiam posse videa-
tur. Haec est Epitome Libri. Singula satis inveniantur suis locis. In
haec tandem nova Phenomenon Solare observandi Machina, ead; facil-
lima librum claudo: & sic habebitur exitus libri, ingressum minime
dissimilis.







AD LECTOREM.



ASTRONOMVS si Phœnomena tractat, ea ex obseruatis probat. Obseruationes in ostendendis phœnomenis sese per modum principiorum habent. Nam si vsquam illud Aristotelis, hic verum est, omnem nimirum scientiam è quibusdam positis atque præcognitis fieri. Phœnomena cum sint plerumque lubrica & fidei dubia, id maxime expostulant, vt non ex præsuppositis figmentis voluntarijs, & ingeniosè excogitatis somnijs, sed sollerter indagatis & præcognitis stabiliantur obseruationibus atque experimentis, præsertim si remota, si noua, si paradoxa videantur. ROSA ergo nostra VRSINA, cum non ex Orbe nouo, sed cælo ipso afferatur, cum abstrusa multa, & à multorum opinione abhorrentia contineat, cum planè cælicam, & terris insuetam fragrantiam exhalet; fieri fortassis posset, vt eius excellentia, debile aut agreste cerebellum obstupesceret, inque nonnullam adduceret, propria infirmitate iudicij, apud sincerum & constantem Lectoris animum, vel fidei meæ in asseuerando, vel credulitatis suæ in assentiendo offensionem. Hoc ne eueniat, aut Rosæ huic cælesti caliginem vel offutias vllus offundat, Phœnomeni huius absque vlla erroris suspitione cognoscendi, inque notitiam perfectam totius orbis deducendi, duo affero solidissima Fundamenta: alterum Modos obseruandi, fusè quidem, & variè libro priore tractatos, nunc strictim refricatos; alterum ipsas obseruationes. è priore habebimus ipsum Phœnomenon esse; è posterioribus, Quale sit cognoscemus. Lege & frue.

Phœnomena rectè obseruata & digesta se habent per modum principiorum.





Maculae et Faculae ex uariis obseruandj modis, stabiliuntur.

PHOE NOMENON

Solare esse, ex ipsis potissimum observandi modis, euidenter asseritur.

I.

DEMONSTRATIO PRIMA

ex variis observandi modis.



RIMVS obseruandi modus, & is quidem simplicissimus atque naturalissimus est, quando Solis radius per exile foramen rotundum immisus,

loco obscuro, ad magnam satis distantiam, ut pedū 15. 20, aut amplius in chartam mundam perpendiculariter abtentā, excipitur. tunc enim Solis figura cum Maculis ibidem spectatur. Et hic modus contra illos pugnat, qui hanc rem vel oculo, vel phantasiae volunt tribuere: nūquid enim imaginatio vel oculus illas Maculas in chartam projicit? &c. In adiecto schemate huius rei adumbrationē habes Solis F per globum G perterebratum, allapsū in Tabellam & figuram H. Sed hoc obiter nota, locum in praxi debere vndique obscuratum esse, excluso quantum fieri potest alio lumine.

Secundus Observandi modus est itidem valde simplex, quando videlicet per vnicū vitrum conuexum Sol in locum obscurum immisus, distantia proportionata, ut ante, excipitur: nam quidquid in illo latet, sub aspectum mundissime venit. Huius rei typum habes ex Q Sole, per vitrum R, in chartam S. Hic modus, uti prior, hanc rem amouet ab oculo & phantasia; non autem esse à vitio vitri, probat modus primus, sed & vitrum etiam ipsum ostendit; quæcunque enim à vitro sunt, gyrato vitro gyrantur etiā in charta; Maculae & Faculae Solares nunquam gyrantur: ergo non sunt à vitro. item, nullum vitrum tubi cuiuscunque, refert alterius vitri in tubo alio dispositi, nauos, &c. omnia autem vitra Telescopia offerunt Maculas & Faculas eodem modo & loco &c. Ergo Maculae non sunt

II.

naui aut labes vitrorum.

Tertius Observandi modus, est similiter simplicissimus & naturalis, quando nimirum in ortu aut occasu, seu etiam per nebulam diurnam, oculus bonus (id quod ego vnā cum alijs non raro feci) Maculas saltem maiores, liberè contempletur. prout ad litteram P in Solem I, expressum vides; & hæc ratio euincit, hanc rem non esse à deceptione vitri, sicut vitrum vicissim non esse à fallacia oculi.

Quartus Observandi modus est per Helioscopium, tubum huic rei ex professo destinatum, per vitra nimirum colorata, cauum & conuexum, vel horum vnicū, aut aliud inter hæc interfertum vtrinque planum (dummodo crassities cuiusvis horum Solis fulgori obtundendo sufficiat) inclusa tubo, prout designatū est ad litteras D & E, & hic modus est præstantissimus, multumque à me & meis discipulis usurpatus; quippe Maculae Solares, Faculaeque conspiciuntur multo melius, quā in charta, immisione naturali, aut reflexione, aut Telioscopij in circulum paruum observatorium traiectu; (nā si magnus ex Telioscopio adhibeatur, transmissio superat emissionem hanc ordinariē.) absque vllā visus læsione, dummodo exactus habeatur tubus.

Quintus Observandi modus habetur Telioscopio, seu tubo quolibet visitato, ita tamen, ut inter ipsum & Solem nebula temperata, quæ Solis aspectum indennē feruet, intercedat; quo posito (id quod frequenter accidere solet) videbis in Sole per Telioscopium, quidquid Macularum & Facularum in eodem hærebit. & quo tubus melior & potentior extiterit, eò accuratius vniuersa spectabis. Exemplum habes in A C B.

Sextus Observandi modus contingit Solaris radij à speculo plano reflexione; si namque speculum planum exactū paruo circello conclusum, Soli opposueris,

Naturalis
Macularū
Solarium
Oculo libero
aspectus.

Artificialis
Macularū
Solaritū per
Helioscopiū
obtinus.

Solis per tubum & Nebulam aspectus.

Macularū
Solaritū per
reflexionē à
speculo plano
presentatio.

I.

vt radius reflexus in satis ampla, (20. pedum aut amplius,) distantia ad chartam mundam accidat, dabit is pulchrè satis, Solis Maculas & Faculas, prout in schemate I K L N, delineatum habes: egoque hoc obseruandi modo, Ingolstadij initio satis frequenter & fœliciter vsus sum.

Facularum & Macularum Solarium per Telescopium in chartam transmissio.

Septimus Obseruandi modus exercetur Solis per Tubum in chartam deductione omnium præstantissimus, securissimus & facillimus; quo Ingolstadij ex anno 1612, hucusque ferè semper, & hic Romæ isto tempore, præcipuè vsus sum: iste mihi Solem, Maculas eiusdem & Faculas haud aliter in chartam spectandas figit, quàm si easdem coram in ipsomet intuerer. huius praxeos exercendæ ideam habes in infimo huius schematis quadrangulo, sub litteris V X Y Z, vbi vides per tubum X, solis radium V, proijci in obiectam chartam, sub circulo Y, perimetro c f d g, comprehenso &c. Cæterum prisma cauum, columellis quatuor, & rigillis transversis superincumbentibus compositum, ad hoc solum seruit, vt possit totum instrumentum intus obscurari, circumpositis vel chartis, vel pannis, vel asserculis, ad prismatis latera fixis, &c. Sunt & alij obseruandi modi, de quibus forsitan suo loco, nunc ex hisce tale deduco argumentum.

Pro Veritate Phœnomeni Solaris.

Argumentum Demonstratiuum ex varijs obseruandi modis deductum.

Si Phœnomenon Solare ex parte rei non existeret, impossibile esset, vt à tam diuersis obseruandi modis simul tempore & loco eodem perciperetur: percipitur autem: Ergo ex parte rei existit. Sequela maioris patet. quia quod non est, non potest falsò exhiberi à tam diuersis organis & modis, &c. nunquid enim si oculus aliquid falsò videt, id etiam per nudum foramen fictitiè immittetur: vitro conuexo ostendetur: reflexione speculi effingetur: Helioscopio conspicietur: Telescopio in charta depingetur: & quidem modo, figura, magnitudine, situ, proportionalitate ipsdem: vnde qua ratione id, quod non est ita, sentiri potest? sine specie visibili nihil videtur &c. igitur neque mens, neque ratio, neque sensus, neque imaginatio, neque natura admittit tale figmentum. Stat ergo firmissima maioris sequela, minorem probabit ipsemet, quicumque hæc negabit, nam si factò periculo pratico vel vnicum istorum modorum delirare, & cum omnibus &

II.

singulis ad amicum non conspirare senserit, causa cadam, totum perdam. Sed veritas fortior est vniuersis. Suppono autem illo tempore quo quis horum pericula facit, Solem Maculis non carere, quod aliquando euenit, sed affectum esse. nam si Maculae non sunt, aspici utiq. in Sole nequeunt.

DEMONSTRATIO SECUNDA à locorum diuersitate.

SI Phœnomenon hoc figmentum esset, eodem tempore non spectaretur in locis toto ferme hemisphærio disiunctis; spectatur autem, & quidem modo, magnitudine, figura, situ, proportionalitate, &c. ipsdem. igitur non est figmentum. Sequela maioris patet. Quia imaginatio, aut oculi visusue fallacia, aut aëris deceptio vel speculi vitriue corruptela, nil potest aut commercij vel connexionis habet in ea quæ sunt in Asia, Africa, aut nouo orbe, &c. igitur si meus visus hic deciperetur non ideo & illorum circa rem eandem & modo eodem, &c. Minor est manifesta per experientiam quotidianam, vt evidens est ex diuersis diuersissimarum Prouinciæ inter sese collatis obseruationibus, quæ omnes ad vnguem correspondent. Manet ergo Conclusio.

DEMONSTRATIO TERTIA a tempore.

Ellacie visus nō sunt diuturnæ, &c. hoc Phœnomenon spectatur modo ab anno vndecimo quo primū illud ego detexi: & spectari potuit ab æuo condito, videbiturque ad finem vsque sæculi: igitur hoc Phœnomenon non est visus fallacia. Quia si ea quæ semper aut plerumque aut sæpe fiunt, modoq. simili & regulato, secundum Philosophum, non sunt fortuita aut casualia; multo minus sunt falsa aut deceptoria. hoc autem Phœnomenon æternum est, & sibi semper simile.

DEMONSTRATIO QUARTA ex ordine & regularitate.

Hoc Phœnomenon seruat suas certas periodos in motu, ordinatas & stas

Pro Veritate Phœnomeni Solaris.

Argumentum a Locorum diuersitate deductum.

Pro Veritate Phœnomeni Solaris.

Argumentum deductum à Temporis diuturnitate.

I.

*Pro Solaris
Phænomeni
Veritate.
Argumen-
tum dedu-
ctum ex ap-
paritionum
Regulari-
tate.*

tas motuum apparentium Zonas & flexuras, augmenta & decrementa regularissima: vicissitudines Phaseon simili semper tenore sibi succedentes; in summa ordinem & proportionem etiam in ipsa instabilitate summam: igitur non est visus deceptio.

DEMONSTRATIO QUINTA.

*Pro Phæ-
nomeni So-
laris Veri-
tate, pugnat
ipsa Falla-
cie Opticæ
natura.*

OMnis visus deceptio supponit aliquid verum & reale eiusdem obiectum: vnde etiam si in hoc Phœnomeno aliquid fallaciarum interuenire concederetur, tamen ex fieri non.

II.

possent sine praeuia aliqua, eaque appa-
rentia vera; nulla autem alia assignari po-
test in hoc Phoenomeno, nisi ipsum Phoe-
nomenon. Ergo ipsum est verum.

DEMONSTRATIO SEXTA.

TAndem ipsa ordinatio, obseruationum digestio, & annua motuum eorundem reuolutio, irrefragabilem huius Phœnomeni veritatem Sole clariorem efficit.

Quare ne diutiùs in ipsa die probanda
immorer, ad ipsas Observationum No-
tas Generales gradum facio.

*Pro Veri-
tate Solaris
Phænome-
ni.*

Argumentū
ex pſis Ob-
ſervationi-
bus digeſtis
deſumptum.



NOTAE GENERALES

ad Observationum Imagines rectè intelligendas peropportunaè.



I. VANDOQVIDEM

*Ordinata
Observatio-
num in Or-
dinem dige-
stio, quàm
fuerit neces-
saria.*

*Macularum
nuda obser-
vationes, om-
ni gratia de-
stituètur.*

*In gratiam
Lectoris ob-
servaciones
sunt in ordi-
nem digestæ.
Ex aliquot
millenis ob-
servationib.
ha Tabula
deprompta
sunt.*

& labor & sum-
ptus intolerabi-
lis fuisset, singu-
las Observatio-
nes singillatim
typo incisas af-
ferre; & res illa-

tædium Lectori potius atque obscurita-
tem, quàm doctrinam vel liberalem ani-
mi voluptatem attulisset: eas labore fer-
me incredibili in talem ordinem redegì,
qui & voluptatem aspectui, & animo
ingenuo afferret eruditionem. nam cùm
observationum ultra duo millia perfecis-
sem hic Romæ, & in circulo quolibet
complexus essem modò 6, modò 10, fre-
quenter 20, 30, & amplius; ipsa aucto-
grapha inordinata in æs seorsim incidere,
fuisset chaos obscuritatum in medium
afferre. Etenim præter perpendiculorum
inscriptiones, & singularum Macularum,
Facularum & Vmbrarum consignatio-
nes, per characteres alphabeticos & nu-
merales explicatas in ipsis, nihil est in-
venire. nulla ibidem Eclipticæ inscriptio,
nulla Macularum de die in diem ordina-
ta progressio: & eiusdem Maculæ iterata
sæpe observatio, & chartæ frequens in-
versio, situsque permutatio, quemlibet
Lectorem confunderent potius quàm do-
cerent. Quare operæ precium fuit, ut in-
gratiam veritatis, & Studiosi Lectoris
hasce molestias deuorarem, atque ex
duobus millibus observationum, atque
cò amplius hic Romæ peractarum hasce
Tabulas seu Imagines elaborarem: ad
quarum intelligentiam, nec non fructuo-
sum vsum, sequentes percipe declara-
tiones.

Prima, Quælibet Imago conflata est
ex observationibus pluribus, secundum
seriem temporum, atque successionem
dierum factis.

Secunda, Quælibet Imago inclusa est
in vnum circulum, qui Observatorius di-

citur, & repræsentat hemisphærium So-
lis apparens in forma circuli, illius anni,
mensis, diei, horæ &c. quibus annotata
observatio respondet: vnde cùm in quo-
libet circulo comprehensæ sint observa-
tiones plures distinctæ; consequens est,
illum circulum tot solaris hemisphærij
diuersis aspectibus æquiuale, quot af-
fultere sub factis ex eodem observatio-
nibus.

Tertia, Circulus iste ordinariè diuisus
est ex punctis quattuor A, Z, B, & N, per
lineas AB, & ZN, (quarum hanc non
expressi, quia mente faciliè concipitur)
in partes æquales quatuor. quarum duas
determinat linea AB, quæ est & dicitur
Ecliptica; & vocatur pars A Z B, supe-
rior & Borealis, siue Arctoa; altera AN
B, inferior siue Austrina. Aliæ duæ par-
tes, quas linea ZN, determinat, sunt Z
A N, plaga orientalis; & Z B N, occi-
dentalis.

Quarta, Linea ZN, est fixa arque sta-
bilis axis Eclipticæ & motus Macularum
annui, cuius polis ipsa terminatur, quo-
rum Z, Boreus, N Austrinus dicitur. Alio
etiam respectu Z, Zenith, & N. Nadir
denotat; quod perpendiculi vertex seu
summum semper in partem seu arcum
Z, basis siue imum punctum, semper
in arcum N, cadat. Linea NZ, etiam
medium cursus Macularum plus minus
determinat.

Quinta, Quando igitur in observatio-
num imaginibus aliqua Macula siue facu-
la seu Umbra, ab aliqua plaga denomina-
tur, ibidem existere tanquam loco viso
censenda est, & quando in aliqua plaga
versatur, inde denominari posse & sole-
re, pro comperto habeas.

Sexta, Perimeter circuli observatorij
A Z B N, esto & dicatur Horizon, quia
ipse visum determinat, ut ultra citraque
ipsum in Sole, vel circa, nil penitus aspi-
ciatur, & in ipsius plaga orientali versatæ
Maculæ, seu Faculæ, dicantur oriri; in
plaga

*Circulus
Observato-
rius vnus
respondet
multis Solis
aspectibus,
multasq; ob-
servaciones
comprehen-
dit.*

*Quadrifar-
ta Circuli
Observato-
rij diuisio,
in plagam
Borealem,
Australem,
Orientalem,
Occidentalem
per Eclipti-
cæ lineam,
& eius axem.*

*Axis Eclip-
ticæ & eius
Officium.*

*Horizon
Solis seu So-
laris, Quis
Ortus & oc-
casus Ma-
cularum,
Vbi?*

I.

plaga occidentali, occidere.

Septima, Quando Maculas inter A, seu ortum & axem Z N, versari videris, tunc eas ascendere; quando in medio cursus, seu linea N Z, aut iuxta easdem conspexeris, mediare, culminare, seu fastigium, culmen, & summam altitudinem in Sole obtinere; quando denique ipsas inter Z N, & B, seu occasum positas aduertere, tum demum descendere scias, respectu cursus proprii, latè non strictè sumpti. Nam veram Macularum culminationem determinat axis Macularum proprius & quasi menstruus, non annuus? seu Eclipticæ: vt suo loco. Hic autem rudiori minerua adhuc incedimus, ad abstrusiora viam paullatim aperientes.

Octaua, Quando Maculas aut Faculas in medio Sole enatas, aut ad finem non perductas videris, (nisi aliud expressè in notis specialibus moneam) scias velim, eas illuc non peruenisse motu aliquo locali, neque inde abiuisse, sed cœpisse, & esse desisse, proinde dicantur eiusmodi ortæ & occasæ physicè.

Nona, In omnibus Imaginibus cuiuslibet Maculæ insigniori, &c. adscribo suam certam & stabilem, ex Alphabeto litteram, itemque numerum diei, quo illa obseruata fuit.

Iam si scire voles tempus & horam diei, si fuit illud vespertinum, inuenies apud Maculam illud expressum littera u. si fuit matutinum, vel nihil inuenies, vel aliquando m. horam autem & eleuationem Solis cognosces ex Tabula singulis Imaginibus adiuncta.

Decima, Noueris autem ex altitudine Solis, non autem ex horis sumptum & inuentum esse angulum Eclipticæ ad verticalem, vel vice uersa. proinde si quis vellet quantitatem illius anguli retro inquirere, deberet id ex Eleuatione Solis efficere.

Vndecima, Horas autem accepi ex verticalibus horologijs, iudicio oculorum, non calculo, ea tamen qua potui dexteritate atque accuratione; & hoc ideo, vt de interuallis temporum & periodorum in designationibus fieri posset aliquod iudicium. Cum autem vel cœli inclementia, vel festinandi necessitate horam non semper habere licuerit, non semper etiam adnotaui, neque postea temporis penuria illam è calculo deducere

II.

vokui, qui illa indigebit, ex eleuatione satis eruet: hanc enim summa diligentia, semper procuravi. Sed & si quid in ipsis horarum scrupulis deliraret, prudens Astronomus grauioribus distento veniam dabit: neque enim ea calculo subieci.

Duodecima, Quando fuit magnus & numerosus Macularum aut Facularum tractus vel cumulus, vnam tantum alteramue adscripta littera signaui, reliquas autem, vt pote valde variabiles & instabiles proprijs signis vt plurimum non affecti, quia cum & figuram, & magnitudinem, & locum, & numerum, & raritatem atque densitatem in horas pæne mutent, superuacaneum, imò claritati scriptionis incommodum duxi, rebus incertis, certas notas affigere.

Decimatertia, Quapropter si quosdam anteambulones, laterones, seu denique affectas aut comitatu deficere, aut de nouo superuenire in Imaginibus conspexeris, pro certo habeas nec illos postea, nec hos antea in Sole visos, sed physicè natos aut denatos censendos esse.

Decimaquarta, Porro cū ab anno 1611. quo hoc Phœnomenon sub alieno Apellis nomine primus euulgauit, ad hoc usque tempus per me & per meos discipulos, bonosque Amicos, continuatas easque accuratas obseruationes habeam, & ex omni quidem Regione; ex Italia, ex Gallia, è Polonia, ex Hispania, ex orbe nouo, ex Belgio & tota quasi Germania; huc tamen, quia ad manum plurimæ illarum certas ob causas non erant, non licuit ex omnibus annis imagines inferere; neque omnes quas mecum habui apponere libuit, ne opus infinitum, labor & sumptus immensus fieret. possum tamen, si opus erit ex illis ad libitum depromere, vel cuiuslibet petenti autographa suo loco & tempore exhibere.

Quintadecima, Itaque in hoc opere Romanas meas obseruationes in Domo Professa, & Collegio Romano, summo studio, atque in conspectu etiam Illustrissimorum, atque maximorum Virorum, sæpe confectas, potissimum virgeo & prommo: quibus tamen aliorum tam Mathematicorum, quam locorum, per annos sex intercisas admisceo; vt ex tam admirabili & planè obstupescenda motus apparentis harmonia, ipsissimam rei veritatem

Non omnes Maculae, aut Faculae, certis notis sunt insignita, & Cur?

Magnitudo, Figura, Densitas & raritas &c.

Maculae in momenta mutatur.

Quenam Macula pro corruptis habenda?

Et harum, & aliarum Obseruationum Autographa, ab anno in annum, è quo Apelles hoc Phœnomenon detexit, in promptu est, cuiuslibet ex iusta causa petenti, exhibere.

Exemplaria Autographa salua stant, pro fide facienda.

Octo annorum & diuersorum Obseruationum atque locorum Obseruationes promuntur in hoc Opere.

Maculae & Faculae ortus, & occasus Physici.

Quid significet littera u. apud Maculas? quid m?

Eleuatio Solis præcipua directionis norma.

Temporis annotatio ad quid inserviat? nõ nunquam omissa.

I.

tem quilibet syncerus rerum aestimator
haud difficulter deprehendat.

Sextadecima, Neque tamen omnes,
ut dixi, vel meas vel alienas horum anno-
rum expedio, sed è tribus quasi millibus
tam meis, quam alienis, illas assumo,
quæ & motus apparentis continuam suc-
cessionem ostendunt, & confusionem in
dispositione euitant.

Decima septima, Sæpe quoque eorum-
dem dierum aliquot observationum Im-
gines & seriesnecto, quia locus in vnico
circulo omnes simul non capit.

Decima octaua, Neque tamen omnes
etiam, vel Maculas vel Faculas, vel Vm-
bras à me in observationum autographa,
semper esse consignatas, aut inde in hæc
Imagines traductas, asseuerauerim; sed
tibi persuadeas velim tam in obseruando
multas non raro præteritas, quam in-
transferendo studio frequenter omittas.
Tam multas enim iteravi dici vnus ob-
seruationes pro veritate stabilienda, ut ad-
huc alias similium observationum series
huic non absimiles sub alijs alijsq; Solis su-
pra Horizontē exaltationibus, nullo nego-
tio, facillimè expedirem. Hæc tamen,
prudenti suffectura puto.

Nam qui istis fidem derogat, neque
centenis quidem millibus, meo iudicio
acquiescet.

Decima nona, Et tametsi fidem probi-
tatis apud cordatum Lectorem ipse ha-
rum disposicionum aspectus concillabit,
nihilominus ex supererogatione accipe
sequentia. Primò, E tanto obseruationum
numero, nullas selegi, nullas reieci, sed
prout opportunitas & temporis ratio in
manum dabat, ita eas in ordinem dige-
stas huc traieci. Secundò, Si quid tamen
emendatione dignum visum est, vel non
admissi omnino, vel in emendatum po-
sui, ut sua Autographis Fides staret.
Hinc videbis nonnunquam vel Facu-
lam vel Maculam à Statione sua paulli-
isper deflectentem; quod uti quisque fa-
cile animaduertet, ita haud difficulter
corriget; nec adscribet lapsum obserua-
toris, itineri Maculæ; sed ex Auctoris
synceritate amplius Phœnomeni integri-
tatem commendabit. Tertiò, Aliorum
obseruationes secundum illorum calcu-
los & inductas Eclipticas pariter illibatas
promo. si quid autem ratione perpendi-
culi inducti corrigendum fuerit, mone-

II.

bitur suo loco, tu conferes an cum meis
conueniant, nec ne. Quartò, Ipsa auto-
grapha intacta retineo, ut pro re nata,
ostendere ea sit integrum. Quintò, Scio
annos hosce cum præteritis annis praxi
assidua, atque examine plusquam Rada-
manthæo olim discussis, quos hic non
tango, ad vnguem in motibus conuenire.
Sextò, Denique ad praxim & experien-
tiam prouoco: obserua, digere, & con-
fer: inuenies tua futura, conuenire cum
meis præteritis, in motu &c. in motu in-
quam non immobili: nam Macula non
perennat, perennat autem motus & Ma-
cularum via ab annis nunc sedecim reper-
ta, & ut credere par est, ab æuo condito
trita.

Vigesima, Quidquid in Sole reperi, di-
stinxi in Maculas, Faculas, & Vmbras.
Macularum triplicem ordinem reperio.
Quædam enim nucleos habent, & valde
distinctas, quoad raritatem & densita-
tem, reliquas à nucleis partes, vaporibus
aut nebulis, fumisue circumiectis simi-
les; quædam non habent expressos &
distinctos nucleos, sed vniuniformiter diffor-
mem rari & densi, commixtionem, den-
siorem in medio, hinc versus extrema-
tendendo, sensim rariorem; quædam ra-
ritatem vbique æquabiliter diffusam. ita-
que hæc omnes species conatus sum
imitari atque exprimere delineando: vn-
de tales imaginaberis tibi, apparuisse in
circulo Solari Maculas, quales hic pro-
positas aspexeris in circulo obseruatorio
nisi aliud expressè moneam, propter in-
cisoris inaduertentiam, qui manum meam
in autographis non semper perfectè asse-
cutus est.

Eodem modo Faculæ aliæ sunt valde
pure, intense & luculentæ; aliæ obtusæ
& hebetes; aliæ liberæ & sine nigricanti-
bus terminis in Sole elucentes, aliæ um-
bris circumuallatæ, vel ex parte vel vndi-
que omnia studui eo modo ob oculos po-
nere, quo in Sole ego conspexi. Quando
igitur eas Solis punctulis, sine umbrarum
indicijs ex lineolarum confertarum ductu
consurgentibus expressas videris; aduer-
tas velim, easdem ex puro Solis æquore,
nullis stipantibus aut circumuallantibus
umbris emicuisse: siue iam huius rei men-
tionem expressam faciam in Notis spe-
cialibus, siue non, hic semel pro semper
dixisse sufficere possit.

Vmbra.

Macula nō
sunt peren-
nes; motus
autem per-
ennat.

Totum
Phænome-
non vel sunt
Macula, vel
Facula, vel
Vmbra.

Macularū
Triplex spe-
cies. Alia
nucleis se-
cundæ: alia
steriles: &
harum ali-
que diffor-
mes, aliqua
uniformes.

Facularum
alia inten-
sa, alia re-
missa; alia
pura, alia
tenebrosa.

Flures hu-
iuscemodi
obseruatio-
num Ord-
ines possent
in medium
adduci.

Fides Con-
ciliatur ob-
seruatis &
digestis.

I.

Vmbrarum Solarium descriptio.

Vmbrarum nomine veniunt tenuissima quaedam & informes partes quasi fumo, vel nebula Soli aspersae, sine praecisa figura & magnitudine varia, non tam stabiles atque Maculae, harum quasi praevia indicia, aut vestigia posthuma; caudae, apices, appendices, exuberantiae. Facularum denique limites & sepes, quas ordinarie vel antecedant, vel comitantur. Quibus Solem non aliter infectum iudices, quam candidissimam syndonem subtilissima tela aranea, vel mundissimam chartam humectatam nota, vel tersissimum speculum manus attractu, orisue habitu. delineavi omnia haec quam potui ad viuum maximè. Vbiunque igitur in Maculis nigriora repereris, scias densos nucleos fuisse, vbi molliora, eas Maculas medio censu habendas, vbi aequabiles adumbrationes, illic & Maculas tenues extitisse. Vmbrarum nominatim fere semper meminero. Et licet haec Vmbrae Maculas & Faculas frequentissimè comitentur, tamen per se separatim visuntur saepius, & post aliquantam moram dissipantur.

Vmbrarum lia sunt cōiuncta, alia separata.

Magnitudo Macularum, Facularum & Vmbrarum est ad Circulū Solis commensurata.

Macularum, Facularum & Vmbrarum magnitudo potius minor, quā maior assumpta est in Maculis maioribus: & maior in minoribus.

Vigesima prima, Magnitudinum, & Figurarum rationem singularem in hisce consignandis semper habui. itaq. qualem in meis Imaginibus earum proportionem inueneris tam inter se, quam ad circulum Solarem observatorium cui interpretæ sunt talem fuisse Macularum, Facularum, & Vmbrarum ad Solem secunde enuacabis, salvo tamen semper refractionis negotio. imò ne forte excederem, & Maculas fide maiores facerem, ausim pro certo affirmare, me Macularum maiorum magnitudines potius minores, quam maiores afferre: sic vicissim quoq. minimas Maculas, potius maiores quam ipsae apparebant statuere; quod ideo teci, quia tantillae saepe fuerunt, vt commodè sculpi & visui in Typo subijci vix possent: licet in Sole distinctissimè promicaret. vnde quando in notationibus dico has vel illas Maculas paruas fuisse, scias illas ordinariè minores apparuisse, quam eas tibi propono in schematibus: non enim soleo paruas appellare, nisi admodum minutae fuerint.

Vigesima secunda, Magnitudines in Imagines tam meas, quam aliorum ampliatas, transtuli ex meis autographis proportionaliter.

II.

1 Vigesima tertia, Situs ratio tota pendet à recta impositione Eclipticae in circulum observatorium, haec autem pendet ex agnitione anguli inter verticalem, & Eclipticam, tempore observationis intercepti: in cuius rei recta praxi, huius totius negotij cardo versatur. Quare quemadmodum ad hanc rem singulare semper studium conuerti, ita me intentum meum plenissimè affecutum esse, nihil ambigo. assentietur, qui idem fatitabit; sed facilius quàm ego, qui viam aperui, & strauit. Facilius autem est, alienam sequi semitam, quàm propriam inuenire.

10 Vigesima quarta, Perpendiculari puncta in perimetrum cum notis numeralibus impressa, addidi multis initio observationibus, partim vt quisq. angulum ab Ecliptica & linea verticali interceptum posset aestimare, partim vt integras observationes ex Imaginibus seuocare: sed cum processu temporis, labor hic, nimius & vtcunq. superuacaneus appareret; Circulus insuper Observatorius nonnihil defecdari videretur, & apparentiarum marginalium loca impediri, & quod caput est, circulus totus (de quo mox) Observatorius ex proeli natura in Ellipsim produci, ita vt semper in situ & positione aliquid variationis intercederet; hisce curis supererogatorijs supercedendum esse iudicavi, satis superq. praestitisse arbitratus, si in aliquibus hanc rem aliorum oculis subiecissim. Nam qui ipsis cursibus propositis assensum suum & fidem abrogat, neque appositis perpendicularibus habebit. Aut ergo vtrique, aut neutri addicenda credulitas.

20 Vigesima quinta, Natura Proeli, quo in aë incise Imagines volutatione cylindrica imprimuntur, hoc secum veni, vt Imagines semper aliquid in longum excrescant. arcta enim illa & violenta strictura, chartam voluendo cylindro attenuat, & extendit: ex quo fit, vt circulares Imagines, praesertim maiores, semper aliquatò longiores & ellipticae fiant, vt experienti constabit. vnde si hoc in circulis observatorijs deprehendes, & Circulos nullos, sed meras ellipses reperies; no adscribes hanc rem, neque mihi, neq. incisori, sed impressionis naturae vitiosae; quae, vt mihi quidem videtur, incorrigibilis, sed tolerabilis esse debet. Accedit, quod omnes ima.

Ratio Situs. Cardo rectae Observationis pendet à Perpendiculari notatione, & Ecliptica inscriptione.

Perpendicularum puncta in marginibus multarum Imaginum addita; Curt

Circuli observatorij reductio nonnihil à prolo in Ellipsin detorque tur.

Typus Imagines autographis minores redidit: & quare?

II

Imagines typo excusae, in charta longè sunt minores, quàm in aere vel autographo; cuius rei feci experimenta, quam plurima. ratio à priori, quia charta imagine imbuenda & imprimenda prius humectatur & ampliatur; post acceptum typum siccatur, & undique contrahitur. Ex his ergo duobus inevitabilibus incommodis, fieri potest, & ut opinor solet, ut nonnulla in ipsas observationum icones invehantur incommoda, circa situm & magnitudinem, atque locum. Ut merito addubitem, an quæ in scriptis asseruntur, semper ad amissim & perfectè corrépondeant iconisimis adductis; tamen si summa æris atq; prototypi concordia plerumq; existat: dico plerumque, quia quandoque fit, uti incisor ab exemplari nonnihil deviet: quod tamen cum raro accidat, & leuiter fiat; suis locis monebitur. Hanc autem rem seriò admonendam, & summo opere attendendam censeo, ut in progressu operis atque lectionis, nec non in Lectorum cum figurarum collatione, scires quid sentiendum, quid tenendum, si à dictis fortasse discrepant simulacra, si ab ideis scripta. Nam errorem hunc verbis indicare possum, ne committatur edendo, aut editus scribendo tollatur, facere non possum. An autem charta imminuatur singularum partium inter sese proportionem retenta, uti non examinaui, ita edicere nequeo.

Vitium Typi sensu oculi vix deprehenditur.

Hoc tñ dico, vitia hæc in singulis chartæ folijs videri similia & vniformia, & ad aspectum & sensum vix notabilia: solus Geometra, curiosusq; dictorum examinatus, quidquid dissonum latebit eruet; atq; eam, de qua egi, inconuenientiam, deprehendet, sed quam Astronomus nec fecit, neq; cauere potuit: veniam ergo merebitur hæc culpa, sine qua veritati & Lectori ad Oculum seruire non licuit; & si ad Oculum seruire alias non licuit vnquam sine culpa, hic fas fuit etiam cum bona, ut spero, gratia.

Circuli Observatorij parui, hanc labem non incurrunt.

Sufficit fidem inesse verbis, veritatem incorruptam autographis. Circuli observatorij parui, hoc malum vix sentiunt. Vigesima sexta. In Observationum Imaginibus, inuenies passim multas Maculas, aut etiam Faculas extra semitam itinerariam, utrinq; collocatas; hoc autem non fit,

II

quia ipsæ talibus inter eundem vsæ sunt diuerticulis, sed quia tanta secum traxerunt impedimenta, ut itinere regio commode collocari non possent; secedendum nonnihil fuit ad latera, ut Gazas suas, & magnificas diuitias in tētorijs tumultuarijs spectantium oculis exponerent. Itaq; secessus illos laterales non Macula fecit, sed Observator; eadem tamen semper à centro C, distantia retenta. Vigesima septima. Cum autem ipsa observationes omnes & circuli Observationum sint, & fiant situ cterso, ipsæ Imagines Observationum in ordinem redactarum, & hic exhibitarum, sunt omnes situ recto & conuerso, ita, ut eo prorsus modo Maculam aspiceres in Sole, quorillam nunc vides in charta, eadē figura, eodem situ, quod secus accidit, in chartis & exemplaribus observationum authenticis. nam supera in Sole, sunt inferiora in charta; dextra in Sole, laeuam chartæ insident, & vice versa &c. Hic ergo, omnia recto & naturali situ representata habes. Vigesima octaua. Finis horum Iconismorum est, ponere fundamentum solidum totius Solaris Phænomeni: quod aliunde quàm ex motu apparente sumi non potest: in hoc enim totius rei cardo versatur. Nam cum in omnibus apparentijs coelestibus, ab Astronomo, Motus, & locus verus, rei visæ atq; motæ, ante omnia semper inuestigari soleat: idq. solidè atque scientificè, sine motu apparente & loco viso acquiri non possit: hinc factum est, ut in hoc perscrutando Phænomeno, tantum operæ in Motum apparentem, absq. hallucinatione promendum, collocarem. Atque ut in eo eruendo eò certior euaderem, suisq; temporibus doctrinam solidiorem elicerem, plures in commercium studij observatorij socios assumpsi, itaque dum Ingolstadtianæ Mathesi per decennium docendæ præfui, discipulis quibudam meis solertioribus observandi huius Phænomeni modum, perpendiculi in observationes inducendi, atque ex hoc in easdem elliptica inducendæ praxim, fidelissimè concredidi. Præsertim cum ad Serenissimæ Domus Austriacæ seruitia, tam in Mathematicis, quàm alijs functionibus obeundis, quandoque euocarer, atque ab assiduitate observandi nonnihil distrahерer.

Macula & Facula extra orbem tam regiam in latera saepe coniunguntur, ob locorum penuriam.

Omnes observationes Imagines asseruntur situ recto & conuerso.

Ex his Observationibus statuitur Fundamentum Solaris Phænomeni.

Socij in laborem observandi assumpsi.

Qua-

I.

Quapropter, cum iam ante industriam, atque dexteritatem Patris Baptistæ Cysati, & Georgij Schönberger, multorumque aliorum experimento didicissem plurimasque ab ipsis observationes cum meis contulissem, atque conuenire animaduertissem, hortatus sum illos sedulo, easdem ut etiam me absente in mei gratiam, & usum subsequendum continuarent. *semper enim speraueram olim hanc rem in publicum à me perfecte producendam, idèque hoc Phænomenon singulariter mihi tanquam inuentum meum haud iniuria reseruauit.* Quare cum ante triennium hanc curam in manus hic Romæ occasionaliter resumpsissem, & tam meæ, quam Patris Cysati originales plurimorum annorum observationes, in Collegio Nissensi reseruatæ, perutiles quidem futuræ, sed huc bellorum, & aliorum periculorum iniuria euocari non possent; postulauit hinc ab utrisque, ut si quid obseruatorum apud se haberent in parato, mitterent, vel certè noua huc mittenda quamprimum obseruarent, quo factum est, ut eas quas Ingolstadij, & Triburgi obseruatas Maculas accepi, huc infererem, eademque ratione a Patre Malaperisio propositas ederem. Nam etiam si multas aliorum hic in Italia factas primorum annorum designationes inuenerim atque adhuc mecum retineam; tamen quia inscripto perpendiculo carebant, præcipuo meo intento non seruebant.

Cum autem olim, uti dixi, ad similem finem, dictos Patres, praxim perpendiculi addendi edocuissem, ita tamen, ut hanc rem secretam tenerent, (ne sicut alia, ita hoc ipsum inuentum ante tempus ab aliis harpiis inuaderetur, &c.) rogavi uti suas observationes mihi communicarent, idque si fieri posset, cum induta in observationes Ecliptica, calculo deducta. quod cum præ reliquis ante biennium præstitisset P. Georgius Schönberger, ordinavi ego hosce ipsius motus apparentes ex calculo ipsius deductos, & in æt incisos, aliquot exemplaria illi ordinata remisi, uti videret, quam bene calculus successisset, & motus Macularum curuilineus, de quo olim ante multos annos tam illi, quam P. Cysato, ut pote meis successoribus sub Rosa multa dixi, in medium prodiret.

II.

Neque tamen hæc eo feci, ut summum rei momentum in illis observationibus positum crederem, aut absque illis cum meis solis prodire diffiderem; sed ut fidelissimos illorum labores, iam tot annos meo rogatu atque causa continuatos, hac saltem animi grati significatione remunerarer: & nihil magis mihi dolet, quam quod accuratas P. Cysati multorum annorum animaduersiones, & quorundam aliorum ex Indiis usque ad me transmissarum, & multo amplius meas ipsius ad manum non habuerim. potuissem enim ex ijs omnes aliorum non tantum iudicare, sed in ordinem quoque digerere, communicato ex meis perpendiculo. Nam ego observationes nullas feci, absque illius in easdem inscriptione. sed quod differtur non aufertur. Dabitur fortassis & illas proferendi oportunitas. Deinde volui toti Mundo ostendere, hoc Phænomenon ubique sibi constare. Nam si meas solius observationes adduxissem, motusque apparentes explicatissem, remansisset forsitan multis scrupulus, & religio assentiendi nunc cum videant tantum vndique, & ubique consensum; non est quod quidquam sinistri sibi imaginentur, vel de mea fidelitate, vel de Phænomeni asserta & certa atque ubiq. terrarum consentiente apparentia. Nam motus illorum apparens, ex calculo illorum proueniens, idem planè est, qui consurgit, ex praxibus meis, vel Mechanicis, vel Geometricis, vel Arithmeticis, vel Astronomicis tam ad mea quam illorumet obseruata applicitis. Neque enim quidquam illorum euulgo, quod non ad meas etiam & accurate quidem, examinaui regulas, de quibus fusè in libro priore. Itaque de Motu apparente in hisce Imaginibus adducto, non est quod quidquam dubij vel diffidentiae cuiquam oboriatur. Pro solo autem motu apparente efficaciter stabiliendo illas ipsorum paruis circulis obseruatorijs animaduersiones comprehensas adduxi; nam ut inde subtiliora quæque eruam, non est opus; cum ex meis maioribus certius exactiusque sine errore habeantur. ad quæ parui circuli iuuant quidem, sed iuuantur multo amplius à maioribus; qui stant soli sine paruis, hi autem soli ad omnia nunquam sufficiunt. Ut exempli causa, girationem Solis, aut perfectum motus ar-

Macularum
obseruatio-
nes ab alijs
rogatu au-
toris in
hunc usum
continuatae.

Ad aucto-
ris instan-
tiam alienæ
obseruatio-
nes Romam
venerunt.

Macularum
sine inducto
perpendicu-
lo obserua-
tiones, ad
motum in-
digandum
non seruauit.

Auctor a-
lias discipu-
lorum suo-
rum obser-
uationes
huc addu-
xit.

I.

*Circuli par-
ui Obserua-
torij soli ad
motū huius
Phænomeni
plenariè e-
ruendū, non
sufficiunt :
magni absq;
paruis totū
abundantissi-
mè præstāt.
Similitudo
motuum in
magnis &
paruis Ob-
servationū
Circulis re-
perta, est ge-
nerica, non
necessario in-
diuidualis.
Flexuum
itinerariortū
qualitates,
intelligun-
tur ex motis
specialibus.*

*cuati flexum, aut Macula durabilio-
ris reditum, nunquam obtinebis ex obser-
uatoriis paruis Circulis, poteris autem
etiam contra refractarium ex magnis.
Quamobrem vt motus apparens inuen-
tus maioribus confirmetur à paruis Cir-
culis, sufficit, vt sicut in maioribus cur-
uilineus vel rectilineus, ita in minoribus
appareat : & hoc est, quod hic inten-
do, & innuo, quando scribo, Cursus
Macularum esse inter sese similes ; in-
genere nimirum aut specie. Nam simi-
litudinem indiuidualem exiges, à Cir-
culis maioribus, & lentibus atque Te-
lioscopijs aequalibus, nec non similibus &
simili ratione confectis.*

*Vigesimanona, Quando autem Cur-
sus Macularum itinerarij curuilinei,
quamdiu & quantum, & qualiter appa-
reant ; quando & quomodo rectilinei :
qui situs istorum Cursuum, ad Eclipti-
cam existant ; à qua parte Solis incipiant,
in quam tendant : quantum latitudinis
in eodem peragrent, &c. aspicias in ob-
servationum Imaginibus, leges in notis
specialibus earundem.*

*Trigesima, Quando dico Cursus
Macularum esse similes Cursibus, men-
sibus, hebdomadibus, & diebus iisdem,
non est sensus, ac si Maculae eadem,
cursus eodem relegerent annuè ; hoc
enim non expectabis, cum, vt videbis,
dubium sit, an vel semel menstruè re-
deant, nedum annuè : sed est locutio
hypothetica. Snpposito, Maculas qua-
scunque tandem, situ, figura, magni-
tudine quacunque horizontem Solarem
intrare ; in puncto eodem, quo alia qua-
cunque intrauerat anno quocunque, men-
se tamen eodem, & die eodem mensis plus
minus ; tunc dico ; cursus apparentes il-
larum semper inuentum iri similes, hoc
est, vel curuilineos, curuitate simili
erga centrum, & Eclipticam, vel recti-
lineos, similiter ad Eclipticam obliquos
&c. Quod si Cursus fuerint eiusdem Ma-
culae, loco tantum, & obseruatoribus
differentes, dico etiam geometricè ad
sensem futuros similes, solumque inter
se discrepaturos, vt indiuiduum ab in-
diuiduo. Dixi ad sensum, quia refra-
ctio in re potest aliquid differentiae in-
ferre.*

*Trigesimaprima, Testes oculatos
Phænomeni huius & Observationum*

II.

*1 mearum atque Inspectores habui, & o-
lim, & nunc atque vbique gentium Vi-
ros ex omni genere, officio, atque di-
gnitate spectabilissimos, multosque pere-
gre huc profectos, qui Phænomenon
hoc ante sibi inuisum, iucundissimè spe-
ctauerunt.*

*5 Trigesimasecunda, Quando in Decur-
su Notationum particularium legeris, a-
liquam Maculam, Faculam aut Vmbram
visam, vel animaduersam esse in motu,
aut videri vel percipi non potuisse, nisi
in motu ; vel aliam è contrario stabiliter
visam esse sine motu ; noueris sermonem
esse, non de motu Maculae quem ipsa
conficit in Sole, nam huius motus pro-
motio nulla sensu est perceptibilis ; sed de
agitatione instrumenti, vna cum Tabel-
la chartifera & circulo obseruatorio, hæc
enim leniter in partem quamcunque
acta, species quodammodo Solis comou-
ent, & oculum ad ea videnda excitant,
quæ alioquin aciem visus in quiete effu-
gissent. Vnde rursus euident est, eas quæ
hac excitatione indigent, seu Maculas,
seu Faculas siue Vmbras, valde exiles &
tenues ; quæ vero absque hac concussio-
ne spectantur robustiores atque consti-
patiores esse.*

*30 Trigesimatertia, Quando aliquas Ma-
culas in suis itineribus Solis punctis ni-
gris consignatas aspexeris ; non censebis
eas tam paruas repente euasisse, sed solo
centro consignatas animaduertas velim,
vel quia aliter in exemplari non sunt ob-
seruatae, vel quia vicinitas stationum a-
liarum totam explicari non est passa.*

*35 Trigesimaquarta, Locus itineris in
quo Macula obseruata designatur, Sta-
tio eiusdem vocetur.*

*40 Trigesimaquinta, Maculae crassiores,
nucleis facundæ, aut sibi vicinæ, plerum-
que coloribus quibusdam peregrinis tin-
guntur, subalbidis sub viridibus, caru-
leis, flauis, furuis, idque non casu, for-
tuito aut temere, sed certo ordine, situ,
augmento & decremento ; Nam ea Ma-
culæ pars quæ centrum recta aspicit
semper carulescit auersa semper fur-
uescit : & quando hoc contingit, ple-
rumque Maculam splendor quidam
instar Halonis ambit ; quem nimbum
vocito ; hanc autem apparentiam, non
semper annoto, sed aliquando, cum valde
illustris est, & exempli causa adduco.*

Quid

*Testes obser-
uationum
mearum o-
culati, qui ?*

*Commotio
machina He-
lioscopica
iuvat ad vi-
dendas Ma-
culas.*

*Macula pte
Etim consi-
gnata.*

*Peregrini
Macularū
colores.*

*Macularū
Halo, seu
Nimbus.*

I.

Quid autem ea sit, unde & quomodo fiat, suis locis, Deo dante disputabitur. hæc interim te monere volui, ut scires id quod ordinariè & ordinatè fit, me studio satis raro annotasse in Macularum cursibus.

Observationum partes enumerantur.

Trigesimasexta, Quælibet Observationum Mearum Imago cõplectitur ista. Primò Circulum Observatorium. Secundò Eclipticam. Tertiò Annum, Mensem, & dies observationum, locumque observandi consignatum. Quartò, *Nomen Iesu, cui me & meos labores omnes consecro, tum Quinto duas Rosas, Phænomeni Familiaq; Vrsina fragrantissima insignia*: neque enim Sol latius suos radios, & vna cum illis hanc Rosam, quam laudatissima illa Familia Vrsina Virtutum Heroicarum fragrantiam spargit. Sextò, Sequuntur deinde, Maculæ, Faculæ, Umbrae. Septimò, His adiunctæ suæ litteræ, & notæ numerales. Octauò, Tandem diaria Observationum recensio.

Ex hisce igitur, statim scies Imaginis cuiusvis aspectu, Quo anno, quo loco, quo mense, quibus diebus, quibus horis, sub qua Solis supra horizontem altitudine, quæque Maculæ, Faculæ aut Umbrae sint observatæ; quando exortæ, quando occasæ fuerint, quibus itineribus incesserint, quo habitu, figura, comitatu, robore viguerint &c. Quæ omnia & singula specialibus explicata leges in singulis Observationum quarumlibet configurationibus & Notis. Hæc autem vniuersim hic attigisse sufficiat. Vide Notationes in Imaginem I. I. quæ est prima Ianuarij, 1625.

Cursus Maculæ, Quid?

Trigesimasexta, Per Cursum Maculæ cuiusvis nihil aliud intelligo, quàm illud vestigium, quod Macula quævis, dum Solem ab ortu in occasum perambulat, post se relinquit, quod quia in visum non cadit, nisi per ipsam Maculam visam & in charta consignatam, idcirco illud ipsum quale sit, per observatas & consignatas Maculæ stationes centrales innotescit: unde si ipsas lineolis fractis coniungas, prout in multis observationibus, exempli causa, factitavi; videbis statim qualis iste cursus sit, curvilineus ne an rectilineus, & ex qua orientis plaga, in quam occidentis pergat; in quem polum concavus, in quem convexus respiciat; qua curvitate præditus sit, qua obli-

II.

1 quitate Eclipticam respiciat; quando, ubi, quomodo & quoties eandem secet vel tangat. Igitur *linea quam Macula quævis centro suo in Sole describit, est & dicitur cursus Maculæ, curriculum, iter, vestigium, via, incessus, linea itineraria quæ omnia pro eodem accipiuntur*. Et in ipsum Solis circulum, seu planum Solaris circuli, projici cogitatur.

10 Trigesima octava, Directio autem Macularum itineraria, significat ipsam viam huius tendentiam, videlicet unde Maculæ & quorsum moueantur.

15 Tamen si enim certum sit, omnes ab ortu in occasum tendere, verumque ortus & occasus punctum determinet Eclipticæ linea in Sole semper expressa; quia tamen Maculæ sua itinera nunquam describunt secundum Eclipticæ fluxum, neque eidem æquidistanter vnquam incedunt; indico ordinariè in Margine quam Macularum directio sit.

25 Semper enim experieris per integros sex menses, itinera Macularum procedere obliquè ad Eclipticam, ab Aequilibrion verno, ad æquilibrium autumnale, ex Aquilone orientali in Austrum occidentalem, quod fit à fine Februarij & initio Martij, ad finem Augusti & initium Septembris; & toto hoc tempore, omnes arcuum itinerariorum subtensæ, siue eæ diametri sint siue chordæ ad axem mobilem perpendiculares, Eclipticam obliquè interfecant; ita ut alterum segmentum 35 semper sit in plaga boreali, angulusque à segmento & Ecliptica comprehensus orientem respiciat, alterum verò segmentum in plaga meridionali iacens, angulum cum Ecliptica faciat apertum versus 40 occidentem.

45 Et prioribus quidem tribus huius semestris mensibus, id est, Martio, Aprili, Maio, omnes arcus itinerarij erunt concavi in Austrum orientalem, convexi in Aquilonem occidentalem; alijs verò tribus posterioribus, post Stationem æstivalem rectilineam, id est, Iunio, Iulio, Augusto, connertent itinera Macularum suas concavitates in Septentrionem occidentum, convexitates autem in Austrum 50 orientalem.

55 Contraria hisce evenient, ab Aequilibrion autumnali, quod contingit semper in fine Augusti atque initio Septembris, usque ad Aequilibrium Vernum, in

Directio siue tendentia Macularum itineraria Quid?

Macularum itinera quomodo, & quando per mediam annum obliquantur ad Eclipticam ex Aquilone in Austrum?

Statio Macularum æstiva.

Macularum itinera quomodo, et quâdo per medietatem annum obliquantur ad Eclipticam ex Austro in Aquilonem.

I.

cuius tribus mensibus, Septembri, Octobri, Nouembri, omnes Macularum viæ sunt concavæ versùs Aquilonem borealem, convexæ erga austrum occidentalem, mensibus autem tribus posterioribus, Decembri, Ianuario, & Februario, postquam Statio hyemalis rectilinea celebrata est, flexus itinerarij sunt caui in austrum occiduum, convexi in Septentrionem ortium.

Statio Macularum Hyberna.

Vicissitudo Motus Macularum itineraria. Annua, Semestris, Trimestris.

Linearum & superficiorum mutua sectio- nes, obliqua vel recta nō sunt, sed tantum denominantur.

Rectitudo vel obliquitas ex situ originem trahit.

Situs autem quantorum est.

Atque hæc itinerum vicissitudo, annua, semestris & trimestris est stata & in hoc Phœnomeno perpetua, quantum ex tot nunc annorum observationibus decerpere & decernere licuit.

Trigesimanona, Quia verò Inclinationum, obliquitatum, declinationum, latitudinum atque sectionum in Notis specialibus, frequens mentio existit, sciendum est; nullam quidem vel linearum vel superficierum inter sese sectionem vel obliquam vel rectam esse, sed talem denominari tantū ex situ & habitudine eorum ad se quæ interfecantur. Nam lineam nō secant nisi in puncto indivisibili, sic superficies superficiem non nisi in linea indivisibili; sectio ergo in se indivisibilis cum sit, obliquitatem vel rectitudinem nullam admittit, est enim hæc quanti proprietas: est tamen & dicitur recta vel obliqua, prout videlicet lineæ ad lineam situs rectus vel obliquus est; sic incidentia recta vel obliqua dicitur, non ex ultimo lineæ incidentis puncto, sed ex habitudine tota lineæ ad lineam; sic etiam inclinatio.

Si namque linea aliqua terminata aliquam aliam finitam extremo sui puncto attrigerit, vel cum eadem in directum iacebit vel non; si primum, nulla inter ipsas

II.

alterius ad alterā inclinatio erit, sed summa & æqua vnius ab altera remotio, nimirum semicircularis: si secundum, erit ambarum ad se inclinatio, & quo fuerit distantia inter illas maior, hoc erit inclinatio minor, sed angulus maior, & vice versa.

Inclinatio ergo hoc loco & obliquitas se mutuo consequuntur; nam Inclinationo magna magnam obliquitatem, parva parvam offert &c. Accipio autem chordas arcuum & non arcus pro obliquitate & inclinatione eruenda, quia arcus sunt irregulares, & Eclipticam sæpe omnino non attingunt, sæpe autem chordæ.

Latitudo autem parallelorum, quos Maculæ describunt, sumenda est penes distantiam illorum a parallelo maximo, quam semper dant diametri arcuum itinerariorum. Sed de hisce affectionibus, suis locis ex instituto agetur.

Quadragesima, Poli super quos Maculæ conuertuntur, sunt duo, Australis & borealis, sibi oppositi, & motibus oppositis agitantur; semperq; alter medio anno in hæmisphærio Solis patente incedit, alter in latente, & semper manifestus ab occasu in ortum voluitur, occultus ab ortu in occasum: australis exoritur in statione rectilinea Hyberna, circa initium mensis Decembris, quo tempore boreus occumbit; tempore verò Stationis æstivalis occidit polus australis, in plaga polari austrina ortiva, circa initium Iunij & exoritur in plaga septentrionali occidua Aquilonaris; & sic mutui isti ortus atque occasus polorum Mobilium, axes circa quos rotantur Maculæ deferentium, semper perennant.

Inclinatio lineæ ad lineam quādo fit.

Inclinatio & obliquitas sese mutuo consequuntur.

Chordæ arcuum itinerariorum assumuntur pro obliquitate vel Inclinatione ostendenda. Latitudo Cursuum.

Polorum super quos Macula conuertuntur. ab ortu in occasum, latitudo annua ab occasu in ortum.

Ortus & Occasus ditionum Polorum.



NOTAE PARTICVLARES

ad Tabulas seu Imagines obseruationum habitarum annis 1618. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626 1627. Romæ & alibi in locis varijs, à Mathematicis diuersis.

I.

NOTAE AD TAB. I. QVAE EST A
die 14. ad 19. Decemb. anni 1624.

In Decemb.
initium fa-
cit motus an-
nuus Macu-
larum.



Rima obseruationū Romanarum Tabula, est etiā, bona utiq. fortuna, prima positionis atq. Ordinis, ita ut hac primo quoq. cum alijs fuisset loco statuenda, etiamsi aliæ in obseruando præcessissent, propterea quod hoc mense & tempore (ut suo loco dicitur) annuus Macularum motus initium finemq. suum faciat, alterq. polus axē Macularum deferens, semicirculi ascendentis quadrantem patentem ingrediatur, alter descendens latentē.

Vfus sum hoc mense vnico tantum ad obseruandum Telioscopio, quo olim vsus fuerat Christophorus Clavius, de re Mathematica absque vlla ambiguitate optimè meritis, è cuius librorum lectione, si quid in Mathematica scientia affecutus sum me plurima habuisse, & ansam atque stimulum alia inueniendi accepisse, haud inuitus confiteor.

Initium ob-
seruandi st-
ipium Telio-
scopio Cla-
uiano.

Circellum obseruatorium hoc mense huius anni 1624. adhibui, uti vides satis paruum c d e f, quem subsecutis mēsisbus æqualem feci circulis obseruatorijs maioribus & vbiq. eadem mensura retentis, augendo proportionaliter: ut videres, an & quomodo Macularum annua reuolutio eadem vel similis rediret, prout ex instituto monebo, tempore, & loco suo.

Accuratio
in obseruan-
do summa
adhibita.

Obseruationes incoepi 8. Decemb. more meo, idest tanta accuratone, quantam fortassis ab vilo mortalium exigere possis atque expectare, cuius rei tot appello testes, quot studij huiusce mei vbiq. Gentium & locorum habui spectatores, qui fuerunt propemodum innumeri: quod nō scribo, quia me magnificè circumspicio, vel am-

II.

bitiosè commendo; sed ut Lectori fidem, necessariam astruam, in re tam noua, tam exotica, tamq. paradoxa, & primo aspectu à sensu quoque peritorum non nihil abhorrente.

15

Igitur ab 8. ad 10. Decemb. vespertinū diem, nulla in Sole cōparuit, seu mihi in domo Professa, seu P. Grùenbergero in Collegio Romano Macula; die 10. sub vespere hora Italica 23. vidi vnā minimam dilutissimā circa medium, quam tamen in circulum obseruatorium non

20

traieci. Dies 11. fuit turbidus. 12. seren-
nus, sed à Maculis vacuus. 13. nebulo-
sus. 14. exhibuit Maculam a in paruo
circello, vel a in magno, tempore pome-
ridiano, quam etiam ante meridiem cō-

25

spexi, sed circulo obseruationis tum non
inclusi, sed primum post prandium. 15.
fuit obseruationi inhabilis cæli inclemen-
tia. 16. & 17. feci obseruationes annota-
tas. & visæ sunt Maculæ deficere. 18.

30

non fauit cælum. 19. aduerti duas mini-
mas Maculas b in minore, siue b in ma-
iore circulo, quas ipsas tamen non vidi
nisi in motu instrumenti, agitando nimi-
rum circulum obseruatorium, tam erant

35

paruæ & luce dilutæ: fuerunt autem eæ-
dem, quæ die 17. sese præsentauerant,
nisi quod geminatæ comparuerint, cum
ante sub vnus habitu incederent. Die
20. cælum obseruationi ineptum.

40

21. Ego & R. P. Ioannes Baptista Sta-
ferius tunc Mathematicus Neapolitanus
cælo serenissimo Solem curiosissimè lu-
stratum, ab omni macula purum, sed
plagis hinc inde illustrioribus, quas Facu-
las appello respersum in motu instrumen-
ti reperimus, quas tamen nō signauimus.

45

A die 21. ad 24. Decembris Sol sem-
per serenissimus alluxit, & studiosissimè
perlustratus Macularum nil penitus ex-
hibuit:

50

bb 3

Dies aliquot
Decembr. à
Maculis va-
cui.

Macula e-
uanida mo-
tu Teliosco-
pij fuit per-
spicibiles.

Mathema-
tico Neap.
ostensa Solis
facula, ma-
culis caren-
tis.

I.

hibuit. Quamobrem ne fortassis ob circelli obseruatorij paruitatem, ipsæ etiam Maculae circumstantis fulgoris amplitudine & vehementia absorptæ, aciem oculorum effugerent, capi 24. Decemb. qui fuit Natalis Domini Vigilia, tubos plures sub forma & circulo capaciore adhibere, Solemque multo exactissime excutere, in quo tamen licet serenissimo, usque ad 31. Decemb. nec Maculam ullam, neque alicuius momenti Faculam deprehendere erat integrum. E quibus satis liquet, hasce Maculas Solem non esse subingressas vel egressas motu locali, sed in eisdem hemisphærio patente natas & dissipatas.

December à die 21, ad 31. notantur in Roma, sed in Germania quoque à Maculis vacuus fuit.

Quod autem Sol non tantum hic Romæ, sed & in alijs orbis partibus hisce diebus purissimus extiterit, accipe luculentum ex Inferiore Germania testimonium. Nam P. Carolus Malaperfius nunc Mathematicus Duacensis inter suas obseruationes Duaci factas, & ad me anno 1625. 3. die April. transmissas hæc habet: Anno 1624. Decēb. 4. nihil deprehēsi. 19. nihil. vbi tamen ego ante meridiem sed in motu, non autē quiescente instrumento, duas exiles annotavi. post meridiem verò nihil penitus ex illis animaduerti potuit. & in hoc sensu & tempore omnino conuenimus. sed pergit ipse. 27. Decembr. Nihil. 30. Decembr. Nihil. Cum igitur idem auctor addat, anno eodem 21. & 23. Nouembris Solem à Maculis vacuum fuisse, probabile est, intermedijs etiam diebus nil extitisse, quod ego per obseruationes proprias,


II.

1 quas in itinere positus nullas feci, adstruere non possum.

December igitur huius anni ita sese habuit, & Macularum sterilis satis fuit, quarum ipsarum tamen iter rectilineum quodammodo, & ad Eclipticam ex Austro in Boream, obliquum neutiquam autem parallelum fuit, vti obseruationes intuenti patebit: & ex Tabulis Nouembris atque Decembris anni 1625. 10 & 1626. necnon Maij & Iunij eorundem amplius elucescet. redeunt enim cursus annui similes & veluti æquales; semestres autem subcontrariè æquantur vel similes fiunt, quemadmodum Phœnomeni constantissima apparentia, tot annorum curriculis sibi semper vniformis & consentanea, ipsaque ratio inde deducta, clarissime euincit: vt suis locis vberius dicetur: nunc autem ad initium obiter præmoneo, vt hæc lecturus & spectaturus, gustum aliquem, & fructum præcipias, conferendo anteriora cum posterioribus, & similia similibus applicando.

25 Nolo autem vt tibi persuadeas, me ex hisce Solis obseruationibus motum rectilineum velle euincere, cum enim & initio & fine careat iste cursus, & in circello paruo sit indagatus, non inde hanc consequentiam stabilio, sed quia eundem ex annis & obseruationibus antegressis certo cognitum, & in sequentibus stabiliendum habeo; idcirco sine vlla formidine hanc veritatem tanquam certam astruo.

Directiones itinerarie Macularum rectilineæ et ad Eclipticam ex Austro versus Boream obliquæ.



I. Imago, Obferuationum

Decemb: unica.

1624.

Anno Domini, 1624.

In Domo Professa Romana Societatis



Cursus Macularum, a 14. Decemb: ad 19. eiusdem.

A B, Ecliptica.

A, Oriens.

B, Occidens.

c d e f g, Circellus
minor, obferuatorius.

h i k l, Circulus ampliatus.

DECEMBRIS

D. — H. — O. El.

14. u. 21 $\frac{3}{4}$ — 22. 28.

16. m. 18 $\frac{4}{5}$ — 24. 30.

16. u. 21. — 21. 40.

17. m. 16 $\frac{4}{5}$ — 14. 30.

19. m. 17 $\frac{1}{2}$ — 17. 40.

N, Nadir.

Z, Zenith.

OBSERVA-

166 ROSAE VRSINAE LIB. III.
OBSERVATIONVM
Imagines Anni 1625. & Notæ in easdem.

I.

NOTAE IN OBSERVATIONVM
Imaginem II. quæ est 1. Ianuar. 1625.

Rimò. Exhibet hæc Imago Maculam insignē a, cum adiuncta parvula supernè per modum caudæ, adhærentem quidem, sed in motu omnino secretam.

Secundo, Hanc Maculam in Collegio quoq. Romano per varios tubos in chartam deduxit P. Christophorus Grünberger, & veritatem ipsius approbavit.

Tertio, Habuit hæc Macula per totum suum cûrsûm densum & nigrum nucleû, magis deorsum in austrum seu versus partes N. vergentem, totaq. Macula è duabus conflata videtur, quarum minor supernè in Boream seu Zenith respexit: tamen 5. die, perfectè circularis comparuit, in medio obscura, ad margines subalbida, qui rotundi sed non præcisi, sed molliter asperati apparebant; ab extremitatibus versus medium sensim obscuritas & densitas augescebat, tamen dierum præteritorum nigrorem non est affecuta. Sola etiam hoc 5. die in Sole fuit absq. vlla alia Macula vel Facula. Sequentibus diebus sensim longitudinem suam & nigredinem recepit, & die 7. itemq. 8. expressè duas distinctas Maculas in motu præbuit, quarû austrina maior, borealis minor extitit, & sic utraq. simul etiam ad exitum vsque duravit, ideoq. longius Maculæ corpus repræsentarunt, in medio versus centrum non nihil ventricosum, sed recta quasi linea, eaq. parallela ad Solis perimetrum.

Quarto, Circa nucleum suum hæc Macula nigrorem valde dilutum, & tenuem instar nebulæ, vaporis, fumi, seu habitus circumiectû habuit toto suo curriculo. Colores etiam varios ostendit, versus centiû cæruleos, & subalbidos, versus marginem autem è flauo in furrum declinantes.

Quinto, iter apparens confecit obliquû ad Eclipticam, & curvilineum, conuexum ergo centrum C, concavum versus N.

Sexto, Numeri 1. 2. 3. &c. Macularum figuris adscripti, denotant dies quibus eæ Maculæ sunt à me observatæ; litteræ verò m vel u, tempus observationis Matu-

zinum aut vespertinum. indicant; Horam verò, & Solis eleuationem reperies in Tabella diaria, cui libet Imagini inserta: in qua numeros dierum inuenies in serie sisterrima sub littera D, quæ significat diem mensis, qui vertici Tabellæ in scriptus est. è regione diei dextrorsus procedendo inuenies sub lineola hac —, vel m, vel u litteram, quæ indicat observationem illius diei esse peractam vel mane, id est ante meridiem, vel vespere, seu post meridiem; unde proximè versus dextram progrediendo, reperies sub H, numeros horarios astronomicos, more Germanorum à meridie ad mediam noctem, & hinc rursus ad meridiem numero duodenario comprehensas, vel integras, vel cum adiunctis fractionibus, prout praxis tulit.

Horarum seriem, mox ultimo dextrorsus excipit Solis eleuatio, in gradibus & minutis primis expressa, sub hisce signis ☉, El. quæ Solis supra horizontem Eleuationem seu Altitudinem indicant: in qua sola præcipuam vim & robur motus apparentis indagandi colloco: nam horas ideo tantum appono, ut ex illarum conspectis numeris possim aliquam temporum atque interuallorum diurnorum comparisonem instituere. Reieci autem horas ab occasu Italicas, quod illarum usus intricatus, difficilis, lubricus, varius a que apud Astronomos peregrinus, imo fallax esset, cum hic Romæ a Crepusculis potius, quam ab occasu numerent quo tempore cum refractionum negotium semper sit infestum; atque ex fallacibus horarum initijs vel semper errandum, vel hallucinatio esset immensis laboribus euitanda; malui planiores inire vias, ideoque horas Germanicas accepi, quod ea apud omnes ferè Europæ populos relinquantur, in consuetudine quotidiana versarentur, tum quod in Astronomicas facilimo negotio commutarentur. Etenim eæ quæ sunt à meridie ad mediam noctem, quas vespertinas appellamus, per se sunt Astronomicæ; si iam matutinis numeratis à media nocte videlicet vsque ad meridiem, adicias semper duodecim horas

Macula circulariter rotunda.

Color Maculæ aduentitius.

Curvitas crescit, polus austr. ascendit ab occasu in ortum.

Explicatur Lateralis sing. observ. adscriptus.

Clavis prima ad motum apparentem indagandû, Solis supra horizontem Eleuatio.

Horæ Italicae rebus Astronomicis parum idoneæ.

Horarum Germanicarum in Astronomicas commutatio

IMAGO SOLIS II.

247

I.

horas, conflata summa dabit continuo
horas Astronomicas.

Curriculi
huius cum
curriculo
anni 1626.
responsus.

Septimo, Maculae huius Cursus obser-
uatus est, Circulo Observatorio satis par-
uo: idèq. ampliatus est in magnum, ser-
vata locorum, magnitudinū, & situs pro-
portione. Similis est Cursui anni sequen-

II.

tis, quem fecit Macula c, à die 4. ad
15. videntur omnibus rite examinatis,
etiam temporibus æqualibus Solem per-
transiisse, in parallelo ad sensum eodem.
5 confer itinera, & videbis itinerum sym-
metrias.

II. Imago Observat^{us}.

Ianuarij. 1.


1625.

ANNO IVBILÆO, 1625.

In Domo Professa Romana Societatis



Cursus Macularum à 1. Ianuarij, ad 11^m eiusdem.



NOTAE IN TERTIAM

obseruationum Imaginem seu Tabulam, quæ
est 2. Ianuarij 1625. à die 7. ad 18 eiusdem.



I.

ANC quoq; Tabulam Tertiam, quæ est Ianuarij 2. proportionaliter auxi, vt Macularum figure, & cursum similitudines magis eluce-

scerent, & cum alijs annis præteritis, & futuris, possent conferri.

*Motus cur-
rior, dat
ehordarum
cum Eclipti-
ca sectione
obliquiore:
quæ utraq;
sunt in cre-
scendo.*

Primò, Macula igitur a, australis die 7. post meridiem signari cæpta, cursum descripsit qualem vides, curuiorem, quam priores, & ad Eclipticam magis obliquum si cogitemus per duo arcus itinerarij puncta, à centro C æqualiter vtrique versus ortum & occasum remota, qualia sūt in proposita figura, centrum Maculæ a, diei 11. matutinum, & diei decimi quarti similiter matutinum, si inquam per ista puncta recta linea cogitetur ducta, in infinitum, secabit ea Eclipticam, & faciet cum eadem angulum minorem, quam fecerant recte simili ratione in obseruationibus prioribus ductæ, prout suo loco & tempore ex professo ostendetur, & in serie succedentium obseruationum sæpe monebitur, nunc obiter tantum insinuo, vt ad mutationem obliquitatis maioris vel minoris, studiosus Lector etiam sensim attendere assuescat, nam semper alia atque alia subsequetur, quoadusque absoluta vna periodo, in idem redeatur. Sed de hac re consule Notas Generales, num. 37.

Secundò, Hæc Macula a, primo die longiuscula valde apparuit quia duplex fuit, prout in motu instrumenti apparuit, reliquis diebus cauda illa in Boream porrecta, non est visa vsque ad diem 13. quo toto, ante & post meridiem in diuersis obseruationibus quinis, ista appendix sæper apparuit; & separatim quidem, atque sine vilo instrumenti motu. reliquis deinde diebus non amplius comparuit. Eodem modo 10. die traxit eadem Macula

II.

1 post se vmbra tenuissimam, solo motu chartæ aspectabilem, sine vlla quasi figura & densitate; quæ tamen sensim ita sese collegit, vt tempore pomeridiano quietè aspici, & signari posset, facta nigrior & in duas sequentibus diebus conformata. Maculas dilutas, tum denuo imminui atque in vnam, demumq; in nihilum abire visa est die 14.

10 Macula subcinericia apparuit, in medio nigra & densa, albior & aspera versus extrema, semperque à primo apparitionis tempore, ad exitum vsque decreuit sensim & quasi proportionaliter.

15 Tertiò, Vice versa, Maculæ b, antediem 13. in Sole nullo modo (tamet si vigilantissimè, ad hanc rem semper intenderem,) sunt vel minimo indicio notatæ, & primo quidem die erant satis parua, raræ, tenues atque dilutæ luce Solaris, sequentibus autem mirum in modum creuerunt, & magnitudine, & densitate, atq; nigrore, ita vt crescendo Solem exiuerint. Sed & interuallis supra proportionem regularem auctas, vel illud euincit, quod interualla extremarum diei 15. æqualia fuerint interuallis diei 13. cum tamen illa debuissent imminui, si Maculæ eadem à centro C distantia, & celeritate æquali motuque vniiformi incessissent.

30 Quarto, Hæc Maculæ die 17. mane & vespere tam luculentas secum traxere Faculas, vt eæ etiam instrumento quieto, absque vilo motu, sine vlla difficultate, cerni potuerint. Quas cum Patres quidam Primarij Societatis nostræ summa cum admiratione, vt pote tãquam rem sibi nouam vidissent, vehementiùs mihi institerunt inchoata vti continuare, atq; ad finem perfectum deducere; neq; sinerem hanc præclaram sportulam in Societatis nostræ Agello enatam, ab alijs eripi, vel tam indignis modis tractari. Quorum virorum auctoritas apud me multum sanè valuit, & vt tam multum & tediosum, longumq; laborem faciliùs deuorarem, momentum

*Macula ex
Vmbra na-
scuntur. In
Vmbra re-
soluuntur.*

*Macula in
plaga occi-
dua nata;
augeant
spatium plus
quam mo-
tuum aqua-
lium ratio
patitur.*

*Facule abs-
que motu in
strumenti
visæ.*

*Facularum
spectaculū,
peperit au-
ctori calca-
ria ad pro-
sequendum
Phenome-
non.*

ma-

I.
magnum addidit.

Dies 19. totus pluuius, cursum Maculae a intercidit. Luxerunt hisce diebus & aliae Faculae atque Maculae, sed neque omnia in Tabulas vniuersas, neque singula vnius curriculi in vnum Iconismum digerere vel possum, vel intendo; sufficit summa & potissima tangere, vt inde reliqua colligi facile ab harum rerum stu-

II.
dio so possint.

Quintò, Omnium Macularum Cursus est curuilineus cōcauus in austrum, conuexus in Septentrionem: & directio seu tendentia tota adhuc obliqua ex austro in boream; polusque annuus austrinus axem Macularum deferens est in semicirculo ascendente patente; septentrionalis in descendente latente.

Maculae motus curuilineus cre scens ad Eclipticam obliquus ex Austro ortiuo in boream occiduam, polus austris

lis superior ascendens, arcticus inferior descendens.

III. Imago Obseruat.

ANNO IUBILAEI, 1625.


Ianuarij, 2.

In Domo Professa Romana Societatis.



Cursus Macularum à 7. Ianuarij, ad 18. eiusdem.

AZBN, Circulus ampliatus.



NOTAE IN QVARTAM

obseruationum Tabulam, Ianuarij tertiam

à die 13. ad 23. eiusdem.

*Magnorum
Circularum
in Sole dete-
gendo effica-
cia ostendi-
tur.*



P RIMO, Cum ani-
maduerterem au-
cto Circulo Solari
obseruatorio, etiam
ipsas Solis partes
magis explicatas,
res in Sole latentes
distinctius exhibe-

re, pederentim ad maiorem formam ac-
cessi, & semper plura reperi, quàm in fi-
guris minoribus, vti manifestum videre
est in hac obseruationum serie, quæ ijs-
dem etiam diebus Ingolstadij perfecta,
multo pauciora exhibet in Circulo mino-
re, quàm mea in maiore. Nam Ingolsta-
diani nihil habent de Macula d, neque
eam, quæ die 14. sequebatur paruulam
Maculam, neque Faculam inter easdem,
quæ non ex aliqua incuria, sed repræsen-
tationis defectu, non visa & omissa esse,
mihi certò constat. cum mihi tentanti in
minoribus circulis eadem eueniant, vt vi-
sa in magnis, delitescant in paruis. vnde
euidens est hoc Phænomenon è meris

*Paruuli
Circuli Ob-
seruatorij
ad huius
Phænomeni
tractationē
sunt insuffi-
cientes.*

*Macularū
summa in
maximis lo-
corum di-
stantijs con-
cinnitas.*

paruis ijsque pauculis aut interruptis cir-
culis obseruatorijs haustum, plenè, di-
gnè, & merè tractari non posse, sed po-
tius deteri & obscurari, quàm illustrari,
cum ipsum non illustre satis, sed obscurum
alluceat. &c. Quæ causâ Apellem quoq.
à motu Macularum penitus decernendo,
in tempora posteriora protrusit. Mirum
autem est, quòd cursus Maculæ a, vtrin-
que tam probè concinat, cum tamen tan-
ta locorum distantia intercesserit.

Secundò Macula a, australis die 13. tan-
tùm in vmbra & facula indicium sui præ-
buit, 14. geminata comparuit cum facula
media; 15. quadruplicata fuit, vti & In-
golstadiana; 16. septemgeminam vna ob-
seruatione habui, Ingolstadiana verò ob-
seruatio quinque tantum refert Maculas,
quia duarum postremarum quælibet con-
stabat è duabus paruulis, ob circelli obser-
uatorij paruitatem non satis distractis,
ideoque sub vna longiuscula visis; alia ve-

11. rò obseruatione hic non consignata, vidi
Maculas 12. cum tribus aut pluribus in-
termixtis faculis. 17. mane, vidi Maculas
& annotaui distinctas 12. mane, sed con-
fusionis vitandæ causâ, non apposui huc.
Ingolstadiana obseruatio exhibet sex, tan-
tum conflatas sine dubio è pluribus, par-
uitate tamen circuli nimis coniunctas, vt
discerni nequirent. sed coniunctim velut
vnę viderentur. Die 18. coelum vapidum
Romæ, tres tantum ostendit Maculas,
duas tantum ob eandem causâ Ingol-
stadij. vbi 19. die iterum 3. visæ; hic Ro-
mæ ob inclementiam cœli nihil. Dies 20.
nubilus vtrinque, Romæ tamen per inter-
uallum serenum Maculam simplicem
præbuit. Dies 21. dedit Solem serenissi-
mum, sed Maculam a rursus simplicem, &
nouas b & c dedit, omnes oblongas no-
tato situ. Maculæ c hoc solo die apparue-
re. b exorta est 19. visæque Ingolsta-
dij, & vltra triduum non durasse videtur.
35 Tertiò Macula a cum Faculis exorta
est, & cum Faculis occubuit: itemque
solito crassior fuit, & post se vestigium
paruulæ Maculæ traxit. Reliqui dies tem-
pestate aspectum Maculæ dispulerunt, ip-
sa verò in statu augmentationis suæ occu-
buisse videtur.

45 Quarto Die 16. 17. & 18. eandem Ma-
culam a ampliatam signaui solo centro
nigro, & circumducta punctim perime-
tro, ne fieret commixtio cum Maculis
minoris circuli. id quod frequenter etiam
alibi factitatum à me aduerter, & semel
pro semper dictum esto. Sed & die 16.
mane; 17. mane; 21. mane; 22. mane,
50 & vesperi, illam designatam habebis solo
puncto illius centrali, reliquum ipsius
paruarum Macularum comitatum insta-
bilem, à die 15. ad 18. exhibet ipsamet
55 Imago.

Quinto Maculæ d, quattuor minimæ,
sed vegetæ, boreales, die 16. in Sole
enata, post 17. nullum sui vestigium fe-
cerunt reliquum.

Sesto

IMAGO SOLIS IV.

171

*Directio itin-
neraria ad-
huc curua-
tur, & ex
austro in Se-
ptentr. tēdit;
axe & polo*

I.
Sexto, Iter Macularum adhuc semper
magis curuescit, & chordarum ad axem
rectarum cum Ecliptica sectiones conti-
nenter fiunt obliquiores, angulique in-

II.
ter chordas & Eclipticam intercepti mi-
nores. Age chordā per stationem diei 15.
& per stationem matutinam diei 21. &
experieris quod dico, esse verum.

*apparēte au-
strali, ex oc-
casu eluctā-
te versus o-
rieriē, in se-
micirculo a-
scendente.*

IV. Imago Obseruat^{us}.


ANNO IUBILAEI, 1625.

In Domo Professa Romana Societatis

Ianuarij, 3.



Curfus Macularum à 13, Ianuarij ad 23, eiusdem, similis In-
golstadiano anni eiusde, in tabula sequenti expresso.



IANVARII.

D	H	O.	E.	D	H	O.	E.
13. u.	3.	—	13. 50.	18. m.	10.	—	21. 25.
14. m.	10.	—	20. 0.	20. u.	2 $\frac{3}{4}$	—	16. 30.
14. u.	3 $\frac{1}{2}$	—	11. 0.	21. m.	9 $\frac{1}{2}$	—	18. 30.
15. u.	3.	—	14. 0.	21. u.	4 $\frac{1}{8}$	—	5. 25.
16. m.	10 $\frac{1}{8}$	—	22. 30.	22. m.	11.	—	27. 5.
16. u.	2 $\frac{5}{8}$	—	15. 0.	22. u.	2 $\frac{3}{4}$	—	16. 30.
17. m.	9 $\frac{5}{8}$	—	19. 55.	23. m.	9 $\frac{3}{4}$	—	21. 30.
17. u.	4 $\frac{1}{8}$	—	5. 25.				

CC NOTAE

ROSÆ VRSINAE LIB. III. NOTAE IN QUINTAM Observationum Imaginem.

I.



*Ingolstadii
Rosæ Vrsinae
Natale solis.*

PRIMO, Hæc est prima Imago quam consarcinaui ex observationibus Ingolstadianis huius anni ad me transmissis; & meritò ex alienis ad me transmissis observationibus & inter meas coordinandis, primas honoris do illi loco, quia Ingolstadij primum hæc *Rosæ Vrsina* coelitus seminata radices egit, enutrita est à me in arca mea, multis annis, primumque fronduit, & nunc Romæ tandem amplissime efflorescit.

Videbis in hac ordinem & cursum Macularum a, & b, & c, atque d.

Secundò, Maculam a, cum suis affeculis iam potissimum prosecutus sum, Tabula mea priore, ubi videre licet & itinerum æqualem similitudinem, & Maculæ ipsius figuram similem, atque magnitudinem æqualem, & sociarum comitatum eundem, quas ob vitandam confusionem in Circulum ampliatum neutribi transtuli. Quod si in dierum numero aut figurarum præcisione, minutiarum accurata perceptione, hic aliqua desideraueris quæ in observatis meis Romanis reperies, tribues id minutis Circulis observatorijs, qui tantum in representando à maioribus deficiunt potentia, quantum magnitudine.

Tertio, Macula b, offert portionem ultimam vestigij itinerarij Maculæ a, in Tabula tertia designati; confer & inuenies admirandam harmoniam; ego certè iucundissime ista sic digesta intueor, cum neque in meis, neque in istis ad me transmissis, quidquam immutarim. sed veritas fideliter tractata, sibi semper & ubique est similis.

*Observatio-
nū collatarū
responsus.*

Quartò, Qui verò has Ingolstadij hor-
tatu meo observavit, & ad me transmisit
est P. Georgius Schönberger, meus olim
in Mathematicis discipulus & nunc in.

II.

Friburgensi Vniuersitate itidem meus in
disciplinis ijsdem Successor, cuius sedula
in observando industria, mihi iam dudum
& sæpius probata, apud me in hisce quo-
que observationibus nō parum fuit com-
mendata: Quamobrem cum tanta sit i-
psius cum meis, & meorum cum ipsius
conformitas, in ore duorum stabit utique
& hoc apud alios verbum: nam ego hæc
aliena non ideo adduco, quod vel diffi-
dam de meis, vel ipsis satis inesse roboris
ad veritatem promendam & stabiliendam,
non putem: sed ut aliorum, qui id à me
petiuerunt, iudicio satisfaciam. Cum
enim plurimi sint, qui observationum
vim, & argumentorum Mathematico-
rum subtilitatem minus penetrent, sem-
perque sibi ab imposturis & fallacijs timeant
prudentum hortatu aliorum longè peti-
tas afferro curas; quas si cum meis con-
cordare senserint, inanem timorem falla-
cemque suspicionem ponent: & quod so-
lidis rationibus denegauerūt, veraci con-
testatæque auctoritati, haud inuiti con-
cedent. Etenim in ea promenda fidelissi-
mum me fuisse, testabuntur ipsa auto-
grapha quæ ego in omnem euentum re-
tentæ, ratione exigente, demonstrare va-
leo & volo.

*Aliorum au-
thoritas ex
aliena diffi-
dencia accer-
situr.*

Quintò, Duæ Maculæ diei decimiquar-
ti in tertia Imagine b, in hac quinta c,
sibi met viciniores erāt, quàm die sequen-
te 15. quod bene notandum est.

Sextò, Macula d, exhorta est in ipso
Sole, & primum visa die 19. nam 18. nec-
dum erat, & Romæ ultimò visa, die 21. ad
litteram b, postea interijt, in ipso Sole.

Calculus harum observationum ad me
transmissus, cum meo exponendi modo,
vel parum vel nihil dissentiebat.

Hasce verò observationes Circulo par-
uo inclusas auxi proportionaliter, ut mo-
tuum similitudo magis elucesceret.

V. Imago Obseruat.^{us}.ANNO MDCXXV.
In Collegio Academico Ingolstadt: Socie:^{is}

Ianuarij. 4.

Cursus Macularum, a 14. ad 20. Ianuarij similis
Romano, anni eiusdem.

A. Oriens.

AB. Ecliptica.

B. Occidens.

abcd. Circellus
obseruatorius.

AZBN. Circulus ampliatus.

IANVARII.

D — H — Scrup.

14.	u.	12.	54.
15.	u.	2.	23.
16.	m.	10.	0.
17.	m.	10.	30.
18.	m.	10.	30.
19.	m.	10.	26.
20.	u.	1.	43.

N

cc 2

NOTAE



NOTAE IN SEXTAM

& Septimam Observationum Imaginem
constat seipsis in Cupro; venien-
dum igitur ad VIII.



Observationum Imago VI. et VII. à die 26. Ian: ad 7. Feb.

Notæ in hanc VI. et VII. Imaginem

1. Non amplius eas, quod ipsæmet satis bene res exhiberent.
2. Posui ambas eisdem cursus et dies complexas, ut appareret quam bene idem præstarent utraque, et una alteram (id quod per totam Imaginum seriem præstare possem si necesse foret) solidissime confirmaret.
- Rursus hinc videbis quanto plus et accuratius præsentent circuli Maiores minoribus, si hasce observationum Imagines conferas cum Ingolstadiana et Dnacenfi sequentibus. etc.
4. Quattuor inuenias cursus in imagine utraq; Macularum a, b, c, d, quæ licet diuersis horis et circulis sint obseruata atq; consignata similes et proportionales motus descri-

Observationum Imago VII.

M. DC. XXV.

6 Ianuarij
2 Februarij


In Domo Professæ Romæ Societ.



Ianuarij

D. H. O. E. L. D. H. O. E. L.

26. m. 9 $\frac{7}{8}$ - 21. 25.	29. m. 9 $\frac{1}{2}$ - 21. 10.
27. m. 9 $\frac{7}{8}$ - 18. 20.	29. u. 3 $\frac{1}{2}$ - 11. 0.
27. u. 3 $\frac{1}{2}$ - 15. 20.	31. m. 9 $\frac{1}{2}$ - 21. 30.
28. m. 9 $\frac{7}{8}$ - 10. 10.	31. u. 3 $\frac{1}{2}$ - 10. 40.
28. u. 3 $\frac{1}{2}$ - 16. 0.	



AB, Ecliptica.

A. Oriens.

Februarij.

B. Occidens.

D. H. O. E. L.

1. m. 9 $\frac{1}{2}$ - 21. 0.	
2. u. 1 $\frac{3}{4}$ - 29. 0.	
3. m. 9 - 17. 0.	
4. m. 9 $\frac{1}{3}$ - 19. 30.	
5. m. 9 $\frac{2}{3}$ - 20. 0.	
6. m. 9 $\frac{1}{2}$ - 19. 40.	

N

5. Ianuarij
1^a. Februarij

Z

1625

Obser: Imago VI.

In domo Professæ Romæ Societ.




Ianuarij

D. H. O. E. L. D. H. O. E. L.

26. m. 10 $\frac{1}{2}$ - 26. 45.	29. m. 9 $\frac{7}{8}$ - 22. 10.
27. m. 10 $\frac{1}{2}$ - 28. 0.	31. m. 9 $\frac{1}{2}$ - 22. 25.
28. m. 10 $\frac{1}{2}$ - 25. 0.	31. u. 4 - 9. 45.

Cursus Macularum a 26. Ianuarij. ad 7^m. Februarij.

A. Oriens.



B. Occidens.

Februarij.

D. H. O. E. L. D. H. O. E. L.

1. m. 9 $\frac{3}{4}$ - 22. 30.	4. u. 3 $\frac{1}{2}$ - 15. 0.
1. u. 4 - 8. 40.	5. m. 10 $\frac{7}{8}$ - 30. 0.
2. u. 1 $\frac{3}{4}$ - 25. 15.	6. m. 10 $\frac{7}{8}$ - 27. 30.
3. m. 10 $\frac{7}{8}$ - 26. 20.	7. m. 10 $\frac{7}{8}$ - 29. 10.

N

perierunt, prout consideranti patebit, et tabula VIII manifestius elucescet.

5. Macula a sensim decreuit post medium; b permansit in eodem fere statu; ambæ fuere nucleis facundæ. c euamit ante finem; d circa medium: b in ortu horizontem quodammodo attingit; circa ingressum fuere aliquæ faculosæ, præsertim c, die 29. in quarum facularum locum circa medium successerunt nouæ Maculæ, et rursus ad finem in faculas abiisse videntur. consule Imagi sequentes
6. Observationibus dierum 26, 28, 29, interfuit R. P. Grubenberger, et illustres faculas ex instituto una mecum est contemplatus. nec defuere spectatores alij.
7. Incessit Macula b, sub ☉ ultra dies duodecim.

ROSÆ VRSINAE LIB. III.
IN IMAGINEM OBSERVA-
tionum VIII. Ianuarij septimam, & tertiam
Febr. Notæ; à die 26. illius, ad 7. huius.

I.



PRIMO Hæc est prima sub huius Circuli magnitudine; non tamen tota. nam dies Ianuarij obseruati sunt adhuc sub Circulo Imaginis VII, quas proinde obseruationes huc proportionaliter transtuli. Februarij autem sub huius Circuli magnitudine sunt ex ipso Sole immediatè traducti. vnde

Secundò, Constat apta & magnitudinum & positionum, & itinerum inter se proportio ad sensum, haud aliter, quàm si vno eodemque circulo continuata, non autem è diuerlis confarcinata fuisset obseruationum Circulis: ex quo obseruationum probitas elucet.

Tertiò, Præterea constat mutua obseruationum Ingolstadianarum, Duacantium, nec non Romanarum concordia. quod si parua discrepantia illorum à meis alicubi interuenit, ne mireris, cum in tam laboriosis obseruandi modis, Sole semper fugiente, circa eandem Maculam semper ad vnguem conuenire. Aliquid ergo ignoscendum tam multum inter se distantibus obseruatoribus, si quandoque in tot obseruationibus & Maculis pauxillo discrepent, in re adeo lubrica, & tam exiguis ad obseruandum circellis ad lapsum procliui: præsertim si quis vnam ex instituto (vt ipsi sæpius) reliquas obiter, infestetur.

Quartò, Patet quomodo curuitas itinerum, atque inclinatio chordarum ad Eclipticam semper crescit.

Quintò, Quomodo Macula a, post

II.

1 29. Ianuarij Eclipticam ascendendo, & rursus post diem 4. Februarij eandem descendendo secavit: Et sic austro borealis fuit.

5 Sextò, Quomodo eandem Eclipticam Macula b aliquot diebus quodammodo rasit: & huius Maculæ iter seu vestigiū ad iter Maculæ a, in medio appropinquauit: & ab eadem magis abfuit circa ingressum quàm circa exitum. quod bene est notandum.

15 Septimò, Quomodo Macula C australis cum Facula ingressa est Solem, die 27. & rursus circa exitum die 6. Februarij ad partes easdem Faculas multò luculentiores exhibuit, cum ipsa penitus ferme consumpta fuisset, nec ad finem occidentis deinde pertingeret.

20 Octauo, Quomodo gracilitas Macularum seu longitudo apparens, quæ ex positione & situ acquiritur, sese ordinariè accommodat secundum flexum & fluxum, quem præferunt circuli paralleli, ex centro C per centra Macularum incedentes: nisi quandoque ipsa corpulentia Maculæ alio excurrens obstat: quæ tamen nihilominus circa horizontem prævalente situs decliuitate, & Macularum tenuitate, frè semper corrigitur. Exemplum habes in ipsa Macula b, quæ 2. 3. 4. & 5. die, longitudine suæ natia præualuit; alijs autem diebus horizonti viciniore, secundum situm quasi parallelum eidem sese accommodauit. 35 hæc res in Maculis rotundioribus est semper certa & stabilis.

Macula eadem, cursu eodem australis & boreales fiunt, ad Eclipticam accedunt & ab eadem recedunt.

Macularum incessus inter se non paralleli.

Gracilitas Macularum rotundarum semper fit secundum circulos ex centro Solis descriptos, ita vt gracilitatis diameter iaceat in chorda, arcus illorum circularum subtendente Non rotunda id præstant suo modulo.

Humanitati, quandoque ex incuria nonnihil negligenti ignoscendum in hac difficillima indagatu materia.

Curuitas & inclinatio crescit.



VIII. Imago Obser-
uationum.

Anno Iubilæo. M.DCXXV.

In Domo Professa Romana Societatis

Ianuarij. 7.

Februarij. 3.




Curfus Macularum à 26. Ianuarij. ad 7. Februarij. similis
Ingolstadiano et Duacensi.

A. Oriens.

A B. Ecliptica ~

B. Occidens.



NOTAE IN NONAM

obseruationum Imaginem, Ianuarij octauam,

& 4. Febr. à die 26. illius ad 7. huius.



I
PRIMO, Obseruationes istae ad meam instantiam vt. ante insinuauimus, sunt factae Ingolstadij à P. Georgio Schönberger meo quondam in Mathemat-

tis, tunc autem quando ista ab illo petiui, aliorum in Theologis discipulo, quas tamen nihilominus ita iudicantibus Superioribus ad obsequium, & hunc usum meum, pro bono publico obseruatas mihi singillatim sub magnitudine circelli a b c d, transmisit, inducta in singulas obseruationes Ecliptica b d; ego igitur omnes in vnum circellum summa diligentia & fide redactas, ampliaui in Circulum E Z F N, meis obseruatorijs circulis aequalem, vt & magnitudinum, & situs, & figurarum, & itinerum similitudo atque aequalitas appareret; quod satis bene euenire intelliges, si Imagines inter sese, Maculasque primarias comparaueris. Nam quod ego ex hisce probare potissimum intendo, est motus apparentis similitudo in curuitate, vel rectitudine sensibili: minutiora ex hisce minutis circellis, exacte & praecise hauriri non debent; imo non possunt.

Secundò, Ob vitandos autem errores, Maculas ampliatas primarias A & B, signaui solis centrīs nigris, circumsepiendo eadem continuis punctulis perimetrum & figuram Maculae apparentem exprimentibus, ipsis autem Maculis adiunxi characteres Alphabeticos maiores.

Tertiò, Placet autem ex Ephemeridibus P. Schönbergeri quaedam verbatim subiungere. Sic ergo ait: 29. Ianuarij, Macula notari potuerunt, quas secuta sunt instar umbræ ferè, lucidiores; partim vt

II.

10 Facula, partim umbris similiore. Et ad 5. Februarij. Mac. 4. à 31. Ian. vsque ad hunc diem, nulla habita obseruatio propter nubes & pluuias, Ad 6. Febr. Maculae 3. tantum vix, & post tertiam secuta sunt 4. Faculae, sicut & in ortu, quarum tamen 15 Facularum locus accurate designari non potuit. Hæc ille: vbi vides, quantum à meis obseruationibus, Circulorum obseruatoriorum paruitate, superetur. Plenior 20 rem igitur numerum Macularum & Facularum, sed & figuram situmque cum magnitudine proportionali inuenies in obseruationibus meis, Tabula VI. praesertim, ad Mac. d & c; itemque Imaginem priorem.

25 Faculam G in ampliato, g in paruo Circulo boream hic ad 6. Febr. diem annotatam, reperiēs in mea XII. Obseruationum Imagine ad diem eundem, loco & proportionem meis obseruatis competente, vt videas summam in tantis locorum interuallis harmoniam huius Phænomeni reperiri; praesertim cum accuratam designationem se tunc accepisse Ingolstadij, neget obseruator. Nihilominus 35 tamen, conicias hinc Faculas eodem vt Maculas videri diuersis in locis modo, neque aspectus diuersitatem pati. Cur autem Facularum praecius & distinctus intuitus sit difficilis, ratio est, similitudo lucis Solaris Faculas circumstantis, & earundem in praelucendo plerumque debilitas, maleque praecisa extremitas, quæ reliquæ luci sensim sine notabili differentia commiscetur.

40 Quartò, Vt loca istarum obseruationum centralia intacta reliqui, ita figurarum conformationi de meis frequenter aliquid addidi. Quod te latere nolui. 50 Meas autem figuras pro iustis secure amplecteris.

*Facula
vt Macula
moventur,
neque aspectus
diuersitatem
patiuntur.*



IX. Observationum

Imago.

M.DC.XXV.

Ianuarij. 8.

Februarij. 4.


In Collegio Academico Ingolstadiano Societatis.



Cursus Macularum à 27 Ianuarij, ad 6 Februarij, similis
Duacensi et Romano.

abcd, Circelli, obseruatorius.

ENFZ, Circulus ampliatus.



E, Oriens

Ianuarij.

Februarij.

F, Occidens.

D. H. —

D. H. —

27. u. 12. 56.

5. m. 8. 40.

29. m. 11. 54.

6. m. 8. 45.

31. u. 12. 43.

EF, Ecliptica.

178 ROSAE VRSINAE LIB. III.
NOTAE IN NONAM
obseruationum Imaginem, Ianuarij octauam,
& 4. Febr. à die 26. illius ad 7. huius.



PRIMO, Obseruationes istae ad meam instantiam vt. ante insinuauit, sunt factae Ingolstadij à P. Georgio Schönberger meo quondam in Mathematicis, tunc autem quando ista ab illo petiui, aliorum in Theologis discipulo, quas tamen nihilominus ita iudicantibus Superioribus ad obsequium, & hunc usum meum, pro bono publico obseruatas mihi singillatim sub magnitudine circelli a b c d, transmisit, inducta in singulas obseruationes Ecliptica b d; ego igitur omnes in vnum circellum summa diligentia & fide redactas, ampliaui in Circulum E Z F N, meis obseruatorijs circulis aequalem, vt & magnitudinum, & situs, & figurarum, & itinerum similitudo atque aequalitas appareret; quod satis bene euenire intelliges, si Imagines inter sese, Maculasque primarias comparaueris. Nam quod ego ex hisce probare potissimum intendo, est motus apparentis similitudo in curuitate, vel rectitudine sensibili: minutiora ex hisce minutis circellis, exacte & praecise hauriri non debent; imo non possunt.

Secundò, Ob vitandos autem errores, Maculas ampliatas primarias A & B, signaui solis centris nigris, circumsepiendo eadem continuis punctulis perimetrum & figuram Maculae apparentem exprimentibus, ipsis autem Maculis adiunxi characteres Alphabeticos maiores.

Tertiò, Placet autem ex Ephemeridibus P. Schönbergeri quaedam verbatim subiungere. Sic ergo ait: 29. Ianuarij, Macula notari potuerunt, quas secuta sunt instar umbræ ferè, lucidiores; partim vt

II.
10 Facula, partim umbris similiores. Et ad 5. Februarij. Mac. 4. à 31. Ian. vsque ad hunc diem, nulla habita obseruatio propter nubes & pluuias, Ad 6. Febr. Maculae 3. tantum visa, & post tertiam secuta sunt 4.
15 Faculae, sicut & in ortu, quarum tamen Facularum locus accurate designari non potuit. Hæc ille: vbi vides, quantum à meis obseruationibus, Circulorum obseruatoriorum paruitate, superetur. Plenior igitur numerum Macularum & Facularum, sed & figuram situmque cum magnitudine proportionali inuenies in obseruationibus meis, Tabula VI. praesertim, ad Mac. d & c; itemque Imagine priore.
25 Faculam G in ampliato, g in paruo Circulo boream hic ad 6. Febr. diem annotatam, reperiens in mea XII. Obseruationum Imagine ad diem eundem, loco & proportionem meis obseruatis competente, vt videas summam in tantis locorum intervallis harmoniam huius Phœnomeni reperiri; praesertim cum accuratam designationem se tunc accepisse Ingolstadij, neget obseruator. Nihilominus
35 tamen, conicias hinc Faculas eodem vt Maculas videri diuersis in locis modo, neque aspectus diuersitatem pati. Cur autem Facularum praecius & distinctus intuitus sit difficilis, ratio est, similitudo lucis Solaris Faculas circumstantis, & earundem in praelucendo plerumque debilitas, maleque praecisa extremitas, quæ reliquæ luci sensim sine notabili differentia commiscetur.
40
45

Quartò, Vt loca istarum obseruationum centralia intacta reliqui, ita figurarum conformationi de meis frequenter aliquid addidi. Quod te latere nolui. Meas autem figuras pro iustis secure amplecteris.

*Facula
vt Macula
mouentur,
neque aspectus
diuersitatem
patiuntur.*



IX. Observationum

Imago.

M.DC.XXV.

Ianuarij, 8.

Februarij, 4.


In Collegio Academico Ingolstadiano Societatis.



Cursus Macularum à 27 Ianuarij, ad 6 Februarij, similis
Duacensi et Romano

abcd, Circelli, obseruatorius.

ENFZ, Circulus ampliatus.



E, Oriens

Ianuarij.

Februarij.

F, Occidens.

D. H. —

D. H. —

27. u. 12. 56.

5. m. 8. 40.

29. m. 11. 54.

6. m. 8. 45.

31. u. 12. 43.

EF, Ecliptica.

NOTAE

observationum Imaginem, Ianuarij octauam,

& 4. Febr. à die 26. illius ad 7. huius.



I
PRIMO, Observationes istae ad meam instantiam ut ante insinuavi, sunt factae Ingolstadij à P. Georgio Schönberger meo quondam in Mathemat-

tis, tunc autem quando ista ab illo petiui, aliorum in Theologis discipulo, quas tamen nihilominus ita iudicantibus Superioribus ad obsequium, & hunc usum meum, pro bono publico observatas mihi singillatim sub magnitudine circelli a b c d, transmisit, inducta in singulas observationes Ecliptica b d; ego igitur omnes in vnum circellum summa diligentia & fide redactas, ampliaui in Circulum E Z F N, meis observatorijs circulis aequalem, ut & magnitudinum, & situs, & figurarum, & itinerum similitudo atque aequalitas appareret; quod satis bene evenire intelliges, si Imagines inter sese, Maculasque primarias comparaveris. Nam quod ego ex hisce probare potissimum intendo, est motus apparentis similitudo in curvitate, vel rectitudine sensibili: minutiora ex hisce minutis circellis, exacte & praecise hauriri non debent; imo non possunt.

Secundò, Ob vitandos autem errores, Maculas ampliatas primarias A & B, signavi solis centrīs nigris, circumsepiendo eadem continuis punctulis perimetrum & figuram Maculae apparentem exprimentibus, ipsis autem Maculis adiunxi characteres Alphabeticos maiores.

Tertiò, Placet autem ex Ephemeridibus P. Schönbergeri quaedam verbatim subiungere. Sic ergo ait: 29. Ianuarij, Maculae notari potuerunt, quas secuta sunt instar umbræ ferè, lucidiores; partim ut

II.

10 Faculae, partim umbris similiores. Et ad 5. Februarij. Mac. 4. à 31. Ian. usque ad hunc diem, nulla habita observatio propter nubes & pluvias, Ad 6. Febr. Maculae 3. tantum vix, & post tertiam secuta sunt 4. Faculae, sicut & in ortu, quarum tamen Facularum locus accurate designari non potuit. Hæc ille: ubi vides, quantum à meis observationibus, Circulorum observatoriorum parvitate, superetur. Plenior igitur numerum Macularum & Facularum, sed & figuram situmque cum magnitudine proportionali inuenies in observationibus meis, Tabula VI. praesertim, ad Mac. d & c; itemque Imagine priore.

25 Faculam G in ampliato, g in paruo Circulo boream hic ad 6. Febr. diem annotatam, reperies in mea XII. Observationum Imagine ad diem eundem, loco & proportionem meis observatis competente, ut videas summam in tantis locorum intervallis harmoniam huius Phœnomeni reperiri; praesertim cum accuratam designationem se tunc accepisse Ingolstadij, neget observator. Nihilominus 35 tamen, conicias hinc Faculas eodem ut Maculas videri diversis in locis modo, neque aspectus diversitatem pati. Cur autem Facularum praecius & distinctus intuitus sit difficilis, ratio est, similitudo lucis Solaris Faculas circumstantis, & earundem in prælucendo plerumque debilitas, maleque praecisa extremitas, quæ reliquæ luci sensim sine notabili differentia commiscetur.

40 Quartò, Ut loca istarum observationum centralia intacta reliqui, ita figurarum conformationi de meis frequenter aliquid addidi. Quod te latere nolui. 50 Meas autem figuras pro iustis secure amplecteris.

*Facula
ut Macula
moventur,
neque aspectus
diversitatem
patiuntur.*



IX. Observationum

M.DC.XXV.

Ianuarij, 8.

Imago.

Februarij, 4.


In Collegio Academico Ingolstadiano Societatis.



Cursus Macularum à 27. Ianuarij, ad 6. Februarij, similis
Duacensi et Romano.

abcd, Circellj, obseruatorius.

ENFZ, Circulus ampliatus.



E, Oriens

Ianuarij.

Februarij.

F, Occidens.

D. H. —

D. H. —

27. u. 12. 56.

5. m. 8. 40.

29. m. 11. 54.

6. m. 8. 45.

31. u. 12. 43.

EF, Ecliptica.

NOTAE IN DECIMAM

obseruationum Imaginem, Ianuarij nonam,

& quintam Februarij, à 26. illius,

ad 7. huius.

I.



RIM O, Pater Carolus Malaperfius Societatis nostrae, olim postquam Apellem meum euulgaueram, Ingolstadio in Poloniam transiens, à me Macularum aspectum, & obseruandi modum vna cum consignando perpendiculo sibi Soli ex singulari amicitia cōcreditum didicit, deinde rursus illac transiens à meo discipulo P. Ioanne Baptista Cylato à me eadem pridem edocto, Eclipticae imponendae rationem eadem cautela, atque fide qua illi olim tradideram, accepit igitur ipse, vicem grati animi in me repensurus, aliquas Duaci à se factas obseruationes mihi Romam rogatus transmisit; quas ego maximo labore in ordinem vnumque circulum a b c d, fidelissimè digestas tibi propono, vt & beneficium ipsius grato officio compensem, & veritati fidem, Phœnomenoque apud eos qui auctoritate quam ratione plus mouentur, maius pondus addam, si tot & tam luculentis aliorum consentientibus studijs stabiliatur.

Maculas autem sub stellæ, circelli, trianguli, & quadrati figura expressi, vt confusionem euitarem. Tum diebus obseruationum numeros subscripsi, prout ipse mihi misit; nam diei 28. & 31. Ian-

10

uarij, hora non erat addita; diei 2. & 5. Februarij, decrat eleuatio Solis; nil igitur immutauit, sed vt accepi, ita fideliter alijs communicauit.

15

Secundò, Scribit autem ad me idem Pater 3. Aprilis 1625. se semper in aliquo Macularum cumulo vnam præcipuam ex instituto intēdere, qualis in adiecto schemate fuerit apud ipsum Macula A, de qua ad diem 31. sic ait. *Pars Maculae infer-*

20

nè tangebatur ipsum centrum. idem eodem die obseruatum, cum esset altitudo pomeri-

25

diana gr. 6. Ex quo colligas reuera partem illam fuisse iuxta ipsum centrum. hæc ipse. Aitque Duacenam loci longitudinem esse 24. & latitudinem 50. 30. circiter. Ego igitur meo expositas modo, inueni situ & ordine quo offero, & admiror tantam cum meis & Ingolstadianis congruentiam. Posuit autem ipse sola Macularum centra, inde & ego in proportionatas formas, illas nolui diducere: quanquam si voluissem, per meas potuissem.

30

Tertiò, Rursus hinc videas ab arcu itinerario huius Maculae A bis esse transitam Eclipticam, quemadmodum & Romæ & Ingolstadij accidisse vides.

35

Quartò, Maculam hanc, vt & reliquas nullam habuisse parallaxim ex hisce trium locorum tam distantium obseruationibus palam est.

40

45

Macula parallaxi carent.



X. Observationum
Imago.


M.DC.XXV.
Duaci, in Collegio Societatis

Ianuarij, 9.
Februarij, 5.



Cursus Macularum, à 26. Ianuarij, ad 7. Februarij, similis
Romano et Ingolstadiano, anni eiusdem.

abcd, Circulus observatorius Duacens.



Ianuarij.

D. H. O. Eleu.

26. u. 2 $\frac{1}{2}$ — 14. 0.

28. u. — 10. 0.

31. u. — 6. 0.

Februarij.

D. H. O. Eleu.

2. u. 12 $\frac{1}{2}$

3. u. 2 — 18. 0.

5. u. 1. —

6. m. 11. — 24. 0.

7. u. — 10. 0.

EFZN, Circulus ampliatus.

E, Oriens, F, Occidens; EF, Ecliptica.

180 ROSAE VRSINAE LIB. III.
 NOTAE IN DECIMAM
 obseruationum Imaginem, Ianuarij nonam,
 & quintam Februarij, à 26. illius,
 ad 7. huius.

I.



PRIMO, Pater Carolus Malaperfius Societatis nostrae, olim postquam Apellem meum euulgaueram, Ingolstadio in Poloniam transiens, à me Macularum aspectum, & obseruandi modum vna cum consignando perpendiculo sibi Soli ex singulari amicitia cōcreditum didicit, deinde rursus illac transiens à meo discipulo P. Ioanne Baptista Cylato à me eadem pridem edocto, Eclipticae imponendae rationem eadem cautela, atque fide qua illi olim tradideram, accepit igitur ipse, vicem grati animi in me repensurus, aliquas Duaci à se factas obseruationes mihi Romam rogatus transmisit; quas ego maximo labore in ordinem vnumque circulum a b c d, fidelissimè digestas tibi propono, vt & beneficium ipsius grato officio compensem, & veritati fidem, Phœnomenoque apud eos qui auctoritate quam ratione plus mouentur, maius pondus addam, si tot & tam luculentis aliorum consentientibus studijs stabiliatur.

Maculas autem sub stellæ, circelli, trianguli, & quadrati figura expressi, vt confusionem euitarem. Tum diebus obseruationum numeros subscripsi, prout ipse mihi misit; nam diei 28. & 31. Ia-

II.

10 nuarij, hora non erat addita; diei 2. & 5. Februarij, deerat eleuatio Solis; nil igitur immutauit, sed vt accepi, ita fideliter alijs communicauit.

15 Secundo, Scribit autem ad me idem Pater 3. Aprilis 1625. se semper in aliquo Macularum cumulo vnam præcipuam ex instituto intēdere, qualis in adiecto schemate fuerit apud ipsum Macula A, de qua ad diem 31. sic ait. *Pars Maculae inferne tangebatur ipsum centrum. idem eodem die obseruatum, cum esset altitudo pomeridiana gr. 6. Ex quo colligas reuera partem illam fuisse iuxta ipsum centrum.* hæc ipse. Atque Duacenam loci longitudinem esse 24. & latitudinem 50. 30. circiter. Ego igitur meo expositas modo, inueni situ & ordine quo offero, & admiror tantam cum meis & Ingolstadianis congruentiam. Posuit autem ipse sola Macularum centra, inde & ego in proportionatas formas, illas nolui diducere: quanquam si voluissem, per meas potuissem.

35 Tertiò, Rursus hinc videas ab arcu itinerario huius Maculae A bis esse transitam Eclipticam, quemadmodum & Romæ & Ingolstadij accidisse vides.

40 Quarto, Maculam hanc, vt & reliquas nullam habuisse parallaxim ex hisce trium locorum tam distantium obseruationibus palam est.

Macula parallaxi carent.



X. Observationum
Imago.


M.DC.XXV.
Duaci, in Collegio Societatis

Ianuarij, 9.
Februarij, 5.



Cursus Macularum, à 26. Ianuarij, ad 7. Februarij, similis
Romano et Ingolstadiano, anni eiusdem.

abcd, Circulus observatorius Duacens.



Notæ in XI. Obseruationum Imaginem Febr.
6. à die 1. ad 13. eiusdem.

*Curuitas ar-
cus, & chor-
darū ad E-
clipticam o-
bliquitas
crescit.*



I.

R I M O , Motus
apparens semper
adhuc & sensim
curuescit, & chor-
dæ arcui itinerario
per puncta à Cen-
tro C, æqualiter
remota subtenfæ,

Eclipticam A B, semper obliquius secant.

Secundò, Hæc Macula a, Eclipticam
circa diem 6. coepit transcendere, & 7, 8,
atque 9. supra ipsam in plaga boreali in-
cessit; die 10. rursus eandem transiuit in
partes australes, semperque magis ab ea-
dem recessit.

Tertiò, Circa ortum & exitum Facu-
lam post se traxit australe. Sic circa me-
dium nacta est Maculam borealem, reti-
nuitq. per dies aliquot, in exitu loco eius
Faculam ostendit.

Quartò, Die 10. ante se monstrauit no-
uas duas Maculas, semet quasi tangentes
vna cum multo minutarum circumiacen-
tium comitatu (quas consultò omisi) il-
lasque duas ad exitum vsque semper præ-
misit, prout ex iconismo cernere licet.

*Macula cir-
ca horizon-
tem mutuo
congressu se
se apparen-
ter intendit*

*Intervalla
Macularū
ampliata.*

*Mora sub
Sole ultra
dies 13.*

Quintò, Duæ istæ antecedentes sensim
coierunt, atq. hinc euenit, vt sub exitum
densiores & crassiores apparerent, quàm
Macula sequens. Præterea, quod notan-
dum singulariter, die 10. minus erat inter-
uallum inter illas, quàm 12. vt intuenti
patet; & ego inter obseruandum ad hanc
rem ex industria attendi. Hæc apparentia
est satis frequens, imo ordinaria.

Sexto, Incessus Maculæ a sub Sole à
die 1. vsque ad 13. fuit dierum completo-
rum duodecim; quod si spatium orientale
atque occidentale inter Maculam & ho-
rizontem consideres, efficiet illud plùs
quàm diem, igitur certum est hanc Ma-
culam sub Sole ultra dies 13. incessisse.
Similis & æqualis est cursui Maculæ a, in
Imag. 58. expresso, anno 1626. à 2. Febr.
ad 14. quem consulas licet.

Septimo, Attende etiam spatium luci-
dum inter duas Maculas a, die 12. inter-

II.

1 iectum, die 13. inter easdem vespere in-
terpositū, dimidio ferè minus apparuisse.

Octauo, Macula occidentalissima 13.
vesperi horizontem ita rasit, vt ab eo nisi
5 confusissima atq. subtilissima albicante
lineola, idq. extra motum, discerni non
posset. & hæsit hac ratione horizonti per
duas horas, prout sæpe ante hanc obserua-
tionem eandem lustraui.

*Multis ho-
ris ad hori-
zontem hæ-
ret.*

10 Nono, Lineolæ ex a in Maculas por-
rectæ, indicant quæ Maculæ ad anteme-
ridianum, quæ ad pomeridianum tem-
pus spectent.

Decimo, Comitua Macularum parua-
15 rum die 10. apparentium, ad finem atq;
exitum non peruenit.

Vndecimò, Hisce à me Romæ obser-
uatis & circa nouarū Macularum die 10.
exortum, atque sequentibus diebus di-
20 scessum annotatis, consentiunt etiam ob-
seruationes Ingolstadianæ, in XVIII. ob-
seruationum Tabula allatæ, in quibus per-
lustres velim primam Tabellâ lateralem,
vbi harum earundem Macularum sub lit-
25 tera a, cursus atque recessus à se maiores
post diē decimum inuenies, sicut in meis.
Nam die 12. & multo amplius 11. Macu-
læ magis inter se dissidebāt quàm 10. imo
11. quoque die Maculas paruas australes
30 & boreas annotatas habes cuiusmodi in
designationibus meis sese prodiderant
die 10. vt mirum sit in tantillo obseruatio-
nis circulo illa animaduerti potuisse. Cæ-
terum ambos obseruatores in re eadem,
35 tanto locorum interuallo, circulis obser-
uatorijs tam differentibus, proportiona-
liter annotanda rectè operatos esse, pro-
bat continua sequentium obseruationum
experientia, & tenor Phænomeni perpe-
40 tuus, secundum quem recens enatas Ma-
culas, semper à se digredi supra expecta-
tionem videbis.

Duodecimò, Hinc rursus maximum
desumitur argumentum, pro nulla huius
45 Phænomeni ad Solem parallaxi, seu aspe-
ctus diuersitate.

*Nulla pa-
rallaxis im-
hoc Phæno-
meno.*

IMAGO SOLIS XII

1194

XI. Observationu₃

ROMÆ

Februarij.

Imago.

ANNO IUBILÆO. M.DC.XXV.

Sexta.


In domo Professa Societatis



Cursus Maculae à primo Februarij, ad 13 eiusdem.

AB, Ecliptica: A Oriens Macularum, B Occidens; Z, Zenith; N, Nadir.

Similis est Ingolstadiano, in Tabella Lateralis 1^a expresso.



FEBRVARII

D—H—O.Ele.

D—H—O.Ele.

1.—4. u. — 8. 40.
2.—1 $\frac{2}{5}$ u. — 26. 20.
3.—10. m. — 24. 30.
4.—9 $\frac{5}{8}$ m. — 24. 10.
5.—9 $\frac{7}{8}$ m. — 24. 40.
6.—10. m. — 25. 30.

7.—10 $\frac{1}{8}$ m. — 26. 30.
8.—10 $\frac{1}{2}$ m. — 29. 40.
8.—3 $\frac{3}{4}$ u. — 14. 30.
10.—10 $\frac{2}{3}$ m. — 30. 20.
12.—3 $\frac{1}{8}$ u. — 20. 25.
13.—10 $\frac{5}{8}$ m. — 31. 10.
13.—3 $\frac{4}{5}$ u. — 13. 40.

dd

Notæ

Notæ in XI. Obseruationum Imaginem Febr.
6. à die 1. ad 13. eiusdem.

*Curuitas ar-
cus, & chor-
darū ad E-
clipticam o-
bliquitas
crescit.*



I.

R I M O , Motus
apparens semper
adhuc & sensim
curuescit, & chor-
dæ arcui itinerario
per puncta à Cen-
tro C, æqualiter
remota subtenſæ,

Eclipticam A B, semper obliquius secant.

Secundò, Hæc Macula a, Eclipticam
circa diem 6. coepit transcendere, & 7, 8,
atque 9. supra ipsam in plaga boreali in-
cessit; die 10. rursus eandem transiit in
partes australes, semperque magis ab ea-
dem recessit.

Tertiò, Circa ortum & exitum Facu-
lam post se traxit australe. Sic circa me-
dium noctis est Maculam borealem, reti-
nuitque per dies aliquot, in exitu loco eius
Faculam ostendit.

Quartò, Die 10. ante se monstrauit no-
uas duas Maculas, semet quasi tangentes
vna cum multo minutarum circumiacen-
tium comitatu (quas consulo omisi) il-
lasque duas ad exitum vsque semper præ-
misit, prout ex iconismo cernere licet.

*Macula cir-
ca horizon-
tem mutuo
congressu se
se apparen-
ter intendit*

*Interualla
Macularum
ampliata.*

*Mora sub
Sole ultra
dies 13.*

Quintò, Duæ istæ antecedentes sensim
coierunt, atque hinc euenit, ut sub exitum
densiores & crassiores apparerent, quam
Macula sequens. Præterea, quod notan-
dum singulariter, die 10. minus erat inter-
uallum inter illas, quam 12. vti intuenti
patet; & ego inter obseruandum ad hanc
rem ex industria attendi. Hæc apparentia
est satis frequens, imo ordinaria.

Sextò, Incessus Maculæ a sub Sole à
die 1. vsque ad 13. fuit dierum completo-
rum duodecim; quod si spatium orientale
atque occidentale inter Maculam & ho-
rizontem consideres, efficiet illud plus
quam diem, igitur certum est hanc Ma-
culam sub Sole ultra dies 13. incessisse.
Similis & æqualis est cursui Maculæ a, in
Imag. 58. expresso, anno 1626. à 2. Febr.
ad 14. quem consulas licet.

Septimo, Attende etiam spatium luci-
dum inter duas Maculas a, die 12. inter-

II.

1 iectum, die 13. inter easdem vespere in-
terpositū, dimidio ferè minus apparuisse.

5 Octauo, Macula occidentalissima 13.
vesperi horizontem ita rasit, ut ab eo nisi
confusissima atque subtilissima albicante
lineola, idque extra motum, discerni non
posset. & hæsit hac ratione horizonti per
duas horas, prout sæpe ante hanc obserua-
tionem eandem lustraui.

*Multis bo-
ris ad hori-
zontem ha-
ret.*

10 Nono, Lineolæ ex a in Maculas por-
rectæ, indicant quæ Maculæ ad anteme-
ridianum, quæ ad pomeridianum tem-
pus spectent.

15 Decimo, Comitua Macularum parua-
rum die 10. apparentium, ad finem atque
exitum non peruenit.

Vndecimò, Hisce à me Romæ obser-
uatis & circa nouarū Macularum die 10.
exortum, atque sequentibus diebus di-
fcessum annotatis, consentiunt etiam ob-
20 seruationes Ingolstadianæ, in XV III. ob-
seruationum Tabula allatæ, in quibus per-
lustres velim primam Tabellâ lateralem,
vbi harum earundem Macularum sub lit-
25 tera a, cursus atque recessus à se maiores
post diem decimum inuenies, sicut in meis.
Nam die 12. & multo amplius 11. Macu-
læ magis inter se dissidebāt quam 10. imo
11. quoque die Maculas paruas australes
30 & boreas annotatas habes cuiusmodi in
designationibus meis sese prodiderant
die 10. ut mirum sit in tantillo obseruatio-
nis circulo illa animaduerti potuisse. Cæ-
terum ambos obseruatores in re eadem,
35 tanto locorum interuallo, circulis obser-
uatorijs tam differentibus, proportiona-
liter annotanda rectè operatos esse, pro-
bat continua sequentium obseruationum
experientia, & tenor Phænomeni perpe-
40 tuus, secundum quem recens enatas Ma-
culas, semper à se digredi supra expecta-
tionem videbis.

Duodecimò, Hinc rursus maximum
desumitur argumentum, pro nulla huius
45 Phænomeni ad Solem parallaxi, seu aspe-
ctus diuersitate.

*Nulla pa-
rallaxis in
hoc Phæno-
meno.*

IMAGO SOLIS XII

194

XI. Observationu

ROMÆ

Februarij.

Imago.

ANNO IUBILÆO M.DC.XXV.

Sexta.


In domo Professa Societatis



Cursus Maculæ à primo Februarij, ad 13 eiusdem.

AB. Ecliptica: A Oriens Macularum, B Occidens; Z, Zenith; N, Nadir.

Similis est Ingolstadiano, in Tabella Lateralis 1^a expresso.



FEBRVARIJ

D_H_O.Ele.

D_H_O.Ele.

1.—4. u. — 8. 40.
2.—1 $\frac{2}{5}$ u. — 26. 20.
3.—10. m. — 24. 30.
4.—9 $\frac{5}{8}$ m. — 24. 10.
5.—9 $\frac{7}{8}$ m. — 24. 40.
6.—10. m. — 25. 30.

7.—10 $\frac{1}{8}$ m. — 26. 30.
8.—10 $\frac{1}{2}$ m. — 29. 40.
8.—3 $\frac{3}{4}$ u. — 14. 30.
10.—10 $\frac{2}{3}$ m. — 30. 20.
12.—3 $\frac{1}{8}$ u. — 20. 25.
13.—10 $\frac{5}{8}$ m. — 31. 10.
13.—3 $\frac{4}{5}$ u. — 13. 40.

dd

Notæ

Notæ in XII. Observationum Imaginem, Feb. 7.
à die 5. ad 23. eiusdem.



P RIMO, Habes hic integrum fere cursum Faculae a, cuius die 6. affusionem, etiam Ingolstadij notatam vides, Imaginem IX. fuit enim puræ, luculenta, & valde notabilis Facula, imo non vna, sed aliquot simul coniunctæ, figura & magnitudine designata. Audi quid scribat Observator Ingolstadianus.

Sexto, Februarij, b, 8. mat. scrupulis 45. Maculae tres tantum visæ, & post secundam ad exitum secutæ sunt quasi Faculae, sicut & in ortu; quarum tamen Facularum locus accuratè designari non potuit. Hæc ille. Loci congruentiam vides: figuram ex observatione mea habes: interim ipso facto comprobatum cernis, minores Circulos observatorios minus posse maioribus: ex hac enim causa, Faculae hæ accuratè non potuerunt notari. vnde nec accurata doctrina ex illis potest deduci.

Secundò, Die 9. mane exortus est cumulus congestus Macularum b, qui sequenti die sese paulatim explicauit in plures, & C nouam post se ad horizontem traxit, densam satis vt conspicuam, insedit eundem locum, quem pridie orientissima b, fuitq; longitudinis duplæ, sed ob confusionem non efformaui. Exortum harum die 9. vna cum luculentis Faculis d & e conspexere & approbauere multi graues Societatis nostræ Patres, Officijs, & doctrina conspicui.

Tertiò, Cursus Maculae b, in congerie primariæ, necdum est ad Eclipticam æqualiter recuruus, sed eidem in exitu vicinior quam in ortu, vt patet ex forma; ipsaq; Macula eandem ante & post centrum interfecit; durauitq; sub Sole vltra dies 13.

Quartò, Circa medium diduxerunt se, & ad exitum denuo coierunt, sed imminutæ, raræ & tenues, quanquam Maculae C, ob multitudinem sese mutuo

coniungentium satis densæ apparuerint.

Quintò, Macula d, cum Facula sua, à die 10. euauit, vsq; ad 18. vbi denuo vel ipsa vel alia huic similis loco cursui debito se stitit, sed ob Maculas hic non perfectè poni potuit. Similiter e exorta est pura Facula die 9. vbi etiam apparuerat d, & postea die 14. 15. 16. ostendit Maculam, rursusq; in Faculam cum tenui vmbra abiuit die 19.

Sextò, Macula F borea initio post se traxit per dies aliquot paruulam, postquam die 16. amissam ostentauit supernè nouam borealem, tandemq; die 22. ipsa cum omnibus in Faculam longam resoluta abiuit. Huius cursus vltra dies 12. non multum excessit, omnibus rite computatis.

Septimo, Maculae g die 16. primum in Sole exortæ, mirificè & numero & mole auctæ sunt per dies duos; 19. rursus imminutæ vtriusq; & 22. atq; 23. sub meris Faculis, atq; vmbreis tenuissimis Solem exiuerunt.

Hæc eadem etiam Ingolstadij pro suo modulo visa atq; animaduersa sunt, prout observationes docent. Vide Tabellam lateralem II. in observationum Imaginem XVIII.

Octauò, Quàm verò mirabiliter sese Macularum b, & c, cumulus auxerit, mole & numero, quàm circa horizontem, orientem & occidentalem coniunxerit, vt vna alteram ex parte contexerit; quàm in medio Sole sese disiunxerit vna ab alia, quàm multæ nouæ natæ, multæ denatæ sint; quantum deniq. omnes ad exitum defecerint in Faculas; exprimi vix potest. Attendi ad hæc varietates summo studio, sed ob circuli observatorii angustias, & Macularum mutuos concursus in locis iisdem, omnia & singula apponere non potuit.

Nono, Notandum bene, tametsi Macula c, in eodem sensibili parallelo sit delata in quo b; nihilominus interualla inter b, & c, æqualiter à centro remota non mansisse æqualia, sed occidentalia orientalibus fuisse maiora, ad quam rem

ex in

Circulorū
paruorum
observato-
riorū impo-
tentia ipso
facto proba-
tur.

Curuitas
motus fere
maxima &
obordarum
inclinatio
summa.

Macularū
b, & c, ad-
miranda va-
riatio.

IMAGO SOLIS XII.

185

I.
ex instituto diligentissime attendi. Macula occidentalissima est b, orientalis-
ma est e.
Decimo, Notandum in ære Maculas
nigriores & fortiores incisas esse, quam
oporteret, præsertim occidentales, quia
illic in defectu fuerunt: & non obstante
hoc disiunctæ manserunt.

Macule e-
nanide non
cœunt sed
disiunctæ
manent.

I.
Vndecimo, Ex istis cursibus patet, po-
lum annuum, australem patent em, & ar-
ctouum latentem, nondum quidem cul-
minare, sed medio valde vicinum esse,
quia itinera Macularum ad æquilibrium
festinant, & chordæ cum Ecliptica ferme
coincidunt, vel eidem æquidistant.

XII. Imago Obser-

uationum.

ROMÆ. M. DC. XXV.

In Domo Professa Romana Societatis

Februarij. 7.



Cursus Macularum et Facularum à 5. Februarij. ad 23. eiusdem.
similis Ingolstadiano. in Tabella II. expresso.



A. Oriens. B. Occidens.

AB. Ecliptica.

FEBRVARII.

D-H-O-EI.

5. m. 10 $\frac{5}{8}$ - 29. 0.

6. m. 10 $\frac{3}{4}$ - 29. 40.

7. u. 3 $\frac{2}{3}$ - 16. 40.

8. m. 11 $\frac{1}{5}$ - 31. 40.

9. m. 10 $\frac{3}{4}$ - 14. 30.

9. u. 3 $\frac{2}{3}$ - 13. 10.

10. m. 11. - 31. 40.

11. u. 12 $\frac{2}{3}$ - 33. 0.

12. u. 3 $\frac{1}{8}$ - 20. 25.

D-H-O-EI.

13. m. 9 $\frac{3}{8}$ - 23. 0.

13. u. 3 $\frac{1}{2}$ - 17. 40.

14. m. 10. - 27. 30.

15. m. 9 $\frac{1}{2}$ - 19. 30.

15. u. 3 $\frac{3}{8}$ - 18. 0.

16. m. 10 $\frac{3}{4}$ - 30. 40.

17. m. 11 $\frac{1}{8}$ - 34. 50.

17. u. 4. - 13. 0.

18. m. 10 $\frac{3}{5}$ - 32. 0.

D-H-O-EI.

19. m. 10 $\frac{3}{5}$ - 33. 30.

19. u. 21. 0.

20. m. 11. - 35. 0.

20. u. 13. 0.

21. m. 35. 40.

22. m. 10 $\frac{1}{2}$ - 33. 30.

22. m. 34. 20.

23. u. 37.

Notæ in XII. Observationum Imaginem, Feb. 7.
à die 5. ad 23. eiusdem.



I. PRIMO, Habes hic integrum fere cursum Faculae a, cuius die 6. affusionem, etiam Ingolstadij notatam vides, Imagine IX. fuit enim pu-

ræ, luculenta, & valde notabilis Facula, imo non vna, sed aliquot simul coniunctæ, figura & magnitudine designata. Audi quid scribat Obseruator Ingolstadianus.

Sexto, Februarij, h, 8. mat. scrupulis 45. Maculae tres tantum vise, & post secundam ad exitum secutæ sunt quasi Faculae, sicut & in ortu; quarum tamen Facularum locus accuratè designari non potuit. Hæc ille. Loci congruentiam vides: figuram ex observatione mea habes: interim ipso facto comprobatum cernis, minores Circulos obseruatorios minus posse maioribus: ex hac enim causa, Faculae hæ accuratè non potuerunt notari. vnde nec accurata doctrina ex illis potest deduci.

Secundò, Die 9. mane exortus est cumulus congestus Macularum b, qui sequenti die sese paulatim explicauit in plures, & C nouam post se ad horizontem traxit, densam satis vt conspicuam, insedit eundem locum, quem pridie orientissima b, fuitq; longitudinis duplæ, sed ob confusionem non efformaui. Exortum harum die 9. vna cum luculentis Faculis d & e conspexere & approbauere multi graues Societatis nostræ Patres, Officijs, & doctrina conspicui.

Tertiò, Cursus Maculae b, in congerie primariæ, necdum est ad Eclipticam æqualiter recuruus, sed eidem in exitu vicinior quam in ortu, vt patet ex forma; ipsaq; Macula eandem ante & post centrum interfecit; durauitq; sub Sole vltra dies 13.

Quartò, Circa medium diduxerunt se, & ad exitum denuo coierunt, sed imminutæ, raræ & tenues, quanquam Maculae C, ob multitudinem sese mutuo

coniungentium satis densæ apparuerint.

Quintò, Macula d, cum Facula sua, à die 10. euauit, vsq; ad 18. vbi denuo vel ipsa vel alia huic similis loco cursui debito se stitit, sed ob Maculas hic non perfecte poni potuit. Similiter e exorta est pura Facula die 9. vbi etiam apparuerat d, & postea die 14. 15. 16. ostendit Maculam, rursusq; in Faculam cum tenui vmbra abiit die 19.

Sextò, Macula F borea initio post se traxit per dies aliquot paruulam, postquam die 16. amissam ostentauit supernè nouam borealem, tandemq; die 22. ipsa cum omnibus in Faculam longam resoluta abiit. Huius cursus vltra dies 12. non multum excessit, omnibus rite computatis.

Septimo, Maculae g die 16. primum in Sole exortæ, mirificè & numero & mole auctæ sunt per dies duos; 19. rursus imminutæ vtrisque; & 22. atq; 23. sub meris Faculis, atq; vmbreis tenuissimis Solem exiuerunt.

Hæc eadem etiam Ingolstadij pro suo modulo visa atq; animaduersa sunt, prout obseruationes docent. Vide Tabellam lateralem II. in obseruationum Imagine XVIII.

Octauò, Quàm verò mirabiliter sese Macularum b, & c, cumulus auxerit, mole & numero, quàm circa horizontem, orientem & occidentalem coniunxerit, vt vna alteram ex parte contexerit; quàm in medio Sole sese disiunxerit vna ab alia, quam multæ nouæ natæ, multæ denatæ sint; quantum deniq. omnes ad exitum defecerint in Faculas; exprimi vix potest. Attendi ad hæc varietates summo studio, sed ob circuli obseruatorij angustias, & Macularum mutuos concursus in locis iisdem, omnia & singula apponere non potuit.

Nono, Notandum bene, tametsi Macula c, in eodem sensibili parallelo sit delata in quo b; nihilominus interualla inter b, & c, æqualiter à centro remota non mansisse æqualia, sed occidentalia orientalibus fuisse maiora, ad quam rem

ex in

Circulari
paruorum
obseruatori-
orum impo-
tentia ipso
facto proba-
tur.

Curuitas
motus fere
maxima &
obordarum
inclinatio
summa.

Macularum
b, & c, ad-
miranda va-
riatio.

IMAGO SOLIS XII.

185

I.
ex instituto diligentissime attendi. Ma-
cula occidentalissima est b, orientalissi-
ma est e.
Decimo, Notandum in ære Maculas
nigriores & fortiores incisas esse, quam
oporteret, præsertim occidentales, quia
illic in defectu fuerunt: & non obstante
hoc disjunctæ manserunt.


Macula e-
nanida non
cœunt sed
disjunctæ
manent.

I.
Vndecimò, Ex istis cursibus patet, po-
lum annum, australem patent em, & ar-
ctouum latentem, nondum quidem cul-
minare, sed medio valde vicinum esse,
quia itinera Macularum ad æquilibrium
festinant, & chordæ cum Ecliptica ferme
coincidunt, vel eidem æquidistant.

XII. Imago Obser-
uationum.

ROMÆ. M. DC. XXV.
In Domo Professa Romana Societatis

Februarij. 7.



Cursus Macularum et Facularum à 5. Februarij. ad 23. eiusdem.
similis Ingolstadiano. in Tabella II. expresso.



A. Oriens. B. Occidens.
AB. Ecliptica.

FEBRVARII.

D-H-O-EI.

D-H-O-EI.

D-H-O-EI.

5. m. 10 $\frac{7}{8}$ - 29. 0.
6. m. 10 $\frac{3}{4}$ - 29. 40.
7. u. 3 $\frac{3}{4}$ - 16. 40.
8. m. 11 $\frac{1}{2}$ - 31. 40.
9. m. 10 $\frac{3}{4}$ - 14. 30.
9. u. 3 $\frac{3}{4}$ - 13. 10.
10. m. 11. - 31. 40.
11. u. 12 $\frac{2}{3}$ - 33. 0.
12. u. 3 $\frac{1}{8}$ - 20. 25.

13. m. 9 $\frac{3}{8}$ - 23. 0.
13. u. 3 $\frac{1}{2}$ - 17. 40.
14. m. 10. - 27. 30.
15. m. 9 $\frac{1}{2}$ - 19. 30.
15. u. 3 $\frac{3}{8}$ - 18. 0.
16. m. 10 $\frac{3}{4}$ - 30. 40.
17. m. 11 $\frac{1}{8}$ - 34. 50.
17. u. 4. - 13. 0.
18. m. 10 $\frac{3}{5}$ - 32. 0.

19. m. 10 $\frac{3}{5}$ - 33. 30.
19. u. - 21. 0.
20. m. 11. - 35. 0.
20. u. - 13. 0.
21. m. - 35. 40.
22. m. 10 $\frac{1}{2}$ - 33. 30.
22. m. - 34. 20.
23. u. - 37.

Notæ in XII. Observationum Imaginem, Feb. 7.
à die 5. ad 23. eiusdem.



P RIMO, Habes hic integrum fere cursum Faculae a, cuius die 6. affusionem, etiam Ingolstadij notatam vides, Imagine IX. fuit enim parva, luculenta, & valde notabilis Facula, imo non vna, sed aliquot simul coniunctæ, figura & magnitudine designata. Audi quid scribat Observator Ingolstadianus.

Sexto, Februarij, h, 8. mat. scrupulis 45. Maculae tres tantum visæ, & post secundam ad exitum secutæ sunt quasi Faculae, sicut & in ortu; quarum tamen Facularum locus accuratè designari non potuit. Hæc ille. Loci congruentiam vides: figuram ex observatione mea habes: interim ipso facto comprobatum cernis, minores Circulos observatorios minus posse maioribus: ex hac enim causa, Faculae hæ accuratè non potuerunt notari. vnde nec accurata doctrina ex illis potest deduci.

Secundò, Die 9. mane exortus est cumulus congestus Macularum b, qui sequenti die sese paulatim explicavit in plures, & C novam post se ad horizontem traxit, densam satis ut conspicuam, insedit eundem locum, quem pridie orientissima b, fuitq; longitudinis duplæ, sed ob confusionem non efformaui. Exortum harum die 9. vna cum luculentis Faculis d & e conspexere & approbauere multi graues Societatis nostræ Patres, Officijs, & doctrina conspicui.

Tertiò, Cursus Maculae b, in congerie primariæ, necdum est ad Eclipticam æqualiter recuruus, sed eidem in exitu vicinior quam in ortu, ut patet ex forma; ipsaq; Macula eandem ante & post centrum interfecit; duravitq; sub Sole ultra dies 13.

Quartò, Circa medium diduxerunt se, & ad exitum denuo coierunt, sed imminutæ, raræ & tenues, quanquam Maculae C, ob multitudinem sese mutuo

coniungentium satis densæ apparuerint.

Quintò, Macula d, cum Facula sua, à die 10. euauit, usq; ad 18. vbi denuo vel ipsa vel alia huic similis loco cursui debito se stitit, sed ob Maculas hic non perfecte poni potuit. Similiter e exorta est pura Facula die 9. vbi etiam apparuerat d, & postea die 14. 15. 16. ostendit Maculam, rursusq; in Faculam cum tenui umbra abiit die 19.

Sextò, Macula F borea initio post se traxit per dies aliquot paruulam, postquam die 16. amissam ostentauit supernè nouam borealem, tandemq; die 22. ipsa cum omnibus in Faculam longam resoluta abiit. Huius cursus ultra dies 12. non multum excessit, omnibus rite computatis.

Septimo, Maculae g die 16. primum in Sole exortæ, mirificè & numero & mole auctæ sunt per dies duos; 19. rursus imminutæ vtriusq; & 22. atq; 23. sub meris Faculis, atq; vmbris tenuissimis Solem exiuerunt.

Hæc eadem etiam Ingolstadij pro suo modulo visa atq; animaduersa sunt, prout observationes docent. Vide Tabellam lateralem II. in observationum Imagine XVIII.

Octauò, Quàm verò mirabiliter sese Macularum b, & c, cumulus auxerit, mole & numero, quàm circa horizontem, orientem & occidentalem coniunxerit, ut vna alteram ex parte contexerit; quàm in medio Sole sese disiunxerit vna ab alia, quàm multæ nouæ natæ, multæ denatæ sint; quantum deniq. omnes ad exitum defecerint in Faculas; exprimi vix potest. Attendi ad hæc varietates summo studio, sed ob circuli observatorii angustias, & Macularum mutuos concursus in locis iisdem, omnia & singula apponere non potuit.

Nono, Notandum bene, tametsi Macula c, in eodem sensibili parallelo sit delata in quo b; nihilominus interualla inter b, & c, æqualiter à centro remota non mansisse æqualia, sed occidentalia orientalibus fuisse maiora, ad quam rem

ex in

Circulorū
paruorum
observato-
riorū impo-
tentia ipso
facto proba-
tur.

Curuitas
motus fere
maxima &
obordarum
inclinatio
summa.

Macula ex
positione a-
spectus den-
santur.

Macularū
b, & c, ad-
miranda va-
riatio.

IMAGO SOLIS XII.

185

Macula e-
nanida non
coeunt sed
disiuncta
manent.

I.
ex instituto diligentissime attendi. Ma-
cula occidentalissima est b, orientissi-
ma est e.

Decimo, Notandum in ære Maculas
nigriores & fortiores incisas esse, quam
oportet, præsertim occidentales, quia
illic in defectu fuerunt: & non obstante
hoc disiuncta manserunt.

I.
Undecimo, Ex istis cursibus patet, po-
lum annum, australem patentem, & ar-
ctouum latentem, nondum quidem cul-
minare, sed medio valde vicinum esse,
quia itinera Macularum ad æquilibrium
festinant, & chordæ cum Ecliptica ferme
coincidunt, vel eidem æquidistant.

XII. Imago Obser-
uationum.

ROMÆ. M.DC.XXV.
In Domo Professa Romana Societatis

Februarij. 7.



Cursus Macularum et Facularum à 5. Februarij. ad 23. eiusdem.
similis Ingolstadiano. in Tabella II. expresso.



A. Oriens. B. Occidens.

AB. Ecliptica.

FEBRVARII.

D-H-O-EI.

5. m. 10 $\frac{5}{8}$ - 29. 0.
6. m. 10 $\frac{3}{4}$ - 29. 40.
7. u. 3 $\frac{2}{3}$ - 16. 40.
8. m. 11 $\frac{1}{5}$ - 31. 40.
9. m. 10 $\frac{3}{4}$ - 14. 30.
9. u. 3 $\frac{2}{3}$ - 13. 10.
10. m. 11. - 31. 40.
11. u. 12 $\frac{2}{3}$ - 33. 0.
12. u. 3 $\frac{1}{8}$ - 20. 25.

D-H-O-EI.

13. m. 9 $\frac{3}{8}$ - 23. 0.
13. u. 3 $\frac{1}{2}$ - 17. 40.
14. m. 10. - 27. 30.
15. m. 9 $\frac{1}{2}$ - 19. 30.
15. u. 3 $\frac{3}{8}$ - 18. 0.
16. m. 10 $\frac{3}{4}$ - 30. 40.
17. m. 11 $\frac{1}{6}$ - 34. 50.
17. u. 4. - 13. 0.
18. m. 10 $\frac{3}{5}$ - 32. 0.

D-H-O-EI.

19. m. 10 $\frac{3}{5}$ - 33. 30.
19. u. - 21. 0.
20. m. 11. - 35. 0.
20. u. - 13. 0.
21. m. - 35. 40.
22. m. 10 $\frac{1}{2}$ - 33. 30.
22. m. - 34. 20.
23. u. - 37.

Notæ in XIII. Observationum Imaginem, Febr. 8.
& 1. Martij, à 24. Februarij ad 9. Martij.

Aequilibrium Macularum Ver-

*Curuitas itinerum sūma; ebor-
darum incli-
natio nulla.
Polus patēs
altissimus,
latens bu-
millimus.*



I.

PRIMO, Cursus Macularum omnium, & Facularum videtur esse in æquilibrio ad

Eclipticam, stationes enim illarum à centro C æquè remotæ, etiam ab Ecliptica æqualiter absunt, chordæq. per æquè remotas stationes extentæ, ad Eclipticam apparent parallelæ.

Secundò, Macula a, australis mediocriter densa, sensim minor & rarior effecta, in duas diuisa, 4. Martij nouas acquisiuit; 5. die aspectum præ tenuitate elusit, reliquis diebus ad exitum vsq. vnà cum Faculis sequacibus sese tametsi agere stitit atq. in Margine Faculam sibi contiguam visendā reliquit. In suo per Solem decursu absupsit plures quàm 13. dies & à 14. non multum abfuisse, nec tamen omnino affecuta videtur. quas secum vbiq. traxerit Faculas, habes in schemate, tametsi non omnes semper annotauerim.

Tertiò, Macula b, borealis in Sole nata, sensim creuit, comitesq. plures successiue acquisitas, paulatim amisit, & in Faculas conuertisse videtur, cum quibus ipsa luculentissimo comitatu exiuit, quas Faculas vmbræ tenues seipere visæ sunt. Spacia diurna fecit proportionaliter quæadmodum Macula a. flexu tamen minus arcuato, (prout in omnibus cursibus est cernere, qui multum ad partes poli occultati procumbunt,) curriculum suum paucioribus diebus conclusit, quam eadem a, vt intuēti & dimidiata itinera inter sese comparanti, manifestum est, & spacia diurna orientalia sunt paullo maiora occidentalibus.

Quartò, Maculas c, triū dierum vitam non superasse certum est. Nam 25. è tenuibus & informibus vmbris sensim creuerunt vsque ad 26. & postea eodem modo pedetentim defecerunt, neq. vllò signo èt studiosissimè requisitæ, post 27. comparuerunt. spacia nihilominus alijs flexu similia decurrerunt. id quod omnibus om-

II.

nino Vmbris, Faculis, & Maculis, etiam vnus dimidij diei familiare est.

Quintò, Macula d, ex abrupto die 2. Martij magnæ apparuerunt, cum pridie in Sole curiosissimè perlustrato, minimè se prodidissent; vnde noctu generatas oportuit: sequens autem orientior, mox iterum decrescere cepit, prout die 4. minuta valde cum præuia Facula comparuit; ipsa autem occidentior in suo vigore permansit, & Faculam insignem circumcirca nata est, quæ similiter cum Maculis ad exitum vsq. motu eodem processit, prout in schemate apparet. distantia illarum die 3. eadem apparuit, quæ 2. cum tamen in motu vniformi, aliquāta arctior debuisset obuuisse.

Sexto, e, est composita luculentissima ex mutuis luculis & vmbris Facula, toto die 28. supra horizontem molliter enisa, extraq. ipsum neq. tenui quidem indicio animaduersa, (licet omni modo & conatu aliquid elicere diu, sed frustra elaborauerim,) 2. Martij eo, vbi designauit consistens loco, quæ etiam sequentibus diebus durauit, sed quia cū Macula b, coincideret, annotare supersedi.

Septimo, f, est Macula, correspondens Maculæ f, Ingolstadianæ in Tobella III. Laterali præsentatæ. Quam proinde consulas, & cum hisce conferas, omnia enim suo modo similia aspicias.

Octauo, Interim semper verum manet quod iam sæpe inculcaui, minores observationum circulos, ad hoc Phænomenon perfectè detegendum, & consequentias, atq. doctrinas solidas, foro Mathematico dignas, inde procudendas, sufficētes non esse; cō quod abstrusiores gazas Solis plerumq. malignè vel omnino non præsentent; id quod practico exemplo nunc iterum confirmat Ingolstadianus Obseruator, in III. Tabella Laterali, ad diem 7. Martij, cuius obseruationem hora matutina 10.49. institutam hisce notis ipse declarat. *Faculae duæ visæ*, (videlicet a, occidentalis, & g, orientalis) & *Macula 6. Facularum tamen magnitudo hic non designatur*. Quia videlicet in paruis circulis

*Speſtabilis
Facula.*

*Cursus dierum ferme
14.*

*Macularum
quarumque
Cursus etiā
mutili, sunt
integris si-
miles.*

XIII. Imago Obser-
uationum.

Anno Iubilæo. 1625.


In Domo Professa Romana Societatis

Februarij. 8.

Martij. 1.



Cursus Macularum à 24. Februarij. ad 9. Martij. similis
Ingolstadiano. Tabella III. expresso.



I.

Facula pu-
ra Roma &
Ingolstadij
observata.

lis rectè discerni nequeunt. quomodo au-
tem Faculae iste australes, in meo Obser-
vationis Circulo, & quali magnitudine
atq. figura, & quot insuper qualesq. sint
visæ, habes non tantum in parte austrina
sub litteris a, & h, ad diem 7. sed etiam
in parte boreali ad g, quæ omnes Faculae
cum fuerint purissimæ & lucidissimæ, per-
rexerunt in diem vsq. 9. quo purissima

II.

item, & luculentissima Facula i, affulsit
in plaga oriente australi, non procul ab h.
Nono, Tametsi Faculae circa horizon-
tem, nonnihil etiam soleant gracilescere,
tamen id neutiquam faciunt vt Maculae,
sed multo latiores manent; præterea situ
suo se non hoc modo ad horizontem ac-
commodant vt illæ, sed eundem varium
præferunt, & in ipso horizonte adhuc sa-

Facula non
ita gracile-
scit vt Ma-
cula.

dd 3 tis

I.

tis extente manent. habes exempla in Faculis a, b, d, & e, quæ omnes in horizontem iacuerunt.

*Facula horizon-
tem nunquam
excedunt: in
quo tamen
integros dies
hærent.*

Decimo, Faculæ quæcūq. hætenus per tot annos à me sunt aduersæ, etiam si iubare vehementi præpolleant, etiam si corpulentia lata & densa affulgeant; tamen perimetrum Solis luce sua nunquam excessere, in quo tamen, ut Maculæ diu

II

hære solent. Exemplum est in dictis Faculis.

Vndecimo, Sed & Maculæ Friburgenses, ex observationibus anni 1622. in Tabulas coniectæ, hisce similes ad Eclipticæ Macularum motus describunt; prout in Tabella IV. & V. Imaginis 18. non obscure insinuatur, vbi fragmenta motuum cernuntur.

Notæ in XIV Observationum Imaginem, Martij 2. à die 4. ad 21. eiusdem.

I.



PRIMO, Maculæ a, arctæ in Sole tenuibus vmbris, & Facula intermedia exordium suscipere die 4. vesperi, indeque & numero & magnitudi-

ne mirabiliter auctæ, densæ satis exiure. Considera diem 6. 7. & 8. & videbis in primis, quantum vnus ab altero differat, in situ & mutatione Macularum minus principalium &c. Deinde confer hosce dies cum Tabella laterali VII. Ingolstadiana in Imagine 18. & animaduertes ex vna parte incredibilem in motu & locis, addo etiam magnitudine consonantiam; ex altera tamen parte, cernes etiam, quantum Circulus meus maior antecedit illi minorem: nam auctor ille vbique tantum numerat Maculas binas, cum tamen ego die 6. numerarim 9. die 7. 10. die 8. tantum quattuor. die 11. sola ferme Macula a, in vnam è duabus conflata, conspecta est: die tamen 12. reliquarum vestigia satis tenuia se reddiderunt, quæ postea die 13. in Faculas conuersa luxerunt.

*Primi Macularum
exortus tenues,
arcti, confusi.*

Animaduersione dignum est, prout hætenus sæpe monui, quomodo hæ Maculæ a, primo sui exortu non tantum parue, colore remisso & tenues, verum etiam angusto spatio conclusæ apparuerunt die 4. vesperi, postmodum vehementer sese quotidie dilatauerunt, ita ut distantie illarum nunquam amplius circa exitum sese contraxerint ad æqualitatem distantiarum orientalium, etiam si inter Macu-

II.

las à centro C æquè remotas comparatio instituat. Comparo diem 10. cum 6. Confer 12. cum 4. imo 13. cum eodem 4. videbis semper intercapedines extremarum occiduarum esse maiores orientalibus; cum tamen deberent esse minores, eò quod illæ occasui viciniore sint, quam istæ ortui. Vnde vides Maculas in eodem parallelo latas, etiam si æquè remotæ à centro distare ponantur, æquales tamen apparentes distantias non seruare.

Secundò, Faculæ b, & c, etiam in Imagine priore sub alijs observationibus allatæ, ordinariæ cum Maculis tenere iter sicut semper. Vbi tamen nota positionem vtrarumq. die 7. esse paullo altiore debito versus Zenith, idèq. corrigendam ex priore. d, est Macula & Facula diei 9. nec ante, nec post visa. Facula c, etiam Ingolstadij visa est, eodem die, situ, loco, & magnitudine proportionali, quemadmodum & Macula a, prout dictum prius, & suis locis amplius declarabitur.

Tertiò, Macula e, die 9. cum Facula in horizonte exorta, & progressa, tandem numero & mole aucta, post medium sensim in Faculam desijt, præuijs Faculis g, ad diem 18. & 19. sicut easdem etiam præmisit in ortu, prout videre est die 9. hora matutina 10. in figura extra seriem itinerariam, itemq. die 10. & 12. in figuris lateralibus. Etiam Observator Ingolstadianus easdem Faculas temere digestas in suo paruo Circello ad diem 18. notauit: ut videre est in Tabula Laterali VII. Figuras autem illarum veras habes hic. Die vero 19. nihil omnino reperit Ingolstadianus

Macula in eodẽ parallelo difformiter mouentur.

XIV. Imago Observa-
tionum.

ANNO IUBILÆO. 1625.
In Domo Professa Romana Societatis

Martij, 2.



Cursus Macularum à 4. Martij, ad 21. eiusdem.



I. nus in Sole, & licet Maculae nullae fuerint, non tamen defuere insignes Faculae tam orientales quam occidentales hesternae, quarum illas loci penuria praetermitto, has vt cursus illarum protendatur, appono in diem vsq. 21. Et diem quidem 20. totum positum habes extra ordinem, sub litteris e & g. puto enim Faculam ad e enatam esse ex Macula; confer totam si-

guram diei 20. cum schemate diei 9. vespertino extra ordinem posito, & videbis satis magnam positionem similitudinem. partem autem huius diei 20. collocatam habes in semita itineraria. Diem verò 21. totum in ordine reliqui. Itaq; si cursum Maculae e rectè ponderes, inuenies ipsam etiam postquam in Faculam degenerauit, insumpsisse minimum in toto Solis transi-
tu dies

I.

tis extente manent. habes exempla in Faculis a, b, d, & e, quæ omnes in horizonte iacuerunt.

*Facula horizon-
tem solis nunquã
excedunt: in
quo tamen
integros dies
hærent.*

Decimò, Faculæ quæcunq. hætenus per tot annos à me sunt aduersæ, etiam si iubare vehementi præpolleant, etiam si corpulentia lata & densa affulgeant; tamen perimetrum Solis luce sua nūquam excessere, in quo tamen, vt Maculæ diu


II

hærere solent. Exemplum est in dictis Faculis.

Vndecimo, Sed & Maculæ Friburgenses, ex obseruationibus anni 1622. in Tabulas coniectæ, hisce similes ad Eclipticā Macularum motus describunt; prout in Tabella IV. & V. Imaginis 18. non obscure insinuatur, vbi fragmenta motuum cernuntur.

Notæ in XIV Obseruationum Imaginem, Martij 2. à die 4. ad 21. eiusdem.

I.



PRIMO, Maculæ a, arctoe in Sole tenuibus vmbris, & Facula intermedia exordium suscipere die 4. vespere, indeque & numero & magnitudine mirabiliter auctæ, densæ satis exiungere. Considera diem 6. 7. & 8. & videbis in primis, quantum vnus ab altero differat, in situ & mutatione Macularum minus principalium &c. Deinde confer hosce dies cum Tabella laterali VII. Ingolstadiana in Imagine 18. & animaduertes ex vna parte incredibilem in motu & locis, addo etiam magnitudine consonantiam; ex altera tamen parte, cernes etiam, quantum Circulus meus maior antecedit illū minorem: nam auctor ille vbique tantum numerat Maculas binas, cum tamen ego die 6. numerarim 9. die 7. 10. die 8. tantum quattuor. die 11. sola ferme Macula a, in vnam è duabus conflata, conspecta est: die tamen 12. reliquarum vestigia satis tenuia se reddiderunt, quæ postea die 13. in Faculas conuersa luxerunt.

*Primi Macularum
exortus tenues,
arcti, confusi.*

Animaduersione dignum est, prout hætenus sæpe monui, quomodo hæ Maculæ a, primo sui exortu non tantum parua, colore remisso & tenues, verū etiam angusto spatio conclusæ apparuerunt die 4. vespere, postmodum vehementer sese quotidie dilatauerunt, ita vt distantie illarum nunquam amplius circa exitum sese contraxerint ad æqualitatem distantiarum orientalium, etiam si inter Macu-

II.

las à centro C æquè remotas comparatio instituat. Comparadiem 10. cum 6. Confer 12. cum 4. imo 13. cum eodem 4. videbis semper intercapedines extremarum occiduarum esse maiores orientalibus; cum tamen deberent esse minores, eò quòd illæ occasui viciniore sint, quàm istæ ortui. Vnde vides Maculas in eodem parallelo latas, etiam si æquè remotæ à centro distare ponantur, æquales tamen apparentes distantias non seruare.

Secundò, Faculæ b, & c, etiam in Imagine priore sub alijs obseruationibus allatæ, ordinariū cum Maculis tenuere iter sicut semper. Vbi tamen nota positionē vtrarumq. die 7. esse paullo altiore debito versus Zenith, idòq. corrigendam ex priore. d, est Macula & Facula diei 9. nec ante, nec post visā. Facula c, etiam Ingolstadij visā est, eodem die, situ, loco, & magnitudine proportionali, quemadmodum & Macula a, prout dictum prius, & suis locis amplius declarabitur.

Tertiò, Macula e, die 9. cum Facula in horizonte exorta, & progressa, tandem numero & mole aucta, post medium sensim in Faculam desijt, præuijs Faculis g, ad diem 18. & 19. sicut easdem etiam præmisit in ortu, prout videre est die 9. hora matutina 10. in figura extra seriem itinerariam, itemq. die 10. & 12. in figuris lateralibus. Etiam Obseruator Ingolstadianus easdem Faculas temere digestas in suo paruo Circello ad diem 18. notauit: vt videre est in Tabula Laterali VII. Figuras autem illarum veras habes hic. Die vespere 10. 19. nihil omnino reperit Ingolstadianus

*Macula in
eodē paral-
lelo diffor-
miter mo-
uentur.*

XIV. Imago Observa-
tionum.

ANNO IUBILÆO. 1625.
In Domo Professæ Romanæ Societatis

Martij, 2.

Cursus Macularum à 4. Martij, ad 21. eiusdem.



I. nus in Sole, & licet Maculæ nullæ fuerint, non tamen defuere insignes Faculæ tam orientales quàm occidentales hesternæ, quarum illas loci penuria prætermitto, has vt cursus illarum protendatur, appono in diem vsq. 21. Et diem quidem 20. totum positum habes extra ordinem, sub litteris e & g. puto enim Faculam ad e enatam esse ex Macula; confer totam fi-

guram diei 20. cum schemate diei 9. vespertino extra ordinem posito, & videbis satis magnam positionem similitudinem. partem autem huius diei 20. collocatam habes in semita itineraria. Diem verò 21. totum in ordine reliqui. Itaq; si cursum Maculæ e rectè ponderes, inuenies ipsam etiam postquam in Faculam degenerauit, insumpsisse minimum in toto Solis transi-
tu dies

I.

tu dies 13. nam à die 9. ad 21. sunt dies 12. quibus si addatur spacium, vnus diei, sunt iam dies 13. & restat adhuc in ortu etiam bona particula. Ex quo euident est cursum Maculae c, longiorem esse cursu Maculae a, quæ à die 4. vespertino ad 13. vespertinum, compleuit dies 9. igitur si multum demus, spatia vtrinque in ortu & occasu residua exigent dies 3. longior igitur fuit cursus c, quam cursus a, vno die & amplius.

Mora Cursuum inaequales, eodem tempore.

Macularum & Facularum motus idem.

Macularum in eodem parallelo delatarum velocitas cursus apparentis diuersa.

Macularum ortus, & occasus Physicus in Sole.

Faculae per totum Solem ardent, vltra dies 13.

Ex eodem cursu Maculae c, liquet Maculas & Faculas eodem passu incedere.

Ex eodem Cursu vides, Macularum in eodem parallelo delatarum non esse celeritatem apparentem eandem, nam media inter illas Maculas c, die 12. deseruit orientalem die 13. & 14. longo vt apparet interuallo, & occidentalem boream, die 12. 13. & 14. sub Ecliptica incedentem tandem assecuta est, atq. 16. & 17. in tres diuisa longè antecessit; tandemq; in Faculas concessit, cum interim orientalis omnino periit. Hanc mediam Ingolstadianus omnino non animaduertit.

Quarto, Maculae f, austrinae, tenues & raræ, æquabilesq. die 9. in medio fere Sole prodierunt, post 12. euanuerunt penitissimè.

Quinto, Faculae g, Maculam e antegressæ, multæ & variæ amplexu tractu dilatatae fuerunt, & per totum Solem, vt ex numero, figura, situ colligitur, arserunt, dieq. 21. in horizonte occidentali vltimò fulserunt; vnde si

II.

interuallum diei 9. quo ab horizonte ortiuo abfuerunt consulamus, manifestum est, illas in Sole decurrendo plures quam dies 13. insumpsisse; Cum autem fuerint 5 meræ Faculae, constat rursus, Macularum & Facularum motus omnino eosdem esse, & æquales à centro Solis vtrarumque distantias.

Sexto, Motus omnium curuus, & in parte borea ad Eclipticam accedens, in australi ab eadem recedens, dum Maculae & Faculae in quadrante occidentali versantur.

Septimo, Inclinationi Motus Maculae c, ad Eclipticam non abfimilis est, quantum ex quattuor obseruationibus colligere licet, Motus Maculae a, in Tabella VI. anno 1623. ex obseruationibus Ingolstadianis designatus, quam consulas 20 velim.

Octauo, Directio, via siue tendentia Macularum & Facularum itineraria, est obliqua à Septentrione in Austrum flectens, & polus Antarcticus patens seu superior incipit versari in semirculo orientali descendente; Arcticus latens siue inferior, in occidentali ascendente; chordæq; ad axem perpendiculares omnes & singulae Eclipticam secant obliquè ex Septentrione orientali in occasum Meridionalem protense. Sed tam curuitas arcuum itinerariorum quam obliquitas sectionum incipit sensim imminui, angulus autem in Eclipticam & chordarum quamuis interceptus augeri.

Curuitas motus, & incidentia obliqua decrescit, augescit angulus, polus leuatus australis descendit, ascendit oppositus.

Notæ in XV. Obseruationum Imaginem, Martij 3. Aprilis 1. à die 20. illius, ad 6. huius.

I.



PRIMO Macula à borealis cum Faculis luculentis die 20. exorta, cum iisdem diu processit, tandemq; vna cum illis exiuit. Eadem

Macula in ortu gracilis, oblonga, & vna comparuit, sed sequenti die, & deinceps in duas explicata, circa medium mediam quoq; ostendit per dies aliquot, occasui propinquans, denuo sese in vnâ quadammodo, sed situ diuerso collegit, ita

II.

45 vt occidentalior circa occasum, fuerit iuxta ortum borealior. Spacium inter illas, tam in ortu, quam occasu absorptum non comparuit; sensim decreuerunt, minoresq; exiuerunt, quam intrarunt. Macula 50 intermedia, & ab vtriusq; separata die 25. 26. 27. in ortu apparuit vmbra seu apex versus austrum seu A, protensa. Occidens horizontem attigit: consumpsit in patente Solis hemisphærio paullo 55 plus quam dies duodecim, vti ex designa-

Macula spatium interiectum, & semetipsas occultant.

Tota sub Sole mora dies 12. non multum excedit.

XV. Imago Obseruati-

onum.

Anno IVBILÆO, 1625.

In Domo Professa Romana Societatis

Martij. 3.

Aprilis. 1.



Curfus Macularu, à 20. Martij, ad 6. Aprilis.
similis Ingolfadiano anni eiusdem, etc.



MARTIVS.

D H O.EI

20. m. 8 $\frac{4}{9}$ - 24. 30.21. m. 8 $\frac{5}{9}$ - 27. 0.22. m. 8 $\frac{1}{9}$ - 22. 40.22. m. 11 $\frac{1}{2}$ - 48. 10.

23. u. — 9. 30.

24. m. 7 $\frac{5}{6}$ - 20. 39.

24. u. 4 — 22. 0.

D H O.EI

25. u. 3 $\frac{4}{5}$ - 24. 25.26. m. 7 $\frac{1}{2}$ - 18. 20.27. u. 2 $\frac{4}{5}$ - 43. 30.28. u. 4 $\frac{1}{3}$ - 21. 0.29. u. 3 $\frac{1}{6}$ - 25. 40.30. u. 2 $\frac{4}{5}$ - 35. 30.31. u. 3 $\frac{2}{3}$ - 26. 30.

APRILIS.

D H O.EI

1. m. 10 $\frac{4}{9}$ - 46. 15.1. u. 3 $\frac{3}{5}$ - 27. 0.2. u. 4 $\frac{3}{4}$ - 17. 25.3. m. 7 $\frac{1}{8}$ - 15. 45.

3. m. 9 — 34. 30.

4. m. 8 $\frac{5}{9}$ - 31. 0.5. u. 2 $\frac{1}{3}$ - 43. 0.6. u. 2 $\frac{1}{4}$ - 43. 50.

I. gnatione manifestum est. Inter Faculas ortæ, cum iisdem occiderunt: quarum figuram, & situm ex schemate intelliges.

Secundo, Maculæ b, c, d, e, die 22. exoriri coeptæ, finierunt cursum circa 6. Aprilis, qui tamen dies non omnes hic fuere consignati, locorum penuria, & confusionis euitandæ causâ. Erant autem duo semet consequentes cumuli,

II. Maculæq; & vmbra, atq; Faculæ sat numerosæ, & conspicuæ, prout patet in figuris lateralibus ad diem 24. & 25. in ortu; nec non 3. 4. 5. & 6. in occasu circa Maculas c, & d, atq; f, quæ primatum in hac serie tenuerunt. Nam b, sensim in Faculam defecit. c, 22. Martij mane Solem intrauit, hora matutina 8 $\frac{1}{4}$. 4. Aprilis exiuit eundem hora vespertina 1 $\frac{5}{9}$

(quæ

I.

tu dies 13. nam à die 9. ad 21. sunt dies 12. quibus si addatur spacium, vnius diei, sunt iam dies 13. & restat adhuc in ortu etiam bona particula. Ex quo euident est cursum Maculae e, longiorem esse cursu Maculae a, quæ à die 4. vespertino ad 13. vespertinum, compleuit dies 9. igitur si multum demus, spatia vtrinque in ortu & occasu residua exigent dies 3. longior igitur fuit cursus e, quam cursus a, vno die & amplius.

Mora Cursuum inaequales, eodem tempore.

Macularum & Facularum motus idem.

Macularum in eodem parallelo delatarum velocitas cursus apparentis diuersa.

Macularum ortus, & occasus Physicus in Sole.

Faculae per totum Solem ardent, ultra dies 13.

Ex eodem cursu Maculae e, liquet Maculas & Faculas eodem passu incedere.

Ex eodem Cursu vides, Macularum in eodem parallelo delatarum non esse celeritatem apparentem eandem, nam media inter illas Maculas e, die 12. deseruit orientalem die 13. & 14. longo vt apparet interuallo, & occidentalem boream, die 12. 13. & 14. sub Ecliptica incedentem tandem assecuta est, atq. 16. & 17. in tres diuisa longè antecessit; tandemq; in Faculas concessit, cum interim orientalis omnino periit. Hanc mediam Ingolstadianus omnino non animaduertit.

Quarto, Maculae f, austrinae, tenues & raræ, æquabilesq. die 9. in medio fere Sole prodierunt, post 12. euauerunt penitissimè.

Quinto, Faculae g, Maculam e antegressæ, multæ & variæ amplexu tractu dilatatae fuerunt, & per totum Solem, vt ex numero, figura, situ colligitur, arserunt, dieq. 21. in horizonte occidentali vltimò fulserunt; vnde si

II.

interuallum diei 9. quo ab horizonte ortiuo abfuerunt consulamus, manifestum est, illas in Sole decurrendo plures quam dies 13. insumpsisse; Cum autem fuerint meræ Faculae, constat rursus, Macularum & Facularum motus omnino eosdem esse, & æquales à centro Solis vtrarumque distantias.

Sexto, Motus omnium curuus, & in parte borea ad Eclipticam accedens, in australi ab eadem recedens, dum Maculae & Faculae in quadrante occidentali versantur.

Septimo, Inclinationi Motus Maculae e, ad Eclipticam non absimilis est, quantum ex quattuor obseruationibus colligere licet, Motus Maculae a, in Tabella VI. anno 1623. ex obseruationibus Ingolstadianis designatus, quam consulas velim.

Octauo, Directio, via siue tendentia Macularum & Facularum itineraria, est obliqua à Septentrione in Austrum flectens, & polus Antarcticus patens seu superior incipit versari in semirculo orientali descendente; Arcticus latens siue inferior, in occidentali ascendente; chordæq; ad axem perpendiculares omnes & singulae Eclipticam secant obliquè ex Septentrione orientali in occasum Meridionalem protense. Sed tam curuitas arcuum itinerariorum quam obliquitas sectionum incipit sensim imminui, angulus autem in Eclipticam & chordarum quamuis interceptus augeri.

Curuitas motus, & incidentia obliqua decrescit, augescit angulus, polus eleuatus australis descendit, ascendit oppositus.

Notæ in XV. Obseruationum Imaginem, Martij 3. Aprilis 1. à die 20. illius, ad 6. huius.

I.



PRIMO Macula à borealis cum Faculis luculentis die 20. exorta, cum iisdem diu processit, tandemq; vna cum illis exiuit. Eadem

Macula in ortu gracilis, oblonga, & vna comparuit, sed sequenti die, & deinceps in duas explicata, circa medium mediam quoq; ostendit per dies aliquot, occasui propinquans, denuo sese in vnam quodammodo, sed situ diuerso collegit, ita

II.

vt occidentalis circa occasum, fuerit iuxta ortum borealis. Spacium inter illas, tam in ortu, quam occasu absorptum non comparuit; sensim decreuerunt minoresq; exiuerunt, quam intrarunt. Macula intermedia, & ab vtrisque separata die 25. 26. 27. in ortu apparuit vmbra seu apex versus austrum seu A. protensa. Occidens horizontem attigit: consumpsit in patente Solis hemisphærio paullo plus quam dies duodecim, vti ex designa-

Macula spatium interiectum, & semetipsas occultant.

Tota sub Sole mora dies 12. non multum excedit.

XV. Imago Obseruati-

onum.

Anno IVBILÆO, 1625.

In Domo Professa Romana Societatis

Martij. 3.

Aprilis. 1.



Cursus Macularum à 20. Martij, ad 6. Aprilis.
similis Ingolfadiano anni eiusdem, etc.



MARTIVS.

APRILIS.

D. H. O. E. I.

D. H. O. E. I.

D. H. O. E. I.

20. m. 8 $\frac{4}{9}$ - 24. 30.25. u. 3 $\frac{4}{5}$ - 24. 25.1. m. 10 $\frac{4}{9}$ - 46. 15.21. m. 8 $\frac{5}{9}$ - 27. 0.26. m. 7 $\frac{1}{2}$ - 18. 20.1. u. 3 $\frac{3}{5}$ - 27. 0.22. m. 8 $\frac{1}{8}$ - 22. 40.27. u. 2 $\frac{4}{5}$ - 43. 30.2. u. 4 $\frac{3}{4}$ - 17. 25.22. m. 11 $\frac{1}{2}$ - 48. 10.28. u. 4 $\frac{1}{3}$ - 21. 0.3. m. 7 $\frac{1}{8}$ - 15. 45.

23. u. — 9. 30.

29. u. 3 $\frac{1}{6}$ - 25. 40.

3. m. 9. — 34. 30.

24. m. 7 $\frac{5}{6}$ - 20. 39.30. u. 2 $\frac{4}{5}$ - 35. 30.4. m. 8 $\frac{5}{9}$ - 31. 0.

24. u. 4. — 22. 0.

31. u. 3 $\frac{2}{3}$ - 26. 30.5. u. 2 $\frac{1}{3}$ - 43. 0.6. u. 2 $\frac{1}{4}$ - 43. 50.

I.

gnatione manifestum est. Inter Faculas
ortæ, cum iisdem occiderunt: quarum
figuram, & situm ex schemate intelliges.

Secundo, Maculæ b, c, d, e, die 22.
exoriri coeptæ, finierunt cursum circa 6.
Aprilis, qui tamen dies non omnes hic
fuere consignati, locorum penuria, &
confusionis euitandæ causâ. Erant au-
tem duo semet consequentes cumuli,

II.

Maculæq; & vmbre, atq; Faculæ sat nu-
merosæ, & conspicuæ, prout patet in fi-
guris lateralibus ad diem 24. & 25. in
ortu; nec non 3. 4. 5. & 6. in occasu cir-
ca Maculas c, & d, atq; f, quæ primatum
in hac serie tenuerunt. Nam b, *sensim in*
Faculam defecit. c, 22. Martij mane So-
lem intrauit, hora matutina 8 $\frac{1}{2}$. 4. A-
prilis exiuit eundem hora vespertina 1 $\frac{1}{2}$

(quæ

I.

(quæ tamen statio hic ob loci angustiam exhibita non est) & sic in Sole per dies 13. duravit, & amplius quam quinque horas: quia quando in ingressu primum animaduersa est, ab horizonte iam libera erat; itaq; etiam illi spatio, tamen ad aspectum minimo, aliquid moræ est tribuendum. Et sic evidens est, moram huius Maculæ sub Sole, longiorem fuisse tempore Macularum a, vno circiter die. In ingressu satis parua, creuit stupendum in modum ad exitum vsque trahens post se comitatum mirificum, & quot diebus varium nouis & quam plurimis Faculis illustrissimis, & Maculis. Nam cum sub ingressum Maculæ parua & pauca cum Faculis magnis apparuissent, diebus sequentibus in locum Facularum subierunt Maculæ, quarum numerus vehementer multiplicari cepit die 27. & sequentibus, ita vt die 28. in Solis quattuor Macularum manipulis c, d, e, f, (quorum hunc extra iter in latus proieci) numerauerim plures quam quinquaginta distinctas Maculas. Cum tamen Obseruator Ingolstadianus, alioquin sedulus, non plures quam septem distinctas describat. sed audiamus quid de ipso testetur P. Georgius Schönberger. 28. Martij hora vespertina 5. scrup. 15. *Maculæ nouem, non à me, sed àlio obseruatae sunt, puto tamen diligenter obseruatas esse, quarum centro proxima, inter tres quasi diuisa.* Cæterum quia inter has nouem, etiam duæ boreales comprehenduntur; necesse est, tantum septem ad hasce congeries spectare. quas tamen ego in paullo plures dispersiui. Hinc rursus emergit tertius testis practicus, Maiores circulos obseruatorios plus posse minoribus. Minutias omnes ob locorum angustiam, annotare non licuit ex autographo, ex Macula tamen d, patet, quomodo omnes eam sequentes, sensim sese ad eandem post medium recipiant, & contrahant in vnum, atq; informem quandam vmbra, seu Maculam vmbrosam efficiant, id quod solenne & quotidianum huic Phænomeno existit. Sic etiam Faculæ ordinariæ in ingressu atque exitu conglobantur, vt vel vna appareat è multis conglobatis, vel multæ fiant ex vna. Exempla in obseruatione passim occurrunt. Sicut autem ego Romæ, sic alibi alij obseruarunt hoc eodem tempore

*Inequalis
Macularum
sub Sole mo-
ra.*

*Mira Ma-
cularum &
Facularum
progenera-
tio.*

*Vbi Ingol-
stadij 7. hic
Romæ vl-
tra 50. sunt
animadu-
ersa Macula.*

*Bonitas Cir-
culi Obser-
uatorij Ro-
mani.*

II

1 vt mox patebit. Vide Imaginem XVI. Duacenam, & Tabellam lateralem octauam Ingolstadianam, in Imagine 18.

5 Tertiò, notandum quomodo omnia Macularum itinera versus eandem partem sunt recurua; & quomodo arcus itinerarius Maculæ c, in ortu vicinior est arcui Maculæ a, quam in exitu, & quomodo sensim ab eodem, & non repente recedit. Notandum etiam, Facularum iubar versus orientem magis dilatari, quam versus occasum.

15 Præterea sciendum est, Maculas b, c, d, atq; e, intus & in circumferentia, plenas apparuisse, ignitis Faculis, seu vna quodammodo Facula continuata, flaua, furua, candicante, cuius terminum circumscripsi punctorum in se redeunte serie. reliquæ autem extra hunc ambitum, vt & boreales a, caruerunt hisce colorum & Facularum, varietatibus: quæ tamen in Maculis magnis satis visitatæ sunt. Amplius obseruandum Maculam C, in horizonte occiduo transeundo 25 insumpsisse plures quam quinque horas. octaua enim matutina iam infidebat, & vespertina secunda necdum omnino excesserat. Hoc quoq; omnibus Maculis in sua tamen proportionem arbitror esse solenne, sed non aduertitur in omnibus, ob illarum paruitatem, & tenuitatem.

5 Quartò, Maculæ d, & f, inceserunt quasi in eodem parallelo, & inter se distiterunt interuallo diurno, vnde hospitium præcedentis d, subsequens f, semper occupauit, paululum in austrum deflexa d, primum conspecta est die 24. Martij vesperti, & die Aprilis 5. occasui appropinquauit vesperti; intercedunt dies duodecim, quibus additus vnus in ortu, facit dies tredecim, cui accedit residuum in occasu aliquot horarum spatium. & sic apparens hic cursus excedit quoq; dies tredecim.

45 Quintò, obserua etiam Facularum cum Maculis in horizonte præcisiones, moras, & æquabiles descensus: itemq; situs inuariabiles &c.

50 Sextò, omnium motuum curuitas, & chordarum ad Eclipticam inclinatio decrescit. Directio motus est ex Septentrione in austrum. Polus superior australis versatur in semicirculo orientali de-

*Vestigia
Macularum
itineraria
inter se non
parallela.*

*Colores,
nimbi, halo-
nes Macu-
larum.*

*Diuturna
Macula in
horizonte
mora.*

*Curuitas
motus, &
inclinatio
decrescit po-
lus australis
descendit.*

XV. Imago Observati

Anno IVBILÆO, 1625.

In Domo Professa Romana Societatis

Martij. 3.

Aprilis. 1.



Cursus Macularu, à 20. Martij. ad 6. Aprilis.
similis Ingolfadiano anni eiusdem, etc.



MARTIVS.

APRILIS.

D_H_⊙.El.

$$20.m.8\frac{4}{9} - 24.30'$$
$$21. m. 8 \frac{5}{9} - 27. 0.$$
$$22.m.8\frac{1}{8} - 22.40.$$
$$22.m.11\frac{1}{2} - 48.10.$$

23. u. — 9 . 30.

$$24.m.7\frac{5}{6} - 20.39.$$

24. u. 4 — 22. 0.

D_H_©.El.

$$25. u, 3\frac{4}{5} - 24. 25.$$
$$26. m \cdot 7\frac{1}{2} = 18, 20$$

27. u. $2\frac{4}{5} - 43.30$

$$28, u, 4\frac{1}{3} - 21, 0$$
$$29. \text{ u. } 3\frac{1}{6} - 25.40.$$
$$30, u. 2\frac{4}{5} - 35, 30.$$
$$31, u. 3 \frac{2}{3} - 26.30.$$

D _ H _ ©.E1.

$$1, m, 10 \frac{4}{9} - 46, 15$$
$$f, u. \quad 3 \frac{3}{5} - 27. \quad 0.$$
$$2. u. \quad 4 \frac{3}{4} = 17.25$$
$$3. m. 7 \frac{1}{8} - 15.45$$

3. m., 9. — 34. 30.

$$4. m, 8 \frac{5}{9} - 31, 0.$$
$$5, u, 2, \frac{1}{3} - 43, 0,$$
$$\frac{0.2}{4} = 0.05$$

Notæ in XVI. Obseruationum Imaginem,
Martij 4. Aprilis 2, à die 24. illius, ad 2. huius.

I.

II.

P R I M O habes hic rursus in hac
proportionaliter ampliata Imagi-
ne, conuenientiam Macularum

Duaci obleruatarum , cum Maculis ij-
dem obferuatis à me Romæ hoc eodem
anno ; vbi duo notare poteris . Primo , id
quod

I.

(quæ tamen statio hic ob loci angustiam exhibita non est) & sic in Sole per dies 13. duravit, & amplius quam quinque horas: quia quando in ingressu primum animaduersa est, ab horizonte iam libera erat; itaq; etiam illi spatium, tametsi ad aspectum minimo, aliquid moræ est tribuendum. Et sic evidens est, moram huius Maculæ sub Sole, longiorem fuisse tempore Macularum a, vno circiter die. In ingressu satis parua, creuit stupendum in modum ad exitum vsque trahens post se comitatum mirificum, & quot diebus varium nouis & quam plurimis Faculis illustrissimis, & Maculis. Nam cum sub ingressum Maculæ parvæ & paucæ cum Faculis magnis apparuissent, diebus sequentibus in locum Facularum subierunt Maculæ, quarum numerus vehementer multiplicari cepit die 27. & sequentibus, ita vt die 28. in Solis quattuor Macularum manipulis c, d, e, f, (quorum hunc extra iter in latus proieci) numerauerim plures quam quinquaginta distinctas Maculas. Cum tamen Obseruator Ingolstadianus, alioquin sedulus, non plures quam septem distinctas describat. sed audiamus quid de ipso testetur P. Georgius Schönberger. 28. Martij hora vespertina 5. scrup. 15. *Macula nouem, non à me, sed alio obseruata sunt, puto tamen diligenter obseruatas esse, quarum centro proxima, in tres quasi diuisa.* Cæterum quia inter has nouem, etiam duæ boreales comprehenduntur; necesse est, tantum septem ad hasce congeries spectare. quas tamen ego in paullo plures dispertui. Hinc rursus emergit tertius testis practicus, Maiores circulos obseruatorios plus posse minoribus. Minutias omnes ob locorum angustiam, annotare non licuit ex autographo, ex Macula tamen d, patet, quomodo omnes eam sequentes, sensim sese ad eandem post medium recipiant, & contrahant in vnum, atq; informem quandam vmbra, seu Maculam vmbrosam efficiant, id quod solenne & quotidianum huic Phænomeno existit. Sic etiam Faculæ ordinariæ in ingressu atque exitu conglobantur, vnde vel vna appareat è multis conglobatis, vel multa fiant ex vna. Exempla in obseruatione passim occurrunt. Sicut autem ego Romæ, sic alibi alij obseruarunt hoc eodem tempore

*Inæqualis
Macularum
sub Sole mo-
ra.*

*Mira Ma-
cularum &
Facularum
progenera-
tio.*

*Vbi Ingol-
stadij 7. hic
Romæ vl-
tra 50. sunt
animadu-
ersæ Maculæ.*

*Bonitas Cir-
culi Obser-
uatorij Ro-
mani.*

II

1 vt mox patebit. Vide Imaginem XVI. Duacenam, & Tabellam lateralem octauam Ingolstadianam, in Imagine 18.

5 Tertiò, notandum quomodo omnia Macularum itinera versus eandem partem sunt recurua; & quomodo arcus itinerarius Maculæ c, in ortu vicinior est arcui Maculæ a, quam in exitu, & quomodo sensim ab eodem, & non repente recedit. Notandum etiam, Facularum iubar versus orientem magis dilatari, quam versus occasum.

15 Præterea sciendum est, Maculas b, c, d, atq; e, intus & in circumferentia, plenas apparuisse, ignitis Faculis, seu vna quodammodo Facula continuata, flaua, furua, candicante, cuius terminum circumscripsi punctorum in se redeunte serie. reliquæ autem extra hunc ambitum, vt & boreales a, caruerunt hisce colorum & Facularum, varietatibus: quæ tamen in Maculis magnis satis visitatæ sunt. Amplius obseruandum Maculam C, in horizonte occiduo transeundo
25 insumpsisse plures quam quinque horas. octaua enim matutina iam infidebat, & vespertina secunda necdum omnino excesserat. Hoc quoq; omnibus Maculis in sua tamen proportionem arbitror esse solenne, sed non aduertitur in omnibus, ob illarum paruitatem, & tenuitatem.

30 Quartò, Maculæ d, & f, inceserunt quasi in eodem parallelo, & inter se distiterunt interuallo diurno, vnde hospitium præcedentis d, subsequens f, semper occupauit, paullulum in austrum deflexa d, primum conspecta est die 24. Martij vesperti, & die Aprilis 5. occasui appropinquauit vesperti; intercedunt dies duodecim, quibus additus vnus in ortu, facit dies tredecim, cui accedit residuum in occasu aliquot horarum spatium. & sic apparens hic cursus excedit quoq; dies tredecim.

45 Quintò, obserua etiam Facularum cum Maculis in horizonte præcisiones, moras, & æquabiles descensus: itemq; situs inuariabiles &c.

50 Sextò, omnium motuum curuitas, & chordarum ad Eclipticam inclinatio decrescit. Directio motus est, ex Septentrione in austrum. Polus superior austrinus versatur in semicirculo orientali de-

*Vestigia
Macularum
itineraria
inter se non
parallela.*

*Colores,
nimbi, halo-
nes Macu-
larum.*

*Diuturna
Maculæ in
horizonte
mora.*

*Cura ita
motus, &
inclinatio
decrescit po-
lus australis
descendit.*

XV. Imago Obseruati-

onum.

Anno IUBILÆO, 1625.

In Domo Professa Romana Societatis

Martij. 3.

Aprilis. 1.



Curfus Macularu, à 20. Martij, ad 6. Aprilis.
similis Ingolfadiano anni eiusdem, etc.



MARTIVS.

APRILIS.

D_H_O.EI.

D_H_O.EI.

D_H_O.EI.

20.m.8 $\frac{4}{9}$ -24.30.25.u.3 $\frac{4}{5}$ -24.25.1.m.10 $\frac{4}{9}$ -46.15.21.m.8 $\frac{5}{9}$ -27.0.26.m.7 $\frac{1}{2}$ -18.20.1.u.3 $\frac{3}{5}$ -27.0.22.m.8 $\frac{1}{9}$ -22.40.27.u.2 $\frac{4}{5}$ -43.30.2.u.4 $\frac{3}{4}$ -17.25.22.m.11 $\frac{1}{2}$ -48.10.28.u.4 $\frac{1}{3}$ -21.0.3.m.7 $\frac{1}{8}$ -15.45.

23.u. — 9.30.

29.u.3 $\frac{1}{6}$ -25.40.

3.m.9. — 34.30.

24.m.7 $\frac{5}{6}$ -20.39.30.u.2 $\frac{4}{5}$ -35.30.4.m.8 $\frac{5}{9}$ -31.0.

24.u.4 — 22.0.

31.u.3 $\frac{2}{3}$ -26.30.5.u.2 $\frac{1}{3}$ -43.0.6.u.2 $\frac{1}{4}$ -43.50.

Notæ in XVI. Obseruationum Imaginem,
Martij 4. Aprilis 2, à die 24 illius, ad 2. huius.

I.

PRIMO habes hic rursus in hac
proportionaliter ampliata Imagi-
ne, conuenientiam Macularum

II.

Duaci obseruatarum, cum Maculis ijs-
dem obseruatis à me Romæ hoc eodem
anno; vbi duo notare poteris. Primo, id
quod

I.

quod semper ego dixi, & dico Maiores
obferuationum circulos, cæteris simili-
bus aut paribus assumptis, semper accu-
ratius & distinctius ea quæ sunt in Sole
repræsentare, quàm soleant minores.
Secundo, nihilominus tamen, in mino-
ribus etiam, minutias multas satis accu-
ratè obijci oculis, prout hic factum vi-
des in comitatu Maculæ C, ad diem 27.
Martij, 36. eiusdem, 31. & 2. Aprilis.

Secundò, ob vitandam confusionem è
locorum penuria, non omnes obseruatio-
num dies aut Maculas adduxi, sed oppor-
tuniores, quibus mirifica tantorum loco-
rum consonantia in tam dissita re consta-
ret: fed & Faculæ circa exitum Maculæ
a borealis, die 31. Martij, suis locis &
numeris constabant, obseruatore ita at-
testante, vt videas eandem & Macula-
rum, & Facularum, nec non vmbrarum
in parallaxi esse rationem. Confer singu-
la cum singulis, & admirabilem con-

*Macularum
æque atq; Fa-
cularum nul-
la parallaxi-
s.*

II.

gruentiam animaduertes. Vide etiam
Tabellam VIII Lateralem, Imaginis
XVIII. in qua eadem quoq; Ingalstadij
obseruata atq; notata animaduertes.

5 Tertiò, aduertas velim, magnitudi-
nes & conimnitatem Macularum in fi-
guris mihi non esse accuratas transmis-
sas, sed eas ex obseruatis meis pro re na-
ta rudi Minerua è meis tralatas; genuina
10 hæc inuenies in Imagine 15.

Quartò, loca tamen Macularum dili-
genter custodita scias, & litteras easdem
eidem Maculæ vtrinq; adiectas, vt litte-
ra a, vtrinq; significet Maculam boream.
15 Litteræ b, c, & d, australes præcipuas
in ortu die 24. & reliquis consequenti-
bus, per Solem versatas.

20 Quintò, quibus autem horis, die qua-
uis sint obseruationes Duaci peractæ, &
sub qua Solis supra finitorem exaltatio-
ne, dat adiuncta in schemate consigna-
tio.

APRILIS

MARTIUS

D. H. O. E. I.	D. H. O. E. I.	D. H. O. E. I.
1. m. 10. 1/2	1. m. 10. 1/2	1. m. 10. 1/2
2. m. 10. 1/2	2. m. 10. 1/2	2. m. 10. 1/2
3. m. 10. 1/2	3. m. 10. 1/2	3. m. 10. 1/2
4. m. 10. 1/2	4. m. 10. 1/2	4. m. 10. 1/2
5. m. 10. 1/2	5. m. 10. 1/2	5. m. 10. 1/2
6. m. 10. 1/2	6. m. 10. 1/2	6. m. 10. 1/2
7. m. 10. 1/2	7. m. 10. 1/2	7. m. 10. 1/2
8. m. 10. 1/2	8. m. 10. 1/2	8. m. 10. 1/2
9. m. 10. 1/2	9. m. 10. 1/2	9. m. 10. 1/2
10. m. 10. 1/2	10. m. 10. 1/2	10. m. 10. 1/2
11. m. 10. 1/2	11. m. 10. 1/2	11. m. 10. 1/2
12. m. 10. 1/2	12. m. 10. 1/2	12. m. 10. 1/2
13. m. 10. 1/2	13. m. 10. 1/2	13. m. 10. 1/2
14. m. 10. 1/2	14. m. 10. 1/2	14. m. 10. 1/2
15. m. 10. 1/2	15. m. 10. 1/2	15. m. 10. 1/2
16. m. 10. 1/2	16. m. 10. 1/2	16. m. 10. 1/2
17. m. 10. 1/2	17. m. 10. 1/2	17. m. 10. 1/2
18. m. 10. 1/2	18. m. 10. 1/2	18. m. 10. 1/2
19. m. 10. 1/2	19. m. 10. 1/2	19. m. 10. 1/2
20. m. 10. 1/2	20. m. 10. 1/2	20. m. 10. 1/2
21. m. 10. 1/2	21. m. 10. 1/2	21. m. 10. 1/2
22. m. 10. 1/2	22. m. 10. 1/2	22. m. 10. 1/2
23. m. 10. 1/2	23. m. 10. 1/2	23. m. 10. 1/2
24. m. 10. 1/2	24. m. 10. 1/2	24. m. 10. 1/2
25. m. 10. 1/2	25. m. 10. 1/2	25. m. 10. 1/2
26. m. 10. 1/2	26. m. 10. 1/2	26. m. 10. 1/2
27. m. 10. 1/2	27. m. 10. 1/2	27. m. 10. 1/2
28. m. 10. 1/2	28. m. 10. 1/2	28. m. 10. 1/2
29. m. 10. 1/2	29. m. 10. 1/2	29. m. 10. 1/2
30. m. 10. 1/2	30. m. 10. 1/2	30. m. 10. 1/2
31. m. 10. 1/2	31. m. 10. 1/2	31. m. 10. 1/2

Notæ in X V I. Obseruationum Imaginem,
Martij 4. Aprilis 2. die 24. illius ad 2. huius.

II.

Duaci obseruationum, cum Maculis
quod

proportionibus ad ipsas imagines
ne, conueniant. Vnde

IMAGOS SOLIS XVI.

195

Σ

M.DC.XXV.


XVI. Imago Obser:
uationum.

In Collegio Academ. Duaceno Societ.

Martij. 4.
Aprilis. 2.



Cursus Macularum à 24. Martij, ad 2. Aprilis, similis et idem
cū Romano et Ingolstadiano, anni eiusdem.



cc

Notæ

I.

quod semper ego dixi, & dico Maiores
obseruationum circulos, cæteris simili-
bus aut paribus assumptis, semper accu-
ratius & distinctius ea quæ sunt in Sole
repræsentare, quàm soleant minores.
Secundo, nihilominus tamen, in mino-
ribus etiam, minutias multas satis accu-
ratè obijci oculis, prout hic factum vi-
des in comitatu Maculæ C, ad diem 27.
Martij, 36. eiusdem, 31. & 2. Aprilis.

*Macularum
æque atq; Fa-
cularum nul-
la paralla-
xis.*

Secundò, ob vitandam confusionem è
locorum penuria, non omnes obseruatio-
num dies aut Maculas adduxi, sed oppor-
tuniores, quibus mirifica tantorum loco-
rum consonantia in tam dissita re consta-
ret: sed & Faculæ circa exitum Maculæ
a borealis, die 31. Martij, suis locis &
numeris constabant, obseruatore ita at-
testante, vt videas eandem & Macula-
rum, & Facularum, nec non umbrarum
in parallaxi esse rationem. Confer singu-
la cum singulis, & admirabilem con-

II.

gruentiam animaduertes. Vide etiam
Tabellam VIII Lateralem, Imaginis
XVIII. in qua eadem quoq; Ingalstadij
obseruata atq; notata animaduertes.

5 Tertiò, aduertas velim, magnitudi-
nes & conimnitatem Macularum in fi-
guris mihi non esse accuratas transmis-
sas, sed eas ex obseruatis meis pro re na-
ta rudi Minerua è meis tralatas; genuina
hæc inuenies in Imagine 15.

10 Quartò, loca tamen Macularum dili-
genter custodita scias, & litteras easdem
eidem Maculæ vtrinq; adiectas, vt litte-
ra a, vtrinq; significet Maculam boream.
15 Litteræ b, c, & d, australes præcipuas
in ortu die 24. & reliquis consequenti-
bus, per Solem versatas.

20 Quintò, quibus autem horis, die qua-
uis sint obseruationes Duaci peractæ, &
sub qua Solis supra finitorem exaltatio-
ne, dat adiuncta in schemate consigna-
tio.

APRILIS

MARTIUS

D. H. O. E. I.	D. H. O. E. I.	D. H. O. E. I.
1. m. 10. 1/2	1. m. 10. 1/2	1. m. 10. 1/2
2. m. 10. 1/2	2. m. 10. 1/2	2. m. 10. 1/2
3. m. 10. 1/2	3. m. 10. 1/2	3. m. 10. 1/2
4. m. 10. 1/2	4. m. 10. 1/2	4. m. 10. 1/2
5. m. 10. 1/2	5. m. 10. 1/2	5. m. 10. 1/2
6. m. 10. 1/2	6. m. 10. 1/2	6. m. 10. 1/2
7. m. 10. 1/2	7. m. 10. 1/2	7. m. 10. 1/2
8. m. 10. 1/2	8. m. 10. 1/2	8. m. 10. 1/2
9. m. 10. 1/2	9. m. 10. 1/2	9. m. 10. 1/2
10. m. 10. 1/2	10. m. 10. 1/2	10. m. 10. 1/2
11. m. 10. 1/2	11. m. 10. 1/2	11. m. 10. 1/2
12. m. 10. 1/2	12. m. 10. 1/2	12. m. 10. 1/2
13. m. 10. 1/2	13. m. 10. 1/2	13. m. 10. 1/2
14. m. 10. 1/2	14. m. 10. 1/2	14. m. 10. 1/2
15. m. 10. 1/2	15. m. 10. 1/2	15. m. 10. 1/2
16. m. 10. 1/2	16. m. 10. 1/2	16. m. 10. 1/2
17. m. 10. 1/2	17. m. 10. 1/2	17. m. 10. 1/2
18. m. 10. 1/2	18. m. 10. 1/2	18. m. 10. 1/2
19. m. 10. 1/2	19. m. 10. 1/2	19. m. 10. 1/2
20. m. 10. 1/2	20. m. 10. 1/2	20. m. 10. 1/2
21. m. 10. 1/2	21. m. 10. 1/2	21. m. 10. 1/2
22. m. 10. 1/2	22. m. 10. 1/2	22. m. 10. 1/2
23. m. 10. 1/2	23. m. 10. 1/2	23. m. 10. 1/2
24. m. 10. 1/2	24. m. 10. 1/2	24. m. 10. 1/2
25. m. 10. 1/2	25. m. 10. 1/2	25. m. 10. 1/2
26. m. 10. 1/2	26. m. 10. 1/2	26. m. 10. 1/2
27. m. 10. 1/2	27. m. 10. 1/2	27. m. 10. 1/2
28. m. 10. 1/2	28. m. 10. 1/2	28. m. 10. 1/2
29. m. 10. 1/2	29. m. 10. 1/2	29. m. 10. 1/2
30. m. 10. 1/2	30. m. 10. 1/2	30. m. 10. 1/2
31. m. 10. 1/2	31. m. 10. 1/2	31. m. 10. 1/2

Notes in X V I. Obseruationum Imaginem,
Martij 4. Aprilis 2. die 24. illius, ad 2. prius.

II.

Duaci obseruationum, cum Maculis
et obseruationibus 2. me. Roms. hoc eodem
anno: vbi duo notate poteris. Prius, id
quod

RIM O habes hic in imagine
proportionibus amplius imagi-
nes, conuenientiam Macularum

IMAGO SOLIS XVI.

195

XVI. Imago Obser:
uationum.


M.DC.XXV.

In Collegio Academ. Duaceno Societ.

Martij. 4.
Aprilis. 2.



Cursus Macularum à 24. Martij, ad 2. Aprilis, similis et idem
cu Romano et Ingolstadiano, anni eiusdem.



cc

Notæ

Notæ in XVII. Observationum Imaginem.

*Macularū
diuersarum
diuersorum
annorum
Cursus si-
miles.*



PRIMO, Concinaui hanc Imaginem, & ampliaui proportionaliter, ex Observationibus Ingolstadij factis anno 1623. ad dies ultimos Mar-

tij, vt appareat cursus omnino similis, licet in Maculis dissimilibus, annorum diuersorum, mense tamen & diebus iisdem. nam

Secundo, Tametsi Macula a borea, & b australis, non sint in eodem penitus parallelo, in quo versatae sunt anno 1625. tamen haud multum recedunt ab itineribus Macularum mearum a & b, anno 1625. & mense atque diebus iisdem decursis atque expressis in Observationum Imagine 15: inuenies curuitatem quasi eandem, stationes & intercapedines diurnas simillimas, & motum denique apparentem eundem.

Tertio, Accipe autem ipsius obseruatoris, qui fuit P. Georgius Schönberger, verba ex autographo transcripta.

Die 26. Martij, Macula nouem per Inspectionem, per Immissionem quinque; quarum maxima per inspectionem instar rarioris nebulae, parte qua exitui vicinior est, Maculam in se habuit valde nigram, vt figura ostendit.

Die 27. Martij, Mac. 7. quarum prima & secunda quæ sunt boreæ, creuerunt notabiliter.

Die 29. Maculae visæ quattuor. quarum quarta in ipso verticali expressissime visa.

Hæc ille. è quibus annoto sequentia, 40

II.

- 1 & Lectori intimo. Primum, Ipsum suas obseruationes plerasque effecisse tam immisso Sole per Telioscopium in chartam, quam emisso visu per Helioscopium in Solem. Secundum, Obseruationes per visum in Solem Helioscopio admissum, esse accuratiores & distinctiores ordinariè ijs quæ fiunt sola Solis in chartam translatione, quoad Macularum figuram, colorem, raritatem, & spissitudinem notandam. si Circulis præsertim paruis obseruatorijs vtamur, prout expertus in Apelle, bene fui; vnde vt ibidem etiam in paruis circulis, Macularum præcisiones exactè satis animaduertentem, in auxilium semper Telioscopium aduocaui; cuius ope exactas Macularum figuras & numeros atq. distinctiones nactus sum: id quod discipulus iste meus à me iam olim edoctus, etiam hic sedulo præstitit. Vnde aduerte, Tertium. Maculam illam nigram in nebula conspectam, fuisse nucleum in suo vapore seu halitu, versus marginem proluquantem, id quod in hoc Phœnomeno est frequentissimum. Quartum, Absque inspectione per solam immissionem neque duas medias boreales, neque istum vaporem à nucleo suo tractum distinctè visum esse. Nam paruus Circulus, quia parum res obiectas ampliat, minuta ista in vnam massam collecta semper representat, teste experientia. Quintum, Augmentatio Macularum patet. Sextum, Macula d vnus diei parvus in centro, quod Solis verticalem dicit apparuit. quod vtrumque non nouum, sed satis frequens est in hoc toto Phœnomeno.

Vsus Helioscopij superat proxim Telioscopij ad paruum circulum obseruatorium restricti.

*Cursuum
ex diuersis
annis similitudo.*

*Macularū
Nuclei etiam
Ingolstadij olim
animaduersi.*



XVII, Imago

M. DC. XXIII.

Martij, 5.

Observationis

In Collegio Academico Ingolstadiano Soc:



A, Oriens,

B, Occidens,

ab cd, Circulus
Observatorius.

AZBN, Circulus

ampliatu

Cursus Macularum a 26 ad 30, Martij, similis Romano

aliquo annorum in mense eodem.

MARTII

D-H-S cr.

26. m. 9. 0.
27. m. 10. 30.
28. m. 7. 45.
29. m. 11. 0.
30. u. 3. 0.

N

cc 2 Notæ

Notæ in XVIII. Observationum Imaginem, con-
flatam ex varijs variorum locorum, & an-
norum observatis cursibus, in Mensi-
bus Feb. Martio, atq. Aprili.

I.



PRIMO, Hæc Imago con-
tinet multas Tabellas, prio-
ribus Imaginibus modo ex-
plicatis omnino concordēs,
& similes quoad motum.

Macularum, & quia alibi & ab alijs sunt
factæ hæ observationes, & per alios etiam
annos excurrunt, & minoribus observa-
tionum circulis coarctatæ, volui eas si-
mul sub sua magnitudine non ampliata,
in vnum conspectum producere, vr con-
stet, quàm motus omnino similes & uni-
formes fiant, quàmque similiter, & unifor-
miter ubiq; Maculæ procedant, & quam
similes, & æqualis ubiq; moræ existant.
Ego enim ex Autographis ad me tran-
smissis fidelissimè illas traduxi. Quod si
experiri velis, vtrum omnia hisce circellis
conclusa meis proportionibus respondeant,
ampliabis hosce circulos ad æqualitatem
meorum, & senties dictorum veritatem.
Notabilia verò mox subnecto. *Tabella*
prima, respondet Imagini XI; nota Macu-
lam à die 5. Februarij tam Romæ à me,
quam Ingolstadij à Schönbergero visam,
esse vnam & simplicem. sed Romæ etiam
prioribus diebus conspectam. deind
eandem die 6. hic Romæ supernè acqui-
suisse parvulam, Ingolstadij tamen non
animaduersam; insuper adhuc alias acces-
sisse die 8. & visas similiter 10. & 11.
atque 12. diebus vtrobiq; eodem quasi
modo. nam quas Romæ supernè adiun-
ctas vidi die 10. easdē vidit Schönberger
die 11. at verò die 12. neutris comparue-
re illæ appendiculæ: sic etiam, die 11. & 12.
maiora facta sunt Macularum interualla,
quàm erant die 10. die 6. Macula vtrobiq;
Eclipticam insedit; die 10. rasit: & om-
nino motus & situs similes vtrobiq; exhi-
buit, prout observationum icones edo-
cent. E quibus irrefragabile pro nulla Ma-
cularum Parallaxe asserenda trahitur ar-
gumentum.

Macularum
Nulla Pa-
rallaxis.

Tabella secunda, respondet Imagini
XII. Nota, Maculam a, eodem loco hæ-

II.

1 fuisse die 10. quo constitit die 11. Macula
b; vnde eadē Macula loco eodem duorū
dierū, & duarum Macularum numeros &
characteres in schemate gestat, id quod
5 etiam die 12. & alias non rarò con-
tingit: vti videre est in mea Imagine XII.
ad diem 9. circa initium. &c. His notatis;
Macula a in Tabella hac, respondet Ma-
culæ b in Imagine mea 12. Macula b
10 hic, Macula C illic; Macula c hic, Ma-
culæ f illic. Macula a in plures resolu-
ta est hic vti & Romæ, atque vtrobiq;
decreuit, & tenuis valde exiuit. Macula
d correspondens Maculæ g, vtrinque de
15 nouo in Sole enata est, die 16. situ & lo-
co proportionali eodem, & variè multi-
plicata, quam tamen multiplicationem
ego in Tabella ob confusionem euitan-
dam omisi, omnia tandem vtrinque in Fa-
20 culam abierunt, die 22. situ, figura, ma-
gnitudine, & loco Solis proportionaliter
ijsdem; vti patet ex iconismis. Macula e
vtrinque eadem, tenuissima, in Faculam
vtrinque abiuit, & hic Romæ Facula
intrauit.

25 *Tabella tertia*, respondet Imagini XIII.
& similes litteræ adscriptæ sunt vtrinque
Maculis similibus. vbi nota Maculam b,
die 26. visam triplicem, die 4. Martij cum
30 Facula vtrinque alluxisse, situ & loco eo-
dem. Macula c die 26. etiam Ingolsta-
dij animaduersa; nam 28. desierat, vnde
videri ibidem non poterat. Macula f v-
trinque situ & loco eodem annotata: sic e-
35 tiam Macula d. Facularum die 7. occi-
dentalium a, & orientalium g, figuras
veras considera in Imagine mea. sufficit
ex hisce parvis Circulis obtinere locum
visum. g, fuit Facula pura.

40 *Tabella quarta, & quinta Friburgana*,
anni 1622. correspondentes non habent
meas, quia istius anni observationes vel
meas vel aliorum ad manus non habeo
nunc: nihilominus tamen interfero etiam
45 hæc Imagines, quia licet Maculæ in ijs
descriptæ non sint eadem, quæ sunt anni
huius





Loci ijdem
visi, Paral-
laxim euer-
tunt.

Facula pu-
ra etiam In-
golstadij ob-
servata.

IMAGO SOLIS XVIII.

199

XVIII. Obferuationum Tabula, complexa 8. Imagines Laterales à 5. Febr: ad 6. Aprilis. conflatas ex annis 1621. 1622. 1623. 1625. in diuerfiffimis Europæ Locis. etc.



I

II.

huius; neq. in iisdem fortasse decurrant parallelis, tamen vestigia Motus ab illis relicta, eandem omnino subeunt habitudinem, & rationem ad Eclipticam, quam habent Maculae anni huius, quæ Solem decurrerunt eodem mense & diebus iisdem. vbi itinera Macularum, ante & post centrum constituta omnia apparent quasi rectilinea, & Eclipticæ ad sensum

I fere æquidistantia, id quod etiam hic in Macula a cernere licet, die 16. & 21. Vice versa Maculae a, & b, in Tabella V. designatae, quia sunt horizonti ortiuo viciniore, arcus describunt, versus centrum & Eclipticam accliuies; & similiter Macula C, horizonti occiduo vicina, diebus iisdem ab iisdem Ecliptica & centro decliuies; quod etiã fecerunt & faciunt Maculae huius anni,

cc 3 vtpa.

*Motus an-
norum di-
uerforum
similes.*

I.

vt patet in Imagine XIII. vbi vides, dum eodem die 28. Februarij, & 2. Martij, Facula e ascendit, iisdem & consequentibus diebus, Maculam b in eodem veluti parallelo descendere ex parte occidentali sic omnino faciunt Macule a, b, & c. itaq. ratio motus similis omnino existit, diebus & mensibus iisdem. &c.

Tabella sexta Ingolstadiana anni 1623. idem etiam docet & suadet. Nam Macula a, per dies 6. à centro versus marginem progressa, describit similes arcus, quales fere designantur in cursibus Imaginis XIII. à Maculis a & d, à die 1. vel 2. Martij, ad 5. & 6. eiusdem; prout conferenti patebit.

Tabella septima Ingolstadiana, respondet Imagini meæ XIV. & Maculae a b, illius respondet Maculis huius sub vna littera a, designatis; Facula autē c, quam in Tabella tertia sub g signaueram, correspondet Faculae C, & Maculae d, Maculis e Faculae q. die 18. Faculis diei eiusdem: vbi nota, Faculas d, hic in vnum cumulum congestas, explicatas, & sub suis figuris expositas apparere in Imagine mea sub littera g. Item Maculas d hic ad diem 13. Febr. & Maculas e illic, situ quidem proportionali conspici, vtrinque enim borealior Eclipticam insidet; sed numero plurimum distare. Nam Ingolstadij sunt tantum duæ visæ Maculae, hic Romæ quattuor. Consule dies etiam alios. Ex his nulla illarum ad Solem aspectus diuersitas, fortissimè stabilitur.

Tabella VIII. Ingolstadiana, respondet XV. Imagini Romanæ, & litteræ Maculis adscriptæ in Tabella hac, iisdem litteris in Imagine XV. loca locis, figuræ figuris, vsq; ad minutias ipsas, in quantum

*Nulla Pa-
rallaxis.*

II.

1 tantilli ferunt Circuli. confer & reperiēs veritatem. Hinc rursus Parallaxis eliminatur.

Nota I. In Imagine XV. Maculam C obseruatam & annotatam esse die 22. Martij, hic autem, in obseruatione diei eiusdem in visum non cecidisse, quod idem accidit die 4. Aprilis, vbi vides eandem Maculam C, in horizonte versatam in Imagine mea, cum tamen Ingolstadianus Obseruator, alioquin diligens, penitus nil animaduertit; culpa igitur non in ipso, sed in Circuli Obseruatorij impotentia residet. Vnde constat ex hisce 15 Circulis (quod saepe iam indicaui) neq; plenos motus apparentes, neq. alia hinc consequentia, rectè statui, & decidi posse, fiunt enim obseruationes & motus manci; & hæc est vna ex causis, cur Apelles sese in obseruationes vltiores semper reiecerit.

Nota secundò Cursus apparentes vtrobiq. eodem modo sese habere ad Eclipticam, & Maculas quidem austrinas circa ortum eidem viciniore esse, quàm circa occasum, boreales verò, vice versa remotiores esse in plaga orientali quàm occidentali, dum sunt in horizonte; nam in progressu flexus curuos efficiunt, & magis accedunt in austro, disceduntq; in borea, quàm circa horizontem fuerant in ortu. &c.

Nota tertio, Itineraria Macularum c & a interualla, si per lineas ad Eclipticam perpendiculares mensurentur, sensim ab ortu incipiendo fiunt ampliora, tam in hac Tabella, quàm in mea Imagine XV. id quod in alijs obseruationum Imaginibus non est infrequens.

*Parallaxis
ex summa
locorum vi-
sorum cor-
responden-
tia, exulat
ab hoc Phœ-
nomeno.*

*Parui Cir-
culi Obser-
uatorij dant
obseruatio-
nes & motus
Mancos.*

*Motus non
paralleli.*

Notæ in XIX. Obseruationum Imaginem, Aprilis 3. à die 2. ad 14. eiusdem.

I. **P**RIMO Aprilis à die 6. ex quo turbæ prædictæ Macularum excesserunt, exiguas & nullius ferme momēti Maculas produxit, interea Facularum feracissimus fuit, ad quas ego data opera, ferias à Maculis nactus singulari studio intentus fui quarum

proinde cursus annotatos hic ob oculos statuo.

Secundò, Die igitur secundo, vespere in horizonte emicuit vna luculenta Facula a inter duas vel tres umbras densiusculas.

Die Tertiò mane, neq; dum tota Facularum

*Facularum
supra hori-
zontem a-
scensio diur-
na.*

XIX, Imago Observata Anno Iubilæo: MDCXXV, 3^a Aprilis.
uationum, In Domo Professa Romana Societatis




Cursus Macularum et Facularum, à die 2. ad 14. Aprilis:

Similes aliis aliorum annorum tempore eodem.

A, Oriens.

AB, Ecliptica.

B, Occidens.



APRILIS

D H O.EI. D H O.EI.

2. u.	3 $\frac{3}{4}$	27.	20.	9. u.	3 $\frac{1}{4}$	34.	10.
3. m.	7 $\frac{3}{4}$	22.	20.	10. m.	10 $\frac{3}{4}$	51.	45.
4. m.	9 —	35.	0.	13. m.	—	37.	40.
5. m.	8 $\frac{8}{9}$	34.	10.	13. u.	3 $\frac{1}{2}$	33.	0.
6. m.	8 $\frac{1}{3}$	29.	20.	14. m.	6 $\frac{2}{3}$	18.	20.
7. m.	7 $\frac{1}{4}$	19.	30.	14. u.	2 $\frac{1}{8}$	47.	25.
8. u.	2 $\frac{1}{4}$	44.	15.				

I.

cularum & umbrarum congeries supra horizontem euasit, dubiumq; me tenuit, quid tandem variegatum istud ex umbris & luculis compactum promontoriū esset pariturum: expectabam sanè Maculas, quas parturire videbatur. cum, ecce tibi, Die 4. in disiunctas cepit abire Faculas, ostensa paruula quadam Macula subdubia.

II

Die Quinto, plura & magis separata Facularum frustra, interiectis satis notabilibus umbris alluxerunt.

Die Sexto, Maiores disiunctiones sese prodiderunt, sed & Umbræ & Faculae attenuari ceperunt præter eam quam loci penuria in latus seposui.

Die 7. 8. 9. & præsertim 10. ita tenui lumine, & luce tinctis umbris interstinguaban-

I.

guebantur Faculae, ut aciem visus paene effugerent; id tamen quod certo affectus sum apposui.

Die 11. & 12. Sol nullus apparuit.

Die 13. tam mane quam vespere, reddiderunt se denuo non umbræ sed Maculae quattuor paruulae, tenues, satis coniunctae, cum Faculis luculentis, neque dubito per totum Solem huc usque ab oriente perdurauisse, & post multam cum Faculis colluctationem ex umbris in Maculas conglobatas esse. Conspirat locus, tempus, & figurarum aliqua similitudo. Nam Faculas in perpetua & multo sensibiliore figurarum mutatione esse quam Maculas, certissimis & continuis tot annorum experimentis constanter expertus sum. Habitum autem vespertinum expressi in latere.

Die 14. Duæ tantum sed auctiores comparuerunt Maculae, coierunt enim in vnam duæ antecedentes, & duæ consequentes, & constiterunt inter Faculas, & hæ complexæ sunt vnam magnam umbram versus boream extentam. quænam autem Faculae puræ sint consecutæ, habes in schemate laterali matutino. Vespere, prior valde gracilis horizonti appropinquauit.

Tertiò, Maculae b, comparuerunt die


II.

1 2. per modum umbrarum Faculam complexarum, deinde sensim se dilatauerunt in Maculas tenues, donec die 9. & 10. cauda in modum Cometæ præmissa, omnino euanuerunt.

5 Quarto, Faculae C boreales purissimæ post diem tertium non luxerunt. Cursus apparens istarum Facularum & Umbrarum, si dies decem & tres attigit, certo non superauit.

10 Quinto, d, sunt Maculae binæ, eodem itinere quo b continuatæ, itaque easdem puto, sed b die 3. nonnihil versus ortum retrahendas existimo, cæteris diebus pari & ordinato cum Faculis incessu easdem aspicias; auctæ sunt numero die 6. & 7. aliquantulum distractæ loco, nisi, quod verius etiam iudico, nouas enatas velis, alijs denatis. nam die 8. vnica mansit, quæ 9. & 10. euanescebat, barbatum cometen, præmissa barba, imitata est. Cum Faculis a, quasi æquidistanter incessit. post diem 10. nullum sui vestigiū reliquit.

25 Sexto, Motus curuilinei directio est ex Aquilone ortiuo in austrum, spectante concauitate itineris in polum Antarcticum, conuexitate in Aquilonem; polo superiore & ascendente Austrino, descendente Septentrionali.



XX. Observationum

Anno Iubilæo M.DC.XXV.

Aprilis. 4^a

Imago In Domo Professa Romana Societatis



Cursus Facularum a et Macularum b a. r. ad 18. Aprilis.

A. Oriens.

AB. Ecliptica.

B. Occidens.

APRILIS

D-H-O-EI-D-H-O-EI

1. m. 8 1/2 - 24. 10.

13. m. 8 1/2 - 36. 30.

2. m. 8 1/2 - 25. 20.

14. m. 6 1/2 - 18. 20.

3. m. 8 1/2 - 29. 30.

15. m. 8 1/2 - 31. 5.

4. m. 7 1/2 - 19. 30.

16. m. 7 1/2 - 25. 30.

5. m. 7 1/2 - 47. 20.

17. m. 8 1/2 - 32. 15.

6. m. 8 - 26. 10.

18. m. 7 1/2 - 22. 20.

7. m. 10 1/2 - 41. 45.

Notæ in XX. Observationum Imaginem,

Aprilis 4. à die 5. ad 18. eiusdem.

I.

PRIMO sicut Aprilis à die quinta amisit vel potius ex apparentes Solis hemisphærio emisit in oppositum magnas Maculas, & exi-

II.

les admodum per sequentes dies exhibuit, ita vicissim Faculis eximijs alluxit, quarum seriem cæpi explicare in Imagine præcedenti XIX. nunc continuo

in.

I.

in hac XX. nam & ipsæ Faculæ sese im-
mediate quodammodo consequebantur,
quæ cuiusmodi fuerint, accipe ex Ephe-
meride subiuncta.

*Facula su-
pra horizon-
tem elucta-
tio, multa-
rum hora-
rum.*

Secundo, Die 5. Aprilis mane, alluxit
Facula a, vel potius Faculæ multæ vm-
bris in morem venarum intercurrentibus
discretæ; ab horizonte necdum erat ex-
pedita, quem tamen hora 3. vespertina
superasse videtur, prout ex figura laterali
satis apparet, nisi quod brachium quod-
dam australe adhuc nonnihil in ipsum
exporrigi videtur. Vmbræ huius Faculæ
satis aspectabiles erant, præsertim hori-
zonti viciniore. Patet ex matutinæ, &
vespertinæ observationis collatione, Fa-
culas nonnihil esse immutatas.

Die 6. Longior & latior comparuit,
prout figura etiam docet.

Die 7. splendore attenuari & debilita-
ri visa est.

Die 8. In multas Faculas lacerata abi-
uit, visu difficilis.

Die 9. Rariores & tenuiores omnes
apparebant.

Die 10. Aspectum fatigabant, & pæne
cludebant, nisi arte peculiari vsus, easdem
protraxissem.

Die 11. & 12. nullus Sol, affulsit.

Die 13. Debilissimæ affulserunt.

Die tandem 14. denuo quasi restaura-
ta flamma viuacius alluxere.

Die 15. amplius enituerunt, inter vm-
bras tamen multo molliores, & rariores
quàm fuerant orientales.

Die 16. totum exposui ad latus, bo-
reales, vt videas integram Facularum at-
que vmbrarum illis ad hærescentium cō-
stitutionem, quæ tenuiores & graciliores
euaferunt, & horizontem radere cæpe-
runt. NB. *fortius esse incisas, quàm oportet.*

Die 17. Horizonti mediæ infederunt,
prout in latere australi ob oculos positū
habes; quem tandem 18. omnino vacuum
reliquerunt aspectui.

Tertio, Cæterum hæc Faculas esse
continuatione easdem, quæ exorta fue-
runt die 5. Aprilis, ego nullus dubito, &

II

huius rei argumenta afferro, ex motu, ex
tempore, ex situ; deniq; ex concomitan-
tia Maculæ b, quæ proportionali semper
interuallo secus easdem Faculas incessit;
quod autem aliquis variationem figuræ,
augmentationem, disiunctionem, rari-
tatem, intensiorem & remissionem for-
tassis obijceret, id ipsum contra Macu-
las etiam intorquebitur. & tamen ob hæ-
scæ mutationes nemo inficiabitur, Ma-
culam b esse eandem die 13. die 14. ad
finem vsq; quæ fuerat in initio, die 5. 6. &
7. &c. quia videlicet hic simplicior &
minor, illic maior, numerosior & tan-
dem Faculis illustrior apparuerit. eadem
ergo ratione, Faculæ eadem, sed altera-
tæ pertransierunt absq; dubio Solem; &
mora quidem eadem, qua Macula b,
quam Faculæ antecesserunt in ortu & oc-
casu, quasi medio die. quarum sub Sole
mora, si dies 13. attigit, certè non supe-
rauit. Et tantæ licet fuerint, atq; in hori-
zonte orientali tamdiu hæserint ascen-
dendo, in occidentali descendendo, inq;
ambobus vehementissimè effulserint, ta-
men extra vel ultra eosdem ne minimam
quidem flammulam sunt eiacularæ.

Quarto Macula porro b, licet igno-
bilis, & rara, per Solem tamen durauit,
& sensim creuit; postquam die 13. Fa-
culis tenuibus inflammari capta, iisdem
vehementer auctis, & ad exitum prælu-
centibus absumpta est, in vmbras tenues
resoluta. Considera bene schemata late-
ralia, diei 16. 17. & 18.

Quinto, Latitudo istarum Facularum,
vt patet ex die 6. & 7. circa ortum, &
15. atq; 17. circa occasum, fuit Solari dia-
metro AB, quasi subquintupla.

Sexto, Notandum diligenter, hæc
Faculas tam in ortu diei quinti, quàm in
occasu diei decimiseptimi, & decimisexti,
&c. horizonti ita infedissee, vt eundem
discretè & quasi ferratim illustrarint,
vmbris deinceps & alternis succeden-
tibus; neq; extra horizontis perime-
trum vlla eluxit, quemadmodum
introrsus illuxerunt, prout etiam ante
dictum.

*Ha Facula
fuerunt per
totum Solē
eadem, non
obstante con-
tinua muta-
bilitate.*

*Facularum
sub Sole mo-
ra, dierum
quasi tredec-
cim.*

*Extra hori-
zontem diu
in se sum nil
emiserunt.*


*Facularum
Latitudo.*

XX, Observationum

Imago.

Anno Iubilæo, M.DC.XXV.

In Domo Professa Romana Societatis.

Aprilis. 4^aCursus Facularum a, et Macularum b, à 5^o ad 18^m Aprilis.

Notæ in XXI. Observationum Imaginem, Aprilis
5. à die 18. Aprilis ad 1. Maij.

I.
OMISSIS multis alijs; habes hic Amice Lector notanda frequentia.
Primò, Macula a australis (vel potius

II.
Maculæ duæ coniunctæ) subintravit Solem die Aprilis 18. vesperi cum Faculis, & exiuit similiter cum iisdem, prout Typus ostendit.

Secundò

I.

Secundò, In ingressu vnitæ & secundum horizontem (more suo) graciles apparuerunt, quemadmodum in egressu die 1. Maij vesperi.

Tertiò, In progressu numerum, figuram, & habitum, itemq; nigrorem, densitatem & lucem, magnitudinem quoq; vehementer admodum variauerunt, attestante id Typo proposito.

Quarto, Nuclei similiter sub ingressum vniti, in medio disiuncti, & per totum varij fuerunt. Nimbus seu vapor nucleis circumiectus, eundem tenorem non seruauit, semperq; versus ortum magis protensus, quam versus occasum, & versus extrema orientalia rarior.

Quinto, Longitudo, dum Macula intra medium Solem versata fuit, latitudinem superauit.

Sextò, Intra sese, ferè semper Faculam valde albicantem, alba fissura expressam, circumtulit, figura pariter continuè variatam, prout expressum cernis.

Septimò, Faculas cum vmbris ante misit, & pone traxit, vmbrarumq; orientalium extremitates, versus centrum densiores, versus marginem rariores erant.

Octauo, per totum ferè Solem, area seu halone circumsepta fuit, furua versus centrum, cærulea ad marginem, expressam cernis die 21. & 22. perimetro punctulis descripta.

Nono, Quales autem Faculae & vmbræ fuerint, figura, magnitudine, situ, &c. habes expressum in figuris lateralibus, suis quibusq; diebus & horis, quibus sunt appositæ, nam neq; omnium dierum Faculas obseruauit, cum per totum Solem Maculam sint comitatæ, neq; omnes obseruatas huc apposui, præter eam, quæ in visceribus hiscentibus Macula hæsit.

*Amplitudo
Facularum.*

Decimo, Et hæc quidem vmbræ atq; Faculae in principio die decimo latitudinem suam æquauerunt quartam Solaris diametri partem; longitudo verò die 30. fuit pars diametri septima.

Vndecimo, Post medium cursus sensim sed notabiliter defecit hæc Macula, in plures & minores portiones scissa, prout figura satis docet.

*Arcuum i
nerariorum
curuitas, &
chordarum
ad Eclipti-
cam*

Duodecimo, Cursum molliter curuileum & ad Eclipticam obliquum tenuit, è borea in austrum reflexum: chordæ ab Ecliptica magis recedunt, sectio-

II.

que minus obliqua contingit.

Decimotertiò, Incessit sub Sole dies quasi tredecim. Nam die 18. hora 3. vespertina, horizontem ferme euaserat: die 1. Maij, hora 8. matutina extra eundem adhuc stetit; igitur si vtrinq; concedamus quattuor horas, habebimus dies tredecim &c.

Decimoquartò, Ad horizontem occidentalem diu hæsit per sex circiter horas.

Decimoquintò, Inter Faculas intrauit hæc Macula, & inter Faculas exiuit; & vicissim intra eandem Maculam intrauerunt, atque exiuerunt, totumq; Solis patens hemisphærium percurrerunt Facula, mira; vtrarumq; inter se commixtio, apparuit: ita vt in horizonte Macula à Faculis veluti tincta & nonnihil absorpta videretur.

Decimosexto, Hæc Macula videtur vna ex ijs esse, quæ redierunt. Tamen si enim pauca sint, quæ tanto tempore durent, vt ex auersa ad aduersam Solis faciem sensibilibiter remeant; sed citius pleræq; intereant; quia tamen tempus, locus, figura & situs condicunt, admodum probabile fit, hanc Maculam esse illam, quæ in Imagine 15. sub litera c Solem pertransijt, à die 22. Martij ad 4. Aprilis, quæ cum exiuerit in augmento, bene potuit tanto tempore perdurare, vt consumptis diebus quasi quattuordecim, tandem die 18. redierit; hoc vt credam facit idem parallelus, & locus omnino in parallelo idem. incredibile enim, ne dicam (ex praxi & genio huius Phænomeni vsitato) impossibile est, hanc Maculam de nouo exortam in loco illius necdum consumptæ. Nam illa, vt dixi in augescendo exiuit, hæc intrauit in decrescendo; vnde cum eundem locum teneant in eodem parallelo, se mutuò impediuisent contrarijs affectionibus: certum enim est, hanc Maculam tantum temporis augendo sibi vendicasse, quantum nunc decrescendo insumpsit, totum igitur hemisphærium latens & amplius durauisse certum est, igitur in patente olim fuit & occubuit augescendo, quemadmodum nunc per totum edurauit decrescendo. Vice versa, etiamsi Macula, c. quædo exiuit statim decreuisset (quod tamen non solet fieri, sed in statu manent aliquamdiu proportionaliter) tamen adhuc hemisphærium hoc attigisset. Loc-

*cam incli-
natio decre-
scit: polus
australis de-
scendit.*

*Mora sub
Sole dierum
tredecim.*

*Mora ad
horizontem
longa.*

*Macula à
Faculis di-
luta.*

*Macula re-
dux, in om-
nibus citis
stantijs.*

I.

cusigitur videtur convincere. accinit figura aliquo modo, & magnitudo, & comitatus ingens non Macularum, quæ parvæ & parvæ fuerunt, neq; hic ob loci defectum posita, sed Facularum & umbrarum, quas ex nuperis Maculis consequentibus exortas esse apud me certum est, & ratio atq; stabilis experientia, omnino persuadent. Periodica etiam ratio hanc

II.

rem manifestam facit. Sed de his suo loco alia s.

Decimoseptimò, Consule Imaginis XXVI. Tabellam primam, & videbis motuum, inclinationum, atq; Facularum proportionem: simulq; ex annotatis ab observatoribus Ingolstadianis, intelliges quanta differentia sit, inter parvum & magnum Circulum observatorium.

XXI. Imago Observa-
tionum.

M.DC.XXV.

5. Aprilis.

In Domo Professæ Romana Societatis



Curfus Maculae, à 18. Aprilis ad 1^m Maij; similis
aliis aliorum annorum tempore eodem.

APRILIS.

MAII.

D. H. O. E. l.

18. u. $3\frac{4}{5}$ - 30. 20.19. u. $5\frac{1}{2}$ - 16. 20.

21. u. 4. - 27. 30.

21. u. $4\frac{3}{5}$ - 23. 10.22. u. $3\frac{5}{6}$ - 31. 25.23. u. $5\frac{1}{2}$ - 15. 30.24. u. $5\frac{1}{3}$ - 17. 40.

D. H. O. E. l.

25. m. $9\frac{2}{5}$ - 11. 45.26. m. $7\frac{5}{6}$ - 26. 0.27. u. $4\frac{7}{8}$ - 24. 0.28. m. $6\frac{5}{6}$ - 20. 0.29. m. $9\frac{1}{2}$ - 16. 40.30. m. $7\frac{1}{4}$ - 22. 30.30. m. $11\frac{1}{2}$ - 46. 40.

30. u. 4. - 30. 0.

D. H. O. E. l.

1. m. $6\frac{5}{7}$ - 20. 10.1. m. $8\frac{3}{4}$ - 39. 0.1. u. $1\frac{4}{5}$ - 53. 10.

A. Oriens.

A. B. Ecliptica.

B. Occidens.

N

ff

Nora

Notæ in XXII. Observationum Imaginem, primam Maij, à die 2. da 14. eiusdem.



Conferuntur observationes Ingolstadianæ cū Romanis.

P RIMO, Maculæ a die 2. Maij duæ apparuerunt præcedente Facula. Die 3. comparuere cū comitatu multo illustriore Facularum, & pomposiore umbrarum in Maculas abeuntium procinctu; quemadmodum die 4. auctis Faculis & umbris rarefcentibus, multo plures prodiere Maculæ. quinto tandem die, debiles apparuere Faculæ, sed vegetæ Maculæ, quarum ultra viginti distinctas numerare licuit; cū Ingolstadianus non viderit nisi quinque. Die 5. Maij hora 9. mat. min. 24. inquit ipse, Maculæ quinque, quarum duæ borealiores admodum dilutæ, videntur esse hesternæ, reliquæ autem tres novæ. illæ autem duæ minutæ erant apud me quattuor. Porro idē Observator die 3. sic scribit. *Macula unica dilutissima, præcedentibus Faculis multis. sed pergit idem, Die 4. Maculæ duæ, cum Faculis, & Maculis circumscripta. hæ duæ non videntur esse illa hesternæ, sed aliæ, hesternæ non amplius apparente cū heri fuerit dilutissima.* Fuit omnino hesternæ, sed mole & socijs aucta. Nam Maculæ distinctæ fuerunt minimum sex. Quarum numerus die 6. infra vigesimum non constitit, licet aliquæ illarum valde ténues, & potius vestigia Macularum Soli immersa oculis obiecerint.

Tametsi die 7. & robore & numero satis creuerint, nam ad triginta distinctas Maculas nulla comparente Facula peruentum esse certissimum est. Ingolstadianus vidit quattuor, & putauit esse novæ, prius nunquam visas; sed fuere priores auctæ, vt patet ex schemate, & cursu, & loco.

Observationem diei 8. matutinam non posui, quia incurrissem in stationes diei 7. coeperunt tamen mole & numero deficere, quia supra viginti non fuerunt; Ingolstadij autem, inquit Observator, *Macula visæ 4. cælo utcunque sereno, quæ rursus videntur esse aliæ, vel valde oblique Eclipticam & celeriter secare.* Nec

sunt aliæ, neque ad Eclipticam sese præter morem habet, prout ex ijs patet, quas post meridiem pauciores quidem observatas annotavi. Die 9. mane, adhuc 18. apparebant, sed debiles & umbris pleræque similiores. Die 10. Sol in vaporibus Macularum aspectum negavit. Die 11. Maculæ 7. diversi vigoris conspectæ sunt, cum duabus Faculis. Die 12. Sol non fuit. Die 13. erant 5. Maculæ, cum Faculis luculentis ante & pone. Die 14. solæ Faculæ cum umbris ad exitum usque durarunt mane & vespere. Die 12. 13. & 14. de hisce nil animadvertum est Ingolstadij, tametsi peractæ sint observationes. Quia igitur cursum ex illis valde mancum fecissem, studio illas omisi; nimis enim paucæ, & ex ijs ipsis aliæ pro alijs fuerunt ab Observatore assumptæ, atque ex hoc capite pro novis habitæ, sed hi lapsus ex Circulorum parvorum defectu, & Macularum minutularum exilitate, atque variabilitate ferme horaria facile contingunt.

Vnde rursus, quod sæpius est inculcandum, parvorum Circulorum insufficietiam atque inde suppositiones, vel consequentias erroneas nonnunquam posse deriuari, facile concesserim. Quæ res Appellem in hisce alioquin apprime exercitatum, à multis asserendis abstinuit.

Secundò, Maculæ b, die 6. de nouo in Sole progeneratæ, die 13. in Faculas abiuerunt antequam occumberent.

Maculæ c cum Faculis luculentis exortæ, crescentibus inde Faculis ipsæ decreuerunt mole & nigrore, & post 9. diem, nullum sui vestigium per totum Solem dederunt. Interim

Nota primò, Maculas parvas, & Soli quodammodo inséultas, plerumque asferre magnas secum Faculas.

Secundò, Cursus Macularum a, & b, apparere ferme rectilineos ad sensum, atque ad Eclipticam inclinos.

Tertio, Istorum cursuum distantias inter se non esse æquales, vel parallelas. sed orientales ampliores, & strictiores occidentales.

Quartò, Et quanquam Maculæ c, ultra

Macularum in Faculas conuersio.

Notanda:

Curuitas & Inclinatio decrescunt, Polus descendit.

I.
ultra triduum non vigerint, nihilominus certum est, illarum cursum futurum fuisse alijs in situ ad Eclipticam non absterilem.

Quintò, Certum est cursum Maculae a, non attigisse dies tredecim.

Sextò, Huius Maculae cursui similes

II.
sunt cursus Macularum a, Duaci & Ingolstadij obseruatarum, anno 1624. à die 30. Aprilis, ad 10. Maij. prout expressum cernis Imagine XXVI. Tabella III. & Imagine XXVII. Tabula I. quos consulas licet.



XXII. Obseruationum

Anno Iubilaei 1625

Maij. 1^a

Imago

In Domo Professa Romana Societatis




Cursus Macularum a die 2^o Maij, ad 14^m eiusdem.

similes Ingolstadiano et Duaceno anni 1624.

A. Oriens.

AB. Ecliptica.

B. Occidens.



Notæ in XXIII. Observationum Imaginem, Maij secundam, à die 11. ad 23. eiusdem.

PRIMO Hæc Macula a, boreo-
austrina, traxit post se aliam b,
leuioris notæ, itemq; vmbra,
& Faculas insignes c.

Secundò, Ipsa Macula primo aspectu
prope horizontem ortuum, per 11. & 12.
diem, integra & continua fuit nucleo he-
betiore & nonnihil remissiore, quam ty-
pus refert, non ita atro, sed parumper al-
bedine diluto insignis, qui deinde die 13.
diuidi cæpit in duos primùm, postmo-
dum in tres distinctos nucleos, qui rur-
sus in duos die 16. coaluerunt, & sic ad
diem 22. permanserunt, quo tandem
post meridiem in vnum saltem apparen-
ter sunt coniuncti, semper ab initio ad
finem vsq; densitate & nigredine admo-
dum crescentes, & figuram nonnihil va-
riantes.

Tertiò, Faculæ & vmbra sub ingres-
sum congestæ, sensim dilatatae & disper-
sæ, oculos ipsarum minus curiosos effu-
gerunt, sed ad exitum figura & habitu
nonnihil immutatis, se denuo luculenter
stiterunt (id quod ordinarium est hisce
rebus) prout ad ideas laterales diei 11. &
12. itemq; 21. & 22. circa exitum spec-
tare datur. In medio autem tam vmbra
quàm Faculæ euauerunt, in quarum lo-
cum multæ nouæ Maculæ temporariæ
emerferunt, prout in Iconismo apparet.
nam hæc in omnibus obseruationibus fe-
re quotidiana sunt.

Quartò, Maculæ halitus seu vapor ex-
trematatem suam accommodat (id quod
in omnibus alijs Maculis vaporosis sem-
per & constanter obseruo) secundùm si-
tum & figuram nuclei seu nucleorum, ita
vt si qua parte nuclei prætuberant, in il-
lam ordinariè etiam circumiectus sese
vapor, seu nebula extendat, seruato ta-
men hoc fere semper stilo, vt sese magis
versus ortum extendat, minus in occa-
sum, ad quam partem nuclei sæpe quasi
nudi festinant; prout obseruator sedulus
quilibet experietur: & in hac ipsa Macu-
la, satis luculenter aduertitur, quam Ma-
culæ, Faculæ, & Vmbra pleræq; sunt se-
cutæ, nullæ fere antegressæ; quod tamen

*Nuclei in
occasû pro-
miores.*

1 non perperuum, quia aliquando aliter ex-
uenit.

Quintò, Macula b, post 16. diem eua-
nuit, videtur in Faculam conuersa quæ
5 sese restituit die 22. & c.

Sextò, Vmbra & Faculæ c, omnino
reuixerunt circa exitum, seu physice, seu
loco illarum similes.

Septimò, Tam Macula ipsa, quàm par-
10 tes eiusdem, seruauerunt situm semper eun-
dem versus Eclipticam, nam nucleus ma-
ior semper mansit vicinus ad illam, minor
semper respexit N, & in hoc etiam situ
ingressi sunt, sicut exierunt.

15 Octauò, Longitudo huius Maculæ la-
titudinem omnino æquauit, prout videre
est, ex intermedijs diebus, & stationibus
Maculæ sublimioribus.

Nonò, Cursus huius Maculæ, ad recti-
20 lineum vehementer propinquat, & Ma-
cula ab Ecliptica subtenfam sui arcus iti-
nerarij magis remouet, quàm priores,
angulumq; prioribus maiorem facit. Ma-
cula vero supra Eclipticam satis multis
25 diebus incessit, donec ex Aquilone in Au-
strum abiuit. Ad dies 13. in Sole hæsisse
certum videtur, nam 23. mane exiuisse,
residuæ ad marginem Faculæ sequaces
conuincunt: & si cætera rectè examinen-
30 tur, vltra dies tredecim peruenietur.

Decimò, Spacium inter nucleos al-
bum, semper præluxit instar Faculæ ful-
gidissimæ. Illud ipsum spatium enituit
semper vsq; ad diem 22. mane, donec
tandem vesperti coniunctis ad aspectum
35 nucleis, videri desijt.

Vndecimò, Familiare huic Phænome-
no est, vt quando Maculæ nucleis grauidæ
sibi vicinæ sunt, ex illa parte circumfusis
40 nebulis ad ipsos vsq; nucleos spoliuntur,
emicantibus indidem intensis Faculis, et-
tiam in medio Sole lucidioribus, quam
sit reliqua eiusdem Solis superficies ordi-
naria.

45 Duodecimò, Cæterum postremos hu-
ius Maculæ dies, & cursus peracti frag-
mentum reposui quoque sub littera b, in
Imagine sequenti 24. vbi vides aliam die
19. & 22. adiunctam obseruationem;

quippe

*Situs inua-
riatus.*

*Curuitas i-
tineraria
parua, incli-
natio qua
fieri solet se-
cundum hoc
Phænomenon
chordarum
ad Eclipticā
ferme mini-
ma i polus
australis pa-
rens, horizo-
ti vicinus.*

*Hiatus in-
tra Macu-
las faculosi,
tandem oc-
cultantur.*

*Hiatus in-
tra maculas
faculosi, va-
pores oblite-
rant, latera
interna præ-
cisa ostendunt.*

IMAGO SOLIS XXIII. 211

I
quippe hæc peracta est, hora vespertina
 $5\frac{1}{4}$. in qua Maculam horisanti vicino-
rem cernis, quam fuerat hic hora $3\frac{1}{4}$.
Simul aduertas velim, flexum itineris ex
parte occidentis non esse tam curuum,

II.
I atque is, qui ex parte orientis consistit:
imo illum potius rigidum, aut versus Se-
ptentrionem resupinatum, quam in au-
strum recuruum videri posse

XXIII, Imago Obser-

ANNO IVBILÆO M.DC.XXV.

2. Maij.

uationum

In Domo Professa Romana Societatis




Curfus Macularu, ab 11, Maij, ad 23, eiusdem

similis Curfibus, aliis alioru annoru tempore eode.

A, Oriens.

AB, Ecliptica.

B, Occidens.



Notæ in XXIV. Observationum Imaginem,
Maij tertiam à die 19. ad 31. eiusdem.

*Motus ad
Eclipticam
obliquus,
paullatim
fit rectili-
neus.*



I.

PRIMO, Vestigia itineraria
Macularum & Facularum,
paullatim ad rectitudinem
tendunt, & ab Ecliptica
semper magis recedunt in
plaga australi, vt patet in Macula a, acce-
dunt in boreali, prout facit c.

Secundò Macula a australis, traxit se-
cum ab ortu lateralem in austrum excur-
rentem Faculam, horizonti contiguam,
quam deinde sensim post se reliquit: ipsa
etiam Macula in duas diuisa, paullatim
defecit, & in tenuem vmbra conuersa,
rursus inter Faculas ad occasum perrexit;
vel potius ipsamet in Faculam conuersa
Solem exiuit. Solem patentem peragra-
uit diebus minimum tredecim, imo am-
plius, si rectus adhibeatur computus. Die
24. vt & 26. nouas comites ostendit.

*Mora cur-
sus dierum
tredecim, &
amplius.*


Tertiò, Maculae b, curriculum inte-
grum habetur in Imagine priore, hic frag-
mentum exhibetur, vt connexio oculis

II.

melius patefcat. Eodem modo Maculae
f, initium hic ponitur, continuatio tota
habetur in Imagine sequente. fuit sub in-
gressum vel Facula, vel vmbra adhærens,
tum sensim in Maculam excrescens, So-
lem peragrauit, vt habetur schemate se-
quente. d est Facula solitaria cum vm-
bris, quemadmodum & c.

Quartò, Maculae c, permixtae Faculis,
semper & sensim attenuatae post diem
29. nulla sui vestigia reliquerunt. itinera
omnium ad rectitudinem prona sunt.

Quintò, In margine adscripti caracte-
res numerales, sunt puncta per quæ linea
verticalis transiuit, illo die, quem ipse
numerus indicat, quando obseruatum
fuit. Arcus igitur horizontis minor inter
datum numerum & Eclipticam intercep-
tus, dat quantitatem Anguli, inter Eclip-
ticam & verticalem circulum interiecti.
&c.



XXIII, Imago
Observationu.

ROMÆ
In domo Professa Societatis

3. Maij.



à die 19, usq; ad 31, Maij; annj M.DC.XXV.
ABCD, Horizon; E pol; eiudem; AC, Ecliptica; D Zenith; B
Nadir; numeri marginales ostendunt linearum uerticalium
communes cu; horizonte sectiones.

MAII.

D	H	°	Elev.	°	D	H	°	Elev.	°
19. m.	8	—	35.	0.	26. u.	4 1/4	—	27.	0.
19. u.	6 1/4	—	13.	40.	27. m.	8 1/4	—	37.	30.
20. m.	—	—	24.	0.	28. m.	8 1/2	—	42.	40.
20. u.	4 1/2	—	33.	0.	Eod. u.	4	—	33.	30.
21. m.	6 1/4	—	21.	30.	Eod. u.	4 1/2	—	29.	30.
21. u.	5 3/4	—	20.	10.	Eod. u.	6 1/2	—	13.	30.
22. m.	—	—	21.	0.	29. m.	—	—	20.	0.
22. u.	5 1/4	—	17.	40.	30. u.	4	—	34.	40.
23. m.	—	—	19.	17.	31. m.	6 3/4	—	19.	20.
23. u.	5	—	25.	0.	31. m.	8 1/8	—	35.36.37.	
24. m.	8 1/2	—	39.	20.					
25. u.	6	—	15.	0.					

Nota

Notæ in XXV. Obseruationum Imaginem, Maij
qurtam, Iunij primam, à die 31. Maii
ad 18. Iunij.

I.



R I M O, Macule
sunt quasi in Tro-
pico æstiuo, ha-
bentq; digressionē,
& maximam de-
clinationē vtrim-
q; ab Ecliptica,
ideòq; stant quod-

ammodo ad tempus, & sensibilem mo-
tus mutationem non faciunt, sed sunt om-
nes ad sensum rectilinei nutant autem in
vtramq; partem, vt examinanti patebit.
a australis æmulatur motum rectum; b
nititur ad curuum, eumq; concauitate
conuersum versus z, Septentrionem: c
rectilineum quoq; præ se fert; h vtrin-
q; nutat, circa ingressum & exitum.

Secundò, Omnes hi motus ad sensum
inter se apparent quasi paralleli.

Tertio, Omnes si produci cogitentur
Eclipticam obliquē, & ad angulos æqua-
les interfecant.

Quartò, Omnes æqualem sub Sole
moram fecerunt, id est dierum plus mi-
nus tredecim. Item spatia, & tempora
diurna orientalia, occiduis ad sensum
æqualia.

Quintò, Macula a duplicitatem non-
nunquam ostendit, creuit ascendendo,
decreuit descensu, & gemina quodam-
modo exiuit, pone trahens Faculam vti
in ingressu.

Sextò, Macula b, gemella sēper decre-
uit, & 2. 3. 4. 5. die omnino in duas di-
screta fuit; postea in vnam coalescens,
ita notabiliter defecit, vt ad horizontem
per quam difficulter appelleret. Faculam
post se immediatē traxit, prout primo e-
tiam Iunij; sed Faculam d, circa centrum
euanidam, reddere visa est, die 8. 9. &
10. licet tenuem valde, & plurimum im-
mutatam. Situm eundem ad Eclipticam
in partibus suis tenuit.

Septimò, Macula h, die 6. Iunij exor-
ta, Maculæ a, in Maij Imagine 23. expo-
sitæ haud multum absimilis, eundem
quasi parallelum descripsit; cum Facu-
lis post se tractis intrauit & exiuit. Nu-

II.

cleos modo continuos, modo discretos
ostendit, & secundum eisdem circumie-
ctam nebulam effigiauit, in medio nu-
cleorum spatio non nihil exalbescens.
De hac Macula vide plura Numero 11.

Octauò, Macula c, est continuatio
Maculæ f, in Imagine priore, quæ ex Fa-
cula enata in Faculā ferè reuersa exiuit.

Nonò, Macula i. minutissima, Facu-
lam instar Cometæ in Austrum exporri-
gens, post diem decimam penitus interiit,
neq; vnquam quidquam sui deinceps red-
hibuit.

Decimò, Numeri marginales osten-
dunt quo loco, obseruationis tempore,
linea verticalis perimetrum Solarem tran-
siuerit, angulumq; Eclipticæ & verticalis
ad centrum C determinant.

Vndecimò, Redeo ad Maculam h &
illam eandem, quæ fuit Macula a in Im-
agine 23. atq; adeo reducem esse, nil am-
bigō. Omnia id suadent. In primis vero
locus, tempus, & magna ex parte figura
Nucleorumq; ratio & constitutio.

Et de loco quidem, cum hoc tempore
Maculæ circa conuersionem æstiuam;
Poliq; circa horizontem in descensione
& ascensione recta versentur, Macula-
rumq; axis, circa quem voluuntur in eo-
dem quasi loco hæere, neq; versus or-
tum aut occasum flecti videatur; hinc
mirum esse nemini debet, si Macula a,
ex Maio, huc vsq; eodem quasi loco con-
sistere, atq; oriri potuit. quia nimirum
axis, circa quem versata fuit, sensibilibiter
mutatus non fuit. de qua tamen re suis
locis exactius atq; ex professo differetur.
interim confer Macularum orientium
culminantium, atque occidentium ad
Eclipticam situm & distantiam, & debi-
tam vbiq; reperies symmetriam.

Tempus autem hanc rem valde pro-
bat: quia Macula a, in Imagine 13. ab
vndecimo ad 22. Maij visa, die 23. eiusdē
mane occubuerat: ex illo ergo tempore
si numeremus ad diem sextum matuti-
num Iunij inueniemus dies 14. quia verò
Macula h, die sexto supra horizontem
iam

Omnium
Macularū
motus ad sē-
sum rectili-
neus, paral-
lelus, propor-
tionalis, &
duratione
æqualis.

Macula b,
ex omnibus
circumstan-
tijs, reduc.

Argumentū
ex loco.

Argumentū
ex Tempore
pro Macula
reduce.

XXV. Imago
Observationis

IVNIVS
Romæ in domo Professa Societatis

4. Maij.
1. Iunij.

Cursus à die 31. Maij. ad 18. Iunij. M.DC.XXV. similis

alio aliorum annorum tempore eodem
Maij. die 31. hora mat: 8 $\frac{1}{2}$. sub elevatione

gr: 37. min: 0

A Oriens. B Occidens Macularum. AB. Ecliptica.

AZB. Solis pars Zenith. ANB. Nadir respectans. Numeri

marginales, 31. 1. 2. et reliqui, indicant communem plani Ver-
ticalis, cum Sectione, tempore Observationis.

IVNII.

Dies. Hora. O. Elevatione.

Dies. Hora. O. Elevatione.

1.	6 $\frac{3}{4}$ mat.	21. 30.
2.	6 $\frac{3}{4}$ mat.	21. 15.
3.	6 $\frac{3}{4}$ mat.	21. 30.
4.	6 $\frac{3}{4}$ mat.	21. 30.
5.	6 $\frac{3}{4}$ mat.	20. 40.
6.	8 mat.	36. 0.
13.	8 $\frac{1}{4}$ mat.	40. 0.
14.	8 $\frac{1}{4}$ mat.	37. 50.
15.	8 $\frac{1}{4}$ mat.	36. 0.

7.	6 $\frac{3}{4}$ mat.	19. 50.
8.	mane.	25. 0.
9.	7 $\frac{3}{4}$ mat.	28. 0.
10.	7 $\frac{1}{4}$ mat.	26. 0.
11.	8 $\frac{3}{4}$ mat.	30. 30.
12.	8 mat.	35. 40.
16.	8 mat.	32. 0.
17.	8 mat.	35. 0.
18.	8 $\frac{1}{4}$ mat.	38. 0.

I.
iam emerferat, demendum est id quod
illi spatio debetur, ab illo quattuordecim
dierum numero, & sic in latente hemi-
sphærio non sunt insumpti omnino dies
tot, sed tredecim, & plus aliquanto:
quod tēpus si adiiciamus ad illud quod
Macula in hemisphærio patente consump-
sit, habebitur Summa motus periodici
consistens intra dies 26. & 27. hanc can-

II
dem summam efficies, si tempus vel ab
occasu diei vigesimi secundi in Maio, ad
occasum diei 18. in Iunio; vel à meridie
diei 16. ad meridiem diei 12. vel deni-
que ab ortu ad ortum, computes: sem-
per eandē summam temporis periodici
inter dies 26. & 27. constitutam, depre-
hendes. de qua tamen re, suo loco exa-
ctius.

Figur-

Notæ in XXV. Observationum Imaginem, Maij
qurtam, Iunij primam, à die 31. Maii
ad 18. Iunij.

I.



*Omniū
Macularū
motus ad sē-
sum rectili-
neus, paral-
lelus, propor-
tionalis, &
duratione
æqualis.*

IRIMO, Macule sunt quasi in Tropico æstiuo, habentq; digressionē, & maximam declinationē vtrinq; ab Ecliptica, ideòq; stant quodammodo ad tempus, & sensibilem motus mutationem non faciunt, sed sunt omnes ad sensum rectilinei nutant autem in vtramq; partem, vt examinati patebit. a australis æmulatur motum rectum; b nititur ad curuum, cumq; concavitate conuersum versus z, Septentrionem: c rectilineum quoq; præ se fert; h vtrinq; nutat, circa ingressum & exitum.

Secundò, Omnes hi motus ad sensum inter se apparent quasi paralleli.

Tertiò, Omnes si produci cogitentur Eclipticam obliquè, & ad angulos æquales interfecant.

Quartò, Omnes æqualem sub Sole moram fecerunt, id est dierum plus minus tredecim. Item spatia, & tempora diurna orientalia, occiduis ad sensum æqualia.

Quintò, Macula a duplicitatem nonnunquam ostendit, creuit ascendendo, decreuit descensu, & gemina quodammodo exiuit, pone trahens Faculam vti in ingressu.

Sextò, Macula b, gemella sēper decreuit, & 2. 3. 4. 5. die omnino in duas discreta fuit; postea in vnam coalescens, ita notabiliter defecit, vt ad horizontem per quam difficulter appelleret. Faculam post se immediatè traxit, prout primo etiam Iunij; sed Faculam d, circa centrum euanidam, reddere visa est, die 8. 9. & 10. licet tenuem valde, & plurimum immutatam. Situm eundem ad Eclipticam in partibus suis tenuit.

Septimò, Macula h, die 6. Iunij exorta, Macula a, in Maij Imagine 23. expositæ haud multum absimilis, eundem quasi parallelum descripsit; cum Faculis post se tractis intrauit & exiuit. Nu-

II.

cleos modo continuos, modo discretos ostendit, & secundum eisdem circumiectam nebulam effigiauit, in medio nucleorum spatio non nihil exalbescens. De hac Macula vide plura Numero 11.

Octauò, Macula c, est continuatio Maculae f, in Imagine priore, quæ ex Facula enata in Faculā ferè reuerfa exiuit.

Nonò, Macula i. minutissima, Faculam instar Cometæ in Austrum exporrigens, post diem decimam penitus interiit, neq; vnquam quidquam sui deinceps rehibuit.

Decimò, Numeri marginales ostendunt quo loco, obseruationis tempore, linea verticalis perimetrum Solarem transuerit, angulumq; Eclipticæ & verticalis ad centrum C determinant.

Vndecimò, Redeo ad Maculam h & illam eandem, quæ fuit Macula a in Imagine 23. atq; adeo reducem esse, nil ambigo. Omnia id suadent. In primis vero locus, tempus, & magna ex parte figura Nucleorumq; ratio & constitutio.

Et de loco quidem, cum hoc tempore Maculae circa conuersionem æstiuam; Poliq; circa horizontem in descensione & ascensione recta versentur, Macularumq; axis, circa quem voluuntur in eodem quasi loco hære, neq; versus ortum aut occasum flecti videatur; hinc mirum esse nemini debet, si Macula a, ex Maio, huc vsq; eodem quasi loco consistere, atq; oriri potuit. quia nimirum axis, circa quem versata fuit, sensibilibus mutatus non fuit. de qua tamen re suis locis exactius atq; ex professo differetur. interim confer Macularum orientium culminantium, atque occidentium ad Eclipticam situm & distantiam, & debitam vbiq; reperies symmetriam.

Tempus autem hanc rem valde probat: quia Macula a, in Imagine 13. ab vndecimo ad 22. Maij visa, die 23. eiusdē mane occubuerat: ex illo ergo tempore si numeremus ad diem sextum matutinum Iunij inueniemus dies 14. quia verò Macula h, die sexto supra horizontem iam

*Macula b,
ex omnibus
circumstan-
tijs redux.*

*Argumentū
ex loco.*

*Argumentū
ex Tempore
pro Macula
reduca.*

XXV. Imago
Observationis

IVNIVS
Romæ in domo Professa Societatis

4. Maij.

1. Iunij.



Cursus à die 31. Maij. ad 18. Iunij. M.DC.XXV. similis

alio aliorum annorum tempore eodem
Maij. die 31. hora mat: $8\frac{1}{2}$. sub elevatione

gr: 37. min: 0.

A. Oriens. B. Occidens Macularum. AB. Ecliptica.

AZB. Solis pars Zenith, ANB. Nadir respectans. Numeri
marginales, 31, 1, 2, et reliqui, indicant communem plani Ver-
ticalis, cum Sectione, tempore Observationis.

IVNII.

Dies. Hora. O. Elevation.

Dies. Hora. O. Elevation.

1.	$6\frac{3}{4}$ mat.	21. 30.
2.	$6\frac{3}{4}$ mat.	21. 15.
3.	$6\frac{3}{4}$ mat.	21. 30.
4.	$6\frac{3}{4}$ mat.	21. 30.
5.	$6\frac{3}{4}$ mat.	20. 40.
6.	8 mat.	36. 0.
13.	$8\frac{1}{4}$ mat.	40. 0.
14.	$8\frac{1}{2}$ mat.	37. 50.
15.	$8\frac{1}{8}$ mat.	36. 0.

7.	$6\frac{3}{4}$ mat.	19. 50.
8.	mane.	25. 0.
9.	$7\frac{3}{4}$ mat.	28. 0.
10.	$7\frac{1}{4}$ mat.	26. 0.
11.	$8\frac{3}{4}$ mat.	30. 30.
12.	8 mat.	35. 40.
16.	8 mat.	32. 0.
17.	8 mat.	35. 0.
18.	$8\frac{1}{4}$ mat.	38. 0.

N

I.

II

iam emerferat, demendum est id quod illi spatio debetur, ab illo quattuordecim dierum numero, & sic in latente hemisphærio non sunt insumpti omnino dies tot, sed tredecim, & plus aliquanto: quod tēpus si adijciamus ad illud quod Macula in hemisphærio patente consumpsit, habebitur Summa motus periodici consistens intra dies 26. & 27. hanc can-

dem summam efficies, si tempus vel ab occasu diei vigesimi secundi in Maio, ad occasum diei 18. in Iunio; vel à meridie diei 16. ad meridiem diei 12. vel denique ab ortu ad ortum, computes: semper eandē summam temporis periodici inter dies 26. & 27. constitutam, deprehendes. de qua tamen re, suo loco exactius.

Figur-

I.

*Pro Macu-
la reuerſa,
Argumentū
ex Figura,
& Situ. &c.*

Figura quoq; magna ſimilitudo in-
tercedit; quemadmodum intuenti pate-
bit: numerus quoq; & ſitus nucleorum
vehementer conſonant. quod ſi magni-
tudinis defectum cauſſari quis velit, e-
tiam eandem vnius hemiſphærij patuli
Maculam, de die in diem, ex hora in ho-
ras viſam, repudiabit, atq; eandem ne-
gabit; cum tamen conſtet eandem, ſed
auctam vel minutam, & figura nonnihil
immutatam eſſe. itaq; ſicut ex aliquantu-
la figura & magnitudinis variatione, non
altera ſed alterata Macula exiſtit, ita
hanc in eodem parallelo, tempore, & lo-
co competente reuiſam, non alteram
ſed decremento alteratam, plus quam
probabile exiſtit. Nam ipſa ab vndecimo
Maij die Solem crescendo peruagata eſt,
& in ſummo vigore, ſicut cernere eſt,
in Imagine 24. ad diem 22. occubuit;
ita vt per totum hemiſphærium latens
abſq; vilo dubio ſalua & incolumis per-
maſerit; ſenſimq; more aliarum deinde
diminuta ſit, prout in hoc curſu à 6. ad
18. Iunij ſatis patet. Sicut autem ex hu-
ius Phænomeni conſuetudine fieri nequi-
uit, vt Macula hæc tam plena atq; inten-
ſa occumbens, tam eeleriter in oppoſito
hemiſphærio fuerit diſſipata; ita præter
omnem fidem eſt, aliam eius præciſe lo-
co tam cito natam, tanto deinde tempo-
re duraiſſe: vtrumq; enim aliquid præ-

*Pro Macu-
la reduce,
Argumentū
ex aliarum
Macularū
natura. &c.*

II.

ter morem Phænomeni accidiſſet: hic e-
nim tarde nata & aucta celerrimè illie
cito producta valde lente conſumpta fuiſ-
ſet: cui tamen, conſtans, ſtabilis atq;
perpetua experientia reclamat. Etenim
quantum temporis Macula quæuis auge-
ſcendo, tantum ſibi vendicat decreſcen-
do: ſi quidem ſecundum ea, quæ hæte-
nus in obſeruandi continua praxi addi-
dici, ratiocinandum ſit. igitur cum Ma-
cula h, à die 6. Iunij ad 18. vſq; conti-
nuè decreuerit, oportet illam tot etiam
diebus incrementa feciſſe; & cum die
18. adhuc ſatis magna occubuerit, ne-
ceſſe eſt illam in alterum hemiſphærium
veniſſe; vnde oportet eandem quoq; non
in latente ſed patulo hemiſphærio antea
quoq; viſam eſſe: cum autem alia præter
Maculam a menſe Maio in illo parallelo
non apparuerit vlla; rectè concludit ra-
tio, Maculam a & h eſſe eandem: & a
quidem in augmento, h in decremento,
oppoſitum autem hemiſphærium eidem
præbuiſſe domicilium in ſtatu & vigore
ſummo verſanti. quemadmodum & cu-
nabula & ſepulchrum ibidem quoq; re-
periſſet. Nam 11. Maij Solem augeſcens
intrauit, exiuit eundem 22. tota vegeta;
deinde reuiſit nos denuo 6. Iunij decre-
ſcens, & ruriſus effæta iam ætate reliquit
die 18. eiufdem; neq; ante diem 11. Maij,
neq; poſt 18. Iunij vnquam animaduërſa.

Notæ in XXVI. Obſervationum Imaginem, ex
variis obſervationibus Friburgi Briſgoiæ,
& Ingolſtadij factis compoſitam, ad
annos 1622. 1624. 1625 & Men-
ſes Aprilem, Maium, Iun.

I.



Equar in hiſce Notis
ordinem Menſium, &
Numeros Tabellarum
Lateralium: Voco Ta-
bellas hæſce Laterales,
quia ex Latere quod-
ammodo eas in ordi-
nem reliquarum intrudo; cum enim ex
inſtituto ordinatum Romanarum obſer-

II.

uationum Exercitum in aciem educam,
prout cuius intuenti clarum euadit, hæ-
ſce Tabellas quaſi voluntarias & honora-
rias ſuppetias locis opportunis diſpono.
Imago igitur hæc XXVI. continet va-
rias Macularum obſervationes, partim
in Vniuerſitate Friburgana, partim In-
golſtadiana peractas: cum enim olim v-
trobiq; publicè, & Friburgi vltimò qui-
dem,

*Friburgen-
ſium Obſer-
uationum
origo.*

XXVI, Imago Observationum ex octo Tabellis lateralibus conflata, observationes et Cursus Friburgenses atq; Ingolstadienses complexis, ex annis 1622, 1624, 1625, et Mensibus, Aprilis, Maio, Iunio.



dem, sed primus ex Societate nostra Mathesin professus, & inde ad Serenissimum Archiducem Austriae Carolum, Episcopum Brixiensem atq; Vratislaviensem, necnon supremum Ordinis Teuthonici Magistrum &c. mem. pientissimae in Silesiam euocarer, imo a studiis velut auocarer, rogavi Successorem; & Discipulum meum Georgium Schönberger, vt

I quoniam olim Phaenomenon Solare, motumq; ipsius curuileum plenius & perfectius propalare cogitarem, interim in gratiam meam Observationes meas eatenus continuatas pertexeret; neq; necessarium esse, vt quotidianas conficeret; sufficere biduanas, triduanas, aut plurium dierum intercalares: cum enim quauis Macula in Sole percurrendo absumeret dies

I.

dies minimum decem, ad 14. vsq; (neq; enim præcisos illarum ambitus finibus certis determinaueram, sed obseruationibus atq; examinibus vltioribus rem tantam reseruaueram, sicut in Apelle meo patet) si primi ingressus atq; vltimi exitus puncta Macularum Centralia, cum nonnullis intermedijs accuratè annotarentur, cursus rectitudinem vel curuitatem ex ijs sufficienter posse argui. Vnde maximopere illi ortus occasusq; & centrales Macularum obseruationes commendauit; & si insigniorem nancisceretur aliquam Maculam, totum ipsius curriculum obseruare ne grauaretur. Quæ cum satis studiosè fecisset, misit mihi roganti anno 1625. eas, quas vtrobiq; fecit Macularum & Facularum animaduersiones, vnà cum calculo & inducta Ecliptica; ita vt mihi aliud nil fuerit opus, quàm vt eas in vnum cursum redigerem; quod fidelissimè feci, & in hoc opere cum ipsius Notis & meis Glossis æri incisas tibi Lector Amice offero: sed vt adhuc certior essem, omnes & singulas meis quoq; examinibus subieci, neq; discrepantiam aliquis momenti inueni.

Auctor in alienis obseruationibus proponendis fidelis.

Tabella I. Lateralis. Continet cursum Maculæ a, à die 21. ad 30. Aprilis. respondet Cursui Romano a, Imagie XXI explicato, à die 18. Aprilis, ad 1. Maij. Quid autem de suo cursu scribat Obseruator Ingolstadianus accipe.

Die 21. Aprilis hora 8. matut. Macula quasi tres, quas secutus est integer manipulus Macularum, præcipuè Facularum, quæ distingui certò non poterant, totus tamen hic notatus Circulus c, plenus fuit. & eodem modo vise sunt etiam hora 12. A die 9. Aprilis vsq; ad hunc, cælum nunquam serenum fuit. hæc ille. vnde causam habes, cur Aprilis Ingolstadianus satis sterilis fuerit, dierum prædictorum. Figuram genuinam Macularum, Vmbrarum & Facularum expressam habes in meo schemate, nam in istis paruis circulis hæc accurate videri, aut describi nequeunt. sed pergit Obseruator.

Conferuntur Macula Ingolstadianæ cum Romanis.

Die 22. Aprilis, hora 9. min. 7. Macula quattuor per nubes albicantes vise, sequente adhuc, vt heri, Macularum, & Facularum copia, vsq; ad peripheriam; &c. hætenus ille. quæ fuerint hoc die Maculæ, Faculæ, & Vmbræ, habes in schemate meo.

II.

Die 23. ait ipse hora 8. min. 7. Sole puro & sereno, Macula octo, melius quàm prius distingui poterant. Macula quarta (orientalior) rarissima fuit instar nebulae. In Obseruatione mea, annotaui in vniuersum Maculas distinctas minimum 18. sed huc non exposui, quia solam Maculam a prosequi statui.

Die 24. hora 9. min. 44. Macula octo, quarum (orientaliores) vix erant notabiles, dilutiores quàm heri, reliquæ auctiores & quasi congeries multarum, secuta sunt priores Faculæ adhuc plurimæ, & simile quiddam instar vmbrae tenuissimæ. Congeriem Macularum vides in meo schemate, ad diem 24. in qua, hora 8 $\frac{1}{2}$. matutina, inueni distinctos nucleos 14. semet mutuo non tangentes. Faculas & vmbas huc penuria loci non transtuli.

Die 25. hora 9. min. 20. Macula nouem. In meo schemate satis expressus est Macularum & Nucleorum numerus.

Die 26. Macula b. Confer cum meo.

Die 28. Aprilis hora 1. min. 9. Macula unica. Inuenies apud me minimum octo.

Die 29. Aprilis, Macula unica, quam secuta est nubecula tenuissima. Habes in meo Typo Maculas distinctas sex, cum Faculis, Vmbris & nimbo circumcirca.

Die 30. Aprilis mane Macula unica, notabiliter quam heri minor, quam secuta sunt Faculae multæ. De eodem vespere hora 2. min. 7. Macula unica notabiliter minor in hac quàm in priore obseruatione fuit, vna cum Faculis. Constitutionem totius diei trigesimi, ab hora matut. 7. vsque ad 4. vespert. habes exactè in meo diagrammate, quod consulas velim, quia videbis non tantum geminam omnium configurationem, sed augmentum Maculæ matutinæ, & decrementum magnū vespertinæ: vt mira sit in obseruationibus vtrunque consonantia.

De die 1. Maij nil habet Obseruator. Hunc cursum cum sua explicatione enucleare volui, vt videas primò exactum ipsius in Sole ad Eclipticam situm, & cum meo loci visi conuenientiam; & omnem prorsus abesse parallaxin agnoscas: tum deinde exemplo rursus practico discas, quanto interuallo circuli isti paruuli à magnis meis relinquuntur, in detegendo hoc Phænomeno.

Macula instar Nubecularum Ingolstadij obseruata.

Augmentum Macularum & decrementum aequè Ingolstadij atque Romæ animaduersa.

Nulla in hoc Phænomeno parallaxis.

IMAGO SOLIS XXVI. 219

I.

Tabella II. Continet Cursum Maculae a, Ingolstadij anno 1624. obseruatum, à die 30. Aprilis ad 10. Maij. Cui simillimum, Maculae & anni eiusdem, reperies Duacenum in Tabula II. Imaginis sequentis XXVII. expressum.

Qualitas via itineraria & similitudo maxime quaeritur per istas obseruationes, & reperitur in annis & Maculis diuersis. Ego anno 1625. illi similiorem in situ, sed Maculis alijs non reperio, quam Cursum Macularum a, in Imagine XXII. explicatum. Confer & videbis situs & flexus itinerarij ad Eclipticam similitudinē, quam per ista intendo.

Tabella III. habet duos Cursus Macularum a, & b. Quorum primus respondet Imagini XXIII. Notas Ingolstadianas ad verbum adscribo.

Die 12. Maii, visa Macula tantum una cum diluissima alia minore. prima autem fuit magna. hæc ille.

Conferatur obseruatio-- nes Ingolstadianæ cum Romanis. Consule schema meum ad dictum diē & videbis præter dictam magnam Maculam, præter umbras & Faculas nō obseruatas, quinque minimum dilutas Maculas.

Die 16. inquit ille (omitto enim aliquos qui singulare nil habent) Macula visa 4. quarum 1. in duas diuisa videbatur, ferè contiguas. idem de diuisione etiam heri die 25. annotauit. Vbi vides diuisionem illam Nuclei, & albæ intercapedinis vehemens iubar, etiam in paruo hoc Circulo animaduersum esse.

Nuclei & extraordinarium iubar fasculosum.

Flauescentia Ingolstadij insolita, Romana frequēs.

Vmbra nucleis circumfusa.

Die 17. Maii Macula 5. quarum prima a, circumcirca videbatur diffundere aliquam umbram, & versus Maculam 4. flauescentiam, præter solitum vitri, quæ flauescentia se usque ad quartam extendebat. Maculam. In ingressu visæ Faculae multæ circa g. Hæc ille. Colores eiusmodi Maculae nucleis desioribus præditæ, quasi semper offerunt, præsertim lucida materia veluti arctata. atque eluctante intra nucleos, prout hic etiam contigit. Macula illa 4. ad quam nebulae pertigerunt fuit inter boreales occidentalior. Vmbrae istæ seu Nebulae Nucleis circumfusi sunt vapores seu tenuiores Macularum partes. in schemate meo apparent ista quidem satis, sed tamen ante prandium h. 6. $\frac{1}{4}$. sub Solis elevatione 20. 50. comitiua & dispositio paullo alia extitit, quam proinde, vnâ cū Facula g, repræsentō, in Imag. 23. à die 15. ad 18. Macula igitur a, dicta hora, distinctas partim in se, partim extra se Maculas omnis generis continuit minimum viginti; aliquas tenues & equabiles, ali-

II.

1 quas mediocriter densas, aliquas cum nucleis, aliquas sine, aliquas veluti nucleos ipsos. Ad flauescentiā extraordinariā quod attinet, capi hanc singulariter annotare, 5 die 16. mane h. 6. $\frac{1}{4}$. cum Sol altus esset gradus 21. hisce verbis. *Maculae centrales u, λ, μ, ν, ξ, Nouæ aliquot emerferunt: apud λ sunt quattuor; apud μ tres, apud ν, duæ, apud ξ est adhuc gibbus, apud u, sunt quattuor. Inter μ & ν est spatium flauescens & albescens, etiam mutato situ vitri; nucleus triplex, quorum maior valde densus est, duo minores sese ferme contingunt.* 15 *Inter nucleos album spatium, fortius reliquo Solis corpore allucescens, umbris nullis infectum, cuiusmodi Nucleos alioquin circumstant, vaporum instar. Totius Maculae constitutionem adiectam habes in medio huius schematis, eo situ ad lineam A B, & punctum C, quo se habuit in Sole ad Eclipticam, eiusque centrum C. in Circulo meo Obseruatorio ordinario; vt inde iudicium de proportionē facere scias. apud 20 " Macula maior hætenus ab initio Maculam a, secuta, deficit, sed minor noua enata non diu hæsit; apud λ cernis quattuor paruas, quattuor apud μ, & plures quàm duas ad ν, sunt enim minimarum manipuli. spatium igitur album oblongū punctulis supernè conclusū, flauescebat & albicabat per triduum apparitione quasi 30 extraordinaria, propter vehementem colorum intensiōem.*

Ex obseruatione Romana Flauescentis & multarum rerum notatu dignarū accurata descriptio.

Flauescentia extraordinaria tridua-

35 *Die 19. Maii, Mac. 5. & inter Faculas, Maculam C præcedentes, visa est Facula insignior g. hæc Obseruator. In meo schemate apud Maculam a, inuenies præter ipsam plures quàm octo paruulas. Cætera dat Cursus a, Imaginis XXIV. Pro Facula insigniore, consule Appendicem meam paullo inferiùs.*

40 *Cursus alter Maculae b, in hac eadē III. Tabella explicatus, respondet meo Cursui a, in Imagine XXIV. compræhenso & explicato, neque aliud discrepantiæ videbis, quàm quod in meo Circulo obseruatorio vt pote maiore, omnia, & singula enucleatius multò contempleris: licet in locis Macularum, & sitibus itinerum ad Eclipticam, summa semper consonantia proportionalis, etiam in hisce minoribus notetur: id quod mihi ex aliorum obseruationibus ad meum propositum sufficit.* 45

Loca visa semper sibi respondent.

55 *Tabella IV. & V. sunt obseruatæ Frisburgi, anno 1622. VI. verò est obseruata* 55 *Ingol.*

I.

*Diversorum
annorum et
Macularum
in Cursibus
maxima si-
militudo.*

*Motus Rec-
tilineus Fri-
burgi & In-
golstadt mē-
se Maio o-
lim observa-
tus.*

Ingolstadij. Anno 1624. & licet neq; lo-
corum, neq; annorum eorundem sint, ni-
hilominus quia in mensem Maium circa
eosdem fere dies incidunt in simili ferme
ab Ecliptica distantia, similitudine quoq;
cursus atq; obliquitatis ad Eclipticam tā
inter se, quam cum Cursu Romano Ma-
culæ a, in Imagine XXIV. expressæ, con-
cordant. Confer singula, & veritatem a-
spicies. In Tabella VI. die 17. non appa-
ruit nisi Macula a, die deinde 18. & 19.
ostendit sociam præuiam, in cuius locum,
cū concurreret sequenti die, distinxī eā
linea circulari. die 24. sola comparuit.
& 26. Faculam australem traxit. Vides
autem ubiq; motus rectilinei speciem ob
oculos versari.

Tabella VII. Complectitur duos Ma-
cularum a. & b, Cursus, anno 1625.
Ingolstadij observatos, quorum ille bo-
reus, respondet Romano b, in Imagine
XXV. proposito; hic b, austrinus æmula-
tur Romanum a. Cū autem mei ab
horizonte ad horizontem pertingant, hic
utrinq; caput & cauda deest Nam Macu-
la a, primum sibi locum vendicat die 30.
cū apud me die 28. Maij horizontem
quodāmodo raserit ingressa, hic vna sim-
plex apud me etiam in horizonte gemi-
nata est animaduersa. Post diem 7. ex ea
nil visum ampliùs Ingolstadij, etiam si Sol
accuratè perlustratus esset, mihi autem
ad 10. vsq; diem, cum Faculis, sed minima
alluxit. Nunc audiamus parumper Obser-
vatores Ingolstadianum in ijs saltē die-
bus, ubi aliquid observatu dignū occurrit.

*Die 6. Iunii, inquit, ho, 10. Macula duæ
cum Faculis circa d, (Macularum ambas
hic expressas habes in cursibus boreo &
austrino) hora tamen pomeridiana 6. visa
est Macula Solem ingredi, per inspectionem
nullā ferè habens latitudinem; in hac for-
ma, non enim per immisionem hodie intro-
missa est. Loquitur autem de Macula cur-
sus a, in Tabella VIII. expositi. In meo
verò cursu Maculæ h in Imagine XXV.
contento, inuenies eandem per modum
gracilis lineolæ observatam die 6. ho. 8.
mat. & ab horizonte quidem liberam. Ex
quo habes 1. meū observandi modū om-
nino nullis posthabendum imo hætenus
anteferendum, 2. Quam Solaris per He-
lioscopium inspectio, accuratè quoq; res
minutas in Sole detegat. 3. Quādiu Ma-
culæ circa horizontem hæreant. 4. Quam*

Notanda.

II.

Circuli observatorij tam parvi ad Macu-
las & Faculas marginales parum valeant.
Nam hora 10. qua Ingolstadij observatā
& Maculæ duæ sunt visæ, iam quattuor
effluxerant horæ, quibus hic Romæ ean-
dem h. 6. conspexeram, integrum horizon-
tem prætergressam: unde necessariū om-
nino est, et inibi hora 10. conspiciendam
fuisse, si quidem Circuli & Tubi observa-
torij conditio id tulisset. Nam de strenua
observatoris accuratione, mihi res est ex-
plorata. Et quanquam ratione atq; vñ
continuo, constare queant istæ veritates:
libentius tamen illas exēplis alienis prac-
ticis tam evidentibus consolido, quam
meis solis domesticis comprobo. Vnde
ulterius 5. liquet, Cursuum apparentium
integritates ab horizonte in horizontem,
parvis istis observationum Circulis eui-
denter non, & nisi rarò in Maculis inge-
nibus, sciri vel indagari posse. Ex quo 6. a-
liud incommodum enascitur, ut ignores
rectilineus an curvilineus Maculæ cursus
existat. 7. Ut nescias verè, an apparen-
ter tantū, Macula aut Facula orta sit vel
occubuerit, generata aut corrupta.

*Die 7. Iunii, Macula tres & Facula cir-
ca d. Prima Macula crevit in latitudi-
nem oblonga tamen adhuc. Omnes hæc
tres Maculas habes in Tabellis, & duas
quidem in Tabella VII. vnam boream a,
& alteram australem b, die 7. expressam.
tertiam habes in Tabella VIII. ad diem
eandem, sub nomine a, quæ omnia simul
ordinata sunt in Imagine mea XXV. ubi
sub littera h, contemplari potes ad diem
7. Maculæ conditionem, quæ & Faculam
& minores Maculas secum traxit, ipsa
non simplex, sed geminata. Faculam vel
potius Faculas, à die 5. ad 8. effigiatas ha-
bes ad litteram & Cursum c, ubi simul
animaduertis, quomodo ex Maculis c
deficientibus in earundem locum fuerint
Faculæ accensæ. Etenim illæ Maculæ die
30. vesperti in Sole ex tenuissima nubecu-
la indicijq; leuissimis exortæ, cū deinde
paulisper numero & mole creuissent, post
diem 4. Iunii notabiliter defecerūt in hæ-
cæ annotatas Faculas quæ die 6. tā ma-
ne, quàm vesperi diligentissimè inspectæ,
numerus denarium compleuerunt. atq;
ista Macularum physica generatio, non
est huius propria, sed omnium cōmunis
& ordinaria. Die 7. mane & vesperi gra-
ciliores multò quàm heri, ad septenarium
per-*

*Ex Macu-
lis Facula.*

*Macularum
generatio.*

I.

peruenerunt. Die tandem 8. mane, vltima sui vestigia in ipso horizontis perimetro haud dubia ostenderunt.

Tabella VIII. complectitur tres Macularū Cursus a, b, & c. Cursus a, boreo-austrinus, respondet cursui Romano h, in Imagine XXV. expresso. Cursus b, respondet Romano K, in Imagine XXVIII. explicato. Cursus c, respondet cursui Romano l n, similiter ibidem proposito atque explanato.

Cursus a, incaptus est explicari diebus præcedentibus nunc continuo.

Die igitur 9. inquit Obseruator, *Macula per nubes visa dua, fuit prior a, adhuc oblonga, minus tamen quam heri.* hæc ille. Altera verò fuit b, in Tabula VII. Figuram genuinam vtriusq. considera in diagrammate Romano.

Die 10. & 11. vacat Ingolstadij.

Die 12. *Macula sex, cum tribus nebulis per immissionem visis.* hæc Obseruator. Maculas quattuor centrales australes cū nebulis cernes ad a & b, duas verò boreales orientales ad c. Centralium a, directè subiecta cētro, est in mea schemate h, versus orientem nonnihil conuergens, quia obseruatio mea anteuertit aliquot horis. Reliquarum tres b, vna cum suis nebulis habentur in mea Imag. XXVIII. ad diem 12. littera K. vbi videbis Maculas, partim foetas nucleis, partim inanes & raras, minimum 14. Borealium duas, habes item in schemate eodem ad litteram n, & quidem explicatas in quinq. Faculis inclusis, admodum illustres.

Die 13. *Macula per immissionem nouem, per inspectionem 11. Prima composita fuit ex duabus & inuoluta nebula, 7. & 8. instar nebula, 9. adiunctas habuit duas Maculas nebulosas valde.* In Romano schemate, pro 9. Maculis, videbis ad centrum C, Australes minimum 7. cum suis nucleis & vaporibus seu nebulis; in borea,

II.

10. vna cum lucidissimis Faculis.

Dies 14. obseruationi, propter cæli inclementiam, non fuit.

Die 15. *Macula quinque cum nebula magna instar Macula per immissionem visa, ut nebula qua Macula est inuoluta, erat.* hæc obseruator. In schemate Romano habes Maculam nebula inuolutam h, deinde reliquas K, versus orientem valde tenues, ideòq; nebularum instar obseruatas. fuerunt autem quattuordecim minimum. Boreales autem 10. Faculas etiamnum secum vehentes valde illustres.

Die 16. *Macula per immissionem per inspectionem in medio exēitum, & sequentium nebula erat.* hæc ille. Aspice schema Romanum, & videbis Maculas K mirificè mutatas, & medias rariores effectas extremis. vnde Nebulæ sunt visæ Obseruatori Ingolstadiano, in medio Macularum antecedentium & sequentium: sed & boreæ, quarum ipsæ quinq; tantum numerat, apparuere minimum 13 præter caudam illam vmbrosam mediā. Faculæ etiamnū, sed debilius alluxerunt.

Die 17. *Macula per immissionem visa octo. Quarum quinque sunt australes, & una hæctenus Ingolstadii non visa* h, quæ respondet in Romano schemate, Maculæ l, cuius cursus incēpit die 8. à Facula, deinde in Maculas prodiuit die 12. & exinde per varias mutationes continuatus est in hunc vsq; diem. Reliquarum habitum, contemplari poteris in Imagine XXVIII. vbi miram borealium vel simul coalitionem, vel simul distractionem aduertes.

Die 18. *Obseruationes intermissæ.* Aspiice Romanas, & inuenies austrinas conglobatas quinque, boreas viginti & c.

Die 19. *Macula visa dua, cælo non adeo sereno.* Quot hæc due boreales fuerint ex parte rei, cernes, si in Romana idea numerabis minimum quattuordecim: & quidem multum immutatas.

Macula tenues ut Nebula visa Ingolstadij.

Macula nebulosa, sunt nucleis foeta.

Immissio Romana multo plures ostendit Maculas, quam emissio seu inspectio Ingolstadiana.



Notæ in Appendicem ad XXVI. Observatio-
num Imaginem.

*Vt Motus
Rectilineo-
rum indu-
bitata veri-
tas stabili-
tur, ex ipsis
autogra-
phis obser-
uationes ge-
nuina asse-
runtur.*



*Macularum
sola centra
punctum
sunt confi-
gnata.*

*Perpendi-
culum seu
Linea Ver-
ticalis. item
Angulus
huius cum
Ecliptica.*

*Anguli In-
golstadiani
ab ijs qui
Romæ sunt
inuenti, non
differunt.*

I Vandoquidem Mo-
tus apprensus hu-
ius Phœnomeni,
est Fundamentū,
vt initio dixi, &
radix prima, è qua
in ipsius Phœno-
meni intimā sciē-
tiam deueniri debet & potest; & iste mo-
tus in eum nunc statum delapsus est, vt
non iam curuus, sed rectus ad sensum al-
labatur; & res hæc noua atque incredi-
bilis quodammodo videri queat; ne quis
fortassis existimet, me alienis obserua-
tionibus in gratiam mearum potius quā
ad veritatem vti; & ita vim aliquam, vel
angulis, vel Macularum positionibus in-
disponendo, inferre, vt ex curuilineis,
Motus rectilineos efformem: Ecce tibi,
quisquis hæc oculo non iniquo aspicias,
vt sinceritatem meam & veritatis sem-
per & ubiq; sibi similis, uniformem teno-
rem experiaris; & iam non meo calamo,
sed tuis oculis fidem habeas, in adiectæ
Appendice ob oculos statuo obseruatio-
nes Macularum singulas, ex ipsis Ingol-
stadiensibus exemplaribus, manu Obser-
uatoris conscriptis, & ad me huc Romā
destinatis, accuratissime transcriptas, ser-
uata Circulorum magnitudine, Macula-
rum numero & situ, qui vt exactius ser-
uaretur, sola centra illarum punctum ad-
duxi; nam magnitudines, figuras, & den-
sitatem vel raritatem, habes satis in Imā-
gine XXVI. proxime proposita. Addidi
etiam perpendiculum Z N, eo ad Macu-
las obseruatas situ, quo illud, Ingolstadio
accepi, cui adscripsi angulum, quem ip-
semet Obseruator Ingolstadianus è cal-
culo Astronomico ad datum obseruatio-
nis tempus eruit; quod ideo à me factum
est, vt veritas apparentis motus alienis
fulcita numeris illustrior euaderet, & cā-
dor meus, quo minus de suo admisceret,
hoc illibator apud animū Lectoris per-
maneret. Tametsi dissimulare non de-
beam, omnes istas Obseruationes, ad
normam quoq; meam applicatas, angu-
losq; æquales repertos esse, vti iam ali-
quoties innui. In subiecto igitur Diagrā-

II.
mate, circuli A Z B N, sunt obseruato-
rij Ingolstadiani, circulo Solis apparenti
per Telioscopium in chartam tralapsi æ-
quales. A B diameter, repræsentat li-
neæ Eclipticæ illam portionem, quam
planum Eclipticæ cū Solis circulo com-
munem habet, Z N, refert plani verti-
calis cum circulo Solari sectionem com-
munem; cuius ab Ecliptica distantiam
& inclinationem determinat angulus ad
Centrum C, dictis lineis Eclipticæ & ver-
ticali comprehensus, seu quod idem est,
arcus perimetri Solaris inter dictas lineas
interceptus. Qui angulus tamen si abso-
lutè ad datum tempus & locum semper
sciat ex Arithmetica infallibiliter, non
tamen datur positione in Circulo obser-
uatorio respectu Macularum obseruata-
rum, nisi ex obseruatione datur linea
verticalis Z N, cuius punctum Z est
zenith, N Nadir; hac data positione,
cū eruat ex obseruationis tempore,
eius ad Eclipticam obliquitas, adeoq; an-
gulus vel Z C A, sinister; aut illi ad ver-
ticæ oppositus dexter N C B, vel Z C B
dexter, aut illi oppositus sinister N C A;
datæ enim positione Eclipticæ A B, ideo-
que & situs Macularum ad eandem, ex
quo cursus illarum apprensus innoscit.
Noueris autem primò, eandem litte-
ram, eidem Maculæ ab Obseruatore In-
golstadiano non semper esse applicitam.
Nam Maculam eandem borealem die 30
Maij & 1. Iunij vocat a, deinde die 4. 5.
& 6. attribuit illi litteram b, die vero 7.
& ultimo illic apparenti, assignat C; ex
quo factum est, vt ego in totius curius
collectione, sub eadem vltima littera c
eandem repræsentem.
Eodem modo, die 9. Iunij, offero to-
tum cursum Maculæ australis b, sub lit-
tera eadem, quia illam die vltimo ab ob-
seruatore Ingolstadiano accepit, tametsi
intermedijs eandem non semper retinue-
rit. Ex eadem causa, Maculæ boreales
a sub hac littera proferuntur: & tandem
Cursus Maculæ boreo australis, sub lit-
tera d.

Noueris secundo, In hisce præsentatis
obseruationibus de meo nil esse additū,
nisi

*Diagram-
matis expli-
catio.*

*Ecliptica,
A B.*

*Sectio Ver-
ticalis, Z. N*

*Angulus
inter Ecli-
pticam, &
Lineā Ver-
ticalem po-
sitione datæ
datur.*

*Data posi-
tione Ecli-
ptica, datur
etiam situs
Macularū
ad ipsam.*

*Vltima ob-
seruationis
littera, toti
Macula cur-
sui attribui-
tur.*


*Totus Cur-
sus Maculæ
c. ad sensum
rectilineus,
in Circulo 6
a die 30.
Maij, ad 7.
Iunij.*

*In Circulo
8. est curri-
culū recti-
lineum Ma-
culæ b a die
1. ad 9. Iu-
nij.*

*Sic in Cir-
culo penul-
timo sunt
Maculæ a
in vltimo d.*

Appendix ad XXVI, Observationum Imaginem, in qua ex ipsis Ingolstadiensium Designationum Exemplaribus Romam transmissis, apographa ad unguem fidelissimè, una cum Ecliptica et Linea Verticali, prout inibi obseruata et inducta, atq[ue] ab ipsomet Observatore directæ fuerant, redduntur: unaq[ue] ex illis angulus, quem planum Verticis cum Ecliptica ad centrum C. solaris circuli AZBN comprehendit, et Motus Apparens hoc tempore ad sensu Rectilineo, solidissimè comprobatur.

223.



I.

Sola diuersarum observationum in unum Carsum Collectio mea est: singula Macularum observationes sunt Observatoris Ingolstadiani.

Summa hic & alibi agitur fide.

Lectoris aequitati multa relinquitur.

Motus ad ducti sunt ad sensum, quasi rectilinei.

Cursus isti ad sensum rectilinei inuenti, comprobantur

nisi solam observationum singularum vnus Maculae, in typum vnus cursus collectionem; cuiusmodi obiectos habes quattuor; videlicet c, b, a, d. nam quintum, ex Maculis die 12. Iunij emerfis, &c. colligere nolui: ad intentum meum videntur praedicti sufficere. Lector autem examinet an ex datis observationibus recte hosce cursus rectilineos collegerim.

Noueris tertio. Me eadem prorsus fidelitate in alijs colligendis cursibus vsum esse, quam in hisce ordinandis tibi ad oculum demonstro. quod autem non afferam ab omnibus originalibus similes copias, arbitror non esse abutendum otio, vel sumptibus, vel tua Lector humane aequitate; cui ne diffidere velle videar, multa quae alioquin promere potuissem, libens volensq; committo, multa omitto. Nam qui hisce tam fideliter prolatis falsitatem subesse iudicat, is neq; multis observationum plaustris in medium adductis, credendum censebit. Nihilominus tamen, vt vel reluctantem conuincam, exemplaria autographa seruo, & quemlibet ad fidem illorum prouoco.

Noueris quarto. Hosce quattuor cursus ad sensum esse quasi rectilineos: addo quasi, ob duas causas: quarum altera desumenda est ab observatore, altera ab obseruatis. Illa quidem, quia fieri nonnunquam solet, vt dum obseruamus, Maculae interim motu diurno a loco in charta obseruato emoueantur, vnde si locum quoq; notatum similiter non protrudamus, tabellae chartiferae giratione; necessario sequitur, vt perpendicularum fallax, & angulus Eclipticae ex illo minus iustus obtineatur. quod hic euenisse subinde, res loquitur. quanquam id ab harum rerum perito nullo negotio notetur & caueatur. quis enim non videt in cursu Maculae b, si regulam applices, aliquas a recto tramite paulisper aberrare, quod ex solius perpendiculari hallucinatione euenisse certum est. Sed quia naeuuli isti valde parui, & a quouis facile sunt animaduertendi & censendi; non est quod illis diutius immorer: hoc solum quaero, vt motum Maculae b, ex die 1. ad 9. Iunij rectilineum obtineam.

Noueris quinto. hosce cursus, prout hic obseruati proponuntur tales omnino verè & recte apparuisse, id est, ad sensum quasi rectilineos; cuius rei fidem faciunt,

II

1 primò Cursus mei Romani horum temporum & dierum huius ipsius anni 1625 ordine positi & exponendi. Deinde cursus horum temporum & dierum in annis praeteritis, prout habes in Tabella IV, V, & VI, Imaginis XXVI. Item in Tabula III. Imaginis XXVII. in qua inuenies quinque distinctos cursus rectilineos Macularum, a, b, c, d, e, Friburgi Brisgoiae anno 1622. ab eodem Georgio Schönbergero meo discipulo & ibidem successore obseruatos, de quibus specialiora hauries in explicatione ipsius Tabulae. sufficit hic auriculam vellere, & intra rectilinea mense Iunio oblata indicare. In eiusdem Imaginis XXVII. habebis etiam Tabulam II. Duacenam, simillimam Ingolstadianae Tabellae II. in Imagine XXVI. a die 30. Aprilis, ad 10. Maij, vbi motum apparētem adhuc quidem curuilineum, sed tamen ad rectitudinem valde aspirantem reperies. Insuper Motus recti sese sistunt annis quoq; sequentibus, adi finem Maij & initium Iunij anno 1626. & videbis omnes Macularum Cursus apparere quasi rectilineos, dico quasi, quia ex parte rei non sunt rectilinei, sed semper curuilinei, ita tamen ad rectitudinem accedunt, vt sensus quidquam certi in contrarium animaduertere nequeat. Deinde quando a fine Maij & initio Iunij notabiliter, id est, dies 14. recedunt, sentitur nonnihil curuaturae, vnde voco illos motus ad sensum quasi rectilineos. Iuuatur etiam curuitas nonnihil a refractione vitri, praesertim si cursus valde australes vel valde meridionales existant.

Noueris sexto. Omnes hosce Cursus rectilineos, secare Eclipticam, non autem eidem parallelos ferri, & sectionem illam esse ad angulos quodammodo aequales, & omnium angulos versus orientem spectantes esse boreos, omnium in occasum respicientes esse australes, omnesq; motus ante sectionem esse positos, in plaga boreali, post sectionem in australi, adeoq; omnium horum motuum apparentium tendentiam & lationem esse ab Aquilone in Meridiem. Et quanquam haec ita sese habeant nihilominus multi motus apparentes sunt toti borei, & Eclipticam intra Solem non secant, secarent tamen extra versus occasum, procurentibus, & tandem concurrentibus lineis: vice versa, multi sunt toti australes, & ab Ecliptica

ex Cursibus Romanis, ex cursibus Ingolstadianis, Friburgensibus, Duacensis, Annorum, 1622. 1624. 1625. 1626. &c.

Macularum apparēs Motus ex parte rei semper est curuilineus, ad sensum tantum fit rectilinus.

Directio Motus apparentis est obliqua ad Eclipticam, ex Aquilone orientali in Meridiem occidentalem.

Multi Motus absoluti sunt toti in plaga boreali, multi in australi; multi sunt mixti.

I.

Ecliptica versus occasum semper magis, magisq; discedunt, eandem tamen secarent extra Solem productis in orientem lineis. Exempla vtrorumq; casuum habes in Cursibus, huius Appendicis, nam iter Maculae c, est totum Septentrionale; Maculae b, totum australe; Maculae d mixtum. quidam autem Eclipticam in Sole ipso secant, idq; aliquando in parte orientali, aliquando in occidentali, rarissime in centro. vide Cursum Maculae d, quae die 9. Iunii Eclipticam tam Ingolstadij, quam hic Romae insedit.

Quomodo, Vbi, & Quando itinera ista curuoscere incipiant?

Quando maxime recta fiant?

Quando vna Macula rectilineo Motu incedit, omnes idem faciunt.

Motus rectilinei omnes diuersorum annorum, faciunt aequales ad Eclipticam Inclinationes.

Noueris septimo, Si cursus hi rectilinei à rectitudine nonnihil deflectere videntur, si versus principium Maij procurrant sunt in parte australi concuui ad Centrum C, in boreali concuui: contra si fini Iunii propiores existant, fient in parte borea concuui, in australi vel concuui vel rectilinei. si verò intra vtrumque mensem aequaliter incedant, ad sensum rectilinei apparebunt, nisi vel refractione lentium, vel aliquis extraordinarius casus, aliquid parum flexus arcuati apportet.

Noueris octauo, hunc motum apparentem rectilineum esse omnibus Maculis communem, etiam si diurnae aut horariae tantum sint, etiam si in ipso Sole primum generentur, & in parte ipsius quacunque tandem: etiam si minimae, etiam si rarae, etiam si figurae irregularis existant: nihilo secius tamen omnes tritam & Regiam omnibus viam sequuntur.

Noueris nono, hunc motum ad sensum rectilineum, easdem facere ad Eclipticam inclinationes, quas exhibuit motus anno 1624. praesentatus & praesentandus hoc anno 1625. atque sequenti 1626. inter mensem Nouembrem atq; Decembrem; in hoc solo differunt, quod tendentiae illorum sint veluti deinceps contrariae: nam Motus inter Maium & Iunium rectili-

II.

neus, fit semper oblique ex borea versus austrum; ille autem inter Nouembrem & Decembrem semper ex austro oblique tendit in boream.

5 Noueris decimo, Quemadmodum Maculae ex illo motu rectilineo hyberno semper abiuerunt in curuilineum, eumque fecerunt semper concuum versus austrum, conuexum versus boream, idque per sex continuos menses; ita nunc è contrario aspicias sensim curuitatem concuam verti in Septentrionem & conuexam in Meridiem, situ planè contrario, sed modo & tempore eodem. considera diligenter obseruationum secururarum Imagines & Notas lege, claramque veritatem dictorum Sole clariùs cernes.

15 * Noueris undecimo, Postquam ad Nouembrem deuentum erit curuitas itineraria apparens, denuo sese in rectitudinem, priori similem incipiet erigere, circaque finem Decembris giros arcuatos priores sectabitur, prout suis locis & exemplis ostendetur.

25 Noueris duodecimo, Omnes hosce motus Maculis omnibus & singulis communes, etiam Faculis & Umbris, tam primarijs quam secundarijs esse proprios, haud aliter quam Maculis ipsis. nunc cepta & quae adhuc ad hunc medium annum restare videntur prosequamur.

30 Ex hisce omnibus consideratè trutinatis, desumitur argumentum solidissimum nullam penitus ex hoc Phoenomeno in Solem redundare parallaxin. Alioquin, qua ratione fieri posset, vt eodem Solis loco ex regionibus tam remotis Maculae conspicerentur? vt itinera similia perlegerent? vt Eclipticam simul insiderent? vt simul ad medium Solis peruenirent? Solem simul intrarent, simul exirent? Eodem loco solis nascerentur? eodem interirent?

Singulis Semestribus contingunt ad plagas subcontrarie oppositas.

Omnes Macula post Motum hyemalem rectilineum qui fit in Decembris initio, describunt itinera concua versus Austrum, mensibus sex: omnes post motum rectilineum aestiuu à Iunio, decurrunt eadem concua, mensibus totide versus Septentrionem.

* Curuitas & rectitudo Motus apparens eadem redit annue. Isti Motus & illorum qualitates etiam Faculis & Umbris communes sunt. Ad hoc Phoenomeno Parallaxis exulat.



Notæ in Appendicem ad Imagines XXIII. &
XXIV. de Faculis a, b, & c, à die 15. Maij,
ad 26. eiusdem.



I.

TIAMS I Faculæ
sint in Sole quotidiana,
& tam solitariae,
quàm cum Maculis
coniunctæ gregatim
occursēt; integrumq;
mihi esset per annos

& mēses totos earum exercitus in aciem
educere; alienas tamen, præ meis solis,
semper libentiùs accendo, eò quòd con-
iunctæ cum meis illustrius quid effulge-
re, & plus lucis ad veritatem afferre vi-
deantur: accedit, quòd iura amicitiae id
exigunt, vt quorum labore in hoc diffi-
cili Phœnomeno adiutor, ipsorum ho-
nori vicissim studeam. Vnde hanc Facu-
larum a, & b Appendicem attexo, vt
quas P. Georgius Schönberger in suis ob-
servationibus ad diem 17. & 18. itemq;
diem 19. Maij, adduxit illustriores red-
dam.

Quas igitur ipse Faculas die 17. & 18.
Maij conspexit, consignatas habes in Ta-
bella III. Imaginis XXVI. easdem ego
diu ante Romæ in horizonte oriētali sur-
gentes aspexeram, die nempe 15. sub ve-
speram hora 5. & amplius, prout anno-
tatum cernis. fuere sine Maculis & val-
de illustres sed nonnihil quoq; graciles,
quarum figuram & numerum & magni-
tudinē fideliter expressam habes in ico-
nismo; illarum Ecliptica est AB, in quam
in sculptum vides diei 15. numerum.

*Facula to-
ta nocte in
horizonte
superando
colluctatur.
Extra Solē
tamen nul-
lam flammam
emittunt.*

Die verò 16. mane, nonnihil ascenden-
do supra horizontem promouerant, ni-
hilominus tamen totum neq; dum exces-
serant, quemadmodum ex idea apparet,
cuius Ecliptica est DE, mole autem &
numero aliquantulum creuerunt: om-
nem nihilominus flammam intra Solem,
coërcent.

Hiscē duobus diebus, ex hisce Faculis
Ingolstadianæ observationes nihil habet,
partim Circuli obseruatorij nimis parui
impotentia, partim nubium die 15. inter-
cursu.

Diei igitur decimę septimę observatio
Ingolstadiana hanc Facularum congeriē

II.

1 sed sine distinctione annotauit. In ingres-
su, inquit, Obseruator visa Facula multa
circa g, hæc ille. Fuerunt autem numero
distinctæ ferme triginta, partim mutuis
5 sibi nexibus coherentes, partim umbro-
sioribus plagis intercurrentibus penitus
discretæ: quarum quidem umbrarum a-
liæ alijs clariores, aliæ tenebricosiores
aspiciebantur; multæ verò à reliqua So-
10 lis splendēte superficie nil penitus diffe-
rebant, sed solas Faculas interiectu suo
conspicabiliore reddebant. nullam ad-
mixtam habuere Maculam: ampliores &
numeriosiores hodie, quàm heri compa-
15 ruerunt, scilicet supra horizontem om-
nino euectę. Ecliptica huius observatio-
nis est FG, numero 17. inscripta.

Die 18. Facula circa g, ait Obseruator
Ingolstadianus, quæ quales apparuerint
20 habes in adiecta observatione ad Eclip-
ticam HI, numero 18. insignitam; pu-
rioris quidem quàm heri, sed minores
& pauciores alluxerunt. sensim enim, vt
Maculæ, deficiunt. Posui autem omnes
25 has observationes cum Eclipticis pro-
prijs, quia ad vnā sine mutuis concu-
sibus & lituris stare non potuissent: dein-
de vt videas nihilominus illarum ad ean-
dem situm, motumq; eundem agnoscas
30 esse Facularum, quem videas Macula-
rum. Cuius rei euidentiam habes in Fa-
cula b, cuius cursum à die 18. ad 21, ap-
positum, nil penitus discrepare vides, ab
itineribus Macularum.

35 Fuit autē hæc Facula b, satis quidem
parua, sed lucis puræ & admodum in-
tensæ, neq; vlla Macula aut umbra nota-
bili circumdata. Decreuit sensim, & post
diem 21. ex ea animaduertere nil potui,
40 tametsi conatum omnem adhibuerim.
Ingolstadij solo die 19. est animaduersa.
Inter Faculas, Maculā c præcedentes, in-
quit obseruator, visa est Facula insignior g.
omnino insignissima fuit, alioqui tam
45 parua in tam paruo circulo obseruatorio
non eluxisset. omnes ipsius observatio-
nes à me hic Romæ sunt ad Eclipticam
vnā & eandem b Cb, dispositæ.

Cæterum

*Facula cir-
citer trigin-
ta visa.*

*Motus Fa-
cularum,
idem, qui
Macularū.*


*Facula b,
pura etiam
Ingolstadij
animadu-
ersa.*

Anno Iubilæo. 1625.

In Domo Professa Romana Societatis



Appendix ad Imagines 23, et 24, de Faculis a, b,
et c; quarum duæ primæ, etiam Ingol:
stadij sunt obseruata.



MAII.

D — H — O. E.

15. u.	$\frac{5}{4}$	18. 0.
16. m.	$\frac{6}{4}$	21. 0.
17. m.	$\frac{6}{4}$	20. 30.
18. m.	$\frac{6}{4}$	21. 5.
19. m.	$\frac{8}{4}$	21. 30.
20. m.	$\frac{6}{4}$	24. 0.
21. m.	$\frac{6}{4}$	21. 30.
26. u.	$\frac{6}{4}$	15. 20.

I. Caterum tam Faculas a, quam b, non perdurauisse vsque ad exitum Solis, patet ex eo, quod vtræque de die in diem defecerint; nam quod die 17. Facula a, auctiores apparuerint, vel attribui potest situi, vel etiam augmento physico, die autem 18. decreuisse certum est, & cum die 19. & sequentibus easdem requisi-

uisssem, inueni quidem vestigia illarum, rara & debilia, sed in chartam annotare intermisi, prout hoc ipsum in Ephemeridibus consignau. Facula verò b vestigia nulla amplius reperi. quod si perdurauissent, vtrique easdem, vna cum alijs in Sole quotidie diligentissime lustrato requisitas inuenisssem, prout die 26, Faculas

Facularum a, diminutarum vestigia etiam diebus infectis visa.

I.

Facula in Sole, instar Macularum, de nouo emergunt.

culas c. limpidissimas & purissimas ultra viginti repertas annotavi; quas in Sole de nouo enatas esse dubium nullum relinquitur; alioquin & vidissem illas, & intactas transire nullo modo permisissim. Videram quidem illas præterito etiam die, sed obscurius allucentes in chartam non retuli. Putaueram illas esse Faculas

II.

a, ipsaque constitutio & figura, præcipue verò tempus arridebant; sed locus & distantia ab Ecliptica A B, nimis repugnant, unde nouas in Sole exortas affirmare cogor. Obseruator Ingolstadianus de illis nil habet, tamen obseruationes huius diei non desunt.

Notæ in XXVII. Obseruationum Imaginem, è tribus Tabulis concinnatam, Mensibus Martio, Maio, Iunio, Duaci, Friburgi, annis 1618. 1622. 1624.

I.



ABVLA I. Complectitur Cursus Macularum a, & b, anno 1618 peractos, quorum mihi obseruationes omnes præter diem 15. hora 12. peractas, mi-

fit P. Carolus Malaperfius; factæ sunt ab octauo, ad 18. Martij, die 15. easdem obseruauit hora 2. pomeridiana. Edidit easdem ipsemet olim, idem Pater in suo solemniori ad doctrinam mathematicam initio, quod Euclidi in fine adiunxit, sed forma multò contractiore, hanc autem cuius apographum ego tibi do, misit ad me, sua manu conscriptam, quam proinde studiosè seruo.

Maculas porro a, ea figura & magnitudine tibi propono, qua ab illo accepi: etenim nec addere, nec demere quidquā libebat alienis; meas porro huius anni Millesimi sexcentissimi decimioctauo Obseruationes in Germania peractas, hic ad manum non habeo, certus nihilominus sum, neque has ab illis, neque illas ab hisce loco & situ discrepare. interim constat ad oculum, hosce motus esse curuilineos, & alijs aliorum annorum motibus tempore eodem peractis conformes. Confer cursus Romanos Martiales cum hoc, & videbis dictorum veritatem. Obiter etiam aduerte, quam multæ parvæ Maculae post ortum in Sole prognatae, ad occasum non peruenerint. Consule Obseruationum Imaginem XIII. & XIV. & inuenies Motus haud absimiles, licet an-

Cursus Macularum anno 1618. Duaci in Belgio peracti, respondent Romanis anno 1625. & sequentibus confectis.

II.

norum aliorum, & Macularum diuersarum. Ecliptica ab hoc cursu Duaceno bis fuit intercisa.

Tabula II. Continet cursum Maculae a austrinæ à die 30. Aprilis ad 10. Maij Duaci anno 1624. obseruatum, quem sine horis & altitudinibus acceptum, sed ab ipsomet obseruatore dispositum, exhibeo sine iisdem, cum situ tamen ad Eclipticam.

Habes illi genuinum anni & Maculae eiusdem, & dierum eorundem, obseruatum Ingolstadij in Tabella II. Imaginis XXVI. expressum. eò libentius autem ipsum adfero, ut vim veritatis videas, quando cursum hunc recti æmulum, non ego sed ipsemet Obseruator ordinauit. Similes illius, sed annis alijs in meis Imaginibus reperiens. Consule Imaginem 22. anni 1625.

Vnum ferme oblitus essem, nimirum die 6. Maij ante centrum, eidem obseruatori Duaceno repente nouam comparuisse Maculam, antea ut ipse scribit, non visam, quam deinde ad finem usque continuat. cum autem Ingolstadiano dies sextus non fauisset, vidit eandem valde magnam non procul post centrum versus occasum, quam ad finem usque per obseruationes diurnas est pariter profecutus, cursum illius, sicut multarum aliarum non appono, sed moneo hæc, ut aduertas non solum mihi sed alijs quoque in Sole medio Maculas nouas nasci, & antiquas interire.


Duaceni & Ingolstadiani Cursus similes, ad rectitudinem accedentes.

Macularum solitariarum diuersissimis in locis conspectarum, responsus.

Tabu-

XXVII, IMAGO OBSERVATIONVM,

tres Tabulas, e trium Mensium, tri-
umq; annorum diuersorum obser-
uationibus et Cursib; Duacenis
et Friburganis concinnatas, Martio,
Maio, Iunio, annis 1618, 1622, 1624,
Duaci et Friburgi Vniuersitatib;.



I.

II.

Tabula III. Complectitur cursus quin-
que Macularum Friburgenses a, b, c, d,
& e, anni 1622. de quibus hæc in suis ad
me autographis habet Obseruator.

Die 8. Iunii cum ante triduum nulla
appareret, visa Macula 10. cum Facula.
Fuerunt autem 2. Maculae in ortu a, vnâ
cum Facula, & reliquæ octo Maculae mi-
nimæ post medium ad litteram e,

Die 9. Macula 5. nam ex hesternis octo

1 minimis (id quod huic Phænomeno so-
lène est) factæ sūt hodie tres ad e, qua-
rum occidentalior nebulosa & diluta, duæ
sequētes compactiones apparuerunt. a, in
5 ortu promota creuit, euanescente Facula:
b noua exorta est.

Die 10. Macula per immissionem quinq;
per inspectionem 9. vna cum Facula. Hanc
in oriente non exhibet typus propter lo-
ci penuriam & confusione vitandam.

Sep-

I.

Septem autem Maculas distinctas numerabis apud e, & occidentalissimam nucleo grauidam, & circumiecto vapore dilutam ad a, est vnica, ad b similiter.

Primus Macularum ortus Physicus à minimis incipit: id quod in observationibus Romanis solenne est.

Facula ex Maculis nata, & notata Friburgi.

Multa parua Maculae augescendo concreverunt in vnā magnam.

Die 11. Mac. per Immissionem 6 per inspectionem 9. Vnam reperies ad a, alteram ad b, quattuor ad d, e. reliquas 3. nouiter exortas ob angustiam non pono. Interim Macula e, adhuc viget, & nucleo medio vapore tenuiorem circumdat.

Die 13. Iunii Mac. per immissionem 9, per inspectionem 9. vna cum corona (circa medium) constante ex Maculis minimis, ob paruitatem non numerabilibus in hac forma. Maculae circa exitum adiunctas habebant Faculas. haec Obseruator. Maculas 3. occiduas vnā cum Faculis habes iuxta e & d. Maculae vel situ vel alteratione in 3. sunt redactae more suo, seper enim horizonti vicinæ similia patiuntur; Faculas d ex Maculis oriundas vix ambigo, est Metamorphosis ordinaria. Mac. ordinariam a & b habes ad suas litteras notis numeralibus 13. medijs indicatas. Macula vero a, praecedunt 4. nouae, haecenus non visae, hesternio die qui fuit 12. sine dubio generatae, ijs assignavi litteram c, quae simul ad coronam paruularū in hac forma non numerabilium pertinet. has autem recenter enatas, docent paruulae e, die 8. genitae. Hoc autem experimentum est frequens in hoc Phenomeno, vt ex multis minimis concreverunt Maculae magnae. Quod autem in hac forma seu circulo obseruatorio non sint numerabiles, facit exilitas ipsius. Practicè iterum doceris. Inspectionem praestantiorē esse, Immissione Solis in paruum Circulum obseruatorium.

Die 14. Iunii, Maculae per inspectionem 11. quarum nonnullae inuolutae erant nebulae hoc situ & ordine (quem cernis in figura) magnam certè Solis partem obtegentes. haec Obseruator. In figura proposita habes ad diē 14. iuxta litteras a & c, Mac. separatas

II.

10. vndecimā reperies ad b, cū die 14. vbi vides minimas hesternas coadunatas in pauciores magnas nucleis graues & nebulis cictas. In hoc vnico paucorū dierū schemate multa memorabilia continentur. Nā,

1. Maculae in Sole ortus & occasus Physicus. ille quidē in Maculis e & c, hic in Mac. a die 8. praecedente postmodum disparente, & Mac. nonnullis e. Contigit autē vtrunq. in tribus Mac. die 11. post medium exortis, neq. amplius die 13. comparētibus, quas tñ non adduxi loci penuria.

2. Facularum post Maculas, & Macularū post Faculas mutua successio loco eodem patet illud ad occasum in Faculis d, quae successerunt Maculis iisdē, hoc in ortu ad Fac. a, cuius loco in medio Sole exortē sūt nouae Mac. c. atq. hoc quidē ex hoc vnico casu tā audacter non assererē nisi aliunde ex meis euidentissimis, & frequentissimis experiētis verissimū ēē deprehēdisse.

3. Macularum status. in quo fuisse videtur a & b, quae semper eadem quasi magnitudine per Solem delatae fuerunt.

4. Macularum augmentum, & decrementum; illud quidem in Macula e, & nonnullis e, hoc verò in nonnullis d & c.

5. Omnes fuerunt australes, & omnium incessus ab Ecliptica versus austrum tramite ad sensum rectilineo recedens.

6. Maculae a & b, in eodem ferme incesserunt parallelo, & passibus sese mutuo consecutae sunt proportionalibus, vt consideranti figuram, & spatia apparentia ad vera reuocanti manifestū est, fiunt enim sensibilibiter aequalia, circa medium die 14. Macula b, suam stationem fere collocauit, in quo loco praecedentis diei constiterat, tempore antemidiani Macula a.

7. Omnis et generis ferme Maculae sese ostentauere. Minime, maxime, mediocres; densae & rae, foetae & steriles. foetas voco nucleis grauidas, steriles, quae nucleo carent, aut aequabili vmbra procedunt.

Paruae & multae coadunantur in paucas magnas.

Ortus & Occasus Macularum Physicus.

Vicissitudinaria Macularum & Facularum successio.

Status Macularum.

Macularum augmentum & decrementum.

Directio Macularum ad Eclipticam obliqua ex Aquilone in austrum.

Maculae a. & b. in eodem parallelo aequaliter procedunt.

Maculae foecundae & steriles; Quae

Notae in XXVIII. Obseruationum Imaginem, secundam Iunij, à die 8. ad 24. eiusdem.

Directio motus ex arcto in austrum ad Eclipticam incipit esse obliqua: cur



Rimò, Macularū Motus ab 8. vsq; ad 18. adhuc quasi rectilineum emittitur, vti videre est in Maculis K, & m; at verò à die 12. vsq. ad 24. curuilineus esse incipit, conuexus versus

austrū, cōcauus erga boreā: id quod Mac. n. clare edocet, nec abludūt cursus Ingolstadt. in Tab. VIII. Imag. XXVI. in cursibus Mac. b, & c. Vnde polū arcticū ascendere in patente, antarcticum in latente hemisphaerio

uitas & obliquitas augescit; polus arcticus ascendit.

XXVIII, Imago

M.DC.XXV

Observationu.

a die octava Iunij, ad 24, eiusdem.

2. Iunij.

Roma in domo Professa Societatis



A Oriens, B Occidens AB Ecliptica,

reliqua more solito.

Cursus similes aliis alioru, annoru, tempore eodem

IVNII

Dies. H. O. E. D. H. O. E.

8.	—	mane.	25.	0.	17.	7 $\frac{1}{4}$ mat.	27.	45.	
9.	—	7 $\frac{3}{4}$ mat.	28.	0.	18.	8 $\frac{1}{4}$ mat.	39.	0.	
10.	—	7 $\frac{1}{4}$ mat.	26.	0.	19.	7 $\frac{1}{2}$ mat.	32.	30.	
11.	—	8 $\frac{3}{4}$ mat.	39.	30.	20.	—	mane.	24.	15.
12.	—	7 $\frac{3}{4}$ mat.	29.	0.	21.	8 $\frac{1}{8}$ mat.	38.	0.	
13.	—	8 $\frac{1}{4}$ mat.	40.	0.	22.	8 $\frac{1}{8}$ mat.	38.	40.	
14.	—	7 $\frac{1}{4}$ mat.	31.	0.	23.	8 — mat.	35.	30.	
15.	—	7 $\frac{3}{4}$ mat.	28.	35.	24.	6 $\frac{1}{4}$ mat.	18.	20.	
16.	—	7 $\frac{1}{2}$ mat.	26.	00.	eod.	7 $\frac{1}{2}$ mat.	28.	0.	

Macularu & Faculis & Vmbris minimis natiuitas, augmentum incredibile, & dilatatio inuallorū. supra proportionem motus vni-formis.

I. phario descendere necesse est. Secundo, K, fuit Facula die 8. & 9. deinde ex vmbris & Macularum indicijis tenuissimis die 10. tāquā luci Solari immerfis, die 11. nonnihil emerfis & in Mac. minimas conformitatis, excreuit admirabiliter summo & celerrimo cū augmēto diebus sequentibus in designatā congeriem & vastitatem Macularum, ad exitum vsq. perseverantium, vbi post se Fac. designatas

I. I. traxerūt. Nuclei initio erant exigui & pauci, post modum numero & mole creuerūt, circaq. exitū in vñ coalescere visi sūt, absorpto intermedio spatio, prout Lateralis figura XIX. satis edocet. nā tota illa multitudinis turba, in tres quasi ignobiles Maculas cōtracta fuit, eliso spatio medio: quod quamdiu patuit, à die 13. ad exitū vsq. reliquo Solis corpore longē splendidiū affulsit, id quod plerūq. in Mac. maioribus

Maculae in faculae & vmbrae minimae natiuitas, augmentum incredibile, & dilatatio inuallorū. supra proportionem motus vni-formis.

I.

ribus & densioribus accidit, quādo mutua vicinitate spacia media vacua relinquunt, quæ fere semper in Faculas acceduntur. Porro posteriores dies Maculæ h. hic repositos vides, vt ipsius ad Maculis K, situm per reliquum Solem addiscas.

Mora ad dies 13. non peruenit.

Omnibus autem expensis certissimū est apparentem istarum Mac. K, præsertim primarū, motum ad dies 13 non peruenisse, nam ab 8. ad 19. sunt 11. quibus additū interuallum inter 8. & marginē, non multū ultra vnū diem dabit: igitur Cursus hic ad sūmū attinget dies 12. & semis. Reliquæ varietates, Lectori lustrandæ relinquuntur.

Tertiò, l. Facula australis, die 8. animaduersa, conuersa est die 12. circa centrum, in Maculam, & sic multiplicata peruenit ad diem 16. postea expirauit: motus vestigia relinquens veluti rectilinea: sed motui Macularū K non exacte parallela.

Quartò, Faculæ & Vmbre m, illis permixtæ die 11. & 12. in oriente ostensæ, acie

11. & diligentiam meā effugerūt, ad 18. & 19. vsq. dies quibus reuixerunt; postmodū oīo extinctæ sūt, non assecutę horizontē: fragmenta tñ itinerū, in recta velut linea iacēt.

5 Quintò Maculæ n arcticę cū Faculis & intra Faculas ingressæ, & cum iisdem in Sole progressæ; tandē cū iisdem eundē egressæ sunt. figuram, magnitudinē, numerūq. mirifice variarūt: versus exitū, eę quę erāt in medio parua & inter se dispersæ, in vnā continuā veluti vmbra congestæ apparuerūt, & sic vnā cū Fac. exiuerūt. Tredecim in Sole dies haud attigerūt: motū offerunt aliquantulū arcuatum, & ad motum Macularū K, sensibilibiter parallelum.

15 Cursum harum Macularum non minoris, sed vel æqualis vel paullo longioris in Sole fuisse moræ, quā fuerit Macularum K, est indubitatum.

20 Numeri marginibus adscripti, indicāt sedes perpēdiculorū, singulis obseruationibus in laterculo positis correspondētium.

Parua Macula dilatatur & copulantur in vnam magnā. Facula cum Maculis æquali passu feruntur.

Macula n, borea Dies 13. vix attigerunt, superasse tamē videtur Maculas K.

Notæ in XXIX. Obseruationum Imaginem, Iulij tertiam, primam Iulij, à die 19. illius ad 2. huius.

Motus curuilinei flexus, & chordarum ad Eclipticam obliquitas crescit. Polus arcticus ascendit.



PRIMO. Eluctatus est tandem sensibilibiter in partem contrariam motus curuilineus, etiam ad visum, tam in Maculis, quā

Faculis, rursusque chordæ arcubus itinerarijs æqualiter à centro C subtensæ, ad Eclipticam propinquant, & minores cum eadem angulos efficiunt.

Macula in Sole nascuntur, ampliatur, in Faculas accenduntur.

45 Secundò. Maculæ a, boreæ in medio Sole exortæ, erant numero quattuor die 19. deinde quinta accessit, & sic istum numerum retinere quidem, situ tamen & magnitudine varia, vt aspicienti clarum euadet. Nam duæ occidentalissimæ ab orientalissima sensim recesserunt, & singulæ tandem in Faculas degenerasse, vel à Faculis adgeneratis obliterate videtur.

Tertiò. Faculæ b, austrinę luculētæ, cū tenuibus Macularum indicijs, die 21. 55 conspectæ, per 22. & 23. ita processerūt,

35 die tandem 25. Maculas duas exiles pererunt, quę succedentibus diebus mirum in modum munero & mole & interuallis auctæ, & variè conformatę, ad contactum vsque horizontis occidui, cum iisdem Faculis diu: simode quoque effigatis, peruenerunt. Vbi notandum, quomodo Maculę dictę in medio valde longę, & rariuscule, circa egressum contractę & densiores apparuerunt, angustatis Macularum interuallis. Facularum & Macularum b, in Sole mora dies tredecim non videtur attigisse.

40 Quartò. Maculæ c, Septentrionales, die 23. vesperi de nouo prognatę fuere sex; tres deinde sequentes, diebus subsecutis in longam caudam extenuatę, quoadusque die 28. 29. & 30. in Faculam abiuerunt, & die quidem 28. seiunctam, sequentibus autem continuatam vsque ad Maculam antecedentem, quę quidem è tribus initio conflata semper creuit, borealior tamen in vmbra sensim, deinde circa exitum in Faculam secessisse videtur,

E Faculis Macula protuberant & cum iisdæ equali passu Solem perambulant.

Mora sub Sole infra dies 13.

Macularū in Faculas conuersio.

Facula scit Et circa occasum cum Maculis itunguntur.

I MAGO SOLIS XXIX.

233

I.
Interapedo
aucta.
tur, quod etiam alias australes egisse per-
suadeor. Hoc etiam circa hasce Maculas
diligenter obseruandum, interapedinem
illarum continuè de die in diem esse auc-
tam, ita vt die 28. distantia Maculæ à Fa-
cula æquaret diei 23. interuallum ab v-
trisque Maculis comprehensum.

Quintò. Maculæ & Faculæ d, triduo
durarunt, progressæ nihilominus regia-

II.
1 aliarum via. die 25. adherentes supernè
duè vmbre g, dimidium durarunt tan-
tum diem, id quod huic Phænomeno
quotidianum.

5 Sextò. Die 26. exortæ aliquot cum
Faculis insignibus Maculæ f, in parte bo-
reali, sensim & lucem, & tenebras ami-
serunt; defecerunt enim ambe, die 1. Iulij
in vmbra tenuissimam.

Macula &
Facula in
vmbra te-
nuem abe-
re.

XXIX, Imago
Obseruationy.

M.DC.XXV.

à die 19, Iunij, ad secunda, Iulij.

Romæ in domo Professa Societatis


3. Iunij.

1. Iulij.



A, Oriens, B, Occidens, AB, Ecliptica. etc.

Cursus similes aliis aliorum annorum, tempore eodem.



IVNII

Dies. H. O. El. D. H. O. El.

19. m. 7 1/3 — 27. 20.
20. m. 7 1/4 — 24. 15.
21. m. 8 1/8 — 38. 0.
22. m. 7 1/2 — 30. 20.
23. m. 7 1/3 — 27. 30.
24. m. 7 1/3 — 28. 0.
25. m. 7 1/4 — 25. 30.
26. m. 7 1/2 — 28. 20.
eod. m. 8 — 35. 0.

27. m. 7 — 25. 0.
28. m. 8 — 35. 40.
29. m. 7 2/3 — 31. 10.
30. m. 7 2/3 — 31. 0.

IVLII.

D. H. O. El.

1. m. 8 1/2 — 41. 0.
2. m. 8 1/8 — 38. 0.
eod. u. 4 — 36. 0.

23. u. 3 1/4 — 38. 20.

Notæ in XXX. Observationum Imaginem,
quartam Iunij, secundam Iulij, à die 27.
illius, ad 12. huius.

*Macula in-
tra Faculas
orta tenues.*



*Facula par-
ua.*

*Facula an-
guſtis ſpa-
tijs orientes,
& continua
ſucceſſu di-
latantur, et
omnino ſe-
parantur,
id quod il-
lis uſitatum
eſt.*

*Facula ad
horizontem
coniuncta,
aſcenſu ſe-
parantur.*

I.

PRIMO Maculæ a auftrales, intra Faculas tenuibus initijs exortæ, & veluti abſorptæ ab ijsdem, die 27. intra eaſdem deinde proceſſerunt ad 30. poſtea euaneſcentibus Faculis, ſolæ Maculæ perrexerunt, ſenſimq; minores & rariores euaserunt, donec & ipſæ conſumptæ, in Sole, poſt diem 4. Iulij nullum amplius veſtigium ſui reliquum fecerunt, horizontem non aſſecutæ ſeruato, interim ordinario curſu, omnibus communi, qui eſt curuilineus, & ad Septentrionem concauus, ad austru conuexus. Traxerunt autem poſt ſe præfertim die 29. & 30. Faculas borealiſſimas & liberas, valde puras.

Secundò. Faculæ Maculis ijsdem a, alucentes ſuperiore parte verſus boream, ad horizontem uſq; pertingebant die 27. verſus plagam auſtralem ſeu Nadir protenſæ, inter ſe & marginem umbras trahabant: die 28. Faculæ adhuc apparebant intenſæ & ſibi cohærentes, umbrasq; comites magis explicabant. die 29. amplius rareſcere & diduci coeperunt: 30. tandem, omnino ſeparatæ, & euandæ conſpectæ ſunt. Et hoc Faculis fere ſemper ſolemne eſt. Sequentibus diebus in motu quidem (vtri ſerè ſemper) aſpectui ſeſe ſtiterunt, ſed ita raptim & locis dubijs, vtri ſecurè & ſtabiliter notari non potuerint. Eadem dicta ſunto de Faculis f, quas die 30. coniunctas, die 1. ſeparatas, diſiungente eas interiecta umbra, contemplaris. Sequutis diebus locis ancipitibus per trāſennam viſas, notare nō libuit.

Tertiò. Maculæ b auſtrales duæ erāt initio cum appendice borea, præuijs Faculis. Secundo verò Iulij Faculam poſt ſe traxerunt, ipſæ factæ tres, quia antecedens borealior in duas abiuit. & nouæ alia tres c, ante ipſas comparuere. Tertiò demum die adhuc traxerunt Faculā, quæ Maculæ vltimæ, tanquam capiti hærens, ſpeciem caudatæ cometæ præbuit intervallo multum dilatato; duæ antecedentes

II.

1 boreales iterum in vnā conuerſerunt, ſed & præcedentes Maculæ C, multas paruulas ſuo comitatu adiecerūt, dilatatis ſpatijs. die 4. amiſſa eſt Facula acceſſitq; in
5 locum ſequens noua Macula, prout virgulæ ex numero 4, in ipſam extentæ do-
cent. Sed & Maculæ C, minuto numero auxerunt molem. die 5. b borealior antecedens, geminata comparuit, cum die
10 antegreſſo huius indicia præmiſiſſet, ſequentes autem loco Faculæ exortæ diuidi & imminui cæperunt in paruulas. die 6. cæperunt duæ Maculæ b denuo
15 cōaleſcere cum aliquo ſui decremento, rareſcentibus occidentalioribus. Septimo Duæ Maculæ b, ſegmenta communia habuerunt: ſequentes amplius decreuerunt. Octauo die & ſequentibus ad exitū uſq;
20 ſemper magis iungebantur, & minores efficiebantur, vt aſpectum apud horizontem ferme effugerent. vnde vel antiquas reſuscitarunt, vel nouas accenderunt Faculas. Plura de his require in Imagine
25 XXXII. quæ eſt 3. Iulij. Et quæ de harum concuſſu, modo ſatis fuſè dixi, frequentiffima ſunt etiam in alijs, ſed breuitatis ergo, plurima omitto, rimanda & ruminanda erudito atque ſtudioſo Lectori.

Iterum duo conſidera. alterum quomodo, 1. die Iulij tātum duæ & ſibi valde
30 vicinæ ſteterunt Maculæ, & illarum ſequens auſtralior maior erat antecedente, nihilominus tñ poſtea valde ſūt diſiunctæ, & poſterior decreuit, & in Vmbram faculoſam ambiuit, crescente priore. alterū
35 quomodo prior vna fuit, ad 5. uſq; diem & die 5. atq; 6. duplicata apparuit, tum ſenſim in vnā ſemet recollegit. Curriculū harum Macularū dies 13. attigſſe, facile ſibi perſuadebit, qui ex interuallis vtrinq;
40 horizontalibus accuratū computū inibit.

Quartò. Mac. d, die 2. exortæ, ſequentibus duobus auctæ, reliquis in Faculas & umbras declinare videbantur. Vbi vides
45 primū umbras tenuiſſimas, poſtmodū Maculas minutiſſimas, & tandem ex his Maculas ſtabiliores factas.

*In locum
Facula ſuc-
ceſſit Macu-
la.*

*Vna in mul-
tas reſolui-
tur Macu-
las mini-
mas.*

*Macularū
primus ex
umbris or-
tus, in Vm-
bras & Fa-
culas occa-
ſus.*

Quin-

IMAGO SOLIS XXX. 235

*Macula in
plaga occi-
dua & mo-
tu declini
exorta, in-
terualla sua
amplificat.*

I.
Quintò. Maculae c, de nouo generatae
sollemnes quoq. cursus tenuerunt; & no-
ta quod intercapedinem suam die 6. & 5.
maiorē ostenderūt, quàm die 4. quae om-
nia singulari cura examinata adnotauī.
Sextò. Omnium Motus est ex Aquilo-
ne orientali in Austrū occidentalem, con-
cauus aduersus illum, conuexus erga. hūc

II.
Polus Arcticus versatur in patente semi-
circulo arctius ascendente ex occasu ver-
sus ortum, partes appositae & motus op-
positos tenet austrinus depressus infra
horizontem. Curuitas motus, & chor-
darum ad Eclipticam inclinatio cre-
scit.

*Motus cur-
uitas &
chordarum
ad Eclipti-
cam incli-
natio crescit,
polus arcti-
cus superior
ascendit.*

XXX, Imago
Observationu.

M. DC. XXV.
Cursus à 27. Iunij, ad 12. Iulij
Romae in domo Professae Societatis

4. Iunij,
2. Iulij.



IVNII

Dies H. O. E.

27. m.	7.	—	25.	0.
28. m.	8.	—	35.	40.
29. m.	7 ³ / ₄ .	—	31.	10.
30. m.	7 ³ / ₄ .	—	31.	0.

IULII

D. H. O. E.

1. m.	8 ¹ / ₂ .	—	41.	0.
2. m.	7 ¹ / ₃ .	—	29.	0.
3. m.	8.	—	34.	40.
4. m.	7 ³ / ₈ .	—	27.	0.
5. m.	7 ¹ / ₂ .	—	27.	30.
6. m.	8 ¹ / ₄ .	—	40.	30.

Reliqui dies patent ex figura Sequentē.

AB, Ecliptica; A, Oriens,
B, Occidens Macularu. etc



Notæ in XXXI. Observationum Imaginem, Iulij tertiam, à die 3. ad 6. eiusdem.



I. RIMO. Est initium positum Maculæ a, per dies 3. qui deinde continuantur in Imag. sequente XXIII. nam posui eam cum

Faculis suis, quas continuus situs ob angustiam loci non tulisset, vides ergo hic cum quibus Faculis Macula a, & alijs Maculis per triduum hoc, inceserit. Prima ipsius positio est diei tertij matutina, fere marginalis; secunda vespertina, diei eiusdem; tertia, contigit die 4. mane, cum Faculis præuijs & sequacibus. quartam habes hic sub die 5. in qua solam Maculam affero, sine Faculis, quas vnà cum Macula require in Imagine XXIII. quinta Maculæ positio datur die 6. circulo albo punctis clauso, vitandæ confusionis causa, Faculas antegressas euandas non obseruavi, sequentes habes in schemate vtroque: vbi nota, quò magis recesserunt Faculæ ascendendo à margine, hoc graciliores esse animaduersas.

Secundò. Maculæ c, b, huius Imaginis, respondent Maculis sub littera b, signatis Imagine præcedente. & Maculæ h, Maculis a; ad diem 3. & 4. Item Maculæ d & e huius, Maculis c, illius; Maculæ f, & g, huius, Maculis d, illius; Maculæ i, huius, Maculis e, illius. & vides hic omnia fere accuratiùs expressa, quàm illic.

II.

1 Tertiò. Faculæ cum vmbris K & l, suos etiam proportionales progressus effecerunt in spatijs diurnis, haud aliter quàm si ipsæmet locis iisdem Maculæ cōstitissent, prout consideranti patebit.

5 Cætera quæ ad progressum, & Comitatum Maculæ a, spectant, habebis in Imagine sequenti satis accuratè delineata. hinc autem est sumendum ipsius caput.

10 Quartò. Interim aduertat velim, id quod sæpe iam monui, etiam segmenta motuum, integrorum rationes seruare. Nam Faculæ K, l, ab Ecliptica discedunt & f, g, tam Maculæ quàm Faculæ ad eandem accedunt, vijs & segmentis itinerarijs arcuatis, id quod in alijs vbique passim reperies. nam hoc semper expertus sum, sicut tota itinera sese habent, ita etiam proportionaliter eorum segmenta.

20 si illa sunt curua, etiam hæc; si illa rectilinea apparenter, etiam hæc: cæteris paribus. &c.

25 Quintò. Ex his autem paucis diebus, imo vnoquoque illorum datur intelligi quomodo tota ferme Solis longitudo fuerit occupata, nam die tertiò, orientem occupauit Macula a, deinde b, post hæc Maculæ c, d, medium Maculæ h, postea

35



IMAGO SOLIS XXXI. 237

XXXI, Imago

1625.

3. Iulij.

Observationu.

Romæ in domo Professa Societa-
tis Iesv; a die 3. Iulij, ad
6. eiusdem.

IVLII.

Dies.	Hora.	Scr.	Alt.	Min.
3. M.	8.	0.	34.	40.
3. V.	4.	0.	34.	30.
4. M.	7.	23.	27.	0.
5. M.	7.	30.	27.	30.
6. M.	8.	20.	40.	30.

E

B



NB. AB, Eclipticam; A Z B, Zenith; ANB, Nadir

in Sole, seu puncta, qua Verticalis plani comunis cum ☉
sectio, supra et infra Eclipticam facit, in
peripheria eiusdem, refert. et c.

Nota

Notæ in XXXII Observationum Imaginem,
quartam Iulij à die 5. ad 12. eiusdem.

I.



R I M O. Macula
a, est hic conti-
nuata à 5. mensis
die, ad 12. ut vi-
deas quid illis die-
bus, & quibus in
locis id in Sole v-
nà cum Macula.

a extiterit. Nam initium Maculae à die
3. ad 6. explanaui in Imagine præceden-
ti. finem, imo totum Maculae cursum, so-
litariè exhibitum, accipies sequente. Hic
itaq. occurrunt Faculae b, Maculam a,
subscutæ, die 5. 6. & 7. vbi vides quo-
modo die 5. quasi vnæ & continuæ Ma-
culæque propinquiores extiterint: die
verò 6. ab eadem quidem Macula remo-
tiores, inter se tamen diuulsæ, & singulæ
graciliores. die autem 7. quomodo inter-
mediæ extinctæ sint, Maculam a; non
vbique expletam, sed vacuam vides die
8. mane, 9. 10. propter euitandam con-
fusionem: perimeter punctulis circa Ma-
culam a, die 5. perfectus, denotat spa-
tium illud fulgentius & flauedine tinc-
tum apparuisse, non hoc tantum, sed a-
lijs quoque diebus; id quod sæpe euenit,
sed non semper annoto.

Secundò. Vbi litteram c, seu simpli-
cem seu geminatam videris, scias reposi-
tas esse Maculas b, Imaginis XXX. à die
7. ad finem, quorum numeros ibidem ad
diem 6. tantum annotaui, in reliquis huc
me reieci. quod ideo feci uti videres quem
situm inter se habuerint Macula a & Ma-
culæ b, quæ in eundem ferme inciderunt
parallelum; itaque haud dissimilia post
se reliquerunt itineris vestigia; quod ta-
men sæpe non seruatur. &c. Deinde ut
experimento practico videres, quam va-

II.

rijs temporibus eandem Maculam obser-
uatam possim ob oculos statuere; & quā-
tus sit motuum è tam diuersis obserua-
tionibus productorum, responsus. Et
quod à me cernis factitatum in ista, cogi-
ta præstari posse in vniuersis. Faculas
quoque & umbras quas Maculae b se-
cum traxerunt, hic sub litteris c, insi-
gnitè expressas vides.

Tertiò. Sed & Macularum, d conge-
riem à die 7. ad 12. vsque prouectam, &
mirificè commutatam aspicias.

Quartò. Die 7. & 8. ad occasum lucu-
lentæ Faculae umbris intermixtæ in ipso
met horizonte hæserunt, sed Solem non
excesserunt.

Quintò. Die 8. & 9. nouæ Maculae m.
in medio Sole exortæ aspectum bidua-
num nobis indulserunt.

Sextò. Simile quid fecerunt Faculae
puræ, boreales n, die 6. & 7. allucen-
tes.

Omnia verò, prout dixi, vnum simi-
lem cursum annunciant.

Die 12. luxerunt Faculae o in boreo,
per vnum tantum diem, umbris com-
mixtæ.

Cursus integri istarum Macularum
habentur partim in prioribus Imaginibus
partim in sequenti mox annunciabuntur.
Hunc autem vtrinque truncum & sine
cauda atque capite cursum, à die 5. ad 12.
etiam ex hac causa do, ut videas, ipsum
sic seorsim spectatum, à rectilineo non
multum differre. de qua re, mox plura
in Imagine sequente.

Vnde euidentius est, è paruis circulis ob-
seruatorijs, eo quod initia & fines raro
obtineant, motus apparentes, rectè con-
stitui, non posse. &c.

*Facula bo-
rizonti vi-
ciniores sūt
maiores, re-
cessu ab eo-
dē gracile-
scunt & fla-
uescunt.*

*Facularum
& Umbra-
rum idem
Motus, bo-
rizontem
insident, sed
Solem non
excedunt.*

*Macula
duorū die-
rum.
Facula pu-
ra duorum
dierum.*

*Umbra &
Facula v-
nius diei.*

*Ratio à prio-
ri, cur nimis
parui Cir-
culi, huius
Phænome-
ni motū ne-
queāt plenè
indicare.*



I M A G O S O L I S XXXII. 239

XXXII, Imago
Observationis.

IVLII.
Romæ in domo Professa
Societatis Iesu, à die 5. Iulij,
ad 12. eiusdem.

4. Iulij.

1625.

Dies.	Hora.	Q. eleuatio.
5.	8. mat.	34. 10.
6.	8 $\frac{1}{4}$ mat.	40. 30.
7.	7 $\frac{3}{8}$ mat.	26. 30.
eod.	7 $\frac{3}{4}$ mat.	32. 0.
8.	7 $\frac{3}{4}$ mat.	28. 0.
eod.	8 $\frac{1}{4}$ mat.	36. 0.
eod.	3 $\frac{2}{3}$ uesp.	40. 30.
9.	8. mat.	34. 0.
10.	8 $\frac{1}{8}$ mat.	36. 20.
11.	9 $\frac{3}{5}$ mat.	42. 10.
12.	7 $\frac{2}{8}$ mat.	31. 0.
eod.	4 $\frac{2}{5}$ uesp.	31. 0.

A, Oriens.

B, Occidens.

Cursus similis aliis aliorum
annorum, tempore eodem.

AB, Ecliptica, Numeri in perimetro
sunt Zenith, aut Nadir.



Notæ

Notæ in XXXIII. Observationum Imaginem,
Iulij quintam, à die 3. ad 15. eiusdem.

I.



*Ad absolu-
tam motuū
inuestiga-
tionem, ne-
cessarij sunt
Macularū
horizonta-
les contrac-
tus, & Mo-
tuū appa-
rentium ab
ortu in occa-
sum usque
expositi
aspectus.*

*Ex stationi-
bus tantum
intermedijs
curvitas iti-
neraria non
facile depre-
henditur.*

*Ex simili-
tudinaria
Motuum
intermedio-
rum appa-
rentia, hal-
lucinatio-
nes multa
posūt fieri.*

PRIMO. Qui in-
dubiā vult ex ob-
servationibus mo-
tuū apparentiū
à Maculis descri-
ptorū eruere doc-
trinam, debet ea-
rundem non tan-
tū crebras & continuatas diu, verum e-
tiam integras, & quantum possibile est,
ab horizonte orientali ad occidentalem
usque pertingentes absolvere observationes;
alioquin hærebit in multis, fluctuabit in
pluribus, exorbitabit in nonnullis. Nam
primi & postremi itinerum dies, maio-
rem curvaturæ & flexus partem in hoc
Phænomeno efficiunt & ostendunt, cu-
ius rei exemplum vel in hac ob oculos
proposita habes Macula; cuius cursum à
die 5. ad 12. sed per alias quàm hic do,
observationes expositam habes in sche-
mate antecedente; quem à rectitudine
non adeo multum deflectentem senties,
ita ut si aliunde huiusce negotij causam
& naturam ignores, planè nescias, curvus
an rectus iste incessus existat ex parte
rei: eò quòd eueniat facile ut obserua-
tionis vitio rectus in curuum, vel vice ver-
sa torqueatur. Quare integrum nunc cur-
riculum eiusdemmet Maculæ subnecto,
ut ex eodem practicè addiscas, etiam si
circa medium motus rectilinei similes
esse videantur, non idcirco tamen tales
ex necessitate existere, sed omnino in
alio motuum genere versari posse.

Secundò. Macula igitur a, Solem in-
trauit in boreali Solis plaga supra Eclip-
ticam A B, die 3. Iulij, tempore matu-
tino, & hora octaua astronomica ab ho-
rizonte iam se liberauerat, gracilis admo-
dum & tenuis, ad Eclipticam deinde sen-
sim accessit, quam etiam die quarto ma-
ne centraliter insedit, vesperi quoque non-
nulla sui parte superiore. die verò quinto,
omnino deseruit, in plagam australem
peruecta, in qua etiam ad occubitum
usque regularissimè incessit, figuram suam
secundum accliuatatem vel decliuatatem
aspectui nostro accommodans.

II.

1 Tertiò. Magnitudinis, & densitatis
mediocris fuit, nucleo prædita non ad-
modum denso & nigro, neque tamen ita
debili ut figura ipsius à reliquo nimbo
5 discerni non valeret, nam ubi circa me-
dium oblongus fuit, illic & Maculam ob-
longam præbuit. In ingressu & egressu
tenuitatē fili serici vix adæquauit: quod
expertus sum, traductione ipsius ad cen-
trum circuli obseruatorij, illic enim sub
10 radijs tubi rectis, figura ipsius gemina pa-
tebat; circa margines autem, more vsi-
tato, refractione spargebatur, & lucis il-
luvie subalbescebat.

15 Quartò. Figuræ ferme rotundæ, & mū-
dæ fuit: post medium nonnihil, sed sen-
sim capit decrescere & rarefieri, ita ut
in statu decretionis fuisse videatur; ita
tamen paullatim diminuta est, ut ad ho-
rizontem sine difficultate perueniret, a-
20 spectui sine difficultate patens.

Quintò. Accepi autem omnes obser-
uationes vespertinas, Primò, quia matu-
tinas in prioribus productas, nolui hic
fastidiose repetere; Secundò, ut obserua-
25 tionum mearum, cum ijs quæ in Colle-
gio Romano fuerunt factæ, maiorem con-
gruentiam ostenderem, sunt enim illæ à
meridie peractæ. Tertiò, ut experiaris si-
ue matutinas siue vespertinas obserua-
30 tionis exponamus, semper eundem cur-
sum apparentem prodire. Quod autem in
hac Macula toties præsentanda feci, id
possem præstare in plerisque; quemadmo-
dum paulo ante, in Notis ad Imaginem
35 præcedentem ex instituto monui.

Sextò. Mora huius Maculæ sub sole,
si bene omnia pensentur, dies tredecim
haud superauit, an omnino attigerit, du-
40 bium esse queat, non multum abfuisse,
certissimum est. ad horizontem enim,
præsertim cum motus sit curuilineus, len-
to feruntur gressu. igitur cum à die 3. ad
15. intercurrerint dies 12. & horæ quasi
45 10. si intervallo ortiuo etiam suum tem-
pus tribuamus, à diebus tredecim non
multum aberimus.

Septimò. Macula hæc à parallelo ma-
ximo non multum abest, tribus nimirum
gradi-

*Motus idē
ex observa-
tionibus seu
Matutinis
seu vesper-
tinis.*

IMAGO SOLIS XXXIII. 241

XXXIII. Imago. Obser-

ANNO IUBILÆO. MDC.XXV.

3. Iulij.

uationum



Cursus Macula à 3. Iulij. ad 15. eiusdem. in Domo Professar

Romana similis cursui Collegii Romani.


huius anni, et aliis aliorum annorum

tempore eodem.

A. Oriens.

AB. Ecliptica.

B. Occidens.



IVLII.

D. H. O. Ele.

D. H. O. Ele.

3. m. 8. — 34. 40.
3. u. +. — 34. 30.
4. u. + $\frac{2}{5}$ — 32. 0.
5. u. + $\frac{4}{5}$ — 27. 0.
6. u. + $\frac{2}{5}$ — 29. 30.
7. u. + $\frac{1}{4}$ — 23. 40.
8. u. + $\frac{3}{5}$ — 40. 30.
9. u. + $\frac{5}{6}$ — 17. 10.

10. u. + $\frac{3}{5}$ — 40. 10.
11. u. + $\frac{2}{5}$ — 32. 30.
12. u. + $\frac{2}{5}$ — 31. 0.
13. u. + $\frac{1}{4}$ — 32. 30.
14. u. + — 35. 0.
15. u. + — 35. 0.
15. u. + $\frac{1}{2}$ — 20. 30.

I.

II.

gradibus, unde necesse est, motum à paralleli maximi motu sensu vix differre: quare, si (positis in superficie Solis Maculis, quod suo loco ventilabitur) appa-rens paralleli maximi portio, semper la-tenti, ad sensum, æquatur: necesse est, etiam huius motus in hemisphærio oppo-sito latentem portionem, huic parenti quodammodo existere æqualem, vel cer-

to non multo maiorem: unde fatendum est, ipsam antequam die 3. Iulij oriebatur, in opposito insumere debuisse dies plus minus tredecim, adeòq; ante tot dies, in confinio vtriusq; hæmisphærij circa oc-casum videlicet inq; horizonte hemisphe-rij nostri parentis hæsisse. Igitur si Ma-culam aliquam tempori & loco illi cor-respondentem, inueniamus, illiusq; du-ratio-

Macula Re-
dux ex om-
nibus Cir-
cumstatijs.

I.

rationem hucusq; stabilem ostendamus, sine dubio rationabiliter existimabimus, illam Maculam esse hanc nostram, & nostram illam ipsissimam haud iniuria discernemus. Quare cum mense proximè elapso Iun. in Imag. XXVIII. inueniamus Maculam K, die mensis 19. occumbentem, locusq; & tempus concinant, neq; magnitudo aut figura multum dissentiant, possumus indubie illam catalogo reducum adscribere. Quod vt planius euadat.

Octauò. Ista Macula K, in patenti hemisphærio, ex umbra tenuissima, & Facula originem trahens, in Maculam excreuit, atq; augescendo horizontem exiuit, vnde in opposito hemisphærio absq; difficultate perdurauit. Præterea tempus ab occasu Maculae K, qui die 19. Iunij contigit, tempori ad ortum Maculae a, qui die 3. Iulij euenit, respondet præcise illi tempori, quod Maculae K in opposito hemisphærio peragrandò deberetur. Amplius si tempus totum periodicum ab occasu Maculae K, ad occasum Maculae a, computetur, & conferatur cum tempore periodico eiusdem Maculae K, cum Maculae a, à Meridie ad meridiem, aut ab ortu

II.

ad ortum; omnia inter sese ad vnguem conuenient atq; æqualia erunt. Præterea Macula K in occasu tanto amplius absuit ab Ecliptica quam Macula a, quantum debebatur ex poli Arctici ascensu & accessu ex occasu in ortum, quantum fecit Macula a ex austro versus Septentrionem. Accedit Magnitudo Maculae, nuclei geminati adunatio, & Facularum post Maculam a comitatus, qui ex usitata huius Phænomeni consuetudine, in locum Macularum sequentium succedere potuit. Atq; ex his, prudens Lector, etiam huic Maculae locum inter durabiliores, haud inuitus concedat.

Nonò. Ex istis pulcherrimè intelliges primam huius Maculae originem, & reliquum illius decursum; nam die 8. Iulij, mane circa horam septimam, in Sole illuxit, sub Faculis duabus K coniunctis, cum admixtione tenuium umbrarum, quæ die sequenti 9. more solito progressæ sese diduxerunt, tum 10. & sequentibus in Maculas excreuerunt, & sic ab 8. Iulij, ad 15. Iulij, circa Solem, vel melius fortassis vnâ cum Sole, suas reuolutiones peregerunt, quemadmodum suo loco & tempore exactius discutietur.

Notæ in XXXIV. Observationum Imaginem, Iulii sextam, à die 3. ad 15. eiusdem.

I.



E quis fortasse dicere aut suspicari valeat, me in ipsa itinerum curuitate indaganda falsum esse, en præter adductos hactenus ex alijs Prouincijs testes, alium proximum non tantum oculatum, sed huiusce rei optimè peritum, & non tantum aliàs de re Mathematica, sed hoc etiam Phænomeno optimè meritum adducò; qui multis meis obseruationibus, adfuit frequenter, Maculasq; & Faculas sæpe conspexit, & Theoricis suis atq; Mechanicis inuentis, conatus meos plurimum promouit. Igitur dum ego in domo professâ hanc Maculam indago, eandem P. Christophorus Grünenberger in Collegio Romano, circulo paullo minore excepit temporibus pomeridianis, atq; ex

II.

obseruationum stationibus in hunc quem ob oculos pono, cursum calculo astronomico ipsemet digessit. Ego nil addidi, nil dempsi, sed sicut ab illo accepi, ita fideliter huc transtuli. An motus hic apprens meo sit affinis & proportionalis necne, tu quicunque es æquus Lector, & spectator iudica. An motus hic curuitatem regularissimam non præ se ferat, tu arbitrate. An spatia diurna in ortu sensim maiora ad medium, ab hoc semper minora ad occasum, ascensiones accliuæ, & descensiones decliuæ non arguât, tute existima. Certè neq; in toto istius Maculae decursu obseruando, neq; in ordinanda ipsius progressionē, alter alteri quidquam communicauit. Si igitur nihilominus tanto motuum apparentium similitudo in circulis, locis, & horis non

iisdem

I M A G O S O L I S XXXIV. 243

I.
iisdem contigit; quis non videt, hæc non
casu aut fortuna, aut alteratiunculis for-
tuitis, vel exorbitationibus accidenta-
riis, sed summa ratione in cælo ex diuina
ordinatione & nature præscripto fieri?
Horas autem & temporum momenta

II.
1 obseruationibus correspondentia non ad-
iungo, quia motum per illa, motusque
qualitatem non illa inquirimus; motum
hic habes à Viro tanto proditum, illis fi-
des obseruatis queritur, hanc auctori-
6 tas Viri, iure merito facit.

XXXIV. Imago Obser-
uationum,

Anno IVBILÆO. 1625.

In Collegio Romano Societatis



Cursus Macula à 3. ad 15. Iulij, similis Cursui Domus Professæ.
et aliis aliorum annorum, tempore eodem.

A. Oriens.

B. Occidens.

AB. Ecliptica

Obseruatore R. P. Christophoro Grünbergero.

Soci. Iesu Mathematico



Notæ in XXXV. Observationum Imaginem,
Iulij 7. à die 12. ad 24. eiusdem.

I.



PRIMO. Habes hic Maculæ a, Imagine 23. & alijs multis hætenus expositæ, dies quattuor ultimos, & totum Solis illis diebus aspectum: cum enim illius initium cum omnibus accidentibus dedissem Imagine XXXI. progressum Imagine XXXII. ipsam verò Maculam solitariam Imagine XXXIII. hic nunc accipis reliquias ipsius, à die 13. vsque ad 15. in quibus considerata sunt.

Primò. Omnia ea quæ die 13. occurrunt, quales sunt umbræ & Faculæ, Maculam a pone sequentes. deinde Faculæ d antecedentes, tam versus boream quam austrum, Maculamque parvam d. Item Faculas e australes, ante non animaduersas. Præterea Faculas orientales p, ordine pulcherrimo per triduum cum umbris progressas, itemque Maculas centrales q: nec non Faculas o, de quibus mox seorsim. hæc igitur omnia simul manifestauit nobis dies decimustertius.

Secundò. Die 14. in considerationem veniunt ex parte occidentis, ipsa Macula a, cum Faculis consequentibus, & antecedentibus, marginemque secantibus d. item Faculis e, quarum occidentiores horis insidebant. Maculæ insuper centrales q. quarum hodie diuaticatio, & numerus auctus est. Ex parte orientis sistunt se Maculæ o, de quibus mox: deinde Faculæ p, auctiores.

Tertiò. die 15. occurrit in occasu sola Macula a; in ortu Maculæ o, mox explicandæ: insuper Faculæ p, in plaga orientis, cum indicijs umbrarum, Maculas parturientium. Et hæc quidem hoc triduo euenerunt, nunc ad Faculas, & Maculas o accedamus.

*Facularum
in umbras
& umbrarum
in Faculas
degeneratio*

Secundò. Faculæ & umbræ o, primum conspectæ sunt die 12, & adhuc tales manserunt die 13. postea verò die 14. disparentibus Faculis, umbræ multæ, sed tenues admodum in Macularum formas capere redigi, ita vt die 15. plurimæ, eæque distinctæ inter se, sed minutæ Maculæ apparerent, prout in schemate assignatum habes; quæ ad 10. & deinceps

II.

1 in monstrosam vastitatem atque multitudinem, mirabiliter excreuerunt, & vicissim quodammodo distractæ sunt, vt spectaculum planè consideratione dignissimum afferant intuenti. demum 22. die, in Faculis circum circa fulgentibus, & umbris tenuibus, ad occasum regularissimè properarunt, tres Maculæ, magis inter se disiectæ, quam circa ortum fuerant eadem vel Faculæ, vel umbræ die 12
5 13. & 14. vel etiam die 15. tam in longum, quam in latum Maculæ: quod bene notandum est, præsertim cum in eodè quasi parallelo inceserint. Item umbræ boreæ
10 in exitu, videntur fuisse diebus præter lapsis parvæ sequaces Maculæ: sicut media Macula o, è mediarum eortione apparenti processit. Postrema harum Macularum videtur die 23. cum media coiuisset; eadem certè 24. mane Solem primum exiuerunt sub forma vnus longè, considera schemata lateralialia, dierum 23.
15 & 24. vnde euident est, ipsas in Sole hæsisse ultra dies 13. Quia interuallum orientale inter umbræ orientiorem, & marginem Solarem, est maius quam vnus diei. vigesima autem 4. mane hora 7 $\frac{3}{4}$. adhuc in horizonte occiduo hærebat. à duodecimo igitur die matutino ad 24. matutinum, interueniunt dies 12. quibus adiectum spatium inter orientem & statione diei 12. efficit plus quam diem.

Notandum etiam è minutis Maculis diei 15. & magnas Maculas & tractus umbriferos continuos sequentium dierum excreuisse, &c. Nucleos insuper habuerunt plurimæ illarum, & Faculas continuas in gremio circumtulerunt.

40 Tertiò, Umbræ & Faculæ p, suum cursum & variationem in figura, raritate, & densitate ad 22. vsque ostenderunt, prout subiectæ designationes docent, & in medio quidem minores, apud extrema maiores apparebant: post 22. penitus desierunt. Ancipites quodammodo fuerunt inter umbras & Maculas ordinarias: tandem in Faculas, & cum Faculis abiuerunt. Maculæ q, duos in Sole dies fecerunt, nec ante, neque post visæ, raræ & luce dilutissimæ, & diuaticatione prodigiøsæ.

Quintò,

Facula, umbra, & macula æqualiter incedunt.

Spatia ampliora, quàm motus æqualis patitur, etiam in eodè parallelo.

E Maculis umbra.

Mora in sole ultra dies 13.

E minutissimis maculis fiunt maxima Macula, &c.

Mira umbrarum & facularum, Metamorphoseos.

Macula duorum dierum, in Sole medio, plus æquo diuaticantur.

IMAGO SOLIS XXXV. 245

Quintò, t, est Facula pura in horizon-
te australi die 16. ex oriens; deinde ulte-
rius progressa post diem 18. nulla fuit, r,
duæ circa occasum australem Maculæ,
Faculam luculentam complexæ, nouiter
exortæ in Sole. Sic quoque S Faculæ &
Maculæ in ortu australi, à die 17. ad 20.
sic u, vmbra & Faculæ, de nouo apparen-
tes, breues in Sole moras, sed vias omni-

bus communes tenuerunt.

Sextò. Interim obiter situm cursus to-
rius ad Eclipticam perpende, quomodo
videlicet augescente curuitate, motus ad
æquilibrium sensim accedit, & chordæ
per æqualia à centro C distantia puncta
traductæ, ad Eclipticam ferme fiunt pa-
rallæ, &c.

*Curuitas
Motus &
chordarum
ad Eclipticā
obliquitas
augetur. Po-
lus arcticus
ascendit.*

XXXV, Imago
Observationu,

IVLIVS
Romæ in domo Professa Societatis

7. Iulij.

MDCXV.

à die 12, ad 24

Iulij.

IVLII

Dies — Hora — Eleuatio

12. m.	7 $\frac{7}{8}$	31. 0.
13. m.	7 $\frac{1}{2}$	29. 0.
14. m.	8 —	33. 0.
14. m.	8 $\frac{1}{2}$	40. 0.
15. m.	8 $\frac{1}{2}$	40. 30.
15. m.	8 $\frac{3}{4}$	44. 20.
16. m.	7 $\frac{8}{9}$	32. 0.
17. u.	6 $\frac{1}{6}$	13. 0.
18. m.	7 $\frac{1}{4}$	24. 0.
19. m.	6 $\frac{1}{2}$	18. 0.
20. m.	7 $\frac{5}{8}$	29. 0.
21. m.	8 —	34. 30.
22. m.	8 $\frac{1}{2}$	36. 0.
23. m.	7 $\frac{7}{8}$ 32 $\frac{5}{8}$ 40.	
23. u.	7 $\frac{1}{4}$ 43. 40.	
24. m.	32. —	0. N

AB, Ecliptica: Z, Zenith;
N, Nadir. NAB, Plaga Orien-
talis in O; NB Z, Occi-
dentalis in eodem.

Notæ in XXXVI. Observationum Imaginem,
octauam Iulij, primam Augusti, à die 25.

Iulij ad 8. Augusti.

Facula & umbra, cum Maculis a- que mouen- tur.



Vmbra mar- ginales, cir- ca medium sunt saepe Maculae.

Vmbra fre- quenter in ortu Macu- las subsequi- ta, antece- dunt in oc- casu.

Maculae in Faculas a- beunt.

Maculae mi- nima in te- nuem veluti nebulam, tã- demq; in Fa- culas resolu- ta.

Cursus pa- ralleli.

I.

RIMO, Macula a, austrina, cum Faculis & vmbis ingressa, cum iisdem diu progressa, denique & Solem egressa est: non autem hic consigna-

ui omnes stationum formas.

Secundò. Circa margines conglobatae intra Faculas vmbrae, fuere in medio spar- sae & raræ Maculae, prout id continuatus alias observationum vsus satis edocet. exemplum est in vmbis & Maculis d. &c. Sed & eadem Macula seu vmbra ge- minata d; videtur in plaga orientali Ma- culam a secuta, in occidentali anteces- sisse, &c. id quod in alijs quoq. Macu- larum apparitionibus singulari studio in- dagans aduerti. Vmbrae c, ad finem cum Faculis sese exhibent.

Tertiò. Arcus itinerarius sensim ad æquilibrium respectu Eclipticæ accom- modatur, semperq; curuescit amplius, & polus arcticus ascendit.

Quartò. Maculae b, & c, die 31. Iulij, ex initio tenui egressæ, in numerum & mo- lem satis magnam, repente creuerunt: mi- req; se & suam figuram variauit postrema illarum b, donec die sexto & deinceps, in Faculam & quasi nihilum abiuit.

Maculae inter b & c interiectæ, i. Au- gusti & multæ & parvæ, & distinctissi- mæ erant; postea in nebulæ & fumi mo- rem confundi & continuari, tandemque in Faculas accendi capere, vt intuenti claret.

Quintò. Arcus itinerarius b, arcui a, parallelus videtur esse; & recta ex b ad Eclipticam perpendiculariter demissa, si

II.

1 in arcum a producatur, æqualis appa- ret, ad sensum alteri ex a similiter in ar- cum b trajectæ &c.

Sextò. Tempus itinerarium arcus a, 5 ab horizonte ortiuo in occiduum, si bene expendatur, ultra 12. dies non multum excessit: at verò mora Maculae c, ex die 2. in 8. sex integros; quod tempus cum non sit dimidium totius curriculi, cui- 10 dens est, Maculam c, ultra dies 12. mul- tum excessuram, & si omnia rectè pen- sentur, haud dubie 13. superaturam, fuisse ab horizonte ad horizontem eun- do, si substantia illius id tulisset: nunc 15 cum in Sole nata integrum cursum non pergerit, ex medietate licet de integro argumentari.

Septimò, ex occidentalioribus & an- 20 tecedentibus paruis Maculis c, die 31. Iu- lij primùm enatis, coaluisse, postea die- bus sequentibus & perdurauisse Maculā vnicam c, nullum est dubium; vnde pa- tet, quomodo deinde b atque c, à se mu- tuo recedendo, nunquam in eandem pro- 25 portionem accesserint: nam licet in eo- dem parallelo sint latae, tamen distantia, quas b & c, die 4. & 5. fecerunt supera- uerunt distantiam diei 31. &c.

Octauo. Aduertendum quoq; etiam si 30 Maculae b & c, simul & semel, ex iisdem initijs atq. in eodem parallelo exortæ de nouo in Sole fuerint, non tamen simul desisse, sed durante c, periisse reliquas, in Faculasq. resolutas euanuisse.

35 Vide cursus Duacenos Tabulae 1. Ima- ginis XL. & Ingoistadianum Tab. II. ibi- dem, sunt enim similes hisce, licet non earundem Macularum, quod non refert; sufficit tempus quasi idem.

Cursuum mora ina- quales.

E multis paruis fit v- na & durat.

Distantia ultra æqua- litatem au- ctæ.

E multis paruis fit v- na & perit.

Diuerfor- tiorum annorum cursus simi- les.

Notes in XXXVII. Observationum Imaginem
Augustianam, a die 25. Julij. ad 1. Augustum.

XXXVI, IMAGO

Anno IVBICAO. 1625.

8. Julij.

1. Augusti.

Observationum

In Domo Professa Romana Soc.



Cursus Macularum a 25. Julij. ad 1. Augusti.

similes Duacenis, anni 1624 et Ingolstadiana anni

huius, nec non aliis aliorum annorum tempore eodem.

A. Oriens.

A B. Ediptica.

B. Occidens.

IVLII.

D. H. O. E. I.

25. m.	8.	34.	0.
26. m.	6 1/2.	23.	0.
27. m.	5 1/2.	22.	0.
28. m.	7 1/4.	31.	30.
29. m.	—	22.	30.
30. m.	7 1/4.	31.	0.
31. m.	7 1/2.	25.	0.

AVGVST.

D. H. O. E. I.

1. m.	8.	32.	0.
2. m.	7 3/4.	30.	30.
3. m.	6 1/4.	19.	30.
4. m.	6 1/2.	29.	30.
5. m.	7 1/2.	22.	0.
6. m.	7 1/2.	27.	0.
7. m.	7 2/3.	17.	20.
8. m.	7 1/2.	27.	30.

Notæ in XXXVII. Observationum Imaginem,
Augusti secundam, à die 6. ad 24. eiusdem.

I.



RIMO. Macula a borea spectabilis, nucleum nigerimum in principio gracilem oblongumq; ostendit, deinde sensim ascensu

Nuclei etiã ad horizon-tem nigri.

amplauit, tandemq; geminum & triplicem, sed descensu rursus procerum, atq; tandem vnum oblongum monstrauit, spatio inter disiectos albicante: id quod alijs aliarum Macularum nucleis crebro accidit.

Secundò. Corpus circa nucleum circumiectum sese secundum ipsius habitum accommodauit, & nescio quem superius gibbum gerens, tandem separauit, & circa finem in Faculas conuertit.

Tertiò. Faculas post se tam in ingressu quam exitu luculentas traxit, vmbris inspersis. & Faculae horis viciniores, ampliores & luculentiores erant, rariores & minores atq; magis dispersæ quò cetero viciniores, quæ omnia in adiectis figuris lateralibus patet, die 8. 9. 10. circa ingressum. & 18. atq; 19. circa exitum. quanquã vtrobiq; etiã aliquid Facularum antecesserit.

Facula ad horizontem ampliores, quam ab eodem distat. Magis sequitur quã antecedunt Maculas.

Mora itin-eris dierum quasi 14.

Quartò. Horizontem vtrinq; quasi attingebat: cum igitur à 6. die matutino, ad 19. matutinum, sint dies 13. ipsa verò Macula die 19. hora pomeridiana 4. adhuc fuerit in Sole, patet ipsam in eodem moratã esse, ultra dies 13. & dimidium. imo si spatium orientale, & curuitatem itineris, morasq; propterea ad horizontem longiores reputamus, dies quattuordecim fere indulgebimus huius Maculae Cursui. Considerandæ etiam Maculae c, quæ ex vmbris & Faculis Maculã comitantibus progressæ, in easdem resolutæ apparent &c. circumduxit etiam hæc Macula secum coloratam aream, prout indico die 9. 11. & 12. & hosce dies tantum exempli causa, adduco, quia alijs quoq; idem euenit. De hac Macula vide plura num. 12.

Area nim-bosa.

Cursuum Mora inae-uales, & maioris ceteroq; propioris minor: minoris & remotioris, maior.

Quintò. Macula australis b, ab horizonte ad horizontem insumpsit plus quã dies 12. ad 13. tamen non peruenit, itaq; borealis cursum non adæquauit, Eclipticæ tamen & parallelo maximo multo vicinior, adeòq; ambitu patentiore & circulo maiore delata, tẽpore tamen minore.

II.

Sexto. Hæc eadem vmbras & Faculas post se magis traxit, quam præmisit, ut patet: easdemq; horis viciniores, putiores & densiores exhibuit.

Vmbra & Facula post se sequuntur &c.

Septimò. Stationes quoq; a & b, ab horizonte æqualiter remotæ, sensu inter se quasi æquales apparent.

Octauò. Vtriusq; autem Maculae cursus ad æquilibrium æquali passu appropinquat, à quo tamen paucillum absunt, indeòq; Ecliptica valde obliquè secatur. Polus arcticus adhuc ascendit.

Directio itinerum adhuc ex Arcto in Austrum; curuitas & obliquitas augetur; polus ascendit.

Nonò. Comites Maculae b, eandem post centrum ferme deseruere: circa exitum in vmbras & Faculas degenerauere.

Decimò. Cursus Maculae a, obseruatus Ingolstadij, habetur in Tabula II. Imaginis XL. quam consulas.

Vndecimò. Cursus Maculae b, habetur ibidem, Tabula IV. expositus. vbi videbis summam motuum, curuitatum, & situum cum meis similitudinem & proportionem.

Duodecimò. Maculam a esse reducẽ, atq; eandem quæ fuit Macula o in Imagine 35. exposita, suadet 1. idem parallelus, in quo vtraq; incessit: eundem autem vtriusq; esse parallelum, est euidens ex breuissima vtrorumq; a centro C distantia, & debita ad Eclipticam positione, quæ in eo consistit, ut cursus o, sub orientem tato plus, sub occidentem tato minus absit ab Ecliptica, quam cursus a; quantum ex axis & poli annui promotione requiritur. id autem ita sese habere, egregie cursus ipsi ex obseruationibus concinnati comprobant: sicut experiẽti & cõferẽti patebit.

Macula a, reducẽ, ex omnibus circumstantijs.

Macula a, reducẽ probatur ex eodem parallelo.

Secundò. Tempus hæc rem quasi certam facit. Nã mora ab occasu Maculae o, ad ortum Maculae a, est breuior quã sit alterutrius in hemisphærio patetẽ transitus: quod ita fieri oportet, si eiusdem reditus accadat. præterea, vtrarumq; cursus, sunt temporum æqualium. periodi quoq; ab ortu ad ortum, periodis ab occasu ad occasum, vel à medio ad medium equantur. & oēs periodi intra dies 26. & 27. consistunt.

Ex tempore periodico.

Tertiò. Figurarum quoq; & magnitudinum, atq; nucleorum necnon comitatus in vmbris, Faculis, & minutis Maculis factis magna similitudo interuenit.

Ex figura magnitudi-ne, nucleis, & vmbra-rum comita-tu.

Quartò.

IMAGO SOLIS XXXVII. 249

Ex statu &
duratione
Maculae
interna.

I.
Quartò. Tandem ipsius Maculae status id plane requirit, cum enim à die 12. Iulij ex umbris & Faculis caperit enasci, atq. in magnam, crassam intensamq. molem excrescere, & sic Solem augescendo die 24. exiuerit: impossibile est, vt tam cito, præter morem Phænomeni, defecerit, atq. ad alterum orientis confinium,

II.
salua adhuc, & aliqua saltem sui portione integra, non aduenerit. Quamobrem ex hisce tantis indicijs, dubium vix vlli rationabiliter superfit, Maculam o eandem fuisse, quæ sit a, & vice versa. Quinquâ suis locis & temporibus, aliter hæc ipsa tractabuntur.

XXXVII. Imago Obser-

M.DC.XXV

uationum.

In Domo Professæ Romana Soc:

Augusti.



Cursus Macularum, à 6. Augustij
ad 24. eiusdem.

Similes Ingolstadianis, anni eiusdem,
et alijs aliorum annorum.

AB. Ecliptica.

AVGVSTI

A. Oriens.

D. H. O. E. l.

6. m.	7 $\frac{1}{2}$	27. 0.
7. m.	7 $\frac{3}{4}$	27. 20.
8. m.	7 $\frac{1}{2}$	27. 30.
9. m.	7 $\frac{4}{5}$	25. 30.
10. m.	7 $\frac{1}{2}$	26. 0.
11. m.	7 $\frac{3}{4}$	28. 30.

D. H. O. E. l.

12. m.	9	41. 20.
13. m.	7 $\frac{1}{4}$	23. 0.
14. m.	7 $\frac{3}{4}$	29. 0.
15. m.	8	30. 0.
16. m.	7 $\frac{1}{4}$	21. 50.
17. m.	9 $\frac{1}{11}$	44. 30.
18. m.	8	29. 0.
19. m.	7 $\frac{1}{8}$	26. 0.
19. u.	4 $\frac{1}{5}$	27. 25.

D. H. O. E. l.

20. m.	8 $\frac{1}{2}$	34. 10.
21. m.	7 $\frac{2}{10}$	28. 0.
22. m.	7 $\frac{1}{10}$	25. 0.
23. m.	7 $\frac{3}{5}$	25. 20.
24. m.	7 $\frac{1}{10}$	18. 5.
24. u.	4 $\frac{3}{5}$	22. 30.

B. Occidens.

N

Notæ in XXXVIII. Observationum Imaginem,
Augusti tertiam, à die 17. ad 27. eiusdem.

*Aequili-
brium auc-
tumnale
instat; cur-
sus maxime
curvilineus
polus arcti-
cus altissi-
mus.*



R I M O, Macula a,
ferme descripsit
motum ad æqui-
librium auctum-
nale seu Arctoum
ita vt quælibet
duo puncta in ar-
cu itinerario æ-

qualiter vtrinq; à centro C, remota,
æquè distent etiam ab Ecliptica A B;
seu quod idem est, recta linea per quas
Maculæ stationes quascunq; à centro C
æquè remotas incedens, Eclipticæ sit pa-
rallela: idèque motus est nunc maxime
curuus, & obliquitas ad Eclipticam vel
summa, vel nulla, eo quod chordæ cum
eadem vel coincident, vel parallelæ exi-
stant. Polus arcticus culmini proximus,

Secundo. Die 17. non apparuit nisi v-
nica Macula, prout designavi; sequenti
accessit Facula sequens cum duabus ena-
tis Maculis, quæ deinceps eam quam vi-
des variationem versus exitum procedē-
do præ se tulerunt.

Tertio. Considera Maculam d, quo-
modo sensim in duas & plures resoluta,
die 24. non comparuit amplius: cum ta-
men die 19. & 20. fuerit vna magna, con-
tinua, sed tenuis umbra.

Quarto. Considera item Maculam e,
quomodo die 19. fuit gemina, postea
auxit in quinq; & plures, rursusq; die 22.
in vnam magnam distensa est, semperque
à primaria Macula a, magis recessit, ita
vt die 27. plus distaret ab eadem, quam
die 21. quod tamen in motu vniformi
non debebat fieri: & tandem 28. omnino
videri desineret &c. vide num. 8.

*Mora mo-
tus ultra
dies 13.*

Quinto. Duratæ huius Maculæ prima-
riæ a, sub Sole inter stationem primam,

1 & vltimam fuit dierum 12. horarum 7.
Cæterum quia neq; in occasu, neq; in or-
tu horizon verè contactus fuit, restat v-
trobique minimum vnus medius dies; &
5 sic totus ab horizonte ad horizontem
transitus, superauit dies 13. sed neque ad
dies quattuordecim, neque ad moram
tantam peruenit, quantam in imagine
priori Macula a perfecit.

10 Sexto, Maculæ vel potius vmbra b,
tenuissimæ & rarissimæ, luce dilutæ, diu-
turiorem vitam non habuere, quam hic
expressam cernis, interim tamen inter-
uallis quidem diurnis maioribus, quam
15 Macula a, vijs tamen sphericis haud
dissimilibus, & distantijs iterum paral-
lelis cucurrerunt.

Septimo, Quod idem de Maculis, vm-
bris & Faculis c, asserendum esse, expe-
rientia monstrauit. Erant ex Maculæ Fa-
culis intermixtæ satis multæ, sed quia in
decremento quotidiano comparebant,
20 duos tantum dies observationibus inde
consecraui, quod die 20. & sequentibus
ita debiles essent, vt oculorum aciem pæ-
ne effugerent. nihilominus & hi ipsi duo
dies, cursum omnium communem se-
quuntur, vt intuenti manifestum euadit.

Octauo, Sicut Maculæ d & e, citò &
30 multum creuerunt, ita eadem celeritate
decreuerunt: nam die 18. vix aliqua sui
indicia præbuerunt, quæ diebus deinde
secutis, numero, & mole ita auxerunt,
vt omnes Maculæ diebus 22. 23. & 24.
35 vna continua Macula apparerent, quæ ta-
men statim dissolui capta est die 25. &
tandem Maculæ d & e, omnino dena-
tæ sunt; nouis in exitu versus austrum
agnatis.

*Quod cito
nascitur, ci-
to perit.*



IMAGO SOLIS XXXVIII

251.





XXXVIII, Imago
Observationis.

ANNO IVBILÆO. MDC. XXV.
In Domo Professa Romana Societatis

3. Augusti.



Cursus Macularum à 17. Augusti, ad 29. eiusdem.
similis Ingolstadiano anni huius, et aliis aliorum
annorum tempore eodem.



AVGVSTI.

D-H-O.EI, D-H-O.EI,

17. m. 9 $\frac{5}{11}$ - 44. 30.	24. m. 7 $\frac{1}{2}$ - 24. 0.
18. m. 8 - - 29. 0.	25. m. 8 - - 28. 0.
19. m. 7 $\frac{8}{8}$ - 26. 0.	26. m. 8 $\frac{7}{10}$ - 32. 30.
20. m. 8 $\frac{1}{2}$ - 34. 10.	27. m. 7 $\frac{1}{3}$ - 22. 40.
21. m. 7 $\frac{9}{10}$ - 28. 0.	28. m. 8 $\frac{7}{8}$ - 36. 30.
22. m. 7 $\frac{5}{8}$ - 25. 0.	29. m. 8 $\frac{1}{2}$ - 32. 0.
23. m. 7 $\frac{2}{3}$ - 25. 20.	29. u. 3 $\frac{1}{2}$ - 32. 25.

Notæ in XXXIX. Observationum Imaginem,
quartam Augusti, primam Septembris, à die
26. Augusti, ad 16. Septembris.

I.

PRIMO. Macula a australis simplex ad aspectum ingressa, paulatim sese in duas, primum nucleo duplici, tum ipsa positione, explicauit; creuit ad medium, secundum magnitudinem depictam, & secundum eandem decreuit in parte occidentali; traxit post se initio Maculas, umbras & Faculas, in egressu meras, sed satis debiles Faculas. intercapedinem albam, Maculas disiungentem à die 4. ad finem vsq. seruauit. duratio ipsius sub Sole dies 12. non multum superauit. certum est enim, ex quotidiana huius Phænomeni experientia, residuum spatium inter stationem diei 7. & marginem, integrum diem non æquare; quod tempus si coniungatur cū medio die initiali, fiet plus quam dies integer, vnde addendo reliquos dies vndecim, efficies huius Maculæ curriculum aliquanto plus quam dierum 12. Nuclei inter circumiectos vapores, plus in occasum vergebant toto fere cursu. Huius Maculæ arcus itinerarius in æquilibrio consistit. vnde chordæ per puncta à centro C æquè distita ductæ, sunt ad Eclipticam parallelæ.

Cursus Maculæ a, dies 13. non attingit.

Factus est in æquilibrio auctā. nali.

Polus arctici mediat.

Chordæ Eclipticæ non secāt, sed vel concidunt vel æquidistant.

Macularū b, Moræ diurnæ ferme 14.

Macularū in Vmbras & Faculas conuersio. Via Macularum b, æquilibrio transcendit.

Notanda. Macularū a senimius discessus.

Secundò. Macula vel potius Maculæ b boreales, 2. Septembris primum, 14. Postremum conspectæ, in Sole non multum infra dies 14. commoratae sunt. nam spatia vtrunque à prima & vltima statione ad horizontem vsq. interiecta, hoc tempore ferme diurna sunt, ob ascensionem & descensionem obliquam. duæ hæ Maculæ antecedentes ad medium vsque sese tangebant, post medium in tres sunt secretæ, quæ sensim in minutæ sic etiam exiuerunt. Traxerunt post se Faculas, umbras & Maculas, quæ sensim in umbras, & Faculas abiuisse apparent. Aequilibrium nonnihil excessisse videntur, in parte occidentali: nam via itineraria harum Macularum, ab itinere Maculæ a sensim discessit, versus Z, accedendo.

De dictis Maculis b notanda sunt insuper sequentia.

Primo. die tertio valde vicinas sibi

II.

apparuisse tres. Secundò, die quarto orientaliorem illarum à duabus occidentaliorebus multum recessisse. Tertiò, Eadem die 5. 6. 7. 9. non tantum incredibiliter recessisse à primis, vel illas ab hac, sed hanc insuper in plures minimas resolutam esse. Quartò, Et has ipsas, vnâ cum alijs intermedijs, die 12. & sequentibus in umbras & Faculas eximias conuersas esse. Quintò, Primas quoque sensim imminutas, & nouarum paruularum accessu multiplicatas esse.

In Vmbras & Faculas conuertuntur.

Tertiò. Macula c, borealis die 3. Septembris in Sole primum conspecta, vltimum visa est, eiusdem die 16. circa meridiem, ab hora autem 7. matutina diei tertij Septembris ad eandem horam diei 16. existunt dies completi tredecim: interuallum inter Maculam & horizontem orientalem interceptum, facile diem medium aut fortasse plus exigit; cui adiectæ horæ residuæ circa occasum, constituent fere diem integrum, mora igitur huius Maculæ supra horizontem, dies 14. fere attingit. Etiam duos nucleos, & figura longa duas quasi Maculas ostendit; nunquam tamen diuisa, sed continua egressa. Faculas & umbras post se vtrinque traxit, quarum figuras & numerum schema exhibet. In statu videtur hæc Macula extitisse, occidua enim magnitudo orientali par apparuit.

Mora supra horizontem dies quasi 14

Macula in statu.

Quartò. Maculæ d, itidem boreæ die 5. Septembris de nouo exortæ, postea die 6. & 7. numero auctæ & spacio longitudinis dilatæ, octauo in maiores sed pauciores coaluerunt, quæ sequentibus diebus absorptæ, solam primam, sed auctam reliquerunt, quæ circa exitum umbras & Faculas, ex dictis Maculis vtrique causatas post se euexit. Curriculum ipsius, si ratio à semicursu rectè ineatur, duratio, æquauit reliquorum moram.

Macularū natiuitas, incrementū, & dilatio.

In exitu die 13. ipsum horizontem omnino contigit diuque insedit ipsius inter ab itinere Maculæ c, in medio magis distat quam in fine.

Itinera non parallela.

Quinto. Dictarum Macularum b, c, & d,

XXXIX. IMAGO

Observationum.

ANNO IUBILÆO. MDCXXV.

In Domo Professa Romana Societatis.

Augusti. 4.

Septemb. 1.



Cursus Macularum, à 26. Augusti, ad 16. Septembris.

Similis aliis aliorum annorum tempore eodem.



AVGVSTI.

SEPTEMBRIS.

D	H	○.E.	D	H	○.E.	D	H	○.E.
26. u.	4 $\frac{1}{2}$	23. 0.	1. m.	7 $\frac{1}{2}$	19. 30.	11. m.	8 $\frac{1}{2}$	21. 0.
27. m.	7 $\frac{1}{2}$	22. 40.	2. m.	7	16. 0.	12. m.	8 $\frac{1}{2}$	26. 50.
28. m.	8 $\frac{1}{2}$	38. 0.	3. m.	7	16. 0.	13. m.	7 $\frac{1}{2}$	20. 0.
29. m.	8 $\frac{1}{2}$	32. 0.	4. m.		19. 40.	14. m.	8 $\frac{1}{2}$	25. 0.
30. u.	2 $\frac{1}{2}$	40. 30.	5. m.	7 $\frac{1}{2}$	18. 0.	15. m.	8 $\frac{1}{2}$	28. 35.
31. m.	8 $\frac{1}{2}$	35. 40.	6. m.	7 $\frac{1}{2}$	22. 0.	16. m.	7 $\frac{1}{2}$	18. 0.
			7. m.		17. 0.	16. m.	11 $\frac{1}{2}$	39. 0.
			8. m.	7 $\frac{1}{2}$	20. 40.			
			9. m.	8	24. 10.			
			10. m.	7 $\frac{1}{2}$	19. 0.			

I.

II.

Directio in-
neraria ex
Austro oriē-
tali, in Sep-
tentrionem
occidentālē.
Situs & fi-
gurarum
aspectus ex
positu sphæ-
rico.

& d, itinera excefferunt equilibrium, & versus occasum ab Ecliptica magis recefferunt, quàm in oriente: vt intuenti & experienti constat.

Sextò. Omnes harum Macularum situs & figurarum conformationes, respiciunt quodammodo centrum C, ex positione spherica prodeuntes.

Septimò. Certissimum est, boreales

hosce Macularum cursus, australibus longiores fuisse. Nam constat australem a, dies tredecim non hēsisse in Sole, boreales autem eosdem superasse evidens est.

Octauò. Certissimum quoque est, in cursibus a, b, & d, Maculas in iisdem parallelis latas, non seruasse equabiles motus; constat hoc ex aspectu Macularum & Cursuum.

Inaqualis Macularum sub Sole mora.

Macula in iisdē parallelis inaequaliter lata.

Nonò.

I.

Nonò. Aequilibrium autem motus inter Augustum, & Septembrem, singulis annis fieri, constans tot annorum experientia docet. In eodem autem Aequilibrij tempore omnium Macularum, Facularum & ymbrarum itinera, obuertere suam concavitatem versus Z, seu plagam borealem; conuexitatem versus N, seu plagam meridionalem, itidem ex obseruatis certissimum est.

Aequilibrium hoc autumnale redit annue.

Aequilibrium cito è statu suo ad sensum precipitatur.

Aequilibrium eodem

Decimò. Amplius Aequilibrium hoc ad sensum non tam diu durat, quamdiu motus apparens rectilineus, sed intra paucos dies è statu sensibiliter eiecitur; vt obseruationes edocent.


Vndecimò. Insuper Aequilibrium hoc singulis annis tempore hoc, situ & modo tali apparere, obseruationes con-

II.

tinuata tot annorum testantur.

Duodecimò. Præterea hoc Aequilibrium ab illo, quod inter Februarium & Martium accidit, distat integro semestri, differt situ, & incessu. hoc enim curuatur à borea ad austrum, & ab hoc ad boream; illud ab austro versus boream, & ab hoc versus austrum. hoc in boream, illud in austrum est concauum: hoc in austrum conuexum, illud in boream. vtrisque autem commune est, quod motuum curuitates, & tempora durationum sensu æqualia describant ceteris paribus; & quod easdem Maculas, & Faculas non reuehant, sed semper nouas & nouas producant: quod rectilineos motus nullos admittant, &c.

modo sese habet annue. Aequilibrium autumnale cum verno differentia, & conuenientia.



IMAGO SOLIS XXXIX.

255

XXXIX. IMAGO

Observationum.

ANNO IUBILÆO. MDCXXV.

In Domo Professæ Romana Societatis.


Augusti. 4.

Septemb. 1.



Cursus Macularum, à 26. Augusti, ad 16. Septembris.

Similis aliis aliorum annorum tempore eodem.



A. Oriens.

C. AB. Ecliptica.

B. Occidens.

AVGVSTI.

SEPTEMBRIS.

D — H — O.E.I.

D — H — O.E.I.

D — H — O.E.I.

26. u. $4\frac{1}{2}$ 27. 0.
27. m. $7\frac{1}{2}$ 22. 40.
28. m. $8\frac{1}{2}$ 38. 0.
29. m. $8\frac{1}{2}$ 32. 0.
30. u. $2\frac{1}{2}$ 40. 30.
31. m. $8\frac{1}{2}$ 35. 40.

1. m. $7\frac{1}{2}$ 19. 30.
2. m. 7 — 16. 0.
3. m. 7 — 16. 0.
4. m. — 19. 40.
5. m. $7\frac{1}{2}$ 18. 0.
6. m. $7\frac{1}{2}$ 22. 0.
7. m. — 17. 0.
8. m. $7\frac{1}{2}$ 20. 40.
9. m. 8 — 24. 10.
10. m. $7\frac{1}{2}$ 19. 0.

11. m. $8\frac{1}{2}$ 25. 0.
12. m. $8\frac{1}{2}$ 26. 50.
13. m. $7\frac{1}{2}$ 20. 0.
14. m. $8\frac{1}{2}$ 25. 0.
15. m. $8\frac{1}{2}$ 28. 35.
16. m. $7\frac{1}{2}$ 18. 0.
16. m. $11\frac{1}{2}$ 39. 0.

N

kk

Notæ in XL. obseruationum Imaginem, quinq;
Tabulas Mensis Augusti complexam.



TABVLA I. Accepi ipsam Duaco, à R. P. Carolo Malapersio, cum obseruationibus eo modo, quo vides dispositis, quibus Eclipticam ex meis accommodaui. si conferas harum Macularum d & e motus, & situs ad Eclipticam, cum sitibus & motibus, quos præ se ferunt Maculae f, g, h, & i, in Tabula II. Ingolstadiana, descriptis, inuenies & miraberis cursuum in diuersis annis & à diuersis Maculis descriptorum similitudinem.

TABVLA II. Habet fragmenta, cursuum Ingolstadianorum, f, g, h, i, à die 3. Augusti ad 10. eiusdem; quos ideo apposui, vt similitudo cum Duacenis appareret. Ego autem harum cursus ex meis non apposui, non quia non multo pleniores & perfectiores haberem, sed quia opus non esse iudicaui, omnium Macularum cursus apponere; quæ admodum tam in hoc, quam in alijs mensibus valde multas prætereo.

Cæterum hoc te moneo, hosce cursus non ab vno, sed à duobus esse obseruatos: nam à die 4. Augusti vsque ad 10. scribit P. Georgius Schönberger, obseruationes esse factas ab alio: quod ideo commemoro, vt nihilominus horum motuum veritatem videas, si etiam diuersorum in eundem cursum collectas obseruationes pulcherrimè concurrentes animaduertas.

TABVLA III. Complectitur cursum boreum Maculae a, ab octauo ad 19. Augusti, respondetque cursui Romano, Maculae a, in Imagine XXXVII. exposito. Hic quoque cursus compositus est ex industrijs duorum obseruatorum Ingolstadianorum, nam ab octauo die ad 11. alius quam Georgius Schönberger obseruauit: nihilominus tamen motus regularitas haud aliter, ac si ab vno obseruatum esset, processit. Vbi nota die 13. & 14. notatam esse vnam paruulam supra a, non per immissionem, sed per solam

II.

1 inspectionem, prout monet Obseruator. Deinde hanc paruulam, die decimoquinto non esse vltius aduersam, neque Ingolstadij per inspectionem, neque hic
5 Romæ per immissionem, vnde egregia obseruandi ratio commendatur, & obseruatis fides indubitata conciliatur. Quomodo autem paruula illa Macula duobus dictis diebus à magna discreta, sese
10 habuerit diebus alijs ab initio ad finem vsque, satis est cernere in Imagine mea Romana, quam illic præteritam, hic describo. Igitur die septimo, ipsa Macula a, summitati boreæ tanquam vmbra
15 inhæsit, facula superfulgente. Die 8. paulo amplius emergere coepit, superuolitante adhuc Facula. Die 9. in hiatum aperiri caput, versus occidentem, super
20 natante etiamnum Facula. Die 10. in duas videbatur velle discesci. Die 11. aucto hiatu in vnam recollecta est. Die 12. iterum supernè aliquid exorbitare visum est. Diebus 13. & 14. omnino separata, sed rara & equabilis apparuit hæc
25 Macula, absque commixtione vllius nuclei, prout hucusque semper aliquis vel inhæsit vel adhæsit. Die 15. nil ex ipsa penitus animaduersum est, spatium tamen
30 album inter nucleos canduit. Die 16. 17. 18. 19. in locum ipsius successerunt luculentæ Faculae. Et hæc quidem huius origo atque exitus Maculae esto, quæ ex obscuro nata loco, in illustrem prosapiam, more plerarumque Macularum,
35 processit. nunc ad vltiora tendamus. Ingolstadiani die 19. Maculam a, per solam inspectionem instar fili tenuissimi obseruarunt: locum dedi ego ex meis.

40 **T**ABVLA IV. Habet cursum Maculae b, à die 12. ad 23. qui respondet Romano Imaginis XXXVII. à die 12. ad 24. vespertinum. In obseruatione Romana diei 12, habes Maculas duas, in Ingolstadiana vnam; quod fit ex impotentia
45 Circuli Obseruatorij nimis parui. Die 13. annotauerunt quidem Ingolstadiani integrum Facularum gregem post Maculam secutum, sed neque figuram illarum, neque

Motus Duaceni & Ingolstadiani diuersorum annorum similes.

Cursus vnus Ingolstadianus ex industria Obseruatorum duorum collectus, similis nihilominus Romano.


Omissa vel non aduersa Ingolstadij, compensantur ex Romano.

Descriptio vmbra seu Maculae borealis superne adhærentis ad Maculam a.

Macula in Faculas accensa.

Romana & Ingolstadiana obseruationes collata.

XL. Observationum Imago. Tabulas 5, ex observationibus annorum 1624, 1625, Duaci et Ingolstadij habitis concinnatas complexa, Mense Augusto



*Luculentum
& practicum
pro Circuli
tam parui
observatorij
impotentia,
testimoniū.*

neque sequacem Maculam expresserunt, utrumque hauries ex meo. Die 18. annotarunt visas Faculas australes, quas inuenies apud illos in Tabella V. ad litterā d, apud me, in Imagine XXXVIII. ad diem 18. & 19. sub littera c. Die 23. Observator Ingolstadianus, de Macula b, & visis cum illa Faculis, hæc verbatim habet. *b in exitu vix visibilis, comitata Faculis fuit.* Hæc ille. Quod est multò luculentissimum testimonium practicum pro eo, quod ego semper contendo, nimirum Circulos paruos observatorios huic Phœnomeno per omnia pares esse non posse.

Quod si die 23. Circulus observatorius Ingolstadianus ad Maculas & Faculas excipiendas non suffecit: quantò minus id præstare potuit, die 24. in quo de hac Macula & eius Faculis nil penitus vidit Observator Ingolstadianus, alioquin acutus & accuratus, cum tamen hic Romæ tam Macula, quàm Faculæ, distinctissimè comparuerint, &c. quarum constitutionem habes in schemate ad diem non tantum 23. sed etiam 22. antè, & 24. post. à quibus similitudinem transtuli in Tabulam Ingolstadianam, quia Observator illas tantum scripto, non autem de-

1 lineato indicavit.

TABVLA V. Continet ea cursum Maculæ c, à die 18. ad 28. observatum; item Faculam d, diei 18. quorum utrumque reperies in mea Imagine XXXVIII. a die 17. ad 29. vespertinum extenta. ad cuius cursus neque initium neque finem pertigit potentia Circuli Observatorij Ingolstadiani; in cuius tamen observationibus nonnulla animaduersu digna habentur.

15 Die 19. inquit Observator, Maculae duæ cum appendice nebuloſa: Hanc appendicem distinctam habes aliquot Maculis & Vmbris Maculam a sequentibus, in observatione Romana, ad Imaginem XXXVIII.


20 Die 22. ait idem, Macula a, ex pluribus erat composita, & integra nebula inuoluta. Rectè dicit, & huius rei ideam genuinam consule in schemate meo; concreuerant enim Maculæ e, vel potius dilatauerant sese in vnam velut nebulam. Sed pergit ipse.

25 Die 23. Macula a, instar unius in charta videbatur. Habes etiam huius ipsius formam veram in diagrammate meo. Omnia enim sibi mutuis nexibus 29 copulata.

*Appendices
macularum
nebulosæ
Ingolstadij
observata.*





XL. Observationum Imago. Tabulas 5. ex observationibus annorum 1624, 1625.
Duaci et Ingolstadij habitis concinnatas complexa, Mense Augusto



M.D.C.XXIV.
Duaci in Collegio Academico
Societatis Iesu

Cursus Macularum d. et e. a 28. Iulij. ad 12.
Augusti, similes Romanis, anni 1625.



Notæ in XLI. Obseruationum Imaginem, secundam Septemb. à die 13. ad 26. eiusdem.

Macula in
ter Vmbra
& Faculas.



RIMO. Macula a, inter insignes vmbra & Faculas circa ortum & occasum incessit, magis tamen iuxta aut pone, quam ante habuit. Post

medium ad exitum vsquo mole defecit. Faculae die 15. in omnem loci differentiam ampliores, quam erant 14. & hæ maiores, quam die 13.

Directio motus obliqua ex Austro in Boream.

Media cursum portiones semper rectitudinem affe-
stant.

Superavit dies 13. non attigit 14. Nuclei in occasum proni.

Secundo. Ab Ecliptica discedit in parte occidua. Si tres ortivas primas, & tres vel quattuor vltimas stationes occiduas mente separe, ab arcu itinerario, facient stationes residua lineam fere rectam, id quod semper ferè accidit, toto anno: unde in circulis parvis obseruatorijs facile euenit, vt initij finisq; ue defectu, itinera alioquin curua, pro rectis agnoscantur.

Tertio. Mora eius sub Sole, superavit dies 13. non attigit quattuordecim, paulo minor est, quam erant boreæ prioris Imaginis. habuit Macula nucleum, semper in occasum amplius enitentem & eminentem: id quod Maculis grauidis ferè accidit.

Quarto. Comites Maculas minutas intermedijs diebus generatas, iterum amittit, vt patet ex Imagine.

Quinto. Faculae cum vmbra b, australes, præterea non sunt animaduersæ.

Sexto. Maculae c, die 16. tenuissimæ erant, deinde sensim creuerunt, quarum aliquæ ad exitum vsque durarunt aliquæ in vmbra, postremæ in Faculas abiuerunt: retenta semper communi omnibus

1 via & situ ad Eclipticam.

Septimo. A die 19. harum primaria alias antegressa ad exitum insumplit dies sex, cum tamen Macula a, consumplent septem. vnde manifesta motus & temporis differentia intelligitur.

Octauo. Hæc Macula c, circa medium vicinior fuit Maculae a, quam circa exitum aut ingressum. Si cursum huius Maculae a die 17. ad 22. aspexeris, inuenies rectilineum, sicut & cursum Maculae a. vnde rursus habes, itinerum curuitates aut rectitudines apparentes non posse sciri, nisi ex cursibus totis aut fere integris.

Nono. Interim nota, quantum hi cursus ab æquilibrio tam breui tempore recesserint. Deinde diligenter obserua, hæc curuitates nequaquam esse circulares.

Præterea, si ex centro C, Macularum a & c, ab eodem distantias comparaueris, experieris Maculas c, die 16. orienti viciniores fuisse, quam a, & rursus idem experieris die 22. versus occidentem. Vnde euident est, Macularum c motum apparentem velociorem fuisse, &c. & hoc non tantum hic, sed & alibi sæpius deprehendes. Examina in Imagine 39. cursus a & b atque c, & reperies huius rei plurimas euidentias.

Decimo. Omnium itinerum curuitates, & chordarum ad Eclipticam inclinationes decrescunt: polusque arcticus patens in semicirculo occidentali descendente, antarcticus latens in opposito ascendente, versatur.

Inæqualis Macularum sub Sole mora.

Macularum vestigia centralia sibi viciniora, quam marginalia.

Curuitas plenaria est ex integris cursibus indaganda.

Magnus ab Aequilibrio recessus.

Curuitates itinerum, nequaquam circulares.

Macula australes breviori tempore maius in Sole spatium decurrunt quam septentrionales.

Curuitas & Inclination decrescit, polus patens descendit.

XLI, Imago Obseruati:

M.DC.XXV.


Septemb: 2.

onum.

In Domo Professa Romana Societatis



Cursus Macularum à 13. Septembris, ad 26. eiusdem.




SEPTEMBRIS.

D. H. O. E. I.

D. H. O. E. I.

13. m. $7\frac{2}{3}$ 20. 0.
14. m. $8\frac{1}{4}$ 25. 0.
15. m. $8\frac{1}{2}$ 28. 35.
16. m. $8\frac{1}{8}$ 23. 30.
17. m. $7\frac{2}{3}$ 19. 20.
18. m. $7\frac{1}{2}$ 17. 40.
19. m. $7\frac{1}{2}$ 17. 10.

20. m. $8\frac{2}{3}$ 25. 0.
21. m. $7\frac{1}{4}$ 18. 15.
22. m. 9 — 31. 0.
23. m. $8\frac{5}{11}$ 24. 45.
24. m. 8 — 20. 30.
25. m. $9\frac{1}{12}$ 31. 0.
26. m. — 23. 0.



Notæ in X L I I. Observationum Imaginem,
à 22. Septembris, ad 6. Octobris.

Macularum
ortus Physi-
cus & ordi-
narius.



Primò. Macule a, au-
strales, nec fine heb-
initium habent sui
cursus, sed in Sole
cum Faculis die
22. exortæ multæ
paruulæ, in pau-
ciores, sed maio-
res more solito concreuerunt die 23. &
tales perstiterunt die 24. exinde rursus
imminutæ, tandem sequentibus diebus
in meras Faculas resolutæ, horizontem
occiduum nequaquam attigerunt. iter
interim regularissimum more aliarum
perfecerunt: magisque semper & magis a
se mutuo recesserunt &c.

Macula in
Faculas a-
beunt.

Secundò. b Macula, in medio itinere
defecit, sensim in tres, tum in duas mi-
nimas resoluta; initio intra Faculam bo-
realem & austrinam incessit, quæ tamen
subsecutis diebus extinctæ sunt.

Macula de-
ficientes in
paruas re-
solvuntur.

Tertiò. Macula minutissima c, ter se
stitit: neque ulterius comparuit, emen-
sa iter Maculæ a proportionatum, à qua
æquali interuallo semper absuit.

Macula mi-
nutissima
triduanæ.

Quartò. Macula d, Maculam & Fa-
culam & Vmbra post se trahens, ac qui-
rit plures vmbra & Maculas eundo, qui-
bus sensim amissis, ipsa imminui, & in
plures pedetentim resolui visa est Macu-
las, donec tandem cum Facula & vmbra
longissima ad horizontem appropinqua-

uit. Ultra dies duodecim in apparente
Solis hemisphærio non permansit, directo
versus Eclipticam itinere sed arcuato.

Quintò. Notandum quomodo hæc
Macula, aliquot post se in parte orienta-
li trahens, & sensim maiore interuallo
relinquens easdem ad se neque apparen-
ter quidem in occasu assumpsit, sed va-
pore vel vmbra continuata coniunxit.

Deinde quomodo Macula sequens orien-
talissima ex vmbra atque in locum Facu-
læ processit, & in occasu rursus in vm-
bram & Faculam longissimam abiuit. si-
mile quid accidit circa Maculam a. simi-
le videbis circa Maculam c, in Imagine
priori, ad horizontem occiduum.

Amplius, quomodo vmbra & Facula
circa Maculam d, repente versus margi-
nem occidentem ita protrusa apparuit, vt
abeodem non magis quam ipsa Macula
distaret, cum alioquin semper præcun-
tem Maculam sequeretur. Similia euene-
runt circa Maculas a, & in priore sche-
mate, apud Maculam c: qualia in alijs
quoque cursibus passim animaduertes.

Sextò. Cursus d, cursui a, non om-
nino parallelus extitit.

Septimò. Hi cursus præcisus extremis,
ad sensum rectilinei comparent.

Octauò. Macula d, ab initio ad me-
dium creuit, hinc ad exitum similiter
decreuit.

Vmbra in
maculas, &
hæc rursus
in Vmbra
& Faculas
commutan-
tur.

Facularum
& Vmbra-
rum versus
horizontem
projectiones



IMAGO SOLIS XLII. 263

XLII. IMAGO.

Observationu.

M.DC.XXV.

In Domo Professa Romana Societatis

Septembris. 3.

Octobris. 1.



Cursus Macularu, à 22. Septemb: ad 6. Octobris.


SEPTEMBRIS.

D	H	☉.El.		D	H	☉.El.
22.	m. 9	— 31.	0.	27.	u. $3\frac{2}{3}$	23. 0.
23.	m. $8\frac{3}{4}$	28.	30.	28.	u. $3\frac{6}{7}$	20. 0.
24.	m. $8\frac{6}{11}$	26.	0.	29.	u. $3\frac{3}{4}$	20. 40.
25.	u. $2\frac{1}{12}$	38.	15.	30.	u. $3\frac{11}{12}$	19. 0.
26.	u. 4	— 19.	30.			

A. Oriens.

B. Occidens.

AB. Ecliptica.



OCTOBRIS.

D	H	☉.El.
1.	u. $3\frac{7}{8}$	16. 15.
3.	m. $8\frac{1}{5}$	19. 0.
4.	m. $8\frac{5}{9}$	23. 20.
5.	m. 8.	16. 30.
6.	u. $3\frac{3}{8}$	24. 5.

Nota

Notæ in XLII. Observationum Imaginem,
Septembris quartam, secundam Octobris,
à die 28. Septemb. ad 14. Octobris.

I.

PRIMO. Macula a, austrina cum suis Faculis, & Vmbris, post medium interiit, nullo penitus relicto vestigio, etiamsi studiosissime inquisuerim. Macula initio vna oblonga per aliquot dies, postea in plures paruas, ante interitum est resoluta; id quod huic Phœnomeno familiare est.

Macula intereuntes in plures paruas diminutas resoluuntur,

Secundò. b, Macula borealis nonnihil nuclei habens, totum Solem integra perambulauit ordinatissime diebus tredecim & amplius, quia in Sole conspecta est, à die primo matutino, ad 14. vespertinum Octobris, acciditque primus aspectus hora 8. vltimus hora 4. intercedunt itaque dies 13. horæ q. octo, & tamen neque tum Macula horizontem occidentalem attigit, licet ferme raserit, facile igitur adhuc aliquot horas ibidem insumpserit: iam euidenter est ex praxi & more huius Phœnomeni interstitium inter perimetrum & diem primum Maculæ b esse minimum duodecim horarum: igitur euidenter concluditur, Cursum apparentem huius Maculæ fuisse dierum plus minus 14. Hæc eadem macula ostendit inferius gibbum quendam versus ortum, qui postea die 6. in tres Maculas erupisse videtur, quas littera g insigniui. hæc Macula ad medium creuit, ab hoc decreuit, pari ferme ratione.

Cursus Macula b, dierum 14.

Tertio. Macula itidem australis c, intra Faculas exorta creuit, acquisiuit die 4. duas, quibus rursus amissis, die sexta assumpsit tres nouas australes, sed & his die 8. amissis, ipsa imminui, & in duas paruas die 9. 10. 11. &c. resolui coepit, & sic gemina vna cum Facula austrina ex Maculis diei sextæ generata, ad occasum peruenit, die 13. Maculam b præcurrit, sicut & in ortu antecessit; harum duarum Macularum itinera paullo ante occasum, (quod est mirabile) sese mutuò secant; & cum Macula b australior sit exorta quam c, hæc tamen occubuit australior quam b; vt intuenti patet. Casus hic tamen si videri possit insolens, tamen non

II.

est solus. vltra dies 13. in Sole confecit.

Quarto. Macula d borealis, tribus stationibus æquidistantibus Maculam b, comitata, è conspectu sese proripuit, neque vnquam restituit.

Quintò. Macula e itidem borealis tenuissima & rarissima, mirum in modum se, sobolemque suam dilatauit, & accensis circa finem Faculis, Solem splendido comitatu exiuit, peragrans ipsum, (si ratio pro pleno itinere computaretur) tredecim quasi diebus: cursus eius, cursui Maculæ b, non fuit parallelus, sed sensim ad eundem appropinquauit: interualla inter ipsas aucta non amplius coierunt, sed maiora manserunt in occasu quam ortu. Faculas & vmbas post se tractas, circa horizontem æque applicauit, vt non minus quam ipsa distarent.

Cursus Macularum non paralleli.

Sextò. Macula f, Maculæ b famula, eandem nonnihil præuerrere animaduersa est, sed ante exitum euauit. Simile quid præstitit Macula g; id quod notatū dignum est: sed & hoc in hoc aduertendum, quod ipsa à Macula b versus boream diuaticata est, vt ex schemate claret.

Macula alias præuerrunt, & cursus decussant.

Septimò. Macula h, australis, tenuissimo initio exorta, equabilis raritatis permansit, mole tamen in duas vel tres excreuit, ad diem 8. 10. & 11. die 12. in quattuor minores resoluta, easdem die 13. accensas combussit; assumpra noua supernè comite. itaque Solem nec intrauit nec exiuit, sed in eodem generata & consumpta est. idem de Macula australi i statuendum, quæ duos dies omnino latuit, id quod non rarò etiam alijs Maculis contingit.

Macula h, aquabilis raritatis, e parua augetur in plures paruas & Faculam resoluta est.

Octauò. K, & l Maculæ biduanæ intra Faculas longissimas, & medio purissimas degenerarunt; quæ die 11. supra modum graciles effectæ sunt.

Nonò. Omnium istarum cursus similis & vniformis, curuus, atque ad Eclipticam obliquus, sed ad rectitudinem paulatim accedens; polo arctico adhuc superiore descendente.

Decimò.

I. Decimò. Macula h australis, eo- I c, vel e. Et tamen hæc centro & Ecli-
dem tempore maius in Sole decurrit pticæ multæ est vicinior.
spatium, quam Septentrionalis b, vel

XLIII. Imago
Observationy.

ANNO IUBILÆO 1625.

In Domo Professa Romana Societatis

4. Septembris.

2. Octobris.



Cursus Macularum à 28. Sept: ad 14. Octobris.

Septemb:

AB, Ecliptica,

A. Oriens.

D. — H. — O. El.

B. Occidens.

28. u. $3\frac{6}{7}$ — 20. 0.

29. u. $3\frac{3}{4}$ — 20. 40.

30. u. $3\frac{11}{12}$ — 19. 0.

Octobris.

D. — H. — O. El.

D. — H. — O. El.

D. — H. — O. El.

1. m. 8. — 30. 0.

6. m. $8\frac{5}{8}$ — 23. 10.

12. m. $8\frac{1}{4}$ — 17. 40.

3. m. $8\frac{1}{2}$ — 19. 0.

6. m. $9\frac{1}{4}$ — 28. 10.

13. m. $8\frac{3}{8}$ — 18. 35.

4. m. $8\frac{5}{8}$ — 23. 20.

7. m. $9\frac{3}{8}$ — 29. 0.

13. u. $3\frac{5}{8}$ — 20. 0.

5. m. $8\frac{1}{4}$ — 19. 40.

8. m. $8\frac{1}{2}$ — 21. 0.

14. m. $8\frac{1}{2}$ — 19. 25.

5. m. $9\frac{1}{9}$ — 30. 30.

9. m. $8\frac{3}{8}$ — 20. 0.

14. u. $4\frac{5}{8}$ — 9. 10.

10. m. $7\frac{7}{8}$ — 14. 0.

11. m. $8\frac{3}{8}$ — 19. 30.

N

Notæ in XLIV. Observationum Imaginem, tertiam Octobris, à die 8. ad 22. eiusdem.



I. A E C Imago præsentat quinq. Macularum cursus, quos ordine litterarum percurram.

Primò. Macularum a cursus incipit die 8. finit

17. & ad horizontem non peruenit in principio visæ sunt tantum duæ maculæ Solis fulgori immerse, quæ die 9. nimbo & faculis lucentibus ambitæ, in nouem paruas ebullierunt, dieque decimo in pauciores, sed maiores cõflatæ sunt, nẽpe in quinque; die vndecimo accessit sexta; die duodecimo, nouem euaserunt, quæ rursus die decimotertio, cum damno minorum, maiores sed pauciores sunt effectæ, videlicet septem; Die decimoquarto in septem alias & minores redactæ sunt; Die decimoquinto iam tenuium vmbra- rum præ se tulerunt figuram. Die decimo sexto vnica tantum, eaque tenuis apparuit: tandem die decimosextimo duæ maculæ vmbrales cum facula alluxerunt. Die decimo octauo & sequentibus diligentissimè requisitæ neque vestigium quidem sui præbuerunt.

Secundò. b, Maculæ boreales, die itidem 8. primum comparuerunt, cum faculis instar vmbra- rum illis confinium. Die 9. sese in Maculas paulatim, & faculas ampliores dilatauerunt. Die 10. & 11. apparuerunt quinque Maculæ exiles. Die 12. euauit australior, sed postremæ borealiores euoluerunt se in quinque, quæ die 13. bene nouem euaserunt: quæ iterum die 14. in quatuor paullo maiores collectæ sunt, quemadmodum & occidentales, hætenus quinque, in tres corpulentiores coaluerunt. Die 15. Orientaliores in vnã tenuem vmbra- m redactæ sunt, occidentales formã duarum adunatarum præ se tulerunt, quod tamen sculptor non satis expressit, diffinitas præsentando. Die 16. quattuor, noua forma comparuerunt orientalioribus omnino inuisis. Die 17. vnica occiden-

II.

1 talissima superfuit geminata, quod itidẽ incisor non satis expressit. Die 19. vmbra cum faculis in horizontem occidui procumbentes in locum Macularum successæ.

5 Aduerte primas à postremis plurimũ discessisse, neque circa occasum denuo conuenisse, sed semper interualla maiora fuisse quàm vt orientalibus similia fierẽt. 10 Macula c, in Ecliptica semel apparuit, nec ante nec post visa.

Tertiò. Maculæ d, austrinæ ex vmb- ris tenuibus die 10. in Sole prorepenti- bus prognatæ, admirabiles die vndecimo progressus fecere: nam cum die decimo, tantum quattuor fuissent, factæ sunt die vndecimo distinctæ tredecim, duplum- que longitudinis occuparunt. Die duodecimo, prima & postrema auxerunt, 20 euanescentibus nonnullis intermedijs; in vniuersum enim nouenarium numerum non excedebant; distantia primæ à postrema creuit tertia circiter parte. Die 13. prodigiosè sunt auctæ, nam tota inter- 25 capedo euasit vna continua Macula, vsque ad primam occidentalissimam: postrema orientalissima separata, sed tota nigra instar nuclei visebatur. nuclei etiam in hoc tractu passim apparebant. Distan- 30 tia duarum extremarum etiamnum aucta est. Die decimoquarto, eadẽ inter extremas distantia creuit, cum tamen in motu vniiformi debuisset decrescere, & distantia diei vndecimi æquari, cuius tamẽ sesqui altera extitit. Macula autem orientalis- 35 sima, mirum in modum ex omni dimensione ampliata est, nucleo grauis, spatium medium à paruulis multis denuo inessum, & orientales in 7. Maculas discretæ. Die 15. quinque apparuere Ma- 40 culæ, & extremarum distantia paullo minor quàm hesternæ. Die 16. duæ orientalis- simæ adhuc constant, & media creuit, orientales in octo paruas sunt resolu- 45 tæ. Die 17. Maculæ quattuor cum vmb- ris & faculis: distantia extremarum adhuc superat distantiam diei vndecimi faculæ in loca Macularum successerunt.

Die

Macula So-
lis fulgori
immersa.

Ex Maculis
d, habetur
ordinaria.
Macularũ
conceptio,
natiuitas,
incunabu-
la, status,
mors, rogus

XLIV, Imago Obseruati:

ANNO IUBILAEI, M.DC.XXV.

Octobris, 3.

In Domo Professa Romana Societatis



Cursus Macularum, ab 8. Octobris, ad 22. eiusdem

AB, Ecliptica,

B. Occidens,

A. Oriens,

OCTOBRI

D	H	O	E	D	H	O	E	D	H	O	E
8. m. 8 $\frac{1}{2}$	—	21. 0.		13. m. 8 $\frac{1}{2}$	—	22. 30.		19. u. 7 $\frac{1}{2}$	—	22. 5.	
9. m. 8 $\frac{1}{2}$	—	23. 30.		14. m. 8 $\frac{1}{2}$	—	22. 30.		20. m. 8 $\frac{1}{2}$	—	19. 50.	
10. m. 7 $\frac{7}{8}$	—	14. 0.		15. m. 8 $\frac{1}{2}$	—	22. 30.		21. m. 8 $\frac{1}{2}$	—	20. 35.	
11. m. 9.	—	24. 45.		16. m. 8 $\frac{1}{2}$	—	20. 0.		21. u. 4 $\frac{1}{2}$	—	10. 30.	
12. m. 8 $\frac{7}{8}$	—	22. 20.		17. m. 9 $\frac{1}{2}$	—	27. 40.		22. m. 9.	—	22. 0.	
				18. m. 8 $\frac{7}{8}$	—	21. 30.					
				19. m. 9.	—	20. 30.					

I.

Cursus non paralleli.

Macula e, portentosa in mutuo discessu, numero, magnitudine, coadunatione.

Die 18. non plures quam duæ extremæ comparuerunt, & occidentalissima valde imminuta, orientalissima satis magna, quarum distantia superat distantiam diei vndecimi. Benè autem notandum quomodo in horizontem quasi coniecta, ut & faculae solent, incumbit. Cursus harum Macularum initio vicinior fuit cursui Macularum, a, quam in fine; itaque non æque distant. E contra, cursui Macularum, b, in fine est vicinior, quam in initio.

Quartò. Maculae, e, non minora imo maiora portenta offerunt quàm, d; in distantia, in numero, in magnitudine, in coadunatione. Die 14. nouiter exorta, fuere nouem. Die 15. quasi quindecim, habuitque prima notabilem nucleum. Die 16. coaluerunt in vnam efformem & irregularem massam, lateralibus paruulis stipatam. Die 17. dissolutæ sunt in quatuor quarum duæ extreme compositæ erant è multis, duæ mediæ parua & euandæ umbræ: distantia interim extremarum semper augecebāt. Die 18. erāt tres quarum orientalissima parua nouiter enata est. Distantia adhuc hesternis æquales. Die 19. fuere duæ, minuta nonnihil distantia, orientalissimæ bifurcatæ hactenus, coierunt. Die 20. distantia extremarum æquantur, distantia diei 14. sunt tantum duæ. Sed quælibet è pluribus composita, prout nuclei & dies priores edocent. Die 21. & 22. quanquam ambæ adhuc apparuere, & orientalis maior atque vegetior fuit, tamen ob loci angustiam & confusionem vitandam, addu-

II.

xi tantum occidentalem vbi nota occidentalissimam, d, circa occasum magis fuisse boream quam, e.

Macula, f, borealis, per modum vmbrae tenuis in medio fere Sole ebullit, die decimo, vnicaque fuit: die autem 16. in vnam longam, è tribus quodammodo conflata, euasit, sequente alia borealiore noua. qua die 17, extincta, hesternæ oblongior vehemèter excreuit, nucleo grauidata, simul sex alias post se deduxit, partim nouas, partim separatione, ut apparet, discretas.

Die 18. in nucleo & intensione nonnihil defecit, amissis quoque medijs, duas postremas minutiores tamen retinuit. Die 19. ipsa in quinque, inter se tamen adhuc contriguas, vel continuas potius, resolui cepit, augeſcentibus aliquantulum sequacibus.

Die 20. capere attenuari in vmbra, & accendi in faculas; prout die 21. cum iisdem plenissimis flammis versus occasum perrexerunt, & sequentibus exinde diebus sui vestigium nullum præbuerunt.

Iter huius Maculae fuit æquidistans itineri Maculae, a, sed obliquum ad viam Maculae, b, non ut ex forma patet, die 15. ab ea satis abfuit, sequentibus autem sensim appropinquauit in tantum, uti die tandem 19. itinera coinciderent, & postea sese quodammodo secarent.

Interim itinera Macularum Eclipticæ obliquè respiciunt, & ad rectitudinem aspiciunt, polo arctico descendente versus horizontem ortuum: chordis ad Eclipticam minus inclinatis.

Ortus, progressus & occasus Physis Maculae d.

Iter Maculae d, aliquibus æquidistat, aliqua intersectat.

Curuitas et obliquitas decreſcens, polus descendens.



XLIV, Imago Observati:

ANNO IVBILAEI M.DC.XXV.

Octobris, 3.

onum

In Domo Professa Romana Societatis



Cursus Macularum, ab 8. Octobris, ad 22. eiusdem.

A. Oriens.

B. Occidens.

AB. Ecliptica.

OCTOBRI.

D. H. O. E. I. D. H. O. E. I. D. H. O. E. I.

8. m. 8 $\frac{1}{2}$ — 21. 0.	13. m. 8 $\frac{1}{2}$ — 22. 30.	18. m. 8 $\frac{1}{2}$ — 21. 30.
9. m. 8 $\frac{3}{4}$ — 23. 30.	14. m. 8 $\frac{1}{2}$ — 22. 30.	19. m. 9. — 20. 30.
10. m. 7 $\frac{7}{8}$ — 14. 0.	15. m. 8 $\frac{7}{8}$ — 22. 30.	20. m. 8 $\frac{3}{4}$ — 19. 50.
11. m. 9. — 24. 45.	16. m. 8 $\frac{7}{8}$ — 20. 0.	21. m. 8 $\frac{6}{8}$ — 20. 35.
12. m. 8 $\frac{7}{8}$ — 22. 20.	17. m. 9 $\frac{1}{2}$ — 27. 40.	22. u. 4 $\frac{1}{2}$ — 10. 30.



Notæ in X L V. obseruationum Imaginem, O-
ctobris quartam, à die 15. ad 31. eiusdem.



I.

RIMO. Maculæ a, australes hori-
zonem subierunt die 15. matutino,
exiuerunt 27. vespertino, itaque in
Sole ultra dies 13. non fuerunt, an
attigerint disputabile est.

Fuerunt monstrosæ, Primo, in longi-
tudinis distantia, quæ cum fuisset die
15. valde exigua, creuit supra modum
diebus procedentibus vti patet die 16,
17. 18. 19. 20. & sequentibus.

Secundo. In magnitudine ad quam
peruenerunt tam paucis diebus; conside-
ra diem 19. 20. 21. & 22. cum denso
nucleo.

Tertiò. In figura, quam quot diebus
aliam exhibuerunt.

Quartò. In decremento, quia quàm
cito enatæ, multiplicatæ & auctæ sunt,
tam cito defecerunt, die enim vigesimo
sexto, non plures quàm tres collectæ cõ-
paruerunt; nam superior borealis sese per
modum apicis adiunxit, cum die præte-
rito adhuc separata esset. vbi nota eam
quæ fuit occidentalissima, & die 19. sepa-
rari cæpta, die 26. denuo sequenti con-
iunctam, & sic die 27. ad horizonem
accessisse, cum vmbri & Faculis, supra,
& infra, quas ex Maculis originem traxis-
se nullum est dubium.

Secundò. Maculæ b, & c, in eodem
parallelo delatæ distantiam incredibili-

II.

ter dilatauerunt. Die 27. Maculæ c di-
sparuerunt, die 30. & 31. ambæ in vm-
bras, & faculas resolutæ sunt.

Tertiò. Maculæ d, boreales, in Sole
die 26. enatæ, ad 28. auctæ, deinde ite-
rum decrescientes, mole & numero, die
tandem 30. ad vnicam paruam redactæ;
postmodum nullum sui vestigium sensibi-
le dedere. in motu nihilominus commu-
nem omnium legem sunt secutæ; quem-
admodum & Maculæ e, circa occasum
die 24. exortæ, idem præstiterunt.

Quartò. Maculæ f, die 27. exortæ in
plagæ australis parte occidentali, fuerunt
duæ exiguæ; die 28. erant quinque ad-
modum minutæ; sed 29. repente euase-
runt in vnam magnam Maculam nucleo
denso præditam, quæ post se comitatum
non spernendum Macularum, vmbra-
rum & Facularum traxit. die 30. occi-
dentalis nonnihil decreuit, sed sequens
orientalis vmbra in euidentem Maculam
euasit, quemadmodum die 31. iterum
comparuit, vbi occidentalis cum vmbra
& facula horis appropinquauit. Di-
stantia istarum apparens die 28, 29, 30,
31, æqualis fuit, quod non debebat fie-
ri, si motus vtriusque verus æqualis es-
set, &c. Motus harum motui Macularum
e parallelus non fuit, sed hic ad illum
nonnihil accessit.

Quintò. Curuitas omnium decrescit,
sicut & chordarum ad Eclipticam obli-
quitas, polus arcticus versus occasum
in semicirculo orientali descendente ten-
dit.

Maculæ a,
monstrosæ in
longitudi-
nis distantia,
in magnitu-
dine, in figu-
ra variatio-
ne, in defe-
ctu.

Disiunctæ
circa exitum
iterum iun-
guntur ad
aspectum.

Motus veri
inaequales.



XLV. Imago
Observationu.

ANNO IUBILAEI MDCXXV.
In Domo Professa Romana Societatis

4. Octobris.



Cursus Macularum à 15. Octobris, ad 31. eiusdem.

A. Oriens

A B. Ecliptica.

B. Occidens.

OCTOBRIS.

D. H. O. E. I. D. H. O. E. I.

15. m. 8 1/2	18. 40.	22. m. 9	22. 0.
15. u. 4 1/2	12. 0.	24. m. 9 7/8	27. 30.
16. u. 3 7/8	17. 0.	25. u. —	20. 0.
17. u. 4 1/2	11. 40.	26. m. 9	20. 30.
18. m. 8 7/8	21. 30.	27. m. 9 7/8	25. 0.
19. m. 8 1/2	17. 0.	27. u. 4 1/2	14. 0.
20. m. 8 1/2	19. 30.	28. u. 3 7/8	13. 0.
21. m. 8 1/2	20. 35.	29. u. 7 1/2	18. 15.
		30. u. 3	20. 30.
		31. m. 9 1/2	22. 0.

N

Notæ in X L V I. obseruationum Imaginem,
quintam Octobris, primam Nouembris;
à die 30. Octobris, ad 14. Nouembris.



I.

Rimò. Si quis aufe-
rat cogitatu extre-
mos istorū itinerū
dies, quis rectili-
neos cursus hos
esse non enunciet?
& tamen rectili-
neos nondum esse

ipsi dies primi, & postremi, horizontibus
proximi certissimo edocent.

Maculæ a, tenues boreales, die 30. cū
faculis luculentis conspectæ, 31. iterum
apparuerunt, postmodum per totum Solem
visum eludere, donec tandem circa exitū
die 9. & 10. Nouembris, vnā cum Facu-
lis per modum vmbrarum, se denuo red-
diderunt. Cæterum, illas esse easdem
quæ fuerant in ortu, suadet tempus & lo-
cus, quod autem tanto interuallo non
sint animaduersæ, potest esse causa par-
tim illarum raritas, partim quod alijs, de
quibus mox, magis intentus fuerim. Si
quis tamen, primas pro extinctis postre-
mas pro nouis velit agnoscere, per me li-
cebit; quia hoc sæpissime etiam tempore
breuiori accidit.

Secundò. Maculæ c, australes quin-
que, tenues, nebulosæ, multaque luce di-
lutæ primum comparuerūt die 31. Octo-
bris, deinde primo Nouembris dispersæ
sunt in duas raras, sed satis amplas nebu-
las malè terminatas, die subsecuto appa-
ruere in vniuersum minimum 22. distin-
ctæ Maculæ, quarum quattuor, primæ,
& occidentalissimæ in vnā collectæ fue-
rant, nucleis insignes, reliquæ omnes e-
rant paruæ, in formam caudæ scorpionis fer-
mè inflexæ. die 3. mole & spatio creue-
runt, quemadmodum & quarto, interme-
dijs semper variantibus. die 5. mediæ cæ-
perunt imminui, prima semper augescen-
te. Die 6. valde magna apparuit occiden-
talis, sequentes valde defecerunt: perime-
ter punctulis circumductus, ostēdit Ma-
culam nimbo fulgenti circumdatam fuisse,
se, quod etiam alijs diebus euenit, hunc in

Macularū c
ordinaria,
sed mira sa-
ne ex vm-
bris tenuis-
simis pro-
creatio, aug-
mentatio, di-
latatio, in fa-
culas demū
conuersio.

II.

exemplum assumpsi. Die 7. Macula fissu-
ram fecit, luce valde splendidam. Sequen-
tes multum attenuatæ sunt. Die 8. etiam
magna decreuit euanescentibus paruis.
Die 9. 10. & 11. Maculæ tenues cum vm-
bris & faculis illam sunt comitatæ, postre-
mis duobus diebus enormiter defecit, nu-
cleum tamen densum die 10. adhuc reti-
nuit. Cursus huius Maculæ occidentalis-
simæ, omnibus computatis, dies tredecim
non superauit, si tamen adæquauit.

Tertiò. Maculæ d boreæ, in Sole de
nouo generatæ, cum faculis exiuerunt,
distantia contractiore, propter situm.

Quartò. Maculæ e, vnica, tenuis &
parua apparuit die 2. die 3. auctior & ge-
minata faculas luculentas secum vexit,
boreas, australes, occiduas. Die 4. iterum
sola fuit, die 5. & 6. auctior, post quos
sensim defecit, & die 11. in vmbram lon-
gissimam faculis vtriusque flagrantem
abiit.

Macula e,
augmentum
& decremen-
tum.

Quintò. Macula f, die 2. exorta, sensim
creuit ad 9. hinc notabiliter imminuta,
peruenit ad diem 14. vesperti. igitur si spa-
tius vtriusque residuis sua tempora den-
tur, perueniet huius Maculæ cursus faci-
le ad dies tredecim; si non aliquanto e-
tiam excedet. à parallelo maximo non
multum declinauit.

Sextò. Faculæ g, valde puræ atque
luculentæ, à die 5. ad 6. se visendas ob-
tulerunt.

Facula pu-
ra.

Septimò. h, Macula australis inter
mediam faculam sese ostentauit die 4.
quæ die 5. in duas erupit, quæ deinceps
se dilatando, post diem nonum penitus
disparuerunt? Nota, quod iter harum
Macularum ad iter c nonnihil appropin-
quauit.

Itinera non
parallela.

Cursum Maculæ K, plenum, habebis in
schemate sequenti, ad litteram a.

Octauò. Cursus isti sunt curuilinei, sed
rectitudini valde vicini: inclinatio chor-
darum ad Eclipticam minus obliqua: po-
lus arcticus horizonti imminet.

XLVI, Imago

MDCXXV

5. Octobris,

Obferuationu.

In Collegio Romano Societatis

1. Nouembris,

Curs, à die trigesimo Octobris, ad 14. Nouembris.

Octobris

D. H. O. Eleu.

30. m. $9\frac{1}{8}$ — 20. 50.

31. m. $9\frac{1}{2}$ — 22. 40.

A. Oriens, B. Occidens, A. B. est linea Ecliptica, ANBZ, Horizon solaris,

numeri marginales lineam uerticalem designant, per centrum F transeunte.

Nouembris

D. H. O. El. Y D. H. O. El.

1. m. — 19. 0.

8. m. $8\frac{1}{8}$ — 17. 0.

2. m. — 14. 30.

9. m. $8\frac{1}{4}$ — 19. 0.

3. m. $8\frac{3}{8}$ — 15. 0.

10. m. $8\frac{1}{2}$ — 16. 0.

4. m. $8\frac{1}{2}$ — 13. 0.

11. m. 9 — 18. 30.

5. m. $8\frac{1}{4}$ — 13. 45.

12. m. 9 — 18. 30.

6. m. $8\frac{3}{4}$ — 17. 40.

13. u. $1\frac{1}{4}$ — 26. 0.

7. m. $8\frac{11}{12}$ — 19. 0.

14. u. $2\frac{1}{2}$ — 21. 20.

N



Notæ in XLVII. obseruationum Imaginem, secundam Nouembris, à die 6. ad 22. eiusdem.



I. PRIMO. Macula a, austrina ultra medium, circa exitum verò borealis peragrauit Solem à die 6. ad 18. nucleum geminum seu oblongum præ-

se tulit, quæ deinde duas Maculas die 12. & sequentibus pepererunt, quæ semper magis à se mutuo recedentes etiam separata exiuerunt, trahentes australem faculam & umbram, &c. Maior apparuit hæc Macula in exitu quàm ingressu. Faculas post se traxit tam oriens, quam occidens. In Sole perambulando consumpsit dies minimum, vt apparet, tredecim, cursu ad rectitudinem procliui. facula b, boreales, luxerunt die 6. valde luculentæ & puræ, non visæ postmodum.

*Facula præ
vnius diei.*

Secundò. Macula c australis die 7. oborta 19. exiuit, vtrinque faculis illustris, aucta fuit sensim, eodemque modo decreuit dies tredecim non est assecuta.

*Facula pura
duorum
dierum.*

Facula d, australes purissimæ & numerosæ, dierum duorum cursum impleuerunt, postea animaduersæ non sunt, licet studiosè quæsita.

Tertiò. Macula e, boreales die 10. Solis orientem transgressæ, die 22. vesperi in horizonte occidentis hæserunt, vt ex figura laterali patet; diebus igitur tredecim aut & amplius in Sole fuerunt. Tam ipsæ quam facula ipsarum ab horizonte sectæ sunt, neutra tamen extra ipsum exiuerunt vel ad hilum.

II.

Quartò. Macula f, in Ecliptica primum conspecta, die 12. eandem tenuerunt vno quasi die, sed 14. & deinceps in boream ascendentes. in Faculas tandem, & umbras diffusæ, ad occasum properarunt; quanquam vltimis diebus non fuerint conspectæ.

Quintò. Macula g, austroboreales parue & tenues, nec numero nec mole constantes, in faculas finaliter abiuerunt.

Sextò. Macula h, duæ australes, die 12, ad 19. vsque, itinere reliquis visitato perrexerunt: cum enim duarum borealior semitam Macula c, diebus 5. antegressæ ingressa esset, in eadem vti patet pulcherrimè perrexit, quamdiu durauit.

Septimò. Macula i, borealis, nebula vel nubecula tenui simillima, à die 12. in 14. durauit. incesu Macula f, parallelo.

Octauò. Macula k boreales, die 13. binæ in Sole de nouo genitæ, die 19. & 20. in faculas resolute exiuerunt.

Omnium motus est rectilineo valde affinis & ferme æqualis, neque dierum tredecim mora multo maior, omnesque ad Eclipticam eodem quasi modo obliquantur: polus arcticus horizontem necdum assecutus est.

*Curuitas &
obliquitas
ferme mini-
ma; polus bo-
rizonti vi-
cinus.*

Nonò. Macula l austrina vnius diei lucem aspexit.

Decimò. Macula m, in plaga australi versus occasum progenitæ, cum faculis imò in faculis exiuerunt flexu itinerario alijs simili: auctæ sunt mole circa horizon-

*Macula cir-
ca occasum
generata au-
gescunt.*



Notae in XLVIII. Observationum Imaginem
Novembris tertiam, Decembris primam;
a die 22. Novembris ad 7. Decembris.

XLVII. Imago
Observationum

In Collegio Romano Societatis

2. Nouembris.



Cursus a die 6. Nouembris ad 22. eiusdem MDCXXV.



Notæ in XLVIII. Obseruationum Imaginem,
Nouembris tertiam, Decembris primam;
à die 22. Nouemb. ad 5. Decemb.

I.

Rimò. Maculæ omnes decurrunt ad sensum itinera rectilinea, & quodammodo inter se parallela necnon æquæua, atque ad Eclipticam ad angulos quasi æquales eosque maximos inclinata. Maculæ igitur & Faculæ atque Vmbræ, inter hosce duos menses, finem scilicet Nouembris, & initium Decembris, versantur in summa ab Ecliptica declinatione hyberna, australes australi, boreales boreali. Omnium tendentia ab orientali Solis plaga in occidentalem est ad Eclipticam obliqua, ex Austro in boream; nulla parallela, nulla curuilinea ad sensum, nisi in quantum Refractionum illas fortassis inflectit: inclinatio & obliquitas ad Eclipticam minima quâ potest habere hoc Phænomenon: polus horizonti insidet; arcus itinerarij cum chordis coincidunt ad sensum: statioque Macularum hyberna celebratur. nunc ad singula veniamus.

Secundò. Igitur Macula, a, die 22. Nouembris in Sole cum faculis insignibus primum est conspecta, neq. dubito quin præterito etiâ die extiterit: sed dies pluuus Solis aspectum negauit. Fuit autem fere rotunda, & pro sua exilitate satis compacta; cuius rei causa in apertum erupit diebus sequentibus, quia plures probabiliter erant & alia aliam obtexerat; nisi quis aliquid de nouo agnatum velit, cui ego non repugnarim.

Die 23. mane Faculæ una cum Macula processerunt, & sese in ampliora spatia effuderunt, vt patet in schemate, cuius vespertinam stationem etiam adnotatam habes. Die 24. & 25. prodierunt eæ quæ supra incumbabant die 22. dies duos intermedios tenuerunt pluuia. Die 28. apparuit Macula adhuc oblonga sed rara.

Die 30. imminuta, sed geminata, una cum faculis borealibus apparuit. Die 1. Decembris fuerunt quattuor Maculæ intra auctas & luculentas faculas, neque dubium est australissimam esse nouam ex

II.

ex umbris diei 22. excoctâ, id quod Phænomeno huic satis vsitatum est.

Die 2. vesperti, tam Maculæ quam Faculæ sese mirè in vnam longam fasciam luculis, umbris & maculis variegatam, composuerunt secundum horizontem, prout in schemate planum est.

Tertiò. Macula, b, tota borea, in conspectum se dedit, die 23. vespertino Nouembris, ex oculis sese subduxit 5. vespertino Decembris. In principio simplex apparuit horizonti vicina, sed satis crassa.

Die 24. sociam post se traxit, inter ambas autem facula fulgentissima eluxit.

Die 25. ex antecedente Macula emerferunt duæ, ex sequente tres, quarum postremæ orientiores densæ ingreditis apparuerunt; interiecta spatia faculis arserunt.

Die 28. post pluuias, duæ priores Maculæ in vnam magnam nucleo fisso conspicuam coierunt massam, vapore ceu nebula circumfusam, nimboq. fulgido vndique radiosam, media sese ab omnibus liberauit, postremæ duæ nucleis fætæ etiâ diuortium meditantur, interea interstita spatia alba faculis collustrata affulserunt.

Die 29. in nucleo Maculæ magnæ aliquanta variatio euenit, mediaque in umbras sese extenuat, postremæ quasdam nouas paruulas ostentât a se penitus diuisæ.

Die 30. prima oblongior & nucleo & circumfuso vapore comparuit, nimbo adhuc radiosâ, paruulisq. duabus borealibus aucta: reliquæ in 5. dispartitæ sunt, faculis passim interlucentibus.

Die Decembris 1. prima tam nucleo quam circumiecto schemate triangularis apparuit. sequentes in 7. fragmenta tenuia laceratæ sunt, nimbus adhuc perstabat.

Die 2. 3. & 4. sensim & magnitudine & intensione defecerunt, donec 5. vesperti horizonti duæ solæ Maculæ sibi valde vicinæ, appropinquauerunt. id autem quod superne versus boream horizontem attigit, fuit umbra tenuis, sequente luculenta facula, ex Maculis accensa. Duratio apparens huius

Facula luculenta inter maculas

Facula & Nimbi cum Maculis procedunt.

Nuclei & Macula v-niformes.

IMAGO SOLIS XLVIII. 269

I.
ius cursus dies 13. non superavit, an ad-
quaverit, sub iudice lis est.

Quarto Maculæ c, rare, eundē cursum
tenuerunt, sed totū non confecerunt, quia

II.
ultra dies quattuor in Sole non subfite-
runt, nec principium nec finem consecu-
ta, sed in eodem medio generata & rur-
sus corruptæ.

XLVIII, Imago

Observationis.

M.DC.XXV.

In Collegio Romano Societatis


3, Nouembris,

1, Decembris,



Cursus Macularum, à 22, Nouembris ad 5, Decembris,

similis aliis aliorū annorū tempore eodem.



NOVEMB.

DECEMB.

D—H—O.EI.

D—H—O.EI.

22.m. 10 — 23. 20.

1.m. 9 $\frac{1}{8}$ 15. 25.

23.m. 9 — 16. 30.

2.u. 2 $\frac{3}{8}$ 15. 20.

23.u. 4 — 8. 0.

3.u. 3 $\frac{1}{2}$ 10. 0.

24.m. — 21. 35.

4.m. 10 — 25. 40.

25.m. 8 $\frac{7}{8}$ 15. 30.

5.u. 3 $\frac{1}{2}$ 11. 0.

28.m. 8 $\frac{3}{4}$ 17. 0.

29.m. 8 $\frac{1}{2}$ 16. 20.

30.m. 8 $\frac{1}{12}$ 15. 0.

Notæ in X L I X. Obseruationum Imaginem,
quartam Nouembris, secundam Decembris;
à die 25. Nouembris ad 8. Decembris.

I.



R I M O. Maculæ
a, australes, cum
vmbis & faculis,
die 25. Nouembris
in parte australi
exortæ perdurant
ad 1. Decembris
fragmentum itine-
ris sui exhibuerunt rectilineum, ad Ecli-
pticam autem obliquum.

Secundò. Eodem die 25. apparuit Ma-
cula, b, borealis cum faculis, & vmbis;
fuit crassa & duplicata. Die 28. in duas
supernè hiauit, nucleis oblongis prægnā-
tes, sequentibus quattuor paruulis. in-
tercapedo alba effulsit in faculam. Die
29, sequens oriētalior absumpta videtur,
nam neque mane, neque vesperi appare-
bat, lucente illa parte, paruulisque ad-
huc sequentibus.

Die 30. mane & vesperi, duæ tanquā
per medium sectæ apparuere Maculæ, nu-
cleis foetæ, intercapedine alba faculæ in-
star præfulgida. Die 1. Decembris mane
& vesperi, schemate denuo mutato pro-
dierunt. Nam mane fuerunt duæ Macu-
læ versus occasum coniunctæ, vesperi

*Mirissima
Macularū
distantio
& coniun-
ctio.*

II.

emicuerunt tres inter se discrete: sed nu-
cleis quattuor paruis graues. Die 2. ve-
speri, euaserunt quattuor distincte & in-
uicem separatæ Maculæ, quarum duæ au-
strales heri, & die 30. itemque 29. con-
iunctæ erant; nucleis nihilominus duo-
bus præditæ. Die 3. iterum in duas ob-
longas sunt collectæ, omnes helternæ
quattuor. Die 4. & hæ ipsæ in vnicam
coaluerunt & sic die 5. perrexerunt.

Die 6. non fuit cælum.

Cursus harum Macularum ad sensum
rectilineus extitit, cursuique, a, quo-
dammodo parallelus incessit, non tamen
cursui c; à quo circa occasum aliquantum
discessit. Mora tota sub Sole, si omnia
computentur, dies tredecim non videtur
attigisse.

Tertiò. Macula, c, vna mole, sed
nucleis geminata incessit, qui die 1. De-
cembris inter se separati comparuerunt,
vsque ad diem 4. post quem tam ipsi,
quam Macula tota vehementer defece-
runt, adscitis in comitatum insignibus
Vmbis & Faculis. Cursus ipsius à recti-
tudine circa occasum nonnihil deflexit.

*Cursus re-
ctilini.*

*Macula et
Nuclei ea-
rum simul
vndiq. defi-
ciunt: in-
quarum lo-
cum umbra
& facula
succeedunt.*



XLIX, IMAGO

Observationu.

M.DC.XXV.

In Collegio Romano Societatis

Nouembris, 4.

Decembris, 2.



Curfus Macularu a 25. Nouemb: ad 2. Decembris.

similis aliis alioru annorum.

A, Oriens.

AB, Ecliptica.

B, Occidens.

Nouemb.

Decemb.

D-H-O-E-I.

D-H-O-E-I.

25. m. 8 $\frac{7}{8}$	15. 30.
25. u. 2 $\frac{1}{8}$	21. 0.
28. m. 8 $\frac{7}{8}$	13. 0.
28. u. 3 $\frac{1}{8}$	14. 45.
29. m. 8 $\frac{7}{8}$	16. 20.
29. u. 3 $\frac{1}{8}$	12. 40.
30. m. 8 $\frac{7}{8}$	15. 0.
30. u. 10.	10. 40.

1. m. 9 $\frac{1}{8}$	15. 25.
1. u. 3 $\frac{1}{4}$	13. 30.
2. u. 2 $\frac{7}{8}$	15. 20.
3. u. 1 $\frac{7}{8}$	21. 30.
4. m. 10.	21. 40.
5. u. 3 $\frac{1}{8}$	11. 0.
7. m. 9 $\frac{7}{8}$	21. 30.
7. u. 3 $\frac{3}{8}$	11. 20.
8. m. 9 $\frac{1}{8}$	15. 10.
8. u. 2 $\frac{3}{8}$	17. 0.

N

Solentia & denata sunt. Ceterum hanc Maculam anno 1622 die eadem in sole non comparuisse euidens est, ex causa mea Observationum Insignis 39. in qua toto dictum illorum decursum, parallelus huius Maculae parallelus Romano propo- tionalis, ab omni propterea Macula va- cuit fuit. Vnde Maculas non perennare

Notæ in Obseruationum Imaginem L. conflatam è Tabulis lateralibus sex, quarum prima est Duacena, secunda Ingolstadiana. Reliquæ quattuor sunt Friburganæ, Annorum 1621. 1624. 1625. Mensium Sept. Oct. Nouemb.

I.



ASCE Tabulas ideo adduco, vt videas mirificam motus Macularum consonantiam, etiam si in diuersis locis, annis diuersissimis, ab hominibus alijs obseruentur, inq. circulos obseruatorios magnitudinum omnino differentium congerantur.

TABVLA I. Obseruata est Duaci anno 1624. à P. Carolo Malaperfio Societatis nostræ; & continet cursum macularum, a, obseruatarum à die 31. Augusti, ad diem 5. Septembris: & licet cursus hic integer non sit, tamen ipsius fragmentum haud absimile est, cursui Maculæ, a, in Imagine 29. descripto, quam Maculâ Romanæ obseruavi anno 1625. diebus iisdem; non quod eadem Maculæ redierint, sed quod aliæ similem cursum, eodem ad Eclipticam situ & habitu peregerint, prout conferenti patebit.

Cæterum plures obseruationum dies in hoc cursu desiderantur in principio & fine, non quia labor obseruantis, sed Macula obseruanda defuit. Etenim, vt obseruator Duacenus adnotauit, die 27, 28, 29, & 30. Augusti, in Sole lustrato nihil „ est animaduersum; eiusdem verò die „ 31. sub altitudine Solis pomeridiana, „ graduum 8. min. 0, ait obseruator, ap- „ paruit Macula, a, tenuis & nitida, an- „ te non visa. Aliæ item apparuerunt cum hac, quæ hic non notantur. Die autem 7. cum Sol reuiferetur, eadem iam disparuerat. Itaque hæc macula in Sole nata & denata fuit. Cæterum hanc Maculam anno 1625. die eadem in Sole non comparuisse euidens est, ex citata mea Obseruationum Imagine 39. in qua toto dierum illorum decursu, parallelus huius Maculæ parallelo Romano proportionalis, ab omni prorsus Macula vacuus fuit. Vnde Maculas non perennare

II.

certum est non tantum ex hoc, sed huic similibus experimentis practicis innumeris: confer annos diuersos, & inuenies in obseruationibus collatis verum esse quod scribo.

TABVLA II. complectitur tres cursus Ingolstadianos Macularum, a, b, & c, die 5. notari ceptos, qui respondent cursibus Romanis b, c, d, in Imagine 39. descriptis, quorum b, respondet Ingolstadiano c, sed Romanus à die secundo & horizonti vicinissimus progreditur; at vero Romano c, respondet Ingolstadianus b, & produxit ille suam originem à die 3. Romano, d, respondet Ingolstadianus, a, qui ex ortis de nouo in Sole Maculis, nouus vtrobique extitit. nunc singulos ordine dierum prosequamur.

Die 5. ait obseruator Maculæ 8. per immissionem, per inspectionem plures, vna cum Faculis, per totam fere disci solaris medietatem, immixtis. In obseruatione Romana, inuenies apud b, Maculas 11. apud c, Maculam vnâ cum faculis 12. aut pluribus; apud d, Maculas 8. Melior est ergo obseruatorius circulus meus magnus, paruo illo Ingolstadiano.

Die 7. Maculæ Ingolstadianæ in vniuersum 5. Romanas inuenies apud b, 11. apud c, vnâ, apud d, 14.

Die 8. Maculæ vniuersim sex, Macula autem, b, (quæ est in meo schemate c,) ait Obseruator, ex pluribus composita. Fuerunt in obseruatione Romana 10. apud c, vna, apud d, 8.

Die 9. Maculæ 5. per nubes calo non satis sereno, ait Obseruator. in Romana videbis apud b, Maculas minimum 16. apud c, vnâ, apud d, 4.

Die 11. Maculæ 5. ait obseruator, macula tamen c, in duas erat diuisa. In cursibus Romanis ad b, habes Maculas 8. ad c, vnâ; ad d similiter vnâ.

Die 12.

Macula nō perennant.

Facule Ingolstadij visæ, mediam Solis partē occupant.

Cum Ingolstadianis obseruationibus, conferatur Romana.

L. Imago Observationum, 6 Tabulas et Cursus Macularum varios complexa,

M.DC.XXI.
In Collegio Academico

Friburgano Societatis Iesu.

Septemb.

Octob.


D.H.O.EI.

D.H.O.EI.

26.m.8.54.26.15.
27.m.9.14.28.30.
28.m.9.24.29.35.
29.m.8.46.24.11.
30.m.8.54.25.25.

1.m.10.58.26.46.
2.m.7.14.27.47.
3.m.9.28.27.29.
4.m.12.13.36.27.

Cursus Macula a. a die 26. Septembris
ad 6. Octobris, similes aliis aliorum
annorum et locorum.



M.DC.XXI.

In Collegio Academico

Friburgano Societatis Iesu.

Octobris.


D.H.O.EI.

D.H.O.EI.

5.m.9.28.27.29.
6.m.12.13.36.27.
7.m.9.28.27.29.
8.m.7.14.27.47.

11.m.4.17.11.10.
12.m.3.50.14.35.
13.m.9.25.24.4.
14.m.11.23.30.40.

Cursus Macularum b. a die 5. ad
15. Octobris, similes aliis
aliorum et locorum.



M.DC.XXIV.

Duaci in Academico Societatis

Iesu Collegio.

Cursus Macula a. observatus a die 31. Augusti
ad 5. Septembris, similis Romano, anni 1625.

Augusti die 31. Oclen: uesp. 8.0.



SEPTEMB.

D.H.O.EI.

1.m.8.54.26.15.
2.m.9.14.28.30.
3.m.9.24.29.35.
4.m.8.46.24.11.
5.m.8.54.25.25.

M.DC.XXI.

In Collegio Academico

Friburgano Societatis Iesu.

Octobris.


D.H.O.EI.

D.H.O.EI.

25.m.11.25.29.18.
26.u.2.56.17.48.
27.m.8.58.16.48.


28.u.12.25.28.15.
29.u.12.56.26.30.
30.u.1.12.27.29.

Cursus Macula c. a die 25. ad 31. Octobris.
similis aliis aliorum annorum et locorum.



Ingolstadtij
Anno 1625. in Collegio
Academico Societatis Iesu.

Cursus Macularum d. e. f. a die 1. ad 15. Septemb. similis Romanis.



M.DC.XXI.

In Collegio Academico

Friburgano Societatis Iesu.

Novembris.

D.H.O.EI.

D.H.O.EI.

16.u.12.15.22.53.
17.m.9.15.13.14.
18.m.10.0.16.55.

21.m.9.30.16.5.
22.m.9.36.13.36.
23.m.10.46.19.0.

Cursus Macularum a. 16. ad 25. Novembris.
similis aliis aliorum annorum et locorum.



Septemb.

D.H.O.EI. D.H.O.EI. D.H.O.EI.

1.m.8.54.26.15.
2.m.9.14.28.30.
3.m.9.24.29.35.
4.m.8.46.24.11.
5.m.8.54.25.25.

Notæ in Observationum Imaginem L. conflatam è Tabulis lateralibus sex, quarum prima est Duacena, secunda Ingolstadiana. Reliquæ quattuor sunt Friburganæ, Annorum 1621. 1624. 1625. Mensium Sept. Oct. Nouemb.

I.



ASCÆ Tabulas ideo adduco, ut videas mirificam motus Macularum consonantiam, etiam si in diuersis locis, annis diuersissimis, ab hominibus alijs obseruentur, inq. circulos obseruatorios magnitudinum omnino differentium congerantur.

TABVLA I. Obseruata est Duaci anno 1624. à P. Carolo Malaperio Societatis nostræ; & continet cursum macularum, a, obseruatarum à die 31. Augusti, ad diem 5. Septembris: & licet cursus hic integer non sit, tamen ipsius fragmentum haud absimile est, cursui Maculæ, a, in Imagine 29. descripto, quam Maculâ Romanæ obseruavi anno 1625. diebus iisdem; non quod eadem Maculæ redierint, sed quod aliæ similem cursum, eodem ad Eclipticam situ & habitu peregerint, prout conferenti patebit.

Cæterum plures observationum dies in hoc cursu desiderantur in principio & fine, non quia labor obseruantis, sed Macula obseruanda defuit. Etenim, ut obseruator Duacenus adnotauit, die 27, 28, 29, & 30. Augusti, in Sole lustrato nihil „ est animaduersum; eiusdem verò die „ 31. sub altitudine Solis pomeridiana, „ graduum 8. min. 0, ait obseruator, ap- „ paruit Macula, a, tenuis & nitida, an- „ te non visa. Aliæ item apparuerunt cum hac, quæ hic non notantur. Die autem 7. cum Sol reuiferetur, eadem iam disparuerat. Itaque hæc macula in Sole nata & denata fuit. Cæterum hanc Maculam anno 1625. die eadem in Sole non comparuisse euident est, ex citata mea Observationum Imagine 39. in qua toto dierum illorum decursu, parallelus huius Maculæ parallelo Romano proportionalis, ab omni prorsus Macula vacuus fuit. Vnde Maculas non perennare

II.

certum est non tantum ex hoc, sed huic similibus experimentis practicis innumeris: confer annos diuersos, & inuenies in obseruationibus collatis verum esse quod scribo.

TABVLA II. complectitur tres cursus Ingolstadianos Macularum, a, b, & c, die 5. notari ceptos, qui respondent curribus Romanis b, c, d, in Imagine 39. descriptis, quorum b, respondet Ingolstadiano c, sed Romanus à die secundo & horizonti vicinissimus progreditur; at vero Romano c, respondet Ingolstadianus b, & produxit ille suam originem à die 3. Romano, d, respondet Ingolstadianus, a, qui ex ortis de nouo in Sole Maculis, nouus utrobique extitit. nunc singulos ordine dierum prosequamur.

Die 5. ait obseruator Maculæ 8. per immersionem, per inspectionem plures, vna cum Faculis, per totam fere disci solaris medietatem, immixtis. In obseruatione Romana, inuenies apud b, Maculas 11. apud c, Maculam vnā cum faculis 12. aut pluribus; apud d, Maculas 8. Melior est ergo obseruatorius circulus meus magnus, paruo illo Ingolstadiano.

Die 7. Maculæ Ingolstadianæ in vniuersum 5. Romanas inuenies apud b, 11. apud c, vnā, apud d, 14.

Die 8. Maculæ vniuersim sex, Macula autem, b, (quæ est in meo schemate c,) ait Obseruator, ex pluribus composita. Fuerunt in obseruatione Romana 10. apud c, vna, apud d, 8.

Die 9. Maculæ 5. per nubes calo non satis sereno, ait Obseruator. in Romana videbis apud b, Maculas minimum 16. apud c, vnā, apud d, 4.

Die 11. Maculæ 5. ait obseruator, macula tamen c, in duas erat diuisa. In curribus Romanis ad b, habes Maculas 8. ad c, vnā; ad d similiter vnā.

Die 12.

Macula nō perennant.

Facula Ingolstadij visæ, mediam Solis partē occupant.

Cum Ingolstadianis obseruationibus, conferuntur Romanæ.

L. Imago Observationum, 6 Tabulas et Cursus Macularum varios complexa, observatos Duaci, Ingolstadij, Friburgi, à

M.D.C.XXI.

In Collegio Academico

Friburgano Societatis Iesu.

Septemb.

Octob.

D.H.O.EI.

D.H.O.EI.

26.m.8.54.26.14.

1.m.10.56.36.46.

27.m.9.14.28.30.

2.u.7.14.22.47.

28.m.9.3.26.39.

5.m.9.23.27.29.

29.m.8.46.24.17.


6.u.12.13.36.27.

30.m.8.58.25.29.

Cursus Maculae a die 26. Septembris

ad 6. Octobris, similes aliis aliory

annorū et locorū.



M.D.C.XXI.

In Collegio Academico

Friburgano Societatis Iesu.

Octobris.

D.H.O.EI.

D.H.O.EI.

5.m.9.28.27.29.

11.u.4.17.11.10.

6.u.12.13.36.27.

13.u.3.50.14.35.

9.m.9.28.26.24.

14.m.9.25.24.4.


10.m.7.28.14.9.

15.m.11.23.30.40.

Cursus Macularum, b, à die 5. ad

15. Octobris, similes aliis

aliorum et locorū.



M.D.C.XXIV.

Duaci in Academico Societatis

Iesu Collegio.

Cursus Maculae a die 31. Augusti

ad 5. Septembris, similis Romano, anni 1625.

Augusti die 31. Oclen: uesp. 8.0.



SEPTEMB.

D.H.O.EI.

1.m.8.0.

2.m.13.0.

3.m.12.0.

4.m.13.0.

5.m.10.0.

M.D.C.XXI.

In Collegio Academico

Friburgano Societatis Iesu.

Octobris.

D.H.O.EI.

D.H.O.EI.

25.m.11.35.29.18.

28.u.12.25.28.15.

26.u.2.56.17.48.


29.u.12.56.26.30.

27.m.8.58.16.48.

31.u.1.12.27.29.

Cursus Maculae c, à die 25. ad 31. Octobris.

similis aliis aliory annorū et locorū.



M.D.C.XXI.

In Collegio Academico

Friburgano Societatis Iesu.

Novembris.

D.H.O.EI.

D.H.O.EI.

16.u.12.15.22.53.

21.m.9.30.16.5.

17.m.9.15.13.14.

24.m.9.36.13.36.

20.m.10.0.16.53.

25.m.10.46.19.0.

Cursus Macularum à 16. ad 25. Novembris.

similis aliis aliory annorū et locorū.



Septemb.

D.H.O.EI. D.H.O.EI. D.H.O.EI.

5.m.8.58.16.48.

7.m.1.25.41.16.

9.m.1.25.41.16.

11.m.1.25.41.16.

13.m.1.25.41.16.

15.m.1.25.41.16.

17.m.1.25.41.16.

19.m.1.25.41.16.

21.m.1.25.41.16.

23.m.1.25.41.16.

25.m.1.25.41.16.

27.m.1.25.41.16.

29.m.1.25.41.16.

31.m.1.25.41.16.

I.

Die 12. *Macula 4. cum faculis plurimis, ait observator*; in Romana observatione, inuenies ad, b, Maculas 5, cum umbris duabus & Faculis luculentis tribus; ad, c, Maculam vnam; ad, d, Maculam vnam cum umbris duabus & Facula vna illustri.

Die 13. *Maculae per nubes duae cum Faculis multis*: habes in observationibus Romanis, ad, b, Maculas tres, inter Faculas circumiectas, cum umbra maxima; ad, c, Maculam vnam; ad, d, Maculam cum Facula horizonti contigua.

Die 14. *Macula occidentalis vna per nubes*: Romae ad, b, Macula vna cum umbris & faculis duabus, ad, c, Macula vna.

Die 15. *Macula occidentalis vna*; quoadmodum in Romana quoque observatione.

Die 16. de hac Macula nil amplius animaduersum est Ingolstadij, Romae vero eandem quasi marginalem, vna cum sex puris & lucidis Faculis aspicias sub littera c.

Ex omnino da obseruationum correspondetia, parallaxis eliminatur.

Istarum Macularum vestigia itineraria, sunt inter se planè similia, & sicut Romae in ortu magis à se distant, versus occasum vero sensim ad se conuergunt, sic etiam ex observationibus Ingolstadianis idem prorsus euenit, vtrinque etiam Macularum cursus paralleli non fuerunt. Vnde nulla Macularum in Sole Parallaxis necessario concluditur. Quod autem ibidem tam paucae, Romae tam multae sint visae Maculae; &c. tribues id tam magno Circulo obseruatorio, &c. cui parui isti numquam æquabuntur. Imo neque Helioscopia Ingolstadij adhibita, virtutem illorum assequuntur.

II.

TABVLA III. Obseruata est Friburgi Brisgoiae, anno 1621. annotauitque Obseruator, faculas ad ingressum, tractas post Maculam, deinde ad primum, imo 5. Octobris vsque diem semper creuisse. itemque visam esse inuolutam nebula, quod nil aliud est dicere, quam maculam gestauisse vterum nucleo primum vno, deinde duobus, vt apparet, grauem. Similem huic inuenies cursum, in Imagine 42. Maculae, d; & Imagine 43. Maculae, a. Hæc Macula die statim 27. tres alias, & sequentibus, ad 3. Octobris, plures acquisiuit socias; quibus absumptis, die 5. Octobris sola iterum comparuit, & sic ad exitum vsque permansit.

TABVLA IV. exhibet cursum Macularum, b, à die 5. ad 15. Octobris anno & loco eodem obseruatarum. Die 6. transparuerunt per nubes sub vna massa. Erant primis diebus plures, sed minoribus sensim deficientibus, à die 13. ad 15. vsque vnica visa exiuit. Cursui prædicto Maculae, a, in Imagine 43. non est absimilis hic cursus, nisi quod hic ab Ecliptica valdè remotus sit. Item cursui Maculae, a, in Imagine 44.

Cursus ab Ecliptica multum declinans:



TABVLA V. Continet cursum Maculae c, loco & anno eodem, à die 25. ad 31. Octobris; inuenies illi similem, in Imagine 45. decursum à Macula, b, ad rectitudinem sese nonnihil accommodat.

Cursus diuersorum annorum et locorum similes.

TABVLA VI. refert ex loco & anno, eodem, duarum Macularum australium, d, cursus; Macularumque socias acquisitas & amissas, item nucleos, circumuolutasque nucleis nebulas: respondet cursibus Macularum c, & h, in Imagine 47. expressis. Rectitudo ubiq. sese ingerit.



L. Imago Observationum 6. Tabulas et Cursus Macularum varios complexa.



M.DCXXIV.

Duaci in Academico Societatis
Iesu Collegio.




Cursus Maculae a. observatus à die 31. Augustij.
ad 5. Septembris, similis Romano anni 1625.

Augusti die 31. O eleu. uesp. 8.6.

SEPTEMB.

D-O. Eleu.

- 1. m. - 8. 6.
- 2. m. - 13. 0.
- 3. m. - 11. 0.
- 4. m. - 13. 0.
- 5. m. - 10. 0.



Notæ in L I. Obseruationum Imaginem, tertiam Decembris, à die 3. ad 14. eiusdem.

I.



R I M O. Macula a, borealis, in Sole nata, & vnica in principio visa die tertio Decembris vesperi, deinde sequentibus vehementer aucta &

multiplicata, circa occasum cæli iniuria spectari non potuit. cursum tamen sensu rectilineum peregit, & faculis circa occasum die nono valde illustris fuit: Macularum autem digressiones in omnem loci differentiam semper à se mutuo maiores euaserunt, & quæ se mutuo tangebant in medio, circa exitum separatæ sunt.

Secundò. Macula, b, biduana tantum fuit, segmentumq. itinerarium alijs aliquantulum obliquum fecit.

Tertio. Macula, c, similiter borea & simplex, ex initio tenui in multam, & magnam prolem breui excreuit, & circa exitum magnum vmbrarum numerum,

II.

Faculas gestantium, post se traxit. iter rectilineum peregit quidem, sed itineri Maculæ, a, non vsquequaque parallelum, ad quod circa occasum nonnihil accessit.

Itinera non parallela.

Quartò. Macula, d, australis solitaria exorta, nonnullas socias adsciuit, die 14. apud horizontem, vmbras & faculas insignes post se traxit, Maculæ, c, parallela semper incessit, eique duratione æqualis, motuque similis extitit, qui vtrobiq. ad sensum rectilineus fuit.

Itinera parallela.

Quintò. Maculæ, e, boreales curriculum breue, sed ramen alijs simile atque proportionale nactæ, in ipso cursu defecerunt, quemadmodum in Sole pænè medio procreatæ fuerant.

Sextò. Macula, f, australis cum insignibus faculis & minutis vmbris sese ostendit, cum ijsdem à conspectu sese propripuit; iter tamen insistentes omnibus commune, rectilineum, nec ab initio capit, neque ad finem peruenit.

Macula augentur & à se mutuo discedunt quauersus.



LI. Imago Ob-
servationu.

MDCXXV.
In Collegio Romano Societatis

3^{ia} Decembris.



Cursus Macularum à 3. Decembris ad 14. eiusdem.

similis aliis alioru annorum.

A, Oriens.

B, Occidens.

A, B, Ecliptica.

DECEMBRIS

D. H. O. Ele.

D. H. O. Ele.

7. m. 9 $\frac{7}{8}$ — 21. 30.

13. m. 9 $\frac{7}{8}$ — 18. 30.

14. m. 9 $\frac{1}{8}$ — 14. 15.

Z, Zenith: N, Nadir.



Notæ in LII. Observationum Imaginem, Decembris quartam, à die 7. ad 16. eiusdem.



Facula magis sequuntur quam antecedunt.

I. PRIMO. Maculae a, boreales, ante diem 7. obseruari non potuerunt, quia dies 6. pluvius, usum obseruandi funditus ademit; die 5. vespere de-

illis nihil animaduersum fuit; Haeserunt die 7. intra luculentissimas faculas, quas partim in itinere recto, partim ad latera delineavi; earum tamen maiorem & potentior partem post se & ad latera traxere, quam premisere, imò quasi nil ante se tulere, die praesertim octauo, ut in figura laterali est cernere.

Secundò. Die 8. mane maculae nonnihil immutatae, & Faculae rariores sunt spectatae.

Tertiò. Die 9. vespere, Faculae quasi disparuere, & Maculae minores & rariores sunt aduersae, quam fuerant pridie.

Quartò. Dies 10. inclementia caeli, importunus, neque vndecimus multo melior, sed quod indulget, data hora, quasi rapina fuit; Vnde si quid fortassis ab itinere deflexum esset, non tribuendum id foret Macularum cursui, sed in obseruando necessariae festinationi.

Quintò. Dies 12. rursus intempestus; dies 13. vespertinus mediocris fuit.

14. Situm, cursum, figuram, & Ma-

gnitudinem veram Macularum praesentat; ubi vides, sequentes valde attenuatas esse.

Sextò. Dies 15. & Maculas, & Faculas, & umbras restaurare visus est, nam de appposita apparentia non est quod dubites, fidelissime omnia promo, nihil addens, nihil detrahens.

Septimò. Dies 16. refert aspectum Macularum & Facularum, necnon umbrarum ultimum; quia die sequente 17. rursus inclementia caeli, animaduerti nil potuit.

Octauò. Interim consideres velim, quanta Macularum & Facularum, nec non umbrarum occidentium, cum orientibus dissimilitudo interuenerit in situ & distantia: Deinde quomodo faculae, & umbrae pleraeque, Maculas potius sequantur aut stipent, quam antecedant, &c. Item quòd non amplius coierunt proportionaliter. Nam Macula occidentalissima diei 15. tantum distat à centro C, quantum orientalissima, diei 7. & tamen occidentalissima diei 15. multo plus distat à sua occidentalissima, & centro multo vicinior est, quam occidentalissima die 7. à sua orientalissima, centroque abest amplius quam illa: id quod huic Phoenomeno ferme est perpetuum.

Nonò. Cursus ad sensum est adhuc quasi rectilineus.

Distantia macularum maior quam motus uniformis patitur.



LII. Imago Ob.

M.DCXXV

4. Decembris.

servationu.

In Collegio Romano Societatis



Notæ in LIII. Observationum Imaginem, Decembris quintam, à die 13. ad 23. eiusdem.

I.



RIMO. Maculæ a, australes, die 13. adhuc quasi inter sese contiguerant, & Faculis lateralibus stipabantur.

Secundò. Diebus tribus sequentibus disiungebantur magis, sed simul imminuebantur mole, crescentes numero, & distantijs, plus quàm vniformis motus patiebatur.

Tertiò. Die 18. tandem & sequentibus numero, mole & disijunctione crescebant.

Macularum ad horizontem reclinatio visitata, quidem, sed admiranda.

Quartò. Die 22. & 23. rursus coniungi visæ sunt longitudine, sed latitudine valde distendi; sed & Faculæ luculentæ accesserunt. Incredibilis harum Macularum ad horizontem æqualis ferme accessus, valde est admirandus, cum circa medium tanto interuallo à se mutuo distiterint. Sed & similia in alijs cursibus frequenter sunt animaduersa.

Quintò. Die 24. Macula, d, cum suis Faculis, vti ex latere patet adhuc supra horizontem versabatur: à quo hesternas Maculas, a, non longè abfuisse ex hisce certissimum est.

Curuitas & chordarum ad Eclipticam inclinatio augere incipit; polus australis ascendit.

Sextò. Cursus harum macularum in medio adhuc quasi rectilineus, & ei qui priore anno noratus & obseruatus fuit, similis existit; secundum extrema perpendus, curuilineus est, conuexus ad Eclipticam, cōcauus ad Nadir: duratio ipsius, si sedula ineatur ratio, erit dierum, plus minus, tredecim. Chordæ ad Eclipticam iterum accedunt, inclinatio augetur, an-

II.

gulus inclinationis minuitur, obliquitas & iterum curuitas crescit, polus antarticus in semicirculi ascendentis quadrante occidentali versatur, & ascendit ab occasu versus ortum. Directio Macularum itineraria est ex ortu austrino versus occasum borealem.

Septimò. Maculæ, b, in medio Sole exortæ; auctæ & multiplicatæ triduo, postea defectæ, & cum vmbri & faculis egressæ sunt. Semicirculus illarum fuit dierum sex, & horarum 6. circiter.

Octauò. Idem asseritur ex Maculis c, quæ plus quam sex diebus, suum semicursum, eumq. ad Eclipticam recursum, & ad Maculam, a, parallelum absoluerunt, egressæ cum vmbri & faculis splendidis. Eadem cum in medio disijunctæ essent, sub exitum coierunt, ideoque nigriores apparuerunt.

Hinc habes, iterum rectilineorum, aut quasi talium, differentias in tempore, quo sub Sole morantur, non esse tantas, quantæ solent esse, motuum maxime curuilineorum. illic enim inter cursus australes, & boreales morarum differentia, diem fermè adæquant; hic aliquot horis vix discrepant.

Morarum itinerarium differentia parua, hoc tempore.

Insuper & hoc habes, è circulis obseruatorijs tam paruis, perfectam motuum apparentium rectitudinem & curuitatem addisci & stabiliri securè non posse, nisi alia accedant adiumenta; eo quod horizontales Macularum apparitiones, in ijs raro visantur. Nam si ab vltimis diebus abstrahas, Macularum, a, cursus rectilineus absque dubio statuatur.



LIII. Imago Obser-
uationum.

M.DC.XXV.
In Collegio Romano Societatis



5. Decembris.



Cursus Macularum à 13 Decembris, ad 23, eiusdem,
similis anni prioris, et

A, Oriens; B, Occidens;

A, B, Ecliptica.



DECEMBRIS

D. H. O. Ele.

D. H. O. Ele.

13. m. $9\frac{3}{4}$ — 18. 30.

19. m. — 18. 30.

14. m. $9\frac{1}{8}$ — 14. 15.

20. m. 10. — 19. 0.

15. m. $9\frac{1}{8}$ — 13. 40.

22. m. — 23. 30.

16. m. $9\frac{1}{2}$ — 16. 0.

23. m. $10\frac{1}{4}$ — 21. 0.

18. m. — 16. 10.

24. m. $10\frac{3}{8}$ — 21. 30.



Notæ in LIV. Observationum Imaginem, sextam Decembris, & primam Ianuarij anni 1626. à die 15. Decemb. ad 7. Ianuarij.

Motus curvilineus in Austrum concavus totus manifestus.



I. PRIMO Omnes hæ Maculæ iam manifestæ & absque ullo ambigendi scrupulo, cursum suum incurvant, & quæ versantur in plaga borea faciunt arcus ad Eclipticam concavos;

quæ in australi, convexos; quæ in utraque partim convexos partim concavos. Exempla concavitudinis habes in Maculis b, & d. Convexitatis in e, utriusque in a, & c, polus arcticus latet infra, antarcticus patet supra hemisphærium, & versus illum convexitas cursuum, erga hunc concavitas spectat; idque à Decembri usque ad Iunium per menses sex.

Secundò, Macula a, australis, & borealis initio una & oblonga, successu bipartita est, & rursus iuncta: Faculam e, post se traxit ad ingressum; exitum ipsius spectabilem cæli intempories sustulit.

Tertiò, Ex eadem causa, nec ingressum, neque exitum habes Maculæ, b, quæ magna, nigra, & nucleosa fuit. Traxit post se Faculam valde intensam. Nucleum paullatim diuisit & sensim in duas Maculas sese aperuit, sed nunquam penitus discretas exhibuit: intercapedo inter illas reliquo Sole lucidiôr instar Faculæ intensæ enituit, & licet Maculæ nunquam omnino disiunctæ sint, nuclei tamen post factum hiatum, ad exitum usque separati manserunt. Circa exitum Faculam & umbram orientali non dissimilem redhibuit, sed tam ipsa Macula quam istæ diminutiores multo fuerunt.

Nuclei circa horizontes etiam gracilescent.

Notandum quod nuclei circa exitum non minus, quam circumscriptis nucleis vapor vel halitus gracilescent. Cursus

II.

1 huius Maculæ cursui Maculæ a, parallelus est.

15 Quartò, Maculæ, c, australes, & boreales ex implicata congerie in duas primum, tum in unam Maculam redactæ, sub finem ingentes Faculas pepererunt, die 24. infederunt iter Macularum a, à quo tamen sensim recesserunt in austrum.

10 Quintò, Macula d, borealis, ponetrahens Faculas, sensim & post medium omnino defecit: peregit motum Maculæ, e, quasi parallelum, non autem Maculæ, b, ad quam sensim appropinquavit.

15 Sextò, Maculæ e, tres cum Facula media, dilatauerunt, & multiplicauerunt se supra modum, neque ad eas angustias unquam se contraxerunt in exitu quas exhibuerunt in ingressu. Faculas fulgentes in occasum secum deduxerunt: 20 ubi etiam plures in unam coierunt, oblitterato intervallo lucido; & ideo tam densa & nigra ad horizontem usque duravit. Hanc Maculam in Sole ad dies 13. minimum commorata esse, certum est, si 25 recte pensentur inter ipsam & horizontem spacia. Iter eius à vestigijs itinerarijs Macularum, a, & b, sensim magis magisque recessit in austrum.

30 Septimò, Maculæ f, fuerunt umbræ boreales cum faculis tenuibus adhærescentibus, boreo polo valde vicinæ, has autem in exemplum tantum subinde adduco, quia sæpius visuntur, in toto quodammodo Sole, sed propter tenuitatem, & multitudinem & mutabilitatem ordinariè annotari facile non possunt. 35 nam ad multos dies rarò durant, moventur tamen ut Maculæ, quarum utique semina indubitata existunt, quemadmodum ex observatis hætenus satis ostendi. 40

Macularum itinera alia alijs parallelæ, alia non parallelæ, eodem tempore.

Umbra sive Macularum semen.




LIII, Imago Ob-
servationu.

M.DC.XXV.
In Collegio Romano Societatis

6. Decembris,
1. Ianuarij. 1626.



Cursus Macularum à 15. Dec: anni 1625, ad 7. Ian: anni 1626.
similis aliis alioru annorum



Notæ in LIV. Observationum Imaginem, sextam Decembris, & primam Ianuarij anni 1626. à die 15. Decemb. ad 7. Ianuarij.

Motus curvilineus in Austrum concavus totus manifestus.



I.

PRIMO Omnes hæ Maculæ iam manifestè & absque vilo ambigendi scrupulo, cursum suum incurvant, & quæ versantur in plaga borea faciunt arcus ad Eclipticam concavos; quæ in australi, conuexos; quæ in utraque partim conuexos partim concavos. Exempla concavitudinis habes in Maculis b, & d. Conuexitatis in e, utriusq. in a, & c, polus arcticus latet infra, antarcticus patet supra hemisphærium, & versus illum conuexitas cursum, erga hunc concavitas spectat; idque à Decembri vsque ad Iunium per menses sex.

Secundò, Macula a, australis, & borealis initio vna & oblonga, successu bipartita est, & rursus iuncta: Faculam e, post se traxit ad ingressum; exitum ipsius spectabilem cæli intempories sustulit.

Tertiò, Ex eadem causa, nec ingressum, neque exitum habes Maculæ, b, quæ magna, nigra, & nucleosa fuit. Traxit post se Faculam valde intensam. Nucleum paulatim diuisit & sensim in duas Maculas sese aperuit, sed nunquam penitus discretas exhibuit: intercapedo inter illas reliquo Sole lucidiôr instar Faculæ intensæ enituit, & licet Maculæ nunquam omnino disiunctæ sint, nuclei tamen post factum hiatum, ad exitum vsque separati manserunt. Circa exitum Faculam & vmbra orientali non dissimilem redhibuit, sed tam ipsa Macula quam istæ diminutiores multo fuerunt. Notandum quod nuclei circa exitum non minus, quam circumscriptus nucleis vapor vel halitus gracilescent.

Nuclei circa horizontes etiam gracilescent.

II.

1 huius Maculæ cursui Maculæ a, parallelus est.

15 Quartò, Maculæ, c, australes, & boreales ex implicata congerie in duas primum, tum in vnam Maculam redactæ, sub finem ingentes Faculas pepererunt, die 24. infederunt iter Macularum a, à quo tamen sensim recesserunt in austrum.

10 Quintò, Macula d, borealis, ponetrahens Faculas, sensim & post medium omnino defecit: peregit motum Maculæ, e, quasi parallelum, non autem Maculæ, b, ad quam sensim appropinquauit.

15 Sextò, Maculæ e, tres cum Facula media, dilatauerunt, & multiplicauerunt se supra modum, neque ad eas angustias vnquam se contraxerunt in exitu quas exhibuerunt in ingressu. Faculas fulgentes in occasum secum deduxerunt: 20 ubi etiam plures in vnam coierunt, oblitterato interuallo lucido; & ideo tam densa & nigra ad horizontem vsque durauit. Hanc Maculam in Sole ad dies 13. minimum commoratum esse, certum est, si 25 recte pensentur inter ipsam & horizontem spacia. Iter eius à vestigijs itinerarijs Macularum, a, & b, sensim magis magisque recessit in austrum.

30 Septimò, Maculæ f, fuerunt vmbre boreales cum faculis tenuibus adhærescentibus, boreo polo valde vicinæ, has autem in exemplum tantum subinde adduco, quia sepius visuntur, in toto quodammodo Sole, sed propter tenuitatem, & multitudinem & mutabilitatem ordinariè annotari facile non possunt. 35 nam ad multos dies rarò durant, moventur tamen vt Maculæ, quarum utique semina indubitata existunt, quemadmodum ex obseruatis hætenus satis ostendi.

Macularum itinera alia alijs parallela, alia non parallela, eodem tempore.

Vmbra sub Macularum semen.



LIII, Imago Ob-
servationis.


M.DC.XXV.
In Collegio Romano Societatis

6. Decembris,
1. Ianuarij, 1626.




Cursus Macularum à 15. Dec: anni 1625, ad 7. Ian: anni 1626.

similis aliis aliorum annorum.



Notæ in L V. Obseruationum Imaginem, Ianuarij secundam, à 1. die ad 15. eiusdem.



PRIMO, Macula, a, borealis in ortu simplex, die 5. sociam à tergo, & Faculam cometæ instar in boream acquisiuit, qua amissa comites auxit, & sub occasum inde umbras & Faculas exhibuit. Motum curuileum auxit, cuius tamen extrema in horizonte assumpta, ab Ecliptica inæqualiter distât; proindeq. chorda per illa traducta, eandem secât alicubi. Durauit in Sole dies 12. & medium minimum.

Macula in Ecliptica interitus.

Secundò, Macula, b, sola ad ortum, multos adsciuuit progressu de nouo comites, cum quibus pederentim consumpta, in Faculas abiuit, nec occasum omnino consecuta est. Eclipticam transiuit, & in eadem interijt. Macula, a, parallela incessit.

Macularum c, prodigiosa ex umbris dilatio & multiplicatio, & in umbras reuersio.

Tertiò, Macula, c, e tribus quattuorue composita, sub ingressum vna, sed crassa & densa comparuit, ducens post se agmen aliarum Macularum australium, itemque umbrarum, nec non Facularum eximiarum. Initium illius ad horizontem die 3. habere non licuit ob aëris turbulentiam; disparentibus faculis exsinuauit sese mirum in modum in Maculas co-

II.


1 piosas, quæ sensim mole & densitate deficientes in faculas & umbras denuo abiuerunt. Die 15. vesperi horizontem ferè attigit, à quo ita prope absuit, Vt interiectum spatium gracilitate & tenuitate filum aranæ vix æquaret, aciemque oculorum quasi eluderet: cum tamen ipsa Macula satis crassiuscula adhuc incederet. Duratio eius dies 13. quodammodo attigisse omnibus computatis videtur
10 sicut etiam Macula, d, quæ Macula, c, fere concurrebat, supra horizontem ab iisdem non multum absuisse: id quod notandum, & in hoc Phænomeno non adeo frequens est. Porro sicut c, cum Maculis, umbris & faculis Solem subintravit, ita cum maiore eorum comitatu, exiuit, ipsa semper prægressa, reliqua ad latera vel à tergo trahens.

Macula Faculas vel potius ne trahant, vel ad latera.

20 Quarto, Macula, d, cum faculis ingressa, cum iisdem egressa est, ad Maculam c sensim appropinquauit. Cætera satis patent ex iconismi nuda inspectione.

Itinerum ad se conuergentia.

25 Quinto, Cursus Maculae c; similis est cursui Maculae, a, ante annum, descripto in Imaginem Obseruationum secundæ diebus iisdem, situ quasi eodem, mora durationis eadem. Consule figuram, confer itinerum vestigia, & assentieris
30 veritati.



LV, Imago Obser-

M. DC. XXVI.

2^a. Ianuarij,

uationu;

In Collegio Romano Societatis



Cursus Macularum à 1^o. Ianuarij, ad 15. eiusdem
similis^{anni} præteriti, 1625.

A, Oriens, B, Occidens; AB, Ecliptica.

IANVARII.

D. H. O. El. † D. H. O. El.

1. m. $9\frac{3}{8}$ — 16. 20.	9. u. $3\frac{1}{8}$ — 14. 30.
2. m. $11\frac{1}{8}$ — 24. 25.	10. u. $1\frac{3}{4}$ — 22. 30.
2. u. — 18. 30.	11. m. $9\frac{3}{8}$ — 15. 50.
4. m. 10. — 20. 0.	12. u. — 11. 0.
5. m. $9\frac{5}{8}$ — 18. 20.	13. m. 9. — 14. 40.
6. m. $10\frac{1}{2}$ — 22. 30.	13. u. 3. — 15. 0.
7. m. $9\frac{1}{2}$ — 17. 45.	14. m. $9\frac{1}{4}$ — 15. 0.
8. u. 3. — 15. 0.	15. m. $9\frac{1}{2}$ — 18. 40.
	15. u. $3\frac{1}{2}$ — 12. 0.

Notæ in L V. Observationum Imaginem, Ianuarij secundam, à 1. die ad 15. eiusdem.



I. PRIMO, Macula, a, borealis in ortu simplex, die 5. sociam à tergo, & Faculam cometæ instar in boream acquisiuit, qua amissa comites au-

xit, & sub occasum inde umbras & Faculas exhibuit. Motum curvilineum auxit, cuius tamen extrema in horizonte assumpta, ab Ecliptica inæqualiter distât; proindeq. chorda per illa traducta, eandem secât alicubi. Duravit in Sole dies 12. & medium minimum.

Macula in Ecliptica interitus.

Secundò, Macula b, sola ad ortum, multos adsciuuit progressu de nouo comites, cum quibus pedetentim consumpta, in Faculas abiuit, nec occasum omnino consecuta est. Eclipticam transiuit, & in eadem interiit. Maculæ, a, parallela incessit.

Macularum c, prodigiosa ex umbris dilatio & multiplicatio, & in umbras reuersio.

Tertio, Macula, c, e tribus quattuorue composita, sub ingressum vna, sed crassa & densa comparuit, ducens post se agmen aliarum Macularum australium, itemque umbrarum, nec non Facularum eximiarum. Initium illius ad horizontem die 3. habere non licuit ob æris turbulentiam; disparentibus faculis exsinuauit sese mirum in modum in Maculas co-

II.


1 piofas, quæ sensim mole & densitate deficientes in faculas & umbras denuo abiuerunt. Die 15. vesperi horizontem ferè attigit, à quo ita prope abfuit, Vt interiectum spatium gracilitate & tenuitate filum aranæ vix æquaret, aciemque oculorum quasi eluderet: cum tamen ipsa Macula satis crassiuscula adhuc incederet. Duratio eius dies 13. quodammodo attigisse omnibus computatis videtur sicut etiam Macula, d, quæ Maculæ, c, fere concurrebat, supra horizontem ab ipsdem non multum abfuisse: id quod notandum, & in hoc Phænomeno non adeo frequens est. Porro sicut c, cum Maculis, umbris & faculis Solem subintrauit, ita cum maiore eorum comitatu, exiuit, ipsa semper prægressa, reliqua ad latera vel à tergo trahens.

20 Quarto, Macula, d, cum faculis ingressa, cum ipsdem egressa est, ad Maculam c sensim appropinquauit. Cætera satis patent ex iconismi nuda inspectione.

25 Quinto, Cursus Maculæ c; similis est cursui Maculæ, a, ante annum, descripto in Imaginem Observationum secundæ diebus ipsdem, situ quasi eodem, mora durationis eadem. Consule figuram, confer itinerum vestigia, & assentieris 30 veritati.

Macula Faculas vel potius ne trahant, vel ad latera.

Itinerum ad se conuergentia.



LV, Imago Obser:
uationu;

M.DC.XXVI.
In Collegio Romano Societatis

2^a. Ianuarij,



Cursus Macularum à 1^o. Ianuarij, ad 15. eiusdem
similis^{ammi} præteriti, 1625.

A, Oriens, B, Occidens; AB, Ecliptica.

IANVARII.

D. H. O. El. † D. H. O. El.

1. m. $9\frac{3}{8}$ — 16. 20.	9. u. $3\frac{1}{8}$ — 14. 30.
2. m. $11\frac{1}{8}$ — 24. 25.	10. u. $1\frac{3}{4}$ — 22. 30.
2. u. — 18. 30.	11. m. $9\frac{3}{8}$ — 15. 50.
4. m. 10. — 20. 0.	12. u. — 11. 0.
5. m. $9\frac{5}{8}$ — 18. 20.	13. m. 9. — 14. 40.
6. m. $10\frac{1}{2}$ — 22. 30.	13. u. 3. — 15. 0.
7. m. $9\frac{1}{2}$ — 17. 45.	14. m. $9\frac{1}{4}$ — 15. 0.
8. u. 3. — 15. 0.	15. m. $9\frac{1}{2}$ — 18. 40.
	15. u. $3\frac{1}{2}$ — 12. 0.

Notæ in LVI. Observationum Imaginem, tertiam Ianuarij à die 17. ad 29. eiusdem.



I. RIMO. Faculae a, boreales ex inferiore hemisphærio, die 17 prælucentes Maculis subsecutis, die 18. totas sese stiterunt, & quia post diē 20.

pluuiæ obseruandi vias præstruxerunt, ex illis, utique absumptis, posterioribus diebus residui nil penitus est animaduersū, segmentum tamen inchoati cursus, reliquis correspondet. Nota tametsi ab horizonte præscinderentur hæ faculae, tamē fuerint valde luculentæ.

Secundò. Maculae, b, australes cum faculis & vmbris exortæ, die 18. in geminas sese sequentibus expanderunt, & sub occasum nonnihil contraxerunt, resumptis Faculis pone sequentibus.

Tertiò. Eodem modo Maculae, c, boreales, ob tempestatem ingressu carent, in medio variè sese commutarunt, ad extremum, cum vmbris & faculis occubuerunt; ultra 6. dies, in dimidium itineris vix infumentes. Ex eo autem quod post diem 25. ita notabiliter diminutæ sunt, & cir-

II.

ca exitum in tenues Maculas & illustres faculas abiuerunt, colligo, in Sole etiam, triduo illo turbulento enatas esse, nam à die 18. ad 20. non extitisse certum est; quæ autem cito pereunt, etiam cito nascuntur, & vice versa, prout experientia hæctenus stata in hoc Phœnomeno edocet. Aduertendus etiam magnus illarum ab inuicem recessus, cum enim die 24. in medio cursus sui consisterent, debebant illic extremæ magis utrique inter se distare, quam die 25. & 26. quando à centro C, remotæ in declinuius ferebantur, cuius tamen contrarium euenit. Et ex hoc ipso argumentum euidentius sumitur pro illarum in Sole natiuitate, semper enim, in ortu physico sibi vicinæ sunt, & postea primum diuiduntur à se mutuo.

Quartò. Cursibus his inuenies haud absimiles in Imagine III. & IV. anni præteriti.

Quos omnes inflexos ad eandem Solis partem australem, aspicias, etiam si integri non sint; ascendente nimirum polo australi, ideoq. curuitate itinerum & inclinatione chordarum ad Eclipticam augescentibus.

Facula ab horizonte, secta, extra Solem nil penitus ostendunt.

Macularum à se mutuus recessus, motu uniformi improprie natus.




LVI, Imago
Observationis.

M.DC.XXVI.
In Collegio Romano Societatis

3^{ia} Ianuarij.



Cursus Macularum, à 17. Ianuarij, ad 29. eiusdem,
similis aliis aliorum annorum.



Notæ in L VII. Observationum Imaginem, Ianuarij quartam, Februarij primam, à die 20. Ianuarii ad 2. Februarij.

I.



RIMO, Macula a, vna continua in ingressu postea die 24. & deinceps, in plures diuisa comparuit; quarum amissis & consumptis quod-

ammodo boreis, exiuit adhuc retenta, austrina, & in exitu insignes Faculas, præsertim borealium Macularum loco traxit.

Secundò, Cursus huius Maculae adæquat dies minimum tridecim; similis & æqualis illi, qui accidit anno præterito, mense eodem, designatus Imagine octaua, Macula & cursu C, qui licet diebus aliquot serius euenerit, huic tamen valde similis, nec mora subsolari inæqualis existit.

Macula in exitu horizontem strinxit, illiusque extra Solem nil penitus comparuit.

Tertiò, Macula, b, ex turbulento cælo capite cursus priuata, ab itinere Maculae a, sensim deflexit in austrum, vt patet. Exitus horizontalis cæli iniuria spectari non potuit. Ipsa interim processu creuit, & nucleum variavit, proque varietate nuclei, etiam circumiectum vaporem, vel quidquid id est, similiter effigauit, prout videre est, die 24. 29. &

II.

omnibus alijs, nam nucleus rotundus dedit massam Maculae rotundam, oblongus oblongam, angularis angularem; id quod etiam in alijs semper & vbique quasi euenit, neque notandum est 29. & 30. nouam acquisiuit Maculam, circa exitum factam Faculam.

Quartò, Maculae, c, austrinae circa exitum enatae, antea non erant, iter tamen commune inceserunt.


Quintò, Eodem modo Macula, d, borealis peregit ab ingressu simile alijs iter, vna cum Faculis puris sequentibus.

Sextò, Si huius Imaginis itinera contuleris, cum ijs quæ medio anno ab hoc distant erunt ea inter se proportionalia, similia, & si super eosdem parallelos fuerint decursa, arcibus & temporibus, vt plurimum, æqualia. vide Iulium anni præteriti, à die 12. vsque ad 8. Augusti, in Imaginibus duabus, nam vnâ hisce diebus præcisè correspondentem non habeo.

Septimò, Reuoca etiam in memoriam quod quo magis arcuatur cursus ad Eclipticam & centrum C conuexus, hoc semper amplior Macularum supra horizontem mora insumitur, cæteris paribus, considera observationes, & moras extrema & cum alijs confer, semperque veritatem hanc cæteris paribus inuenies.

Secundum figuram nuclei, conformatur ordinariè Macula.

Maior arcuum itinerariorum. curuatura maiorem arguit cæteris paribus moram.



LVII, Imago
Observationis

M, DC, XXVI.
In Collegio Romano Societatis

4, Ianuarij,
1, Febr.




Cursus Macularum, à 20, Ianuarij, ad 2, Febr, similis
illi, qui fuit ante annum.

A, Oriens,

AB, Ecliptica,

B, Occidens,



IANVARII

D — H — O, E, I.


20. u. $2\frac{3}{4}$ — 18. 10.
24. m. 9 — 16. 0.
25. m. $9\frac{1}{8}$ — 16. 20.
26. m. $9\frac{1}{2}$ — 18. 50.
29. m. $8\frac{3}{8}$ — 15. 15.
30. u. $2\frac{1}{2}$ — 21. 5.
31. u. $3\frac{1}{4}$ — 16. 40.

FEBRVARII.

D — H — O, E, I.

1. m. $8\frac{1}{4}$ — 12. 0.
2. m. 9 — 20. 20.

Notæ in Observationum Imaginem LVIII. Februarii secundam, à die 2. ad 14. eiusdem.



I.

PRIMO. Maculae tres australes, a, die 2. horizontem prætergressæ, sitibus diuersis, mediam continuerunt faculam valde fulgentem; postrema Macularum horizontem quasi rasit. Die 3. vespere, eadem Maculae in Solem promotæ auctiores & numero, & mole, & interuallis apparuerunt: Nam septem conspectæ sunt Maculae pleræque nucleis facundæ, distantia verò extremarum, in longitudinē plus quàm triplo, in latitudinem dimidio sunt ampliatae. Die 5. fuere Maculae 10. quarum prima occidentalissima, è duabus in vnam concreuit, nucleo & circumstante vapore secundum omnem dimensionem aucta, postrema orientalissima, spatio quidem adhuc diffusa, sed admodum rara fuit, quemadmodum & intermediae tenues apparuerunt. Distantia extremarum secundum longitudinem est ad distantiam diei 2. quasi sextupla. Latitudo nil variauit. Die 6. orientalissima euauit, mediae in pauciores coaluerunt, occidentalissima figuram aliquantulum mutauit, discessio inter illas secundum longitudinem adhuc multum creuit. Die 7. occidentalissima suo tenore incescit, & illam immediate sequens decreuit, reliquæ duæ sequentes attenuatae sunt corpore, sed spatio à prima amplius retrusæ. à die 7. ad 10. turbulentum cælum abstulit obseruandi potestatem. Die 10. stiterunt se duæ occidentalissimæ disiunctæ nucleis, coniunctæ corporibus, secutæ sunt quattuor, tenues, è nuperis reliquæ, quarum à prima distantia, æquantur distantia diei 6. quæ est inter primam & duas penultimas orientales. Die 11. & 12. solæ duæ occidentalissimæ inter se magis adunatae & iam gracilescentes apparuerunt. Die 13. & 14. apparuit Macula, a, cum faculis & vmbis post se. Vmbra autem diei 13. media & densior, sunt verosimiliter reliquæ Macularum diei 10.

Macula in longum & latum dilatata.

Macula ante disiuncta coniunguntur.

Macula in Faculas & vmbas conuersa.

II.

1 occidentalissimam sequentium. Vmbra autem & faculae postremae rariores, sunt vestigia Macularum orientalium à die 6. & 7. non comparentium. Vnde certissimum est, postremarum in occasu distantiam apparentem, die 14. numquam tam arctam comparuisse, quam fuerat in ortu die 2. cum tamen Macula, a, die decimo quarto in horizontem ipsum incurrerit. Cursus hic Maculae 1. fuit dierum circiter tredecim, quemadmodum & cursus Maculae, a, anni præteriti in Imagine x1. descripti, à die 1. ad 13. Februarii: cui non multum absimilis fuit, licet hic ab Ecliptica magis declinauerit. Cursus autem Maculae postremae, si durauisset, videbatur futurus diuturnior, vti ratiocinanti manifestum euadet, quia discessionem tardius aliquanto sequebatur.

20 Secundò. Macula, b, die 2. exorta, die 14. occubuit, die 5. & 6. supernè paruulam acquisiuit, in statu veluti consistentia incescit, nucleo non adeo denso prægnans, in exitu faculis stipata resplenduit, sicut etiam die 5. Maculae, a, occidentalissimæ parallela incescit, cuius etiam sub Sole moram fere adæquasse videtur. (id quod rarum est) In imagine Obseruantium x11. inuenies huic Maculae b, cursum similem Faculae, a, confer schemata, & videbis congruentiam.

30 Tertiò. Maculae, c, valde raræ & tenues, die 6. in Sole prognatae, die 7. ad duas redactæ, die 10. denuo quodammodo reuixerunt, numero septem, similiter & 11. sed valde paruæ apparuerunt, distantijs longitudinum maioribus, quàm in medio sub illarum exortum physicum apparuissent. Cursus sui fragmentum alijs simile & proportionale exhibuerunt. Maculam borealissimam omnium quidem minimam, & puncti instar, sed maxime nigram & conspicabilem secum deuexerunt, prout post diei characterem numeralem datur cernere.

40 Quartò. Directio itinerum ex austro in boream, curuitas arcuum, & inclinatio chordarum ad Eclipticam crescit, polus austrinus ascendit ex occasu versus orientem.

Cursus dierum 3.

Discessus macularum maior quam ratio motus æquabilis patiat.

IMAGO SOLIS LVIII.

LVIII, Imago
Observationu.

M. DC. XXVI
In Collegio Romano Societatis

2^a Februarij.



AB, Ecliptica: A Oriens Macularum, B Occidens, Z Zenith, N Nadir.

Cursus Macularum, à secundo Februarij, ad 14 eiusdem,
Cursui prioris anni similis, et duratione aqualis ~

Februarij

D. — H. — O. Ele.

2	— 9. m. —	20. 20.
3	— . u. —	21. 10.
5	— $8\frac{3}{8}$ m. —	13. 35.
6	— $9\frac{1}{8}$ m. —	19. 50.
7	— $8\frac{1}{2}$ m. —	15. 0.

D. — H. — O. Ele.

10	— $8\frac{7}{8}$ m. —	18. 30.
11	— . m. —	24. 30.
12	— . m. —	31. 5.
13	— $10\frac{5}{8}$ m. —	31. 0.
14	— . m. —	13. 15.

N

Notæ in LIX. Obseruationum Imaginem, tertiam Februarii, à die 12. ad 27. eiusdem.



PRIMO, Hæc Imago multorum cursum ferax, offert inprimis, a, & b, duos vnus manipuli cursus, quorum initium animadu-

sum est die 12. vesperi in meris faculis & vmbis. Die 13. prodijt Macula, a, cum sequacibus vmbis & faculis, quæ tamen ob loci angustiam hic omiffæ sunt. Die 14. prodierunt plures Maculæ, b, & faculæ sequentes Maculam, a, etiam sunt notatæ. quod itidem factum vides die 15. qui Maculas, b, occidentaliores plures & maiores exhibet. Nam die 14. apparuerunt sub paruo & tenui manipulo qui in quattuor sese Maculas ad omnem loci differentiam dilatauit. Die 16. Maculæ a, valde defecerunt, disparentibus Faculis. at verò, b, è contrario in vnâ ferme continuâ coiuerunt augescendo massam. Die 17. Macula, a, visa est vnica; b, verò, inter duas satis amplas at tenues, nouarum sementem ostendit. Die 18. a, adhuc vnica, & b, numero & mole auxerunt. Die 19. a, rarefciendo deficit, b, verò occidentalissimæ coadunari incipiunt, orientalissimæ in vnâ massam æquabilem dilatantur. Die 20. de Macula a, nullum vestigium, at verò, b, rarefciunt quidem, sed tamen ad se mutuo accedunt. Die 21. priores, b, valde gracilefciunt, posteriores euanescent raritate. Die 22. mane solæ occidentalissimæ Macularum, b, cum tenui facula, reliquarum loco comparuerunt, vesperi etiam hæc non amplius, sed sola Macula tenuis visa est. Cursus harum Macularum, a, & b, valde similes sunt manipulo Macularum b, & c, in Imagine xii. consignato ante annum; nam Maculæ b, hic respondent Maculis, b, illic; & Maculæ, a, hic Maculis, c, illic; maximeque intercedit similitudo loci, temporis, curuitatis & dilatationis. Consule & compara figuras vtrinque.

Secundò. Macula, c, borealis cum faculis, d, puris borealibus exorta, die 15. simplex apparuit, sed nucleis discretis tribus, in totidem postea & plures maculas abiuit: die 16. paulatim in plures didu-

II.

1. Ita est prælucentibus faculis, d, borealibus, & alijs non minus illustribus pone-
atque ad latera comitantibus. Die 17. extinctis Faculis Maculæ nigros & præ-
cisos duos gestauerunt nucleos, alibique
illorum indicia passim sese ostentarunt.

Die 18. Superior Macula borealis nō comparuit, sed & australes densitate defecerunt.

10. Die 19. vestigium boreæ cōparuit; australes amplius attenuatæ sunt. ipsæ quoque Maculæ nucleosæ imminui incipiunt.

Die 20. nulla amplius Comitum borealium adfuit, australes duæ, reliquæ videntur decrefcere. Die 21. australes versus occasum nouæ enatæ, & Maculæ ipsæ mirabiliter contortæ, atque in tres aut plures nucleos euolutæ sunt, spatio albo intermicante.

20. Die 22. mane & vesperi, Maculæ australes mole & numero creuerunt, ipsæ verò principales sensim deficiunt mole, & densitate. Die 24. (23. pluuius erat) Macula c, iterum in vnâ & vnum nucleum collecta fuit, australibus comitibus nonnihil attenuatis, & cōtractis.

25. Die 25. & 26. Macula vnica, post se & ad latera in boream & austrum mirificas vmbas, & luculentissimas Faculas traxit. Cursum huius Maculæ ad dies 13. peruenisse, non est credibile. Multum affinitatis habet cum cursu Maculæ, f, Imagine xii. exposito.

35. Tertiò. Macula, e, austrina cum facula & vmbra horizontem insedit die 17. vesperino, ad medium peruenit 24. die 25. attenuata in vmbas & faculas non comparuit posthac, eius dimidijs cursus, à diebus septem non multum abfuit itaque totus ad dies ferè 14. peruenisset.

40. Quartò. Macula, f, australis die 18. comparuit, et versus centrum aliquantum creuit, sed mox die 24. minor effecta, trium Macularum formam retulit, quam etiam die 25. sed minor retinuit, die 26. vnica sed minor, & 27. minima comparuit, post hæc sine vllò sui vestigio fuit.

50. Curuitas horum itinerum augescit, & paulatim ad æquilibrium vernum propinquat, inclinatio chordarum crescit; polus australis ascendit.

Variationes
Macularum
c, spectabiles.

Facula in
medio cor-
pore macu-
la.

Vmbra, &
Facula ple-
rumque ad
latera decli-
nant aut suc-
cedunt post
Maculas.
Cursus die-
rum fere 13.

Cursus die-
rum fore 14.

Facula ex-
tinguuntur
antequam
occafum cō-
sequantur.

I MAGOSOLIS LIX.

301

LIX, Imago

M.DC.XXVI.

3. Februarij.

Obferuationu.

In Collegio Romano Societatis



Curfus Macularum à 12. Februarij, ad 27. eiusdem.
similis anni præcedentis et aliorum.


A.B. Ecliptica,

B. Occidens.

A. Oriens.

FEBRVARI.

D. H. O. E. D. H. O. E. I.



Notæ in L X. Observationum Imaginem, quartam Februarij, primam Martij, à die 24. Februarii ad 15. Martii.

I.



RIMO, Maculæ a, boreales, primum conspectæ sunt die 24. vesperti, deinde 25. mane cum inclusa facula, vigesimo deinde sexto, sola.

prior Macula comparuit, quæ sese subduxit per sequentes continuos dies septem; tandem die 5. Martij vespertino se denuo visendas præbuerunt vmbre tres cum faculis, quæ die 7. vesperti h. 3 $\frac{1}{2}$, sub Solis elevatione gr. 27. minutorum 30. (id quod in Tabella temporis per incuriam omissum fuit) in Maculas raras digestæ, præeuntibus faculis ad horizontem appropinquauerunt. An autem hæ fuerint eadem Maculæ, quæ die 24. sub ortum comparuerunt, non affirmo pro comperto, per tempus & locum atque situm possunt esse; per Phænomeni inconstantiam, possunt esse nouæ, prioribus funditus extinctis. relinquo hoc spectatoris arbitrio. Nam exempla in vtrumque non desunt.

Secundò, Macula, b, borea, horizontem infedit die 25. vespertina, cum facula vmbrosa, deinde die 27. adhuc vna & rara apparuit; per duos interlapsos dies, 28. Februarij & 1. Martij, pluuios nil est obseruatum; tandem 2. Martij quattuor; tertia tres; quarta duæ; & quinta die vna iterum visa est & deficient Macula, quæ die 7. in vmbas medijs duabus lucidissimis faculis abiuit. Incessus illius æquilibrio proximus fuisse videtur. Respondet cursui Maculæ, b, in Imagine XIII. consignato. Omnibus computatis certum est hanc Maculam dies 12. non superasse, an attigerit dubium.

Tertiò, Maculæ, c, itidem boreales die 26. mane horizonti proximæ; 27. Febr. & 2. Martij, non nisi vnicam exhibuerunt; sed die 3. in tres, 4. in quattuor excreuerunt; quæ rursus die 5. in tres raras, & die 6. in duas raras & paruas redactæ, tandem 7. in vmbas latas, & faculas lu-

II.

cidas conuersæ sunt. Cursus illarum ab æquilibrio aliquantulum abfuisse videtur neque diem 12. multum superasse. Nam ex penuria durationis physicæ, totum ex obseruatis cursum enunciare non licuit.

Quartò, Maculæ d, austrinæ, die 2. primum conspectæ, traxerunt post se immediatas luculentas faculas, quas stipabant vmbre, & has rursus faculæ fulgentes, cum vmbis ad horizontem ferè protensis. quibus inhæsit versus austrum Macula h, tenuis adhuc, & vmbre quam Maculæ similior. die 3. Maculæ, d, in 4. sese exsinuarunt, faculæ autem & vmbre multo maximè sunt dilatatæ, in omnem loci differentiam, quemadmodum & Maculæ nouiter ortæ, quasi semper solent. dico quasi; quia dubito an aliquando aliter eueniret: certè exemplum non occurrit. Die 4. Maculæ d, fuere quinque. Die 5, accessit vmbra cum facula australi. Die 6. Maculæ adhuc 5. sed in longum protensæ. Die 7. duæ tantum visæ cælo vapido. Die 8. quinque iterum imo quasi sex, se obtulerunt, coalescentibus borealibus in vnam. Die 9. tres tantum, decimo iterum 5. sunt visæ, & reddidit sese Macula h, cum foenore nam cum socijs 6. & Facula egregia comparuit. Die 11. Maculæ d, partim coierunt in vmbas dilatatæ, partim in faculas candidas abiuerunt, sequentibus interim Maculis, h, sex. Die 12. Maculæ, d, eodem modo cum faculis, sed figura graciliore processerunt, sequentibus Maculis, h, quattuor, faculas insignes claudentibus. Die 13. vespertino, Maculæ, d, cum faculis horis in stiterunt, sequentibus vmbis, faculis & Maculis, h. Considera diligenter quomodo Maculæ, h, sese in latas vmbas diffuderunt, id quod frequenter faciunt vel patiuntur Maculæ rarescentes, & ad faculas vel interitum tendentes. Cursus Maculæ, d, si recti computi ratio ineatur durauit ab horizonte ad horizontem, ferè dies quattuordecim, nam interuallo orientali inter Maculam & limbū, debentur minimum dies

Cursus Macula b, dies 12. non superauit.

Maculæ c, in vmbas & Faculas conuersio.

Macula ad interitum tendentes orientali in latas vmbas rarescunt.

Cursus dierum ferè quattuordecim.

LX, IMAGO

Obferuationu.

M.DC.XXVI.

In Collegio Romano Societatis

4^{ta} Februarij.

1^a Martij.



Cursus Macularum à 24. Febr. ad 15. Martij.
similis cursui anni præteriti et alioru.



Februarii.

Martii.

D—H—O.EI.

D—H—O.EI.

D—H—O.EI.

24. u. — 18. 0.
25. m. 8 $\frac{1}{2}$ 20. 25.
25. u. 3 $\frac{5}{8}$ 18. 0.
26. m. 8 $\frac{7}{8}$ 19. 10.
27. m. — 36. 30.

2. m. 9. — 26. 5.
3. m. 10 $\frac{1}{12}$ 35. 0.
4. u. 3 $\frac{1}{4}$ 25. 30.
5. m. 8 $\frac{1}{8}$ 19. 10.
5. u. 3 $\frac{3}{8}$ 25. 0.
6. m. — 21. 45.
7. m. 8 $\frac{1}{4}$ 21. 0.
8. m. 8 $\frac{7}{8}$ 27. 5.
9. m. — 28. 30.

10. m. 7 $\frac{7}{8}$ 18. 36.
11. m. 8 $\frac{1}{8}$ 21. 20.
12. u. 5. — 9. 50.
13. u. 3 $\frac{1}{3}$ 28. 40.
15. u. 3 $\frac{7}{8}$ 22. 50.

I.

dies duo cum dimidio, prout euident est ex Maculae g, ad diem 5. distantia: distantiae Maculae d, æquali. igitur si duos dies cum dimidio adiiciamus ad dies 11. & 6. horas, non multum aberimus à diebus 14. quos Maculam, h, compleuisse nullus ambigo. Cursus huius Maculae, d, & situ & duratione atque æquilibrio valde similis est cursui Maculae a, an. 1625. Imagine XIII. exposito, & vestigio itinerario Maculae itidem, a, anni 1627. inferioris suo loco explicando. Vnde huius Maculae apparens cursus, superauit cursus Macularum, b, & c, plus quam integro die.

Cursus Maculae d, versatur circa æquilibriū vernalis: superat cursus boreales plus quam die.

Maculae in faculas & umbras conuertuntur.

Quintò, Maculae e, f, g, vnius manipuli die tertio exorti, sese mirum in modum dilatauerunt, & die 5. intra Faculas illustres inceserunt; post medium & numero, & mole decreuerunt, tandemque in Faculas & umbras ex potiori degenerarunt, cum quibus ad occasum vsque peruenerunt. Cæterum nota 1. Maculam, f, Maculae, g, in ortu viciniorē apparuisse (id quod incisor non satis expressit) quàm Maculae, e; contrarium

II.

1 fuit in occasu. 2. distantiam Macularum, e, g, in occasu maiorem esse quam in ortu. 3. Cursum Maculae, g, fuisse ferme dierum 14. 4. itinera huius manipuli, 5 esse quodammodo in æquilibrio. 5. In Imagine XIV. aliquid simile reperiri, ad cursum, e.

Manipulus Macularū e, f, g, in æquilibrio verno versatus est.

Sextò, Habes in hoc schemate adnotatas etiam umbras & faculas, die 3. austrinas, a, boreas verò, b, & c; item die octauo, d, & e, quas exempli causa & tanquā notabiliores adduco: quia huiusmodi in Sole toto Phases sunt quotidianæ & abundantia summa.

Umbra, & facula notabiliores in partibus polaribus.

15 Septimò, Summa in æquilibrio arcuum curuitas, chordarum nulla ad Eclipticam inclinatio, sed omnes vel coincidunt vel æquidistant: polus austrinus culminat, boreus summè depressus est; 20 & hic incipit ascendere in hemisphærio latente, ille in patente descendere; & hic transit in plagam orientalem, iste in occidentalem; Macularumque directio, & Eclipticæ à chordis sectio, sit ex borea 25 in austrum.

Æquilibriū vernalis affectio.



LX, IMAGO
Obferuationy.

M.DC.XXVI.

In Collegio Romano Societatis

4^{ta} Februarij.

1^a Martij.



Cursus Macularum à 24. Febr. ad 15. Martij.
similis cursui anni præteriti et aliorum.



Februarii.

Martij.

D-H-O.EI.

D-H-O.EI.

D-H-O.EI.

24. u. — 18. 0.
25. m. 8 $\frac{1}{2}$ 20. 25.
25. u. 3 $\frac{5}{8}$ 18. 0.
26. m. 8 $\frac{7}{8}$ 19. 10.
27. m. — 36. 30.

2. m. 9. — 26. 5.
3. m. 10 $\frac{1}{12}$ 35. 0.
4. u. 3 $\frac{1}{4}$ 25. 30.
5. m. 8 $\frac{1}{8}$ 19. 10.
5. u. 3 $\frac{3}{8}$ 25. 0.
6. m. — 21. 45.
7. m. 8 $\frac{1}{4}$ 21. 0.
8. m. 8 $\frac{7}{8}$ 27. 5.
9. m. — 28. 30.

10. m. 7 $\frac{7}{8}$ 18. 30.
11. m. 8 $\frac{1}{8}$ 21. 20.
12. u. 5. — 9. 50.
13. u. 3 $\frac{1}{2}$ 28. 40.
15. u. 3 $\frac{7}{8}$ 22. 50.

Notæ in LXI. Observationum Imaginem, Martij secundam, à die 10. ad 22. eiusdem.



I.

AE C Macula, a, ab Ecliptica & paralelo Maximo non adeo multum abfuit, ideoque ex cursu illius multa haberi possunt, peculiariter notanda.

Nucleorum generatio & augmentatio observata describitur.

Primò, Exorta est ventricosa seu potius capitata parte superiore in boream, caudata inferiore versus austrum, causâ ventris etiâ tunc indicavit, nucleus haud obscurè indicatus, qui die 11. manifestè sese prodidit, in quinq. distinctos nucleos, sed parvulos discretus, qui rursus die 12. in quattuor collecti apparuerunt; sequenti verò 13. die, orientior auctus, & occidentales parvi quidem sed numerosiores apparuerunt, qui rursus die 15. coaluisse, & in tres redacti videntur, austrinum & arctoum maiores & longiores, medium autem valde paruum, qui tamen eodem die vesperi quattuor fuerunt prout in schemate adnotatum habes ad, a, & u, diei 15. id est, ad observationem vesperinam diei decimi quinti. die verò 16. tam mane quam vesperi, eosdem nucleos ex coalitione auctos, sed numero diminutos vides, erant quippe tres, quem numerum nunquam amplius excefferunt. Nam die 17. tres quidem nuclei & nigerrimi, sed coniuncti apparuerunt, neque deinde amplius per totum Solem disiuncti fuerunt, sed magis semper adunati; prout per singulos dies ad 22. usque in diagrammate patet. Atque ex isto quidem nucleorum progressu, & incremento apparente saepe etiam alias à me observato, & in hisce iconismis allato, manifestum est, in generatione, atque augmentatione nucleorum, à natura huius Phænomeni eandem servari rationem, quæ servatur in ipsa Macularum productione; quæ semper è tenuibus, minutis, & plerumque dissipatis umbris in unum coalescunt, & deinde augescunt in omnem loci differentiam. Quemadmodum hosce nucleos creuisse quisque non coecus advertit. Nam si omnes hi nuclei singulis diebus, à 10. ad 15. in-

Nucleorum & Macularum eadem prorsus in nascendo & augescendo ratio, qui crescunt & deficiunt ad omnem loci differentiam ut Macula.

II.

spiciantur, tametsi plures fuerint numero quam die 16. & sequentibus, tamen mole illos non æquant. Die autem 15. vesperi, 16. 17. & 18. mane, itemq. 21. vesperi, solas nucleorum genuinas figuras, & magnitudines adduxi: nam 19. vesperinus, punctum tantum dat, qui nuclei centrum seu locus est.

Vbicunque verò, inter hosce nucleos album spatium repereris, scias id non casu incisoris sed studio observatoris esse relictum, eoque fulgentissimam faculam indicari. Hæc de nucleis huius Maculæ.

Facula intra Nucleos.

Secundò, Nunc ad circumiectam nucleo nubem, seu ipsam Maculæ figuram veniamus. videbimus ipsam secundum nucleorum situm & figuram conformari nam à die 10. ad 15. ex austro in boream procerior fuit, ut & nuclei: quamprimum verò nuclei à die 16. ad 19. trigoni effecti sunt, idem schema induit Macula tota. Die verò 21. & 22. oblonga iterum evasit, prout in ortu, quod & Nuclei sese simili modo ad aspectum attenuauerint. Et hæc mutua figurarum similitudo, Nuclei cum Vapore, & huius cum Nucleo, non tantum in hac, sed cum omnibus alijs Maculis foecundis euenire solet.

Corpus Maculae imitatur figuram Nuclei.

Tertiò, De comitatu huius Maculæ hæc accipe. fuit is umbrarum, facularum, & Macularum. Umbræ in ortu eam valauerunt, sicut & luculentissimæ Faculæ, quemadmodum ex die 10. & 11. perspicis. Cauda autem illa umbræ in austrum acuminata die 10. fuit Macula vera, sed rara, dieque 11. ampliata visa est, & tandem progressu in plures Maculas tenues abiisse videtur; quemadmodum ex umbris quoque borealibus & alijs, plures sine dubio Maculæ eruperunt, quas pro libito contemplari poteris, die 13. 15. 16. 17. 18. & 19. nam die 21. & 22. iterum in umbras & Faculas multas sine controuersia transmutatæ sunt; quia Macula inter umbras & faculas horizontem occiduum adiuit, & exiuit. Nimbus autem Maculam præcingens, qualis die 12. & 15. per ambitum punctis insignem notatus est, non illis tantum diebus, sed

Comitatus huius Maculae in Umbris, Faculis, & Nucleis describitur.

Umbræ in Maculas, et hæc rursus in Umbras mutantur.

Nimbus, seu Halo, sive Area Maculam circumstans.

à 12.

LXI. Imago Ob-

M.DC.XXVI.

2^a Martij.

servationu.

In Collegio Romano Societatis




Cursus Maculae a, a die 10. ad 22. Martij. similis aliis an-
norum prateritoru et sequentium, tempore eodem.

A. Oriens.

AB. Ecliptica.

B. Occidens.



MARTII.

D-H-O-EI.

D-H-O-EI.

10. m.	$7\frac{7}{8}$	—	18.	30.
11. m.	$8\frac{1}{8}$	—	21.	20.
12. u.	$2\frac{5}{8}$	—	31.	45.
13. u.	$3\frac{1}{8}$	—	28.	40.
15. m.	$8\frac{1}{8}$	—	21.	20.
15. u.	$3\frac{7}{8}$	—	22.	50.
16. m.	$8\frac{3}{8}$	—	25.	50.
16. u.	—	—	11.	10.
17. m.	$7\frac{2}{8}$	—	18.	30.
17. u.	$4\frac{1}{4}$	—	21.	0.

18. m.	$8\frac{1}{8}$	—	24.	0.
18. u.	$4\frac{7}{8}$	—	16.	0.
19. m.	—	—	29.	30.
19. u.	—	—	9.	5.
21. m.	—	—	30.	0.
21. u.	$4\frac{3}{8}$	—	19.	10.
22. m.	$9\frac{1}{2}$	—	34.	0.
22. u.	$2\frac{1}{2}$	—	37.	0.
22. u.	$4\frac{5}{8}$	—	17.	0.

22. u. h. $2\frac{1}{2}$

22. u. h. $4\frac{5}{8}$

I.

à 12. ad 19. vsque notabilis fuit; exempli
verò caussa diebus illis notauī, quo a-
liud nil, quam extraordinarium quendam
varium fulgorem Maculae circumfusum
innuo: qui in magnis, aut densis Macu-
lis ferè semper contingit.

Quartò, Considerandum est iter huius
Maculae, & habitudo itineris ad Eclipti-

II.

cam; quomodo videlicet incessus flexu-
ra non amplius sit in æquilibrio, sed pars
occidentalis præponderet, magisque re-
cedat ab Ecliptica, Maculae cursus in oc-
casu quam in ortu. Vt videre est in sche-
mate. Deinde quomodo hæc eadem
Macula Eclipticam insederit in ortu die
12. & omnino transierit 13. 15. & 16.

*Itineris cur-
uitas & fi-
tus ad Eclip-
ticam descri-
bitur.*

I.

iterumque in eandem reciderit die 17. die verò 18. & sequentibus omnino deferuerit: & sic factum est, vt hæc Macula ex austrina borealis, & ex arctica rursus australis euaserit: & cursus ipsius aliqua segmenta ad Eclipticam fuerint conuexa quale est orientale 10. 12. & occidentale 18. 22. reliquum inter hæc à die 12. ad 18. interiectum, versus eandem Eclipticam extitit concavum; vbi tamen nota stationes diei 15. esse parumper extra sua loca, nam matutina est paullo vicinior ad Eclipticam, & vespertina remotior ab eadem quam oporteret, prout quisq. statim aduertere potest.

Longa Macula in horizonte mora. Macularia in eodem, sed non extra conspectus.

Macula in horizonte versantis maior ab Ecliptica in horas digressio.

Macula occasui vicinissima habescunt, & nebulis similes fiunt.

Quintò, Notanda etiam diuturna Maculae huius ad horizontem occiduum commoratio, & ipsius intra Faculas illustres, & umbras late patentis incessus, prout offert figura lateralis in boream explicata, vbi vides quomodo Faculae totam Maculam cingentes & in oppositam hemisphaerii partem deducentes, neque scintillam quidem suae flammæ extra Solis orbitam emicare permittant: deinde quomodo hora vespertina 2. quando Macula horizontem attigit, etiam ipsæ cum eadem proportionato passu accesserint, vsque ad horam ferè 5. quemadmodum in schemate expressum vides: vnde omnibus pensatis, non est dubium hanc Maculam in horizontis contactu insumpsisse, minimum 6. horas: vbi nota (cuius ego singularissimam rationem habui) quando Macula ante prandium horizonti vicina fuit, eius ab Ecliptica recessum B, m, esse minorem, quam sit b, a, quem habuit hora 2. $\frac{1}{2}$. vespertina, & hunc ipsum esse minorem, distantia c, a, quæ fuit hora vespertina 4. $\frac{5}{8}$. quam rem cum alias sæpe etiam animaduertissem, & hæsissem, motuine Macularum, an forsitan lapsui in obseruando id esset adscribendum; deprehendi tandem certis & constantibus obseruationibus, non esse hallucinationem obseruatoris, sed veritatem motus apparentis. Porro Macula sub horam 2. $\frac{1}{2}$. longè viuacior apparuit, quam sub horam 4. $\frac{5}{8}$. hic enim floccida, debilis, sparsa & instar tenuis nebule diluta comparuit, illic autem nigra adhuc & vegeta; neq. mirum; maiorem adhuc partem versus nos dirigebat, hora verò 4. potior in oppositum transmiserat. Aduerte autem distantias

II.

b, a, & c, a, in Imagine æquales reperiri, quod non phænomeno, sed incisorii imputabis; nam inæquales fuisse, secundum dicta, certissimum est.

Sextò, Cursus huius Maculae fuit æquabilis, saltem quoad sensum; nam spatia equalium temporum & similium positionum sunt æqualia. Quippe intervalum à die 13. vespertina ad 15. vespertina nam æquatur intervallo diei 16. & 18. itidem vespertini, sunt autem & situs similes, & tempora æqualia, vti ex iconismo, & notis patet: eodem modo reliqua intervalla orientalia occidentalibus æqualia inuenientur: vnde necessarium est, dimidium itineris in oriente, tantundem sibi temporis vendicare, quantum sibi vendicat altera medietas in occasum: partesque vtrinque æquales etiam respondere temporis equalibus partibus. Quare cum statio Maculae vespertina diei 21. detur vna cum suo ad horizontem intervallo, detur etiam tempus eidem respondens quod est diei vnus & $\frac{1}{4}$. horæ; consequens est etiam intervallo orientali, quod inter horizontem & stationem Maculae die 10. intercurrit, deberi vnum diem: quia illud interuallum, est ad sensum æquale interstitio occidentali 11. 22. modo descripto. Itaque totus Maculae huius apparens cursus esset dierum 13. horarum 8. & semis plus minus. Cumque huius Maculae parallelus à maximo non magnam latitudinem habeat euidentis est paralleli maximi apparentem cursum sensibilem, non fore minoris moræ, quam dierum 13. sed maioris: quanto autem excedat, ex hisce quidem præcisè non determinatur in præsentia.

Cursus æquabilis, & spatia orientalia occidentalibus positione similia, æquantur.

Cursus Maculae huius dierum 13. horarum 8. & semis.

Cursus paralleli Maximi dierum 13. aliquot horarum.

Septimò, ex hac eadem Maculae horizontalis ab Ecliptica discessione, euidentissimum est; vestigia Macularum itineraria, non describere arcus circulares, sed vel ellipticos ad sensum, vel illis non multum dissimiles. Quid autem ex hac itineris qualitate, & Macularum diutina in horizonte mora pro vero Macularum motu & loco statuendo eruatur, patebit suo loco.

Macularia apparentia vestigia non sunt circularia, sed Elliptica, haud absimilia, quoad sensum.

NOTANDVM.

Quod autem vel huius vel sequentium mensium Maculas omnes vel earum continuatas & concatenatas obseruationes non addu-

I.
adducam; non ideo fit, quod vel Sol illis diebus à Maculis vacuus, vel ego in obseruando defes fuerim; (obseruati enim & obseruatas in magna copia habeo;) sed quia ad meum intentum prosequendum opus non est, omnia, & singula promere. Iuuat etiam aliquid nummorum in gra-

II.
rium recondere, quod suo tempore, si oporteat possim promere: iuuat alijs, aliquid spatij in hac palestra dare, in quo se exerceant, & suam artem, non verbis, sed re ostendant. Lacunas Apellis nullus impleuit. Erit fortasse qui hasce suppleat.

Multa obseruationes non adducitur, ut aljs obseruationibus eas producendi occasio praestetur.

LXI. Imago Obseruationis.

M. DC. XXVI.

2^a. Martij.

In Collegio Romano Societatis




Cursus Maculae a, à die 10, ad 22. Martij. similis alius annorum prateritorum et sequentium tempore eodem.

A. Oriens.

AB. Ecliptica.

B. Occidens.



MARTII.

D	H	O.E.	D	H	O.E.
10. m.	7 $\frac{7}{8}$	18. 30.	18. m.	8 $\frac{1}{8}$	24. 0.
11. m.	8 $\frac{1}{8}$	21. 20.	18. u.	4 $\frac{7}{12}$	16. 0.
12. u.	2 $\frac{6}{7}$	31. 45.	19. m.	—	29. 30.
13. u.	3 $\frac{1}{3}$	28. 40.	19. u.	—	9. 5.
15. m.	8 $\frac{4}{8}$	21. 20.	21. m.	—	30. 0.
15. u.	3 $\frac{7}{8}$	22. 50.	21. u.	4 $\frac{3}{8}$	19. 10.
16. m.	8 $\frac{3}{8}$	25. 50.	22. m.	9 $\frac{1}{12}$	34. 0.
16. u.	—	11. 10.	22. u.	2 $\frac{1}{2}$	37. 0.
17. m.	7 $\frac{2}{3}$	18. 30.	22. u.	4 $\frac{5}{8}$	17. 0.
17. u.	4 $\frac{1}{4}$	21. 0.			

Notæ in Observationum Imaginem, LXII.
 Aprilis primam, à die 4. ad 18 eiusdem.

I.



PRIMO, Macula a, die 4. vesperi horizontem cum facula parua sed fulgida insedit, sequenti deinde die, vti & 6. cum eadem facula versus occasum reflexa processit, & duas alias umbras b, atq. c; (quarum tamen b, Sculptoris in curia hic non expressit) cum faculis post se traxit; quibus deinde extinctis post diem 8. ipsa sola perrexit, & continuè secundum omnem dimensionem, tam in nucleo quàm circumposito corpore defecit; donec die 14. in umbras tenuissimas & debiles faculas abiuit. Cursum exegit dierum minimum tredecim: prout ex cursu, d, huius, & alijs Imaginis sequentis, nec non proximè antecedentis, satis manifestum est. A parallelo Maximo non multum abfuit.

Macula d, in utroque horizonte visa.

Secundò, Macula, d, in horizonte utroque visa est, vnde cursus ipsius apparens, satis præcisus haberi potest. In orientali horizonte primum conspecta est hora 4. $\frac{1}{4}$. vespertina diei quintæ, corpore quasi toto supra ipsum emerso; in occidentali tota fere depressa apparuit die 18. hora 2. $\frac{1}{4}$. vespertina: si igitur ipsi corpulentia ascendentis & descendentis demus horas quasi 10. aut minimum

II.

8. faciemus curriculi per Solem apparentis, dies 13. horas circiter 8. vel minimum 6. Fuit autem hæc Macula in statu suo quodammodo perfectio, nucleo & corpore rotunda, constans, & sibi ferme similis, nisi quod more aliarum extra medium versus extrema sensim, & magis magisque gracilescerat. Inuenies cursui huius Maculae, similes non Macularum, sed Facularum cursus, in Imaginibus XIX. & XX. ad litteras a, ubi est flexus similis & duratio æqualis reperietur.

Cursus dierum 13. horarum 8. circiter.

Macula rotunda.

Tertiò, Macula hæc, centro circa medium proxima incessit, Eclipticam die 7. & 10. quasi centraliter insedit, die 8. & 9. transiit in partes boreas, reliquas in Austro consumpsit. Orientalis Eclipticæ vicinior fuit quàm occidentalis; ab itinere Maculae, a, parumper deflexit in austrum, vt suum eidem non faceret parallelum.

Macula australis, deinde borealis, & rursus australis.

Quartò, Hæc Macula spatia æqualia à centro C, æqualiter quasi remota, decurrit tempore æquali, cuiusmodi sunt, orientale inter diem 8. & 10. & occidentale inter diem 13. & 15. ubi tam spatiorum quàm temporum æqualitatem reperies saltem ad sensum, id quod mihi sufficit.

Motus huius Maculae ad sensum uniformis.



LXII, Imago
Observationis.

M.DC.XXVI,
In Collegio Romano Societatis

1. Aprilis.




Cursus Macularum, à die 4. ad 18. Aprilis, similes
aliis aliorum annorum, tempore eodem.

A, Oriens.

AB, Ecliptica,

B, Occidens.



APRILIS.

D-H-O.EI. D-H-O.EI.

4. u. 4 —	27. 25.	12. u. 4 $\frac{1}{2}$	23. 0.
5. u. 4 $\frac{3}{8}$	23. 30.	13. u. 4 —	29. 0.
6. u. 4 $\frac{3}{4}$	19. 0.	14. u. 4 $\frac{5}{8}$	22. 0.
7. u. 4 $\frac{1}{12}$	27. 0.	15. m. 7 $\frac{1}{12}$	18. 30.
8. u. 4 $\frac{1}{10}$	27. 30.	16. u. 5 —	18. 30.
9. u. 4 $\frac{3}{4}$	20. 25.	17. u. 3 $\frac{3}{4}$	33. 35.
10. m. 7 $\frac{1}{2}$	22. 30.	18. u. 2 $\frac{3}{4}$	43. 30.
11. u. 3 $\frac{3}{8}$	35. 30.		

N

Notæ in Observationum Imaginem LXII.
 Aprilis secundam, à die 7. ad 19. eiusdem.



I.

RIMO, Macula
 a, die 7. mane,
 longa & ventrico-
 sa in medio, supra
 & infra in acutos
 umbrosos apices
 definebat, faculam
 præmittens, tra-

hens infernè tenuem Maculam umbræ
 similiorem, horizonti contiguam. posui
 illam ad latus boreale, vt omnia locum
 haberent tametsi in itinere recto sine alijs
 comitibus etiam est exposita.

Die 8. in plures umbras & Faculas
 maiores, quas post se traxit, ipsa au-
 gescens.

Die 9. 10. 11. videntur Maculæ po-
 steriores, priori appropinquauisse, quod
 est præter morem Phænomeni ordina-
 rium.

Die 12. & deinceps cæpere omnes im-
 minui & deficere prout ex idea patet;
 die 19. Maculam sequuta est ingens Fa-
 cula, in locum desitarum Macularum.
 confer hunc diem cum die 8. & inuenies
 magnam similitudinem. Qualem umbra-
 rum & Facularum comitatum secum
 traxerit die 18. habes ex latere.

Cursus huius Maculæ sese extendit ad
 dies 13. & amplius; & habet aliquam si-
 militudinem cum cursu Umbrarum, &
 Facularum, A, in Imaginibus XIX. &
 XX. descriptarum: quæ simili fluxu, &
 tempore æquali, sua curricula confe-
 cerunt.

Secundò, Macula, b, in Sole primum
 conspecta est die 7. vesperti; & quando die
 8. sese conspectui reddidit, aliam c, post

II.

se, cum insignibus Faculis traxit. inces-
 sus autem ambarum, fuit in eodem sensi-
 biliter parallelo; deinde (quod rarissimū
 est in hoc Phænomeno,) apparentes illa-
 rum inter se distantia, si sumantur à cen-
 tro, C, vtrimque æqualiter remotæ, in-
 ter se inuentæ sunt sensu æquales: quales
 sunt diei 8. & 19. diei 10. & 17.

Sic & interualla ambarum tempori-
 bus æqualibus, & locis ijsdem, aut à cen-
 tro æque distantibus decursa inter se ap-
 paruerunt æqualia. Die 9. 12. 13. 16. o-
 stentauerunt umbras, quæ tamen diutur-
 næ non fuerunt.

Qualem autem Facularum & Umbrarum
 comitatum deduxerint die 18. & 19.
 habes partim ex latere, partim itinere
 regio delineatum. Creuerunt ambæ ab
 ortu versus medium nucleis difformibus
 grauidæ, inde versus occasum rursus di-
 minui cæperunt: vbi vides Maculæ c,
 figuram, iuxta nucleis modulum esse at-
 temperatam.

Tertiò, Ambarum vestigium itinera-
 rium, est vestigio Maculæ, a, sensu æqui-
 distans id quod etiam rarum est in hoc
 Phænomeno. Et si interuallorum hori-
 zontalium tam in ortu, quam occasu bo-
 na ratio ineatur, inuenietur vterque per
 apparentem Solis circulum trāsitus con-
 tigisse diebus tredecim, horis octo mini-
 mum. Simile quid huic cursui inuenies
 in Imagine XX. ad litteram, b, in tem-
 pore tamen, quo Sol decursus est, vide-
 tur aliqua differentia intercedere. quod
 in hoc Phænomeno neque nouum, neque
 inusitatum est.

*Motus uni-
 formes.*

*Secundum
 Nuclei figu-
 ram effi-
 giatur Ma-
 cula.*

*Mora sub
 Sole, diert
 13. horarū
 8. aut am-
 plius.*

*Macula in
 Faculam re-
 soluta.*

*Cursus su-
 perat dies
 tredecim.*



LXIII, Imago
Observationy.

M.DC.XXVI.
In Collegio Romano Societatis

2^a Aprilis.



Curfus Macularum à die 7. ad 19. Aprilis, similes
aliis aliorum annorum.

A, Oriens.

AB, Ecliptica.

B, Occidens.



APRILIS.

D.	H.	O.	E.	D.	H.	O.	E.
7.	m.	8	$\frac{3}{8}$	31.	5.	13.	u.
7.	u.	4	$\frac{1}{2}$	27.	0.	14.	u.
8.	u.	4	$\frac{1}{12}$	27.	30.	15.	m.
9.	u.	4	$\frac{3}{4}$	20.	25.	16.	u.
10.	m.	7	$\frac{2}{3}$	24.	30.	17.	u.
11.	u.	3	$\frac{3}{8}$	35.	30.	18.	m.
12.	u.	8	$\frac{1}{2}$	23.	0.	19.	m.

N

Notæ in LXIV. Observationum Imaginem,
à 21. Maij, ad 5. Iunij.



I. AEC Observatio-
num Imago exhi-
bet multos diuer-
sarum Macula-
rum cursus in qui-
bus continentur
res sane memora-
biles. Nam.

*Macula So-
li immersæ
Faculam il-
lustrem cir-
cumualla-
bant.*

Primò, Tres Maculæ, a, b, & c, bo-
reales die vigesimo primo per modum
trianguli isoscelis physicè exortæ, obtu-
sum valde sui aspectum præbuerunt, e-
rant parvæ luce vndique superfusæ, (id,
quod alias etiam in eiusmodi Macula-
rum exortibus fere semper accidit) ea-
demque quodammodo dilutæ, denique
oculus consultus dixisset Soli immersas,
vmbri tenuibus ferè connectebantur,
totaque inclusa area, effulgebat Facula
admodum luculenta. ante diem hunc
nullum sui indicium præuium fecerunt.

Die 22. Melius quidem comparuere,
nam lucem illam dubiam magna ex par-
te excussere sed tenues admodum & æ-
quabiles erant, ampliata non tantum
ipsæ, sed in longum quoque, latumque
protenso triangulo a b c, durante sem-
per in medio Facula, sed & vmbra late-
ralis b, a, nonnihil ab, a, resilire cepit.
Triangulum vero rationem suam muta-
uit; cum enim heri longitudo a, b, esset
basis trianguli isoscelis, hodie latitudo a,
c, hoc munus suscepit & ad finem fermè
retinuit.

*Tam Macu-
la, quam
spatium
Maculari
triangulare
a, b, c, in
omnem loci
positionem
augetur.*

Die 23. triangulum amplius in om-
nem loci positionem est auctum, Macu-
læque a, b, & c, mirificentissimè & nu-
mero & mole & densitate creuerunt,
prout ex nouis nucleis satis liquet, noua
insuper Macula, f, emerfit; & vmbra late-
ralis inter, b, & a, sese omnino contraxif-
se, inque nucleum coiuisse videtur. Vice
versa vmbra lateralis b c, plurimum in-
crementi fecit. & spatium internum basi
a c, adiacens totum erat faculosum, si-
cut & situs vertici b, inter duos nucleos
insertus.

Die 24, vt ex laterali designatione pa-
ter (nam in itinere directo totum poni
non potuit) triangulum, a b c, adhuc

II.

1 creuit, sed magis secundum longitudi-
nem a, b, quam latitudinem a, c, & al-
ter nucleus boreus ad, b, resolutus appa-
ret in tenues Maculas, & totum latum
5 boreum b, c, similiter in plures tenues
Maculas distractum, & Macula c, pro-
tensa in longum & latum, & nonnihil
processisse amplius quam reliquæ baseos
Maculæ, ea verò quæ in angulo, a, ali-
quantulum imminuta, cui tamen noua
10 vmbra K, accessit. At, f, in omnem
dimensionem creuit, & ab a, multum
processit. Spatia interna basi a, c, & ver-
tici b, itemq. Maculæ f, adiacentia, facu-
lis luculentis splendida.

*Facula in-
tra Macu-
las ardentes
semper ad-
huc durans
& cum Ma-
culis equali
passu per-
gunt.*

15 Die 25. triangulum a, b, c, etiamnum
in longum & latum creuit, basis item a,
c, vehementer auxit, & iam non apparet
sub linea recta, sed curua, propter maio-
rem progressum Maculæ, c, cui hac noc-
te magna accessio facta est ex Maculis, l,
20 physicè ortis. Sed & K, tenuissima vm-
bra in longum sese extendit: & Macula,
f, figura nonnihil variata, suas fimbrias
dilatavit versus interiores Maculas, & a-
liquanto amplius recessit ab, a, in occa-
sum, vertex, b, sese nonnihil recurauit, &
25 ab omnibus secreuit, medijs Maculis in-
paruulas plures redactis. Sinus interim
albi ad basin circa f, & verticem iuxta, b,
30 adiacentes, faculoso lumine pleni. Nu-
cleus mediæ baseos in crucem formatus
niger & densus.

*Triangula
a, b, c, sic
mixtilinea
& supra om-
nem fidem
& modum,
in omnem lo-
ci differen-
tiam auge-
tur.*

Die 26. non apposui integram basin,
35 ob loci angustias, deest altera extremitas
a, australis coincidens cum vertice b,
diei hesterni. e, mire sese in occasum ex-
porrigit nucleo anteuertere. appendix l,
incredibiliter sese versus medium diffu-
dit instar tenuis & æquabilis nubeculæ.
40 Maculæ f, mediæque heri illis vicinæ, vt
plurimum euauerunt, sed & K, moritu-
rit; contra vertex, b, augefcit, alicubi ver-
sus occasum, versus ortum deficit in vm-
bram; & minutæ hesternæ pauciores sed
45 maiores sunt factæ: omnes sinus albi in-
terni faculis lucidis illustres. & totus cir-
ca ambitus colore subflauo velut aureo,
subuiridi, & albo insignis, prout ambitus
50 punctulis distinctus indicat, id quod in
alijs


*Sinus inter-
ni adhuc fa-
culenti.*

LXIV, IMAGO
Observationu.

ANNO MDCXXVI.
In Collegio Romano Societatis

Maij.
Iunij.

Cursus Macularu à 21. Maij. ad 5. Iunij,
similis aliis aliorum annorum.



I.
alijs quoq. diebus huius trianguli; & alijs figuris insignioribus aliorum dierum & temporum soléniter euenire solet, sed breuitatis ergo non signo.

Die 27. quem ad latus in boreā totum posui, nam in linea itineraria locus defuit Triangulum, a b c, adhuc quidem creuit in re; sed ad apparentiam stationem acquisiuisse, & ab equicruri defecisse vide-

II.
tu r, quia basis a c, iam non æquidistare visa est à vertice, b, sed, c, eidem vicinius accessit, eo quod Macula, c, à basi omnino sese liberauerit, progrediendo versus occasum, prout ex icone patet; interim tamen, l, & K, sese mutatis aliquantulum formis stiterunt; nam, l, contraxit suam longitudinem, K, verò in multas paruas Maculas sese dispersiuit, f, similiter sese
pp ab

I.

ab interitu reuocare, & vires pristinas colligere videtur. b, in duas coadunatur, appendices verò animam agunt. pleraque spatia alba triangulo, a b c, intercepta, faculis lucent.

Macula, c, præcurrentis, stupenda cum, l, & K, coacta ampliatio.

Alba intercapedines etiamnum faculis accensa allucent.

Nuclei versus occasum proniores & nudiiores.

Die 28. Macula, c, sibi tam l, quam medias mirabiliter variatas, quam, K, vniuit, mira societate, sed & a, Macula primigenia angularis, diuortium a reliquis in basi contentis meditari videtur, f, suum solemne tenet ablegatis superfluis comitibus; b, in vnam coit; vniēdis paulatim nucleis; & comites post se trahit fortiores. Intercapedines albæ inter, K, l, c, a, Faculis vehementer rutilant.

Die 29. inuenies totum triangulum, a b c, extra positum, quia in via itineraria, a, & K, locum non habuerunt.

Vides quomodo mediæ Maculæ sensim euanescent, & Macula, a, à reliqua basi paulatim secernitur, & b, in vnam oblongam Maculam coalescit attenuatis quæ pone sequuntur Maculis: f, autem adhuc utcunq. durat. Sed & Maculæ, l, secessum à, c, moluntur. Notandū etiam nucleum baseos versus occasum quasi nudum, versus ortum reliquos vapores seu nebulas quodammodo post se trahere; id quod valde huic phænomeno solēne est.

Die 30. non licuit appingere Maculam, a, in itinere recto, nisi centrum puncto nigro, propterea ad latus totam posui in figura itineraria vides Maculas, l, etiā ab omnibus alijs seiunctas esse, & verticem, b, vnam factam optice, sequaces autem valde attenuari. apud, f, nouæ emergunt vmbra cum faculis, hucusq. non animaduersæ. spatia alba faculis infessa.

Die 31. mane habes figuram lateralem boream, quo habitu apparuit triangulum a b c, vmbri & faculis repletum; nam ubicunq. alba interualla aspicias, noueris Faculis eximij fuisse collustrata. Macula, f, vmbri iuncta & similis facta est: omnes vmbra quasi nouæ, & admodum tenues, quidquid inter horizontem, & Maculam, b, intercessit, occupauere; Macula, a, suum longum nucleum etiam paulatim contrahit, & reliquo corpore in vmbra dilutæ formam gracilescit.

Die eodem vesperi, trigonum, a b c, horizontem attigit vertice, b, vna cum vmbri & faculis lateralibus austrinis, ante vmbra & Maculam, f, Maculæ, a, & c, adhuc seiunctæ suos nucleos ostentant, & a, longam caudam vmbrosam exporrigit

II.

alba omnia faculis resplendent. Maculæ, l, admodum gracilescunt situ tamen libero.

Die 1. Iunij mane non comparuit amplius Macula, b, sed duæ, a, & c, itemq. per modum vmbra, l; etiam, f, in horizonte sui vestigium insinuauit: posui autem omnia hæc ad latus boreum, eo quod in recto locus deesset. Sicut

Eodem die vesperi situm dictarū Macularum & vmbra, l, locui ad latus australe, vbi & Maculas horizonti vicinas latis crassas, & eidem horizonti incumbentes faculas habes tam in borea, quam austro. Cæterum Macularum, a, & c, puncta centralia habes suis locis itinerarijs impressa, cum litteris, a, & c, intra figuram diei 31, vespertinam.

Secundò, Consideranda est trianguli a b c, positio seu figura optica per singulas stationes diurnas. Licet cum certum sit triangulum in se suam speciem & magnitudinem semper retinere, retentis iisdem lineis. tamen certum itidem est, trigonum quoduis cæteroquin immutatum, & figuram & magnitudinem & speciem immutare optice, sola positione & aspectu. Vnde etiam si Maculæ eandem inter se distantiam inuariatam retinerent nihilominus tamen figuram & magnitudinem variarent sola positione & aspectu. Multo magis id euenire oportet, si motio localis quoque interueniat.

Igitur tres Maculæ, a, b, & c, die 21. 22. & 23. exhibuerunt triangulum rectilineum isosceles, variatis tamen basibus, & auctis lateribus omnibus. Die 24. & 25. basis, a c, facta est curuilinea, & triangulum euasit isosceles mistilineum. Semper tamen incredibiliter auctum. A die 26. ad 30. retulit formam scaleni obtusi anguli, atque nonnihil optice decreuit, semper tamen interuallo longissimo primi diei figuram superauit. Die 31. redijt ad rectangulum, ita vt duo latera angulum rectum continentia fuerint, a b, & a c, b c, verò fuerit latus angulo recto oppositum; fuitque hoc triangulum, rectangulum multo maius triangulo æquicrura diei 21.

Tertiò, Maculæ, b, & a, decurrerunt in eodē parallelo, & nihilominus, b, antevertit currendo Maculam, a, spatio ferè diurno. id quod in alijs Maculis & temporibus etiam vsu venit.

Quartò, Eodem modo Macula, c, horizonti orientali vicinior fuit quam, a, & c

Facula in horizontem usque incumbunt inter Maculas.

De figura triangulari, quam Macula, a, b, c, repræsentauerunt.

Trianguli ultimum diei 31. fuit maius secundum omnem loci distantiam, triangulo primo die 21.

Due Macula in eodē parallelo inaequaliter ambulant.


LXIV, IMAGO
Observationum.

ANNO MDCXXVI.
In Collegio Romano Societatis

Maij.
Iunij.



Cursus Macularum à 21. Maij. ad 5. Iunij,
similis aliis aliorum annorum.



I. in exitu denuo, praeuenit eandem, a, vt citius ad horizontē pertingeret occidentalem: & sicut ab eadem secundum latitudinem discessit maximeq. in medio distitit, ita in exitu ad eandem rursus plurimum accessit saltē optice.

Quintò, Tempus Maculae, b, à prima ipsius in Sole apparitione, quæ fuit die 21. ho. matutina 8 $\frac{7}{8}$. ad contactum horizontis occiduum, fuit 10. dierum hor.

II. 9. plus minus; Tempus Maculae, c, à die 21. vsq. ad diem 1. Iunij vespertinum, fuit dierum 11. hor. 9. circiter; quibus adiunctum, id quod residuo ad marginem occidentalem debetur tempus, erit horarum forsitan 9. & sic ad dies 12. non omnino peruenietur. Tandem tempus Maculae, a, ad contactum occidentalem fere assequetur dies 12. etenim die 1. Iunij vesperi ho. assignata ipsius vestigium

pp 2 adhuc

I.

adhuc à margine occiduo satis bono spatio distitit. Itaq. si spatia etiam illa, quæ sunt inter horizontem orientalem & Maculas, a, b, c, examinemus, debetur illi quod à margine ad b, tēpus vnus diei, horarum 22. circiter; cum enim Macularum viē hoc tempore sint quasi rectilineæ, ipsæ ad sensum, testante experientia, temporibus æqualibus æqualia conficiūt spatia, & spatijs æqualibus decurrendis intersuallum Maculæ, b, diei 30. matutini, ad contactum vsq. occiduū, sit diei vnus & quasi hor. 12. aut amplius, & illud spatium sit paullo minus intersuallo orientali; patet hoc diei vnus & hor. plurimum 12, videlicet viginti circiter duarum fore. totus igitur cursus Maculæ, b, ab ortu in occasum, fuit minimum dierum 12. horarum 7.

Cursus Macula, b, dierum 12. horarum 7.

Cursus Macula, c, dierum 13. minimum.

Cursus Macula, a, dierum 13. horarum 12.

Cursus Maculæ, c, ratiocinando eodē modo, accesserit ad dies minimum 13.

Cursus Maculæ, a, exitit à contactu, ad contactum, dierum 13. & semis circiter. Sed hæc suis locis planius discutientur, nunc ad propositum, per transfennam tantum inspiciuntur.

Sextò, Expeditis obiter Maculis borealibus, a, b, c, venio ad australes, quarum 1. occurrit, d, cum sua facula umbratili, cui num. 21. inscripsi; & hæc vel potius hæc concurrerunt triāgulo boreo motu quasi parallelo, prout experienti constabit. die igitur 21. d, fuit Macula habens adiunctam ante se deinde aliam insignem versus austrum faculam cum umbra; postea euanescētib. faculis, successere primum duę postea quattuor, tum bene decem Maculæ, quæ rursus ad pauciores redactæ, in duas demum grandiores coaluerunt die 29. & 30. & eodem, atque sequenti die in umbras iterum faculasq. abire ceperunt, quarum borealior, & occidētalior à Macula, b, semper æqualiter absuit. Durauit sub Sole ab ortu ad occasū diebus 12. & semis minimū.

Macularū Umbrarum & Facularum, d, incredibilis varietas, & mora sub Sole dierū 12. 1/2

Macula, c, progressio, et interitus.

Septimò, Macula, e, post se faculas & umbras hor.izonti contiguas trahens, primum conspecta est 22. vesperti. die 23. umbrā illā pridie late patentem, in parua videtur constrinxisse Maculam (id quod huic phænomeno satis frequens est) quam deinde post vnum diem amisit physicè consumptam; ipsa verò æquali raritate, sed ampliata processit ad 26. ex quo deinde decreuit, & decrescendo

II.

1 in duas discessit Maculas semper minores, donec die 30. vltimo conspecta interijt, situ interim ad Eclipticā inuariato. posteriorib. diebus, eius loco facula tenuis emicuit, sed ob debilitatē nō notauit.

5 Octauo Macula, h, die 24. vesperti exorta, post se duas umbras cum facula interiecta traxit, quas littera, i, insigniui & quia die 25. ob faculam 21. locus defuit, notauit solum locum nucleo; integram verò Maculam cum faculis sequentibus ad latus descripsi. Die 26. mane tam ipsa quam umbræ faculæque sequentes vehementer creuerunt. Die eodem.

15 vesperti loco umbrarum sequentium, Macula I, apparere cæpit, quæ postmodū ad primū vsq. Iunij variè visa est, aliquando duæ, aliquando vna grandior, mox nulla. An autem umbræ die 2. & 4. Iunij reduces, sint eadem Maculæ, & umbræ, I, quæstio non contemnenda est; prout similes apparentiæ in alijs quoque Maculis quotidie ferme occurrunt. Sed hanc rem alibi discutiendam referuo. interea breuiter omnino arbitror, easdem.

25 umbras, sæpissimè ita durare, & hic omnino fuisse vix ambigo. sed umbra borea die 4. nouiter apparens, physicè exorta videtur, neq. enim vllum eius indicium antea extitit. Macula, h, post diem 28. Maij sensim decreuit, in medio quoq. oblonga apparuit, similem gestans nucleū ac si è duabus conflata esset, in margines molliter asperatos desinens, quemadmodum & Maculæ pleræque sicut & faculæ; multo verò maximè umbræ.

Incessit hæc in Sole Macula, si omnia exactè disquiramus, ab horizonte ad horizontem dies tredecim & semis quodammodo; incessumque ferè rectilineum & Maculæ, a, atque, b, ad sensum parallelum habuit. Habes ergo ex hac vnica obseruationum Imagine sex distinctos Macularum cursus; tres boreos, ex Maculis, a, b, & c, & tres austrinos ex Maculis, d, e, atq. h.

45 Secundò, Habes diuersę celeritatis cursus tempore, & situ & in parallelo eodem; vt patet in Macula, a, b, c, huius enim cursus est breuissimus, illius longissimus, c, medius & c. Habes etiam australes, ab aliquibus illorum diuersos.

Tertiò, Habes ortus & occasus astronomicos & physicos tam Macularum, quam Facularum, quam umbrarum.

55 Quartò, Incrementa & decrementa earum.

Cursus Macularum, h, fuit dierum 13. & horarum 12. plus minus.

I M A G O S O L I S LXIV. 319

earundem exotica, nec non generationes nucleorum portentosas, concursus & separationes admirandas.

Quintò, Habes Integros Facularum, cum Maculis & intra Maculas cursus, à primo & Physico exortu, qui contigit die 21. Maij, vsque ad occasum Astronomicum, qui incipit die 31. Maij, & ab solutus est 1. Iunij vesperi, aut summum 2. Iunij mane, tantum enim temporis

1 in horizonte occidentali pertransiendo consumpsit triangulum, a, b, c, cum suis Maculis, Faculis & Vmbris; quæ quidem omnes vnum & eundem motum semper participant, & societate indissolubili vniuntur, in tantum vt reciprocas in sese Metamorphoses passim exercent, dum alterum ex alio enascitur vniusque in aliud conuersio existit.

LXIV, IMAGO


Observationu.

ANNO MDCXXVI.
In Collegio Romano Societatis

Maij.

Iunij.

Cursus Macularu, à 21. Maij. ad 31. Iunij,
similis aliis aliorum annorum,



D H O.EI.

21. m. 8 $\frac{7}{8}$ - 43. 0.
22. m. 8 $\frac{1}{4}$ - 39. 0.
22. u. 5 - 25. 0.
23. m. 7 $\frac{7}{8}$ - 35. 30.
24. m. 7 $\frac{7}{8}$ - 35. 20.
24. u. 4 $\frac{1}{2}$ - 31. 10.
25. m. 7 $\frac{7}{8}$ - 34. 50.

D H O.EI.

26. m. 7 $\frac{1}{2}$ - 33. 0.
26. u. 4 $\frac{1}{2}$ - 30. 40.
27. u. 5 $\frac{7}{8}$ - 17. 0.
28. m. 7 $\frac{7}{8}$ - 32. 30.
28. u. 5 $\frac{1}{2}$ - 19. 30.
29. m. 8 $\frac{1}{4}$ - 46. 0.
29. u. 5 - 27. 30.
30. m. 7 $\frac{1}{2}$ - 30. 30.
30. u. 5 - 24. 45.
31. m. 8 $\frac{1}{12}$ - 38. 35.
31. u. 5 $\frac{1}{2}$ - 20. 0.

D H O.EI.

1. m. 7 $\frac{1}{4}$ - 29. 30.
1. u. 5 $\frac{1}{2}$ - 22. 30.
2. u. 4 $\frac{1}{2}$ - 33. 0.
3. m. 7 $\frac{7}{8}$ - 37. 0.
3. u. 5 $\frac{1}{2}$ - 18. 10.
4. m. 7 - 26. 40.
5. m. 7 - 26. 30.

Notæ in LXV. Observationum Imaginem, Iunij & Decembris.

I.



*Nova Im-
ginum for-
ma proponi-
tur.*

ACIO saltum, & coniungo duos menses sibi semestri spatio, adeoque semicirculo oppositos, novaque Imaginum formam ob ocu-

los pono, ut videas Maculas earumque motus & situs in mensibus oppositis, es- subcontrariè sibi oppositos, id quod in hoc iconismo spectandum habes in Maculis, a, & b, nam tempore semestri inter se distant; Macula, a, est tota borealis, b, tota australis: a, ex ortu boreali F, tendit obliquè in occasum, G. versus Eclipticam, A, B, accedendo; sic vicissim Macula, b, ex ortu australi, H, versus Eclipticam & plagam borealem appropinquando, occasum terminat in, I. iter Maculae, a, est conuexum versus plagam australem, sic vicissim flexus itinerarius Maculae, b, protuberat in Aquilonarem partem, P. Similitudo etiam arcuum maxima apparet. Et hæc quidem in genere, nunc singula inspiciamus.

Explicatio Maculae, a,

MAculas, & Faculas à quinto Maii ad 17. Iunij. observatas, multas & frequentes, consulto omitto, quia omnia & singula proferre non intendo; deinde quia alijs Apellis Censoribus, sicut in Apelle, ita etiam hic, locum sua, & non mea pro suis aut sua ex meis proferendi & stabiliendi, tribuo. Macula ergo, a, die 19. primum, conspecta, satis plena, & densa comparuit, nucleo non exiguo foecunda; cuius singulas diebus singulis apparitiones, & consignationes annotatas habes in adiecto laterculo, ad diem usque 28. inclusivè; nam hæc eadem in Observationum Imaginem referre, nec animus, nec locus fuit: quemadmodum neque alium ipsius amplissimum in Faculis, & Umbris comitatum; die 17. vesperi solum nucleum expressi, confusionis vitandæ causa. cætera ut typo expressa


*Explicatio
Maculae, a,*

II.

cernis, ita Sol in chartam traiecit. Vbi considera figuram & positionem Maculae respectu poli, M, ex axis, M E N, cir-

I V N I I.

D.	H.	☉	El.
17 m.	$7\frac{1}{4}$	31	25
17 u.	5.	26	0
18 m.	$7\frac{3}{4}$	37	40
18 u.	$5\frac{1}{2}$	20	0
19 m.	$7\frac{1}{2}$	29	40
19 u.	6	15	30
20 m.		30	30
20 u.	$5\frac{1}{2}$	22	40
21 m.	$8\frac{1}{2}$	39	50
21 u.	$5\frac{1}{2}$	26	0
22 m.	$6\frac{1}{2}$	21	0
22 u.	4	37	0
23 m.	$7\frac{1}{2}$	32	30
23 u.	$4\frac{1}{2}$	33	20
24 m.	$7\frac{1}{2}$	36	50
24 u.	6	16	30
25 u.	$3\frac{1}{4}$	40	0
26 m.	$7\frac{1}{2}$	31	40
27 m.	$7\frac{1}{2}$	30	0
27 u.	$5\frac{1}{2}$	20	0
28 m.	$7\frac{1}{4}$	30	10
28 u.	$5\frac{3}{4}$	19	20



I.

ca quem Macula, a, incescit . nam ad il-
lum respicere & figuram suam accom-
modare videtur . Deinde quomodo nu-
cleus & circumiectus halitus figuram
similiter mutant , nam diebus 20. & 21.
mane, vtrique rotundi, reliquis oblon-
gi, parent. Præterea qua ratione ambo
simul crescunt mole & intentione, à die

II.

17. ad 21. & exinde simul vtrisque de-
ficiunt, ita vt die 28, vespertino, quan-
do Macula horizontem rasit, & parua,
& valde rara fuerit . Itaque Solem exiit
in defectu, neque in opposito eiusdem
hemisphærio diu hēsisse credenda est, ex
ista satis celeri defectione.

Ipfius

I.

*Cur axes
partim inte-
gra par-
tim fracta
linea expres-
si.*

*Medij cur-
sus axis tan-
tum adduci-
tur.*

Ipsi in patente Solis hemisphaerio moram ad dies 13. peruenisse, non est dubium, si spatium, *F a*, in computum assumatur: an autem & quantum eodem superauerit, nunc non decido: ceterum quantum huius motus axis, *M E N*. ad axem Eclipticae *C E D*, tantum chorda, *F G*, ad sectionem Eclipticae, *A B*, inclinatur ordinariè, quantum quidem hactenus ex obseruatis deprehendi. Quod autem totius axis, *M E N*, alteram medietatem linea integra, *M E*, alteram fracta, *E N*, expressi, ideo factum est, ut scires axem, *M E*, eleuatum, alterum, *E N*, in auersam Solis partem depressum; cuius contrarium aspicias in axe *O P*, què respicit Macula, *b*, id quod in alijs quoque Imaginibus praestitum esse noueris. Monitum autem te volo, axem, *M E N*, hic esse expressum secundum chordam cursus maximam, & non esse fixum aut stabilem, sed in momenta circa stabilem Eclipticae axem, *C, D*, annua reuolutione girari, in paruo circello, certa distantia ab axe Eclipticae remoto: unde in quolibet cuiuslibet Maculae cursu, tot sunt axis huius mobilis stationes quot Macularum. hic autem vnum tantum adduco eumq. medium, exempli, & erudiendi causa. nam de hoc axe habebis peculiaris in libro sequenti.

Macula, b, explanatio.

Haec Macula, *b*, die 17. Decembris ob caeli inclementiam aduertiri non potuit, igitur die 18. & sequentibus primum annotata est, eo quo vides modo; comitatum in Maculis, Vmbris, & Faculis illustrissimum, atque copiosiss. secum deduxit, sed ob rationes

II.

prae dictas ipsum omitto, contentus solius Maculae schemate, ad iter ipsius indagandum: cuius diarium expressum cernis in adiecto leterculo, à die 18. matutina ad 29. itidem antemeridianam.

Die 20. & 23. pomeridiano consignauimus solum nucleum. Totus cursus omnibus rite computatis non videtur excessisse dies 13. an autem impleuerit, dubitauerit fortasse quispiam. Situs huius Maculae, situi Maculae, *a*, subcontrariatur, & polum, *O*, haud obscure respicit, & in medio cursus, die nimirum 22. & 23. figuram rotundam exhibet.

Tabula diaria. 1626.

D E C E M B E R.			
D	H	☉	El.
18.	m.	9 $\frac{1}{2}$	16. 10.
19.	m.	9 $\frac{1}{8}$	14. 0.
20.	m.	8 $\frac{7}{8}$	13. 30.
20.	u.	3 $\frac{5}{8}$	9. 20.
21.	m.	9 $\frac{1}{2}$	17. 30.
22.	u.	2 $\frac{5}{4}$	16. 0.
23.	m.	9 $\frac{1}{4}$	14. 5.
23.	u.	2 $\frac{4}{7}$	16. 30.
26.	u.	2 $\frac{5}{8}$	18. 0.
29.	m.	9 $\frac{1}{2}$	14. 30.



LXV, Imago Ob-
servationum,

M DC XX VI.
In Collegio Romano Societatis,

Iunij, et
Decembris.

Cursus duo subcontra:




Cursus Macula a, a die 17, ad 28, Iunij, 1626.



A, Oriens,

AB, Ecliptica,

B, Occidens,



Cursus Macula b, a die 18, ad 29, Decembris, 1626.



22 Solis facies inest, sine magno co-
line finis quod proportionem decem.
& A. C. et ad medium insigne, &
& F. G. que parallelis ipsarum, A. P.
nem autem, ut patet ex chordis L. M.
in boream, sunt Maculae, & ex Aquilo-
repectu Ecliptice obliquus est ex Aquilo-
Solis circuli, A. B. D. tendentis ipsius
totata facies elata, supra planum
facies patet, patet N. E. circuli quod
facies conuenit, est vultus patet ad
a. latitudinis ad 21. eundem, ite
Solis facies, anno 1627, a die
Ecliptice ex facie conuenit in solis

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

324 ROSAE VRSINAE LIB. III.
Notæ in Obseruationum Imaginem LXVI.
Iulij anno 1626. & Ianuarij anno 1627.

II.

I.
SVNT iterum duo Cur-
sus Macularum, a, & b,
tempore sex Mensium
distinctarum; quarum,
a, cucurrit à die 6. ad
18. Iulij, anno 1626.
Tempora cursus diurna distincta vides
in adiecta Tabella.

Macula, a, semper duos, modo coali-
tos, modo seiunctos nucleos gestauit, in
medio tres exhibuit; sitū suum & figurā
more aliarum attemperauit secundū polū
eleuatum, H, & axem H E I, quem qui-
dem axi, C E D, viciniorē exhibet, quā
in schemate priore; quod ideo fit, quia
versatur in circelli patentis semicirculo
ascendente, quantum autem pars H E,
ascendit tantum descendit latens E I, &
in tantum etiam proportionaliter itinera
Macularum curuantur, quæ ex solius
Circelli polos axis mobilis annuè deferē-
tis volutione, originem trahunt.

Quo autem flexus itinerarius Macula-
rum magis crescit, hoc etiam chorda
F G, siue recta, A K, illi parallela, ad E-
clipticam, A B, amplius appropinquat,
angulumque, B A K, acutiorem facit, qui
angulo, H E C, semper quasi æqualis re-
peritur.

Duratio Duratio huius cursus, ab ortu in oc-
Macula, a, casum, fuit circiter dierum 13. die 18.
vesperi, coepit Macula horizontem,
quodammodo radere post culmina-
tionem coepit aliquantulum deficere, ta-
met si satis vegeta ad horizontem appro-
pinquarit.

Sola Ma- Reliquum huius Maculae apparatus,
cula, absque qui non magnus fuit prudens omitto, si-
alio comita- cut & alios tam huius quam aliorum,
tu adducun- mensium dies, quorum obseruationes
tur. plurimas & fecundas habeo: sed alijs
quoque obseruatoribus, præsertim ijs,
qui hæc ætate nostra, ius cæli, è nescio
quibus privilegijs sibi solis vendicant,
oportet vacua interualla relinque-
re, quibus implendis, auctori-
tatem, atq. existimatio-
nē suam aliquare-
nus commen-
dent.

Spatia va-
cua alijs im-
plenda stu-
dio relin-
quantur.

I V L I V S.			
D.	H.	⊙	El.
6.	m. $8\frac{1}{2}$	40.	0.
7.	m. $7\frac{1}{2}$	30.	40.
8.	m. 8.	38.	0.
9.	m. $7\frac{1}{4}$	29.	25.
10.	m. $7\frac{1}{2}$	32.	0.
11.	m. $7\frac{3}{4}$	34.	30.
12.	m. $7\frac{1}{4}$	29.	30.
13.	m. $7\frac{1}{2}$	32.	30.
14.	m. 7	27.	0.
15.	m. $7\frac{1}{2}$	31.	30.
17.	m. $7\frac{1}{4}$	29.	0.
18.	m. $7\frac{1}{2}$	32.	20.
18.	u. $4\frac{1}{4}$	28.	30.

De Macula Aquilonari, b.

Perficit ea suum cursum in plaga
Solis boreali, anno 1627. à die
9. Ianuarij, ad 21. eiusdem, iter
ipsius concuum est versus plagam au-
stralem, quia axis pars N E. circa quem
rotata fuit, stetit eleuata, supra planum
Solaris circuli, A C B D, tendentia ipsius
respectu Eclipticæ obliqua est ex Austro
in Boream, sicut Macula, a, ex Aquilo-
ne in Austrum, vt patet ex chordis L M,
& F G, siue parallelis ipsarum, A P,
& A K. Creuit ad medium insigniter, &
hinc simili quasi proportionē decreuit.
Solitaria fermè incessit, sine magno co-
mitum

LXI, Imago Observati-
onum.

In Collegio Romano
Societatis

Iulij, 1626.
Ianuarij, 1627.



Axis temporarius Mobilis,



A, Oriens,

AB, Ecliptica,

B, Occidens,



Cursus duo Macularum a et b, subcontrarij.



Axis annuus Fixus
Axis temporarius Mobilis,

I D N

I.

mitum strepitu, absque multa Facula-
rum luce.

*Macula, b,
in Sole ma-
cula.*

Mora ipsius in patente Solis disco,
dies tredecim non superasse, omnibus
computatis, mihi certum; imo pro-
babilius iudico, non omnino attigisse.
Tabulam ipsius itinerariam hic con-
templandam propono. Nucleo denso,
nigro, & ab alia circumfusa nebula
mundè præciso, gravis fuit; cuius va-
riam configurationem, idem ambiens
halitus, semper imitatus fuit, nisi quis
malit dicere, ex huius varietate illius
transmutationes fieri; quorum neutrum
modo decerno.

Maculae huius diameter longitudinis
prout iuxta centrum explicata compa-
ruit, ad Solis diametrum sese habuit,
ut 1. ad 23. Hinc data magnitudine
Solis, datur etiam magnitudo Maculae,
prout haberi in corporibus istis minus re-
gularibus, & semper variabilibus potest.

Nuclei die 19. coeperunt valde graci-
lescere, & quasi in plures rumpi, sed
& reliquum etiam corpus Maculae, atte-
nuari coeptum est.

II.

I A N V A R I V S.

D. H. ☉ El.


9.	m. $9\frac{1}{4}$	15.	0.
10.	m. $9\frac{1}{4}$	16.	10.
11.	m. $9\frac{1}{4}$	16.	15.
12.	m. 9.	14.	0.
14.	m. $9\frac{1}{4}$	15.	0.
15.	m. $9\frac{1}{4}$	15.	0.
16.	m. $9\frac{1}{4}$	17.	10.
17.	m. $9\frac{1}{4}$	16.	0.
18.	m. $8\frac{1}{4}$	14.	10.
19.	m.	23.	40.
20.	m. $9\frac{1}{4}$	17.	10.
21.	m. $8\frac{1}{4}$	13.	0.
21.	u. $3\frac{2}{10}$	2.	40.



LXI, Imago Ob-
servationu.

In Collegio Romano
Societatis

Iulij, 1626.
Ianuarij, 1627.



Notæ in Obseruationum Imaginem L X V I I.

ab octauo Aug. die, ad 18. eiusdem, anno

1626. item à die 5. ad 16. & à 9. ad 22.

Februarij, anno 1627.

I.

II.

Cursus, & Tabula Maculae, a.

AE C Macula, a, tota incessit in parte Solis australi, & quia arcus ipsius itinerarius, F a G, concavus est versus polum boreum exaltatum, R, conuexus erga depressū, S, totaq. pars axis borea, R E, eminet supra planum Solare, ACBD, & altera E S, austrina extra idem in plaga opposita versatur: necesse est arcum patentem, F a G, circa axis partem latentem, E S, regulariter in Solis superficie descriptum, esse segmento semicirculari minorem, per Propos. 19. l. 2. Theodosij, apud Claviū: id quod & ipsa praxis obseruatoria comprobatur. nam si ab 8. obseruationis die ad 18. transeas, inuenies 10. dies præcisè; spatium autem 18. G, residuum in occidente, ultra diem naturalem non præstat id quod planum facio ex interuallo 5. 6. orientali, cursus haud absimilis & subcontrariè oppositi, I c K, Maculae, c, cui interuallo respondent horæ 16.

Eodem modo, interapedini ortiue, F 8. si rigidissimè omnia excutiantur, & tempus plurimū tribuatur, amplius quā diem 1. & 18. hor. vix exsculpes: & sic totus cursus Maculae, a, ultra dies 12. excedet quidem, sed ad 13. non perueniet.

In ipsa autem positione & constitutione Mac. quædam animaduersione digna euenerunt, & primum quidem situs in oriente, die 8. in quo Mac. non æquabiliter protensa fuit, secundum lineam horizontalem, A F H, sed parte sui australi propior, boreali remotior ab eadem extitit. quod ideo euenisse arbitror, quod Mac. plures in re fuerint, sed aspectu, & situ decliui vnam visui repræsentarint, vnde ea quæ horizonti vicinior iacuit, caudam australem situ propiore obiecit; id quod sequentium dierum apparitio satis declarat cum die 9. duæ; 10. tres; 11. quinq. distinctæ sint conspectæ Maculae: quæ tamen sequentibus iterū partim conflatae

Cursus Maculae, a, in Sole mora.

Quædam notatu digna circa Maculam, a,

A	V	G	V	S	T	V	S.
D.	H.						El.
8	m. $7\frac{1}{4}$	31	30				
9	m. $7\frac{1}{4}$	26	30				
10	m. $8\frac{1}{2}$	38	0				
11	m. $7\frac{1}{2}$	33	0				
12	m. $7\frac{1}{2}$	33	0				
13	m. 8	32	30				
14	m. 8	32	30				
15	m. $7\frac{1}{2}$	25	40				
16	m. $7\frac{1}{2}$	29	0				
17	m. $9\frac{1}{4}$	45	35				
18	m. $7\frac{3}{4}$	28	25				

coierūt, vel partim imminutæ interierūt.

Nunc ad Cursus huius Maculae subcontrarios venio, qui sunt tres, Macularum, b, c, d, omnesq. euenerunt anno 1627. mense eodem Febr. & Mac. quidē b, australis incedens via cōcaua in austrū conuersa versus Septentrionem, à die 5. ad 16. Febr. processit, relictis vtrinq. spatijs, H, 5. in ortu, & 16. G, in occasu: quorum vtrumq. cum diem integrū & 4. quasi horas complectatur, patet Mac. b, ab horizonte ortiuo ad occiduū insupersisse dies 13. & hor. circiter 8. quod ideo euenit; quia vestigium ipsius itinerarium polum, T, & axis partem eleuatā, T E, respexit, ideoq. per dictam Theodosij arcū semicirculo maiorem descripsit, supposito, ipsam Maculam in superficie solaris globi ferri.

Com-

LXVII, Imago
Observationum.


In Collegio Romano
Societatis

Augusti, 1626.
Februarij, 1627.



Axis latentes.

Axis patens.



19	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

I.

Compositam fortasse diceret aliquis è pluribus, prout in illas resolui coepit ad medium cursus, nisi passim ex obseruatibus constaret, præcisè & non ex aspectu solo in plures resolui.

Macula in parallelomino re girata diutius hæret in Sole, quâ quâ minore parallelum perambulauit.

Aduerte, etiamsi Macula, b, à centro E, plus abfuerit, quam Macula, a, id quod Chordæ, H G, & F, G, vel arcus, A H, & A F, edocent; tamen nihilominus illa plus moræ in Sole fecit quam hæc, quia huius segmentum minus est, quam ut sit simile segmento illius, ob sphaeræ situm obliquum, & depressos infra aut eleuatos supra horizontem, polos.

De Macula, c.

Hæc Macula, c, Maculæ, a, itidem subcōtraria, cursū suum absoluit, à die 5. vespertino, ad 16. vespertinum; cuius si spatia vtrunque residua examinemus, reperiemus iter ipsius dierum duodecim, & horarum sedecim plus minus. Itaque neque Maculam, a, neque Maculam, b, assecuta est in mora sub Sole, cuius causa est, quod axis, P E Q, medietatem, E Q, depressam respexerit, & à centro Solis, E, plus remota fuerit, quam, a, vel, b, iuxta Chordam, I K, vnde etiam constat, arcum itinerariū, I c K, semicirculo esse minorem.

Macula, d.

Macula tandem, d, austrina, cursum, L d M, descripsit, semicirculo maiorem, quia axis partem, E X, & polum, X, eleuatum respexit, & à centro, E, omnium maxime abfuit, ideoq. segmentum, L d M, semicirculo maius confecit.

Horizontem in occasu attigit, & die, 19. 20. & 21. in duas Maculas discreta fuit; ob quam causam reliquo incessu tempore oblonga semper apparuit. Interuallum ipsius, orientale, L, 9. horas circiter 20. cōplectitur, vnde tota ipsius in Sole mora fuit dierum 13. & hor. 20.

Mora Macula, d.

Ex quo habes primo quam cursus isti tempore sint inæquales & differentes: nam cursus, d, excedit cursum, a, & c, die quasi integro.

Notatu digna.

Secundò, Et hanc inæqualitatem reperiri tempore quasi eodem. vti patet in

II.

1 Maculis, d & c, quarum hæc illam non diu antecurrit. supraq. horizontem simul commoratae sunt à die 9. vsq. ad 17. per dies integros 9. eoque amplius.

5 Tertiò, Tametsi Maculæ b, & c, simul ferme ortæ, simulque propemodum occasæ fuerint; non tamen motus perfectè parallelos ostendisse, sed nonnihil ad se conuergentes, vnde & axium aliquantam in positu discrepantiam posui. Similes autem apparentiæ, & cursuum conuergentiæ vel diuergentiæ saepe eueniunt, quarū causas proprias nūc nō prosequor.

15


Tabula diaria cursum, b, c, d, anni 1627.

F E B R V A R I V S.				
D.	H.	☉	El.	
5	m. $8\frac{1}{2}$	11	30	
5	u. $4\frac{1}{4}$	8	40	
6	m. $8\frac{3}{4}$	16	40	
7	m. $9\frac{3}{4}$	24	20	
8	m. $9\frac{1}{2}$	20	10	
9	m. $8\frac{7}{8}$	20	0	
10	m. $8\frac{5}{8}$	18	0	
11	m. $9\frac{1}{2}$	21	30	
12	m. $8\frac{1}{2}$	18	30	
13	m. $8\frac{1}{2}$	17	45	
15	m. $8\frac{1}{2}$	17	45	
16	u. $4\frac{1}{4}$	6	15	
18	u. $3\frac{3}{4}$	16	0	
19	u. $4\frac{5}{8}$	9	0	
20	u. $2\frac{1}{2}$	28	20	
21	m. 9	23	25	
22	m. $8\frac{1}{2}$	17	30	

55

I.
 Maiorem curuitatem itinerum : sequitur chordarum ad Eclipticam maior obliquitas .
 Quartò, Cursus isti ab æquilibrium non multum abfuerunt, unde tam axes mobiles, ad axem fixum, C D, quam chordæ cursibus subtensæ, ad Eclipticam, A B, valde sunt obliquæ; nec non itinerum curuitates magnæ.
 Quintò, Vnicus autem cursus, a, sub-

II.
 contrariatur tribus cursibus, b, c, d, Cæterum quamlibet cuiusvis Maculæ observationem quotidianam intellexisti partim ex assertis, partim è Tabula diaria, poteris sufficienter hautire: quam proinde consulas velim.



Notæ in LXVIII. Obseruationum Imaginem,
à die 27. & 30. Augusti, ad 8. & 10. Septemb.
anno 1626. item à die 2. & 3. Martij, ad
14. & 16. eiusdem, anno 1627.

I.



RES Cursus, a, australis,
b, & c, boreales, conti-
gere anno 1626. quibus
subcontrarij effluerunt
duo, d, australis, & e, bo-
realis; anno 1627. Cur-
sum anni 1626. Ephemeridem propo-
no in adiecta Tabula itineraria.

Cursus Macularum, a. 10

Macula, a,
Mora
supra hori-
zontem.

A die 27. matutino Augusti, ad
8. Septembris matutinum,
interlabuntur dies 12. quibus
addita spatia vtrunque: efficient vnum
diem & octo plus minus horas; itaque
inter Maculas, a, quæ occidentalissima
fuit atq. alias antecessit, hæsit supra ho-
rizontem dies 13. & horas circiter 8. id
quod rarum est in ijs Maculis, quæ ex par-
te poli atq. axis latentis versantur, qua-
lem hanc fuisse certum est. vnde cum à
centro, E, satis multum distet, ipsius ar-
cus itinerarius erit segmentum semicir-
culo minus, & alter in opposita Solis
parte latens, eodem notabiliter maius,
(supposito, Maculam, a, in superficie
globi Solaris, regulariter esse latam) ex
quo fatendum est, cursum in auersa So-
lis plaga peractum ad dies 14. plus mi-
nus peruenturum. Huius Macule iter æ-
quilibrium autumnale superauit, vti pa-
tebit, si statio ortiua, cum occidentali
per rectam lineam coniungatur, & ex cen-
tro, E, excitetur ad illam vtrinq. pro-
tracta in horizontem linea perpendicu-
laris, qui representabit axem mobilem
huius cursus, qui cadet extra axem an-
nuum fixum, C D, peruenietq. patens
in quadrantem orientalem, C, A, latens
in occidentalem, D B, vnde patet cursum
iam transiisse æquilibrium; id quod ob-
seruatu dignum est. ex hoc enim cursu
inter se aliqualis discrepantia innotescit.
Magna intercedit similitudo inter hunc
cursum, & illum qui contigit an. 1625.

Macula, a,
æquilibriū
transiuerūt

Cursus hu-
ius, cum cur-
su an. 1625.
similitudo

II.

Tabula diaria Macularum,
a, b, c, anni 1626.

AVGVST. SEPTEMB.

D.	H.	☉	El.
27.	m. 8 ⁵ / ₈	32.	0.
27.	u. 4 ¹ / ₄	27.	0.
28.	m. 7 ¹ / ₄	21.	20.
29.	m. 7 ¹ / ₂	23.	10.
30.	m. 7 ⁵ / ₈	25.	25.
31.	u. 4 ⁵ / ₈	21.	0.
1.	m. 8 ⁷ / ₈	37.	50.
2.	m. 7 ¹ / ₂	23.	10.
3.	m. 7 ² / ₈	26.	25.
4.	u. 4.	28.	25.
5.	m. 7 ⁵ / ₈	21.	45.
6.	m. 7 ⁵ / ₈	23.	50.
7.	u. 4 ¹ / ₂	20.	30.
8.	m. 7 ¹ / ₈	20.	0.
9.	u. 3.	26.	0.
10.	u. 4 ² / ₂	22.	15.

hoc eodem mense, hisce iisdem diebus,
in plaga itidem australi, à die 26. Augu-
sti vespertino, ad 7. matutinum Septem-
bris; vti videre est, in Imagine Obserua-
tionum XXXIX. augusti 4. & Septemb.
pri-

LXIIIX, Imago
Observationis.

In Collegio Romano
Societatis

Augusti et Septem: 1626.
Martij, 1627.



CD, Axis
annus Fixus.

Cursus Macularum a, b, et c, anni 1626, subcontrarij, cursi:
bus Macularum d, et e, anni 1627.



Cursus a, b, et c, a die 27, et 30, Augusti, ad 8, et 10, Septembris.

Cursus d, et e, a die 2, et 3, Martij, ad 14, et 16 eiusdem.



Maculae currunt
quasi in Aequilibriis.

16.	23.	8.	23.
17.	22.	7.	22.
18.	21.	6.	21.
19.	20.	5.	20.
20.	19.	4.	19.
21.	18.	3.	18.
22.	17.	2.	17.
23.	16.	1.	16.

Maculae currunt
quasi in Aequilibriis.

I.

prima, quam consulas licet. sola differentia intercedit in distantia à centro, E. in inclinatione ad Eclipticam, nam illic Macula, a, secundum æquilibrium incessit, hic ab eodem non nihil est declinatum; tandem in mora temporaria aliquantum etiam est euariatum: quia ille cursus dies 13. non omnino attigit: hic etiam superauit. Quod partim potest attribui inæquali parallelorum à centro distantiae, partim differenti Macularum girationi, vnde cunq. illa accadat.

Magnum habuit hæc Macula comitatum, sed confusionis vitandæ gratia, pauca studio adduxi in medium.

Cursus Macularum, b, & c.

Macula, b, & c, visæ sunt primū die 30. Augusti mane, satis in Solem progressæ ex parte boreali, & b, quidem geminatae speciem Maculae præ se tulit, c, verò simplicis. Macula, c, videtur ad occasum peruenisse die 10. vesperi, b, vero 11. mane. Si omnia ad computum vtcunq. accuratum reuocentur, Macula, b, in Sole perambulando consumpsisse videtur dies 13. & hor. 18. haud paullo minus Macula, c, cuius cursus paullo incitator fuit, quam b, & itineri, a, veluti parallelus; sed Macula, b, ab itinere Maculae, c, sensim deflexit in boream.

Cursuum aliorum annorum cum hisce similitudo.

Cursus subcontrarij.

Similes harum Macularum cursus inuenies, anno præterito, b, & c, in citata Imag. XXXIX. à die 2. & 3. ad 14. & 16. Septemb. cursusq. ab ortu ad occasum hisce quodammodo æquales reperiuntur, dierū videlicet 13. & horarum viginti.

Cursibus igitur modo dictis, a, b, & c, an. 1626. nunc cursus subcontrarios statuamus, d, & e, an. 1627. mensis Martij; nam viæ itinerariæ Mac. a, subcontrariatur via Mac. d, à die 2. ad 14. Martij, in tantum, vt in eundem ferme parallelum concurrisset videntur, certè in idem ortus punctum, F, confluerunt; quemadmodum & Macula, c, cum Mac. b, in ortiuo puncto, H, conuenit, de reliquo autem eidem vbiq. subcontrariè incedit.

Cursus Maculae, d.

Macula, d, sub Sole mota.

Macula, d, tota fuit australis, consumpsit à die 2. matut. ad 14. vespertinum dies 12. hor. fere 9. quibus addita residuorū in ortu & oc-

II.

casu interuallorū tempora, efficient dies circiter 13. horas plus minus 16. pro cursu Mac. d, quam è pluribus compactam fuisse, ostendit varie compositus & figuratus ab ortu vltra mediū Nucleus. Quē ab initio vsq. semper luculenter ostendit: ab ortu in occasum semper & sensim decreuit. Ambulauit insuper quasi in æquilibrio; cursū Mac. a, superauit, qui ambo coniuncti, efficient dies præcisæ 27. intra quos ordinaria Macularum reuolutio absoluitur: neq. facile excedi deprehēdetur.

Tabula itineraria Macularum, d, & e. 1627.

M A R T I V S.

D.	H.	☉	El.
2.	m. $7\frac{3}{4}$	15.	0.
3.	m. $8\frac{1}{4}$	19.	30.
3.	u. $3\frac{1}{2}$	24.	0.
4.	m. $7\frac{1}{2}$	10.	40.
5.	m. $7\frac{3}{4}$	15.	30.
6.	m. $8\frac{1}{2}$	22.	15.
7.	m. $7\frac{1}{2}$	15.	30.
8.	m. $8\frac{1}{2}$	20.	0.
9.	m. $7\frac{1}{2}$	18.	0.
10.	m. 9.	18.	40.
11.	u. 3.	30.	30.
12.	m. 8.	20.	20.
13.	u. $2\frac{1}{4}$	32.	0.
14.	m. $8\frac{1}{2}$	20.	0.
14.	u. $4\frac{1}{4}$	18.	0.
15.	m. $7\frac{1}{2}$	16.	0.
15.	u. $3\frac{7}{8}$	22.	50.
16.	m. $8\frac{1}{2}$	23.	30.


I.
Cursus Maculae, c.
Tota borealis extitit hęc Macula, incesu Mac. d, parallelo gauisa. Horizontem ortiuū retigit die 3. vesp̄ri, hor. 3 $\frac{2}{3}$ occiduū die 16. hor. matut. 8 $\frac{1}{2}$ itaq. totus cursus fuit dierum 12. hor. 17. itidē in æquibrio. Additus hic cursus, cursui Mac. b, efficit dies 26. hor. 11. Additus cursui Mac. d, efficit dies 26. hor. 9. Cumq. in Sole simul inceserint, nihilominus tamen, mora Mac. e, defecit à mora Mac. d, horis 23. vno quasi die.

Cursus Maculae, c, sub Sole mora.
Cursuum diuersorū apparentium compositio, ab integra Macularū reuolutione, partē, vel nil diserepat.

II.
I naturali. A Mac. verò, b, defecit vno die, & hora vna.
Cæterum posito, Maculas in superficie Solis circūferri, cōplementum cursus, H b b, à cursu Mac. H e I, quasi nihil distabit; & vice versa, complementum cursus H e I, à cursu Maculę H b b, quasi nil differt. Ex similibus igitur congruentijs in hoc Phænomeno perpetuis, aut saltem ordinarijs, solidissimū pro loco Macularū trahitur argumentum. Quod hic innuere volui.

Cursuū apparentium diuersitas.

Pro vero Macularū loco, validum argumentum.



Notæ in LXIX. Obseruationum Imaginem,
à die 4. ad 16. Martij Telioscopio Helio-
tropico, nouo Instrumento obser-
uatam, anno 1627.

Exemplum
ex nouo ob-
seruandi mo-
do.



AE C Imago com-
plectitur easdem
duas Maculas, d,
& e, quæ priore
Imagine LXVIII.
fuerunt exhibitæ,
sed nouo planè &
compendioso mo-
do obseruatas, quemadmodum, paullo
post ipsius instrumenti formam, fabri-
cam & vsum copiosè explicabo. Tabu-
lam diariam dedi in iconismo: quæ præ-
ter diem, & horam nil complectitur. So-
lis enim supra horizontem eleuatio ad
hanc rem nil facit: cursus quippe Macula-
rum, & positio in chartam per se venit,
qualem hic obiectam cernis de die in
diem: annum autem, mensẽ, diem &
horam ideo assigno, vt alij cursus possint
cum hisce conferri, deinde vt diurnarum
stationum interualla simul aspici, simul
inter sese comparari. Macularum autem
situs, conformationes, progressiones, nu-
cleos, augmenta, decrementa, itemque
itinerum sub Sole durationes, satis ex-
planauì in schemate antecedenti, vt hic
eadem non sint otiosè repetenda: vtrim-
que enim adhibui Telioscopia æqualis
magnitudinis, & potentiae: vtrimque cir-
culos obseruatorios amplitudinis eius-
dem; & tandem vtrimque tempora & ho-
ras veluti easdem; vnde vtrimque etiam
Macularum positiones & distantiae à
centro, E, æquales. Nunc quædam pe-
culiaria huius figure explicemus.

Explicatio
quorundam
notatu di-
gnorum.

Primò, Circulus, A B C D, est ad axẽ
coni Solaris erectus, & solari circulo pa-
rallelus, prout in omnibus Obseruatio-
num Imaginibus.

Secundò, Linea, A B, est sectio Aequi-
noctialis circuli, quam facit in plano cir-
culi obseruatorij, supposito terram punc-
ti instar, & quemuis in terra locum, tan-
quam in centro vniuersi haberi. Eandem
sectionem facit etiam circulus per axem
coni solaris ad horarium C D, erectus.

Tertiò, Linea, C D, refert axem mun-
di, itemque quemuis horarium à Sole
inflexum, & in axem mundi, comuni
sectione concurrentem; potissimum verò
loci Meridianum: imo omnes horarios,
prout illos Sol quouis die successiue
adit.

Quartò, Punctum, seu centrum, E, re-
presentat etiam quolibet totius Eclip-
ticæ punctum toto anno: vnde sicut se
habent circuli horarij ad Eclipticam per
singula eiusdem puncta incedentes, ita
se habet linea, C D, ad lineam Eclip-
ticæ, quæ ad eandem accedit & recedit,
pro vario anni tempore: nam in Solstitijs
angulos rectos efficiunt ad centrum, E,
in Aequinoctijs complementa declinatio-
nis maximæ, in reliquis temporibus in-
termedios; prout clarius videbitur postea
suo loco; interim hæc præmitto, vt noris
Eclipticam in hac obseruandi machina
non fixam, sed mobilem esse, atq. vltra
citraque lineam, A B, euagari secundum
latitudinem radiorum Zodiaci, ex, E,
descriptorum. de qua re postea fusiùs.
nunc hæc prælibo, ne mireris, si in præ-
senti imagine duas Eclipticæ lineas in-
scriptas videris. nam,

Quintò, 2 E 2. est Ecliptica, quæ die
2. Martij ad circulũ declinationis seu ho-
rarium, C D, suam positionem tenuit se-
cundum angulum minorem vel, C E 2.
vel D E 2. à qua Macula, d, die secundo
Martij absuit distantia F 2. Linea verò
14. E, 14. est Eclipticæ ad diem 14. po-
sitiõ, ex qua habetur Maculæ, d, distan-
tia, G, 14. ab eadem Ecliptica, die Mar-
tij 14. Vnde.

Sextò, Constat Macularum Cursus
prout Heliotropio obseruantur, non esse
ipsos genuinos & meros earundem flexus
sed compositos suis proprijs atq. Eclip-
ticæ diuicationibus. quare, vt proprij
habeantur, Ecliptica ad singulas obser-
uationes est inscribenda; & tum demum
vnã super alteram collocanda, & Ma-
cula-

LXIX, Imago Ob-
servationum.

M.DC.XXVII.

Martij.


In Collegio Romano

Societatis
à die 2. ad
16. Martij.



Observatū mane.

D	H	D	H
2	8 $\frac{3}{8}$	9	8 $\frac{1}{4}$
3	8 $\frac{1}{4}$	10	8 $\frac{3}{4}$
4	8	12	8 $\frac{1}{3}$
5	8 $\frac{1}{4}$	14	8 $\frac{1}{3}$
6	8 $\frac{2}{4}$	15	8 $\frac{1}{3}$
7	8 $\frac{1}{2}$	16	8 $\frac{1}{2}$
8	8 $\frac{1}{2}$		



AB, Sectio Aequatoris.

CD, Sectio Circuli Declinationis.

2 E 2, Ecliptica die 2.

14 E 14, Ecliptica die 14.

FG, chorda motus d d d.

HI, chorda motus e e e.

I.

cularum loca signanda : quod in presenti
schemate non feci, quia differentia situs,
quæ inter diem secundum & decimum
quartum interuenit, est admodum exi-
gua, quemadmodum ex angulo 2 E 14.
patescit. ex quo,

Septimò, Constat, cursus datos, F d
G, & H e I, esse non nihil curuiore, quam
sint veri, & illi quos in Tabula præceden-
ti protuli; licet ob exiguam discrepan-
tiam, id sensu non perciperetur. nam hoc
æquinoctiorum tempore, augmenta, &
decrementa angulorum in Eclipticam &
circulum declinationis interceptorum,
sunt supra modum exilia; prout ex Tabu-
la postmodum suis locis ponenda mani-
festum euadet.

Octauò, ob hanc eandem rationem
F G, chorda, est paullo minor & à cen-
tro, E, remotior, quam illa foret, quæ
motum Macularum parum subtenderet;

II.

1 & vice versa, chorda, H I, est aliquanto
maior, & centro, E, vicinior, quam ea,
quæ motui correcto responderet. Sed de
Ecliptica in hæc observationes impor-
5 tanda, aut motu Macularum puro, ex
ipsis observationibus immediatè absque
vlllo alio labore, acquirendo, differetur
postea suis locis vberius, nunc hæc bre-
uiter annotauisse, satis est.

10 Nonò, Quod autem Eclipticas 14. E,
14. & 2 E 2. non vides iunctas secun-
dum lineam, A B, sicut in alijs observatio-
nibus feci, id eo accidit, quod, vt dixi, li-
nea, C D, horariū quemuis & maxime
15 Meridianum illius diei præsentat, & si-
tum Eclipticæ ad eundem, vna cum situ
Macularum ad Eclipticam; quorum
proinde constitutionem pulchre iste ob-
seruandi modus exhibet. quanquam in
20 observationibus verticalibus hæc eadem
non desiderantur.



LXIX, Imago Ob-
servationum.

M.DC.XXVII.

Martij.

In Collegio Romano


Societatis

à die 2, ad

16, Martij.

Observatū mane.

D	H	D	H
2	8 $\frac{3}{8}$	9	8 $\frac{1}{4}$
3	8 $\frac{1}{4}$	10	8 $\frac{3}{4}$
4	8 $\frac{1}{2}$	12	8 $\frac{1}{2}$
5	8 $\frac{1}{4}$	14	8 $\frac{1}{2}$
6	8 $\frac{3}{4}$	15	8 $\frac{1}{2}$
7	8 $\frac{1}{2}$	16	8 $\frac{1}{2}$
8	8 $\frac{1}{2}$		



Notæ in LXX. Obseruationum Imaginem, à die
23. ad 26. Nouemb. Anno 1626. item à die
26. Maij ad 6. Iunij, Anno 1627.



I.

VNT in hoc diagrammate duo Macularum cursus, alter nimirum, a, & alter b. quorum ille contigit anno 1626. mense No-

uembri, hic anno 1627. Mensibus Maio & Iunio: vtrique fuere rectilinei ad sensum, ideoque poli & axes illorum in quibus & circa quos sunt peracti, in circulo solari iacuerunt, supposito Maculas in superficie Solis ferri. nunc de singulis breuiter.

Cursus Macula a.

Est macula, quia Macula tenuis per totum Solem non durauit, sed sensim re-
refacta, post diem 29. nullo sui vestigio comparuit: quanquam non dubito illam in aliquam faculam exarsisse, sed quia in medio Solis id accidit, minus aduerti potuit.

Diebus 25. 26. 27. 28. 29. semper aliquid duplicati habuit, tamen si die 27. id minus appareret.

Ex austro in boream transiit, in Ecliptica die 26. commorata: & quia ab eadem non multum digressa est iuxta centrum P, idcirco parallelus ipsius à Circulo seu parallelo maximo non multum abfuit. Angulus ipsius, A, 26. E, quem cum Ecliptica facit, id est angulus A B I, terminat maximam axis mobilis G H, ab axe stabili digressionem, & iterum quæ Maculae designant, obliquitates minimas; post hoc enim ea secundum chordas itinerarias augentur: nunc autem chordæ ab ipsis itineribus non distinguuntur.

Cæterum quia motuum istorum rectilineorum itinera non differunt à diametris cursum, idcirco descripsi semicircularem arcum E r F, ut emissis à centrīs Macularum in ipsum perpendicularibus 23. r, 24 s, 25 t, 26 u, 27 x, 28 y, 29 z, per interceptos arcus diurnos r s, s t, t u, u x,

II.

1 x y, y z, cursum E y F, mensurarem; qui omnibus euentilatis, dies tredecim plus minus adæquat; unde reuolutio periodica dies 26. complecteretur; de qua suo loco fusius. Isto verò mensurandi genere, in itineribus curuilineis, vti non possumus.

Macula, a, sub Sole duratio, & eius periodica reuolutio.

Cursus Macula b.

10 Hæc Macula ad diem 26. Maij vespertinum primitiū inspecta, duplex apparuit, postea suo in Solem ascensu sensim in tres, & plures, sed paruas Maculas euoluta, cum ipsis paulatim defecit, prout è dimidijs dierum interuallis clare licet intueri: nam post diem 4. Iunij in tenuissimam umbram & faculas paruas, sed satis illustres resoluta, die 6. Iunij vespertino vltimum visui patuit. Tota borealis & recto itinere incessit, prioris subcontrario, æquali ad Eclipticam inclinatione O B A. Axis circa quem incessit, fuit M N, priori G H, subcontrarius. Semicirculus K g n L, quem in superficie Solis descripsit, ex centro m, ad semidiametrum m K, vel m L, delineatus est; & si ex singulis dierum stationibus agantur perpendiculares 26 c, 27 e, 28 f, 29 g, &c. designabunt ea per arcus interceptos c d, d e, e f, f g, &c. interualla Maculae itineraria, temporibus intermedijs in tabella diaria consignatis respondentia: per quæ si arcum totum K m L, semicircularem commensures, inuenies, vt ante, dies plus minus tredecim; ex quo totus ambitus dierum 26. elicitur: non obstante, quod diameter K L, sit minor diametro E F: sed hæc hic obiter, vt sensim videas Maculas in Sole, non extra ferri: de qua re libro sequente fusius.

Macula, b, sub Sole duratio.

40 Interim hæc etiam, annota. Facularum itinera eodem prorsus modo & motu ferri, quo Macularum; quemadmodum à die 4. Iunij ad exitum vsque patet; ex quo iterum constat, ambas eadem à centro Solis remotione incedere.


Deinde

Cursus ad sensum rectilinei.

LXX, Imago Ob-
servationum.

Nouembris, 1626.

Maij, et Iunij, 1627.



I.


Deinde & hoc notandum, interualla diurna occidentalia, ab interuallis orientalibus, sensibilibus non differre. Sed & hoc non prætereundū, Maculam b, stationem suam matutinam die primo Iulij, præcisè collocauisse in ipso axe M N, ad m; quod significat mane: vnde itinerum vtrinque spatia perbelle mensurantur.

Cætera subtiliore disquisitione digna, reseruantur suis locis.

Illud ferme præterijssim, hanc, b, Maculam, prout hic exhibetur, hoc anno 1627. esse obseruatam vtroque Telioscopio, tam verticali quam Heliotropico, & vtrorumque summam locorum obseruationum concordiam esse repertam, ita vt neque vnus quidem hili discrepantia reperiretur; prout ex ipsis autographis cuiuslibet planum faciam, si ita oportuerit. Et hæc quidem in hoc tertio VRSINAE ROSAE Libro sit vltima Imaginum ex Obseruationibus congestarum hypoty-

II.


1 posis; licet non sit vltima Obseruationum: quia sicut aliorum censuram non vereor ex proprijs illorum obseruatis profectam; ita si alij suas obseruationes rite factas fideliter ediderint, à meis non dissensuras satis scio: si quo tamen casu aliqua differentia interueniret; relinquitur prudentis Lectoris iudicio, an perpetuæ tot annorum exercitationi, sub oculis & Censoribus eruditis, etiam ad conuincendos proteruos habitæ, tot tamq. varijs & quidem approbatis modis confirmatæ, cuius testem do, in his quæ hucusque propono naturam semper sibi similem, experientiâ continua temporum serie stabilem, cordato cuiuslibet exploratori examinandam, ante ferenda sit temporaria, & ad substructiones arbitrarias, naturaque propellente passim collabentes, opere tumultuario male fulciendas, properata & temere confarcinata titubantium obseruationum designata farrago.



LXX. Imago Ob-
servationum.

Nouembris, 1626.

Maij, et Iunij, 1627.



Notæ in Rosæ Vrsinæ Meditullium.

I.

Princeps So-
lis sed omne
um minime
spectabile
Phænomen-
on.



Commenda-
tar ista Phæ-
nomeni So-
laris pars,
tāquam v-
na ē præci-
pua.

ROSAE Vrsinæ Florem, i
Meditullium, ipsamque
adeo Medullam Phæno-
meni hic exhibeo; quam
ideo similibus exorno ver-
bis, quia sicut ea Rosæ
pars, quam latini *florem* appellauere, in
medio quidem existit; sed non nisi expan-
so beneque explicato Rosæ calyce prodit,
suoque odore suauissimo, atque colore
aureo, sensum hominis animumque iu-
cundissimè demulcet; ita inter omnia
Rosæ nostræ Vrsinæ Prodigia, hoc arca-
nissimum maximeque admirandum, vlti-
mo loco profertur, neq. sese in aspectum
dat, nisi summè dilatata Rosa & folijs
multū expāsis, id quod peculiari artificio
consequimur, prout mox explicabimus.

Præterea sicut flos Rosæ medium oc-
cupat & veluti ex medulla prodit; ita ea
quæ huic Phænomeno insunt, nil nisi sub-
stantiam, atq. adeo ipsissimam Solis me-
dullam redolere videntur: totam enim
aspectabilem Solis superficiem occupat,
imo in Sole, & ex Sole, præter hanc lu-
cularum, & umbrarum congeriem nil pe-
nitus spectamus vnquam, licet oculorum
acie naturali partium eiuscemodi discrimi-
mina nequaquam animaduertamus. Sed
nunc ad singulorum explicationem ac-
cedamus.

Figura. ABDL, semicircularis, refert
dimidium Circuli obseruatorij; itemque
dimidium disci Solaris patentis, adeoque
hemisphærium Globi Solaris. vbi tamen
nota, ex parte, A, ad interuallum, A, L,
aliquid deesse.

A B, Eclipticam refert; C D, axem
eiusdem fixum; & quia hoc tempore,
Maculæ, & Umbræ in Aequilibrio con-
stitere, axis illarum proprius & mobilis,
ab axe fixo, C D, non multum abfuit.
Reliquæ litteræ & numeri diuersas huius
apparentiæ partes indicant, quas proinde
in singularum explicationibus melius in-
telliges.

Partes huius Apparentiæ.

Huius appa-
rentiæ sunt
partes tres.

Sunt Umbræ, seu Maculæ Secunda-
riæ, sunt Luculæ, seu Faculæ Se-
cundariæ, sunt Plagæ Solis æqua-

II.

biles. Maculas autem, a, ad docendum
& Lectorem dirigendum adductas in-
sortem huius Medullæ non admittō, satis
eæ sunt tractatæ hætenus.

Amplitudo huius apparentiæ,

Totum occupat Solem: omne
enim spatium Solis conspec-
tum aut est æquabile, vnicolor
& vniforme, aut diuersicolor & varium,
ac difforme; si primum, habes plagas æ-
quabiles: si secundum, profiliunt Umbræ,
& Luculæ. Præter hæc in Sole nil datur
cernere.

Totum Solē
occupat hæc
apparentia.

Duratio huius apparentiæ.

DVplex potest esse de Duratione
quæstio: altera Generalis de
tota apparentia; An videlicet
ea diu sit vel fuerit? aut futura? altera
specialis & indiuidua: An nimirum Um-
bræ & quamdiu durent? an & quamdiu
Luculæ? An & quamdiu plagæ homo-
genæ? Item an & quamdiu harum sin-
gulæ?

Respondeo primo ex ijs quæ hætenus
per tot annos obseruare & deducere li-
cuit, hanc apparentiam in Sole perpe-
tuam, & veluti natiuam esse.

Apparentia
hæc in Sole
nunquam
defuit.

Respondeo, secundo, Umbrarum se-
cundariarum in Sole apparitionem videri
æternam, vt semper in ipso aliquæ sint.


Respondeo, tertio, Lucularum pariter
in Sole apparitionem, videri æternam,
quemadmodum & Umbrarum.

Respondeo, quarto, spatium æquabi-
le, quoad apparentiam perpetuam, mihi
esse dubium. fieri enim fortasse potest vt
aliquando totus Sol sit varius Umbris,
& Luculis, adeoque spatium æquabile
desit.

Respondeo, quinto, Singularum vel
Umbrarum, vel Lucularum, vel plaga-
rum homogenearum durationem esse
temporariam, eamque valde variabilem:
nam quædam Umbræ per plures dies per-
seuerant; quædam per pauciores; aliquæ
vix vno; nonnullæ horariam moram haud
superant, prout in multis inter obseruan-
dum deprehendi. Etenim frequenter
vnam,

Singula Um-
bræ, Luculæ
& plaga ho-
mogeneæ So-
lis, sunt in
continua
mutatione.

⁵ ROSAE VR SINÆ MEDI TVLLIVM, IN QVO EX NO
⁴ OBSERVANDI MODO, FACIES SOLIS ABSTRVSIOR, SEV MACVLÆ E-
³ cula Secundaria atq; adeo umbræ et lucula alternæ, solarem superficiem perpetua uariatione infide-
 A que cum sole, motu regularissimo, circumuehentes, exhibentur, à die 3, ad 16, Septembris, 1625, Romæ in domo Profe-



I.

vnam, duas, quandoque plures continuas horas huic curæ consecraui. Et hæc quidem in genere, nunc ad specialiora veniamus.

De Vmbris seu Maculis secundariis.

Vmbra Secundaria cur ita nominetur?

Affectiones varia istarum Vmbrarum.

VOco hæc Vmbras, Maculas secundarias, non ratione naturæ & existentiae, sed vel duratione, vel tenuitatis; quia Maculae primariae, cæteris paribus diutius durant, & compactiore corpulentia, atque nigrore præditæ visuntur: quorum comparatione Maculae secundariae, non Maculae sed tanquam vmbrae ad corpora reputantur.

Magnitudo, figura, situs, raritas, & densitas, itemque multitudo istarum Vmbrarum varia existit, prout in schemate indicatur. Circa margines polares rarissime spectantur: in via Macularum regia dilutæ admodum & tenues apparent: in Zona quasi media & temperata frequentes & vegetæ ebulliunt. Raro sunt sine Luculis, modo antecedentibus modo consequentibus, nunc austrinis, nunc borealibus. quandoque tamen fit vt solē incedant, æquabili Solis superficie ambitæ.

De Luculis.

Lucula.

QUæ de Vmbris dixi, applicantur eadē proportionē Luculis, nam alternis sitibus Luculae cum Vmbris, Vmbrae cum Luculis permiscuntur, & est istarum rerum varietas quotidiana incredibilis. Imaginare lacum aliquem, vel mare tranquillum, molli aura crispatum, solis fulgere illustratum; ista igitur crispatio, offert visui alternas vmbas & luces, è vario vel nullo radiorum solarium ad oculum reflexu: qualis igitur tum superficies æquoris, talis occurrit ex hac apparitione Solis. Similia ferme repræsentabuntur, si Solem per vitreas rotulas, aut planas lamineas sed minus politas, in chartam excipias: si Tubum nimium diducas; aut contrahas; si conuexam lentem nimium claudas: videbis enim hic simulachra fallacia quidem, sed Phænomenon, de quo ego, valde ementientia: quorum tamen fucum, statim scies, instrumenti rotatione &c.

II.

De Plagis æquabilibus.

A Equabiles Solis plagæ, sunt partes ita similes, vti colorum lucis & vmbrae varietatem atque commixtionē sensibilem nullam representent. Huiusmodi plagas in via regia reperire est satis arduum & insolens. circa partes polares ordinariè spectantur. Et ex quidem plagæ, quæ polos inhabitant, sunt nonnihil obscuriores medijs ordinariè: expressi illas confertis punctulis &c.

Cæterum istarum plagarum, neque magnitudo certa, neque situs, aut figura stabilis, sed modo maior modo minor euadit, prout naturæ & Auctori Solis placuit: de quibus suis locis disputandum.

Motus huius Apparentia.

ESt idem penitus cum motu Macularum, & Facularum primariae, prout crebris observationibus atque experimentis comprobauimus: hæc autem tantum exempli gratia adduco, possem enim plurima promere, sed magnitudo circuli obseruatoris, & laboris sumptusque superuacui, ab hac opera me reuocant. Omnia enim in hoc vnico exemplo satis monstrantur. Considera Maculas, a, ex die 3, in septimum Septembris adductas, & experieris illarum Cursui, cursus Vmbrarum, b, à die 3. in 12. vsque correspondere: sic Vmbrae, c, à die 8. ad 11. & d, à die 10. ad 13. e, verò, à 10. ad 12. f, tandem ab 11. ad 12. g, autem & h, vnus tantum diei fuerunt.

Alias Maculas, Faculas, & Vmbas cum hisce concurrentes, in parte boreali non pono lamine penuria: si tamē illas videre desideres, cōsule xxxix. Observationum Imaginem, anni 1625. quartam Augusti primamque Septembris: in ea inuenies cursum Maculae, c, septentrionalis, à die 3. ad 16. Septembris, huic Cursui noueris cursum Vmbrae, b, parallelum, & suo modo proportionalem fuisse: sicut & reliquarum Vmbrarum, c, d, e, f,

Cursus tamen Vmbrae, b, dies vndecim, si omnia computentur excessisse non videtur. Tabula diaria ab ea, quæ ibidem

Plaga æquabilis quid

Vmbra mora Sole.

I.

ibidem habetur, parum discrepat, unde quilibet inde tempora diurna, si volet excerptet.

*Spatiorum
aquabilium
causa.*

Cur autem circa polos solaris superficie partes, sint æquabiles & quietæ, facit parvus, & tardus motus: cur in media Zona turbulentiores, efficit motus maior & celerior, agitatioque vehementior.

Giratio Solis.

Atque ex hoc quidem ostento, vel solo, vel potissimo giratio Solis satis efficaciter probatur.

Tota quippe spectabilis facies Solis simul ut Maculæ, ut Faculæ conuertitur: unde & Solem ipsum girari dubium esse vix potest.

Portio certè polaris DEFGHIK, quotidianas suas circa centrum C, girationes, progressiones, regressiones, &c. fecit ut quælibet Macula. Sed de his alias ex professo.

Huius apparentiæ observanda modus.

Conuenit hæc observandi ratio cum Telioscopio in omnibus, præter solas lentes vitreas: nam loco lentis causæ, applicatur lens conuexa, sphaericitatis non magnæ tamen duplicatæ, ne distantia chartæ nimis remoueat, & machina observatoria ultra modum opportunum prorogetur.

Lens autem quæ Solem immediatè excipit, quo sphaera maioris maior portio extiterit, planoconuexa hoc ad negotium præsens melior censetur, cæteris paribus.

*Solarium
specierum
erectio.*

Singulare quoque huic instrumento est, quod eius beneficio Phænomenon Solis erigitur, & quæ sunt dextra in Sole, proiciuntur in dextram quoque chartæ partem, sinistra in sinistram, supra in superiorem, in inferiorem infra; oculo nimirum constituto inter Solem, & chartam: quod si ex aduerso utriusque tam chartæ quam Solis oculum ponas, tum ut Maculas in homologis sitibus tam in Sole, quam charta aspicias; oportet easdem in auersam superficiem traiectas, & consignatas esse. & hoc facto, nulla alia chartæ transpositione est opus. Hæc solarium specierum erectio, procedit etiam in tubo simili quocunque minore

II.

Porro, mirabitur fortassis aliquis, cur hanc rem tam amplo circulo observatorio præsentem? Cui ego respondeo, id non esse factum ostentationis ergo, aut fortuna, sed necessitate: nam tenues istæ phasæ sese conspectui subducunt in parvis observationum circulis, & non nisi incertis dubijsque indicijs visui occurrant; quare ut certo, & stabiliter internoscantur, exponenda fuit Rosa in magno circulo observatorio, inque folia ampla diducenda, tubo decem palmorum, binis conuexis lentibus armato. Tametsi non negem etiam communi meo observandi Telioscopio, & circulo observatorio ordinario, hæc apparentias præsertim insigniores sæpissime annotauisse: ad quod plurimum subsidij afferet, lentis primæ, in Solem directæ, clausura arctior, ita ut Sol circulo minore solito intromittatur: hæc enim res nimium lumen excludit, & sic ad istas tenues luculas & umbras discriminandas, multum iuuat teste experientia. Unde in praxi huius apparentiæ explorandæ, non tantum lentem primam oportet non nimis esse patulam, sed & alia circumstantia ab aëre lux omnis, quantum fieri potest omnino est excludenda.

*Qua arte
hæc appari-
tio etiam in
minoribus
tubis ad vi-
sum proli-
ciatur?*

DE ALIO INSTRUMENTO

*Telioscopico Heliotropico, à P. Christophoro Gruenberger recens
fabricato.*

INcapi hunc librum cum Machina Telioscopica verticali; claudam cum alia æquatoria, à P. Gruenbergero alios quidem in usus nuperime elaborata, nostris vero visibus opportunissime accommodata. Difficultates enim illæ, quæ propter motum diurnum in designandis Macularum itineribus sese hæcenus obtrudere, & labores qui toto fere priore libro exantlandi fuere, tolluntur fere omnes, nouæ huius machinæ beneficio, & maximo temporis laborumque compendio euitantur.

Nam in Machina illa verticali semper & necessario angulus quem Ecliptica cum circulo verticali facit, est indagandus (nisi quis per paralleli inductionem ad sensum procedere velit) ut situs, locus, & mo-

I.

& motus Macularum certus habeatur; in hoc vero instrumento, huius anguli neque usus, neque necessitas vlla occurrit. Illic cuilibet obseruationi inscribendum est perpendiculum, hic istorum nihil est necessarium: illic altitudo Solis supra horizontem summa cum diligentia fuit annotanda; hic ipsius usus penitus exultat: illic per multos ambages circumcundum fuerat, quoadusque in vnamquamque obseruationem, lineam Eclipticæ introducerem; hic omnia hæc nullo negotio, dicto citius fiunt: illic hæc omnia & singula oportebat præstare circa obseruationes vnius diei quascunque; hic sufficit vnam obseruationem pro die vno excolere; nam angulus pro vno die manet idem, ad sensum; itaque pro omnibus illius diei obseruationibus inseruit: illic in omni latitudine loci variantur anguli, hic manent vbique & semper iidem; prout fusius infra demonstrabitur: illic ex erroneis per inaduertentiam assumptis vel annotatis perpendiculis, necesse est fallaces Eclipticæ cum verticali linea depromi angulos; hic istorum nihil est verendum; quia angulus hic non pendet ex obseruatione, sed ex sola Tabellæ chartiferæ proba collocatione, & Macularum iusta designatione, itemque Tabulis vniuersalibus: quemadmodum postea videbitur.

Itaque Machina hæc tot difficultatibus non implicatur, quot illa; & insuper sua expeditius, & in praxi celerius absoluit quam illa. Vnde operæ precium erit, eius naturam aliquantulum scriptione explicare, siquidem id ipsemet Machinæ Architectator visus est præstare noluisse: quamuis postea non pauca suis demonstrationibus egregiè illustrarit, meque festinantem, atque ad finem operis properantem, similibus officijs, mihi in tanta temporis angustia poene necessarijs, peropportunè adiuuerit.

De Nomenclatura Telioscopij Heliotropici.

Non sum nescius Telioscopij Helioscopij usum patentissimum atque vniuersalissimum, vti successu satis declarabitur, aliud sibi nomen potuisse vendicare: nam instrumentum hoc, si axem in me-

II.


ridiano sursum & deorsum mobilem accipiat, id quod fieri haud difficulter potest, à Torqueto vniuersali, itemque Armillis Ptolomaicis, itemque horologio equinoctiali vniuersali non multum discrepabit; quia tamen usus ipsius, in hoc nostro Phænomeno solari singularissimus est, & Sol omnium astrorum adeoque Mundi rector & moderator existit; satius esse duxi, ab ipso huic Machine nomen indere, & deinde ad usus alios pro re nata accommodare.

Heliotropium autem est herba, sic dicta, quod toto die ad Solem sese conuertit: quod cum instrumento huic maxime conueniat, de nominis usurpatione, difficultas nulla poterit subesse. Axem enim con radiosi solaris ita sequitur, vt illum semper centraliter, atque directo hauriat: quare cum Solem perfectissimè sequatur, nemo Solis equæ, seu Heliotropij vocabulum illi inuidebit.

25 *TELIOSCOPII HELIOSCOPICI Fabrica.*

30 **P**RIMO. fac triangulum rectangulum abc , cuius angulus b ac , sit rectus; ac , sit angulus altitudinis poli in loco dato: complementum ipsius, siue altitudo æquatoris sit abc , axis mundi sit recta bc .

35 Secundo. Secundum normam huius trianguli, ex tigillis planatis & bene dotalis, fabrica gnomonem trigeminum, $abcde$, secundum proportionem futuræ Machinæ, tubo sustinendo idoneæ, quod prudentis artificis iudicio relinquo; 40 tigillum tamen ac , reliquis aliquanto longius oportet assumi, gnomonis sunt tigilla parallelepipeda tria, quorum duo, ac , oblongum, & de , transversum basin præstant; ab , perpendiculariter erigitur, cui in capite immittitur, asserculus quadratus fg ; at verò 45 tigillo a , inseritur alius asser hi , vtrique autem inter se sunt paralleli, & secundum planum æquatoris inclinati; unde horæ æquinoctiales huic sunt inscriptæ. in hisce duobus asserculis tanquam 50 polis versatur columella octogona kl , (quæ tamen cylindrica, seu figuræ alterius



**Telioscopii, siue Telioscopii Heliotropici figura; qua
 Rina Macularum Cursus absq; ullo perpendicularo, aut laboriosa
 Ecliptica ad verticalem Circulum inclinatione aquiritur.**

I.

rius esse potest) cuius axis KbI , cum axe mundi (astronomicè saltem) congruit.

Tertiò. Columellæ KI , in superiore parte circa I , inhaeret orbis, seu discus mln , ad ipsius columnæ crassitiem; huic immissa sunt duo excisa sphaeræ frusta, superius $opqr$, & inferius $stux$, in quorum limbis pq , & tu , inscripti sunt radij Zodiaci, secundum gradus signorum, pro capacitate videlicet instrumenti: medietas autem signorum in circulo ascendente annotata est ex q , versus p , ab initio Capricorni, ad finem Geminorum; altera medietas semicirculi descendens consignata est, vel in dorso eiusdem limbi, vel in margine inferiore, ex u versus t , per sex signa descendens, à Canceri initio, per Leonem, Virginem, Libram, Scorpionem, in finem usque Sagittarij.

Quartò. Huic exciso Zodiaco, circumponitur alia machina, circa clauum I , tanquam axem & polos pendula & versatilis, composita est hæc machina vel ex vno continuo affere, sed secundum crassitudinem Zodiaci exciso, vel ex tigillis parallelepipedis quattuor $yz\alpha\beta$; tigillo $\alpha\gamma$, immissum est aliud ad angulos rectos $\gamma\delta$, item aliud perpendiculariter assurgens $\alpha\epsilon$: Tigillo $\beta\delta$, insertum est tigillum ϵ , tigillo ϵ , æquidistans; item tabella chartifera θ , $\iota\kappa\lambda$. Tigillo $\gamma\delta$, alligatus est tubus opticus $\mu\nu\xi$, qui radios solares $\sigma\pi$, deferret in chartam θ , sub circulo $\nu\phi\chi\psi\omega$, per conum radio-

sum $\mu\nu\phi\chi\psi\omega$.
Sunt autem huius instrumenti, Tabellam chartiferam, & Tubum sustentis anguli $zy\psi$, & $yz\gamma$, itemque $\alpha\gamma\theta$, recti, lineaque yl , & axis $\alpha\mu\theta$, inter se paralleli.

Officia singularum partium.

Tigilla ac , & de , sunt totius machinae bases: quarum ac , lineam meridianam, de , æquinoctialem refert.

Tigillum ab , præsentat lineam verticalem, secundum quam erigitur, si perpendicularum AB , apici subiecto B , directè respondet. Idem Tigillum ab , vna cum base ac , sustinet columnam bK , & per ipsum totum instrumentum $\alpha\epsilon\gamma\delta\iota$, pensile, & versatile circa axem bK , in polis b & K .

II.

Tabella hiK , in plano æquatoris extensa, gestat horas æquinoctiales, quas index C , in plano horario iacens, & cum eodem circumuolutus monstrat observationis tempore.

Tabella fg , continet axem Kb , & coarctat vndique, ne excidere aut aliorum quam in gyrum moveri valeat.

Columnæ Kbm , officium est signiferum pu , gestare; axem mundi referre; & motu diurno Solis loca in Zodiaco annotata circumducere. eadem columna portat etiam instrumentum seu Ferculū pro Tabella chartifera & tubo sufferendo, radioque excipiendo aptatum.

Ferculum $yz\delta$, tribus præcipuis fungitur muneribus.

Primò, Tabellam chartiferam θ , sustinet.

Secundò, Tubum Opticum $\mu\xi$, fixum tenet.

Tertiò, Radium Solis & visus aptè dirigit. Hinc haud ineptè posset ista pars Radius Telioscopicus appellari.


Tabella chartifera chartam θ , nitidam & sine plicis expansam gestat, cui inscriptus est circulus observatorius $\nu\phi\chi\psi\omega$. cuius centrum α , in axe solaris coniuncto op , iacet, qui axis axem mundi KI , in solo æquatore ad angulos rectos secat, alias semper obliquè: diameter $\nu\chi$, refert circulum horarium in quo Sol versatur, & in eodem iacet plano in quo index horarius C : diameter $\phi\psi$, refert æquatorē; totus vero circulus $\nu\phi\chi\psi$, Solem designat, eiusque centrum α , præstat.

Tubus Opticus $\mu\xi$, vel Solem deferret in chartam, vel oculum in Solem: prout adhibueris lentes.

Duo pinnacidia ϵ , & η , radium Solis per foramina α , & η , traiciunt in oppositum pinnacidium γ , & sic instrumentum ad debitam Solis altitudinem & loco debito Zodiaci constituunt.

DE ALIA HUIUS INSTRUMENTI
compositione & forma.

Cum hanc meam fabricæ descriptionē legeret P. Gruenbergerus, monuit hanc quidem se non improbare, aliter tamen compositurum fuisse eiusdem instrumenti partes, si iterum fabricandum foret: nimirum sic, ut instrumentum non penderet in aëre liberum ex axe bK , quæ res



Heliotropii Telioscopici, siue Telioscopii Heliotropici figura; qua
 Machina Macularum Cursus absq; ullo perpendiculari, aut laboriosa
 Ecliptica ad uerticalem Circulum inclinatione aquiritur.

I.

res in obseruando vacillationem & tremorem facile affert; sed vt totum incumberet plano firmo æquinoctiali, ad datum locum erecto: quale esset in data machina planum $g f$, si quaqua uersus extensum esset: iam si totus excisus asser $p q t u$, Zodiacum inscriptum habens, protensus cogiteretur secundum lineam $m b$, vt priori insistat, & apud b , immissus sit, & circumgirari queat: reliquis inuariatis; habebitur forma ad hunc vsum commodior, ob euitatam trepidationem. Cætera minutiora ingeniosus Lector facile assequetur, & sponte adiiciet.

Vsus totius Telioscopii Heliotropici.

Dum singularem huius instrumenti commoditatem, quam in obseruatione Macularum habet, perpendo, ausim dicere eius primarium ac principalem vsum esse, vt Solem in chartam deducat, & Macularum progressionem propriam exhibeat, immediate absque laboriosa illa reductione, quæ in instrumento verticali interuenire solet. prout insinuatum est in prioribus, & patebit ex infra dicendis.

Alij verò eiusdem Machinæ vsus sunt, & quidem varij, pro ratione Tubi optici accommodandi.

Nam primò. Si adhibueris Helioscopium, vitra nimirum colorata, aspicias Solem toto quasi die, sine sensibili radij mutatione.

Secundò. Si adhibueris Telioscopium, intueberis simili modo Lunam, & Venerem, & alios planetas.

Tertiò. Accomodabis eundem ad stellas fixas, quarum cursum diurnum sine errore & stellæ amissione, aut laboriosa inquisitione assequeris; nam Tubus in parallelum ipsius constitutus, eundem tenebit toto die. vnde ad diurnam siderum inspectionem erit modus hic accommodatissimus, quia stellæ locus reperitur absque errore. & hunc maxime vsum ait se præcipue intendisse P. Gruenberger, cum hoc æquatorium elaboraret, &c. sed refractione videtur huic negotio offectura, &c.

Quartò. Idem instrumentum ad Solem per vnum conuexum excipiendum, meo quidem iudicio, non erit inhabile, si

II.

Tabella chartifera multum elongetur.

Quintò. Seruit pro Horologio vniuersali, per totum terrarum orbem, si planum æquatoris mobile fiat.

Sextò. Præstat vsum armillarum, à quarum substantia parum differt, &c.

Praxis Obseruandi per Heliotropium.


Vt rectè obseruetur debet Machina hæc in plano horizontali constitui ad libellam, quod fit beneficio trium clauorum striatorum $D E F$, qui clauæ G , posunt circumuerti, quo fit vt basæ $a c$, & $d e$, eo vsque totum Gnomonem librent, donec perpendicularum B , apici suo directissime superpendeat. tunc enim tigillum $a b$, vertici loci respondebit.

Deinde oportet in plano horizontali $H I K$, inuentam & positione descriptam esse lineam meridianam $H K$, siue huic parallelam $L M$, & ad harum alterutram oportet applicari latus $M N$, tigilli $a c$: his habitis rectè stat instrumentum. Quod si linea Meridiana non habeatur, poterit adhiberi virgula, seu acus Magnetica approbata, pyxidi quadratæ inclusa, simul lineam magnetis, simul meridianam in fundo horizontali consignatam habenti, pro illa regione.

Postea statue radium $y z$, ad locum Solis in Zodiaco $p q$, vel $t u$, prout tempus, & ratio anni id postulabit.

Tum tandem gira totum Heliotropium in polis b , & k , & inuenies Solem ingressurum in chartam sub circulo $\phi \psi$, illicque Maculas & Faculas non tantum lustrabis, sed & notabis pro tuo libito: quod si quotidie obseruando perrexeris, acquies cursum Macularum intentum, absque vlla alia praxi molesta, vel operosa.

Cæterum quia Sol in Ecliptica quotidie suos progressus, & semper novos cum circulo horario angulos facit; hinc fit vt ipsa Ecliptica in Circulo obseruatorio per centrum quidem sub forma lineæ rectæ accidat, situ tamen seu loco semper alio atque alio. cum enim, circulus horarius quem Sol insidet, semper per centrum Solis, & polos axemque Mundi incedat, ipsius in charta lectio per lineam $v x$, representata toto anno inuariata manet: & tamen eius ad



Heliotropii Telioscopici, siue Telioscopii Heliotropici figura; qua
 Machina Macularum Cursus absq; ullo perpendiculo, aut laboriosa
 Ecliptica ad uerticalem Circulum inclinatione aquiritur.

I.

II.

ad Eclipticam inclinatio quotidie mutatur; igitur necesse est in charta Eclipticæ sectionem mutari, & modo accedere ad horarium νx , modo recedere ab eodem; accessum autem & recessum hunc acquirimus ex angulis sphaericis, quos duo isti circuli inter sese toto anno faciunt.

Et quamquam singula augmenta & decrementa horum angulorum parua existant; nihilominus tamen, quia Macularum Solarium in patente hemisphaerio transitus intra duodecim & quattuordecim dies ordinariè absoluitur; euenire potest, ut tot dierum fluxu magno loci & situs mutatio fiat. Quare ut verus & genuinus Macularum motus acquiratur, necesse est Circuli horarij ad Eclipticam inclinatione cognoscere quouis anni die; sic enim facile Eclipticam ad situm & statum in circulo obseruatorio immobilem reuocabimus, Macularumque motum proprium apparentem agnoscemus.

Porro hanc Eclipticæ in charta variam proiectionem haud difficulter apprehendes, si Solem in circulum meridianum animo constituas, & tunc circuli obseruatorij communem cum Eclipticæ plano sectionem consideres. id autem maxime ostendent Coluri solstitiorum & æquinoctiorum. Sole enim in Solstitijs constituto, semper Eclipticæ in charta situs erit rectus ad Meridianam; in æquinoctijs vero maxime obliquus, idque modo in boream, modo in austrum, prout mente circulos caelestes imaginanti, & oculo sphaeram materialem inspiciēti statim ad sensum patebit. Causa autem horum omnium est, positio Eclipticæ in vniuerso atque ad æquinoctialem obliqua. Nam si mundi polis accommodata esset, ista varietas non haberet locum.

Inuestigatio Anguli, quem ad quoduis punctum Eclipticæ facit Circulus horarius vel Meridianus cum Eclipticæ.

Ad hoc quod hic quaeritur, multis vijs peruenitur, e quibus eam primo omnium monstrabimus, quæ licet sit propter nimiam abstractionem abstrusior, est tamen omnium rectissima, quippe quæ desiderata ipsis etiam in minutis spectanda proponit, ea est numerica, quæ

per Canones triangulorum, sinuum, tangentium & secantium perficitur, atque Astronomis tam familiaris & obuia, ut absque numeris nihil non expediant, quod in obseruationibus Astronomicis sit alicuius momenti.

In hac ergo figura sphaerica Colurus Solstitiorum sit $abcd$, poli mundi a, c , æquinoctialis, b, d ; Ecliptica $fe g$. puncta æquinoctialia γ , vel α ad e , puncta solstitialia σ , & ϕ ad f, g .

Punctum autem o , sit quoduis aliud punctum Eclipticæ, & per ipsum ex polis mundi a , intelligatur incedere circulus $a o h$, nimirum circulus declinationis puncti o , qui est quoque vnus aliquis ex horarijs, cuius arcus $h o$, est arcus declinationis, & $o a$, eiusdem declinationis complementum. & $e h$, est arcus ascensionis rectæ arcus Eclipticæ $e o$; & in triangulo sphaerico $e h o$, angulus h , est rectus. $h e o$, angulus maximæ declinationis, mensuratus ab arcu $h o$; & demum angulus $h o e$, est ille qui hic inquiritur: continetur enim ab Eclipticæ $e o$, & horario $h o$, ad punctum o .


Hunc angulum ut canonicè exhibeamus, supponimus in triangulo sphaerico $e h o$, ea quæ vltro dantur, nimirum angulum maximæ declinationis $h e o$, & arcum Eclipticæ propositum $o e$, qui hic opponitur angulo recto h , & ideo usurpari solet nomine basis.

Data autem basi in triangulo sphaerico vna cum alterutro angulorum non rectorum, dantur canonicè reliqua, atque adeo in hoc triangulo $e h o$, latus $h o$, quod metitur declinatione puncti o ; & latus $e h$, quod metitur ascensionem rectam arcus Eclipticæ $e o$, necnon angulus o . singula ex problematis sphaericis singulis, iuxta Problema 15. Clauij in suis Triangulis sphaericis, quod ita se habet.

Dato arcu in Triangulo rectangulo, qui recto angulo opponitur, cum alterutro angulorum non rectorum, inquirere alterum angulum non rectum, & duos arcus circa angulum rectum.

Sed quia hic solum angulum o , inquirimus, rectius consulitur Problema eiusdem Clauij 3. in quo ad finem primi Libri Astrolabij, nimirum Lemmatis 53. docet in triangulo sphaerico rectangulo, inquirere angulum ex base & altero angulo recto, in hunc modum:

Fiat



Fiat ut sinus totus anguli h, } ad { sinum complementi basis e h.
Ita tangens anguli dati h e o, } ad { ad 4. nempe ad tangentem
complementi anguli o.

EXEMPLVM.

Basis, e o. Grad. 19°
Angulus e. Grad. 23.min.30.

Sinus totus 100000
Sinus Compl. 94552
Tangens 43481
94552
756416
378202
283656
378208

Angulus o, gr. 67. 39. cuius tangens compl. est 411121551

I.

Atque hac ratione per singulos Eclipticae gradus, imo minuta quaelibet poteris indagare angulos inclinationum, qui fiunt cum Ecliptica & circulo declinationis aut horario, tempore quolibet totius anni, idque assequeris non absque magno compendio, si semper tangentem 43481, quæ semper est eadem, per alterum numerum multiplices, imo si semel hic numerus 43481. ducatur seorsim, in omnes novæ figuras numericas, 1234.&c. habebuntur omnes summæ multiplicationis particulares, eademque descriptæ suis locis, iuxta regulas multiplicationis, non erit opus nisi additione, & collectione in unam summam.

Vt autem tota unius integri anni varietas per gradus singulos Eclipticae habeatur, non est opus totam Eclipticam, aut omnia ipsius signa peruadere, sed sufficit trium signorum, & 90. graduum primi quadrantis angulos exhibere calculo. Unus enim idemque angulus communis est quattuor punctis Eclipticae æqualiter à punctis cardinalibus remotis, ut videre est in sequenti Tabula.

EXPLICATIO TABVLAE.

Procedit hæc Tabula per integros signorum gradus, ab γ , per signorum consequentiam progrediendo, duo signa opposita coniunguntur, qualia sunt γ & ω ; δ & m ; π & t : & similiter habentur coniuncti characteres signorum oppositorum in infima Tabulae sede. Series columnarum erectarum sunt quinque.

Prima ex parte sinistra numerat gradus uniuscuiusque signi, ad 30. usque: & est communis omnibus signis tam borealibus, quam australibus supra transuersim notatis, primi & tertij quadrantis, & descendunt numeri deorsum per gradus infra litteram G, supra positam.

Secunda Columella, complectitur numeros gradibus singulis è regione debitos gradui Columellæ primæ, dum Sol in γ , vel ω , versatur.

Sic Columella tertia, quæ & media, comprehendit numeros, qui respondent gradibus lateralibus, columnæ primæ, quando Sol δ & m , decurrit.

Quando vero Sol π , & t , insidet, inferunt series numerorū quarta. Ethactenus quidē descendendo. Nam si ascēdimus,

II.

eadem columnæ & numeri iidem seruiūt ad signa in infima parte Tabulae posita, qualia sunt, ω & t , Ω & m ; m & X ; in quibus dum Sol versatur, numeratio graduum sursum instituitur, in columella quinta, ad gradus 30. usque. E quibus omnibus, per se patescit,

TABVLA

Pro angulo, quem Ecliptica facit cum Circulo declinationis.

	γ	ω	δ	m	π	t	
G	G	M	G	M	G	M	G
0	66	30	69	22	77	44	30
1	66	30	69	34	78	6	29
2	66	31	69	46	78	28	28
3	66	32	69	58	78	50	27
4	66	33	70	11	79	12	26
5	66	35	70	24	79	35	25
6	66	37	70	37	79	58	24
7	66	39	70	71	80	21	23
8	66	42	71	5	80	45	22
9	66	46	71	20	81	9	21
10	66	49	71	35	81	32	20
11	66	53	71	50	81	57	19
12	66	56	72	6	82	21	18
13	67	2	72	21	82	46	17
14	67	7	72	38	83	10	16
15	67	12	72	55	83	35	15
16	67	19	73	12	84	0	14
17	67	25	73	29	84	27	13
18	67	32	73	47	84	50	12
19	67	39	74	5	85	15	11
20	67	47	74	23	85	41	10
21	67	54	74	42	86	6	9
22	68	3	75	1	86	32	8
23	68	11	75	20	87	1	7
24	68	20	75	40	87	24	6
25	68	30	76	0	87	50	5
26	68	39	76	20	88	16	4
27	68	49	76	41	88	42	3
28	69	0	77	2	89	8	2
29	69	11	77	23	89	34	1
30	69	22	77	44	90	0	0
G	X	m	Ω	⊖	⊕	⊙	G

I.

Vsus Tabulae, & descriptio Eclipticae in Circulo obseruatorio.

Nam si scire desideras, quemnam angulum cum Ecliptica faciat circulus horarius, quem Sol insidet, signum & gradum signi accipe in Tabula, & si signum est vnum è supernis, gradum numerabis in serie prima descendendo; si ex infernis, accipies gradum in serie postrema ascendendo, & ytrimque transuersim ex inueto signi gradu intrabis in tabulam, donec in numerum sub signo dato directo collocatum incidas; is enim enuntiabit anguli quæsiti quantitatem in gradibus & minutis; quem applicabis deinde ex horario C D, in circulo obseruatorio A B C D, vel superne è puncto C, vel inferne ex D, idque vel ad dextram, vel ad sinistram; prout ratio temporis & situs ipse atque processus Macularum satis edocuerit.

Angulus autem hic nunquam est maior quadrante Circuli, nunquam minor complemento maximæ Solis declinationis. In exemplo:

Exemplum practicum.

In Imagine Obseruationum 95, quæritur ad diem 2. Martij, angulus quem Ecliptica facit cum horario C D, in circulo obseruatorio A B C D. Ingressus Ephemerides anni 1627. inuenies die 2. Martij Solem versari in gradu 11. X. igitur cum X, sint in Tabulae parte inferiore, ascendes in serie postrema, ad 11. vsque gradum, è cuius regione inuenies in columna secunda quibus X, subiacent, gradus 67. minuta 39. Hæc applicata ex C, versus A, in quadrante A C, dabunt Eclipticam pro illo die 2. E 2. & angulum quæsitum C E 2.

Modus Analemmaticus prædictum angulum inueniendi.

Diuertemus nunc à via illa canonica, quam diximus rectissimam, & numerorum tenebras commutabimus cum luce Geometrica: & quidem vt pluribus hoc nostro labore satisfiat, nimirum ijs, qui libentius inter lineas versantur & circulos, quam inter ignotos numerorum labyrinthos; figuram assumimus sphaericam eandem, cum superiori figura nu-

II.

mero I. sed non amplius triangulum e h o, sed eius loco triangulum a o f, quod etiam rectangulum est, propter rectam a f o. In hoc enim triangulo angulus a o f, æqualis est angulo e o h, quem canonicè hætenus inuestigauimus, & hic analemmaticè nitimur inuestigare, hoc est, per circulos sphaeræ orthogonaliter alicui plano impressos; quemadmodum factum est à Ptolemæo in suo Analemmate, & à Ioannè de Roas in suo Astrolabio Catholico, seu vniuersali: in quibus omnes circuli sphaeræ alteri plano perpendiculariter impressi, vel exprimuntur per lineas rectas, vel circulares, vel ellipticas. Illi enim qui plano sunt paralleli, omnes proijciuntur in lineas circulares, & qui ad idem planum sunt recti, omnes in lineas rectas; & reliqui omnes ipsi plano obliqui exprimuntur per Ellipses: quorum demonstratio non est huius loci, atque in Astrolabijs versatis satis per se nota.

Conabimur ergo triangulum sphaericum a o f, rectangulum analemmaticè exprimere, eoque artificio metiri geometricè angulum a o f, vel certè eius complementum, hoc est angulum a o t, quem cum circulo declinationis a o, seu cum horario facit circulus longitudinis t o. Hunc enim in finem notatus est in coluro solstitiorum a b c d, ad punctum t, alter saltem polarum Zodiaci t, ex quo educti circuli maximi, qualis est t o, omnes sunt recti ad Eclipticam, ita vt certum sit angulos t o f, t o e, esse rectos: & consequenter angulum a o t, esse angulum complementi a o f.

Descripsimus autem præterea ex polo o, hoc est ex ipso angulo quæsito, per punctum a, circulum minorem i a K, vt in ipsa sphaera exprimeretur mensura angulorum a o f, a o t, seu a o K, a o i, nempe arcus a K, a i. Quamuis enim huiusmodi mensura proprie sumatur penes circulos maximos, qualis esset, qui ex polo o, describitur, per punctum t, eo quod o t, sit quadrans, possunt tamen etiam accipi, per circulos eorundem maximorum parallelos, qualis est i a K. & ratio est, quia omnes circuli ex eodem polo descripti secantur à circulis maximis per eundem polū traiectis proportionaliter.

Anguli autem sphaerici semper sunt homologii illis angulis rectilineis penes quos sumi-

I.

fumitur inclinatio circulorum, constituē-
tium angulum sphaericum: hoc est, tam
angulus hic sphaericus, quam ille rectili-
neus mensurantur arcubus circulorum
æqualibus vel similibus. Sed hæc suffi-
ciat maioris intelligentiæ gratia præmi-
sisse. nunc ad constructionem problema-
tis accedamus.

*Constructio Problematis in
secunda figura.*

Centro E, describatur pro arbitrio cir-
culus vel semicirculus BOC, sectus in
suos quadrantes per orthogonalem EO.

Arcus BD, CG, fiant æquales maxi-
mæ declinationi, G. 23. M. 30. & per
rectam DG, abscindatur, semidiameter
EH, circuli HA, qui vnus & idem in-
seruit omnibus arcubus Eclipticæ, potest-
que vocari Polaris, quia in sphaera, cuius
semidiameter est EB, æqualis est circu-
lis polaribus.

Vt autem analemmaticè exprimat
triangulum sphaericum aof, arcus HA, 25
fiat æqualis vel similis arcui Eclipticæ fo,
& ex puncto A, ad diametrum BC, ap-
plicetur recta AL, æqualis semidiametro
EB, in quam transferantur etiam seg-
menta AM, ML, facta à semidiametro
EO, hoc est, EN, sit æqualis, ipsi AM,
vel NB, ipsi ML. & denique ex N, eri-
gitur perpendicularis NP, quæ pro men-
sura anguli aof, abscindit ex quadran-
te BO; arcum BP, & pro angulo com-
plementi, aot, arcum PO.

Demonstratio.

Ad euitandam confusionem linearum 40
intelligentur in hac tertia figura maiore
eadem omnia præstita, quæ in secunda,
& pro demonstratione producat in pri-
mis recta EA, abscindatque arcum OF,
similem arcui HA, seu arcui Eclipticæ fo, 45
qui in prima figura constituit angulum
rectum ofa, cum complemento maxi-
mæ declinationis fa. Cum igitur in
Analemmate etiam recta EF, eo quod
referat circulum maximum per polum
circuli BOC, hoc est per E, constituat
angulum rectum cum arcu OF, ad pun-
ctum F, manifestum est, eandem EAF,
representare circulum fad; imò pars 50

*Demonstra-
tio in figura
tertia.*

II.

1 ipsius AF, referet ipsum arcum af.
Cum enim EA, æqualis sit EH, sinui
maximæ declinationis; si ex A, supra
EF, erigatur perpendicularis AQ, ab-
5 scindetur arcus FQ, complemento ma-
ximæ declinationis æqualis. idem vero
arcus FQ, si vna cum linea AQ, seu
potius, si totum segmentum AFQ, con-
cipiatur erectum supra planum analem-
10 matis BOC, cadit perpendiculariter in
rectam AF: ergo AF, representat ve-
rè complementum maximæ declinatio-
nis, hoc est arcum af.

Atque hinc sequitur tertium arcum,
15 qui cum arcubus OF, FA, perficit tri-
angulum simile triangulo afo, quiue
respondet arcui ao, necessario terminari
ad puncta AO. Hoc est, tertius iste
arcus OA, erit arcus Ellipsis descriptæ,
20 circa semiaxem EO, per punctum A,
qualem hic cogitemus esse OAN: hoc
enim sufficit ad præsentem demonstra-
tionem. Neque dubium est, si ex N, vbi
hæc Ellipsis secatur EB, erigatur perpendi-
25 cularis NP, abscindi arcum BP, metien-
tem angulum NOB, seu AOF, atque
adeo triangulum aof. arcus enim ON,
OB, referunt quadrantes, & recta EB,
refert circulum maximum descriptum
30 ex polo O, vbi constituitur quæsitus an-
gulus AOF, & recta NB, refert arcum
BP, cadit enim perpendiculariter in ipsam
BP, si segmentum NBP, intelligatur e-
rectum supra planum Analematis BOC.
35 Sed quia necdum constat hanc rectam
EN, quæ est semiaxis minor Ellipsis OAN
eandem esse cum illa, quam in constru-
ctione fecimus æqualem segmento AM,
hoc iam est denique demonstrandum;
40 sed non est opus pluribus, iam enim hoc
ipsum demonstratum est lemmate 50.
primi libri Astrolabij Clauiani: nimirum,
si ex quouis puncto Ellipsis, verbi gratia,
ex A, applicetur ad minorem axem, si
opus sit productam, recta AL, æqualis
45 semiaxi maiori EO, eam ita secari ab eo-
dem semiaxe maiore, vt segmentum
AM, semper sit æquale semiaxi minori
EN. Ergo, &c. quod erat demonstnan-
50 dum.

Quoniam vero in sphaera non solum
per circulos maximos mensurantur angu-
li sphaerici, sed etiam per circulos mino-
res, vt prædiximus, qualis in prima fi-
gura

I.

omnes secari ab Ellipsi proportionaliter. Quare sinus EN , ad suam semidiametrum EB , eandem habet proportionem, quam sinus AI , ad suam semidiametrum IK , & idcirco arcus PO , similis est arcui RS . &c.

Eadem demonstratur aliter.

Vel certe independenter à demonstratione sic. Recta KAI , refert circulum minorem descriptum ex polo O , per punctum A , nimirum Quadrantem $i a K$; quia arcus AO , respondet arcui ao , & quando quadrans IRS , concipitur re-
ctus ad planum analemmatis, tunc arcus KRS , est ille qui in sphaera describitur, ex eodem polo O , per punctum, quod repraesentatur per A , hoc est is, qui describetur per punctum R , hoc enim cadit perpendiculariter in A : ergo arcus RS , cuius sinus rectus est AI , respectu sinus totius IK , est ille, qui in sphaera metitur angulum, quem faciunt duo circuli repraesentari, per OI , OA ; & RB , ille, qui metitur angulum, quem ad O , constituunt arcus repraesentati, per OA , OK .

COROLLARIUM I.

Ex hac constructione, demonstrationeque patet, si in aliquo Quadrante EBO , exaratae essent analemmatice omnes Ellipses omnium nonaginta graduū, ipseque Circellus, vel saltem eius Quadrans HT , diuisus similiter in suos, haberi posse illico, vno quasi eodemque intuitu angulos quæsitos, pro singulis gradibus Eclipticæ, numerando arcus Eclipticæ inchoatos ab initio Y , vel α , à puncto T , versus H , vel eorum complementa ab H , versus T . Gradus enim analemmatici inter B , & N , terminum Ellipseos transeuntis per punctum Eclipticæ A , meriuntur quæsitum angulum BOA , & reliqui gradus NE , eiusdem complementum, hoc est angulum AOE .

Quadrans Astrolabij Frisiani facilius apparibilis, idem præstat.

Sed hoc sufficit hic vel obiter insinuas-
se, rari enim sunt huiusmodi Quadrantes, ob difficilem descriptionem tot Ellipsiū. Quare eius loco posset adhiberi Quadrans Astrolabij, Gemmæ Frisij, in quo pro Ellipsibus describuntur facilius & accuratius arcus circulorum qui idem habent officium, quod Ellipses in Astrolabio Ioannis de Roias.

Verum in huiusmodi Quadrante Fri-

II.

fiano Circellus HA , non describitur interuallo sinus maximæ declinationis, sed alio multo minore, nimirum interuallo EV , quod abscindit ex EO , occulta linea CD , ducta ab extremitate diametri BC , ad terminum arcus maximæ declinationis BD : Quadrantis autem hoc modo descripti & more solito diuisi in suos gradus, vsus est idē, qui quadrantis HT .

COROLLARIUM II.

Insinuatur in hac eadem constructione satis aperte, declinationes punctorum Eclipticæ æque bene haberi posse beneficio circelli polaris AH , ex centro Analemmatis descripti, quam beneficio circelli, quem in eundem finem suo in Analemmate describit Ptolemæus, præsertim quando alicuius puncti Eclipticæ in particulari declinatio desideratur. Describit enim Ptolemæus, eodem quo nos interuallo, nimirum sinu maximæ declinationis, hoc est, centro X , interuallo XD , circulum per D , cuius hic expressimus vnum tantum Quadrantem, DY , qui procul dubio æqualis est, nostro Quadranti HT . Sumpto autem quouis puncto Z , in Quadrante DY , cuius punctum D , respondet punctis solstitialibus, & Y , æquinoctialibus, agit Ptolemæus per punctum Z , rectam ZK , parallelam diametro BC , demonstratque arcum BK , esse arcum declinationis puncti Z , cuius distantia à puncto solstitiali D , sit arcus DZ , & à puncto Aequinoctiali Y , arcus YZ . Quis autem non videt, si iidem arcus numerentur in Quadrante TH , à punctis H , T , vsque ad A , & per punctum A , agatur IAK , parallela ipsi BC , huiusmodi parallelam abscindere ex circulo BOC , eundem arcum BK ? Coincidet enim necessario cum ZK , vt patet, si ex Z , A , intelligantur cadere duæ perpendiculares in rectam BC : erunt enim æquales, quia sunt situs duorum arcuum æqualium YZ , TA ; & parallelæ, quia sunt rectæ ad eandem BC , & ideo etiam AZ , parallela eidem BC .

Cæterum noster circellus ex centro E , descriptus, videtur secum auferre hoc commodi, quod in ipsum facillime transferri queant, quicunque arcus Eclipticæ, beneficio circuli BOC . Sumpto enim vncunque puncto F , vel numeratis quibusque

I.

quoque posse angulum a , & si tertius arcus $a o$, hoc est basis, seu latus recto angulo oppositum, aliunde non haberetur, per praxin hic expositam haberi posse, quæ sic paucis hic insinasse est satis.

INSTRUMENTVM PRACTICVM ex dictis.

Porro ut res hæc in praxi facillima, & absque vlllo arithmeticae concursu peragi valeat, construxi instrumentum HFDC, cuius beneficio acquies vtrumque angulum, tam illum quem facit horarius cum Ecliptica, quam ipsius complementi, idque solius regulæ & circini beneficio.

Instrumentum autem hoc complectitur duos quadrantes ex eodem centro E, descriptos, maiorem ECD, ad interuallum EC, liberum, cuius limbus ex parte D, excurrit in F, pro maxima Solis declinatione habenda, cuius finis F, per ductam parallelam FH, dat mihi mensuram quadrantis minoris EHKI, cuius arcum HKI, diuido in 90. æquales gradus, postea duplici discreto limbo, ordino in ipsos signa Zodiaci, initio facto ab γ , & H, tribuendo cuilibet signo 30. gradus. coniungo autem signa homologa, ut γ & α ; δ & η ; π & τ : tum eodem modo retrogrado ordine, σ & ρ ; Ω & ω ; μ & χ : quibus perfectis, si gradibus marginalibus adscripsisti numeros, perfectum est instrumentum: cuius vsus facillimus est iste, quem exemplis tribus explicabo.

*Exemplum
primum.*

Sol versatur in gradu 19. γ : item in gradu 11. χ : item in 19. α ; item in 11. η : quæritur angulus complementi, quæ facit Ecliptica dictis temporibus cum circulo horario quem insidet? Ut quæsit o satisfacias, ingredi limbum parui quadrantis, & inuenies vnicum punctum K, quod omnibus propositis temporibus satisfaciet: nam in illud incidit gradus 19. γ & α ; item 11. η & χ : ex hoc ergo puncto applicata semidiameter ED, vel EC, dabit sinum KM, cui ex E, æqualis EN, abscissa, dabit parallelam NO, adeoque angulum complementi OED, qui ex D, ad interuallum DO, abscissus ex arcu semicirculi CD, in P, vsque, relinquet angulum quæsitum PEC, quem facit horarius HEC, cum Ecliptica EP, quæsito tempore. quantitatem

II.

autem anguli determinatam OED, dabit numerus ad P, inuentus, qui est, gradus 67. minuta plus minus 40.

*Exemplum
secundum.*

Alterum exemplum eodem modo desumptum est, ad gradum 30. δ vel η ; initium Π aut τ ; item ad 30. σ , vel ρ ; initiumque Ω & ω : nam hæc omnia signa illud vnicum punctum, Q, commune habent, ex quo demissa semidiameter QL, in EC, dabit rectam QM, quæ traducta ex E, in N, offeret parallelam ER, & hæc ex puncto R, ostendet quæsitum complementi angulum RED, omnibus prædictis signis in loco assignato conuenientem, quantus autem in gradibus & minutis iste angulus sit, enunciant notæ numerales, limbo inscriptæ, quæ ostendunt gradus 12. minuta plus minus 15. Arcum ergo DR, si circino ex D, abstuleris ex quadrante CD, in S, vsque; relinquetur arcus CS, qui terminabit angulum SEC, cuius quantitatem indicabunt numeri limbo inscripti, gradus videlicet 77. minuta 40. & amplius.

Exemplum tertium & vltimum desumptum est, ex gradu 30. Π , & τ ; itemque initio σ & ρ ; cui loco deseruit recta IL, quæ cum à semidiametro E, nusquam secetur, parallela nulla alia erit quærenda, quam ipsamet semidiameter ED: vnde angulus complementi nullus, ideoque residuus totus erit DEC, adeoque in σ , & ρ , faciet horarius cum Ecliptica, angulum rectum.

*Exemplum
tertium.*

Alius modus Geometricus, Eclipticam in Observationum Circulum importandi, & angulos prædictos utrosque inueniendi per descriptionem radiorum polarium radiis Zodiaci similium, quorum vsus apud Astronomos & præsertim Gnomonicos est quotidianus.

In circulo Heliotropij Observatorio ω , circa semidiametrum ω , v.g. describe radios polares; ad eundem prorsus modum, quo describi solent radij Zodiaci, per singulos signorum gradus, & fecisti intentum: nam ipsorum ope simul Eclipticam, simul ambos angulos, quos horarius cum Ecliptica in dato quolibet Solis loco & gradu Signi, continet, dicto citius, venaberis.

Per radios autem polares intelligo sectiones, quas planum per loca Solis & polos

INSTRUMENTVM ECLIPTICAM, ET AN-

gulos quos Ecliptica cum circulo
horario seu Meridiano per totum annum
facit; eorumque complementa, dicta citius,
geometricè indagandi



I.

los Eclipticæ incedens, ad circulum obseruatorium rectum, totius anni quot diebus communes facit; earum autem descriptio sic fit.

*Descriptio
Circelli po-
laris, & ra-
diorum po-
larium.*

*Radij pola-
res ex motu
annuo, deri-
uati.*

Est circulus obseruatorius, in figura 4 ABCD, quæ in centro E, intersecant ad angulos rectos duæ diametri, AC, & BD: ut igitur prædicti radij designentur circa semidiametrum AE, ex A, numeretur vtrinque poli Eclipticæ à polo mundi distantia, maximæ Solis declinationis æqualis gr. videlicet 23. min. 30. in F, vsq. & G, quæ bifariam secabitur ab AE, in puncto H; quo facto centro, si ad interuallum HF, vel HG, describatur circulus FIGK, erit is circulus polaris, circulo ad maximam Solis declinationem describi solito, æqualis, quem circulum polarem polus Eclipticæ annuè designat: huius igitur circuli singuli quadrantes ILMG, KLMG, ILMF, KLMF, diuidendi sunt in 90. gradus (ego hic tantum per initia signorum processu, vitandæ confusionis ergo) & per singula diuisionum puncta L, M, &c. agenda vtrinque rectæ LL, MM, parallelæ ad rectam IK, secabunt enim eæ diametrum FG, in punctis vtrinque N, & O; per quæ si emittantur rectæ ex E centro, EN, EO, ite EF, EG, erunt ipsæ radij polares quæ sit, quos circulus per polos & locum Solis transiens in circulo obseruatorio efficit.

Notandum vero est hanc radiorum descriptionem à me factam esse, intuitu ipsius motus annui, quo axis & polus Eclipticæ, polum mundi circuit; hinc enim fit ut radij aliam denominationem sortiantur, quam in ordinaria illorum descriptione fit; in qua radius EA, æquinoctijs, & Y, atque α , initijs competit, radij vero EF, & EG, debentur α , & β ; hic autem nomenclatura permutatur; nam radius EA, est α , & β , communis, extremorum vero EF, debetur Y, & EG, α ; quare hoc? quia Sole in Solstitijs existente, axis & poli Eclipticæ versantur in ipso Coluro solstitiorum, & ob eandem causam Eclipticæ sectio, ab axe semper quadrante remota, est in circulo obseruatorio BD, sectio vero quam planum per axem facit est AC; in æquinoctijs autem, radius polaris EF, pertinet ad Y; EG, ad α ; hinc ut radio-

II.

rum, ita angulorum & arcuum permutationem tibi imaginaberis. Nam angulus NEA, non respondet angulo complementi inclinationis is Eclipticæ ad Horarium vel Meridianum, illius puncti vel arcus Eclipticæ, pro quo parallela LL, abscindit arcum declinationis AP, more illam indagandi visitato.

Ut enim habeatur declinatio alicuius puncti Eclipticæ beneficio Circelli IFKG, accipitur illius puncti distantia ab alterutro punctorum æquinoctialium, & in circello IFKG, numeratur ille arcus à punctis I, K, quæ respondent Y, & α , nimirum arcus IL, I L. ducta enim LL, abscindit arcum declinationis AP, illi arcui vel puncto Eclipticæ congruentem. At hic in præfenti negotio arcus IL, est ille, qui in sphaera numeratur à punctis solstitialibus α , & β ; illi enim arcui vel puncto Eclipticæ responderet angulus NEH: qui tamen non est angulus quem facit meridianus cum Ecliptica in illo puncto, sed est eiusdem complementum. vnde sequitur angulum ipsum esse angulum BEN. & arcum Eclipticæ ab æquinoctio numeratum, esse FL, cuius declinatio, non est arcus AP, sed arcus AQ, ut patet, si arcus FM, FM, intelligantur æquales arcui FL, & parallela MM, secet arcum AF, in Q.

Hanc pernecessariam animaduersionem, cum P. Gruenberggerus in principio non attendisset, vidissetque angulum NEA, nullo modo respondere arcui IL, cuius declinatio est AP, de ipsa praxi non solum dubitauit; sed etiam ut falsam reiecit. Verum ubi permutationem arcuum, de qua dictum est, & calculos adhibuit, illico expertus est, hanc praxin geometricam, à ratione triangulorum sphaericorum canonica, & à Problemate 3. superius citato nequaquam dissentire.

Quapropter, cum eam varijs elegantibusque modis solidissime demonstrauerit, quæ non tantum huc, sed ad alios quoque vsus Mathematicos inferuire possint, placuit eas, (reiectionis meis in aliud tempus & locum opportunum) huc apponere: ne praxis opinione eiusdem, digna omni luce, sine demonstratione videret lucem.

*Declinatio
cuiusq. pun-
cti Eclipti-
cæ, ut habea-
tur?*

*Cautela no-
tatu digna.*




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 7. Casus
primus.Fig. 7. Casus
secundus.Fig. 7. Casus
tertius.

Fig. 8.





Fig. 9.



Ad Lectorem admonitio.

Vt stili, & auctoris diuersitatem aduerteres, ea quæ sequuntur, continuata serie
sine columnis sunt impressa.

Demonstratio Prima P. Christophori Gruen- bergeri, Canonica, ex Analogia figuræ quintæ.

*Propositio-
nis & figu-
ra Quinta
explicatio.*



*Veritas pra-
xeos demon-
stratur per
Problema 3
Triangulo-
rum sphari-
corum.*

EX præcedente quarta figura, repetitur hic in figura quinta, Qua-
drans ABE, cum IFH, Quadrante Circelli IFKG; & licet hic
arcus AF, non sit maximæ declinationis, accipitur tamen vt talis, 10
sic autem figura est expeditior. Arcus vero FL, intelligitur esse
arcus Eclipticæ, ab Y, numeratus, u. g. vsque ad initium Π , erit-
que LI, eiusdem complementum; & ducta LN, parallela IR, e-
rit NH, sinus arcus LI, respectu sinus totius HF; & ducta recta
EN, constitutus erit, iuxta præcepta huius problematis, angulus NEH, angulus com- 15
plementi inclinationis Meridiani, & Eclipticæ, Sole existente in principio Geminorum,
si vera est praxis præmissa. Esse autem veram, demonstrabo hic ex analogia problema-
tis Tertij Triangulorum sphaericorum, ex qua superius huiusmodi anguli canonicè sunt
inuenti, nimirum ex eo, quod ita sit tangens maximæ declinationis ad tangentem com-
plementi, anguli inclinationis quæsitæ, vt sinus totus ad sinum complementi arcus Ecli- 20
pticæ dati, & à puncto æquinoctiorum numerati.

Ducatur ergo tangens AyZ, eamque secent, EF, EN, ZY, eritque AZ, tan-
gens anguli maximæ declinationis FEA, & AY, tangens anguli, per constructionem
inuenti, nempe anguli NEH, respectu sinus totius EA. Respectu vero sinus totius
HF, erit NH, vt prædiximus, sinus arcus LI, hoc est, sinus complementi, dati arcus 25
Eclipticæ FL. Cum igitur propter parallelas, AZ, HF, vt HF, sinus totus ad KN,
sinum complementi arcus FL, ita sit AZ, tangens maximæ declinationis ad AY, tan-
gentem AEY, & ex huiusmodi analogia per 3. problema citatum, inueniatur tangens
complementi anguli quæsitæ; erit procul dubio AY, tangens illa, quæ per 3. proble-
ma, exhibet angulum complementi anguli quæsitæ, & ideo etiam, angulus NEH, cu- 30
ius tangens est AY, erit complementum eiusdem anguli quæsitæ. Ergo, &c. quod
erat faciendum & demonstrandum.

LEMMA AD DEMONSTRATIONEM SEQUENTEM.

Circa diametrum FRG, in figura Sexta, circuli vel semicirculi FIG, descriptus sit
alius circulus BOCV, centrum habens E, quod erit in semidiametro IR, &c. perpen-
diculari ad FG, & ex quouis puncto K, semicirculi FIG, demittatur in diametrum
FG, perpendicularis KD, seu parallela ipsi IRE, iunctaque ED, & protracta secet
circulum BOC, in P, V, & QR, sit sinus rectus arcus OP. Denique ex K, applicetur 40
ad FG, KX, æqualis semidiametro EB, eamque secet IR, in S.

Dico rectam KS, æqualem esse sinui PQ.

Quadrata enim EP, KX, sunt æqualia, & Quadrato KX, sunt æqualia DK, DX, er-
go etiam Quadratum EB, æquale est Quadratis DK, DX. Est autem Quadratum
EP, æquale rectangulo PDV, vna cum Quadrato ED, per secundam secundi, eo quod 45
PV, secunda sit bifariam in E, & non bifariam in D. Ergo quadrata DK, DX, sunt æ-
qualia rectangulo PDV, vna cum quadrato ED. Est autem rectangulum PDV, æ-
quale rectangulo FDG, & hoc æquale quadrato DK. Ergo duo quadrata, DK, DX,
sunt æqualia quadratis, DK, ED, ablatoque communi DK, reliquum DX, æquale
reliquo ED, rectaque DX, æqualis ED. Sed vt ED, ad DR, ita est EP, ad PQ, 50
propter parallelas DR, PQ, vtque XD, ad eandem DR, hoc est, vt EP, ad PQ, ita
est KX, ad KS, propter parallelas DK, RS, ergo vt EP, ad PQ, ita KX, ad KS,
suntque EP, KX, æquales, ergo & PQ, KS, quod erat demonstrandum.

COROL.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.





Fig. 7. Casus
primus.Fig. 7. Casus
secundus.Fig. 7. Casus
tertius.

Fig. 8.




Fig. 9.

COROLLARIUM.

Quare præter EP, KX, quæ sunt æquales per constructionem, constat ex demonstratione, æquales etiam esse, tum PQ, KS, tum BD, DX.

DEMONSTRATIO II.

Circellus F IG, qui in præmissis Lemmate fuit arbitrarius, intelligatur nunc in eadem 6. figura descriptus intervallo sinus maximæ declinationis respectu sinus totius EB, hoc

est

*Explicatio,
& compara-
tio figurarū*

*Demonstra-
tio.*

est arcus BF. OG, intelligantur esse G. 23. M. 30. & arcus FK, statuatur esse arcus
Eclipticæ ab Aequinoctijs numeratus, & KI, eius complementum, ita enim fiet, vt hic
recta KD, respondeat in figura 4. rectæ LN, & angulus DER, angulo NEH, & vtro-
bique inuentionis praxis sit eadem, nimirum illa praxis geometrica, quam secundo lo-
co ad quartam figuram tradidimus. Prior vero Analemmatica exposita ad secundam
& tertiam figuram, repræsentatur hic per explicationem rectæ KX, perque intersec-
tionem cum semidiametro perpendiculari RI, ad punctum S. Nihil enim refert quod illic
circellus maximæ declinationis TAH, quem etiam hic expressimus, cum sua applica-
ta AML, descriptus sit circa cētrum E, hic vero eius loco descriptus sit Circellus
FKI, omnia enim vtroque sunt constituta similiter, & ideo applicatæ non possunt
non secari eodem modo, in punctis MS, à semidiametris EH, RI; vt patet si semidia-
meter ET, superponatur semidiametro RF, & circulus TAH, inclinetur super cir-
culum FKI, congruent enim sibi mutuo propter æqualitatem, & punctum A, puncto
K, & EH, ipsi KI, & AL, KX, tunc erunt eadem, sed & puncta M, S, eadem, &c.
in re autem tam manifesta, non est opus diutius immorari. Quoniam igitur AM, per
demonstrationem praxis analemmaticæ est sinus complementi anguli quæsitī, & RS,
æqualis, vel potius eadem quæ AM, ipsique KS, per lemma præmissum æqualis sit
PQ, erit etiam PQ, sinus complementi anguli quæsitī, est autem PQ, sinus anguli
PEQ, seu DER, quem hic ostendimus inuentum esse, per posteriorem praxin Geo-
metricam. Constat igitur vtrâque praxi inueniri vnum eundemque angulum, atque
adeo praxi explicata ad figuram quartam, ex vi huius demonstrationis rectè inueniri
angulum complementi; anguli quæsitī. Ergo, &c. quod erat demonstrandum.

Theoria & fundamentum, sequentium Demonstrationum.

*Quilibet E-
cliptica qua
drans Cardi-
nalis, exhi-
bet omnē va-
rietatem tri-
angulorum
sphericorū,
&c.*

Varietatem non solum Declinationum vniuersam, sed etiam Inclinationum Eclipticæ
ad Meridianum, aliosque circulos horarios & Horizontes rectos, eandem esse in omni-
bus quadrantibus Eclipticæ cardinalibus, satis est manifestum in sphaera, ita vt mirum
videri non debeat, si in posterum in explicatione problematis propositi, vsurpauerimus
semper primum quadrantem inter initia γ , & ϖ , interceptum. hoc enim posito expri-
mentur commodius anguli & triangula sphaerica, quæ nunc contemplanda hic propo-
nere decreuimus, vtque confusionem euitemus, reducemus varietatem omnem ad tres
casus, quorum primus & secundus considerabunt puncta γ , & ϖ , in meridiano posi-
ta, & tertius quodlibet aliud punctum intermedium, in eundem Meridianum trans-
latum.

Explicatio figura primi casus.

Meridianus in hac figura 7. casus primi, est ABC, Polus mundi A, circellus ipo-
laris DGF, cuius quadrantes sunt DP, FP. BEC, æquinoctialis, eiusque quadran-
tes BE, CE, & consequenter E, polus meridiani ABC. & hæc sunt perpetua & om-
nibus tribus casibus communia.

Ecliptica in hoc primo casu est HMC, in quo punctum Arietis H, ponitur in Meri-
diano, ideoque coniunctum puncto æquinoctialis B. NGE MI, est circulus maximus
qui in omnibus tribus casibus describitur ex puncto Eclipticæ posito in meridiano, estq.
disco Solari parallelus, & in hoc primo casu transit per polum mundi A, & tam in hoc,
quam in reliquis transit semper per polum Eclipticæ G, qui semper existit in circello
polari DPF, & per polum Meridiani E, & ex Ecliptica & Meridiano semper abscindit
quadrantes, quales hic sunt BM, BN, BI. Denique arcus BG, vel HG, est quadrans
circuli longitudinis puncti Arietis H.

Dictum 1. His ita constitutis. Dico Primò. In hoc primo casu parallelum disci solaris, seu hori-
zontem solarem, hoc est, circulum maximum NEI, esse Colurum solstitionum; transit e-
nim per polos mundi, & Eclipticæ, hoc est, per AG.

Dictum 2. Dico Secundò. Polum Eclipticæ G, hic coincidere, cum puncto quadrantis P. Cum
enim circellus DPF, sit parallelus æquatori BC, & circulus Meridianus AB, & circu-
lus




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.





Fig. 7. Casus
primus.Fig. 7. Casus
secundus.Fig. 7. Casus
tertius.

Fig. 8.




Fig. 9.

lus A E I, abscindant quadrantes, F P, B E. Itaque in hoc casu circulus A E, idem cum N E, abscindet etiam Colurus solstitorum N E M I, eundem quadrantem F P. Est autem ad sectionem Coluri & paralleli polaris, Polus Eclipticæ: ergo polus Eclipticæ G, coincidit hic cum puncto P.

Dico Tertio. Tam arcus M I, G E, quam B M, N G, esse æquales. Sunt enim G M, E I, quadrantes, & ablato communi E M, remanent æquales E M, N G. Immo E M, N G, sunt complementa æqualium M I, G E, propter quadrantes E A, E I.

Dico quarto. In hoc casu angulum inclinationis Eclipticæ ad Meridianum esse complementum maxima declinationis, & vice versa, complementum inclinationis esse angulum

Dicitur 3.

Dicitur 4.

ipsiusmet

ipsiusmet maximæ declinationis. Angulus enim inclinationis Meridiani BI , & Eclipticæ HM , est MHI , eiusque complementum EHM . Cumque HI , HM , HE , sint quadrantes, erunt MI , EM , arcus angulorum MHI , MHE . Sed EM , est arcus maximæ declinationis, & MI , ipsius complementum. Ergo, &c. quod erat demonstrandum. Et hoc est, quod in hoc primo casu præcipue prætenditur.

Explicatio figuræ secundi casus.

In hac figura septima secundi Casus, punctum Eclipticæ O , in meridiano positum, est punctum $\odot$, & ideo Meridianus coincidit cum Coluro solstitiorum, & Polus Eclipticæ G , coincidit cum puncto D . & punctum Arietis H , coincidit cum polo Meridiani E , qui est in æquinoctiali, & distat à Meridiano quadrante BE . Sed & arcus Eclipticæ OH , est quadrans, neque potest terminari ad æquinoctialem, nisi ad punctum E . nam à puncto E , ad O , est similiter quadrans.

Circulus quoque maximus, & disco solari parallelus, descriptus ex polo O , transit hic necessario per D , eo quod secetur per polum G ; & transit per punctum EH , & ideo punctum N , in quo secat Meridianum, debet coincidere cum punctis E & H . Denique arcus longitudinis puncti O , hoc est quadrans GO , hic est idem cum quadrante meridiani DO , & angulus inclinationis Eclipticæ OM , cum Meridiano OI , est angulus re-
ctus MOI , subtensus à quadrante MI , & angulus complementi eiusdem anguli incli-
nationis, quam deberent metiri arcus EM , NG , propter coincidentiam punctorum
prædictam, est nullus, & hoc est, quod in secundo casu, demonstrandum fuit.

Vnde constat neque in hoc, neque in priori casu, inuestigationem anguli quæsitæ indigere peculiari praxi, siquidem hic est rectus, & complementum ipsius nullum, & illic definitur, per complementum maximæ declinationis, & ipsammet maximam declinationem, quæ ultro dantur.

Explicatio tertii casus, in figura Septima.

Meridianus ABC , æquinoctialis BE . circellus polaris DF . respondet superioribus, reliqua licet procedant eadem methodo, qua præcedentia, variant tamen ex parte figuram, & offerunt plura Triangula spherica, diligentius perpendenda. Circulus $NGEMI$, est iterum circulus maximus disco solari parallelus Sole constituto in O . GO , est quadrans longitudinis puncti O . EO , quadrans circuli maximi ad meridianum, & ad circulum disco solari parallelum rectus; & $OHML$, est Ecliptica recta ad eundem circulum $NGEMI$, in puncto M ; & secans æquinoctialem BC , in H . Et quia hic versamur circa primum quadrantem Eclipticæ, punctum O , erit vnum aliquod punctorum, inter initia Y , & $\odot$. esto initium, Π , ita ut arcus Eclipticæ interiectus inter O , & principium Y , sit graduum 60. nempe arcus OH . punctum enim H , sumpsimus etiam in superioribus figuris pro initio Y .

Dictum 1. Dico igitur primo, hoc punctum H , cadere inter O , & M . Est enim OM , quadrans, & OH , minor quadrante.

Dictum 2. Dico secundo, punctum N , esse inter A & D . Meridianus enim AB , transiens per punctum O , metitur declinationem puncti O , per arcum OB , estque hæc declinatio minor maxima declinatione, nempe arcu AD . Est autem AN , æqualis OB , quia quadrantes BA , ON , sunt æquales, & arcus AO , communis ergo etiam AN , erit minor AD .

Vnde sequitur parallelum disci solaris NGE , secare circellum polarem infra P , & polum Eclipticæ G , cadere intra quadrantem DP . Punctum enim P , existit in circulo AE , ut vidimus in primo casu.

Dictum 3. Dico tertio. Tam MI , GE , quam EM , NG , esse æquales sicut erant æquales in primo casu, in secundo enim casu, arcus EM , NG , evanescunt. A polo enim Meridiani E , ad ipsum meridianum, hoc est ad I , & N , sunt quadrantes EI , EN , & ex polo G , usque ad punctum Eclipticæ M , est itidem quadrans, ergo dempto communi EM , remanebunt, æquales MI , GE , & dempto communi GE , æquales EM , NG .

Iam vero ut ad angulos quæsitos, atque ad ea quæ conducunt ad eorundem inuestigationem




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7. Casus primus.




Fig. 7. Casus secundus.




Fig. 7. Casus tertius.




Fig. 8.




Fig. 9.

gationem proprius accedamus. Dico III. Arcus MI, GE , metiri ipsos angulos quæsitos, et EM, NG , eorundem complementa. Sunt enim MI, GE , arcus angulorum æqualium MOI, GOE , quorum ille continetur meridiano OI , & Ecliptica OM , & arcus EM, NG , Sunt arcus angulorum æqualium EOM, NOG , qui sunt prædictorum complementa, suntque omnes arcus OI, OM, OE, OG, ON , quadrantes ergo MI, GO , metiuntur angulos quæsitos, & EM, NG , eorundem complementa.

Consideratio, & usus quorundam Triangulorum sphericorum Theoriae tertii casus. Triangula spherica rectangula quæ faciunt ad determinationem angulorum quæsitorum, hic tria
uu reperio

reperio ad verticem H, dico; HDO, HME, & tertium ad arcum NG, ducendo arcum AG, scilicet triangulum ANG. in triangulis BHO, HME, anguli ad verticem H, sunt anguli maximæ declinationis elati. ad B, & M, sunt anguli recti, quia æquinoctialis HB, est rectus ad meridianum OB. & vice versa Ecliptica HM, recta ad Horizontem solarem EM, & in triangulo BHO, Datur præterea arcus Eclipticæ HO, numeratus ab γ , & in triangulo MHE, arcus eiusdem Eclipticæ HM, qui est complementum prioris HO, eo quod OM, sit quadrans, estque HM, latus adiacens angulo dato, & in priori triangulo arcus HO, est basis, seu arcus oppositus recto B. Itaque in istis duobus triangulis, ita se habent latera circa angulos maximæ declinationis ad punctum H, ut arcus unus, sint complementa alterius. toti enim arcus BE, OM, sunt quadrantes, & MH, est complementum HO, & HE, complementum arcus HB, & vice versa isti sunt complementa illorum.

Triangulum BHO.

In Triangulo BHO, id quod quaeritur est angulus HOB, inclinationis Eclipticæ HO, ad meridianum OB, & potest haberi per tertium problema iam sæpius citatum, & in simili triangulo adhibitum, in quo angulus propositus inquiritur ex basi, & altero angulo non recto, hoc est ex basi HO, graduum 60. & angulo BHO. graduum 23. m. 30. si enim fiat, ut sinus totus, ad sinum complementi basis HO, hoc est ad sinum reliqui arcus HM; ita tangens anguli BHO, ad quartum; producit tangens complementi anguli HOB, hoc est tangens anguli EOM, atque adeo tangens arcus EM, qui sublatus ex quadrante EI, relinquit MI, arcum anguli HOB.

Calculationem ipsam hic non exhibeo, quia eiusdem analogiæ exemplum iam datum est superius.

Triangulum MHE.

In triangulo vero MHE, licet diuersa sint quæ dantur excepto angulo MHE, & loco anguli HOB, quaeratur arcus EM; & aliud sit problema datis accommodatum, nimirum problema XI. in quo inuestigatur latus, nempe EM, ex altero latere HM, & altero angulo non recto MHE, qui lateri quaesito opponitur, nihilominus in idem recidunt utriusque problematis analogiæ, si rectè expendantur, & idem est quod per illas acquiritur, scilicet tangens arcus EM. analogia. n. problematis XI. ita se habet.

Ut sinus totus ad sinum lateris HM, cuius loco in præcedenti analogia problematis tertij, erat; ita sinus totus ad sinum complementi basis HO, ubi manifestè apparet secundum terminum utriusque analogiæ esse eundem: sinus enim complementi basis HO, est sinus rectus lateris HM.

Ita tangens anguli dati, utrobique eadem, ad tangentem arcus EM, quæ eadem est cum quarto termino analogiæ præcedentis, tangens enim complementi anguli HOB, hoc est arcus MI, est tangens arcus EM.

Alia inuentio Anguli quaesiti, noua & expeditissima per Tabulas declinationum, & ascensionum rectorum.

*Inclinatio-
nes horario-
ræ ad eclipti-
cam habentur
à Tabulis Declina-
tionum, &
Ascensionum
rectarum.*

In iisdem triangulis BHO, MHE, aliud quippiam aduerto obseruatione haud indignum, & fortassis non ita facile obuium, nisi una se se obrutui obtulissent. Ex eo enim, quod arcus unus trianguli sint complementa alterius, video arcum EM, haberi posse immediatè, ex tabulis declinationum, & ascensionum rectorum. Ex tabula enim ascensionum rectorum, habetur arcus HB, ascensionis rectæ arcus Eclipticæ HO, numerati à puncto arietis H, quo inuento, habetur etiam eiusdem arcus HB, complementum HE, qui si in triangulo rectangulo HME, putetur esse arcus Eclipticæ, erit arcus EM, eiusdem declinatio. Dato autem arcu Eclipticæ ab γ , vel α , hoc est à puncto H, numerato, potest haberi eiusdem arcus declinatio, ex tabula declinationis.

Ergo




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.





Fig. 7. Casus
primus.Fig. 7. Casus
secundus.Fig. 7. Casus
tertius.

Fig. 8.




Fig. 9.

Ergo absque vlla operatione Arithmetica si ad manus sint prædictæ duæ tabulæ, potest haberi in hunc modum complementum anguli quæsitæ.

Et hanc ob causam libuit ad finem huius libri apponere vtramque, tabulam, alteram decerptam ex sphæra Clauij, quæ offert declinationes; alteram ascensionum rectarum, computatam à P. Gruëmbergero, & vtramque per quina minuta Ecliptica procedentem.

Triangulum ANG.

I N Triangulo ANG, angulum N, esse rectum conuincitur ex eo quod ar-

uu 2 cus

reperio ad verticem H, dico; HDO, HME, & tertium ad arcum NG, ducendo arcum AG, scilicet triangulum ANG. in triangulis BHO, HME, anguli ad verticem H, sunt anguli maximæ declinationis elati. ad B, & M, sunt anguli recti, quia æquinoctialis HB, est rectus ad meridianum OB. & vice versa Ecliptica HM, recta ad Horizontem solarem EM, & in triangulo BHO, Datur præterea arcus Eclipticæ HO, numeratus ab γ , & in triangulo MHE, arcus eiusdem Eclipticæ HM, qui est complementum prioris HO, eo quod OM, sit quadrans, estque HM, latus adiacens angulo dato, & in priori triangulo arcus HO, est basis, seu arcus oppositus recto B. Itaque in istis duobus triangulis, ita se habent latera circa angulos maximæ declinationis ad punctum H, ut arcus vnus, sint complementa alterius. toti enim arcus BE, OM, sunt quadrantes, & MH, est complementum HO, & HE, complementum arcus HB, & vice versa isti sunt complementa illorum.

Triangulum BHO.

In Triangulo BHO, id quod quaeritur est angulus HOB, inclinationis Eclipticæ HO, ad meridianum OB, & potest haberi per tertium problema iam sæpius citatum, & in simili triangulo adhibitum, in quo angulus propositus inquiritur ex basi, & altero angulo non recto, hoc est ex basi HO, graduum 60. & angulo BHO. graduum 23. m. 30. si enim fiat, ut sinus totus, ad sinum complementi basis HO, hoc est ad sinum reliqui arcus HM; ita tangens anguli BHO, ad quartum; producit tangens complementi anguli HOB, hoc est tangens anguli EOM, atque adeo tangens arcus EM, qui sublatus ex quadrante EI, relinquit MI, arcum anguli HOB.

Calculationem ipsam hic non exhibeo, quia eiusdem analogiæ exemplum iam datum est superius.

Triangulum MHE.

In triangulo vero MHE, licet diuersa sint quæ dantur excepto angulo MHE, & loco anguli HOB, quaeratur arcus EM; & aliud sit problema datis accommodatum, nimirum problema XI. in quo inuestigatur latus, nempe EM, ex altero latere HM, & altero angulo non recto MHE, qui lateri quaesito opponitur, nihilominus in idem recidunt vtriusque problematis analogiæ, si rectè expendantur, & idem est quod per illas acquiritur, scilicet tangens arcus EM. analogia. n. problematis XI. ita se habet.

Ut sinus totus ad sinum lateris HM, cuius loco in præcedenti analogia problematis tertij, erat; ita sinus totus ad sinum complementi basis HO, vbi manifestè apparet secundum terminum vtriusque analogiæ esse eundem: sinus enim complementi basis HO, est sinus rectus lateris HM.








Ita tangens anguli dati, utrobique eadem, ad tangentem arcus EM, quæ eadem est cum quarto termino analogiæ præcedentis, tangens enim complementi anguli HOB, hoc est arcus MI, est tangens arcus EM.

Alia inuentio Anguli quaesiti, noua & expeditissima per Tabulas declinationum, & ascensionum rectorum.

*Inclinatio-
nes horario-
rũ ad eclipti-
cam habentur
à Tabulis Declina-
tionum, &
Ascensionum
rectarum.*

In iisdem triangulis BHO, MHE, aliud quippiam aduerto obseruatione haud indignum, & fortassis non ita facile obuium, nisi vna se se obrutui obtulissent. Ex eo enim, quod arcus vnus trianguli sint complementa alterius, video arcum EM, haberi posse immediatè, ex tabulis declinationum, & ascensionum rectorum. Ex tabula enim ascensionum rectorum, habetur arcus HB, ascensionis rectæ arcus Eclipticæ HO, numerati à puncto arietis H, quo inuento, habetur etiam eiusdem arcus HB, complementum HE, qui si in triangulo rectangulo HME, putetur esse arcus Eclipticæ, erit arcus EM, eiusdem declinatio. Dato autem arcu Eclipticæ ab γ , vel α , hoc est à puncto H, numerato, potest haberi eiusdem arcus declinatio, ex tabula declinationis.

Ergo



Ergo absque vlla operatione Arithmetica si ad manus sint prædictæ duæ tabulæ, potest haberi in hunc modum complementum anguli quæsiti.

Et hanc ob causam libuit ad finem huius libri apponere vtramque, tabulam, alteram decerptam ex sphæra Clauij, quæ offert declinationes; alteram ascensionum rectarum, computatam à P. Gruëmbergero, & vtramque per quina minuta Ecliptica procedentem.

Triangulum ANG.

In Triangulo ANG, angulum N, esse rectum conuincitur ex eo quod ar-

cus NG, seu circulus NEI, suum polum O, habent in Meridiano NAO, & licet præter basim AG, quæ, est arcui maximæ declinationis æqualis, nihil aliud offerat ut datum, latus tamen AN, potest quoque numerari inter data; est enim declinatio arcus Eclipticæ HO, dati, hoc est æqualis arcui OB. Dato autem arcu Eclipticæ ab æquinoctio numerato, excerpi potest ex tabula declinationum (quæ copiosissima habetur apud Claviium in secundo capite sphaeræ, quamue ad finem huius libri spectabis) declinatio desiderata, atque adeo definiri arcus AN. Data autem basi AG, & latere AN, inuenitur per problema VII. triangulorum sphaericorum quæ, ut diximus, habentur ad finem primi libri Astrolabij, latus NG, hoc modo.

Fiat ut sinus totus, ad sinum complementi basis, hoc est ad sinum Graduum 66. min. 30. eo quod ipsa basis sit arcus maximæ declinationis, Graduum 23. min. 30. ita secans lateris AN, hoc est secans declinationis per tabulam inuenta ad numerum quartum.

Quartus enim numerus per regulam Trium inuentus, est sinus complementi lateris NG, hoc sinus arcus GE, MI: quem constat metiri angulum quæsitum MOI

Inuentio arcus NG, Geometrica per lineas.

Cæterum idem arcus NG, & quidem ad nostrum propositum problema accom- modatus, exhibetur etiam geometricè hoc modo.

Figura octava explicatio.


In Octava figura ex centro R, describatur portio circuli respondentis meridiano NAF, ita ut AF, sit arcus maximæ declinationis, & AN, arcus declinationis debitus arcui Eclipticæ proposito, hoc est arcui HO, & ex eodem centro R, nempe ex centro sphaeræ describatur eodem interuallo, alia portio circuli NE, quæ licet hic sit in eadem superficie plana, cum meridiano NAF, potest tamen concipi ad meridianum recta, ita ut in sphaera, & in præcedenti figura tertij casus respondeat parallelo disci solaris NGE, qui in sphaera est Horizon obliquus, habens altitudinem poli arcum AN.

In isto Horizonte solari NE, inuestigandum est punctum G, ex his, quæ data sunt in triangulo sphaerico ANG.

Primo igitur demitto ex puncto A, in semidiametrum RN, perpendicularem Aa, & ex eodem puncto A, ad eandem semidiametrum applico rectam AT, æqualem chordæ AF. Deinde centro a, interuallo a T, describo arcum circuli secantem arcum NE, in G, sicque inuenio punctum G, & arcum NG, quem dico æqualem esse arcui NG, vel EM, præcedentis Theoriæ.

Sed prius demonstro circulum descriptum ex a, interuallo a T, secare arcum NE. Declinatio enim AN, minor est maxima declinatione AF, & chorda AF, hoc est, AT, maior chorda AN, & ideo angulus TNA, seu aNA, maior angulo ATA; & vice versa, angulus NAA, complementi, anguli aNA, minor complemento aAT, anguli ATA. Cum igitur respectu sinus totius Aa, recta aT, sit tangens anguli aAT, & aN, tangens anguli aAN, erit aT, maior quam aN, & idcirco circulus TG, descriptus ex a, interuallo a T, secabit arcum NE, abscindetque aliquem arcum NG, qui in figura tertij casus, abscinditur à circello polari DPF, ita ut arcus AG, interceptus inter polum A. & punctum G, sit arcus maximæ declinationis, & recta inter eadem puncta AG, sit chorda eiusdem maxime declinationis. Vnde hic in octava figura demonstrandum est meridiano NAF, existente ad Horizontem Solis NE, perpendiculari; rectam AG, in sublimi ductam, esse æqualem chordæ AF, vel applicatæ AT. Nectatur aG, & aV, sit ad ipsam aG, perpendicularis, & æqualis aA, nectaturque VG. Quoniam igitur aT, aA, sunt æquales aG, aV, & anguli contenti sunt recti, erit VG, æqualis AT. Cumque meridianus NAF, rectus sit ad Horizontem NE, erit & Aa, ad eundem Horizontem recta, sicut & recta aV, si triangulum rectangulum GaV, concipiatur ad eundem Horizontem rectum. Vnde sequitur in tali constructione, rectas perpendiculares aA, aR, coire in vnam rectam, & propter æqualitatem earundem, coalescere quoque in vnum punctum VA, atque adeo rectam AG.

Tunc



Tunc fore eandem cum VG , sed VG , ostensa est æqualis chordæ AF , ergo etiam AF , est eidem chordæ æqualis, & punctum G , erit illud ipsum, quod in sphaera in eodem Horizonte definit arcus maximæ declinationis AG , seu circellus polaris DEF .

LEMMA AD III. DEMONSTRATIONEM.

DEMONSTRATA. Hac ultima praxi, qua proximè in Figura Octava inuenimus arcum NG , Posset hic immediatè subiungi demonstratio

cus NG, seu circulus NEI, suum polum O, habent in Meridiano NAO, & licet præter basim AG, quæ, est arcui maximæ declinationis æqualis, nihil aliud offerat ut datum, latus tamen AN, potest quoque numerari inter data; est enim declinatio arcus Eclipticæ HO, dati, hoc est æqualis arcui OB. Dato autem arcu Eclipticæ ab æquinoctio numerato, excerpri potest ex tabula declinationum (quæ copiosissima habetur apud Clavium in secundo capite sphaeræ, quamue ad finem huius libri spectabis) declinatio desiderata, atque adeo definiri arcus AN. Data autem basi AG, & latere AN, inuenitur per problema VII. triangulorum sphaericorum quæ, ut diximus, habentur ad finem primi libri Astrolabij, latus NG, hoc modo.

Fiat ut sinus totus, ad sinum complementi basis, hoc est ad sinum Graduum 66. min. 30. eo quod ipsa basis sit arcus maximæ declinationis, Graduum 23. min. 30. ita secans lateris AN, hoc est secans declinationis per tabulam inuenta ad numerum quantum.

Quartus enim numerus per regulam Trium inuentus, est sinus complementi lateris NG, hoc sinus arcus GE, MI: quem constat metiri angulum quæsitum MOI

Inuentio arcus NG, Geometrica per lineas.

Cæterum idem arcus NG, & quidem ad nostrum propositum problema accom-

Figura octava explicatio.


modatius, exhibetur etiam geometricè hoc modo. In Octava figura ex centro R, describatur portio circuli respondentis meridiano NAF, ita ut AF, sit arcus maximæ declinationis, & AN, arcus declinationis debitus arcui Eclipticæ proposito, hoc est arcui HO, & ex eodem centro R, nempe ex centro sphaeræ describatur eodem interuallo, alia portio circuli NE, quæ licet hic sit in eadem superficie plana, cum meridiano NAF, potest tamen concipi ad meridianum recta, ita ut in sphaera, & in præcedenti figura tertij casus respondeat parallelo disci solaris NGE, qui in sphaera est Horizon obliquus, habens altitudinem poli arcum AN.

In isto Horizonte solari NE, inuestigandum est punctum G, ex his, quæ data sunt in triangulo sphaerico ANG.

Primo igitur demitto ex puncto A, in semidiametrum RN, perpendicularem Aa, & ex eodem puncto A, ad eandem semidiametrum applico rectam AT, æqualem chordæ AF. Deinde centro a, interuallo aT, describo arcum circuli secantem arcum NE, in G, sicque inuenio punctum G, & arcum NG, quem dico æqualem esse arcui NG, vel EM, præcedentis Theoriæ.

Sed prius demonstro circulum descriptum ex a, interuallo aT, secare arcum NE. Declinatio enim AN, minor est maxima declinatione AF, & chorda AF, hoc est, AT, maior chorda AN, & ideo angulus TNA, seu aNA, maior angulo ATa; & vice versa, angulus NAa, complementi, anguli aNA, minor complemento aAT, anguli aTA. Cum igitur respectu sinus totius Aa, recta aT, sit tangens anguli aAT, & aN, tangens anguli aAN, erit aT, maior quam aN, & idcirco circulus TG, descriptus ex a, interuallo aT, secabit arcum NE, abscindetque aliquem arcum NG, qui in figura tertij casus, abscinditur à circello polari DPF, ita ut arcus AG, interceptus inter polum A. & punctum G, sit arcus maximæ declinationis, & recta inter eadem puncta AG, sit chorda eiusdem maxime declinationis. Vnde hic in octava figura demonstrandum est meridiano NAF, existente ad Horizontem Solis NE, perpendiculari; rectam AG, in sublimi ductam, esse æqualem chordæ AF, vel applicatæ AT. Nectatur aG, & aV, sit ad ipsam aG, perpendicularis, & æqualis aA, nectaturque VG. Quoniam igitur aT, aA, sunt æquales aG, aV, & anguli contenti sunt recti, erit VG, æqualis AT. Cumque meridianus NAF, rectus sit ad Horizontem NE, erit & Aa, ad eundem Horizontem recta, sicut & recta aV, si triangulum rectangulum GaV, concipiatur ad eundem Horizontem rectum. Vnde sequitur in tali constructione, rectas perpendiculares aA, aR, coire in vnam rectam, & propter æqualitatem earundem, coalescere quoq. in vnum punctum VA, atque adeo rectam AG.

Tunc



Tunc fore eandem cum VG , sed VG , ostensa est æqualis chordæ AF , ergo etiam AF , est eidem chordæ æqualis, & punctum G , erit illud ipsum, quod in sphaera in eodem Horizonte definit arcus maximæ declinationis AG , seu circellus polaris DEF .

LEMMA AD III. DEMONSTRATIONEM.

DEMONSTRATA. Hac ultima praxi, qua proximè in Figura Octava inuenimus arcum NG , Posset hic immediatè subiungi demonstratio

*Praxis Re-
gia qua, &
quare.*

*Explicatio
propositio-
nis.*

*Demonstra-
tio.*

tertia illius praxis Geometricæ, quam iam alijs duabus demonstrationibus confirmaui-
mus, quamue regiam appellare licet ob facilitatem, & vsum, qui est amplissimus. Sed
quia eadem praxis regia non est alligata maximæ declinationi, sed conuenit etiam qui-
buscunque alijs arcubus, & angulis, malimus demonstrationem particularem postpo-
nere, & in hoc lemmate præmittere vniuersalem proponendo duas praxes simul in hac
nona figura, nimirum regiam, & eam, quæ demonstrata est in figura præcedenti, lem-
ma autem est tale. In figura nona, circa diametrum FD , circuli $FIDK$, cuius centrum
 H . descriptus sit quicumque circulus alius $FNDG$. centro E . eritque EH , ad FD , per-
pendicularis, & ideo FI , ID , DK , KG . quadrantes, & arcus FD , sectus bifariam in N .
Deinde ad eandem partem diametri IK , siue ad dextram, siue ad sinistram, abscindan-
tur quicumque duo arcus æquales IL , KL , & ad easdem partes, vel diuersas à puncto F ,
vel D , abscindantur vtriusque FM , FN , æquales eisdem IL , KL , & LL . secet FD , in P , &
 MM , eandem in O . tam autem LPL , quam MOM . erit parallela IK . Secet quoque LL ar-
cum FND , in A . & Aa , sit sinus arcus NA , & applicata AT , sit æqualis chordæ ND .
Denique per O , traducatur diameter $GOER$. nectaturque a G , quam Dico æqualem fore
rectæ a T .

Nectantur enim NO , HL . quoniam igitur arcus IL , FM , sunt per constructionem
æquales, erunt etiam eorundem complementa MI , DL , æqualia, & OM , sinus arcus
 FM ; æqualis HP , sinui arcus IL , & HO , sinus arcus IM , æqualis PL , sinui arcus DL ;
estque Aa , æqualis HP ; ergo omnes tres OM , HP , a A , sunt æquales, earumque qua-
drata æqualia.

Est autem quadrato OM , æquale rectangulum $FO D$, & huic rectangulum $GO R$,
eo quod FD , GO , sese mutuo intersecant in eodem circulo, & quia OM , in semicirculo
 FID , est ad diametrum FD , perpendicularis: ergo rectangulum $GO R$, est æquale
quadrato HP , vel quadrato a A ; sed huic quadrato a A , propterea quod a A , sit recta ad
diametrum $Na C$, æquale est rectangulum, $Na C$, ergo rectangulum $GO R$, æquale
est rectangulo $Na C$; & quia totæ diametri GR , NC , sunt æquales, erunt etiam earum
segmenta æqualia, nempe OR , ipsi a C ; & GO , ipsi Na ; & ablatis GO , Na , ex semi-
diametris æqualibus, EG , EN , remanebunt æquales EO , Ea : atque ita circa eundem
angulum E , erunt duo latera, GE . Ea , æqualia, duobus lateribus NE , EO , & conse-
quenter per quartam primi, basis ON , æqualis basi a G ; Dico eidem ON . æqualem esse
a T , atque adeo a T , æqualem a G . Idque pro conclusione huius lemmatis demonstro hoc
modo. Quadrata æqualium linearum ND , AT , sunt æqualia; ergo etiam HD , HN ,
sunt æqualia quadratis a T , a A , hoc est quadratis a T . HP . Sed HD , quadratum, seu
 HL , æquale est quadratis HP , PL , hoc est quadratis HP , HO : ergo quadrata HP , HO ,
& HN , sunt æqualia quadratis a T , HP . Sed rursus, HO , & HN , sunt æqualia quadra-
to ON ; ergo duo a T , HP , sunt æqualia duobus ON , HP . sunt autem HP , HP , eadem
ergo reliqua quadrata sunt æqualia, & recta a T , æqualis rectæ ON . ostendimus
autem eidem ON , æqualem a G , ergo a T , a G , sunt æquales; quod erat demon-
strandum.

C O R O L L A R I V M.

Vnde patet, rectam EO , productam, & a G , æqualem ipsi a T , applicatam, ad cir-
cumferentiam circuli FND , abscindere eundem arcum HG . nam ex eodem puncto a,
existente extra centrum E , & ad easdem partes F , non potest applicari alia æqualis
eidem a G , ad aliud punctum G .

DEMONSTRATIO III.

In lemmate præcedente est adhibita constructio duplex, Regia scilicet & quam exhi-
buimus ad figuram octauam quibus accessit præterea 3. similis illi, qua per Circellum
maximæ declinationis in Analemate exhibentur reliquorum punctorum Eclipticæ de-
clinationes. Talis circellus cogitetur in nona figura esse $FIDK$, Circulus vero Ana-
lematis $FNDG$, & arcus IL , sit arcus Eclipticæ. Itaque parallela LL , abscindet
ex




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.





Fig. 7. Casus
primus.Fig. 7. Casus
secundus.Fig. 7. Casus
tertius.

Fig. 8.




Fig. 9.

ex Analemmate, declinationem NA , debitam arcui Eclipticæ IL , numeratò ab initio Arietis I . Habemus igitur hic in arcu $NA D$, quod ponebatur in octava figura, arcus enim maximæ declinationis ND , responderet arcui $N F$; & arcus declinationis NA , arcui declinationis NA . Deinde in octava figura demissa est in semidiametrum NR , perpendicularis $A a$, hic itidem perpendicularis $A a$. Vtrobique autem applicata etiam est $A T$, æqualis chordæ maximæ declinationis ND ; vel $N F$: denique tam hic quam illic abscissus est arcus NG , interuallo rectæ æquali, $a T$. Demonstratum est autem in octava, arcum NG , esse complementum anguli quæsitì: ergo etiam hic arcus NG , erit complementum anguli, quando pñctum Eclipticæ, respòdens puncto L , occupat Meridianum.

Praxis

Praxis vero Regia, consistit in hoc, quod arcus IM , sit complementum arcus IL , & quod per punctum O , in quo parallela MM , secat HF , educta sit recta EO , ut constat ex constructione quartae figurae. Demonstratum autem est in praecedenti Lemmate, rectas a G , EO , abscindere eundem arcum NG , & paullo ante ostendimus, hunc arcum, esse complementum anguli quaesiti. Ergo etiam praxis Regia exhibet complementum anguli quaesiti, quod erat demonstrandum.

Aliae Praxes eiusdem Problematis ex secundaria inspectione Theoriae tertij casus deductae, ac demonstratae, ipsique Macularum Phaenomeno singularissimè accommodatae.



NON erat quidem opus tam multis vijs problema alioquin simplicissimū inquirere, neque pluribus demonstrationibus confirmare, cui vel unica sufficiebat: sed iuvat aliquando in similibus latius discurrere, & palam facere, etiam Mathematicos utiliter ludere sub inde posse seseque & alios veritatis amatores recreare. Ipsa enim veritatum consensio, veritatis indagatorem non delectare non potest. Quod verò nec dum consistimus, sed adhuc ulterius in hac materia, bona Auctoris venia, prouehimur causa est, quod Macularum Phaenomeno, nondum planè satisfactum videtur. Circulus enim observatorius hucusque non videtur accepisse Axem Radiumque Eclipticae, vel alterutrum, ex ipsa observatione saltem, praxi, ac demonstratione immediata, quam nunc dare aggredimur.

Explicatio Figura Decimae.

R , centrum sphaerae, O , punctum Eclipticae, & locus Solis, v. g. in grad. 68. ita ut ab O , usque ad initium Y , intercedat arcus grad. 36. cui debetur declinatio grad. 13. min. 33. & ascensio recta grad. 33. min. 40.

A , Polus mundi boreus, $A O B C$, circulus maximus per polum A , & Solem O , ductus nimirum Horarius Horarum Astronomicarum, in quo quadrantes AB , AC , terminantur necessario ad æquinoctialem, & quia ponimus polum A , nobis sphaeram contemplantibus ad sinistram, hinc fit, ut Hemisphaerium conspicuum terminatumque Circulo $A O B C$, sit occidentale, & in eodem Hemisphaerio existat punctum æquinoctij vernalis: Ordo enim signorum procedit contra motum diurnum, seu ab occasu in ortum & in eadem parte apparebit quoque polus Eclipticae boreus, uti ratio postulat, & sphaera materialis ultra docet.

$B H C$, æquinoctialis descriptus, ex polo A , per $B C$, cuius punctum H , est initium Y , & arcus $H B$, ascensio recta puncti O , grad. 33. min. 40. Et per hoc punctum H , necedit.

$O H L$, Circulus Eclipticae, cuius arcus HO , est grad. 36. Arcus verò circuli horarii $B O$, $C L$, sunt æquales, & declinationes punctorum Eclipticae oppositorum $O L$, grad. 13. min. 33.

$B C$, $O L$, sunt diametri sphaerae, & communes sectiones æquinoctialis, & Eclipticae cum circulo horario, quia omnes circuli maximi transeunt per centrum sphaerae, & omnis planarum superficierum interfectio est linea recta.

$D P F$, Circellus polaris, æquinoctiali parallelus, descriptus ex polo A , per puncta D , F , quae à Polo absunt gr. 23. min. 30. Arcus enim $A D$, $A F$, sunt maximae declinationi Eclipticae æquales, quamvis secundum Tyconem eadē declinatio sit vno minuto, & dimidio minor, $D F$, diameter circelli polaris, & cōis sectio eiusdē cum circulo horario.

$N E I$,




Fig. 10.




Fig. 11.




Fig. 12.




Fig. 13.

NEI, alius circulus maximus, descriptus ex loco Solis O, faciens cum Horario communem sectionem diametrum NR I, cum æquinoctiali rectam RE, & quia etiam discus Solaris habet eundem polum, erit hic circulus NEI, disco solari Parallelus, & quia idem polus O, est in Horario ABC, si punctum O, accipiat pro vertice, habebit circulus NEI, rationem Horizontis, poteritque iure vocari Horizon Solaris, & circulus horarius erit eiusdem Horizontis Solaris Meridianus.

G, interfectio circumferentiarum DPF, NEI, ad quam necessario concurrit Polus Eclipticæ boreus. Quod enim sit in circulo Polari manifestum est ex sphaera quod autem sit ad peripheriam circuli NEI, patet ex eo, quod sicut punctum Eclipticæ O, est polus

polus circuli NEI, ita vice versa polus Eclipticae debet esse in circulo NEI, atque adeo ad punctum G: neque enim in Hemisphaerio occidentali Meridiani ABC, in quo constat existere polum Eclipticae boreum, potest dari alia intersectio circulorum DPF, NEI.

Ga, Est intersectio circelli polaris DPF, & Horizontis solaris NEI, & aequedistat communi sectioni RE, propterea quod circulus NEI, facit duo plana parallela, DGF, BEC, & quia tam circellus DPF, quam Horizon NEI, rectus est ad Meridianum ABC, idcirco eadem GA, est ad eundem Meridianum perpendicularis: idem dicendum est de recta ER. sunt enim ad eundem meridianum recti etiam, tam aequinoctialis, quam Horizon, & consequenter eadem ER, est perpendicularis ad omnes lineas rectas, quae in meridiano transeunt, qualis est axis mundi AR, quae secat diametrum circelli polaris DF, bifariam, & ad angulos rectos in n, & tres diametri BC, OL, NI. Imo eandem ob causam rectis DF, NI, insistit perpendiculariter, recta Ga, in a.

E, Est polus Meridiani, quia est intersectio Horizontis, & aequinoctialis, & quia arcus EB, EC, EN, EI, sunt quadrantes, subtendentes quatuor angulos rectos quos ER, facit cum duabus diametris BC, NI, ad centrum Sphaerae R.

APE, est alius circulus Horarius descriptus per A, & E, cuius poli sunt in meridiano ad puncta aequinoctialis.

B, C, sunt enim tam BA, BE, quam CA, CE, quadrantes, estque etiam ipse ad Meridianum rectus, & communis utriusque sectio est axis mundi AR: communis vero sectio, quam facit cum circello polari est, Pn, recta ad Meridianum, & perpendicularis ad axem AR, & idcirco duo arcus PF, PD, sunt quadrantes; quod etiam sequitur ex eo, quod semicirculi DPF, CEB, sint paralleli, & quadrans AE, incedat per eorundem polum A.

RM, communis sectio Horizontis, & Eclipticae, non quidem perpendicularis ad Meridianum, propter Eclipticam inclinatum, recta tamen ad diametrum OL; eo quod OR, sit axis Horizontis NEI.

chd, parallelus Horizontis, incedens per punctum Arietis H, cuius intersectio cum Meridiano est diameter cd, secta a diametro OL, bifariam, & ad angulos rectos in g. gh, communis sectio paralleli chd, & Eclipticae OHM, aequedistans ipsi RM.

fch, circulus Horizonti concentricus, cuius semidiametri Rf, Re, Rh, sunt aequales semidiametris gc, gH, gd, circuli paralleli chd, qui si intelligatur imprimi Horizonti orthogonaliter, necesse est, ut incidat in circulum fch, & puncta quidem cd, in puncta fh.

b, intersectio diametrorum BC, cd, & bH, communis sectio paralleli chd, & aequinoctialis BHE, perpendicularis ad Meridianum, & ad rectas cd, BC, in b: eo quod tam parallelus, quam aequinoctialis ad eundem Meridianum sint recti.

He, necit punctum Arietis H, cum puncto, e, in quo circulus fch, secat RM.

bm, est parallela axi Horizontis OR, & denique recta, me, connectit punctum, m, cum puncto e.

CONCLVSIONES.

Conclusio
prima.

His ita explicatis, Dico primò, Rectam HE, perpendicularem esse ad Horizontem. Cum enim rectae gH, Re, sint aequales, quia sunt semidiametri circulorum aequalium, & parallelae, quia in rectis gH, ReM, secat Ecliptica OHM, duo plana parallela chd, NMI: quare etiam OR, he, sunt aequales, & parallelae, sed axis OR, rectus est ad Horizontem, ergo & He.

Conclusio
secunda.

Dico secundò, Rectam em, aequalem esse, & parallelam Hb, esseque rectam ad planum Meridiani, & perpendicularem ad bm, NI, in puncto m. Sunt enim He, bm, aequales, & parallelae eidem gR; ergo aequales inter se, & parallelae, & similiter Hb, em; sed Hb, est ad Meridianum recta, ergo & em, & simul perpendicularis ad bm, NI.

Conclusio
tertia.

Dico tertio, Arcum PG, similem esse arcui HB, ascensionis rectae arcus HO, vel puncti O. Per puncta enim H, G, ex Polo A, intelligantur educti circuli maximi, nempe AVH,




Fig. 10.




Fig. 11.




Fig. 12.




Fig. 13.

A V H, colurus æquinoctiorum, & *A G*, solstitiorum: eritque arcus Circelli polaris inter ipsos interceptus, nempe arcus *V G*, quadrans, æqualis quadranti *F P*, demptoque communi *V P*, erit reliquus *V F*, æqualis reliquo *P G*. Sed *F V*, *B H*, intercepti inter *A B*, *A V H*, sunt similes, ergo etiam *P G*, *B H*, sunt similes,

Vel sic. quando punctum Arietis *H*, est ad punctum *B*, tunc iuxta primum casum, consideratum superius, polus Eclipticæ, est ad punctum *P*, & quia utrumque punctum intelligitur in eadem sphaera primi mobilis, dum punctum *H*, ad hunc motum recedit à puncto *B*, per æquinoctialem, *B E*, necesse est polum *G*, proportionaliter discedere à puncto *P*, in Circulo polari *D P F*, & sic arcus *P G*, semper erit similis arcui *B H*, ascensionis rectæ arcus Eclipticæ *H O*.

Dico quartò, rectam *a G*, esse sinum rectum arcus *NG*, in circulo maximo *NGI*, eandēq. *Conclusio*
à *G*, quarta.

a G, esse sinum complementi arcus PG, in circello polari DPF. patet ex dictis: ostendimus enim rectam a G, esse perpendicularem, tam ad diametrum NI, quā ad diametrum DF.

Conclusio quinta. Dico V. altitudinem Poli supra Horizontem NEI, semper esse aequalem declinationi puncti Eclipticae O: semper enim AB, ON, sunt quadrantes, & semper ablato communi arcu AO, remanet altitudo poli AN, æqualis declinationi BO.

Conclusio sexta. Dico VI. ut etiam dictum est supra, æquales esse tam NG, EM, quā GE, EI, & istos metiri angulum inclinationis Eclipticae OML, ad Meridianum ABC, & illos metiri eiusdem anguli complementum. Prior pars patet, quia NE, GM, EI, sunt quadrantes, demptoq. GE, remanent æquales NG, EM: & dempto EM, remanent æquales GE, MI. sed & posterior pars est manifesta, quia OI, OM, sunt quadrantes, & ideo arcus MI, seu GE, mensura anguli MOI, & ME, NG, mensura complementorum; cum iidem arcus ME, NG, sint complementa arcuum MI, GE.

Fundamenta Praxeos primariae.

Praxis primaria quæ? Praxin primariam voco illam, qua in Circulo observatorio ex illis, quæ in observatione dantur designatur ad tempus datum, siue ad locum Solis datum, eiusdem circuli observatorij, communis sectio, quam facit cum circulo Eclipticae, sine qua itineraria macularum solarium qualitas certò definiri non potest.

Praxis secundaria quæ? Secundariam verò appello eam, qua in eodem circulo observatorio similiter assignatur Eclipticae Axis. Hic enim nunc est extra istum circulum, eoq. positione dato, datur etiam radius Eclipticae, qui hic primariè inquiritur, desideraturque.

Circulus observatorius, & horizon solaris, idè. Porro circulus observatorius semper est idem cum Horizonte solari NGL, propterea, quod uterq. æquidistet disco solari O, patetq. ex dictis, Axem Eclipticae RG, semper iacere in tali Horizonte, & radium Eclipticae RM, semper distare ab Axe, quadrante GM. Vnde sequitur idem prorsus contingere in circulo observatorio. In quo præterea semper datur quædam linea, per centrum circuli observatorij ducta representans communem sectionem eiusdem cum circulo horario, tempore observationis per Solem ducto, cui in hac nostra Theoria respondet diameter NI. ergo si hic detur positione radius RM, respectu diametri NI, proculdubio etiam datur in circulo observatorio, atque adeo satisfactum est problemati proposito. Quis autem non videt, totum negotium versari in inuentione puncti e, probando ipsum esse in Ecliptica? Hinc enim sequitur immediate rectam ReM, esse radium eiusdem Eclipticae. Eo enim ipso, quod Ecliptica est circulus maximus, necesse est ipsam transire per centrum sphaeræ R, & ReM, esse communem sectionem eiusdem cum Horizonte solari NMI. Quod autem punctum e, sit in plano Eclipticae, probatur hoc modo. Punctum H, est ad Eclipticam, quia ad H, ponitur initium Arietis. Deinde planum Eclipticae transit per rectas Hg, gR, & defertur etiam per rectam ReM, parallelam Hg. Ergo omnes istæ lineæ, necnon punctum e, sunt in plano Eclipticae, ad cuius inuentionem hæc sese offerunt.

Inuento puncto e, varia inueniuntur. Primò, arcus declinationis BO, puncto O, & arcui Eclipticae HO, debitus, qui varijs modis haberi potest, & commodissimè per tabulas, & analemma, & huius arcus beneficio, datur in plano meridiani positione radius æquinotialis RB: radius. n. Eclipticæ est RO.

Secundò. Dato arcu Eclipticae OH, dantur etiā Od, Oc, & diameter paralleli horizontis cHd, quam diximus transire per punctum Arietis H, & consequenter datur punctum b.





Tertiò. Datur in diametro horizontis NI, punctum m, per rectam bm, parallelā oR.

Quartò. Datur in ipso plano horizontis, circulus feh: datur enim centrum R, eiusq. semidiameter, æqualis semidiametro paralleli cHd, hoc est semidiametro gc, vel gd.

Quintò. Cum ostensum sit, rectam me, perpendicularem esse ad diametrum NI: ergo si ad NI, erigatur perpendicularis me, eadem me, dabit ad peripheriam circuli feh, punctum e, atque adeo positionem radij Eclipticae ReM.

Fundamentum secundariae praxis.

Hoc fundamentum est ipsamet tertia, & quarta Conclusio: illic. n. ostendimus arcum PG, esse similem arcui HB, ascensionis rectæ, arcus Eclipticae HO, & rectam Ga, esse sinum complementi arcus PG, in circulo polari, & sinum rectum arcus NG, in horizonte NEI. sed dato arcu Eclipticae, datur eius ascensio recta varijs modis. Si ergo in circello polari accipiat arcus illi ascensioni similis, & sinus complementi, fiat sinus rectus in circulo observatorio, vel horizonte solari NEI, qualis est a G, habebitur arcus NG, dabiturq. positione axis Eclipticae RG.



Praxis Primaria.

Semicirculus NO I, vñdecimæ figuræ, sit idem cum semicirculo Meridiano præcedentis decimæ, reliquus verò semicirculus NE I, Horizontis solaris, qui illic exprimitur per regulas prospectivæ, hic sit ille ipse, qui illic exprimitur, & licet concipi possit, prout est ad suum Meridianum rectus, melius tamen est pro praxi, si intelligatur cum eodem Meridiano continuatus. Sic enim non sine compendio semidiameter æquatoris R E, quæ in Theoria est perpendicularis ad H I, continuatur cum semidiametro Eclipticæ R O, quæ etiam ipsa in eadem Theoria est perpendicularis ad eandem N I.

Figura undecima descriptio & explicatio.

xx

Et quia

Et quia pro praxi opus habemus arcu declinationis OB, abscindantur ad utramque partem radij æquatoris RE, arcus maximæ declinationis ES, EX, & ex puncto Y, in quo idem radius RE, secat chordam SX, ad angulos rectos, & bifariam, describatur intervallo YS, vel YX, circellus declinationum SQXT, ille idem, qui describi eodem modo solet, in analemmate Ptolematico. Deinde à punctis T, Q, ad easdem partes numerentur arcus TZ, QZ, arcui Eclipticæ æquales, & ZZ, secet EX, in K, eritque EK, declinatio respondens arcui TZ, & cui æqualis esse debet arcus OB, ut in Meridiano positione radius æquatoris RB. Quo posito, sumantur arcus Oc, Od, æquales arcui Eclipticæ proposito, & chorda cd, secet radium æquinoctialis RB, in b, erit punctum b, illud, in quod initium Arietis perpendiculariter cadit in Meridianum, & illud, per quod in Theoria ducitur recta bm, parallela RO, vel perpendicularis ad NI. quæ etiam in hac vndecima Figura similiter ducitur. Radius verò Eclipticæ RO, secat chordam cd, bifariam, & ad angulos rectos in g. offertque semidiametrum gc, vel gd, quarum in plano Herizontis describendus est circulus feh, in quo punctum e, in figura decima habetur, si ex M, ad NI, erigatur perpendicularis me, at hic sufficit producere rectam bm, hæc enim assignat idem punctum e, & hoc dato, datur positione radius Eclipticæ R e M, quod erat faciendum.

Demonstratio praxeos.

Demonstratio patet ex fundamento praxis primariæ, & ideo hic ne litteras quidem immutauimus, nisi in circello SQXT, qui hic constructioni, & inuentioni declinationis est additus. Ceterum constructio, quæ hic fit in semicirculo Meridiano NOI, tota potest fieri in semicirculo horizontali NEI: arcus enim Oc, Od, æquæ benè abscinduntur ad utramque partem puncti E, imo loco radij RB, hic compendiosius ducitur radius RK, pro inuentione puncti b, in hoc semicirculo NEI, sed priori modo minus confunditur figura.

Eadem compendiosior.

Satis est inuenire punctum b, nam bd, est sinus versus anguli, quem Ecliptica facit cum Meridiano. Cum enim in decima figura, circuli cHd, polus sit O, arcus Hd, metitur angulum H o d, & quia H b, est ad c d, perpendicularis, constat eandem H b, esse sinum arcus Hd, & b d, sinum versus, & g b, sinum complementi respectu sinus totius g d. Datis autem sinibus, dantur arcus. ergo. sed operæpretium est saltem sinum complementi acquirere, respectu semidiametri RE, pro determinando arcu EM, id quod non est difficile factu, si in figura vndecima ex b, applicetur b p, æqualis semidiametro RE, secans RO, in r. recta enim b r, erit sinus arcus EM; quia eadem est proportio pb, ad b r, quæ g d, o d, g b. Ducta enim R d, est æqualis ipsi p b, & quia utraque est applicata ad easdem partes, inter parallelas p m, g d, constituitur parallelogrammum b p, m d, unde sequitur, ut p R, b d, necnon p m, g d, sint æquales, addendo æquales R m, g b. Cumq. R r, m b, sint parallelæ, erit proportio p, ad b r, eadem, quæ p m, ad m R, hoc est eadem, quæ d g, ad g b.

Praxis Secundaria.

Qua axis Eclipticæ pro quouis puncto Eclipticæ dato, circulo obseruatorio adscribitur, videri potest aliqua ex parte superflua: nam ut ostensum est in Theoria figuræ 10. axis RG, distat quadranti MG, à radio RM. Descripto igitur radio per praxim primariam, non diù desiderabitur axis RG. imo tota constructio radij conuenit axi, si diameter OL, transferatur ad diametrum NI, &c. Habet tamen etiam constructionem propriam, nempe eam quam in fundamento praxis secundariæ ita apertè insinuauimus, ut pluribus non indigeat. Illud solum videtur desiderari adhuc, ut doceatur quomodo Circellus polaris in ascensiones rectas diuidatur, quod hic non tam necessario, quàm ad alia vtiliter, in primisque in gratiam Praxis Regiæ præstabimus.

Circuli Polaris, vel Circuli Declinatorij, Analemmatis, distributio in Ascensiones rectas.

Non sum nescius, hoc fieri posse per præcepta Astrolabij, quibus quilibet circulus pro æqui-




Fig. 10.




Fig. 11.




Fig. 12.




Fig. 13.

æquinoctiali sumptus, beneficio Eclipticæ secetur in ascensiones rectas. Scio etiam id fieri in analemmate, ubi dictæ ascensiones mensurantur per circulos parallelos, vel in ipsa linea æquinoctiali per ellipses horarios. Denique, certum est, vno circulo utcumque diuiso, diuidi posse alium similiter, saltem per lineas eductas ex cõmuni centro: sed dimensionem circuli declinatorij, cuius beneficio reperiuntur declinationes punctorum Eclipticæ, & cuius beneficio Praxis Regia exhibet angulos inclinationis Eclipticæ, & Meridiani, qui hætenus dederit, non inuenio, sed ni fallor, dabitur in posterum.

Centro E, descriptus sit in Figura Duodecima circulus analemmatis B A C; Fig. 12. rest- qui communiter est colurus Solstitiorum, vel Meridianus in quo axis Mundi gnatio, & EZ, explicatio.

E Z, Polus boreus Z; Radius æquatoris E A, rectus ad axim E Z, arcus A B, 1
A C, maximæ declinationi æquales, B D C. diameter circelli declinatorij, secta bi-
fariam, & ad angulos rectos ab E A, B F C, ipsemet circellus declinatorius, se-
ctus ab eadem E A, in quadrantes, F B, F C, B G, C Y, radij Eclipticæ, Sole exi-
stente in ♄, & ♅.

Erecta igitur perpendiculari E V, super radium C Y, si semicirculus C V Y, sum- 5
tur pro Ecliptica, & erectus ad planum meridiani, erit punctum V, punctum V, vel
☐; & si punctum X, sumatur pro quocumque alio puncto Eclipticæ, indeque ca-
dat in C Y, perpendicularis X R, & per punctum R, agatur I R L, parallela, ra-
dio æquatoris A K; erit I L, diameter paralleli, qui in sphaera transit per pun- 10
ctum X. ut patet si semicirculus I N L, descriptus circa I L, in quo recta R a, est ad
I L, perpendicularis, intelligatur rectus, ad planum meridianum. Ita enim eadem,
R a, fit etiam recta ad idem planum meridianum, sicut & recta R X, & ideo coeunt
in vnum, & punctum a, iungitur X, sunt enim R a, R X, æquales, quia eorum qua-
drata sunt æqualia, rectangulis æqualibus I R L, C R Y. Quoniam ergo punctum, 15
Eclipticæ X, seu punctum a, describit ad motum primi mobilis parallelum, metietur
arcus N a, ascensionem rectam, arcus Eclipticæ V X, & arcus A I, erit declinatio e-
iusdem puncti Eclipticæ X, ut demonstratur ex professo in analemmate, quamvis hac
praxi raro utantur Astronomi in definiendis declinationibus.

Viderunt enim diametrum paralleli I L, secare diametrum circelli B F C, in Q, 20
& proportionem C D, ad D Q, & C E, ad E R, esse eandem, propter parallelas
E D, R Q. & consequenter arcum F H, quem abscindit eadem parallela L I, esse
similem arcui Eclipticæ V X. Ut enim semidiameter C E, ad E R, sinum arcus
V X, ita & semidiameter C D, ad D Q, sinum arcus F H. Quare loco arcus V X,
accipiunt arcum F H, similem arcui Eclipticæ, & per H, agunt H Q, parallelam ipsi 25
F D, abscinduntque arcum declinationis A I, respondentem puncto Eclipticæ dato.

Ascensiones rectas inveniendi ratio.

Pro ascensionibus vero rectis similem translationem non inuenio, sed ut ipsemet ali- 30
quid tentarem impulit declinationum, ascensionumque affinitas, & vix non coëgit,
hancque obtulit praxim quærenti. Iussit iungere radium E I, & per O, ubi secat dia-
metrum B C, agere O P, parallelam F D, & demonstrare arcum F P, esse ascensio-
nem rectam, arcus Eclipticæ F H, cui debetur declinatio A I.

Demonstro autem sic; ducendo prius rectam R T, parallelam C D, & producen- 35
do P O, usque ad radium E C, ad S: sic enim habemus rectas C D, C E, habere ean-
dem proportionem ad D O, E S, & I E, I M, eandem ad E T, M R: essentque pro-
culdubio, omnes istæ proportiones eadem, si constaret de æqualitate rectarum,
E S, E T,

Hoc enim posito, ut C D, ad D O: ita esset C E, ad E S; hoc est I E, ad E D, nec 40
non I M, ad M R, probo ergo esse æquales.

Nam ut I E, ad E R, ita & O E, ad E S: Sed ut I E, ad E R, hoc est C E,
ad E R: ita est eadem O E, ad E T. cum igitur O E, ad E S, & E T, habeat
proportionem eandem, sequitur ut eadem E S, E T, sint æquales: ergo beneficio
declinationis I, inuentæ, per circumulum B F C, possumus habere in eodem circulo a- 45
scensionem rectam, quod erat faciendum,

*ALITER SUPPOSITA DEMONSTRATIONE
Praxis Regiæ.*

In altero quadrante B F, fiat arcui Eclipticæ, proposito, nempe F H, æqualis B d, 50
& d e, sit parallela F D, & E e, secet circumferentiam A B, in c. eritque per Conclu-
sionem quartam, superius positam, sinus arcus A c, hoc est D g, sinus complementi
ascensionis rectæ arcus B F. Ducta igitur g c f, parallela e d, erit sinus arcus B f, arcus
ascensionis rectæ debitæ arcui B d.

Sed




Fig. 10.




Fig. 11.




Fig. 12.




Fig. 13.

Sed de his satis. Praxis enim secundaria contenta videtur esse Primaria, ut paullo ante monuimus: erit tamen eorundem usus non contemnendus inferius in Appendice. Hæc enim non sunt alligata Eclipticæ, sed arcus AB, AS, possunt esse maiores, vel minores maxima declinatione prout videre est in hac ipsa figura 12.

Atque hic sanè problemati proposito finis imponi poruisset; imò etiam multo ante debuisset, si necessitati tantum consulendum fuisset; certè præter intentionem tantum comitatu problema alioquin satis plebæum prodijt: sed macularum Phænomeno, demonstrationiq. Praxis regiæ adscribendum est, quidquid in hac parte prolixius quidem, sed non inutiliter, peccatum est.

Demonstratio quærebat^{ur} statim ab initio, ea quæ dependeret immediatè ex illa constructione, qua ipsemet Macularum diligentissimus observator in ipso circulo observatorio assignavit positionem Radiorum Eclipticæ, cuilibet observationi congruenter. Sed ostendendo semper alias, atque alias minus proprias, ita illudit illa diu insequentes, ut nunquam amplius attingi posse videretur, voluit tamen aliquando; & quia voluit in fine, hoc eam ipso loco etiam nos stringere nexibus Geometricis volumus, ipsiq. in posterum omnes fugæ vias intercludere.

Postrema, & propria Regiæ Praxis Demonstratio.

In hac XIII. figura, quæ est eadem cum decima, paucis omissis, & paucis additis, producat^{ur} arcus Coluri solstitionum A G, vsque ad Eclipticam O H L, ad punctum Capricorni K: sic enim facile ostendetur angulum AGN, in triangulo ANG, analogum esse arcui Eclipticæ proposito H O, hoc est angulum AGN, & arcum H O, numerari eodem numero graduum. Arcus enim M K, propter quadrantes GK, GM, metitur angulum MGK, & ablato arcu H M, ex quadrantibus OM, HK, remanet arcus HO, æqualis MK, ergo etiam arcus HO, metitur angulum NGK, nec non angulum ipsi ad verticem, hoc est, angulum AGN. Et hoc est quod hactenus ignoratum, retardavit Demonstrationem desideratam.

Huic igitur angulo AGN, sit æqualis ME d, & arcus E d, secet Eclipticam in d, efficieturque triangulum rectangulum Emd, & duo anguli dME, dEM, erunt æquales duobus ANG, AGN, in triangulo ANG: sed hæc eadem triangula habent etiam latera EM, EG, dictis angulis adiacentia æqualia; ergo per vigesimum triangulum sphaericorum Clauij, etiam reliqua latera erunt æqualia d M, ipsi AN, & d E, ipsi AG, hoc est d M, erit æquale declinationi B O, & d E, maxime declinationi A G. Quare si ex Polo Meridiani E, in quo Horizontem solarem NGI, secat æquinoctialis BEC, interuallo arcus E d, describatur in superficie sphaeræ circulus c d e, is erit circello polari DGF, æqualis, & illi, qui in analemmate describitur in gratiam radiorum Zodiaci, & declinationum, & quia angulus e E d, ad polum E, est arcui Eclipticæ HO, analogus, & quia eundem angulum e E d, metitur etiam arcus d e, manifestum est, arcus H O, d e, esse similes.

Praxis regiæ perfecta.

Quo demonstrato iam parum, vel nihil deest demonstrationi Praxis Regiæ. Circulus enim c d e, rectus est ad Horizontem, eo quod in ipso existat polus E & recta c e, vtriusque communis sectio, est diameter eiusdem circuli c d e: secaturq. bifariam, & ad angulos rectos, semidiametro æquinoctialis, & Horizontis R E, in i. Communis etiam sectio eiusdem Horizontis, & Eclipticæ, hoc est radius Eclipticæ R M, secat eandem diametrum alicubi in b, & recta b d, sit communis sectio Eclipticæ, & circuli c d e. Et quia vterque circulus est ad Horizontem rectus, necesse est eandem b d, esse ad Horizontem rectam, atque adeo perpendicularem tam ad diametrum c e, quam ad radium Eclipticæ R m.

Praxis regiæ usus.

Quare si in Horizonte solari, seu in Circulo observatorio NEI, ad vtramq. partem puncti E, abscindantur arcus E c, E e, maximæ declinationi æquales, & circa diametrum c e, describatur circulus c d e, & arcus e d, fiat æqualis arcui Eclipticæ dato, & ex puncto d, in c e, demittatur perpendicularis d b, inuentum erit punctum b, per quod in circulo horario transit radius Eclipticæ quando sol O, est in meridiano, seu in horario circulo ABC, & arcus Eclipticæ H O, interceptus inter Solem, & punctum Arietis, vel Libræ H, est similis arcui e d, quod erat demonstrandum.

Eodem modo describitur axis RG, si in eodem circulo observatorio NEI, arcus maximæ declinationis, quales fuere Ec, E e, abscinderentur ad vtramq. partem puncti N, quod à puncto E, abest quadrante E N: debet enim arcus NG, æqualis esse arcui E M, ut constet ex dictis.

N O T A

In triangulis rectangulis O B H, A N G, d N E, pulchram quandam angulorum laterumque metamorphosin.

Primò. Triangula A N G, d M E, sunt prorsus æqualia.

Secundò. Angulus N A G, & consequenter angulus E d M, est angulus complementi ascensionis rectæ arcus H O, ostendimus enim, arcum D G, esse similem complemento arcus B H, qui est arcus ascensionis arcus H O. sed DG, metitur angulum NAG, propterea quod A, polus mundi, sit polus circelli polaris D G F, ergo, &c.

Tertiò. Omnes tres arcus AN, BO, d M, sunt æquales declinationi puncti Eclipticæ O. Quartò.




Fig. 10.




Fig. 11.




Fig. 12.




Fig. 13.

Quartò, Arcus AN, d M, subtendunt angulos A G N, d EM, homologos arcui HO. & BO, subtendit angulum maximæ declinationis BHO, homologum basibus AG, d E.

Quintò. Denique arcus NG, EM, sunt homologi complemento anguli HOB, inclinationis Eclipticæ, & meridiani, quam metitur arcus MI, & cuius complementum est EM.

Appendix pro solutione Geometrica Triangulorum sphericorum.

Hac demum breui Appendice, id vt spero efficiam, palam vt fiat, haud vanum esse nomen, quod praxi hætenus demonstratæ addidimus: Regiam enim placuit appellare, non tam

tam ob beneficium, quod ab ea accepit Macularum Phænomenon; sed multo magis ob singularissima commoda, quæ inde ad triangula spherica promanant. sed quia huius loci non est similia tractare ex professo, rem ita proponam, ut viam videar aperuisse ad maiora.

Statim vt praxim hanc certam esse cognoui, ex prima illa demonstratione, qua eam
cum analogia problematis tertij composui, hanc intuli consequentiam: habemus igitur,
vnde data basi, & angulo non recto alicuius trianguli sphaerici rectanguli, possimus sol-
uere totum triangulum, & hoc praxi adeo facili, vt vix alia expeditior excogitari posse
videatur. Certe ratio Canonica, quae fit operationibus arithmeticis, ab hoc compendio
plurimum abest, licet alioquin sit accuratissima, & in rebus serioribus etiam necessaria.
singulis enim analogijs non expediuntur nisi quæsita singula, nimirum hoc latus, vel il-
lud vel sine lateribus angulus reliquus. At Regia Praxis exhibet vnico ferè labore omnia
simul. Contentus ero hic vnico exemplo, & figuris 13. & 12. sumendo triagulum sphæ-
ricum OBH, in 13. & constructionem in 12. Porro autem in triangulo OBH, præter an-
gulum rectum B, dari angulum H, & basim HO, atque ad solutionem totius trianguli ad-
huc desiderari angulum BOH, & latera BO, BH. In figura 12. arcus AB, AC, sint analogi
anguli BHO, siue angulus BHO, sit maximæ declinationis, siue alius: & circa chordam,
BC, describatur saltem alter quadrantum FB, FC, vel semicirculus BFC, & arcus FH, fiat
similis basi datæ HO: perpendicularis enim HQ, abscindet arcum AI, respondentem ar-
cui BO, neque refert vtrum BO, arcus dicatur declinatio puncti O, respectu basis HO, si-
ue non, & iuncta EI, secabit chordam BC, alicubi in O, & perpendicularis OP, abscindet
arcum FP, analogum arcui BH. Deniq. angulus BOH, habebitur, si ipsi QH, nempe sinui
complementi arcus FH, abscindatur æqualis D e, siue ex DB, siue ex DC: vel certè arcui
FH, sumatur alius æqualis B d, ad partes B, vel C. sic enim perpendicularis d e, erit sinus
rectus eiusdem arcus, & D e, sinus complementi æqualis QH. & recta E e c, abscindet
arcum AC, complementi anguli BOH, & hoc arcu AC, in hunc modum inuento dabitur
iterum arcus BH, vel saltem ipsi similis, si per punctum c, agatur c f, parallela e d: arcus
enim BF, est æqualis FP, vt paullo ante ostendimus: vtroque enim modo inuenitur ascē-
sio recta arcus HO, hoc est similis arcui BH. quia angulus BHO, est angulus maximæ de-
clinationis. Praxis tamen hic tradita non est ad huiusmodi angulum alligata. estque
demonstratio prorsus eadem, saltem quando omnes arcus trianguli propositi sunt qua-
drante minores, anguliue non recti recto minores, neque opus est, si quæ in alijs triangu-
lis forent immutanda hic penitus enucleare.



tionis bellicae, & meridiana, quatuordecim sunt. Mi, & eius complementum est Em.
Quinto Denique arcus Ng, Em, sunt homologae complementum anguli HOB, scilicet.
Bo, subtendit angulum maximam declinationis BHO, homologum latitudi AG, & E.
Ogato, Arcus AN, & M, subtendunt angulos A G M, & E M, homologos arcui HO, &

Abhandlung des Deutschen Geographischen Instituts

Hac de causa p[ro]p[ri]e Appellat[i]o[n]is et sp[eci]ali efficitur, datus ut per hoc non sit no-

TAB. ASCENS. RECT. 391

ASCENSIONES RECTAE. ET DECLINATIONES VNIVS
quadrantis Eclipticæ per quina minuta.

G		O		I				2				G	
Min.	asc. rect.		Declin.		asc. rect.		Declin.		asc. rect.		Declin.		Min.
	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	
0	0	0	0	0	0	55	0	24	1	50	0	48	0
5	0	5	0	2	1	0	0	26	1	55	0	50	5
10	0	9	0	4	1	4	0	28	1	59	0	52	10
15	0	14	0	6	1	9	0	30	2	4	0	54	15
20	0	18	0	8	1	13	0	32	2	8	0	56	20
25	0	23	0	10	1	18	0	34	2	13	0	58	25
30	0	28	0	12	1	23	0	36	2	18	1	0	30
35	0	32	0	14	1	27	0	38	2	22	1	2	35
40	0	37	0	16	1	32	0	40	2	27	1	4	40
45	0	42	0	18	1	37	0	42	2	32	1	6	45
50	0	46	0	20	1	41	0	44	2	36	1	8	50
55	0	50	0	22	1	45	0	46	2	41	1	10	55

3				4				5					
0	2	45	1	12	3	40	1	36	4	35	2	0	0
5	2	50	1	14	3	45	1	38	4	40	2	2	5
10	2	54	1	16	3	49	1	40	4	44	2	4	10
15	3	59	1	18	3	54	1	42	4	49	2	6	15
20	3	4	1	20	3	58	1	44	4	54	2	8	20
25	3	8	1	22	4	3	1	46	4	58	2	9	25
30	3	13	1	24	4	8	1	48	5	3	2	11	30
35	3	17	1	26	4	12	1	50	5	7	2	13	35
40	3	22	1	28	4	17	1	52	5	12	2	15	40
35	3	26	1	30	4	21	1	54	5	17	2	17	45
50	3	31	1	32	4	26	1	56	5	21	2	19	50
55	3	35	1	34	4	30	1	58	5	26	2	21	55

6				7				8					
0	5	30	2	23	6	25	2	47	7	21	3	11	0
5	5	35	2	25	6	30	2	49	7	25	3	13	5
10	5	39	2	27	6	35	2	51	7	30	3	15	10
15	5	44	2	29	6	39	2	53	7	34	3	17	15
20	5	49	2	31	6	44	2	55	7	39	3	19	20
25	5	53	2	33	6	48	2	57	7	43	3	21	25
30	5	58	2	35	6	53	2	59	7	48	3	23	30
35	6	3	2	37	6	58	3	1	7	53	3	25	35
40	6	7	2	39	7	2	3	3	7	57	3	27	40
45	6	12	2	41	7	7	3	5	8	2	3	29	45
50	6	16	2	43	7	11	3	7	8	6	3	31	50
55	6	21	2	45	7	16	3	9	8	11	3	33	55

ASCENSIONES RECTAE. ET DECLINATIONES VNIVS
quadrantis Eclipticæ per quina minuta.

G		9		IO		II		G	
Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.	
	G	M	G	M		G	M	G	M
0	8	16	3	35	0	9	11	3	58
5	8	21	3	37	5	9	16	4	0
10	8	25	3	39	10	9	20	4	2
15	8	30	3	40	15	9	25	4	4
20	8	34	3	42	20	9	29	4	6
25	8	39	3	44	25	9	34	4	8
30	8	43	3	46	30	9	39	4	10
35	8	48	3	48	35	9	43	4	12
40	8	52	3	50	40	9	48	4	14
45	8	57	3	52	45	9	54	4	16
50	9	2	3	54	50	9	57	4	18
55	9	7	3	56	55	10	2	4	20

12		13		14		Min.			
asc. rect.		Declin.		asc. rect.			Declin.		
G	M	G	M	G	M	G	M		
0	11	2	4	45	0	11	57	5	9
5	11	6	4	47	5	12	2	5	11
10	11	11	4	49	10	12	6	5	13
15	11	15	4	51	15	12	11	5	15
20	11	20	4	53	20	12	16	5	17
25	11	25	4	55	25	12	20	5	19
30	11	29	4	57	30	12	25	5	20
35	11	34	4	59	35	12	30	5	22
40	11	39	5	1	40	12	34	5	24
45	11	43	5	3	45	12	39	5	26
50	11	48	5	5	50	12	43	5	28
55	11	52	5	7	55	12	48	5	30

15		16		17		Min.			
asc. rect.		Declin.		asc. rect.			Declin.		
G	M	G	M	G	M	G	M		
0	13	48	5	55	0	15	40	6	42
5	13	53	5	57	5	15	44	6	44
10	13	57	5	59	10	15	49	6	46
15	14	2	6	1	15	15	54	6	47
20	14	7	6	3	20	15	58	6	49
25	14	11	6	5	25	16	3	6	51
30	14	16	6	7	30	16	8	6	53
35	14	21	6	9	35	16	12	6	55
40	14	25	6	11	40	16	17	6	57
45	14	30	6	13	45	16	22	6	59
50	14	35	6	15	50	16	26	7	1
55	14	39	6	17	55	19	31	7	3

TAB. ASCENS. RECT. 393

ASCENSIONES RECTAE. ET DECLINATIONES VNIVS
quadrantis Eclipticæ per quina minuta.

18					19					20				
Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.	
	G	M	G	M		G	M	G	M		G	M	G	M
0	16	35	7	5	0	17	31	7	28	0	18	27	7	50
5	16	40	7	7	5	17	36	7	29	5	18	32	7	52
10	16	45	7	8	10	17	41	7	31	10	18	37	7	54
15	16	49	7	10	15	17	45	7	33	15	18	41	7	56
20	16	54	7	12	20	17	50	7	35	20	18	46	7	58
25	16	59	7	14	25	17	55	7	37	25	18	51	8	0
30	17	4	7	16	30	17	59	7	39	30	18	55	8	2
35	17	8	7	18	35	18	4	7	41	35	19	0	8	4
40	17	13	7	20	40	18	9	7	43	40	19	5	8	5
45	17	17	7	22	45	18	13	7	45	45	19	10	8	7
50	17	22	7	24	50	18	18	7	47	50	19	14	8	9
55	17	27	7	26	55	18	23	7	48	55	19	19	8	11
21					22					23				
0	19	23	8	13	0	20	20	8	35	0	21	16	8	58
5	19	28	8	15	5	20	24	8	37	5	21	21	9	0
10	19	33	8	17	10	20	29	8	39	10	21	25	9	1
15	19	38	8	19	15	20	34	8	41	15	21	30	9	3
20	19	42	8	20	20	20	38	8	43	20	21	35	9	5
25	19	47	8	22	25	20	43	8	45	25	21	40	9	7
30	19	51	8	24	30	20	48	8	47	30	21	45	9	9
35	19	56	8	26	35	20	52	8	48	35	21	49	9	11
40	20	1	8	28	40	20	57	8	50	40	21	54	9	13
45	20	6	8	30	45	21	2	8	52	45	21	58	9	14
50	20	10	8	32	50	21	7	8	54	50	22	3	9	16
55	20	15	8	34	55	21	11	8	56	55	22	8	9	18
24					25					26				
0	22	12	9	20	0	23	9	9	42	0	24	6	10	4
5	22	17	9	22	5	23	14	9	44	5	24	10	10	6
10	22	22	9	24	10	23	18	9	46	10	24	15	10	8
15	22	27	9	26	15	23	23	9	48	15	24	20	10	9
20	22	31	9	28	20	23	28	9	49	20	24	25	10	11
25	22	36	9	30	25	23	33	9	51	25	24	29	10	13
30	22	41	9	32	30	23	37	9	53	30	24	34	10	15
35	22	45	9	34	35	23	42	9	55	35	24	39	10	17
40	22	50	9	35	40	23	47	9	57	40	24	44	10	19
45	22	55	9	37	45	23	52	9	59	45	24	48	10	20
50	23	0	9	38	50	23	56	10	0	50	24	53	10	22
55	23	4	9	40	55	24	1	10	2	55	24	58	10	24

ASCENSIONES RECTAE. ET DECLINATIONES VNIVS
quadrantis Eclipticæ per quina minuta.

G

27

28

29

G

Min.	asc. rect.		Declin.		asc. rect.		Declin.		asc. rect.		Declin.		Min.
	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	G	M	
0	25	3	10	26	25	59	10	47	26	57	11	9	0
5	25	7	10	28	26	4	10	49	27	1	11	11	5
10	25	12	10	29	26	9	10	51	27	6	11	12	10
15	25	17	10	31	26	14	10	53	27	11	11	14	15
20	25	22	10	33	26	19	10	54	27	15	11	16	20
25	25	26	10	35	26	23	10	56	27	21	11	18	25
30	25	31	10	37	26	27	10	58	27	25	11	19	30
35	25	36	10	38	26	33	11	0	27	30	11	21	35
40	25	40	10	40	26	38	11	2	27	35	11	23	40
45	25	45	10	42	26	42	11	3	27	39	11	25	45
50	25	50	10	44	26	48	11	5	27	44	11	27	50
55	25	55	10	46	26	52	11	7	27	49	11	29	55

30

31

32

0	27	54	11	30	28	51	11	51	29	49	12	12	0
5	27	58	11	32	28	56	11	53	29	53	12	14	5
10	28	3	11	34	29	1	11	55	29	58	12	15	10
15	28	8	11	35	29	6	11	56	30	3	12	17	15
20	28	13	11	37	29	10	11	58	30	8	12	19	20
25	28	18	11	39	29	15	12	0	30	13	12	21	25
30	28	22	11	41	29	20	12	1	30	18	12	22	30
35	28	27	11	42	29	25	12	3	30	22	12	24	35
40	28	32	11	44	29	29	12	5	30	27	12	26	40
45	28	37	11	46	29	34	12	7	30	32	12	28	45
50	28	42	11	48	29	39	12	8	30	37	12	29	50
55	28	46	11	49	29	44	12	10	30	42	12	31	55

33

34

35

0	30	46	12	33	31	44	12	53	32	42	13	13	0
5	30	51	12	34	31	49	12	55	32	47	13	15	5
10	30	56	12	36	31	54	12	56	32	52	13	17	10
15	31	1	12	38	31	59	12	58	32	57	13	18	15
20	31	6	12	39	32	3	13	0	33	2	13	20	20
25	31	11	12	41	32	8	13	1	33	6	13	22	25
30	31	15	12	43	32	13	13	3	33	11	13	23	30
35	31	20	12	45	32	18	13	5	33	16	13	25	35
40	31	25	12	46	32	23	13	7	33	21	13	27	40
45	31	29	12	48	32	28	13	8	33	26	13	28	45
50	31	34	12	50	32	32	13	10	33	31	13	30	50
55	31	39	12	51	32	37	13	11	33	35	13	32	55

ASCENSIONES RECTAE. ET DECLINATIONES VNIVS
quadrantis Eclipticæ per quina minuta.

G 36					37					38					G
Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.		Min.
	G	M	G	M		G	M	G	M		G	M	G	M	
0	33	40	13	33	34	39	13	53	35	37	14	13	0		
5	33	45	13	35	34	44	13	55	35	42	14	14	5		
10	33	50	13	37	34	48	13	56	35	47	14	16	10		
15	33	55	13	38	34	53	13	58	35	52	14	18	15		
20	34	0	13	40	34	58	14	0	35	57	14	19	20		
25	34	4	13	42	35	3	14	1	36	2	14	21	25		
30	34	9	13	43	35	8	14	3	36	6	14	22	30		
35	34	14	13	45	35	13	14	5	36	11	14	24	35		
40	34	19	13	46	35	17	14	6	36	16	14	25	40		
45	34	24	13	48	35	22	14	8	36	21	14	27	45		
50	34	29	13	50	35	27	14	9	36	26	14	29	50		
55	34	34	13	51	35	32	14	11	36	31	14	30	55		

39					40					41				
0	36	36	14	32	37	35	14	51	38	33	15	10	0	
5	36	41	14	34	37	40	14	53	38	38	15	11	5	
10	36	46	14	35	37	44	14	54	38	43	15	13	10	
15	36	50	14	37	37	49	14	56	38	48	15	14	15	
20	36	55	14	38	37	54	14	57	38	53	15	16	20	
25	37	0	14	40	37	59	14	59	38	59	15	18	25	
30	37	5	14	42	38	4	15	1	39	3	15	19	30	
35	37	10	14	43	38	9	15	2	39	8	15	21	35	
40	37	15	14	45	38	14	15	4	39	13	15	22	40	
45	37	20	14	46	38	19	15	5	39	18	15	24	45	
50	37	25	14	48	38	24	15	7	39	23	15	25	50	
55	37	30	14	49	38	29	15	8	39	28	15	27	55	

42					43				44				
0	39	33	15	28	40	32	15	47	41	32	16	5	0
5	39	38	15	30	40	37	15	48	41	37	16	6	5
10	39	43	15	32	40	42	15	50	41	41	16	8	10
15	39	49	15	33	40	47	15	51	41	46	16	9	15
20	39	53	15	35	40	52	15	53	41	51	16	11	20
25	39	57	15	36	40	57	15	54	41	56	16	12	25
30	40	2	15	38	41	2	15	56	42	0	16	14	30
35	40	7	15	39	41	7	15	57	42	7	16	15	35
40	40	12	15	41	41	12	15	59	42	11	16	17	40
45	40	17	15	42	41	16	16	0	42	16	16	18	45
50	40	22	15	44	41	22	16	2	42	21	16	20	50
55	40	27	15	45	41	26	16	3	42	26	16	21	55

ASCENSIONES RECTAE. ET DECLINATIONES VNIVS
quadrantis Eclipticæ per quina minuta.

45					46					47					G
Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.		Min.
	G	M	G	M		G	M	G	M		G	M	G	M	
0	42	31	16	23	0	43	31	16	40	0	44	31	16	57	0
5	42	36	16	24	5	43	36	16	41	5	44	36	16	59	5
10	42	41	16	26	10	43	41	16	43	10	44	41	17	0	10
15	42	46	16	27	15	43	46	16	44	15	44	46	17	2	15
20	42	51	16	28	20	43	51	16	46	20	44	51	17	3	20
25	42	56	16	30	25	43	56	16	47	25	44	56	17	4	25
30	43	1	16	31	30	44	1	16	49	30	45	1	17	6	30
35	43	5	16	33	35	44	6	16	50	35	45	6	17	7	35
40	43	11	16	34	40	44	11	16	52	40	45	11	17	9	40
45	43	16	16	36	45	44	16	16	53	45	45	16	17	10	45
50	43	21	16	37	50	44	21	16	54	50	45	21	17	11	50
55	43	26	16	39	55	44	26	16	56	55	45	26	17	13	55

48					49					50					
0	45	31	17	14	0	46	32	17	31	0	47	32	17	47	0
5	45	36	17	16	5	46	37	17	32	5	47	37	17	48	5
10	45	41	17	18	10	46	42	17	34	10	47	42	17	49	10
15	45	46	17	19	15	46	47	17	35	15	47	47	17	51	15
20	45	51	17	20	20	46	52	17	36	20	47	52	17	52	20
25	45	56	17	21	25	46	57	17	38	25	47	59	17	54	25
30	46	1	17	23	30	47	2	17	39	30	48	4	17	55	30
35	46	6	17	24	35	47	7	17	40	35	48	8	17	57	35
40	46	12	17	25	40	47	12	17	42	40	48	13	17	58	40
45	46	17	17	27	45	47	16	17	43	45	48	18	17	59	45
50	46	22	17	28	50	47	22	17	44	50	48	23	18	0	50
55	46	27	17	29	55	47	27	17	46	55	48	28	18	2	55

51					52					53					
0	48	33	18	3	0	49	34	18	19	0	50	35	18	34	0
5	48	38	18	4	5	49	39	18	20	5	50	40	18	35	5
10	48	43	18	6	10	49	44	18	21	10	50	45	18	37	10
15	48	48	18	7	15	49	49	18	23	15	50	51	18	38	15
20	48	53	18	8	20	49	54	18	24	20	50	56	18	39	20
25	48	59	18	10	25	50	0	18	25	25	51	1	18	40	25
30	49	4	18	11	30	50	5	18	27	30	51	6	18	42	30
35	49	9	18	12	35	50	10	18	28	35	51	11	18	43	35
40	49	14	18	14	40	50	15	18	29	40	51	16	18	44	40
45	49	19	18	15	45	50	20	18	30	45	51	21	18	45	45
50	49	24	18	16	50	50	25	18	32	50	51	26	18	47	50
55	49	29	18	17	55	50	30	18	33	55	51	32	18	48	55

TAB. ASCENS. RECT. 397

ASCENSIONES RECTAE. ET DECLINATIONES VNIVS
quadrantis Eclipticæ per quina minuta.

54					55					56					
Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.		Min.
	G	M	G	M		G	M	G	M		G	M	G	M	
0	51	37	18	49	0	52	38	19	4	0	53	40	19	18	0
5	51	42	18	50	5	52	43	19	5	5	53	45	19	19	5
10	51	47	18	52	10	52	48	19	6	10	53	50	19	21	10
15	51	52	18	53	15	52	53	19	8	15	53	53	19	22	15
20	51	57	18	54	20	52	58	19	9	20	54	0	19	23	20
25	52	2	18	55	25	53	4	19	10	25	54	5	19	24	25
30	52	7	18	57	30	53	9	19	11	30	54	11	19	25	30
35	52	12	18	58	35	53	14	19	12	35	54	16	19	26	35
40	52	18	18	59	40	53	19	19	13	40	54	21	19	28	40
45	52	23	19	0	45	53	24	19	15	45	54	26	19	29	45
50	52	28	19	2	50	53	29	19	16	50	54	31	19	30	50
55	52	33	19	3	55	53	35	19	17	55	54	36	19	31	55

57					58					59				
0	54	41	19	32	55	44	19	46	56	46	19	59	0	
5	54	47	19	33	55	49	19	47	56	51	20	0	5	
10	54	52	19	35	55	54	19	48	56	56	20	1	10	
15	54	57	19	36	55	59	19	49	57	2	20	2	15	
20	55	2	19	37	56	4	19	50	57	7	20	3	20	
25	55	7	19	38	56	10	19	51	57	12	20	5	25	
30	55	13	19	39	56	15	19	53	57	17	20	6	30	
35	55	18	19	40	56	20	19	54	57	22	20	7	35	
40	55	23	19	41	56	25	19	55	57	27	20	8	40	
45	55	28	19	42	56	30	19	56	57	33	20	9	45	
50	55	33	19	44	56	36	19	57	57	38	20	10	50	
55	55	38	19	45	56	41	19	58	57	43	20	11	55	

60					61				62				
0	57	47	20	12	58	51	20	25	59	54	20	37	0
5	57	53	20	13	58	56	20	26	59	59	20	38	5
10	57	58	20	14	59	1	20	27	60	4	20	39	10
15	58	4	20	15	59	7	20	28	60	9	20	40	15
20	58	9	20	16	59	10	20	29	60	14	20	41	20
25	58	14	20	17	59	16	20	30	60	20	20	42	25
30	58	19	20	18	59	22	20	31	60	25	20	43	30
35	58	25	20	19	59	27	20	32	60	30	20	44	35
40	58	30	20	20	59	32	20	33	60	35	20	45	40
45	58	35	20	22	59	38	20	34	60	41	20	46	45
50	58	40	20	23	59	43	20	35	60	46	20	47	50
55	58	45	20	24	59	48	20	36	60	51	20	48	55

ASCENSIONES RECTAE. ET DECLINATIONES VNIVS
quadrantis Eclipticæ per quina minuta.

63					64					65				
Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.	
	G	M	G	M		G	M	G	M		G	M	G	M
0	60	56	20	49	0	62	0	21	0	0	63	3	21	11
5	61	2	20	50	5	62	5	21	1	5	63	8	21	12
10	61	7	20	51	10	62	10	21	2	10	63	13	21	13
15	61	12	20	52	15	62	15	21	3	15	63	18	21	14
20	61	17	20	53	20	62	20	21	4	20	63	24	21	15
25	61	23	20	53	25	62	26	21	5	25	63	29	21	16
30	61	28	20	54	30	62	31	21	6	30	63	34	21	16
35	61	33	20	55	35	62	36	21	7	35	63	40	21	17
40	61	38	20	56	40	62	42	21	8	40	63	45	21	18
45	61	44	20	57	45	62	47	21	8	45	63	50	21	19
50	61	49	20	58	50	62	52	21	9	50	63	56	21	20
55	61	54	20	59	55	62	57	21	10	55	64	1	21	21
66					67					68				
0	64	6	21	22	0	65	10	21	32	0	66	13	21	42
5	64	11	21	23	5	65	15	21	33	5	66	19	21	42
10	64	16	21	23	10	65	20	21	34	10	66	24	21	43
15	64	21	21	24	15	65	25	21	34	15	66	29	21	44
20	64	27	21	25	20	65	31	21	35	20	66	34	21	45
25	64	32	21	26	25	65	36	21	36	25	66	39	21	46
30	64	37	21	27	30	65	41	21	37	30	66	45	21	47
35	64	43	21	28	35	65	46	21	38	35	66	50	21	47
40	64	48	21	28	40	65	52	21	39	40	66	55	21	48
45	64	53	21	29	45	65	57	21	39	45	67	1	21	49
50	64	59	21	30	50	66	2	21	40	50	67	6	21	50
55	65	5	21	31	55	66	8	21	41	55	67	12	21	51
69					70					71				
0	67	17	21	51	0	68	21	22	0	0	69	25	22	9
5	67	22	21	52	5	68	26	22	1	5	69	30	22	10
10	67	27	21	53	10	68	32	22	2	10	69	36	22	10
15	67	33	21	54	15	68	37	22	3	15	69	41	22	11
20	67	38	21	54	20	68	42	22	3	20	69	46	22	12
25	67	43	21	55	25	68	48	22	4	25	69	52	22	12
30	67	49	21	56	30	68	53	22	5	30	69	57	22	13
35	67	54	21	57	35	68	58	22	5	35	70	2	22	14
40	67	59	21	57	40	69	3	22	6	40	70	8	22	15
45	68	5	21	58	45	69	9	22	7	45	70	13	22	15
50	68	10	21	59	50	69	14	22	8	50	70	19	22	16
55	68	15	22	0	55	69	20	22	8	55	70	24	22	16

ASCENSIONES RECTAE. ET DECLINATIONES VNIVS
quadrantis Eclipticæ per quina minuta.

72					73					74				
Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.	
	G	M	G	M		G	M	G	M		G	M	G	M
0	70	30	22	17	0	71	34	22	25	0	72	38	22	32
5	70	35	22	18	5	71	39	22	26	5	72	43	22	33
10	70	40	22	18	10	71	44	22	26	10	72	49	22	33
15	70	45	22	19	15	71	50	22	27	15	72	54	22	34
20	70	50	22	20	20	71	55	22	27	20	72	59	22	35
25	70	56	22	20	25	72	1	22	28	25	73	5	22	35
30	71	2	22	21	30	72	6	22	29	30	73	10	22	36
35	71	7	22	22	35	72	11	22	29	35	73	16	22	36
40	71	12	22	22	40	72	16	22	30	40	73	21	22	37
45	71	18	22	23	45	72	22	22	30	45	73	27	22	37
50	71	23	22	23	50	72	27	22	31	50	73	32	22	37
55	71	28	22	24	55	72	33	22	31	55	73	37	22	38
75					76					77				
0	73	43	22	39	0	74	47	22	46	0	75	52	22	52
5	73	49	22	39	5	74	53	22	46	5	75	58	22	52
10	73	53	22	40	10	74	58	22	47	10	76	3	22	53
15	73	59	22	40	15	75	3	22	47	15	76	8	22	53
20	74	4	22	41	20	75	9	22	48	20	76	13	22	54
25	74	9	22	41	25	75	14	22	48	25	76	19	22	54
30	74	15	22	42	30	75	20	22	49	30	76	25	22	55
35	74	20	22	42	35	75	25	22	49	35	76	30	22	55
40	74	26	22	43	40	75	30	22	50	40	76	35	22	56
45	74	31	22	43	45	75	36	22	50	45	76	41	22	56
50	74	36	22	44	50	75	41	22	51	50	76	46	22	57
55	74	42	22	45	55	75	47	22	51	55	76	52	22	57
78					79					80				
0	76	57	22	58	0	78	2	23	3	0	79	7	23	7
5	77	2	22	58	5	78	7	23	3	5	79	12	23	8
10	77	8	22	58	10	78	13	23	3	10	79	18	23	8
15	77	13	22	59	15	78	18	23	4	15	79	23	23	8
20	77	18	22	59	20	78	24	23	4	20	79	29	23	9
25	77	24	23	0	25	78	29	23	5	25	79	34	23	9
30	77	29	23	0	30	78	34	23	5	30	79	39	23	9
35	77	35	23	0	35	78	40	23	5	35	79	45	23	10
40	77	40	23	1	40	78	45	23	6	40	79	50	23	10
45	77	45	23	1	45	78	51	23	6	45	79	56	23	11
50	77	51	23	2	50	78	56	23	7	50	80	1	23	11
55	77	56	23	2	55	79	1	23	7	55	80	6	23	11

ASCENSIONES RECTAE. ET DECLINATIONES VNIVS
quadrantis Eclipticæ per quina minuta.

63					64					65				
Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.	
	G	M	G	M		G	M	G	M		G	M	G	M
0	60	56	20	49	0	62	0	21	0	0	63	3	21	11
5	61	2	20	50	5	62	5	21	1	5	63	8	21	12
10	61	7	20	51	10	62	10	21	2	10	63	13	21	13
15	61	12	20	52	15	62	15	21	3	15	63	18	21	14
20	61	17	20	53	20	62	20	21	4	20	63	24	21	15
25	61	23	20	53	25	62	26	21	5	25	63	29	21	16
30	61	28	20	54	30	62	31	21	6	30	63	34	21	16
35	61	33	20	55	35	62	36	21	7	35	63	40	21	17
40	61	38	20	56	40	62	42	21	8	40	63	45	21	18
45	61	44	20	57	45	62	47	21	8	45	63	50	21	19
50	61	49	20	58	50	62	52	21	9	50	63	56	21	20
55	61	54	20	59	55	62	57	21	10	55	64	1	21	21
66					67					68				
0	64	6	21	22	0	65	10	21	32	0	66	13	21	42
5	64	11	21	23	5	65	15	21	33	5	66	19	21	42
10	64	16	21	23	10	65	20	21	34	10	66	24	21	43
15	64	21	21	24	15	65	25	21	34	15	66	29	21	44
20	64	27	21	25	20	65	31	21	35	20	66	34	21	45
25	64	32	21	26	25	65	36	21	36	25	66	39	21	46
30	64	37	21	27	30	65	41	21	37	30	66	45	21	47
35	64	43	21	28	35	65	46	21	38	35	66	50	21	47
40	64	48	21	28	40	65	52	21	39	40	66	55	21	48
45	64	53	21	29	45	65	57	21	39	45	67	1	21	49
50	64	59	21	30	50	66	2	21	40	50	67	6	21	50
55	65	5	21	31	55	66	8	21	41	55	67	12	21	51
69					70					71				
0	67	17	21	51	0	68	21	22	0	0	69	25	22	9
5	67	22	21	52	5	68	26	22	1	5	69	30	22	10
10	67	27	21	53	10	68	32	22	2	10	69	36	22	10
15	67	33	21	54	15	68	37	22	3	15	69	41	22	11
20	67	38	21	54	20	68	42	22	3	20	69	46	22	12
25	67	43	21	55	25	68	48	22	4	25	69	52	22	12
30	67	49	21	56	30	68	53	22	5	30	69	57	22	13
35	67	54	21	57	35	68	58	22	5	35	70	2	22	14
40	67	59	21	57	40	69	3	22	6	40	70	8	22	15
45	68	5	21	58	45	69	9	22	7	45	70	13	22	15
50	68	10	21	59	50	69	14	22	8	50	70	19	22	16
55	68	15	22	0	55	69	20	22	8	55	70	24	22	16

ASCENSIONES RECTAE. ET DECLINATIONES VNIVS
quadrantis Eclipticæ per quina minuta.

72					73					74				
Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.	
	G	M	G	M		G	M	G	M		G	M		
0	70	30	22	17	0	71	34	22	25	0	72	38	22	32
5	70	35	22	18	5	71	39	22	26	5	72	43	22	33
10	70	40	22	18	10	71	44	22	26	10	72	49	22	33
15	70	45	22	19	15	71	50	22	27	15	72	54	22	34
20	70	50	22	20	20	71	55	22	27	20	72	59	22	35
25	70	56	22	20	25	72	1	22	28	25	73	5	22	35
30	71	2	22	21	30	72	6	22	29	30	73	10	22	36
35	71	7	22	22	35	72	11	22	29	35	73	16	22	36
40	71	12	22	22	40	72	16	22	30	40	73	21	22	37
45	71	18	22	23	45	72	22	22	30	45	73	27	22	37
50	71	23	22	23	50	72	27	22	31	50	73	32	22	37
55	71	28	22	24	55	72	33	22	31	55	73	37	22	38

75					76					77				
0	73	43	22	39	0	74	47	22	46	0	75	52	22	52
5	73	49	22	39	5	74	53	22	46	5	75	58	22	52
10	73	53	22	40	10	74	58	22	47	10	76	3	22	53
15	73	59	22	40	15	75	3	22	47	15	76	8	22	53
20	74	4	22	41	20	75	9	22	48	20	76	13	22	54
25	74	9	22	41	25	75	14	22	48	25	76	19	22	54
30	74	15	22	42	30	75	20	22	49	30	76	25	22	55
35	74	20	22	42	35	75	25	22	49	35	76	30	22	55
40	74	26	22	43	40	75	30	22	50	40	76	35	22	56
45	74	31	22	43	45	75	36	22	50	45	76	41	22	56
50	74	36	22	44	50	75	41	22	51	50	76	46	22	57
55	74	42	22	45	55	75	47	22	51	55	76	52	22	57

78					79					80				
0	76	57	22	58	0	78	2	23	3	0	79	7	23	7
5	77	2	22	58	5	78	7	23	3	5	79	12	23	8
10	77	8	22	58	10	78	13	23	3	10	79	18	23	8
15	77	13	22	59	15	78	18	23	4	15	79	23	23	8
20	77	18	22	59	20	78	24	23	4	20	79	29	23	9
25	77	24	23	0	25	78	29	23	5	25	79	34	23	9
30	77	29	23	0	30	78	34	23	5	30	79	39	23	9
35	77	35	23	0	35	78	40	23	5	35	79	45	23	10
40	77	40	23	1	40	78	45	23	6	40	79	50	23	10
45	77	45	23	1	45	78	51	23	6	45	79	56	23	11
50	77	51	23	2	50	78	56	23	7	50	80	1	23	11
55	77	56	23	2	55	79	1	23	7	55	80	6	23	11

ASCENSIONES RECTAE. ET DECLINATIONES VNIVS
quadrantis Eclipticæ per quina minuta.

81					82					83					
Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.		Min.	asc. rect.		Declin.		Min.
	G	M	G	M		G	M	G	M		G	M	G	M	
0	80	12	23	12	0	81	18	23	15	0	82	22	23	19	0
5	80	17	23	12	5	81	23	23	16	5	82	28	23	19	5
10	80	23	23	12	10	81	28	23	16	10	82	33	23	19	10
15	80	28	23	13	15	81	34	23	16	15	82	38	23	10	15
20	80	33	23	13	20	81	39	23	16	20	82	44	23	10	20
25	80	39	23	13	25	81	44	23	17	25	82	49	23	10	25
30	80	44	23	14	30	81	49	23	17	30	82	55	23	20	30
35	80	50	23	14	35	81	55	23	17	35	83	0	23	21	35
40	80	56	23	14	40	82	0	23	18	40	83	6	23	21	40
45	81	1	23	15	45	82	6	23	18	45	83	11	23	21	45
50	81	7	23	15	50	82	11	23	18	50	83	16	23	21	50
55	81	12	23	15	55	82	17	23	19	55	83	22	23	22	55

84					85					86					
0	83	28	23	22	0	84	33	23	24	0	85	39	23	26	0
5	83	33	23	22	5	84	38	23	24	5	85	44	23	26	5
10	83	38	23	22	10	84	44	23	25	10	85	49	23	27	10
15	83	44	23	22	15	84	49	23	25	15	85	54	23	27	15
20	83	49	23	23	20	84	55	23	25	20	86	0	23	27	20
25	83	55	23	23	25	85	0	23	25	25	86	6	23	27	25
30	84	0	23	23	30	85	6	23	25	30	86	11	23	27	30
35	84	6	23	23	35	85	11	23	26	35	86	16	23	27	35
40	84	11	23	24	40	85	17	23	26	40	86	22	23	27	40
45	84	16	23	24	45	85	22	23	26	45	86	27	23	28	45
50	84	22	23	24	50	85	27	23	26	50	86	33	23	28	50
55	84	28	23	24	55	85	33	23	26	55	86	38	23	28	55

87					88					89					
0	86	44	23	28	0	87	49	23	29	0	88	54	23	30	0
5	86	49	23	28	5	87	55	23	29	5	89	0	23	30	5
10	86	55	23	28	10	88	0	23	29	10	89	6	23	30	10
15	87	0	23	28	15	88	5	23	29	15	89	16	23	30	15
20	87	6	23	28	20	88	11	23	29	20	89	16	23	30	20
25	87	11	23	28	25	88	16	23	29	25	89	22	23	30	25
30	87	16	23	29	30	88	22	23	29	30	89	27	23	30	30
35	87	22	23	29	35	88	27	23	29	35	89	33	23	30	35
40	87	27	23	29	40	88	33	23	30	40	89	38	23	30	40
45	87	33	23	29	45	88	38	23	30	45	89	44	23	30	45
50	87	38	23	29	50	88	44	23	30	50	89	49	23	30	50
55	87	44	23	29	55	88	49	23	30	55	89	55	23	30	55

Vsum huius Tabulæ ad hunc nostrum finem, habes indicatum in superioribus. Atque hæ sunt Demonstrationes, quibus P. Grünenberger indubitatam reddidit illam Praxim, quam ipse Regiam voluit appellare: cum qua & nos librum hunc finimus, ad Dei Optimi; Christi que Regis æterni gloriam maiorem.

EXAMEN DE MONASTICIS

161		162		163		164	
161	162	163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184
185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232
233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248
249	250	251	252	253	254	255	256
257	258	259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270	271	272
273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296
297	298	299	300	301	302	303	304
305	306	307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328
329	330	331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342	343	344
345	346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368
369	370	371	372	373	374	375	376
377	378	379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390	391	392
393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414	415	416
417	418	419	420	421	422	423	424
425	426	427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448
449	450	451	452	453	454	455	456
457	458	459	460	461	462	463	464
465	466	467	468	469	470	471	472
473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488
489	490	491	492	493	494	495	496
497	498	499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510	511	512
513	514	515	516	517	518	519	520
521	522	523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534	535	536
537	538	539	540	541	542	543	544
545	546	547	548	549	550	551	552
553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568
569	570	571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582	583	584
585	586	587	588	589	590	591	592
593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608
609	610	611	612	613	614	615	616
617	618	619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630	631	632
633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654	655	656
657	658	659	660	661	662	663	664
665	666	667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678	679	680
681	682	683	684	685	686	687	688
689	690	691	692	693	694	695	696
697	698	699	700	701	702	703	704
705	706	707	708	709	710	711	712
713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728
729	730	731	732	733	734	735	736
737	738	739	740	741	742	743	744
745	746	747	748	749	750	751	752
753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774	775	776
777	778	779	780	781	782	783	784
785	786	787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808
809	810	811	812	813	814	815	816
817	818	819	820	821	822	823	824
825	826	827	828	829	830	831	832
833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848
849	850	851	852	853	854	855	856
857	858	859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870	871	872
873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888
889	890	891	892	893	894	895	896
897	898	899	900	901	902	903	904
905	906	907	908	909	910	911	912
913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928
929	930	931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942	943	944
945	946	947	948	949	950	951	952
953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968
969	970	971	972	973	974	975	976
977	978	979	980	981	982	983	984
985	986	987	988	989	990	991	992
993	994	995	996	997	998	999	1000

Ut in huius Tabulae ad hunc nostrum finem, habes indicium in
superioribus. Atque haec sunt Demonstrationes, quibus P. Gradenber-
gerus indubitam reddidit illam Praxim, quam ipse Regiam voluit
appellare: cum qua & nos librum hunc finimus, ad Dei Optimi, Chri-
stique Regis aeterni gloriam maiorem.

1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008
1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016
1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024
1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032
1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056
1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064
1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072
1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080
1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088
1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096
1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104
1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112
1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128
1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136
1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144
1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152
1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160
1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168
1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176
1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184
1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192
1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200
1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208
1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216
1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224
1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232
1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240
1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248
1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256
1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264
1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272
1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280
1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288
1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296
1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304
1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312
1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320
1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328
1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336
1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344
1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352
1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360
1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368
1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376
1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384
1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392
1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400
1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408
1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416
1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424
1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432
1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440
1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448
1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456
1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464
1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472
1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480
1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488
1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496
1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504
1505	1506	1507	1508	1509	1510	151	

ROSÆ
VR SIN AE
SIVE SOLIS
LIBER QVARTVS.



ROSA Vrsina Libro primo radices egit ; Secundò in fruticem rudem & spinosum excreuit ; Tertiò folia viridia, & semiclausos quodammodo per Obseruationum Imagines calyces atque flores protrudit; nunc igitur Quartò sese expandit, & naturalem suam pulchritudinem hactenus latentem, folique cælo cognitam, terris spectandam offert, odorisq. fragrantiam per totum Vniuersum longe latèq. spargit.

Phænomini igitur solaris, naturam ex obseruationibus libro tertio præmissis, indago hoc Libro Quartò, cuius partes duas facio; in quarum prima ipsius proprietates prosequor : in Secunda Theoriam afferro & alia hinc & ex Phænomeno consequentia depromo.

Summa Partis Primæ.

I.



*Tractando-
rum ordo
& sequela.*

Otissimus Primæ Partis scopus est, indagare verum Solaris Phænomeni locum, ex hoc enim certo cognito, in aliarum rerum certam notitiam deueniri potest, aliter nequaquam: verus autem locus haberi nequit, nisi per cognitum verum motum; & hic non acquiritur, nisi ex Motu Apparente: unde necesse est de Apparente Macularum & Facularum Motu, Libro Tertio producto, & stabilito disputare. Quia vero Motus Localis à Visu non percipitur nisi viso Mobili, hoc autem per solos colores & lucem dignoscitur, oportet de Phænomeni nostri Luce, & obscuritate inquirere. & quia hæc non tantum loco moueri, sed & magnitudine variari, figura mutari, imo omnino euanescere atque de nouo enasci videmus; hinc in parte Prima omnia ista pertractamus: Motum ad Locum, ad Quantitatem, ad Qualitatem; vbi de Figura, de Luce, de Obscuritate, de Colore atq. Opacitate Phænomeni disceptamus; de Ortu & Occasu, de Generatione & Corruptione substantiali; denique Locum verum multis argumentis summatim relictis decernimus, eundemq. cum viso respectu Solis ostendimus, & absolutam exinde Macularum Facularumque magnitudinem definimus. Audisti summam, Amice Lector, sed hanc eandem cogita quasi Rosam adhuc tegumento clausam; contrecta parumper manu, confoue calore, confriga parumper, lege, inquam, sequentia; fortassis redolentia non ingrata afflaberis: Rosa enim hæc Vere perpetuo gaudet, & caducis folijs noua subcrefcentia continenter sufficit. Huius igitur venusta specie si caperis, omnium Conditori Deo, qui manu sua ipsam plantauit, gratulare: si male à me tractatam, forsitan præter mentem meam, offenderis, ne offendaris: homo sum, Opera Dei ab homine nunquam satis bene tractantur. Mirabilis hæc Rosa, diuina & cælestis non esset, si ingenij, & styli mei tenuitas ipsam adæquaret.

II.

PROLOGVS.

Rosam Vrsinam, diuturnitate temporis, obseruandi assiduitate, & diligentia stabilitam explicaturus ijs, quæ libris prioribus fideliter adduxi & tradidi pro notis & admissis atque indubitatis habitis, ad vltiora procedo: quod vt solidius fiat, omnia quæ de Apparente Phænomeni motu sparsim ob oculos statui, hic simul, sed succincte propono, hoc præmonens vt etiam si Phænomeni huius nomine omnia quæ in Sole visuntur circa Maculas & Faculas tam primarias quam Secundarias, intelligam & comprehendam, dum de motu apparente generatim ago: nihilominus quia Maculæ, præsertim primariæ in oculos Helioptici, potissimum occurrunt; ita de illis sim tractaturus, vt reliquis Solis apparentijs pleraque etiam possint accommodari. Quandoquidem nec minus nec aliter apparent moueri Faculæ quàm Maculæ; neque minus aut aliter Vmbra & Luculæ, quàm illæ vtreq. nisi quod maior instabilitas & minor duratio in his reperiatur, quàm in Maculis primarijs.

Motus secundum Philosophum est triplex; localis; augmentationis; alterationis: de singulis pro instituta breuitate ordine agemus.

*De Motu Macularum locali
apparente.*

Motus localis distinguitur in verum, & apparentem: verus est is, qui prout apparet, ita etiam ex parte rei mobili inest: apparens est is, quem visus mobili adiudicat, siue iam ex parte rei inest, siue non: unde fit, vt omnis motus localis verus, possit esse & dici apparens, quatenus nimirum sensu percipi potest, ratione subiecti mobilis; non tamen omnis apparens necessario sit aut dicatur verus. Dixi ratione mobilis, quia si quo casu mobilia dentur in nullum sensum cadentia; iam motus illorum neque apparens neque verus percipietur.

Ambulat nauis in mari, mouentur homines

*Ex obseruat-
is priore
libro allatis
doctrina se-
quens dedu-
citur.*

*Qua de Ma-
culis prima-
rijs dicetur,
poterunt or-
dinari etiam
alijs Phæno-
meni parti-
bus applica-
ri.*

*Triplex Mo-
tus species.*

*Motus ve-
rus & appa-
rens, quis*

II.

Motus merè apparēs quæ scēte mobili.
mines vna cum & in naue, & ipsi littora vtrinque stantia, vnaque cum littoribus terras, sylvas, montes, turre &c. contra moueri vident; motu vtiq; non vero, sed merè apparente.

Motus appa- res & verus.
Video currentem in stadio equum, & ibi vbi currentem video, currentem iudico; Motus apparens, & verus.

Igitur vt institutæ breuitati consula- tur, quæcunque ad apparentem Macu- larum motum pertinent, per certa pro- nunciata ex obseruationibus hausta pro- sequar.

PRONVNCIATVM PRIMVM.

Ortus, & oc- casus Macu- larum quo- tidianus.
Omnes Maculae (quamdiu durant, neque motu proprio in auersam Solis plagam auertuntur) quotidie cum Sole mane apparenter oriuntur, cumque eodem toto die conuertuntur, & vespere occum- bunt, neq; Solem deserunt, in vlla or- bis terreni parte conspectæ; imo tempore eodem, visuntur ubiq; ab obseruatori- bus diuersissimis, in locis Solaris disci yf- dem, progressionibus planè uniformi- bus, distantius à centro, & marginibus vel equalibus vel proportionalibus.

CAP. I.

Hoc pronunciatum satis proba- tum est, toto libro priore, ex adductis tot diuersorum loco- rum & Astronomorum obseruationibus, quæ Maculas aut iisdem aut proportio- natis in Sole locis obseruatas, & de die in diem cum eodem exortas, atq; per meridiem in occasum delatas edocent: neque sane alia probatione vltiore in- diget, quam solo aspectu, qui fieri po- test à quouis, die quolibet. Et licet res hæc apud Astronomos omni falsitatis su- spicione careat; apud eos tamen, qui vel Phenomenon ignorant, vel vim conse- quentiarum inde deductarum auersan- tur, aliquid difficultatis subesse potuif- set: vnde in præmissis libro tam frequen- tem, tam solidam, ex obseruationibus a- lienis probationem attuli: quia ex hoc vnico puncto; Quod omnes & singulae Maculae, ex quauis orbis parte, cum Sole oriri, culminare, & occidere videantur, in eodem sub Sole loco, tempore proportio- naliter eodem, &c. ex hoc, inquam, vnico puncto, etiam si alia non darentur,

II.

1 prout dantur plurima, Maculae omnes ir- refragabiliter supra Lunam, totamq; Lu- nae sphaeram eleuantur: id quod eiden- tissimè, atq; ipso facto demonstratur, ex
5 qualibet eclipsi Solis, quæ cum nil aliud sit, quam radiorum solarium Lunæ inter- iectu occultatio; certum est, etiam Macu- larum inter nos, & Solem oppositiorum, a- liud nil, quam varias radiorum ipsius inter-
10 cisiones fieri. Quare sicut nulla Solis E- clipsis ab interpositione Lunæ causata, vel in eodẽ loco Solis è diuersis terræ re- gionibus, vel ex omni hemisphaerii terreni luminaribus coniunctis subiecti plaga, si-
15 mul spectatur: ita, si Maculae etiam in ip- sam Lunaris sphaeræ crassitiem, quocunq; modo imponantur, neq; in eodem loco So- lis, neq; ex quauis terræ oppositæ regio- ne simul cernuntur: sed qui sunt orienta-
20 lissimi, ijs Maculae solares occidentiores, qui sunt occidentalissimi, ijs eadem fiet orientiores, qui sunt respectu Solis Au- strales, videbunt septentrionales, qui medij, loco Solis medio: sicut fit in Eclipsi
25 Solis integra, quam ij soli totam vident, qui intra superficiem conicæ umbræ con- sistunt; reliqui omnes totam obscuratio- nem Solis non cernunt, sed partem Solis versus verticem ab omni occultatione li-
30 beram, plus vel minus, prout in terra, à loco Solis magis, vel minus absūt, de quo argumento, plura ex professo dicentur in- ferius. Interim hic sufficiat, Maculas sola- res, in varijs & maxime inter se distanti-
35 bus Prouincijs, eodẽ quasi tempore visas & cõsignatas, omni prorsus sensibili aspe- ctus diuersitate caruisse. Cuius rei testes laudare possè quâ plurimos, eū quibus, & olim, & nūc cõmunicem habeo. Certe
40 Maculae in Italia, Germania, Polonia, Bel- gio, Gallia, Hispania, Nouo Orbe, & Arabi obseruatae, interq; sese collatae, omnẽ pro- fus Parallaxin respuunt, id quod nō ego tã- tū singularibus ex eplis frequenter expectus-
45 sū, multisq; in priore libro adductis planū feci; sed idẽ alij quoq; alibi factitarū, oēq; earū inter sese quoad sitū, & locū visū in Sole cõuenientiā, & similitudinẽ reperere. idq; priuatis, & publicis scriptis cõtestatū
50 reliquere. Vide Galileū in Hist. Delle Mac- chie, Epist. an. 1612. die 14. Aug. ad Mar- cū Vellierū per scripta pag. 45. & alibi passi- tã in hac, quã sequenti epist. &c. Patre Ada- mū Tãnerū, qui in Dissertatione de Celis,
Q. vij. S. v. p. 152. de Mac. solar. hæc habet.

Macula a- pud Lunam posita, pate- rentur sen- sibilem pa- rallaxin.

Macula ca- rent omni se- nsibili paral- laxi.

Macula su- pra Lunam euehantur infallibili- ter,

Summa Partis Primæ.

I.



*Tractando-
rum ordo
& sequela.*

Otissimus Primæ Partis scopus est, indagare verum Solaris Phænomeni locum, ex hoc enim certo cognito, in aliarum rerum certam notitiam deueniri potest, aliter nequaquam: verus autem locus haberi nequit, nisi per cognitum verum motum; & hic non acquiritur, nisi ex Motu Apparente: unde necesse est de Apparente Macularum & Facularum Motu, Libro Tertio producto, & stabilito disputare. Quia vero Motus Localis à Visu non percipitur nisi viso Mobili, hoc autem per solos colores & lucem dignoscitur, oportet de Phænomeni nostri Luce, & obscuritate inquirere. & quia hasce non tantum loco moueri, sed & magnitudine variari, figura mutari, imo omnino euanescere atque de nouo enasci videmus; hinc in parte Prima omnia ista pertractamus: Motum ad Locum, ad Quantitatem, ad Qualitatem; vbi de Figura, de Luce, de Obscuritate, de Colore atq. Opacitate Phænomeni disceptamus; de Ortu & Occasu, de Generatione & Corruptione substantiali; denique Locum verum multis argumentis summatim relictis decernimus, eundemq. cum viso respectu Solis ostendimus, & absolutam exinde Macularum Facularumque magnitudinem definimus. Audisti summam, Amice Lector, sed hanc eandem cogita quasi Rosam adhuc tegumento clausam; contrecta parumper manu, confoue calore, confrigaparumper, lege, inquam, sequentia; fortassis redolentia non ingrata afflaberis: Rosa enim hæc Vere perpetuo gaudet, & caducis folijs noua subcrefcentia continenter sufficit. Huius igitur venusta specie si caperis, omnium Conditori Deo, qui manu sua ipsam plantauit, gratulare: si male à me tractatam, forsitan præter mentem meam, offenderis, ne offendaris: homo sum, Opera Dei ab homine nunquam satis bene tractantur. Mirabilis hæc Rosa, diuina & cælestis non esset, si ingenij, & styli mei tenuitas ipsam adæquaret.

II.

PROLOGVS.

Rosam Vrsinam, diuturnitate temporis, obseruandi assiduitate, & diligentia stabilitam explicaturus ijs, quæ libris prioribus fideliter adduxi & tradidi pro notis & admissis atque indubitatis habitis, ad vltiora procedo: quod vt solidius fiat, omnia quæ de Apparente Phænomeni motu sparsim ob oculos statui, hic simul, sed succinctè propono, hoc præmonens vt etiam si Phænomeni huius nomine omnia quæ in Sole visuntur circa Maculas & Faculas tam primarias quam Secundarias, intelligam & comprehendam, dum de motu apparente generatim ago: nihilominus quia Maculæ, præsertim primariæ in oculos Helioptici, potissimum occurrunt; ita de illis sim tractaturus, vt reliquis Solis apparentijs pleraque etiam possint accommodari. Quandoquidem nec minus nec aliter apparent moueri Faculæ quam Maculæ; neque minus aut aliter Umbrae & Luculæ, quam illæ vtrequi quod maior instabilitas & minor duratio in his reperiatur, quam in Maculis primarijs.

Motus secundum Philosophum est triplex; localis; augmentationis; alterationis: de singulis pro instituta breuitate ordine agemus.

*De Motu Macularum locali
apparente.*

Motus localis distinguitur in verum, & apparentem: verus est is, qui prout apparet, ita etiam ex parte rei mobili inest: apparens est is, quem visus mobili adiudicat, siue iam ex parte rei inest, siue non: unde fit, vt omnis motus localis verus, possit esse & dici apparens, quatenus nimirum sensu percipi potest, ratione subiecti mobilis; non tamen omnis apparens necessario sit aut dicatur verus. Dixi ratione mobilis, quia si quo casu mobilia dentur in nullum sensum cadentia; iam motus illorum neque apparens neque verus percipietur.

Ambulat nauis in mari, mouentur homines

*Ex obserua-
tis priore
libro allatis
doctrina se-
quens dedu-
citur.*

*Qua de Ma-
culis prima-
rijs dicetur,
poterunt or-
dinarie etiã
alijs Phæno-
meni parti-
bus applica-
ri.*

*Triplex Mo-
tus Species.*

*Motus ve-
rus & appa-
rens, quis*

II.

Motus merè apparēs quie scēte mobili. mines vna cum & in naue, & ipsi littora vtrinq; stantia, vnāque cum littoribus terras, sylvas, montes, turres &c. contra moueri vident; motu vtiq; non vero, sed merè apparente.

Motus appa- res & verus. Video currentem in stadio equum, & ibi vbi currentem video, currentem iudico; Motus apparens, & verus.

Igitur vt institutæ breuitati consula- tur, quæcunque ad apparentem Macu- larum motum pertinent, per certa pro- nunciata ex obseruationibus hausta pro- sequar.

PRONUNCIATVM PRIMVM.

Ortus, & oc- casus Macu- larum quo- tidianus. Omnes Macula (quamdiu durant, neque motu proprio in auersam Solis plagam auertuntur) quotidie cum Sole mane apparenter oriuntur, cumque eodem toto die conuertuntur, & vespere occum- bunt, neq; Solem deserunt, in vlla or- bis terreni parte conspectæ; imo tempore eodem, visuntur ubiq; ab obseruatori- bus diuersissimis, in locis Solaris disci is- dem, progressionibus planè uniformi- bus, distantius à centro, & marginibus vel equalibus vel proportionalibus.

CAP. I.

Hoc pronunciatum satis proba- tum est, toto libro priore, ex adductis tot diuersorum loco- rum & Astronomorum obseruationibus, quæ Maculas aut ipsas aut proportio- natis in Sole locis obseruatas, & de die in diem cum eodem exortas, atq; per meridiem in occasum delatas edocent: neque sane alia probatione vltiore in- diget, quam solo aspectu, qui fieri po- test à quouis, die quolibet. Et licet res hæc apud Astronomos omni falsitatis su- spicione careat; apud eos tamen, qui vel Phænomenon ignorant, vel vim conse- quentiarum inde deductarum auersan- tur, aliquid difficultatis subesse potuis- set: vnde in præmissis libro tam frequen- tem, tam solidam, ex obseruationibus a- lienis probationem attuli: quia ex hoc vnico puncto; Quod omnes & singula Macula, ex quauis orbis parte, cum Sole oriri, culminare, & occidere videantur, in eodem sub Sole loco, tempore proportio- naliter eodem, &c. ex hoc, inquam, vnico puncto, etiam si alia non darentur,

II.

1 prout dantur plurima, Macula omnes ir- refragabiliter supra Lunam, totamq; Lu- nam sphaeram eleuantur: id quod euiden- tissimè, atq; ipso factu demonstratur, ex
5 qualibet eclipsi Solis, quæ cum nil aliud sit, quam radiorum solarium Lunæ inter- iectu occultatio; certum est, etiam Macu- larum inter nos, & Solem oppositione, a- liud nil, quam varias radiorum ipsius inter- cisiones fieri. Quare sicut nulla Solis E-
10 clipsis ab interpositione Lunæ causata, vel in eodē loco Solis è diuersis terræ re- gionibus, vel ex omni hemisphaerii terreni luminaribus coniunctis subiecti plaga, si- mul spectatur: ita, si Macula etiam in ip-
15 sam Lunaris sphaeræ crassitiem, quocūq; modo imponatur; neq; in eodem loco So- lis, neq; ex quauis terræ opposita regio- ne simul cernuntur: sed qui sunt orienta-
20 lissimi, ipsi Maculae solares occidentiores, qui sunt occidentalissimi, ipsi eadem fiēt orientiores, qui sunt respectu Solis Au- strales, videbunt septentrionaliores, qui medij, loco Solis medio: sicut fit in Eclipsi
25 Solis integra, quam ij soli totam vident, qui intra superficiem conicā vmbrae con- sistunt; reliqui omnes totam obscuratio- nem Solis non cernunt, sed partem Solis versus verticem ab omni occultatione li-
30 beram, plus vel minus, prout in terra, à loco Solis magis, vel minus absūt; de quo argumento, plura ex professo dicentur in- ferius. Interim hic sufficiat, Maculas sola- res, in varijs & maxime inter se distanti-
35 bus Prouincijs, eodē quasi tempore visas & cōsignatas, omni prorsus sēsibili aspe- ctus diuersitate caruisse. Cuius rei testes laudare possē quā plurimos, eū quibus, & olim, & nūc cōmunicōem habeo. Certè
40 Maculae in Italia, Germania, Polonia, Bel- gio, Gallia, Hispania, Nouo Orbe, & alibi obseruatae, interq; sese collatae, omnē prorsus Parallaxin respuūt, id quod nō ego tā- tū singularibus exēplis frequēter expectus sū, multisq; in priore libro adductis planū feci; sed idē alij quoq; alibi factitarūt, oēq; earū inter sese quoad sitū, & locū visū in Sole cōueniētiā, & similitudinē reperere. idq; priuatis, & publicis scriptis cōtestatū reliquere. Vide Galileū in Hist. Delle Mac-
50 chie, Epist. an; 1612. die 14. Aug. ad Mar- cū Vellierū per scripta pag. 45. & alibi passi- tā in hac, quā sequēti epist. &c. Patrē Ada- mū Tānerū, qui in Dissertatione de Celis, Q. vij. §. v. p. 152. de Mac. solar. hæc habet.

Macula a- pud Lunam posita, pate- rentur sen- sibilem pa- rallaxin.

Macula ca- rent omni sēsibili paral- laxi.

Summa Partis Primæ.

I.



*Tractando-
rum ordo
& sequela.*

Otissimus Primæ Partis scopus est, indagare verum Solaris Phænomeni locum, ex hoc enim certo cognito, in aliarum rerum certam notitiam deueniri potest, aliter nequaquam: verus autem locus haberi nequit, nisi per cognitum verum motum; & hic non acquiritur, nisi ex Motu Apparente: unde necesse est de Apparente Macularum & Facularum Motu, Libro Tertio producto, & stabilito disputare. Quia vero Motus Localis a Visu non percipitur nisi viso Mobili, hoc autem per solos colores & lucem dignoscitur, oportet de Phænomeni nostri Luce, & obscuritate inquirere. & quia hasce non tantum loco moueri, sed & magnitudine variari, figura mutari, imo omnino euanescere atque de nouo enasci videmus; hinc in parte Prima omnia ista pertractamus: Motum ad Locum, ad Quantitatem, ad Qualitatem; vbi de Figura, de Luce, de Obscuritate, de Colore atq. Opacitate Phænomeni disceptamus; de Ortu & Occasu, de Generatione & Corruptione substantiali; denique Locum verum multis argumentis summatim relictis decernimus, eundemq. cum viso respectu Solis ostendimus, & absolutam exinde Macularum Facularumque magnitudinem definimus. Audisti summam, Amice Lector, sed hanc eandem cogita quasi Rosam adhuc tegumento clausam; contrecta parumper manu, confoue calore, confriga parumper, lege, inquam, sequentia; fortassis redolentia non ingrata afflaberis: Rosa enim hæc Vere perpetuo gaudet, & caducis folijs noua subcrefcentia continenter sufficit. Huius igitur venusta specie si caperis, omnium Conditori Deo, qui manu sua ipsam plantauit, gratulare: si male à me tractatam, forsitan præter mentem meam, offenderis, ne offendaris: homo sum, Opera Dei ab homine nunquam satis bene tractantur. Mirabilis hæc Rosa, diuina & cælestis non esset, si ingenij, & styli mei tenuitas ipsam adæquaret.

II.

PROLOGVS.

Rosam Vrsinam, diuturnitate temporis, obseruandi assiduitate, & diligentia stabilitam explicaturus ijs, quæ libris prioribus fideliter adduxi & tradidi pro notis & admissis atque indubitatis habitis, ad vltiora procedo: quod vt solidius fiat, omnia quæ de Apparente Phænomeni motu sparsim ob oculos statui, hic simul, sed succincte propono, hoc præmonens vt etiam si Phænomeni huius nomine omnia quæ in Sole visuntur circa Maculas & Faculas tam primarias quam Secundarias, intelligam & comprehendam, dum de motu apparente generatim ago: nihilominus quia Maculæ, præsertim primariæ in oculos Helioplici, potissimum occurrunt; ita de illis sim tractaturus, vt reliquis Solis apparentijs pleraque etiam possint accommodari. Quandoquidem nec minus nec aliter apparent moueri Faculæ quam Maculæ; neque minus aut aliter Vmbra & Luculæ, quam illæ vtreq. nisi quod maior instabilitas & minor duratio in his reperiatur, quam in Maculis primarijs.

Motus secundum Philosophum est triplex; localis; augmentationis; alterationis: de singulis pro instituta breuitate ordine agemus.

*De Motu Macularum locali
apparente.*

Motus localis distinguitur in verum, & apparentem: verus est is, qui prout apparet, ita etiam ex parte rei mobili inest: apparens est is, quem visus mobili adiudicat, siue iam ex parte rei inest, siue non: vnde fit, vt omnis motus localis verus, possit esse & dici apparens, quatenus nimirum sensu percipi potest, ratione subiecti mobilis; non tamen omnis apparens necessario fit aut dicatur verus. Dixi ratione mobilis, quia si quo casu mobilia dentur in nullum sensum cadentia; iam motus illorum neque apparens neque verus percipietur.

Ambulat nauis in mari, mouentur homines

*Ex obserua-
tis priore
libro allatis
doctrina se-
quens dedu-
cet.*

*Quæ de Ma-
culis prima-
rijs dicetur
poterunt or-
dinarie et
alijs Phæ-
nomeni parti-
bus applica-
ri.*

*Triplex Mo-
tus species.*

*Motus ve-
rus & appa-
rens, qui*

II.

Motus merè apparēs quie scēte mobili. mines vna cum & in naue, & ipsi littora vtrinq; stantia, vnāque cum littoribus terras, syluas, montes, turres &c. contra moueri vident; motu vtiq; non vero, sed merè apparente.

Motus appa res & verus. Video currentem in stadio equum, & ibi vbi currentem video, currentem iudico; Motus apparens, & verus.

Igitur vt instituta breuitati consula- tur, quæcunque ad apparentem Macu- larum motum pertinent, per certa pro- nunciata ex obseruationibus hausta pro- sequar.

PRONUNCIATVM PRIMVM.

Ortus, & oc casus Macu larum quo- tidianus. Omnes Macula (quamdiu durant, neque motu proprio in auersam Solis plagam auertuntur) quotidie cum Sole mane apparenter oriuntur, cumque eodem toto die conuertuntur, & vespere occum- bunt, neq; Solem deserunt, in vlla or- bis terreni parte conspectæ; imo tempore eodem, visuntur ubiq; ab obseruatori- bus diuersissimis, in locis Solaris disci yf- dem, progressionibus planè uniformi- bus, distantis à centro, & marginibus vel equalibus vel proportionalibus.

CAP. I.

Hoc pronunciatum satis proba- tum est, toto libro priore, ex adductis tot diuersorum loco- rum & Astronomorum obseruationibus, quæ Maculas aut iisdem aut proportio- natis in Sole locis obseruatas, & de die in diem cum eodem exortas, atq; per meridiem in occasum delatas edocent: neque sane alia probatione vltiore in- diget, quam solo aspectu, qui fieri po- test à quouis, die quolibet. Et licet res hæc apud Astronomos omni falsitatis su- spicione careat; apud eos tamen, qui vel Phænomenon ignorant, vel vim conse- quentiarum inde deductarum auersan- tur, aliquid difficultatis subesse potuis- set: vnde in præmissis libro tam frequen- tem, tam solidam, ex obseruationibus a- lienis probationem attuli: quia ex hoc vnico puncto; Quod omnes & singula Macula, ex quauis orbis parte, cum Sole oriri, culminare, & occidere videantur, in eodem sub Sole loco, tempore proportio- naliter eodem, &c. ex hoc, inquam, vnico puncto, etiam si alia non darentur,

II.

1 prout dantur plurima, Macula omnes ir- refragabiliter supra Lunam, totamq; Lu- na sphaeram eleuantur: id quod euiden- tissimè, atq; ipso facto demonstratur, ex 5 qualibet eclipsi Solis, quæ cum nil aliud sit, quam radiorum solarium Lunæ inter- iectu occultatio; certum est, etiam Macu- larum inter nos, & Solem oppositione, a- liud nil, quam varias radiorum ipsius inter- cisiones fieri. Quare sicut nulla Solis E- 10 clipfis ab interpositione Lunæ causata, vel in eodē loco Solis è diuersis terræ re- gionibus, vel ex omni hemisphaerij terreni luminaribus coniunctis subiecti plaga, si- mul spectatur: ita, si Macula etiam in ip- 15 sam Lunaris sphaeræ crassitiem, quocūq; modo imponatur; neq; in eodem loco So- lis, neq; ex quauis terræ oppositæ regio- ne simul cernentur: sed qui sunt orientā- 20 lissimi, ijs Macula solares occidentiores, qui sunt occidentalissimi, ijs eadem fiet orientiores, qui sunt respectu Solis Au- strales, videbunt septentrionales, qui medij, loco Solis medio: sicut fit in Eclipsi 25 Solis integra, quam ij soli totam vident, qui intra superficiem conicæ vmbrae con- sistent; reliqui omnes totam obscuratio- nem Solis non cernunt, sed partem Solis versus verticem ab omni occultatione li- 30 beram, plus vel minus, prout in terra, à loco Solis magis, vel minus absūt; de quo argumento, plura ex professo dicentur in- ferius. Interim hic sufficiat, Maculas sola- res, in varijs & maxime inter se distanti- 35 bus Prouincijs, eodē quasi tempore visas & cōsignatas, omni prorsus sēsibili aspe- ctus diuersitate caruisse. Cuius rei testes laudare possē quā plurimos, cū quibus, & olim, & nūc cōmunicōem habeo. Certe 40 Macula in Italia, Germania, Polonia, Bel- gio, Gallia, Hispania, Nouo Orbe, & alibi obseruata; interq; sese collata, omnē prorsus Parallaxin respuūt; id quod nō ego tā- tū singularibus ex ēplis frequēter expectus sū, multisq; in priore libro adductis planū feci; sed idē alij quoq; alibi factitarūt; oēq; earū inter sese quoad sitū, & locū visū in Sole cōueniētiā, & similitudinē reperere. idq; priuaris, & publicis scriptis cōtestatū reliquere. Vide Galileū in Hist. Delle Mac- 45 chie, Epist. an; 1612. die 14. Aug. ad Mar- cū Vellerū per scripta pag. 45. & alibi passī tā in hac, quā sequēti epist. &c. Patre Ada- mū Tānerū, qui in Dissertatione de Cēlis, Q. vij. S. v. p. 152. de Mac. solar. hæc habet.

Macula a- pud Lunam posita, pate- rentur sen- sibilem pa- rallaxin.

Macula ca- rent omni sēsibili paral- laxi.

Macula su- pra Lunam euehantur infallibili- ter.

I.

Ad tertium, scilicet Maculas Solares, quod attinet, fateor in primis, eas & re ipsa existere, & Luna superiores esse; etiam si multi eas multo tempore, aut prorsus negarint, tubi aut oculorum vitia & maculas, non Solis esse rati: aut certe Luna superiores non esse existimarint. Quorum utrumque refellitur, non solum quia ab iisdem diuerso tempore, idque satis diuturno (spatio ferre duodecim, vel quattuordecim dierum) sed etiam quia eodem tempore in diuersissimis remotissimisque locis à diuersis sub eodem Solis loco (nisi quantum proportionalis motus progressio, aut locorum distantia variavit) magna proportionum uniformitate constanter visæ sunt, atque etiam nunc videntur. Manet ergo, id quod in Pronunciato dixi, comprobatum & observationibus, librorum priorum productis, & auctoritate multorum aliorum: & ex eo, quod Maculae continuos dies cum Sole motu primi Mobilis circumduci videntur, & in eodem Solis loco sensibilibiter immorari, vnde cunctique tandem ex orbe conspectæ; clarum & euictum est, nullam illarum, vel infra Lunam in aëre, vel cum Luna, aut circa Lunam in aethere, sed longe altius in caelestibus illis regionibus circumferri, id quod erat demonstrandum: atque communiter ab omnibus nunc est receptum. de quo tamen inferius pluribus agemus.

COROLLARIUM.

Macula transcendit Venerem & Mercurii Perigaos.

Hoc eodem argumentandi modo, Macula exaltabuntur supra circulos Veneris & Mercurii perigaos; nam in illis hosce planetas ad Solem pati parallaxin aliquam sensibilem non est dubium, id quod solide inferius ostendetur: vnde si Maculae in illorum sedibus collocarentur, haud dubie ipsæ cursus suos apparentes, proportionali ratione in circulo observatorio ex aspectus diuersitate precipitarent, ita ut in diuersis locis, aut loco eodem tempore diuerso, obseruatae, in diuersis & alienis locis Solis conspicerentur; id quod tamen non fit. vnde nec illuc compingendas, sed sublimiore throno suspiciendas, extra controuersiam relinquitur.

PRONUNCIATVM SECVNDVM,
Omnes Maculae, nulla dempta, videntur semper moueri ab orientali Solis plaga, in eiusdem occidentalem.

CAP. II.

VT hoc pronunciatum rectè intelligatur, sciendum primo hic iam non agi amplius de motu *Notandum primum.*

Macularum communi, & quotidiano, ratione primi mobilis per accidens subeundo; sed de peculiari illarum, respectu disci solaris, progressionem, qua pederent in Sole promouentur, è loco Solis in locum alium eiusdem, donec totum emensæ fuerint, certis dierum interuallis.

Sciendum secundo. Solis centrum, semper in Ecliptica versari, ideoque Solem ab eadē in duo hemisphaeria secari, quorum alterum & in meridie versus Zenith *Notandum secundum.*

eleuatus, Aquilonare; alterum & in meridie horizontem spectans atque humilior existens, Meridionale seu austrinum dicitur. Iam si dictæ Eclipticæ, circulo seu plano per centrum Solis & polos, axemque Eclipticæ, aliud planum seu circulus erigatur ad rectos, secabitur sol iterum in duo æqualia hemisphaeria; quorum id quod ad orientem spectat, orientale; quod ad occidentem, occidentale nominio. Hisce præmissis.

Quandoquidem ex hæcenus obseruatis & toto libro priore adductis tot Cursuum Imaginibus luculenter constat, omnes Maculas semper & constantissime ab Orientali Solis plaga in occidentem ferri; constat sua pronunciatio fides, & efficacia. Nam secundum rectam Logicam, ad esse, sequitur dici: ergo cum perpetuus omnium Macularum apparens motus sit, ex horizonte Solis ortiuo, in eiusdem occidentem; iure merito motus illarum apparens, talis esse perhibetur. & confirmatur ex vnanimi omnium Astronomorum praxi & consensu; qui omnium astrorum, omnium Cometa- *Varia disci solaris per certas circulorum sectiones diuisio.*

rum apparentes motus & illorum tendentias definiuerunt, non ex latente, sed ex patente mobilium hemisphaerio: hinc Sol, & omnia astra quotidie mane oriri, vesperi occidere, & cursum diurnum ab ortu in occasum *Macula ab ortu in occasum ferri, dicenda sit.*

perfi- *Ortus, & Occasus ex hemisphaerio patente denominatur.*

I.

I I.

perficere dicuntur, quia nimirum hemisphaerium patens percurrunt: hinc rursus & Sol & planetae atque omnia pariter astra fixa, ab occasu in ortum suas proprias periodos absoluerere creduntur, non aliam ob causam, quam quod tales revolutiones in aspectabili hemisphaerio peragere deprehendantur; quare cum Maculae solares in aspectabili Solis facie Sole supra horizontem nostrum constituto, semper ab orientali Solis plaga, in occidentalem eiusdem deferantur; in aversa vero parte sola ratione, nullo sensu possint percipi: ridiculum esset, sensu, ratione, & auctoritate antiquorum neglecta, illarum periodos velle determinare, ex decurso hemisphaerio Solis superiore, & latente, adeoque dicere, Maculas oriri in Sole, quando Solem exeunt; occidere, in eodem quando eundem intrant: praefertim dum motus illarum supra Solem, in Quaestione versatur.

Obiectio in
ex Epicyclo
rum denomi
natione sa
tisfit.

Quod si quis obijciat Epicyclos planetarum, & dicat illorum motus definiri a partibus circulorum superioribus, adeoque & de motu Macularum idem statuendum, cum per modum Epicyclorum circa Solem voluantur.

Respondeo, An & quomodo Maculae circa centrum Solis girentur; utrum homocentrice, an excentricè; utrum in Epicyclis an secus circumueant, nunc quidem non agitari, discutiendum postea; hoc certum esse.

Primo, Nullum planetam ab Astronomis statui ab ortu in occasum, vel ab occasu in ortum moueri, nisi in hemisphaerio patente, atque supra horizontem consideratum.

Secundo, Nullum planetam in Epicyclo delatum, denominari vel tantum a parte sphaerae superiore, vel tantum ab inferiore circumuolui, sed ab utraque; & hoc ideo, quod in hemisphaerio patulo, planeta aequè mobilis videatur in Epicycli superiore, atque inferiore parte: vnde Astronomi non habebant maiorem rationem, motum illum definiendi ab ortu in occasum, quam ab hoc in ortum; ergo prudentissime ab utroque in utrumque diuisum. Vnde si argumentum hoc multum efficiet, id vnum obtinebit, ut Maculae dicantur infra Solem ferri ab ortu in occasum, supra, ab occasu in ortum. Si tamen simpliciter denominandus esset ea-

rundem Motus, diceretur esse ab ortu in occasum, quia hic semper est visibilis, ille nunquam. Atque haec pro veritate, & Appelle meo dicta sunt.

Ex hoc autem perpetuo motus tenore, ortus & occasus inuariabili consequentia, oportet paullatim attollere animum, & aliquid magni de hoc Phenomeno suspicari, neque illud inter vilia & fortuita Meteora annumerare, sed caelestibus, & solemnibus ostentis adscribere. Nam si Maculae nubium instar circa Solem fluatarent, (prout simile quid menti ingerere posse videntur) quemadmodum in Atmosphaera circa terram nubes tumultuari quotidie cernimus; quis non videt, incredibile, ne dicam, impossibile merito videri, ut non aliquando contrario impetu, ex occasu in ortum ferrentur? quis easdem ex Austro in Aquilonem, aut hinc in Meridianam oram impellendas neget? prout in nubibus nostris simul fieri amat: quae cum nunquam eueniant, oportet horum longe aliam, certiorè & diuiniorè causam esse, quae illas constanti hac lege ab ortu in occasum deducat. Cum proprijs interim in orbem diffusionibus non careant.

Porro, quia multi sunt, qui putant se Macularum spectaculum sub Sole perpetuo intercursum visendum, sufficienter explicaturos orbium caelestium Soli subiectorum perpetuo ordinatissimoque interposito, ita ut Maculae & Faculae sub Sole conspectae, nil aliud sint quam heterogeneae orbium caelestium particulae, Solaribus radijs magis vel minus peruiæ aut illustratae; tamen si haec persuasio multis & euidentibus rationibus possit in contrarium conuinci, & ex priore pronuntiatio penitus prostrata iaceat; in gratiam tamen eorum, qui veritatem synceram sectantur, ostendamus, Ex eo solo quod status Macularum cursus ex orientali Solis plaga in occidentalem tendat: id nulli sphaerarum sub-solarium vel motui, vel dispositioni attribui posse; Dato interim, sed non concessio, orbis illos re vera, prout ipsi, sibi perperam imaginantur existere.

Trium autem caelorum orbis, in vulgata hisce temporibus quorundam sententia infra Solem statuuntur; Lunæ, Veneris, Mercurij. De singulis breuiter agam.

Perpetuus
Macularum
idemque in
oriendo, &
occidendo te
nor, aliquid
magni ap-
pelle meo
dicta sunt.

EX PRONVNCIATO II.

ostenditur nullam Lunaris celi
sphaeram posse vllam in Sole caus-
sare Macularum vllarum appa-
rentiam.

CAP. III.

Macula ab
interiectu
orbium Lu-
naris celi
causari ne-
queunt.

SPHAERAM Lunæ, secundum
istos celi architectos, quinque or-
bes constituunt, quorum vnus Ex-
centricus simpliciter, semper mo-
uetur ab occasu in ortum; igitur si ipse
suo interiectu Maculas caussaret, ex per-
gerent sub Sole ab occasu in ortum, quod
est contra Phænomenon.

Epicyclus Lunæ mouetur in parte su-
periore ab ortu in occasum, in inferiore
ab occasu in ortum; igitur si ex ipsius in-
terpositione Maculae apparent, ibunt ex
partim ab ortu in occasum, partim ab oc-
casu in ortum, idque tempore eodem,
quod est contra Phænomenon.

Duo orbis, qui augem excentrici de-
ferunt, mouentur quidem ab ortu in oc-
casum, sed ita celeriter, vt vnaquæque
Macula in Sole vix vltra vnicam quidem
horam maneret. id quod est contra Phæ-
nomenon.

Quod autem Macula quæuis ab hac
sphaera caussata & in Solem inducta, vl-
tra horam vnicam in Sole vix maneret,
sic demonstro.

Tota istorum Orbium reuolutio absol-
uitur diebus 32. Horis 3. minutis 5. fiunt
in vniuersum, si dies in horas resoluantur
horæ 771. minuta 5. Si resolutio in mi-
nuta instituatur, fiet summa 46265'.
Vnde si fiat, vt 46265'. id est, totum tē-
pus periodicum, ad 21600', totius cir-
culi peripheriam in minuta prima reda-
ctam; ita 60', temporis id est, vna hora
ad aliud; prodibunt peracta operatione
 $28\frac{1}{4} - \frac{2}{6} - \frac{5}{2} - \frac{5}{6}$, id est, minuta prima 28.
& 3. secunda, quæ à quolibet puncto or-
bis deferentis Soli subiecto, percurruntur
vna hora, ab ortu in occasum; quia vero
Solis diameter mediocris statuitur 31'.
Sol autem motu proprio horario tendens
contra motum istarum sphaerarum ima-
ginariarum, conficit quasi duo minuta;
fit vt orbis prædicti, Solis diametrum
pœnè percurrant hora vna. Nam duo il-
la minuta adiuncta ad 28', efficiunt sum-

1 mam 30'. qualem arcum orbis illi in cir-
culo Soli subiecto hora circiter vnica ab-
soluunt. Et sic manet, id quod assum-
psi, demonstratum.

5 Orbis autem deferens caput Draconis,
cum suam reuolutionem absoluat, annis
Aegyptijs 18. mensibus 7. diebus 12. sin-
gulisque diebus ab ortu in occasum pro-
grediatur minutis primis 3. secundis 10.
10 (vt vult noster P. Iosephus Blancanus, in
Sphaera Mundi, cap. 2. pag. 139.) vel 3'.
11'. (vt vult Tycho, lib. 1. Progymn. p.
026.) at vero Sol motu proprio in longi-
tudinem ab occasu in ortum, secundum
eundem Blancanum lib. cit. c. 4. p. 207. cō-
ficiat 59'. 8". 19'", si (neglectis 19'", hac
vice) vtrorumq. cursus redigantur ad se-
cunda, fient 190". motus orbis Lunaris;
& 3548". motus solaris, pro vno die sub

20 Ecliptica, qui additi dabunt arcum Ecli-
pticæ diurnum 3738", decursum vno die;
vnde si Sol, & punctum quodcunque
dicti orbis Lunaris peragant mutuis oc-
cursibus, 3738". arcum Eclipticæ, in ho-
ris 24. quot horas absument pertransun-
do Solis diametrum 31. seu 1860'. Fiet id
horis non omnino 12. Quod si Sol staret,
dum Orbis Lunæ sub ipso incederet, per-
agraret assignatum aliquod in orbe isto
punctum, solarem diametrum, diebus 9.
30 & horis 15. plus minus. Sed neque hic
cursus, Maculis congruit. Impossibile
igitur est, vt Maculae in Solem inducan-
tur, ab vlla celi Lunaris sphaera. id quod
erat in gratiam Physicorum ostendendū.

35 Amplius autem Motus isti ab omni
simpliciter orbe subsolari planetario ex-
cluduntur, si Macularum non tantum
dictam motus tendentiam ab ortu in oc-
casum, sed & deuiationem modo in au-
strum, mox in boream, idque cum figu-
ra, & duratione motus eius modi, quæ cū
nullo dictorum orbium vnquam iterit,
aut stare potest, in animum reuocemus;
45 isti enim Macularum motus euertūt om-
nem legem secundum quam planetae in-
cedunt. Tandem propria quædam Ma-
cularum in omnem loci differentiam di-
latatio atque exsinuatio, cum supposita
orbium planetariorum adamantina duri-
tia atque inflexibilitate conciliari non
poteest. Sed de his alias vberius, hic tantū
stringere volui. nam ex sola ab ortu in
occasum tendentia principaliter nunc in-
55 tentum conficere volui. videlicet: Sup-
positos

I.

positos planetarum solari globo orbes, ex hypothesi tantum admissos, nullas in Sole unquam posse causare Maculas, quæ motui Macularum solarium vel in minimo correfpondeant. Contraria enim aut alia omnia & fierent & apparerent. Et sic manet ostensum, id quod probandum proposui.

EX EODEM II. PRONVNCIATO

Ostenditur nullum orbem sphaera Mercurialis ullam posse in Sole causare Maculam suo interuentu.

C A P. I V.

E Sex orbibus fingitur composita sphaera Mercurij, & duobus Circulis.

Orbes duo Augem Aequantis deferentes mouentur ab occasu in ortum; igitur Maculam nullam causant, quæ macula vadunt semper ab ortu in occasum.

Excentricus deferens Epicyclum, tendit ab occasu in ortum; igitur Maculas nullas defert, quæ vadunt semper ab ortu in occasum.

Epicyclus incedit ab occasu in ortum in parte superiori; ab ortu in occasum in

II

inferiori: igitur Maculas nullas secum trahit, quæ semper & tantum ambulant ab ortu in occasum hic autem vtrumque fieret.

5 Circulus Aequans, tendit ab occasu in ortum: igitur nil officit: quia Maculae tendunt ab ortu in occasum.

Duo orbes Augem Excentrici deferentes, ab ortu in occasum tendunt, sed nil efficiunt vel efficiunt, quia diebus 365. & horis 5. min. 49. totam periodum conficiunt; vnde quolibet die vnum quasi gradum punctum illorum quoduis promouet: Sol autem tantundem fere ab occasu in ortum motu proprio proficit; igitur ex motibus hisce compositis, Macula quæuis Mercurialis Solem peragraret horis quasi quinque; id quod Phænomeno repugnat, vt ostensum Pronunciato primo. Quod si Solis motu proprio stante promoueatur illa Mercurij sphaera, fieret id horis, circiter duodecim: quod rursus Phænomeno repugnat.

15 Circulus paruus, similem motum describens, simili ratione expedietur.

25 Maculae igitur in Solem à Sphaera Mercurialis orbibus fictitijs, tametsi darentur, nullæ introducerentur. Id quod erat ostendendum.



Macula à fictitijs cali Mercurialis orbibus Solem subeuntibus, causari non possunt.

In hac figura ostenditur, quomodo Maculae in Solem à Sphaera Mercurij introduci non possunt.

EX PRONVNCIATO II.

ostenditur nullam Lunaris celi
sphaeram posse ullam in Sole caus-
sare Macularum ullarum appa-
rentiam.

CAP. III.

Macula ab
interiectu
orbium Lu-
naris celi
causari ne-
queunt.

SPHAERAM Lunæ, secundum
istos celi architectos, quinque or-
bes constituunt, quorum vnus Ex-
centricus simpliciter, semper mo-
uetur ab occasu in ortum; igitur si ipse
suo interiectu Maculas caussaret, ea per-
gerent sub Sole ab occasu in ortum, quod
est contra Phænomenon.

Epicyclus Lunæ mouetur in parte su-
periore ab ortu in occasum, in inferiore
ab occasu in ortum; igitur si ex ipsius in-
terpositione Maculae apparent, ibunt ea
partim ab ortu in occasum, partim ab oc-
casu in ortum, idque tempore eodem,
quod est contra Phænomenon.

Duo orbis, qui augem excentrici de-
ferunt, mouentur quidem ab ortu in oc-
casum, sed ita celeriter, vt vnaquæque
Macula in Sole vix vltra vnicam quidem
horam maneret. id quod est contra Phæ-
nomenon.

Quod autem Macula quæuis ab hac
sphaera caussata & in Solem inducta, vl-
tra horam vnicam in Sole vix maneret,
sic demonstro.

Tota istorum Orbium reuolutio absol-
uitur diebus 32. Horis 3. minutis 5. fiunt
in vniuersum, si dies in horas resoluantur
horæ 771. minuta 5. Si resolutio in mi-
nuta instituat, fiet summa 46265'.
Vnde si fiat, vt 46265'. id est, totum tē-
pus periodicum, ad 21600', totius cir-
culi peripheriam in minuta prima reda-
ctam; ita 60', temporis id est, vna hora
ad aliud; prodibunt peracta operatione
 $28\frac{1}{4} \frac{2}{6} \frac{5}{2} \frac{0}{6} \frac{0}{5}$, id est, minuta prima 28.
& 3. secunda, quæ à quolibet puncto or-
bis deferentis Soli subiecto, percurruntur
vna hora, ab ortu in occasum; quia vero
Solis diameter mediocris statuitur 31'.
Sol autem motu proprio horario tendens
contra motum istarum sphaerarum ima-
ginariarum, conficit quasi duo minuta;
fit vt orbis prædicti, Solis diametrum
poenè percurrant hora vna. Nam duo il-
la minuta adiuncta ad 28', efficiunt sum-

1 mam 30'. qualem arcum orbis illi in cir-
culo Soli subiecto hora circiter vnica ab-
soluunt. Et sic manet, id quod assump-
psi, demonstratum.

5 Orbis autem deferens caput Draconis,
cum suam reuolutionem absoluat, annis
Aegyptijs 18. mensibus 7. diebus 12. sin-
gulisque diebus ab ortu in occasum pro-
grediatur minutis primis 3. secundis 10.
(vt vult noster P. Iosephus Blancanus, in
Sphaera Mundi, cap. 2. pag. 139.) vel 3'.
11'. (vt vult Tycho, lib. 1. Progymn. p.
226.) at vero Sol motu proprio in longi-
tudinem ab occasu in ortum, secundum
eundem Blancanum lib. cit. c. 4. p. 207. cō-
ficiat 59'. 8". 19"', si (neglectis 19"', hac
vice) vtrorumq. cursus redigantur ad se-
cunda, fient 190". motus orbis Lunaris;
& 3548". motus solaris, pro vno die sub

20 Ecliptica, qui additi dabunt arcum Ecli-
pticae diurnum 3738", decursum vno die;
vnde si Sol, & punctum quodcunque
dicti orbis Lunaris peragant mutuis oc-
cursibus, 3738". arcum Eclipticae, in ho-

25 ris 24. quot horas absument pertransun-
do Solis diametrum 31. seu 1860'. Fiet id
horis non omnino 12. Quod si Sol staret,
dum Orbis Lunæ sub ipso incederet, per-
agraret assignatum aliquod in orbe isto

30 punctum, solarem diametrum, diebus 9.
& horis 15. plus minus. Sed neque hic
cursus, Maculis congruit. Impossibile
igitur est, vt Maculae in Solem inducan-
tur, ab vlla celi Lunaris sphaera. id quod
erat in gratiam Physicorum ostendendū.

35 Amplius autem Motus isti ab omni
simpliciter orbe subsolari planetario ex-
cluduntur, si Macularum non tantum
dictam motus tendentiam ab ortu in oc-
casum, sed & deuiationem modo in au-
40 strum, mox in boream, idque cum figu-
ra, & duratione motus eius modi, quæ cū
nullo dictorum orbium vnquam iterit,
aut stare potest, in animum reuocemus;
45 isti enim Macularum motus evertūt om-
nem legem secundum quam planetae in-
cedunt. Tandem propria quædam Ma-
cularum in omnem loci differentiam di-
latatio atque exsinuatio, cum supposita
50 orbium planetariorum adamantina duri-
tia atque inflexibilitate conciliari non
potest. Sed de his alias vberius, hic tantū
stringere volui. nam ex sola ab ortu in
occasum tendentia principaliter nunc in-
55 tentum conficere volui. videlicet: Sup-
positos

I.

positos planetarum solari globo orbes, ex hypothesi tantum admissos, nullas in Sole unquam posse caussare Maculas, quæ motui Macularum solarium vel in minimo correfpondeant. Contraria enim aut alia omnia & fierent & apparerent. Et sic manet ostensum, id quod probandum proposui.

EX EODEM II. PRONVNCIATO

Ostenditur nullum orbem sphaera Mercurialis ullam posse in Sole caussare Maculam suo interuentu.

C A P. I V.

E Sex orbibus fingitur composita sphaera Mercurij, & duobus Circulis.

Orbes duo Augem Aequantis deferentes mouentur ab occasu in ortum; igitur Maculam nullam caussant, quæ maculæ vadunt semper ab ortu in occasum.

Excentricus deferens Epicyclum, tendit ab occasu in ortum; igitur Maculas nullas defert, quæ vadunt semper ab ortu in occasum.

Epicyclus incedit ab occasu in ortum in parte superiori; ab ortu in occasum in

II

inferiori: igitur Maculas nullas secum trahit, quæ semper & tantum ambulant ab ortu in occasum hic autem vtrumque fieret.

Circulus Aequans, tendit ab occasu in ortum: igitur nil officit: quia Maculæ tendunt ab ortu in occasum.

Duo orbes Augem Excentrici deferentes, ab ortu in occasum tendunt, sed nil efficiunt vel efficiunt, quia diebus 365.

& horis 5. min. 49. totam periodum conficiunt; vnde quolibet die vnum quasi gradum punctum illorum quoduis promouet: Sol autem tantundem fere ab occasu in ortum motu proprio proficit; igitur ex motibus hisce compositis, Macula quævis Mercurialis Solem peragraret horis quasi quinque; id quod Phænomeno repugnat, vt ostensum Pronunciato primo.

Quod si Solis motu proprio stante promoueat illa Mercurij sphaera, fieret id horis circiter duodecim: quod rursus Phænomeno repugnat.

Circulus paruus, similem motum describens, simili ratione expedietur.

Maculæ igitur in Solem à Sphaeræ Mercurialis orbibus fictitijs, tametsi darentur, nullæ introducerentur. Id quod erat ostendendum.



Macula à fictitijs cali Mercurialis orbibus Solem subeuntibus, causari non possunt.

Macula à fictitijs cali Mercurialis orbibus Solem subeuntibus, causari non possunt.

Macula à fictitijs cali Mercurialis orbibus Solem subeuntibus, causari non possunt.

Respon-

I.

EX EODEM II. PRONUNCIATO

Nullus orbis qui sphaeram Veneris constituit finguntur, sua interpositione, ullam in Sole Maculam obijcere potest visus.

CAP. V.

Quattuor orbis pro caelo Veneris fabricant: duos Augem excentrici deferentes: Excentricum, & Epicyclum: vnum item circulum æquantem concipiunt. Horum autem nullius interuentu Solem in Maculas aut Faculas variegari, clarè ostendo ex ipsa Veneris Theoria ante oculos proposita. In qua A, centrum Mundi, B, centrum Excentrici C S: C, centrum Epicycli I K: D, centrum Aequantis circuli S R: E, planeta Venus. F, Oriens, G, Meridies; & punctum Augis: H, Occidens: E G I K, Epicyclus Venerem E, deferens, ex E, Occasu per G, meridiem, ad Orientem I, in semicirculo superiore; in inferiore I K E, ex I, ortu, per K, meridiem, in occasum G: Reliqui omnes, cuiusmodi sunt duo secundum quid Excentrici, D, interior, & F L N H, exterior; itemque Excentricus simpliciter G K M N O P, mouentur ex occasu H, O, & P, per meridiem G, & K, in ortum F M, & Q; similiter & circulus Aequans R M S O, pergit ex occasu O, per meridiem R, in ortum M; vnde impossibile est, vt horum interkursu vllæ in Solem, Macularum, aut Facularum phasæ, visui in A, existenti offerantur; cum omnes Maculæ ex ortu in occasum progrediantur, hic autem contrarius illarum motus sequeretur, ex occasu in ortum; imo ex interiecto Epicyclo, vterque: nam superior pars E G I, obijceret Maculas ex occasu in ortum, inferior ex ortu in occasum: quæ omnia repugnant Phænomeno. Igitur nullus orbis, nullus circulus Veneris, causare potest vllam in Sole Maculam, id quod erat demonstrandum; quodque demonstraui libens in gratiam eorum, qui hanc veritatem ex hoc Phænomeno audissimè expectant; nam apud Mathematicos hæc vilia & trita sunt, cum Venus ipsa cornibus suis, hæc casus, quibus quasi quibusdam carceribus constricta ab aliquibus tenebatur hucusque, iam pridem solo equauerit, cam-

Macula so-
lares induci
non possent
in Solem à
commenti-
tjs Veneris
orbibus, e-
tiam si da-
rentur.

In gratiam
Physicorum
ista asserun-
tur.

II.

pumque caelestem, in quem circa Solem expaciaretur, sibi liberum aperuerit, Mercurio inter se, & Solem angustioribus circuitibus coërcito; quem proinde etiam cornua frequenter assumere, non est dubium: sed ipsdem armatum difficillimè videri arbitror, partim quia paruas à Sole digressiones facit, partim quia paruas, & que lucis tam viuide, quam Venus existit; cuius si etiam attenuatio cornuum incremento accedat; haud mirum, si Mercurius tam raro in visum perueniat.

Mercurii
etiam cornu
tum fieri, e-
quum est.

Dices, demonstrationes allatas, esse tantum contra suppositiones falsas, & procedere ad hominem, non autem absolute euincere, Maculas non effici ex alijs orbium interpositionibus. Nam cum certum sit, Venerem perigæam post Lunam infra Mercurium & Solem, apogæam supra Solem, & Mercurium incedere; quemadmodum Plato in Tymæo, & Aristoteles 2. de Cælo olim quoque cum antiquis multis hos duos planetas absolute supra Solem posuerunt: posset aliquis si- bi persuadere, Maculas interpositione nouorum istorum orbium, in quibus Venus & Mercurius circa Solem ferrentur, in discum Solis aspectabilem introduci.

Obiectio,
Maculas in
Solem posse
introduci
obiectu No-
uorum Or-
bium

Respondeo primo, Antiquata figmenta nouis restaurare, & lutum luto lauare, non esse consultum.


Obiectionis
solutio.

Respondeo secundo, Excentricum Solis, tam simpliciter, quam duos secundum quid, hætenus ab alijs pro veris habitos, istos hospites absque penetratione, aut destructione in illorum hypothese non recipere. Quod si quis novos fabricandos contenderit, ampliato nimirum excentrico, & intra ipsius crassitiem intrudendos.

Respondeo tertio, Si antiqui orbium istorum Architecti decepti esse nunc manifesto deprehenduntur; novos decipere, & decipi posse fingendo quis neget? præsertim cum hæc asserere attentent, non quia sint aut esse sciant, vel probabili aliqua ratione id asserant: sed quia sic esse posse in animum suum inducât, neque contrarium conuinci villo modo posse credant: & hanc affirmandi rationem satis virium habere sibi persuadent ad illos ponendos, si possibiles esse verosimiliter ostenderint. Sed quam sit hæc debilis philosophandi ratio, satis per se patet, vel obiter ipsam consideranti.

Nouos in
caelo orbis
effingere si-
ne solidis
fundamen-
tis, non est
solidè physico-
sophari.

Respon-



I.

II.

Datis sed nō concessis fitiis nouis orbibus, nihilominus ab ipsorum interiecta, Macula in Solem induci non possunt.

Ex motu Veneris, demonstratur, Maculas ab orbe ipsius prodire non posse.

Respondeo quarto. Neque si admitterentur nouiter conficti huiuscemodi orbis, Maculae ab illis vllō modo in Solem introducerentur: quia tametsi id ex eo præcisè non euerteretur, quod Maculae ab ortu in occasum tenderent; (nā etiam istorum orbium ab ortu in occasum progressio esset, infra Solem;) tamen ex alijs capitibus id non effici posse, ostendetur. Sole clarius in Pronunciatis sequentibus, & nunc demonstratur ex ipsa motus Planetarum istorum, à motu Macularum discrepantia: quæ facit vt & ab ipsorum orbibus pro hoc negotio obtinere nil possis. Epicyclus igitur Q siue deferens abolito priore Systemate, circa Solem solus quasi remanet, suam periodum absoluit diebus 583. horis 22. minutis 12.

quæ omnia conficiunt summam minutorum horariorum 8 37 47 2'. Siergo fiat, vt 8 37 47 2'. ad 21600. minuta prima vnus integri circuli; ita 1440'. minuta horaria integri diei, id est horarum 24. ad aliud; prodibunt peracta ratiocinatione, minuta 37', pro vnus diei motu. Iam si denuo fiat, vt vnus diei 37'. minuta ad horas 24. ita 31'. diametri solaris minuta ad aliud; prodibunt horæ 20. Igitur si ponamus ex inferiore parte Epicycli Veneris, Maculas in Solem induci, peragrabunt eæ Solem, horis 20. plus minus, id quod Phænomeno solari repugnat; insumunt enim Maculae suo per Solem transitu dies 12. 13. 14. & vltra: vnde impossibile est, cælum Veneris, illas obiectu suo causare, quod

Veneris motus, non stat cum motu Macularum.

quod erat demonstrandum.

CAP. VI.

IDEM DEMONSTRATUR DE
MERCVRIO.

THEORIA & ET Q. CIRCA SOLEM.

Theoremate ergo V, pag. 25. sic ait.

Mercurius.

*Mercurij
Orbes in So-
lem nullam
possunt in-
ducere Ma-
culam.*

Simili ratione, cum Mercurius amisso proprio, seu verius, putatio hospitio, solari regia perfruatur, eumque Epicyclo officiose ambiat, gremioque suo foueat, etiam si ipsum Epicyclum inquam solidum esse sinamus, & parte inferiore ab ortu in occasum cicamus; aio nihilominus, eius inter nos, & Solem interuentu, Maculam vllam Soli aspergi non posse.

Etenim ipsius Epicyclus siue deferens, absoluit suam periodum, diebus 115. horis 21, minutis 5. quæ omnia in minuta seu scrupula horaria redacta, exhibebunt summam scrupulorum, 166865.

Quapropter si per Regulam trium, fiat vt 166865. ad 21600. ambitum circuli; ita 1440. horæ 24. ad aliud: prodibunt 186' $\frac{6}{10} \frac{7}{10} \frac{1}{10} \frac{1}{10} \frac{2}{10}$. id est gr. 3. min. 6'. 24".

&c. pro motu diurno. Vnde si rursus (neglectis minutis 24". quæ rei præsentis nil officiant) fiat vt 186'. ad 24. horas, ita 31'. Solis diameter ad aliud; prodibunt præcisè horæ 4. quibus Macula aliqua Mercurialis cæli totum Solem percurreret; quod cum aduersetur Phænomeno,

*Mercurij
motus non
stat cum mo-
tu Macu-
larum.**Summa di-
stancia.*

(morantur enim Maculæ sub Sole, pro varia anni ratione dies 12. 13. 14. & 15.) impossibile est è cælo Mercurij procusas Maculas, in Solem intrudere. Quare cum ex arbitraria cælorum istorum subsolarium soliditate, ipsorumque planetarum motu, nec non parallaxi, & vera motus Macularum apparentia, ostensum sit, Maculas sub Sole conspicuas, ab ipsis, vel ipsis inesse non posse; prospiciendum nunc est, de altiore & nobiliore illarum domicilio: quod antequam facio, locus, & tempus monet; ea quæ de Mercurio, & Venere in Palatio Solis susceptis, succinctè quidem, sed eruditè in Sole illustrato disputat, Illustris, & generosus Dominus D. Ioannes Nicolaus à Smogulecz, Smogulechis, huc inferere, faciunt enim ad dictorum intelligentiam, non parum.

*Mercurij
motus non
stat cum mo-
tu Macu-
larum.*

Mercurius indiuiduo Soli iunctus consortio, proximus Planetarum est, qui Solem ambit, & annuo suo cursu coronat, temporeque fere dimidio supra, medio infra Solem comparet, nam vt ex probatissimis Copernici atque Tyconis inuentis clarum est, Mercurius non infra, vt putabat Ptolemæus, sed circum Solem in orbem voluitur distatque cum terræ proximus est, semidiameter terræ 585. cum remotissimus semidiameter 1700. ferè, ita tamen Solem circumit, vt non ad amissum, & præcisè eum pro centro habeat, sed aliud sibi centrum iuxta Solem proximum deligat, tantum ab eodem distans, quanta est excentricitas Mercurij, semidiameter nimirum terræ 108. à Copernico inuenta, l. 5. c. 27.


Mercurius indiuiduo Soli iunctus consortio, proximus Planetarum est, qui Solem ambit, & annuo suo cursu coronat, temporeque fere dimidio supra, medio infra Solem comparet, nam vt ex probatissimis Copernici atque Tyconis inuentis clarum est, Mercurius non infra, vt putabat Ptolemæus, sed circum Solem in orbem voluitur distatque cum terræ proximus est, semidiameter terræ 585. cum remotissimus semidiameter 1700. ferè, ita tamen Solem circumit, vt non ad amissum, & præcisè eum pro centro habeat, sed aliud sibi centrum iuxta Solem proximum deligat, tantum ab eodem distans, quanta est excentricitas Mercurij, semidiameter nimirum terræ 108. à Copernico inuenta, l. 5. c. 27.

Vt igitur locus Mercurij in cælo Solis appareat, sit excentricitas Solis, (in adiecto schemate minore) A, B, semidiameterum terræ, 41. maxima Solis à terra distantia, A E, semidiameterum terræ 1182. m. 56. semidiameter excentrici Solis B, E, & Excentricus S S. cui nunc latitudinem assignamus aliquam; maiorem tamen, quam proporrio geometricè exigeret, vt à reliquis duobus Augem deferentibus K, & I, discerni melius, eiusque motus considerari possit, media tamè Excentrici linea circularis E T, suam in distantia proportionem habet. A Solis itaque Apogæo E, sursum versus, vsque in C numeretur Excentricitas Mercurij semidiam. terre 108. salium qualium A B, est 41. & similiter à perigæo Solis, T, introrsum versus centrum, vsque in M. & ex M, atque C, describatur Epicyclus, cuius semidiameter sit æqualis semidiametro Epicycli Mercurij, hoc est 480. semidiam. terre; apparebit locus Mercurij in Cælo Solis, quem in suo cursu peregrinat: eumque Mercurius fuerit in G, habebit maximam, cum autem fuerit

*Mercurius
circa Solem.*

II.

1 „ tricitas semidiam. 24. maxima à ter-
 „ ris distantia , 2029. minima , 255.
 „ iuxta Copernicum l. 5. c. 21. cui pro-
 „ xime consentit Tycho, quamvis Co-
 5 „ pernicus in alijs partibus idipsum as-
 „ serat, quam terræ semidiametris, quas
 „ tamen partes, si ad semidiametros ter-
 „ ræ reduceris, inuenies tot quot assi-



Mercurius et Ven, in Cælo O.


30.

35

40

45

55



I.

*Schema
Theoricum
Veneris.*

„ gnauimus. Supponit enim Coperni-
 „ cus sicut, & Tycho Excentricum.
 „ Mercurij, atque Veneris B E, esse Ex-
 „ centricum quoque Solis, cuius semi-
 „ diameter sit 1142. semidiametri ter-
 „ ræ, siue, vt supra diximus, 1150. ita.
 „ Tycho fol. 475. l. 1. de noua stella.
 „ Quibus suppositis iterum figuram
 „ construximus adiacentem, ex qua
 „ appareat via Veneris per cælum Solis.
 „ Assignata enim Excentricitate A B,
 „ Solis, & eiusdem distantia maxima
 „ A E, atque semidiametro Excentrici
 „ B C, (in figura maiore) numeretur ab
 „ E, sursum Excentricitas Veneris semi-
 „ diametrorum terræ 24. partium ni-
 „ mirum talium 24. qualium est B A, 41.
 „ atque ex T, introrsum eadem Excen-
 „ tricitas vsque in M; ex M, & E, de-
 „ scribatur circulus, cuius semidiameter
 „ æqualis sit semidiametro Epicycli Ve-
 „ neris, semidiametrorum nimirum
 „ terræ, 822. is enim circulus represen-
 „ tabit Epicyclum Veneris, in quo circa
 „ Solem E, rotatur, & maximā designa-
 „ bit Veneris distantiam à terra A, in
 „ G. minimam in P, eo quod maxima
 „ componatur ex remotione Solis A E,
 „ maxima 1183. Excentricitate Veneris
 „ E C, 24, & semidiametro Epicycli C
 „ G, 822. semidiametrorum terræ, quæ
 „ inuicem addita dant 2029. distantiam
 „ Veneris maximam, quam vnquam
 „ habere potest: sic etiam si subtraxeris
 „ semidiametrum Epicycli Veneris M P,
 „ cum excentricitate eiusdem M T, à
 „ remotione Solis minima A T, rema-
 „ nebit distantia Veneris minima A P,
 „ 255. Ex his deducitur.

COROLLARIUM I.

„ Si Venus mouetur in Epicyclo solido
 „ C G, vel M P, tum cælum Solis multo
 „ maius est, quàm superius assignauimus,
 „ minimum enim tantum oportet esse,
 „ quantus est circulus O N, vel maxima
 „ Veneris à terra distantia A G, hoc est
 „ semidiametrorum terræ 2029. mini-
 „ mum. Si enim cælum Solis non foret
 „ tantum, sed minus, tum Epicyclus so-
 „ lidus ingrederetur in cælum Martis,
 „ proximè ambiens cælum Solis, hoc
 „ autem fieri neutiquam potest, vt
 „ pars Epicycli sit in cælo Solis, pars

II.

1 „ in cælo Martis: cum cælum Solis ce-
 „ lerius, cælum autem Martis tardius
 „ duplo moueatur, ac consequenter ea
 „ pars Epicycli, mota cum cælo Solis,
 5 „ duplo celerius perueniret ad suum ter-
 „ minum, quam pars Epicycli mota
 „ cum cælo Martis, adeoque neces-
 „ sario discontinuetur, quod est ab-
 „ surdum.

COROLLARIUM II.

„ Deferentes item Apogæum, & Pe-
 „ rigæum, K, & I, item Excentricum
 15 „ simpliciter S, non esse posse in cælo so-
 „ lido, orbes integros, suum ambitum
 „ ex toto absoluentes, sed ex vna parte
 „ per Epicyclum Veneris interruptos,
 „ vt figura secundum dimensionem geo-
 20 „ metricam clare delineata demon-
 „ strat.

Hæc ille, docte sane, & neruose,
 ad mentem Copernici, Tychois, &
 communem sensum eruditorum huius
 æui, quæ deo adduxi, quia plana sunt,
 & oculis orbes illos alioqui imaginatu
 perquam difficiles, metodo pulchra,
 & facili, subiiciunt, id quod à nullo ita
 factitatum, vidi: tum etiam, vt dicta
 30 & inferius dicenda, melius percipiantur.
 Nam rationes istæ, quibus Maculas su-
 pra cælos, & melius Cursus subsolares
 horum trium Erronum, Lunæ scilicet,
 Veneris, & Mercurij extuli, nec sunt solæ,
 35 nec præcipuæ, neque plenè explicatæ:
 quæ omnia suis locis debitè tractabun-
 tur. Nunc ad Phænomeni apparentias re-
 deamus.

40 PRONVNCIATVM TERTIVM.

*Nulla Macula, nulla Picula, seu pri-
 maria, seu secundaria, extra pa-
 tentem Solis orbem, siue horizon-
 tem ipsius conspicuum, vn-
 quam apparet.*

CAP. VII.

50 **S**olis horizon conspicuus, est circu-
 lus, radijs visualibus globum Solis
 tangentibus determinatus, sectio
 nimirum plani & globi Solaris commu-
 nis, per tangentium radiorum contractus
 finita, ad axem coni visualis recta, ter-
 55 minus omnium eorum, quæ in Sole
 conspi-

*Horizon So-
laris quis?*

I.

conspiciuntur, Solem in segmenta duo sphaerica diuidens, patens nimirum & latens; quorū hoc hemisphaerio maius, illud minus esse demonstratur, differentia tamē ad sēsū imperceptibili; vnde circulus Solis visualis, passim pro circulo maximo vsurpatur; quia in re, sensibile aliquod incommodū vix infert; sicubi tamē ad rē erit, monebo. Radij autē ab extremo, & marginali Solis cōtactu in lentem obseruato-
riā conuexā cōcentrantur, & inde sensim facta intersectione, in cōtū inuersum diducuntur, basinq; illius radiosam post lentē cauā in chartā proijciunt, & circulū lucidū depingunt. Visibilis ergo iste Solis circulus, qui discus, orbis, superficies, facies, vel vultus Solis aspectabilis ab omnibus passim asseritur, à me, propositi mei ratione Horizon Solaris appellatur, quatenus ipse omne id quod in Sole videndum est, suo gremio complectitur, & quidquid extra ipsū est, in Sole minimē spectatur; deinde quia penes ipsum ortus & occasus Macularum dignoscitur; tandem quia in ipso omnia quodammodo visuntur, proijciuntur enim in ipsum omnia, & in eius plano examinatur: &c. hinc merito nomen horizonis & Finitoris sibi vendicauit.

Pronunciatum autē satis est probatum & stabilitum tot annorum diligentissimis inuestigationibus; tot allatis lib. priore accuratis obseruationibus; tot deniq; cōspiratis Astronomorum sententijs. Cum. n. nonnulli lectione Apellis mei, perperam intellecti, sibi persuasissent, Maculas Solis à me veluti Lunulas extra Solem fuisse conspectas, idq; à me assertum esse; omnes in obseruando neruos intenderunt, id experimentis deprehendere: quod cum obtinere nequiuissent, scriptis suis testari sunt, extra Solem de hoc Phænomeno nil penitus animaduerti: de quo ego nunquam dubitavi: si quid autē de Maculis tanquā extra Solē circumlatis disputauis; non id praestiti ex eo capite, quod illas extra Solem oculis aspicerem, sed quod aliunde ex apparēte inaequalitate motus, deprehensa nonnulla argumenta per modum dubitantis potius, quā certo affirmantis, asserrem. Vnde si ē Maculis, lucis solaris reflexione illustribus lunulas feci, id ex suppositione, (si nimirum extra Solem circumferentur) non absolute à me assertum fuit.

Hemisphaerij Solaris apparentis, Synonyma.

Officia Horizonis solaris.

Apelles male intellectus, falsam de auctore suspicionem apud quosdā ingenerauit.

II.

Nunc autem dum hoc Phænomenon tracto, & obseruata discutio, in hanc rem singularissimē attentus fui, si quo modo vilo possibili, vel Maculam vel Faculam aliquam insignem, siue ortiuam siue occiduā extra perimetrum horizonis aspicerem. Et licet, conatum meum circa Maculas, Luna Solē eclipsans satis infregerit; quia de ipsa, quatenus Soli nō substat; nil penitus in visum cadit, quemadmodum curiosissimē in id dum Solem Eclipsaret Ingolstadij olim, inquisiui: Facularum tamen, saltem maiorum, & insigniorum aspectus, si extra Solis superficiem quadantenus elōgarētur, oculorum aciem, & Tuborum potentiam euitare nō posset. praesertim quādo in horizonte ita luculētia, & veluti perimetro abscissae integros dies, ascendendo, & descendendo contumpserunt. Cum enim subiectae corporis Solis lucidiori elucescant & videantur, euident est, easdē subiectas minus lucido, amplius visum iri. Certum autē est, ætherem Soli circumfusum, esse minus lucidum ipso Sole; igitur si Facula aliqua in medio Sole à visu discernitur, quanto amplius si iuxta Solem in æthere minus illustri incedat?

Obijcies, Venerem, apogeam, Martem, Iouem, Soli coniungendos, in eiusdem radijs latere; & tamen dubium nemini esse debere, fulgorem Veneris, Martias ignes; & Ioualia fulmina, longe esse nitidiora, splendoribus Facularum: igitur sicut dicti planetae Faculis lucidiores in praesentia Solis noctescunt, ita mirum esse nemini debet, si Faculae etiam extra & iuxta Solem positae in liquido æthere non luceant.

Respondeo, Planetas omnes Superiores Soli vicinos, in se vehementissimē quidem illustrari, nobis tamen obtenebrari, ob Solis praesentiam, qui lucis suae abundantia ita visum nostrum occupat, ut illorum ad nos lucis sensus peruenire non possit; non quod species illorum etiam de medio die ad nos non pertingant, aut in oculos nostros non immittantur, sed quod vehementioris lucis, videlicet diurnae, praesentia, siderum istorū omnē radiosam praesentiam obfuscet, ut in potentiae visus potestate non sit, illos distinctē apprehendere. Quod autem stellae, & planetae radios suos in visū nostrū demittāt aequae praesente Sole atq;

Luna portio extra Solē eclipsatum prominens, nō videtur.

Facula si extra horizonem solarem prominere, extra etiam viderentur.

Obiectio ex planetarum superiori-bus cum Sole coniunctionibus.

Obiectionis solutio.

Planeta etiam de die lucet, sed nō sentiuntur.

I.

absēte; patet ex eo, quod specierū effusiones necessario fiant, neq; lux lucē in fluxu suo impediāt, & nullū ēt aliud corpus opacū intercedat; imo experiētia multorū id constat, qui planetas libero oculo, medio de die viderunt à quorū numero me non excipio, qui olim, dū Philosophiæ Ingolstadij operā dedi, cū multis Iouē pæne meridianū sēpius aspexi, & alijs ostendi: itaq; species planetarū visibiles sēper affluere, imo in oculū apertū, & oppositum influere nullū est dubiū; sed aio non sentiri, ob maioris lucis efficaciam hāc aut lucē, non esse illā, quæ Solē, planetas, & reliqua sidera in liquidissimo illo æthere fulgentissima circumstat, sed nostrā diurnā quæ apud nos visum obsidet, probatur experiētis quotidianis; qñ tenebris crepusculinis manē euanescentibus, ēt alstra extinguitur, vesperi ingruentibus, accēduntur; hęc aut nō ideo fiunt, quia superior illa aura, vel illustratur, vel obfuscatur, sed quia aer noster vicinus ex vmbra terre interuētu obtenebratur vespere, ex eiusdē abscessione illuminatur mane; & sic lux diurna præsens adimit aspectū planetarū Soli viciniorū, absens reddit. Probatur idē experiētia aliter: etenim si per Tubū, quēcūq; planetam illustriorem noctu lucentem, in chartā voles traducere, efficies id quidē, sed nō sine tenebris oculū circūstātibus; alioqui si vel paruula lux chartā, aut oculū inuadet, elidet speciē planetæ in papyro exceptā; nō quod ipsius imago ex charta verē eliminetur, sed quod oculus maiore luce peruasus, ipsam debiliore persentiscere non valeat: simile quid eueniet, si magnitudinem Solis per foramen minutissimū intromissi, venari volueris: etenim species illa Solis, est omnis alterius lucis in locum illū immissi impatiens, eo quod quaelibet ingressa, imaginem Solis imminuit; quod aliunde non euenit, nisi quod illustrioris præsencia speciē circa extrema minus splēdicantem in oculo elidit; & sic minor apparet in præsencia alienæ lucis, quæ alioquin se sola maior fuisset. Hanc experientiam, multis incredibilem, ostendi ipso facto. Cum enim Solem intromissem per foramen ita paruum, vt acie oculi ēt optimi quasi effugeret, & à camera omnē aliā lucē exclusissem, vidimus imaginem Solis magnitudine sua competentem in charta obiecta præsentedam; quāprimū autem ē quocūq; tandem loco a-

Lux diurna aspectū Planetarū, & stellarū diurnum adimit.

Probatur experiētis lucis præsencia speciē extingui.

Solis per minutissimū foramen intromissio.

II.

1 liquantulū lucis externæ admisimus, statim prædicta Solis imago, sensibiliter, in omnium oculis decreuit, neq; possibile fuit illud decrementum instaurare, quam
5 rursus excludēdo lucē illā admisā. Quæ ex re cōclusimus maioris lucis præsencia, minoris in organo visus sensū obliterari. Sed de hoc solaris imaginis experimento plura & exactiora dabo inferius, vbi in fine huius parte, de absoluta Macularum, & Facularum magnitudine disquiram.

10 Sed omnium maximum, & huius rei proprium experimentum est Eclipsis Solis totalis, cuiusmodi contigit anno Dñi 1560, & visa est in Lusitania, in tantum, vt stellæ firmamēti clarissime apparerēt.

15 Quemamodum Christophorus Clarius in Capite 4. in Sphæram, p. 594. Editionis Rom. 1606. testatū reliquit hisce verbis.

20 „ Et vt quod ipsi quoq; aliquñ obseruauimus hac in parte, in mediū proferamus, recitabo duas insignes Eclipses Solis, quæ meo tempore contigerunt non ita pridē: quarū vnā an. 1560. Co-
25 „ nimbricæ in Lusitania circa meridiem obseruauī, in qua interponebatur Luna directē inter visum, ac Solē, ita vt totū Solē, nō modico tēporis interuallo cōtegeret, essentq; tenebræ quodāmodo
30 „ maiores quā nocturnæ. Neq; enim, vbi pedē quis poneret, videre poterat, clarissimeq; stellæ in cælo apparebant, & (quod mirabile erat) aues ex aëre in terrā, præ horrore tam tetræ obscuritatis decidebāt, hæc ille. Quā eādē Eclipsin, viuis adhuc, & oculatus testis mihi hæc scribēti, Romæ nūc multis annis degens, confirmauit P. Emmanuel Vega Lusit. Societ. nostræ, qui ait illā, dū simul præderetur, ita cū multorū horrore tenebras
40 „ illas auxisse, vt opus fuerit in meridie lucernas accēdere, & vniuersā Eclipses durationē fuisse vltra tres horas extensā, occultationē vero Solis totius stellarūq; cōspectū horæ spatium vt minimū adæquauisse: dum interim fæmineus sexus, astronomiarum rerum ignarus, extremum iudicii diem per compita, & vicos concursando, adesse cum lachrymis
50 „ eiulatuq; miserabili lamentaretur. Addebat insuper, tam intensas illas tenebras extitisse, vt stellæ in toto cælo ita lucidas conspexerit, quantum alias nunquā, tota sua vita. Similis Eclipsis in Hispania visa
55 „ est, anno Dñi 719. vti in eius Annalibus com-

Sole toto Eclipsato apparent stellæ.

I.

II.

Exempla
stellarum in
Eclipsibus
solaribus vi
sorum.

Ex Annali-
bus Constan-
tinopolita-
nis.

Ex Annali-
bus Frascis

Exempla
stellarum in
Eclipsibus
solaribus vi
sorum.

Modi alij
stellas de
die aspiciendi

compendio manuscriptis hisce diebus le-
gi. Ita autem preter multa alia celitus vi-
sa prodigia, habent. Sol precipue adeo
lumine defectus, ut tota Hispania stel-
las, duas per horas, quasi nocte concu-
bia, silente Luna, viderint. hisce consonant Annales Constanti-
nopolit. Auct. Georgio Cedreno, Anno
9. Iustiniani, qui fuit Constantini Po-
gonan filius. Tantus inquit fuit Solis
defectus, ut astra visa fuerint. Idē pag.
489. anno 2. Leonis, qui fuit Basilij fil.
Sub idem tempus, Sol hora diei sexta
ita defecit, ut stellae viderentur. Idē p.
544. anno Nicephori 4. die mensis De-
cemb. 22. hora 3. tantus ait, fuit Solis
defectus, ut astra quoque apparuerint. Id.
p. 572. sub Basil. & Constant. fratribus
Sol etiam meridie defecit, & stellae
conspicuae sunt.

Ex Bibliotheca Petri Pithaei I. C. Anna-
lium Francorū, editionis Parisien. 1588 p.
43. par. prioris. An. Dñi DCCCXXXIX.
sub Imperat. Hludou. in ipsa autē, inquit,
vigilia Ascensionis Dñi, hoc est 4. Id.
Maij, Eclipsis Solis circa 7. & 8. horam
diei facta est, tā valida, ut et stellae pro-
pter obscuritatē Solis visae sint, rebusq;
color in terra mutaretur. ib. p. 134 p. 1.
an. Xpi. DCCC.LXXVIII. Sol quoq; in
4. Cal. Nouēb. post hor. 9. ita obscura-
ratus est per dimidiā horā, ut stellae in
celo apparerēt, & omnes sibi noctē im-
minere putarent. ib. p. 28. i. in vita Imp.
Ludou. Pij. Quo in tēpore, inquit, deli-
quiū Solis contigit, tertia die Litaniae
maioris, insolito modo. In tñ. n. lucis
recessu tenebrae praeualuerunt, ut nihil
a noctis veritate differre viderentur.
stellarū naq; raturus ordo ita cernebatur,
ut nullū Sydus lucis solaris hebetudinē
pateretur: quin potius Lunā, qui se ei
aduersā praeberat, paulatim oriētem
petendo primū corniculatim illi lumē
a parte occidentali restitueret, in morē
sui, quando prima vel secunda cerni-
tur, & sic per augmenta totam venu-
statem, tota rota Solis reciperet.

Habeo ex Hispano, Viro doctiss, & fide
digniss. se anno 1601. die 24. Decēb. cū E-
clipsim Solis Villæ regiae in Hisp. vidisset
simul stellas Firmamenti se vna cū alijs a-
spexisse. Idē addidit in Hisp. tritū esse, ut
in puteis profundis, sub dio apertis calū,
& stellae in eo per Reflexionē relucētes

1. tanquā è speculo distinctiss. ipso et meri-
die videant, & se frequētiss. eas cōtēplatū
esse. Conimbricenses, & alij è puteo pro-
fundo videri affirmant. Hæ experiētiæ ab
5. Astronomo nō sunt negligēdæ, quia pos-
sunt esse visui maximo. Igitur ex allatis
exemplis, oppositione Lunari dies erepta
sol ablatu, nox effecta, & sidera vbique
in conspectu steterunt: vnde.

10. Sequitur Primò. Astrorū cū Sole cōiun-
ctionē, præcisè spectatā, nisi ea corporalis
sit, nō esse causā, cur ipsa nō videatur, qñ
cū Sole cōiūgūtur: alioqui nec in istis E-
clipsibus, sidera Soli vicina fuissent visa,
15. cuius tamē cōtrariū accidit: igitur qñ pla-
netæ superiores cū Sole iūgūtur, nō ideo
visum effugiant, quia cum Sole coniun-
cti sunt, cum in simili casu, possent simul
coniuncti & simul conspicui esse.

20. Sequitur Secundò. Splendidissimas illas
oras & auras caelestes, fulgoribus solarib;
cādicātes, nō esse causā, cur planetæ cum
Sole cōiuncti ad visum nostrū sensibilibiter
nō perirgāt, tanquā aura illa iubare suo
25. fulgētiss. visū prestringat, & sic oculos ab
aspectu planetarū arceat: dico hāc causā
nō esse; quia in istis totalibus Solis Eclip-
sibus, preter corpus Solis illius plage à Lu-
na quasi nihil obtectū fuit, in quam circa
30. Lunā vndiq; oculo expaciandi, liberrimus
cāpus patuit, insuper, & tota illa regio su-
perlunaris à lumine solari æque in Eclipsi
atq; extra perlustrata, & in Oculū, preter
Lunā vbiq; aperta fuit: & tñ hisce nō ob-
stantibus, stellae firmamēti, & planetæ su-
per horizōtē versātes, tāquā media nocte
35. illustres arradiauerunt: regio ergo illa æ-
theria, quantiscūq; splēdoribus imbuta in
caussa non est, cur sidera Soli propinqua
visui nostro eripiantur.

40. Sequitur Tertiò. Cur planetæ, & alia si-
dera Soli vicina oculis nostris dispareāt,
nō inueniri aliā causā, quā lucē diurnā,
in aēre nostro vicino, atq; oculo, receptā,
45. & probatur: istud affert causā, quod ab-
latū tollit effectū, & quod redditū effectū
restituit: atqui lux diurna ablata, dispari-
tionem siderū tollit; reddita restituit: er-
go lux diurna affert causā disparitio-
nis siderū. Maior est nota in terminis mi-
nor claret in Eclipsi, & alijs experimentis
adductis igitur conclusio manet. Atmo-
sphaera igitur nostra, à luce solari per-
uasa, & supra hemisphaerium nostrum,
55. reperta, in oculos incurrens, debiliores

Astrorū ad
Solem late-
ralis vicini-
tas, non est
caussa, cur a
nobis non
videantur.

Aura illa
brissimus,
non tollit
Planetarū
Soli latera-
liter cōiun-
ctionem, a-
spectum.

Lux diurna
sola, facit di-
sparere sive
ra Soli iam-
ta.

I.

siderum irradiationes suffocat non physicè, sed opticè; illud quidem, quia species omnes siderum, etiam Sole præfente adsunt; hoc autem, quia lucis diurnæ præcellentia hebetatæ stellarum radiosæ imagines sentiri nequeunt: unde tenebris luci diurnæ succedentibus, siue terræ, (ut quot noctibus,) siue Lunæ interpositione in Eclipsibus solaribus, id fiat: sublata fortioris lucis tyrannide, debiliores planetarum & stellarum luminosi conii, in visum sua iura exercent. Unde cum Faculæ Solares sub Sole die quovis serenissimo, toto anno, tam æstate, quam hyeme, suos nitores, & ignes luculentissimos in oculos nostros eiaculentur.

Lux Facularum solarium superat diem lucem.

Lux Facularum solarium fortior est, luce Solis communis.

Lux Facularum intensior est lumine auræ calæstis.

Lux Facularum superat lucem Planetarum, magis quam Sol, Faculis exutus. Obiectio iniunctio facta evanescit.

Si Faculae solares extra Solem sunt, videbuntur extra ad latera.

Concludo primò. *Lucem Facularum esse fortiolem luce diurna*; alioqui si lux diurna esset fortior prævaleret in oculo, & Facularum speciem in charta receptam præfocaret, cuius contrarium accidit: nam multæ Faculæ, etiam si sub dio observatio instituitur, elucet.

Concludo secundò. *Lucem Facularum esse fortiolem, reliqua globi solaris luce*; alioqui, non prælucere Faculæ, ex illa communi Solis luce.

Concludo tertio. *Lucem Facularum esse fortiolem luce quacunque corporis Solis ambientis in ordine ad visum*. Si enim fortior est luce diurna ad visum & luce solaris: utiq. & circumstante luce vegetior est quia lux Soli circumdata non est nisi à Sole, & est in corpore tenuissimo, rarissimoq. atq. ob eam causam ad agendum multo debilior: à fortiori igitur; si Faculæ solares, præstantia lucis suæ, communem & equabilem Solis lucem antecunt; quanto amplius remissiolem superabunt.

Concludo quartò. *Lucem planetarum, cum Luce Facularum comparatam, esse minoris vigoris, quam si comparatur ad communem lucem Solis*; nam lux Facularum est intensior luce solari communi; multo ergo intensior luce Planetarum.

Unde obiectio, ex Planetis iniunctio facta, nulla est.

Concludo quintò. Si Faculæ in æthere cælesti iuxta Solem ex parte quacunque tandem incedunt, necessario videbuntur.

Probatum primò. Sol in quacunque ætheris plaga videbitur; igitur & Faculæ solares iuxta incedentes viderentur, sunt enim Sole ut probatum, lucidiores. Suppono autem Faculas cum visitata sua magni-

II.

tudine posset enim tam parva assumi, ut exilitate corporis, non remissione lucis, aciem visus præterirer.

Probatum secundò. Pars aliqua Solis tanta, quanta magna aliqua Facula existit, iuxta Solem posita alluceret; igitur & Facula, idem præstaret, cum Facula sit lucidior, communi solaris corporis portione.

Probatum tertio. Faculæ ad nos affulget ex Sole, ut patet experientia; multo ergo amplius splenderent iuxta Solem ex æthere: quia quod radiat è lucidior, amplius nitet ex minus lucido: minus autem lucet æther, globo corporis solaris, ut per se notum est.

Probatum quarto. Causæ cur Faculæ solares non allucerent, vel essent ex æthere Solem circumstante, vel ex Aëre nostro, vel ex ipso Sole. Sed ex nullo horum vlla assignari potest ratio, quo minus Faculæ allucerent, ad nos, extra Solem in æthere positæ: igitur si illuc egredientur, lucebunt. Sequela Maioris probatur: quia præter illas tres causas, nulla potest excogitari, cur Faculæ in æthere positæ non allucerent; Minor probatur: quia de facto, æther Solem circumstant, non impedit stellas; quo minus in Eclipsi Solis totali ad nos splendore suo pertingant, ut probatum est, ergo multo minus Faculas: aërem vero nostrum diurnum, & ipsum Solem quotidie splendore superant: teste experientia: igitur probata manet minor.

Concludo sexto. *Faculæ solares à Sole non distant, neque extra superficiem ipsius exeunt, aut prominent sensibiliter sed eidem insunt ut partes*. Probatum, Quia si distarent, id circa horizontem sentiretur; idem fieret si ipsius superficiem exirent, aut sensibiliter prominere. horum autem nihil fit; unde Solis esse partes illustiores ex eo concluditur, quod Solem alternatim quodammodo insideant, & integrent, & si ab eodem mente auferantur, Sol totus mera Macula secundaria existat. Quod autem Solari superfici ei secundariæ Faculæ, Maculis secundariis passim insideant, exhibitum est satis ex observationibus & Notis earundem in libro priore, & præsertim Observationum Imagine vltima, seu Meditullio Solis, in quo uniuersa Solis apparentis facies ex instituto profertur & explicatur.

Faculae solares sunt partes Solis.

I.

Hoc argumentum licet potissima ex parte Physicum, & minus Geometricum, tamen quadam tenus Opticum existit, & tanto robore pollet, vt omnino convincere videatur.

COROLLARIUM I.

Macula, vt Facula in- sunt Soli. Hinc sequitur etiam Maculas intra superficiem physicam Solis contineri, quia motus apparens Macularum est idem, qui Facularum: non autem esset, si Maculae à centro Solis amplius recederent, quam Faculae saltem sensibilibiter.

COROLLARIUM II.

Sol gyratur circa suum centrum. Gyratio Solis ex hoc capite directo sequitur: praesertim si Maculae, & Faculae secundarie in auxilium aduocentur. Cum enim hae totum quasi Solem componant, & moueantur vniformiter difformi motu neque Solem tamen exeant; necesse est, aut Solẽ gyrari; aut Solẽ nullũ aspici: id enim quod de Sole lucet, & aspicitur, gyratur.

His omnibus ad stipulatur, Galilaeus, in Hist. sua, Delle Macch. epist. ult. pag. 132. verbis istis: Io spero, che di quãto fin qui hò detto, Apelle deura restar sodisfatto, e massime aggiugedoui quel ch' hò scritto nella seconda lettera, e crederò, ch' e' nõ sia per metter difficultà nõ solo nella massima vicinãza delle macchie al Globo Solare, ma ne anco nella di lui riuoltione in se medesimo, in cõfirmatione di che posso aggiungere alle ragioni, che scrissi nella seconda lettera à V. S. che nella medesima faccia del Sole, si veggono tal volta, alcune piazzette più chiare del resto, nelle quali cõ diligẽza offeruate, si vede l'istesso mouimẽto, che nelle Macchie, e che queste sieno nell'istessa superficie del Sole, nõ credo che possa restar ad alcuno, nõ essendo in verun modo credibile, che si troui fuor del Sole sustãza alcuna più di lui risplẽdẽte; e se questo è, nõ mi par che rimãga luogo di poter dubitare del riuolgimẽto del Globo Solare in se stesso. Et tale è la cõfession de veri, che di qua poi corrispõdetemẽte ne seguita la cõtigità delle Macchie alla superficie del Sole, e l'esser dalla sua conuerfione menate in volta: nõ apparendo veruna

II.

1 „ probabil ragione, come esse (quando
„ fossero per molto spatio separate dal
„ Sole) deueffero seguitare il di lui riuol-
„ gimento. Hæc ille quæ ego latine sic
5 „ intelligo.

„ Ego spero Apelli, ex hætenus dictis sa-
„ tisfactum iri, praesertim si quæ in epist.
„ 2. scripsi, hisce adiunxerit: credamq;
„ illi nullam fore difficultatẽ, non tantũ
10 „ circa Macularũ ad Solẽ viciniã, sed ne-
„ que circa Solismet ipsius conuerfionẽ:
„ in cuius rei confirmationẽ, præter alla-
„ tas, dicta epist. ad V. D. rationes, etiam
„ hoc possum addere, in ipsamet Solis fa-
15 „ cie interdum apparere plagas reliquo-

„ illustiores, in quibus diligẽter obser-
„ uatis, idẽ qui in Maculis reperitur mo-
„ tus: ipsas autem superficiẽi solari inhe-
„ rere, apud quenquã in dubiũ reuocari

20 „ posse non puto, quod nullo modo cre-
„ dibile sit, aliquam substantiam extra
„ Solem ipso splẽdidiorem inueniri: quo
„ obtento, non video qui fieri possit, vt

„ Sol in se ipso nõ reuoluatur. Et hæc est
25 „ veri cõnexio, ex quo deinde Macularũ
„ cũ Sole cõtigitas, atq; circulatio cor-
„ respõdetia apta cõsequitur: cũ è cõtira-
„ rio, (si à Sole magno spatio sepa-
„ rentur)

„ nulla probabilis ratio in propriũ sit, qua
„ motui Solari obsecũdẽt. Hæc Galilaeus,
circa meũ Apel. e. vbi nota, me ex inuẽro

30 „ Macularũ inæquali motu, addubirasse, &
„ inquisiuisse, an nõ à Sole Maculae aliqua-
„ tulũ, & inæqualiter recederent: cuius cõtira-
„ rariũ cũ sentiret Galilaeus, ex Faculis Soli

35 „ inhærentibus, probauit. Maculas inesse,
„ eo quod vt rarũq; vnus idẽq; motus esset.

„ Illatũ à Galilæo verũ est, sed minus so-
„ lidẽ intulit, cum eandem rationem in
40 „ hoc Facularũ, & Macularũ esse probauit,
„ quod in Faculis diligẽter obseruatis,

„ idẽ qui in Maculis reperitur motus, ipse
„ aut ita indiligẽter motũ obseruauerit, vt
„ omnium putauerit esse constanter recti-
45 „ lineum, & ad Eclipticam parallelum,

„ necnon morã supra horizontem solarem
„ æqualis: quæ expresse falsa demonstrata
„ sunt in libro 1. & 3. Quare si Macularum

50 „ motus fuisset curuilineus, vt sensibilibiter
„ etiam fere semper est, Facularum vero
„ rectilineus, vt asserit ipse, fuisset apertum
„ discrimen, ad opposita inferenda, & ip-
„ se ex deceptione idem intulisset. Præte-

55 „ rea medium quo probat Faculas inesse
„ Soli, est aliquod verosimile physicum,

I.

quod ego pariter quidem adhibeo, sed firmioribus munitum observationum, atque rationum praesidijs, quibus prorsus ipse destituitur. Cum enim hanc ipsam Solis gyrationem, epistola 2. pag. 49. ad finem in dubium reuocasset, ex hac sola coniectura in eo fundata probabilem facit, quod tam constans & regularis motus, qualis in Maculis cernitur, non posset habere radicem, & fundamentum primum in substantia fluida, ac proinde motibus accidentarijs facile perturbabili: maculas tamen ibi in ambiente, vel ad summum contiguas ponit corpori solari. quarum motum constantem, male accepit pro semper uniformi, & ignorauit interim motum annuum, quem cum altero multo probabilius ipsi corpori solari tribuisset.

COROLLARIUM III.

Excentrici, & Epicycli ab hoc Phænomeno arcentur.

Excentrici, & Epicycli procul exulant, si namque Solis centrum in linea Eclipticae semper inheret, si Maculae, & Faculae superficiem Solis Physicam nunquam egrediuntur; patet Epicyclos, & Excentricos Macularum circa Solem, ut nonnullis Phænomenon hoc peruerentibus affingere placuit, dari non posse.

COROLLARIUM IV.

Facula, & Macula non sunt stella.

Ex eodem fonte nec Maculae, nec Faculae stellarum numero abscribi possunt. Nisi quis asserere velit, Solarem globum aliud nil esse, quam stellarum infinitam & temere accumularam congeriem; quod ex alijs capitibus solide refutatur.

Obiectio ex Refractione & Reflexione desumpta.

Dices argumentationem ex Faculis motis pro gyratione Solis factam procedere si Faculae Solares supponantur esse aliquod corpus lucidum, luce interna, & permanente perfusum. De cætero si quis diceret, Faculas Solares esse quandam fulgoris apparentiam, vel ex reflexione, vel refractione generatam; discursum factum, fore eneruam.

Respondetur.

Respondeo omnino, Faculas, & esse, & probatis, atq; probandis supponi corpus intrinsecus lucidum; non autem exoriri ex reflexione, aut refractione, id quod suo loco ostendetur infra ubi de ortu, & interitu illarum disputatur.

PRONUNCIATVM QVARTVM.

Nulla Macula, aut stare in Sole, aut regredi, aut precipitari visa est, tot nunc annis.

CAP. VIII.

Hoc pronunciatum verum est de omnibus, & singulis Maculis, & probatur ex omnibus, seu plurium, seu singularum adductis, & adducendis cursibus, qui omnes procedunt modo, & motu ad sensum proportionali, atque æquabili, ut ex adductis observationum imaginibus constat, suisque locis fusius dicitur: neque enim hæc res probatione alia, quam terminorum explicatione indiget. Dum ergo dico in Sole. *Nullam Maculam visam esse stare;*

sensus est, Tempore notabiliter diuerso, quamlibet Maculam in Sole obtinuisse, & obtinere, seu obtenturam locum notabiliter alium progrediendo ab ortu in occasum. Tempus autem notabiliter diuersum in medio Sole, est vnus quasi horæ circa margines, duarum aut plurium: prout circulo obseruatorio magno vel paruo vltus fueris. Tantis enim temporum interuallis, Macularum dictis locis, progressio ab ortu in occasum animaduertitur, ab accurato, & instrumentis bonis instructo Obseruatore, in magnis Obseruationum Circulis. Dum dico, *nullam esse retrocedere animaduertam,* intelligo de motu Macularum proprio, non communi, quotidiano diurno: nam quod ex hoc stationariae, retrograde, & progressiue fiant Maculae ostensum est libro antecedente, modique, & rationes huius motus sunt affatim declarata: illa autem statio, regressio, & progressio motum proprium Macularum non afficit, qui circa suum axem, in suo parallelo perinde promouetur, ac si apparentia ista nusquam euenirent.

Dum dico, *Nullam Maculam esse notatam precipitari;* non comparo singularum motus cum motibus omnium, aut singularum, vel vice versa; sed vnus cuiusque motum ad se; ita ut sit sensus pronuntiati, Maculam aliquam dum tendit ab ortu versus occasum, non esse visam instabiliter aut subsultim ferri, ut modo velox, modo tarda, iterumque velox,

Explicatio, & probatio Pronunciati ex obseruatis.

I.

velox, inconstanti reciprocatione suum iter instituat; sed si quæ sunt alijs celeriores animaduersæ, eæ suam celeritatem retinuerunt, si tardiores, tarditatem, cui tamen non obstat, apparens ad margines ipsarum coitio, & interuallorum diurnorum, ex accliuitate, & decliuitate cursuum proportionalis stataq; contractio. Hæc autem sic explanata, maiore probatione vt dixi, non indigēt; nam obseruata, aliter quam syncera prolatione, & vera explicatione, firmari non possunt. Et qui ab Obseruatore fidelius plus exigit, semetipsum Obseruatorem, constituat, oportet; qui tamen, vt alijs omnibus, sibi tamen, ne sic quidem satisfaciet: nam ad persuadendum sibi, præter nudas obseruationes suas, nihil afferet. Aut ergo negandum totum Phænomenon, vniuersæque Astronomiæ valedicendum, omnisque sensuum cognitio penitus profliganda; contra omnem sensum, & rationem, nec non veræ Philosophiæ praxim: aut, quod verissimum; *standum est tandem aliquibus obseruatis primis*. Qualia si non agnoscis mea, fac vt habeamus tua: quæ si accuratione fideque debita pertractata fuerint, à meis deflexura, minime crediderim. Si deflexerint, non ægre feres, si plus credidero meis, quam tuis: nam quæ quis alijs facit, vt eadem sibi fiant, ipso facto suadet.

Fides tandem habenda obseruatis.

Ex hoc Pronunciato constant sequentia Corollaria.

COROLLARIUM I.

Maculæ non feruntur in orbibus Excentricis sub Sole, alioqui aliquando essent retrogradæ; quod tamen non fit. quod autem retrogradæ essent, constat ex eo, quod Latitudine apparenti Solem non egrediantur, sed zona certa coercerentur: deinde ex eo, quod ad sensum spatii temporis aliquanto, recto ferre itinere ferantur, vnde necesse est, illarum planum non esse multum inclinatum, sed quasi erectum ad circulum solarē: ita vt axis oculi, & Maculæ parallelus sint in eodē veluti plano, ad horizontē solarē recto: vnde quādo talis Macula, in sui circuli superiore parte feretur, Solem non excedet in Boream, vel Austrum:

Orbes sub Sole Excentrici excluduntur ab hoc Phænomeno, per Pronunciatum.

II.

ergo videbitur sub Sole retrograda, quod tamen est falsum. Non igitur feruntur Maculæ sub Sole in Orbibus Excentricis. id quod erat propositum.

COROLLARIUM II.

Maculæ non feruntur in vllis orbibus Epicyclis, seu sub Sole, seu circa Solem, idque siue in Excentricis, siue in homocentricis. Quia easdem affectiones multo magis subirent, quas modo in Corollario præcedente explicauimus, & exturbauimus. Circumferentur enim isti Epicycli, in alijs quibusdam sub Sole, aut circa eundem, aut homocentricis, aut excentricis, aut quibuscunque tandem circulis: qui Epicycli sub Sole Maculas sepe in ortum retrorquerent &c. quod cum repugnet Phænomeno, non est asserendum. Igitur Maculæ non circumferuntur in vllis orbibus Epicyclaribus, seu sub Sole, seu circa Solem. id quod erat demonstrandum.

Epicycli, vt Excentrici in hoc Phænomeno nulli.

PRONUNCIATVM QVINTVM.

Omnium Macularum itinera tempore eodem apparent generis, & situs eiusdem, ceteris paribus.

CAP. I X.

Volo dicere, si vnus Maculæ iter est rectilineum, etiam aliarum esse, tempore eodem, si vnus est curuilineum, etiam aliarum esse curuilinea, tempore eodem. Addo cæteris paribus, quia sunt quædam, quæ nullam disparitatem afferunt, vti suis locis, in progressu me monente, benignus Lector, satis intelliget.

Expl. catur sensus Pronunciati.

Per tempus idem, non est intelligendus cursus Maculæ totus, cum cursu alterius Maculæ toto aliquando, & alicubi concurrens; sed omnino strictè, & rigidè est intelligenda vox temporis: secundum dies, & tempus sensibilibiter idem obseruandi: sic, vt qua die, quo tempore, Macula quæcunque in Sole, & circulo obseruatorio annotata inceserit via rectilinea, eadem die & tempore, aliæ quæcunque similia itinera describant: neque vlla procedat tramite flexo, dum aliæ recto; aut rectilineo, dum aliæ perficiant

ficiant arcuatum.

Per situm eundem intelligo linearum itinerarium habitudinem ad plagas vel polos globi solaris: ita ut itinera Macularum curuilinea, sint simul omnia caua in eandem plagam, sint conuexa simul in eandem; si sunt rectilinea, seruent tendentiam veluti similem, & ad Eclipticam Inclinationem fere æqualem. Accipienda sunt etiam in eadem solaris circuli plaga, vel orientali, vel occidentali.

Hoc pronunciatum, dicto modo, explicatum, constat ex toto libro priore, & constanti tot nunc annorum experientia: ut plus opus non sit, quam Lectorem ad imagines, & Notas particulares observationum remittere; videbit enim illic, hanc cursuum proprietatem identidem occurrere atque inculcari.

Ex hoc pronunciato sequitur, Motus huius vniuersalis, & omnibus Maculis communis subiectum, siue causam mouentem; debere esse vnam, & omnibus Maculis communem; itaque vel erit vna aliqua sphaera quæ tam Maculas quam Faculas immerfas secum circumferat, vel quæ adhærescentes circumgyret. Hanc autem ipsam sphaeram esse ipsissimum Solis globum, probatum est partim ex antecedente pronunciato, partim ostenditur è consequentibus.

*Commune
Macularum
motus subie
ctum est Sol.*

Cautela

Nota, si quando euenit (vti solet) ut dum aliqua Maculae, vel boreales, vel australes nonnihil incuruescunt, dum alia vestigia itinerum rectilinea post se relinquunt, id fieri ex lentum refractione, deinde tantillum esse, ut ad sensum rectitudinis, vel parum, vel nil derogat.

Pronunciato ex eo capite, nil decedere debet.

Loquimur enim

de apparentijs

sensibili-

bus.

omnibus Maculis communem esse annum; eo quod particulares Macularum motus annue in ysdem parallelis decursu & inter se collati sint similes, & æquales & c.

PRONUNCIATVM SEXTVM.

Omnia Macularum itinera ab ysdem parallelis annue descripta, sunt ad sensum sibi similia, & plerumque tempore aequalia.

C A P. X.

DVplex potest esse huius pronunciatum sensus; alter, motum paralleli cuiuscunque vno anno descriptum, secundum quem Maculae incedant, esse annum, & cuiuscunque alterius anni Motui annuo similem, & æqualem; & hunc sensum non intendo, tamen si enim, (vt suis locis videbitur sit motus totius Solis, & singulorum ipsius partium circa polum Eclipticæ solaris annuus, &c.) de ipso tamen hic non inquirō.

Alter igitur pronunciatum sensus est iste, quemcunque Solis parallelum similibus anni temporibus, describere cursus similes & æquales Macularum. Vt exempli causa; qualescunque Macularum motus describuntur in Sole hoc anno 1627. hoc mense Augusti; hoc die 22. mensis eiusdem; tales motus in genere saltem, sunt descripti annis præteritis, tales expectamus futuris, tempore hoc eodem, à parallelis, & punctis parallelorum ysdem. Et hic est sensus genuinus Pronunciatum; & quod de hoc tempore Augusti loquor, idem intelligendum volo de tempore mensis cuiuscunque. Et hoc vnde scio? Ex ipsis Maculis, & Faculis annua in eisdem parallelis incidentibus, id quod frequenter contingit, & quando euenit, motus semper ad sensum similes, & quasi æquales contingunt. Consule obseruationum imagines inter cetera ad hunc finem, libro priore alatas, & videbis huius veritatis constantiam.

Ex hoc rursus infero, Motus huius tam constantis causam, & subiectum debere esse quid vnum, & vniuersale. Infero secundo, motum quandam omnibus Maculis communem esse annum; eo quod particulares Macularum motus annue in ysdem parallelis decursu & inter se collati sint similes, & æquales & c.

Dixi motus ad sensum esse similes in ge-

*Sensus Pro-
nunciatum ex-
ponitur.*

*Sensus Ge-
nuius Pro-
nunciatum.*

*Subiectum
motus Ma-
cularum co-
mune, & mo-*

I.

& plerumque æquales, quia fieri posset, ut ex parte rei, aliqua parua dissimilitudo, interueniret, vti etiam in motu aliquantam discrepantiam quandoque contingere, certum est, ex obseruationibus, & earum notis.

Tametsi motus sit annuus, non ideo sunt annue Maculae.

Dixi motus similes, & æquales annuè redire, eosque sciri è Maculis in parallelis eisdem incidentibus; vbi nota, non ideo Maculas illas esse annuas, & redire, hoc enim non fit, cum paucae vel semel redeant; sed quia aliæ alijs succedunt, describunt in iisdem parallelis itinera similia, quia Mobile principale Sol cui insunt, statos circuitus perficit: sicut in rota, si in amissi clauis locum alius sufficiatur, eosdem, quos prior solitus erat describet circa axem ambitus &c.

PRONVNCIATVM SEPTIMVM.

Omnes Maculae in parallelis aequalibus delatae, & semestri temporis intervallo à se distantes, faciunt motus quidem ordinariè similes & æquales, si tamen, & tendentia subcontrarios.

CAP. XI.

Huius rei exempla sunt obuia in toto libro priore, in specie vero allata circa finem, vbi motus subcontrarios per singulos duorum annorum menses contruli.

Per æquales parallelis intelligo semper binos ultra, & citra maximum collocatos, intervallo latitudinis ab eodem æquali.

Subiectum motus Macularum commune.

Sequitur ex his iterum, subiectum, & Mobile vniuersale, in quo, à quo, & secundum quod Maculae deferuntur, esse quid vnum, stabile & perpetuum, atq; ordinatissimum; alioqui mens non capit, qua ratione, tanta semper vniformitas & similitudo interueniret, & singulis semestribus recurreret.

II.

PRONVNCIATVM OCTAVVM.

Omnia Macularum, & Facularum itinera bis fiunt in anno rectilinea ad sensum; semel circa finem Novembris; & initium Decembris: et semel intra finem Maii et initium Iunii.

CAP. XII.

Patet hoc pronunciatum ex imaginibus Obseruationum tamenearum quam alienarum, libro priore ad dictos menses depromptis: nec aliter, nisi obseruando stabiliri potest.

Conueniunt autem isti motus rectilinei in hoc.

Primo. Moras sub Sole ad sensum faciunt æquales, omnes & singuli cursus ordinariè.

Secundo. Itinera omnia sunt ad Eclipticam obliqua nulla vero vnquam parallela.

Terrio. Omnes anguli quos itinera ista cum Ecliptica comprehendunt, sunt inter sese fere æquales, & inter sex, & octo gradus versantur.

Quarto. Tempus, quo motus iste ad sensum quasi rectilineus perdurat, excurrit ad duas circiter hebdomadas.

Quinto. Omnes hi cursus qui secant Eclipticam sunt boreales, & australes; qui non secant, vel sunt tantum boreales, vel tantum australes.

Differunt autem isti motus rectilinei in hoc.

Primo. Omnes brumales tendunt ex Austro ortiuo, in occasum borealem. Omnes vero æstiuales, tendunt ex ortu Aquilonari in occasum australem.

Secundo. Brumales sese sensim recipiunt, tã ex parte australi in ortu, quam septentrionali circa occasum ad Eclipticam, æstiu vero, circa ortum ex Aquilone tendunt ad Eclipticam, circa occasum ex Austro.

Tendentia autem motus Macularum spectatur maximè penes puncta ortiuia, atque occidua; item penes chordam puncta illa necentem, & situm ipsius ad Eclipticam, nec non angulum quem cum eadem facit.

Duo autem reperiuntur anguli, qui sunt

*Motus Rectilino-
rum conuenien-
tia.*

*Motuum
Rectilino-
rum differen-
tia.*

I.

fiunt ad Eclipticam, alter arcus itinerarij in planum obseruatorium à centro Maculae proiecti, cum Ecliptica mixtilineus; alter chorda ortum & occasum neptentis cum eadem Ecliptica rectilineus; hoc ergo angulo descrescente, augefcit ille; augesciente decrescit ille; & quando ille summus est in æquilibrijs, hic nullus est: quando maximus rectilineus, ille mixtilineus nullus est; sed arcus ad sensum cum chorda optice congruit; quemadmodum chorda in æquilibrijs cum Ecliptica, aut saltem eidem parallelus incedit. Hæc pro Macularum tendentia bene intelligenda nosse oportet.

COROLLARIUM I.

Motus hi non possunt esse in ullis orbibus Planetarijs.

Ex his colligo primò. Motum istum in nullo orbium planetariorum fictitiorum posse existeri; quia ipsi tales motus non habent, temporibus hisce statis. Examinet qui volet, omnes planetarum Theorias, & sic sese rem habere inueniet. Neque enim hic omnes istas nugas ponere, & inutiliter refutare, tempus & charta, aut eruditorum iustum fastidium permittit.

COROLLARIUM II.

Motus rectilinei non possunt esse in orbibus Soli circumpositis.

Colligo secundò. Motum hunc non inesse ulli orbi externo, qui sit ad globum Solarem vel excentricus vel homocentricus. Nam totius huius motus reuolutionem periodicam infra Solem non absolui, probavi in prioribus; quod alioqui necessario Maculae sub Sole regrederentur eodem tempore, dum prouehuntur motu isto rectilineo, eo quod plana per motus huius parallelos traducta, sint ad circum Solis quasi erecta & in oculi axe visorio aliquamdiu iaceant; unde circuli secundum quos voluuntur Maculae, quantumuis magni cogitentur, quia tamen necessaria inclinatione super planum horizontis destituuntur, idcirco nulla sui parte extra latitudinem Solis in Boream austrumue excedunt: ex quo necesse est, si totum Solis Phenomenon infra Solem vagaretur, videndum fuisse regressiuum in parte apogæa; hoc autem cum nunquam fiat, etiam hac sola motus rectilinei apparentia, efficitur Maculas infra Solem totam periodum non describere;

Macularum Motus, nec totus infra, nec totus supra Solem est.

II.

Sed neque totam supra: quia tunc omnino non viderentur obiectu Solis: igitur circum agitari censendum est, (id quod tamen alijs longè solidissimis argumentis postea demonstrabitur) quo posito; dico illas non agi in vilo circulo, qui Solari globo sensibilibiter maior sit; aut enim Circulus siue sphaera illa erit Soli homocentrica aut heterocentrica; Sed neque primum, neque secundum; & tertium non datur: igitur sphaera illa Solari globo sensibilibiter non est maior.

Probatum nunc maior per singula.

SPHAERAM IN QUA MACULAE

circum Solem gyron cogitantur, non esse Sole maiorem, & homocentricam.

CAP. XIX.

IN Titulo huius capituli & sequentium absolute nego maiorem, quia absolute neganda est, ut ex professio infra probabo, ostendens Maculas & Faculas esse in Sole: iuxta promissum tamen, in fine precedentis capituli, hic maiorem sensibilem rejicio.

Ex à centro tanquam polo, in figura prima descriptus cogitetur Solis globus a b c d e, & quia Maculae supponuntur circa ipsum circumferri homocentrice, transibit axis circa quem voluuntur per centrum Solis a, & sit is e c, & quia Motus macularum statuitur rectilineus, axis e c, iacebit (ad sensum saltem) in plano solaris circuli b c d e: & quia Maculae Solares, & Faculae primarie occupant magnam in Sole latitudinis Zonam, secundaria vero totum Solem, prout ex obseruatis & allatis libro priore constat, idcirco, assumo in exemplum tres parallelos, maximum b d, duos minores borealem alterum f g, alterum austrinum h i, in quibus voluantur Maculae & Faculae quæcunque. Quarum itinera cum absoluantur, cæteris paribus, tempore ad sensum aequali, dico, fieri non posse, ut in sphaeris sensibilibiter maioribus Solem cõcentrice circumdantibus absoluantur.

Maculae solares circulant Solem, sed in nulla extra eundem sphaera.

Explicatio Propositionis.

Admonitio.

I.



ETIAM SI rectilineus Macula-
rum motus ex parte rei semper
sit curvilineus, neque lineam
b a d, aut f x g, perfecte rectam ita desi-
gnet, vti figura præfert; nihilominus ta-
men, quia ista qualis qualis à rectitudine
deviatio, circa prædicta tempora, mora-
rum in cursus inæqualitatem sensibilem
non infert, quemadmodum ex observa-
tis constat; manet suus nihilominus ar-
gumento nervus, qui ab æquali supra ho-
rizontem mora potissimum trahitur.
Quanta autem homocentricorum extra
Solem debeat assumi distantia, quæ pri-
mo observatori sensibilis sit, hic non de-
termino; hoc certum, paucorum minu-
torum, ne dicam vnius, sensibilem futu-
ram. Argumentum autem nititur illo
fundamento, quod diuersæ magnitudinis
Circuli, nisi in vnico puncto, se non tan-
gunt. & sic portiones arcuum sibi mu-
tuo congruere non possunt, &c. His præ-
monitis.

Probatio.

Sphæra ho-
mocentrica
circa Solem
excursatur.

Assumatur, si fieri potest, sphæra ali-
qua K l m n, secundum dicta, & sit eius
semidiameter a K, dupla ad solarem se-
midiametrum a b, & protrahatur axis v-
trinque in polos l, arcticum n, austrinum,
super quos voluantur Maculæ & Faculæ
in parallelis o p, & q r, dictis temporibus
motu ad sensum rectilineo, eoque vti so-
lent ad sensum regulari; & sit aliquis cir-
culus l b n, latitudinis in superficie dictæ
sphære, per polos l, n, incedens, Solemque
in b, apparenter seu optice contingens,
respectu oculi in terra constituti, vehat-
que secum duas Maculas b, f, atque vnā
Faculam australem, t. Igitur quando di-
ctus circulus Solem attingit in b, euident
est arcum reliquum totum b f l, &
b t n, extra peripheriam Solis b f c, b h e,
versari, est enim circuli maioris semicir-
culus in arcum Ellipticum proiectus; igitur
quando Macula b, in Sole exoriri in-
cipit, Macula f, & Facula t, procul ex-
tra Solem adhuc vagatur: & vice versa,
quando Macula f, in f, & Facula t, in h,
ad horizontis solaris contactum delata
fuerit, tunc circulus Maculas & Faculas
deferens promotus, secabit Solem in f, &
h, ideoque totum arcum f h, & conse-

II.

1 quenter Macula f, offeret intra Solem
inductam apud punctum u. Vnde quan-
do Macula f, & Facula h, horizontem
solarem subit, Macula b, in Solem pro-
gressa est ad punctum u, spatio notabili
5 b u. Rursus, quando circulus l u h n, ad
summum in Sole peruenerit, proijcietur
in rectam l c a n, & Maculæ culminabunt,
b, quidem in a, f vero in x, & Facula
10 t, in y.

Et hinc rursus, quando circulus Ma-
culas deferens in communem horizontis
& paralleli o p, sectionem g decurrerit,
Macula f, & Facula t, occumbet in g, & i,
15 sed Macula b, adhuc supra horizontem
morabitur in puncto Z. Denique quando
Macula b, occumbet in d, tunc circulus
latitudinis euexit Maculam f, in a, & Fa-
culam t, in b. Igitur si Soli circumduca-
tur sphæra sensibilibus maior Maculas &
20 Faculas deferens, ipsæ in Sole motu re-
ctilineo promotæ, nunquam facient mo-
ras ad sensum æquales, quod cum sit fal-
sum & contra Phænomenon; etiam ea,
ex quibus hæc consequuntur, oportet ef-
se falsa. vnde stante veritate Phænomeni,
corruant oportet isti orbes homocen-
trici.

Quod si iste tantillus Soli circumda-
tus orbiculus K l m n, Solis ambitum
30 minutis non omnino octo excedens, tan-
tam in Motus Macularum rectilineos di-
screpantiam infert, quid facient ij, qui
non semidiametris solaribus, sed integris
35 gradibus, & ijs quidem multis, maiores
assumuntur? certè tam absona,

tam erudito hoc æuo indigna
consequuntur, vt aures
aliorum collutula-
re pigeat.

40 Sed ne canamus ante victo-
riam triumphum, videa-
mus an eadem fa-
cilitate simus
ab hac
45 experientia elimi-
naturi hetero-
centricos.

Conclusio
ex allatis.

Absurda
magna con-
sequuntur
orbes ma-
gnos Soli
circumscri-
ptos, in qui-
bus Macu-
la deferan-
tar.

SPHAERAM IN QVA MACVLAE

circa Solem gyron cogitantur,
non esse Sole maiorem,
& Heterocentri-

cam.

CAP. XIV.

Variis sphae-
ra circa So-
lem Excen-
trica, casus.

Triplici ratione principali potest
poni excentricitas sphaerae Soli
circumiectae; vel secundum
longitudinem in linea K m, in eadem pri-
ma figura, hinc & illinc: vel secundum
latitudinem in linea l n, supra & infra;
vel denique secundum profunditatem, in
linea distantiae ab Oculo directa, quae in
figura data in punctum a, confidit. Inci-
piamus ab hac.

Si sphaera
circumposi-
ta excentri-
citas in axe
visorio ma-
net, demon-
stratio a
prioribus
nil differt.

Siue sphaera igitur K l m n, in 1. adhuc
figura, accedat ad oculum perpendicula-
riter puncto a, incumbente siue recedat ab
eodem, vsq. ad contactum Solis in pun-
cto superficiali a, dummodo axis visorius
itemque Solis & Sphaerae centrum, in vni-
cum punctum a, confidant, &c. tunc ea-
dem semper euenient, quae modo sunt di-
cta; quia Solis species per modum cylin-
dri, aut conii ad nos venit in cuius apice,
vel extrema base oculus collocatus est,
vnde Maculae & Faculae seu vestigia iti-
neraria illarum eodem semper modo So-
lem eiusque circulum apparentem seca-
bunt: vt modo est demonstratum.

Sphaera cir-
ca Solem ex-
centrica ex-
cutiuntur.

Scholium animaduersione dignum.

Succinctum
demonstra-
tionis funda-
mentum.

Demonstratio indicata pendet ex
communi sphaerae & cylindri seu conii vi-
soriae sectione, quae semper est, segmentum
superficie sphaericae circuli peripheria
terminatum, optice in apparentem Solis
circulum b f g i h, proiectum: nam si
oculus loco consistat eodem, fiet sectio
in cono: si ad singula solaris circuli pun-

cta axem visorium perpendicula-
rem traducere cogitetur,
fiet cylinder, & se-
ctio cylindrica
&c.

Et haec de Excentricitate
secundum directio-
nem indicata
sunt.

EXCENTRICITAS
secundum longitudinem.

5 Vt si sphaera, a b c d e, in figura se-
cunda ex altero Solis a b, contactu a,
tanquam centro, ad interuallum conta-
ctus b, descripta, circa axem & polos c e,
Maculas b f g, deferat; quando b, orie-
tur, f, & g, extra Solem haerebunt, quibus
orientibus in h & i, b processit in K; tan-
dem occumbentibus h & i in l & m, Ma-
cula K versatur in n, qua occumbente,
in a, reliquae versantur in o, & p, extra
Solem &c.

Casus pri-
mus.

Sphaera cir-
ca Solem se-
cundum lon-
gitudinem
excentrica
excitatur.

15 Eodem modo, si centrum Excentrici
q a r, fiat b, & circa axem & polos q r,
voluantur Maculae b f t, prius oriatur
Macula b, & postremo occumbet in a,
reliquae autem serius orientur in h & i,
dum b, versabitur in u, & citius occident
in l & m, dum b adhuc vagabitur in x.

Casus secun-
dus.





Quae omnia sunt contra Phaeome-
non. Maculae enim rectilineo ad sensum
motu latae, aequales in Sole ad sensum
25 moras ordinarie faciunt, vt ostendi fusi-
sime ex obseruatis passim in prioribus.

Quod si quis contentionum, quam
Veritatis studiosior, vrgeat hinc sequi,
illas saltem Maculas, quarum cursus cum
aliarum cursibus in mora supra horizon-
tem non concordat, posse a Sole procul
eximi; & sic argumentum hoc de omni-
bus non concludere. Respondeo argu-
mentum primario ex aequalitate morae
35 procedere, & quia inaequalitas quae in
quarundam cursibus inuenitur, nec tanta
nec talis est, quanta & qualis in hisce &
similibus excentricitatibus reperitur, se-
cundario etiam vis argumenti ad illas de-
ruiatur. Licet hoc loco mihi satis esset,
si de aliquibus probaretur, ipsas a Sole
non posse auelli: Nam vbi vna est, ibi
omnes quoque versari, ex alijs quoque
45 capitibus solide hoc tractatu compro-
batur.

SCHOLIUM.

50 Quod si quis istas excentricitates vel-
let componere, ex sphaerae excentricae ac-
cessu ad nos, vel recessu a nobis, non eua-
det, sed magis se intricabit, vti conside-
ranti patebit. In sectionibus enim vel cy-
lindricis, vel conicis, cum sphaerae excen-
55 tricae

Casus alij.
Excentrici-
tas secundum
directum ac-
cessum vel re-
cessum eadem
absurda of-
fert.



I.
tricae superficie communibus, eadem,
quæ modo dixi fient.

**EXCENTRICITAS SECUNDVM
latitudinem.**

Repræsentatur ea in figura tertia. In
qua centrum excentrici $\beta \gamma \beta$, est α , & a-
xis circa quem voluitur $\beta \gamma$, in polis β , &
 γ . Solem $\alpha \gamma \alpha$; contingens concaua su-

II.
perficie in γ , polo fixo australi. Quando
igitur tres Maculae δ , ϵ , ζ , in vnico latitu-
dinis circulo $\gamma \alpha \beta$ deferuntur, omnium
prima perueniet in horizontem δ , reli-
quis procul extra positis. quando ϵ per-
ueniet in horizontem, ad α , tum α , pro-
cessit in θ , & ζ hæret foris ad ι ; quando
tâdem promotus latitudinis circulo $\beta \alpha \gamma$,
Macula ι , horizontem subit in α , reli-
quæ duæ processerunt in λ , ν . Omnes

*Sphæra cir-
ca Solem se-
cundum la-
titudinem
excentrica,
excitun-*

Ccc dein-

Casus pri-
mus.

I.

deinde simul culminant, in ν ; ξ , σ . postea quæ postrema Solem intrauit ad η , prima exit ad π : reliquis hærentibus ad ϵ & σ . Tum occumbente Macula ξ in π , aliæ duæ morantur, in ν , ϕ . Ultimo, quando Macula ϕ horizontem occiduum assequitur in x , reliquæ duæ, porro vagantur extra in ψ & ω . Itaque in hoc casu, omnes Maculæ boreales, cuiusmodi est, ξ , ν , μ , &c. facerent breuissimas moras in Sole, australes α , θ , μ , longissimas, Mediæ γ , η , λ , medias. quæ tamen omnia longissimè à veritate Phænomeni Solaris absunt. Igitur non sunt asserendæ eiusmodi sphaeræ heterocentricæ.

Conclusio vera, ex hypothesis falsa.

Hisce contraria in situ euenient, si sphaera excentrica Solem contingat in β , polo fixo boreali; tunc enim Macula arctica α , diutissimè in Sole manebit, breuissimè vero β , australis, medio modo sese habebit γ , media. Quæ rursus omnia falsa, quia contra Motum apparentem rectilineum Phænomeni, etiam illum, qui ab ordinarijs in duratione nonnihil deciscit.

Excentricitates sunt Soli circumpositæ secundum sex locorum positiones: Ante, Retro, Dextra, Laeva, Supra, Infra.

Atque in hisce tribus figuris expositos habes casus Excentricitatum sex primarios, secundum sex primaria globi Solaris puncta, in sphaerica ipsius superficie expressa; quorum duo sunt, maximè apogæum, & maximè perigæum, per axem visorium designata, & vnico caractere, α , expressa, in figura prima, siue igitur centrum sphaeræ excentricæ cogitetur in puncto apogæo, siue in perigæo, α , constitutum, semper ea contingunt, quæ sunt figura prima ostensa.

Alia solaris globi duo puncta sunt β , & δ , longitudinem eiusdem comprehendunt, & in hisce sphaera excentrici suum centrum figit, schemate 2. In tertio diagrammate, centrum excentrici α , agit vicem duorum punctorum, γ , nimirum & ϵ , in solari globo ad primam figuram descriptorum, quorum γ , boreum, ϵ , maximè austrinum est, & illud quidem compensatur ab α , respectu Solis γ , ϵ vero, respectu Solis α & β .

Quare cum in hisce sex primarijs, & simplicibus Excentricitatum positionibus, Motus Macularum rectilineus, prout vniformiter & regulariter hætenus apparet, locum nullum habeat, facile quicuis cordatus intelliget, multo

minus locum futurum excentricitatibus, quæ ex hisce componuntur. nam compositiones istæ longè maiores exorbitantias, atque errorum ambages efficiunt, quàm priores istæ simplices. quod vt ad oculum pateat, ecce tibi figuram quartam, in qua rem duplici modo exhibeo.

EXCENTRICITAS MIXTA.

Sphaeram in qua Macula circa Solem gyrari cogitantur, non esse Solem maiorem, & Excentricitatis mixtæ.

CAP. XV.





VOco Excentricitatem mixtam, quæ aliquid ex longitudine, & aliquid ex latitudine coniunctum habet, aut etiam ex profunditate, quæ præsentatu difficilis est. Mixtam ex longo & lato hic exhibeo, ad figuram quartam in puncto α , quod cum sit centrū sphaeræ ab β γ δ ϵ , ipsa respectu Solis α β , erit excentrica, & quidem secundum latitudinem, γ α , septentrionalem, & longitudinem occidentalem, δ α . Cum autem α , centrum sphaeræ sit in contactu Solis, & sphaeræ diameter ponatur dupla ad diametrum Solarem, α β , patet in, β , esse duarum sphaerarum Solis nimirum α β & sphaeræ ambientis γ δ , contactum. vnde necesse est, si Maculæ aliquæ in parallelis β γ δ , β η δ , β ν δ , ab vno latitudinis circulo β γ δ , deferantur, circa axem α β , in polis excentricis γ , & ϵ ; Maculam β , exorituram, dum aliæ duæ μ & ν , adhuc foris extra horizontem vagantur; deinde cum ex μ , in ϕ , peruentum fuerit, Maculam β , progressam esse in ϕ , β vero extra hære in η . Quando vero η , orietur in π , tunc ϕ , & β , versantur in ξ , & π . simul autem occumbent, π , & ξ ; π quidem in α , ξ vero in ν ; quo tempore Macula β , hærebit intra Solem apud γ , qua occidente in x , ν , manebit in γ , & α in δ , extra Solem β . In hac itaq. positione excentricitatis obliqua, Macula β , primo intrat, & primo exit Solem in ν , vna cum α ; β intrat postremo, & primo vna cum β exit; μ , intrat Solem post β , ante γ , & post vtramque exit in x .

Quanam sit Excentricitas mixta.

Excentricitatis Mixtae Casus primus.

Mixta sphaerarum circa Solem excentricitas, excutitur

Et



I.

Et sic excentricitas ista mixta, seu obliqua, multo plus anomaliae, & irregularitatis habet, quam priores simplices: quæ omnia cum motu Macularum ordinato & regulari multo minus stant, quam priores, adeoque multo minus tolerari possunt.

Excentricitas mixta Casus secundus. Contrario modo omnes hæ irregularitates accident, si Sol sit α ; nam in-

II.

1 ter Maculas β, γ, δ , prima oriatur β , deinde orientibus simul, γ , & δ , in ϵ , & a , β erit in t , quibus progressis per Z, n, θ , prima omnium occumbet, australis Z , in i , profundum Solem occupantibus n , & λ ; deinde sequetur in occasum n , apud μ , cū λ , hærebit in Sole ad ν , vero extra in ξ ; tandem occumbente ν in o , μ residebit in π , & ξ in d . & hac ratione prima-

Ccc 2 om-

I.

omnium exorta β , secundo loco occubuit in μ ; simul autem exorientium, α , & ϵ , prior occubuit α , australis; postrema borealis ϵ .

Conclusio vera, ex Hypothese falsa.

Hæc autem omnia sunt irregularia, & contra quotidianam Phænomeni naturam & apparitionem; itaque nullo modo asserenda.

SCHOLIUM.

Omnes Excentricitatum casus, ad aliquem ex prædictis possunt reuocari, vel similiter explicari.

Tametsi positiones Excentricitatum sunt infinitæ, intra prædictos tamen casus generales omnes coerceri videntur: itaque nullæ omnino apparent assignabiles, quæ in aliquo dictorum non peccent, aut omnino cum rectilineo Macularum motu conueniant.

Ratio efficax; quia quodocumq. mutatur centrum motus, oportet etiam mutari vel quantitatem, vel qualitatem eiusdem, &c.

Aduertendum etiam illud, excentricitatum harum omnium centra assumpta esse in superficie Solis, eadem tamen omnia proportionaliter euentura, si assumantur siue extra, siue intra Solem.

Amplius hisce similia, sed sitibus contrarijs fierent, si Excentricitates assumerentur in puncto superficiali Solis f , & in puncto australi peripheriæ Solis α .

COROLLARIUM I.

Absurda quæ ex aliorum arbitrijs figmentis in Motus Phænomeni solari inuehiuntur.

Ex his colligitur primò. Si excentricitas ad semidiametrum Solarem assumpta, tantam itinerum variationem parit, quid non efficeret, vnus, duo aut plures gradus?

Secundò. Si sola excentricitas tantas anomalias suscitaret, quid non efficient additi Epicycli?

Tertiò. Adhuc magis absorta consequentur, si hæ sphaeræ ita assumantur, vt Solem secant; dabitur enim non tantum monstruosa motuum anomalia Phænomeno contraria, sed etiam penetratio corporum, veræ philosophiæ repugnans, tandem Maculæ & Faculæ ante occasum Astronomicè occident, & post ortum, astronomice consurgunt, in medio & ex medio Sole, quæ omnia portentosa & falsa sunt.

Quartò. Ne quis autem putet, ista solum euenire in sphaera tanta, nouerit ea-

II.

dem absurda proportionaliter euentura, in sphaera etiam quacumq. minore, Solem sensibiliter excedente. posui autem tantam, vt res ad oculum pateret.

COROLLARIUM II.

Eadem Motuum irregularitates, & multo magis introducerentur in Macularum itinera curuilinea. quibus representandis super sedemus, ingeniosus harum rerum amator, inueniet sponte sua, quod dico verum esse: id tamen, quod hic innuo, sæpe exhibebitur & probabitur alibi, sed argumentis alijs atque alijs.

In Motibus Macularum curuilineis, eadem, & maiora absurda reperiuntur, ex datis falsis hypothesebus.

COROLLARIUM III.

Hinc rursus concluditur, exclusis Sphaeris Soli circumiectis, ipsum esse commune Motus Macularum principium & subiectum.

Sol ipse est commune Motus Macularum principium & subiectum.

PRONVNCIATVM NONVM.

Itinera Macularum omnia, ad sensum rectilinea, paullatim abeunt in curuilinea, ita vt ex rectitudine brumali sensim intumescant versus Aquilonem augescente curuitate continenter per tres menses, Decembrem, Ianuarium, Februarium; inde per tres alios eodem modo menses, Martium videlicet, Aprilem & Maium, vsq. ad initium Iunij, prædicta curuitas decrescit, inq. rectitudinem æstiualem sese recipiunt Macularum vestigia itineraria.

CAP. XVI.

HOC pronunciatum constat è toto libro priore, & allatis nec non elaboratis tot observationum Imaginibus, proprijs & alienis. Vbi notandæ sunt sequentes proprietates.

Prima. Omnes Macularum Cursus à Decembri ad finem Maij sunt Curuilinei, sed curuitas ab initio Decembris ad medium illius, & à medio Maij ad finem illius, non est sensibilis, vt moram cursum, cæteris paribus, integrorum, vel angulos, quos chordæ cursibus subtensæ cum Ecliptica comprehendunt, sensibiliter inæquales efficiant.

Tametsi

I.

Semestris Motus Macularum curuitas & eius proprietates à Decembri ad Maium. Tametsi non ignorem, axem mobilem hoc rectilinei Motus tempore, propter ascensum aut descensum in circello polari, quasi rectum, Macularum itinera à rectitudine satis auocare; cur autem neq. hoc in obseruationibus Telioscopicis statim aduertatur, inter alias, præcipua causa solet esse, negotium Refractionis, quam lentes cauissant. vt inferius dicitur ex instituto, tempore autem intermedio, est notabilissima, hæc curuitatis variatio, præsertim si cursus integri habeantur, ab horizonte ortiuo ad occiduum extensi.

Secunda. Omnes isti cursûs, dicto semestri confecti, sunt conuexi versus boream, concaui versus austrum.

Tertia. Ad summam conuexitatem, peruenitur intra spatium trium mensium, quæ fit circa diem octauum Martij, plus minus. Ita pronuncio ex obseruariis.

Quarta. Inclinationem quam paralleli Macularum summæ huius conuexitatis tempore ad planum, Eclipticæ retinent, seu quod ex iisdem fontibus emanat, eleuationem poli mobilis super planum horizontis maximam, semper inueni ad sensum æqualem, maximæ Macularum ab Ecliptica declinationi, in parallalo maximo mensurata.

Quinta. Quando Maculæ summam conuexitatem obtinent, tunc ortus illarum & occasus ab Ecliptica æqualiter ad sensum vtrinq. distare inuenitur, ideoq. chordæ quæ punctum ortus cum puncto occasus necunt, vel æquidistant, vel congruunt Eclipticæ; & ob hanc causam voco hunc Cursuum statum Aequilibrium vernum, quia ortus & occasus Macularum Eclipticam æque respicit, & tendentia Macularum itineraria in medio quodammodo consistit, & chorda duo puncta quæuis itineraria à centro circuli obseruatorij æque remota, connectens, Eclipticam ordinariè non secatur, saltem ad sensum, id quod ad meum propositum satis est.

Sexta. Macularum seu cursuum quos efficiunt, tendentia penes duo solet spectari, nimirum vel ex ipso vestigio itinerario, quod per ordinatas stationum obseruationes necendo, lineas habetur; vel ex chorda, quæ per puncta duo itine-

II.

1 raria à centro æque distata, traducitur.

Quamdiu igitur Maculæ alicuius iter curuilineum ita affectum est, vt ortus, & occasus ab Eclipticæ polis inæqualiter distent, tunc & Macularum tendentia inde cognoscetur & denominabitur; in proposito ergo nostro, quandoquidem cuiuslibet Maculæ punctum orientale, Eclipticæ polo austrino vicinius hæret, quam occidentale, à Mense Decembri ad Martium vsq. vel; (quod eodem recidit;) quandoquidem cuiuslibet Maculæ ortus est remotior à polo Eclipticæ boreo, quàm occasus; voco ego Macularum huius trimestris tendentiam obliquam, ab oriente australi; versus occidentem boreum.

Sic etiam, quoniam chorda per punctum ortus & occasus, Maculæ cuiuslibet, vel per duo puncta itineraria dicto modo ducta, ad Eclipticam est obliqua, & per eam ex ortu australi in occasum aquilonarem transit; quamdiu hoc fit, tamdiu Macularum tendentia dicitur ex Austro in Boream.

25 Septima. Postquam vero Maculæ cursu suo Aequilibrium vernum assecutæ sunt, in eodem ad sensum nō diu hærent, quod ad declinationem, & punctorum ortiuorum atq. occiduorum mutationem spectat; nam curuitatem sensibilibus eandem diu retinent; sicut in itinere rectilineo, in quo multos dies absq. notabili saltem declinationis & locorum orientalium atque occidentalium, variatione perstant, imo neq. à sensibili rectitudine tam cito deciscunt; at vero Aequilibrij sunt impatientissimæ, ab eoq. intra diei spatium sese, quantum ego hætenus animaduertere potui, eijciunt; & exinde iter suum continuo ex oriente Aquilonari in Austrum, dirigunt, ab octauo quodammodo Martij die, per menses tres ad octauum circiter Iunij, eodem prorsus modo à curuitate in rectitudinem æstiuam decrecentes, quo contorquebantur à rectitudine brumali in curuitatem vernam. Quæ augmenta & decrementa non æqualibus sed inæqualibus at regularibus & proportionalibus ad sensum interuallis & temporibus fiunt. Itaque sub vniufmodi arcuum ad plagas, & polos eosdem situ & habitudine, dum videlicet, omnes cursus sunt conuexi in boream, concaui in austrum, duas tendentias subcontrarias instituunt, vnam

Tendentia Motuum ab oriente Australi, versus occidentem borealem.

Macula in Aequilibrio sine mora sunt.

Tempore Aequilibrij Macularum tendentia mutatur.

Motuum Tendentie subcontraria.

I.

Aequilibrium est diuersarum tendentiarum communis terminus.

ex Austro in boream trimestrem, alteram ex Arcto in austrum itidem trimestrem, priori similem & æqualem cæteris paribus, & si homologa homologis comparentur. Aequilibrium igitur est duarum istarum directionum confinium, & medius communis terminus.

Octaua. Maculae eodem tempore & loco Solis constitutæ, secundum diuersas tendentias non feruntur, sed vnā omnes sequuntur. dixi in eodem loco, quia si aliæ versentur in ortu, aliæ circa occasum, in diuersas tendentias possunt & solent incidere.

Nona. Arcuati Macularum cursus eodem tempore sub diuersis parallelis confecti, habent curuitates apparentes differentes, & minores, qui sunt magis boreales, maiores qui amplius Australes sunt. constant hæc ex obseruatis. Vera sunt hæc à Decembri ad Maium, Hinc ad Decembrem, contraria fiunt.

Decima. Curuilinea Macularum itinera, apparentia eodem tempore in diuersis parallelis descripta, sunt inæqualia, & minora ad suos circulos proportionallyter quo magis borealia, maiora quo magis existunt australia. dixi proportionallyter, nimirum si considerentur in ordine ad suos quæque circulos comparata: nam etiam si arcus aliquis itinerarius in parallelo maximè australi descriptus possit esse minor alio, versus boream amplius exporrecto; nihilominus tamen hic semper est maior circuli sui portio, quam ille sui. Constat horum veritas ex obseruatis.

Vndecima. Arcuum itinerariorum apparentia segmenta tota ab ortu in occasum pertingentia, eodem tempore in parallelis diuersis descripta, australiora sunt, sunt borealibus maiora, quam vt iidem existant similia. Hæc res alia probatione non eget, quam obseruatorum cursum examine & collatione: vel si mauis, propria sed accurata obseruatione.

Duodecima. Arcuum itinerariorum segmenta curuilinea tota à Maculis eodem tempore super parallelas æquales hoc semestri austrino descripta, sunt inæqualia, & maiora austrina, minora septentrionalia, nec tamen inter se similia. Patet ex assidua & longæua obseruandi praxi, & diligenti obseruatorum exami-

II.

ne. Idem tempus, sumo moraliter, hoc loco, non Mathematicè, ita vt duo cursus habeant commune, plus quam dimidium temporis in horizonte Solis insumpti.

Decimatertia. Arcus curuilinei à Maculis simul in diuersis parallelis decursi, ordinariè absoluuntur temporibus inæqualibus, & maiore quidem, qui sunt australiores, minore qui borealiores. Contraria deinde fiunt in semestri boreali, seu æstiuo. Vno verbo, vt arcus ad arcus, ita se plerumque habent inter sese illorum moræ & durationes. dixi ordinariè, & plerumque; quia multæ etiam Maculae, nouiter exortæ, cursus suos amplius accelerant, quam vt intra ordinarias moras referri queant, tamen si velocitates regulares & non disproportionatas subeant. Obseruata probant quæ dixi.

Decimaquarta. Curuitates arcuum à Maculis in eodem parallelo annuè tempore simili descriptorum, sunt ad sensum similes, & æquales. patet ab experientia ex obseruatis, si cætera sumantur paria.

Decimaquinta. Arcuum à Maculis, quæ parallelas æquales insident, eodem tempore descriptorum curuitates, sunt inæquales, maiores australium, minores borealium. Patet ex obseruatis. Semper intellego semestrem hyemale: nam in æstiuo similia in contrarium accidunt.

Decimasexta. Omnium Macularum australiorum arcus itinerarij eodem tempore descripti, fiunt magis curui, quam borealium. Patet ex obseruatis.

Decimasextima. Omnium Macularum itinera curuilinea, ab ortu in occasum expansa, sapiunt curuitatem Ellipticam. Circularem certè nunquam exhibent. Est autem ea gyralis, ex annuo, & 26. aut 27. dierum motu ordinariè conflata. Patet ex obseruatis apte dispositis, aut si mihi non credis, ex tuis rite obseruandis, & disponendis.

Decima octaua. Macularum quarumcunque in vno eodemque parallelo per hoc semestrem successiuè tempore notabili delatarum, cursus sese semper secant, in plano horizontis solaris, constat ex obseruatis. Annui tamen coincidunt.

Decimanona. Maculae cuiuscunque reducis cursus apparens, priorem apparentem

I.

parentem fecat . Patet ex obseruatis .

Vigesima . Macularum quarumcunq. cursus in parallelis quibusuis delatarum , si tempore diuerso fiant , intra spatium semestris , nunquam fiunt inter se , paralleli . Experientia quotidiana .

Vigesima prima . Macularum quarumcunq. cursus in parallelis quibuslibet tempore eodem delatarum , aliquando inter sese sunt paralleli , aliquando à sese digrediuntur , sæpe etiam congressum affectant . Experientia .

Vigesima secunda . Multi Macularum arcus itinerarij sunt toti borei ; multi toti austrini , multi austroborei , multi boreoaustrini , multi ex austro in boream , & hinc rursus in austrum flectunt , & qui eiusmodi sunt , Eclipticam bis secant , reliqui tantum semel .

Vigesima tertia . Omnes Maculae huius semestris australes faciunt ordinarias in Sole moras longiores rectilineis ; eisdem breuiiores , boreales . Dixi ordinarias , ob euentum quandoque contrarium . Experientia in obseruationibus obuia .

Vigesima quarta . Tametsi omnes Maculae circa horizontes tardius , in medio Solis velocius moueantur , ea tamen quæ itinere curuilineo incedunt , rectilineis tardius mouentur apud horizontem , celerius in culminationibus . Veritas huius apparitionis ex obseruationibus constat .

Vigesima quinta . Inter ipsos motus curuilineos maior circa horizontem tarditas animaduertitur in Maculis australibus , minor in borealibus eodem tempore , cæteris paribus . circa medium vero , maior celeritas in borealibus quam australibus , vt plurimum : res ex obseruationibus certa .

Vigesima sexta . Summa Macularum circa horizontem tarditas in hoc Semestri reperitur in australissimis tempore Aequilibrij ; summa celeritas , & quidem omnium , tempore incessus rectilinei . Sunt hæc omnia ex obseruatis manifesta .

Vigesima septima . Interualla Macularum omnium diurna , inter duo puncta stationaria seu obseruatoria sita , eiusdem cursus , circa medium sunt semper maxima , ad horizontem semper minima , cæteris paribus : hinc ascendendo versus medium semper regularissimè ad sensum & proportionaliter crescunt , à medio

II.

1 vero descendendo eadem regularitate , & proportionalitate decrescunt . Aliter hæc veritas non probatur , quam obseruandi praxi assidua & certa , prout ex toto libro priore constat .

5 Vigesima octaua , Macularum in eodem parallelo delatarum , motus curuilinei interualla diurna sunt breuiora , quam rectilinei . Suppono autem , ex eodem parallelo tam rectilineos ad sensum , qua curuilineos motus describi , suis temporibus , id quod ex phænomeno certissimum est . Patet autem hæc asserio ex obseruatis .

15 Vigesima nona , Maculae in parallelis maximis delatæ , faciunt cæteris paribus , spatia diurna ampliora , ijs quæ circumferuntur in parallelis minoribus , itaque Maculae borealissimæ , vel australissimæ minima diurna spatia explent .

20 Trigesima . Diurna Macularum in eodem parallelo delatarum spatia , sensim mutantur , in longiora motu rectiore , in breuiora motu curuiore , breuissima fiunt motu sub æquilibrio curuissimo , sub statione brumali recta longissima , &c . Constant hæc ex obseruatis .

30 Trigesima prima . Plurimas intercapedines Macularum diurnas præbent cursus curuilinei qui describuntur à parallelis australibus minimis ; paucissimas qui fiunt secundum minimos boreales ; qui vero fiunt in parallelis maximis , medio modo sese habent .

Trigesima secunda . Tempore motus rectilinei , Quæ Maculae simul oriuntur , simul fere occumbunt . Claret ex obseruandi praxi .

40 Trigesima tertia . Tempore Motus notabiliter curuilinei , quæ simul oriuntur , vix vnquam simul occidunt . Quæ simul occidunt , rarissimè simul fuerunt exortæ .

45 Trigesima quarta . Fit nonnunquam , vt quæ post aliam oritur , ante eandem quoque occidat .

Habetur
ex
obserua-
tis.

QVAE POSSINT COLLIGI EX
enarratis Motus Macularum
proprietatibus.

CAP. XVII.

EX hisce modo enarratis Motus Macularum proprietatibus, iam tū ab initio animaduersi huius Phænomeni, sese turmatim ingerentibus coepi statim aciem mentis erigere, & quod res erat, motum aliquem mixtum sed ad sensum regularem & ordinatum, subodorari, præsertim quando an. 1612. eas mense Iunio, ad motum rectilineum, ex curuilineo redire primum comperi, atque ex hoc rursus in curuilineum abire paullatim expertus fui, idque per annos insequentes stabili experimento semper didici: ita ut Motus à Decembri ad Maium, motui à Iunio ad Decembrem situ contrario similis, & tempore æqualis fieret: & tum demum in orbem rediretur.

Itaque ipse curuilineus Macularum incessus arguebat ex ea parte in quam concavitas respiciebat, polum aliquem atque axem communem supra planum Solis eleuari, circa quem Maculae gyros suos describerent, præsertim cum omnes communi quadam ratione volui viderem. Amplius autem in hac sententia firmatus sum, quando ipsam Macularum progressionem vna cum itinerum flexibus concordī quadam & regulari, ut ita dicam difformitate situ & figura mutari sentiebam, ita ut à declinatione austrina, sensim in borealem conuerterentur, & ex hac rursus in austrinam, & sic anno quouis bis rectilineos, ad sensum, & quod interest vtrique curuilineas semitas, sed situ contrarias protererent; qua ex re mecum statui, subesse oportere huic tam regulari tam uniformi motui axem quendam, & polos communes, in quibus & circa quem conuersio talis efficeretur.

Coeterum motu Macularum rectilineo tendente ex austro in boream, necessario axis circa quem motus eiusmodi describeretur, iacebat in circulo Solis ad motum illum, & parallelum, in quo circumlata Macula, ipsum designabat, perpendicularis; & motu illo rectilineo

1 tendente, ex Aquilone in austrum, necessario axis illius motus iacebat extensus ab austro in Aquilonem, ipsi motui ad angulos rectos constitutus. Et hæc
5 quidem erant rudimenta atque incunabula prima, axeos poli atque circelli annui constituendi: in quæ ab ipso Phænomeno manucebar, & quasi inuitus traher, formidans ne deceptio aliqua subesset, qua ego in fraudem inductus, alijs
10 imponerem; itaque factum est, ut in Circelli ratione determinanda cunctarer utpote à quo totius Phænomeni plena cognitio esset haurienda: quod cum fieri non posset absque multis, assiduis, diuturnis & probatissimis observationibus, semper ad vltiora me in meo Appelle cautus reieci: nihilominus tamen, cum obseruata etiam obiter lustrarem,
20 & motum apparentium condiciones exactius aliquanto pensitarem, Axem polosque communes super quos Maculae in suis parallelis conuerterentur, necessario semper inueniebam.

25 Ex eo enim, quod cursus rectilineos simul & similiter, ad sensum peractos, omnes eiusdem moræ ordinariæ, & spatia diurna inter se proportionalia comperi; haud malè conclusi, axem Macularum per centrum Solis transire.

30 Ex eo vero, quod Maculae in medio celerrime, sed versus extrema semper tardius, idque cum debita proportionē ferrentur, item quod spatia diurna in medio maxima, circa extrema minima, inter hæc medio modo apparerent, idque regularissimè ad sensum, & quod Maculae omnes ab ortu in occasum tenderent, nullæ vicissim; statui motum
40 hunc circa Solem necessario fieri.

Ex eo, quod motus iste à recto in curuilineum sensim abiret, idque summa cum proportionē augmenti per tres menses, & decrementi similis per tres, deinceps donec curuilineus in rectilineum restitueretur; collegi axem istum esse mobilem, & altera sui medietate tantum eleuari supra planum Solis, quantum Macularum cursus versus alterum polum & axem incuruarentur. id
50 quod examinabam per chordas cursuum perfectorum extrema puncta necentes, hæ enim chordæ, repræsentant aliquatenus communem paralleli à Macula inflexi cum circulo seu horizonte Solari
55 sectio.

Motus mixtus ex reciproca itinerum curuitate collectus.

Apparens Motus Macularum curuitas difformiter uniformis est.

Polorum Mobilium, & Circellorum ab ipsis descriptorum Incunabula

Axis Macularum per centrum Solis transit.

Motus Macularum circa Solem unde primo conclusus

Axis, & poli mobiles, unde?

I.

sectionem, ad quam sectio plani per axem mobilem ad circulum Solis recti, est recta: & in hanc ipsam eleuatus semper projicitur axis.

Patens & latens axis Medietas

Ex eo, quod Macularum cursus altero semestri prioribus contrarios & oppositos flexus, per omnia tamen similes & proportionatos efficiunt (vt mox ostendetur) manifestum est, axis medietatem australem esse depressam infra horizontem, altera medietate boreali supra eundem eleuata.

Ex eo autem quod communes parallelorum cum horizonte Solari sectiones (quas chordæ per extrema cursuum perfectorum ductæ vtcunque patefaciunt) ex parte orientis ascendant ab australi versus polum boreum, ex parte occidentis ab aquilonari polo versus meridianum descendunt, in quacunque tandem existant plaga Maculæ cum suis cursibus, idque per sex continuos menses, & tertio quidem mense Macularum cursus in Aequilibrio consistunt, & chordæ illorum cum Ecliptica, si sunt Maximi congruunt, si non maximi omnes plerunque paralleli existunt, cæteris paribus; collegi primo axem circa quem isti motus fiunt, ab occasu in ortum ferri, contra Macularum tendentiam propriam ordinariam; alioquin, eiusdem paralleli communis cum arcu horizontali in ortu sectio non ascenderet versus polum arcticum, in occasu non descenderet tantumdem versus austrum. Collegi secundo post trimestrem ascensionem culminare, ex eo, quod arcus itinerarij essent tum summè curui, & chordæ illorum ad Eclipticam non inclinatæ seu oblique.

Collegi tertio, eundem axem reliquis tribus mensibus iterum descendere in suo semicirculo vsque ad Horizontem, atque inibi rectilineum Macularum cursum constituere. Qui Motus rectilineus cum sensim etiam post aliquot dies (vt nunc videbimus) versus polum Australem intumescere, & versus borealem excuari sit animaduersus, &c. conieci eadem ratione, polum Septentrionalem vna cum medietate axis attolli, & oppositam australem portionem deprimi, qua notaueram ante, eleuatam fuisse Australem, depressam borealem. Et hæc alterna medietatum axeos cum suis po-

Poli, & axis patens Motus ab occasu in ortum, unde?

Poli, & axis australis patens, ascensio, summa exaltatio, descensio, unde?

Poli & axis borealis patens, ascensio, summa eleuatio, & descensio, unde?

II.

lis ascensio atque descensio, in Macularum motum omnem istam varietatem vtique infert, vti consideranti atque experienti clarissimè patebit. Inde enim omnis varietas in motu vti promanat, ita euidentissima ratione illico declaratur. Non obstantibus, quod aliquæ nonnunquam anomalix nihilominus, sed minute, ex alteratione naturali notentur, de quibus alias.

Nam quod Maculæ diutius apud horizontem immorentur, in motu curuilineo, quam rectilineo, facit inclinatio parallelorum, ad Eclipticam; quod inæquales cursus, inæqualibus temporibus describantur, ex eadem causa prouenit; neque inæqualis interuallorum diurnorum aspectus, aliunde originem trahit: & sexcenta alia, suis locis posita vel ponenda, ex hoc vnico Systemate originem trahentia, dicto citius soluentur.

Axis itaque cum suis polis Mobilis, & Motus annui, ab occasu in ortum, circellorumque polarium, inuentio generalis & rudis descriptio talis esto: interim tamen quanti isti circelli sint, & circa quos polos axesque describantur ex hisce nondum innotuit; & hoc opus, hic labor.

Axem vero cum suis polis Mobilem, breuitatis ergo, vocabimus axem Macularum, axem Mobilem, axem Parallelorum, est enim ad illos rectus, Axem Motus proprii. Eodem modo appellabimus polos huius axis, Macularum, Mobiles, Parallelorum, Motus proprii.

Axem vero, circa quam circellus Polarum describitur, qualiscunque tandem is sit, vocabimus Axem fixum, stabilem, Axem Motus annui, Axem Motus communis. Axem obliquum, respectu parallelorum in quibus Maculæ deferuntur.

Circellos à polis mobilibus descriptos, dicemus Polares; stables; annuos; Motus communis; Obliquos, respectu Parallelorum Mobilium.

Parallelos ipsos in quibus Maculæ deferuntur, nominamus parallelos Mobiles; Parallelos Macularum; Parallelos Motus proprii. quos deinde in Australes, & boreales subdiuidimus, cis & trans parallelum maximum.

Et hæc quidem non ex hypothesi arbitraria aut conueniente à nobis excogitata

Polorum & axis mobilitas, causat omnem Phenomena in motu varietatem.

Quod si in motu curuilineo, quam rectilineo, facit inclinatio parallelorum, ad Eclipticam; quod inæquales cursus, inæqualibus temporibus describantur, ex eadem causa prouenit; neque inæqualis interuallorum diurnorum aspectus, aliunde originem trahit: & sexcenta alia, suis locis posita vel ponenda, ex hoc vnico Systemate originem trahentia, dicto citius soluentur.

Synonima Axis & Polorum.

Appellationes Axis, & polorum fixorum.

Circelli Polares.

Parallelorum Nomina.

gitata supponimus, sed tanquam res veras ab ipso Phænomeno nobis obseruato patefactas, & ratione euidente ex effectu præcognito deductas afferimus, & quorum causas prius ignorabamus, ex hisce erutis manifestas facimus.

COROLLARIUM.

Orbes subsolares planetarj, ad hoc Phænomenon inepti.

Ex hisce bene perpensis rursus euidēs est, Maculas, non posse esse vllas cæli vllius planetarij subsolaris partes, etiam si orbes illi fictitij supponerentur esse; aut in illis orbibus nescio quem orbem aliū fictitium imaginemur. Nam Maculae circumeunt Solem, exclusā est ergo ab ab hoc Phænomeno Luna, cum omnium cælorum suorum, ab hominibus excogitato apparatu. Venus, & Mercurius Phænomenon hoc non creant suis Epicyclis, si qui sunt, in Excentricis quibus Solem coronant: quia illi toti sunt extra Solem, gremioque suo illum non complectuntur, & multo reuolutionis suæ tempore, versantur supra Solem; igitur tunc ex hoc Phænomeno nihil appareret in Sole; quod est falsum: cum Sol ab eo nunquam vacet præsertim si loquamur etiam de Maculis & Faculis secundarijs.

Excentricus autem huius Planetæ, Solem ambiens, quem alij Epicyclum nominant, istas Macularum, circa Motum statas vicissitudines, nequaquam, subit igitur ex his quoque præter dicta superius ab hoc Phænomeno penitus exulat Venus, cum omnibus suis palatijs, vetustate nunc collapsis.

Neque Mercurius, sibi ex eo, quidquam surripiet, etiam si supponamus, duos ipsius orbes Augē Excentrici deferentes, ab ortu in occasum moueri 365. diebus, idque circa Solem, quid tum? Quis non videt Maculas in Sole ab illo depingendas longe alio ciendas motu, quam nunc apparet? absoluunt enim Maculae suum cursum intra 26. aut 27. dies, plus minus, vt visum; Reliqui omnes, ambulant ab occasu in ortum, & hoc ipso Maculas non circumducunt. Igitur & Mercurius totus ab hoc Phænomeno reiectus esto.

Quod amplius confirmatur ex eo, Quia orbes istorum duorum Planetarum, Veneris inquam, & Mercurii, istas Macularum statas certis temporibus in

cundo deuiationes, ambages, rectitudines, flexus, curuitates; cursuum velocitates circa medium, moras in extremis oris, non facerent. Neque enim talis motus inest vlli istorum Planetarum, orbi. Igitur simpliciter loquendo impossibile est, vt hæ Maculae in Sole oriantur, ex vlla eiusmodi orbis inter nos & Solem interpositione. Accedit propria cuiusque Maculae in omnem loci differentiam dilatatio; marginalis deinde contractio, & similia multa: quæ sine orbium physica dilaceratione nequaquam consisterent. Quamobrem cum hæc ita sese habeant, cum Maculae solares nec in Aëre nubes, nec in Lunari aut Veneris, Mercurijue regionibus spirabilibus sint vllæ densiores rarioresue illius auræ particulae; restat, vt animum suum alio inducant, quicunque hactenus hisce imaginationibus inuoluti, ea quæ fieri non poterant, pro persuasis habebant. Sed nunc exorsi telam pertexamus.

PRONVNCIATVM DECIMVM.

Macularum omnium itinera, circa aut paullo post initium Iunii rectilinea, paulatim inflectuntur in curuilinea magis magisque arcuata, donec paullo post initium Septembris in Austrum maximè conuexa, & in Aequilibrio constituta fuerint, ex quo rursus per tres menses, scilicet Septembrem, Octobrem Nouembrem ad initium Decembris, pedetentim decrescunt, & sese in rectitudinem annuam referunt. Sunt autem curuitates istæ, cæteris paribus, huius semestris æstiuo autumnalis, alterius Hybernouemalis in modo crescendi & decrescendi itemque figura similes, & quantitate necnon duratione æquales; situ tamen oppositæ: conuexitas enim arcuum itinerariorum semper vergit in Austrum, concauitas semper in boream; & reliqua omnia priore Semestri ostensa, fiunt hic etiam, sed situ contrario.

CAP. XVIII.

QVAE hic dico, alia probatione non indigent, quam oculis Lectoris, manu Scriptoris, & praxi Obseruatoris.

Lustra

Probatum
Pronunciatum
ex Obseruatis.

I.

Lustra totum librum priorem, considera omnes, & singulas observationum. Imagines à Iunio ad Decembrem, arbitrare vltimarum industriarum cursus semestribus interuallis disiunctos & inter sese collatos, atque sub vnum aspectum propositos, ab Observationū imag. Lxv. pag. 321. ad Lxx. & videbis Pronunciati veritatem per singulos menses sibi constantem. Lege notas ibidem singulares, percurrere ea quæ hic mox subiungam; & si placet, appone manum ad Aratrum, observa, digere, confer, & inuenies meis gemina, senties paria, loqueris & scribes similia.

Observationum Imagines pro Motu rectilino.

Maculas igitur circa finem Maij, & initium Iunij quotannis facere motus ad sensum rectilineos, Habes ex Observationum Imag. xxv. p. 215. an. 1625. in cursu Romano Maculæ a, & h; item ex observationū Imag. xxvi. p. 217. in Cursibus Ingolstadianis Tabellæ 7. Maculæ b, quæ eadem est cum Romana a, & Tabellæ 8. Maculæ a, quæ in cursu Romano fuit h, quos cursus repetitos habes in Appēdice ad Imag. xxvi. pag. 223. Tabella 8. à die 1. ad 9. Iunij, sub littera b, & vltima tabella, à die 6. ad 17. Iunij, sub littera d, vt videas, meum in hisce pertractandis candorem, & similem sibi semper veritatis tenorem.

Astina hisce reperies in Imag. xxvii. p. 229. Tabella Iunij, ad Cursus Macularum a, & b, Friburgi Brisgoiæ obseruatarum, anno 1622.

Maium, & Iunium anno 1626. eodem modo, quo fuerat anno 1625. rectilineum inuenies. Imagine Observationum Lxiv. p. 315. in cursibus Macularum ibidem expressis.

Eisdem Menses itidem ad sensum rectilineos habes Imag. Lxx. p. 341. ad an. 1627. vbi simul est cernere cursum, licet non integrum, defectu Maculæ, Nouembris rectilineum illi subalternū, anni 1626. sex mensibus distantem, æqualiter ad Eclipticam AB inclinatum, secundum lineas KL, & EF, vel illis parallelas OB, & IB, quæ comprehendunt cum Ecliptica AB, angulos æquales ABO, & ABI, quibus etiam aliorum annorum anguli ad sensum æquales fiunt. Hos autem angulos non mensurant arcus AI vel AO, sed arcus ex angulis B, ad inter-

Arcus qui angulos rectilineos mensurant, quos itinera recta cum Ecliptica comprehendunt.

II.

1 uallum semidiametri Solaris circuli BP, descripti. Consule citatas, & alias Imagines.

Hanc rectilinei motus apparentiam, ideo tam fuscæ, & solidè stabilio, quia ex illa Circellus polaris vterque & eius quantitas non minus eruitur, quam ex motu curuilineo; Si enim Macula b, in cursu KL, ex K versus L, progrediendo vestigium ad sensum rectilineum post se reliquit, idque ab Ecliptica AB, summe declinauit, & axis circa quem parallelus KL, volutus est, MN, in plano solaris circuli sensibilibiter iacuit, vel certe sectio plani per ipsum, & axem coni solaris traducti, sedem perceptibiliter non mutauit, patet, eundem axem tantum abesse ab axe fixo Eclipticæ, CD, quantum ab Ecliptica intelligitur abesse, linea quæ sit parallela ipsi KL, per centrum P, obseruatorij circuli ducta; eodem modo axis GH, ad rectam EF rectus, tantum ab axe CD, discedet quantum ipsi IB, parallela per centrum P, transiens, abit ab Ecliptica AB; cumque cursus isti rectilinei insumma ab Ecliptica declinatione sciatur esse, ex obseruationibus, & rationibus inde deductis; (post hac enim chordarum ad Eclipticam accessus fit, vt mox ostendam,) clarum est, etiam axium mobilium MN, & GH, maiorem ab axe fixo CD, diuarcationem contingere non posse, sed similem accessum opticum fieri oportere cuiusmodi fit chordarum ad Eclipticam, id quod patet in Imag. Lxv. p. 321. in qua exhibitū cursum habes Maculæ a, eumque versus polum austrinum D, iam aliquātulum recuruum, cuius chordam FG, ex parallela ipsi KB, & angulo KBA, vides nonnihil inclinatiorem ad Eclipticam AB, quam in priore figura fuerit recta OB; sic & proiectum axem huius cursus MN, polo & axi stabili CD, viciniorem cernis; cuius alteram medietatem ME, expressi linea integra, ad indicandum, ipsam supra horizontē in sublimi versari, tanto altitudinis arcu, quantus est is, qui curuitatem cursus FaG, mensurat. altera verò medietas EN, linea intercisā offertur, vt infra horizontem depressam & latentem intelligas. Eadem situ contrario videbis in chorda HI, Maculæ b, mense

Explicatio & applicatio quorundam ex Imagine LXX.

Ex itineribus rectilineis Circellipolares acquiruntur.

Ex Imaginibus Observationū probantur asserta.

Imaginis L XV. applicatio.

Vt chorda cursum ad Eclipticam, ita axis Mobilis projectio accedit ad axem fixum.

menſe Decembri, circa axem mobilem P O, conuolutæ. Scio iſtos axes & chordas in perpetua variatione verſari, ſed ad oftendendum debent fixa aſſumi, ſicut in parallelis ſolaribus ſolet fieri, quos Sol quotidie deſcribit; qui tamen verè paralleli non ſunt &c. ſimile fit hic.

Imaginis LXVI. applicatio. Iam in Imag. LXVI. p. 325. vt curſuū a, & b, chordas, F G, id eſt A K, L M, ſeu A P, ad Eclipticam A B, inclinatiores, ita axes mobiles proiecti H I, & N O, ad fixum C D, vicinioreſ cernes, angulis vtrouique, & vtrinque æqualibus inuentis.

Imaginis LXVII. Explicatio, & Applicatio. In Imag. LXVII. p. 329. habes oppoſitos menſes Auguſtum anni 1626. in eoque curſum Maculæ a, & Februarium anni 1627. & tres ipſius curſus, b, c, d; quorum aliqui nonnihil exorbitarunt, id quod Phænomeno huic, ſepiuſcule contingit; nihilominus tamen, appropinquatio chordarum G H, I K, L M, ſemper eſt facta, & eodem modo axium mobilium ad fixum acceſſio.

Imagines Aequilibrarum. Cæterum, vtrum eiſcemodi deuiationibus ſtatim ſint peculiareſ axes attribuen- di, an cauſæ aliæ ſubrogandæ, dicetur alibi: nihilominus vt extrauagans diuariatio notaretur, ſuum cui- libet axem appoſui. Interim axes P Q, & R S, curſibus F a G, & L d M, debiti, æquali ad axem fixum C D, paſſu accedunt: id quod ad propoſitum meum ſatis eſt.

Imaginis LXVIII. Explicatio, & Applicatio. Imago Obſeruat. LXVIII. p. 333. Exhibet Aequilibrium vtrumque, autumnale Macularum a, b, & c, intra Auguſtum & Septembrem, anni 1626. itemque oppoſitum vernale, Macularum d & e, ad 8. circiter Martij, anni 1627.

Vbi tamen nonnullam iterum Macularum b & c, eſt inter ſeſe animaduertere diſceſſionem. Interim curſus H c I, l e H, & F d G, omnino ſunt ad ſenſum perfectè æquilibres, & vnicum axem C D, reſpiciunt.

Motus Macularum ex ſeruat. & geometricè digeſtis adducto, reſtilineo in reſtilineum reuoluitur annue. Experimento igitur oculari, ex obſeruat. & geometricè digeſtis adducto, conſtat Maculas à motu reſtilineo ex fine Maij & initio Iunij propoſito, trium menſium decurſu, in ſummam curuitatem deduci, atque exinde rurfus aliorum trium menſium ſpatio, ab eodem in priſtinam & annuam reſtitutionem deuolui, quemadmodum libro priore,

1 ab Imag. xxxix. p. 253. ad LI. fuſſimè, & luculentimè oftendi, & ſi opus eſſet, vltèrius propagatis curſibus edocere poſſem: ſed ne vna cum Maculis circulari curriculo ex anno in annum circumacti eodem loco ſemper hæreamus, & ſine fine, ſine initio quaſſati, in ſtupidam mentis vertiginem acti videamur, & Lectorem ſola obſervationum multitudi-
5 ne velle obruere; puto hic obſervationes claudendas, & ſepoſito tantisper oculorum aſpectu, obtutum mentis in hoc præclarum Phænomenon acrius aliquanto deſigendum.

15 Etenim qui chordarum hiſce tribus menſibus; ex parte orientali regularem ab Aquilone in Auſtrum deſcenſum, qui earundem ſimilem in occaſu aſcenſum; qui ſimili proportionè curſuum au-
20 ſcentes curuitates conſiderat, illarumque menſuras, ſummis paralleli maximi de- clinationibus æqualeſ inuenit; qui eoſdem curſus ſubcontrariè oppoſitis ſe-
25 meſtribus ſimileſ & æqualeſ reperit, qui annuiſ temporibus eoſdem in parallelis iſdem modo Macularum & Facularum feraceſ ſint, redire comperit; iſ vna me-
30 cum, arbitror, axem & polos mobileſ: circa axem fixum Eclipticæ, libenter agnoſcet.

Sed quare, inquiet aliquis, & vnde ſcitur, circa axem Eclipticæ iſtos motus fieri?

35 Primò. Ex motibus reſtilineis duobus, ſemeſtri temporis interuallo diſſiſtis, qui vt oftendi, Eclipticam in medium recipiunt, vnde & axes mobileſ idem præſtare vtrinque debent circa axem ſtabilem Eclipticæ: quia axes mobileſ à
40 paralleli maximi diametro, itidem mobili, quæ declinationis maximæ menſura ſeu meta eſt, circuli quadrante ſemper diſtant.

Secundò. Ex Aequilibrijs & eorum ſummis arcuationibus, idem elicitur.

45 Nam cum regulareſ iſtæ curſuum ad ſenſum protuberationeſ non poſſint prouenire, niſi ex aliquo ad ſenſum regulari motu, eoque circa vnum aliquem axem peracto, huius autem motus ſumma curuitas apparens tum fiat, cum
50 eiſ diameter Eclipticæ vel congruit in parallelorum Maximo, vel parallela exiſtit, in parallelis non maximis, eiſ inſuper meſura, ſummæ declinationi ad ſen-

Obſervationibus pro- ducendis, tandem impo- nendus ſinit.

Cur Poli & axes mobileſ ex obſeruat. agnoſcendi?

Cur axis & poli Mobileſ circa axem Eclipticæ volui ſtatuantur.

I.

ferisum; æqualis reperiatur; amplius cum apices summi istarum curuitatum æqualiter à centro circuli obseruatorij, adeoque ab Ecliptica distent, & eandem in medium recipiant, sitibus arcuum oppositis, spatio quolibet semestri; sequitur omnino, motum hunc circa axem Eclipticæ ferri, eo quod is bis in anno tum culminet, quādo axis mobilis cum axe Eclipticæ optice congruit, geometricè autem, ad circulum Solis summe eleuatus, angulum inclinationis maximum faciat: & similiter, vt paullo ante dictum, bis etiam ab eodem axe fixo elongationes maximas faciat, in plaga orientali vnā, in occidua alterā, quarum tamen vtraque maxima poli mobilis eleuationi & depressioni æquetur.

Ad hæc igitur astruenda, cum ab ipso met Phænomeno manuducar, nec alia via commoda, & conueniens appareat; spero eruditum Lectorem, ex hisce apparentijs hæctenus productis, haud inuitum in hanc sententiam concessurum, & amplexturum, non tantum Motum Macularum propriam ab ortu in occasum, quem oculis videmus, confectum diebus sub Sole 14. 13. 12. & minus; verum etiam annuum, quem ratione ex curuitate, & tendentia admirabiliter ordinata aspicimus, ab occasu in ortum; & quem non vna obseruatio immediatè, sed multæ in vnum cursum digestæ; multique cursus per menstrua & annua spatia inter se collati, menti atque oculis representant: & illum quidem, proprium videlicet, circa axem & polos mobiles, hūc autem super axē Eclipticæ & polos eiusdem fixos confici. Nolim tamen cogites hosce duos Macularum motus separatos inibi reperiri, sed est vnus gyralis ex hisce duobus compositus, vt suo loco discutietur, in duos tamen simplices resoluitur. Et iste motus annuus axem, & polos motus proprii circumferens, omnem fere in Macularum cursus diuersitatem importat.

Fundamenta, opinor, motus annui, ex apparentibus Macularum itineribus, fuse & solide posita sunt; nunc vltius progrediamur, & particulares Macularum motus apparentes penitus introspeciamus.

II.

PRONVNCIATVM VNDECIMVM

Omnium Cursuum, quos Maculae describunt, interualla itineraria diurna, apparent circa horizontem maiora, circa medium minora quam vt sint regularia: supponendo, Maculas in superficie Solis regulariter ferri, vt hoc capite probabitur de rectilineis.

C A P. XIX.

Animaduersio, & elucidatio Pronunciati.

DIXI sæpe in prioribus, apparentem Macularum Motum esse regularem, quem in superficiem Solis physicam, vna cum Maculis capi inducere, & amplius introducam in sequentibus. Cui tamen doctrinæ, & ratio & experientia videtur contraire. Ratio quidem, ex assertis Pronunciatis, & ipsa Motus regularis natura deducta. Etenim ex Astronomorum determinatione, Motus Regularis is esse de-

finitur, qui equalibus temporibus, equalia spatia conficit, siue qui semper est uniformis, seu æque velox. Hoc autem Motui Macularum in prioribus Pronunciatis à nobis constituto, attribui nequit. Quia is, non simplex, sed è duobus componitur, annuo, & fere mēstruo; qui cum è plagis contrarijs, ad contrarias, prout rectè explicatum est, ferantur partes; intelligi nō potest; qua ratione regularitas & vniformitas, eo, qui ex ipsis componitur, conseruetur: singuli enim super diuersos polos atq. axes fiunt. Ad hanc subtilē obiectionem respōdeo, motus ipsos duos annuū Circellorum polariū & eum qui est proprius & fere mēstruus Maculae cuiusuis, omnino Regularissimos esse, præsertim si primum ipsius subiectum, qui est Sol, spectetur, & si singuli seorsim expendantur, æqualibus temporibus æqualia interualla decurrere; cum vero qui ex ipsis conflatur, sine dubio ex parte rei, aliquid difformitatis ad apparentiam saltem contrahere, id tamen, (prout hæctenus sedulo in-

quisui) in obseruatis ad sensum,

Ddd & re-

Quid sit Motus Regularis?

Obiectioni prima satisfi.

Duo Solis motus faciunt vnum mixtum.

I.
& rectè expositis, pro vno curriculo, non aduerti: quod accidit ideo.

Primò. Quia Circellus polaris, qui aliquid inæqualitatis in Motum proprium importat, est valde paruus.

Secundò. Quia vno integro anno tantum semel percurritur, dum itinera periodicæ Macularum circa Solem reuolutiones plus quam 13. absoluuntur.

Tertiò. Quia illa inæqualitas in singulos dies, eadem fermè proportionè, & differentia quasi insensibili dispensantur.

Quartò. Quia Macularum conuersiones describuntur in Regia Solis via, seu Zona torrida, in quam proinde Axes mobiles, mutationis parum inuehunt, præsertim si Maculæ secundum parallelos Maximo vicinos incedant. Parallelorum enim Maximus, nullam omnino secundum longitudinem in Motu Anomaliam sentit, sed temporibus æqualibus æqualia geometricè spatia peruadit, quia semper semicirculum infra, & alterum semicirculum supra horizontem habet. reliqui ad sensum: id quod ad meum propositum sufficit. Sed instabis, Motum annuum secundum latitudinem in Cursibus Macularum valde notabilem esse &c. respondeo, in Cursibus multis sentiri tandem diuersitatem; in vno autem cursu, diem cum die conferendo, non esse perceptibilem differentiam, eo, quod singulis spatijs diurnis æqualia quodammodo accedant ex annuo motu momenta. Imo quod in eadem annuè, & in similia puncta à quouis parallelo singulis semestribus redeatur, & idem parallelus suam conuersionem æquali semper tempore absoluat, &c. illa sunt, quæ regularitatem huius motus commendant.

Quintò. Definitio illa maxime regularitatem motus simplicis tangit: nam etiam motus compositi non ideo irregulares sunt, quia quasdam anomalias ingerunt, dummodo certis legibus & temporibus id faciant. &c.

*Altera
pro Irregularitate
obie-
ctio.*

Alterum Irregularitatis & quidem vehementer sensibilis argumentum producit, ex ipsis Macularum observationibus atq. inde digestis & ordinatis Cursibus, posito enim Maculas superficiem Solis perambulare, dato ipsas re-

gulariter moueri, videtur ex ipsis Cursibus contrarium eo ipso ostendi: imo ipsum præsens Pronunciatum XI. in terminis aliud nil enunciat, quam omnes Macularum cursus, si in Solem intrudantur Maculæ, apparere anomalos & inæquales. Vnde neq. Maculæ in Solem, neque ipsarum Motus videtur ponendus esse vlllo modo, etiam ad sensum, Regularis & ordinatus.

Respondeo, si Maculæ in Sole sunt, eas motum iri regulariter ad sensum, & si regulariter moueri censende sint, in Solem & non alio locandas; id quod ex antecedentibus & consequentibus, Motu illarum apparente supposito, clares fuerit & sit probandum. Ne vero vllum Veritati obstaculum, aut alicui scrupulus insuperabilis oboriatur, pono hoc Pronunciatum XI. & occasione illius omnes difficultates amolior, & assertas in prioribus veritates stabilio.

Huius autem pronunciati veritas immediate ex ipso Macularum apparente, motu ob oculos posito, elici vel discerni nō potest, nam visus stationum quidem diurnarum distantias videt, & alias alijs maiores aut minores distinguit, vtrū tamen debitam magnitudinum ad superficiem vel etiam Circulum Solis inter se proportionem habeant, oculus solo aspectu non videt, sed necessarium est, id examine quodam alio geometrico inuestigare. Nam supponendo Maculas in superficie Solis hæere, & motu circulari vniiformi circa axem per centrum solaris globi transeuntem circumduci, necessarium est vnamquamq. temporibus æqualibus, æqualia in suo circulo percurrere, intervalla, inæqualibus inæqualia; ita vt sicut tempore temporibus, ita intervalla intervallis mutua proportionum similitudine cor respondeant.

Deinde cum Sol sphericus esse ponatur, Macularum vestigia itineraria ad obtutum nostrum tanquam in plano conspecta considerantur, inq. circulum Solarem per lineas visuales perpendiculares proiecta; nam ob nimiam distantiam paruitatem, astronomi communiter assumunt radios perpendiculares. Et licet ex parte rei circulus Solis visualis, in quem Maculæ prouiciuntur, à rationali, qui Solem bifariam diuidit, magnitudi-

Responsio.

*Visus solus
ex Apparen-
te Macula-
rum Motu
in discum
solarem con-
gesto, regu-
laritatem
discernere
nequit.*

I.

adine differat, vti suo loco videbitur; discrepantia tamen ista tanta non est, vt sensibilem aliquam distinctionem inferat, quæ tractioni huic quidquam negotij faceat, vnde sensibilem & verum Solis Horizontem pro eodem sumo. Sensibilem autem Solis circulum præstat charta, & designatus in eadem circulus obseruatorius à Sole illustratus.

His intellectis, vt id quod dixi, innotescat, oportet Maculæ cuiuscunque expositum cursum accipere, & itinerarias singulorum dierum distantias inter sese conferre, tunc excessus & defectus in publicum prodibunt. Quomodo autem sint cursus Macularum concinnandi, docui in Libris prioribus &c.

*Examen
interuallo -
rum diurno
rum, ex Car
sibus Macu
larum recti
lineis.*

Aut igitur cursus Macularum sunt rectilinei, aut curuilinei. Si Cursus sunt rectilinei, facilis erit praxis. Nam ad interuallū semissis cursus, describitur ex puncto eiusdem medio semicirculus, in cuius perimetrum demittuntur perpendiculares, ex centrīs Maculæ per suas stationes notatæ; vbi enim eę lineę ipsum interfecuerint, illic diurna arcuum decursarum interualla, diem percurſa distinguunt, & eo modo, quo dicitur in Pronunciato, inæqualia, ad oculum ostendent.

Exemplum huius rei habes in Imagine LXX. Libro Tertio pag. 341. tam Maculæ a, mensis Nouembris, quam b, Maij & Iunij. Vbi in semicirculo E x F, secundum cursum Maculæ a, descripto, habes interualla diurna r f, f t, t u, u x, x y, y z; & quamuis arcus, x y, y z, sint decursi circa medium cursum, Macula nimirum culminante, & plus temporis habeant, quam arcus r f, vel f t; vt tabulam inspicienti patebit: nihilominus tamen arcus r f, vel f t, est maior quam arcus x y, vel y z: quod tamen fieri non deberet, Maculis in superficie Solis vni-formi & regulari motu decurrentibus, prout suppono, sed x y, vel y z, deberet esse maior, quam r f, f t. quia x y, ab hora 8 $\frac{7}{8}$. diei 27. Nouemb. consumpsit ad horam 9 $\frac{1}{8}$. diei 28. eiusdem mensis, horas 24. & semis. Arcus vero r f, insumpsit à die 23. ad 24. horas 24. & $\frac{1}{8}$: defecit ergo tempore ab arcu x y, $\frac{1}{8}$. id est, horę quarta parte & semis.

II.

1 Minori ergo tempore, debebat esse decursus arcus r f, minor; & tempore maiori, arcus x y, maior; eo quod sit, vt tempus ad tempus, ita arcus ad arcum: contrarium autem euenit, nam tempore maiori, absolutus est arcus x y, multo minor; & tempore minore, expletus est arcus multo maior r f. constat igitur ex obseruatione, si Maculę in Solis superficie ordinato motu circumferri ponantur, spatia diurna horizonti vicina, esse maiora medijs, &c.

10 Eadem & multo amplius reperies in semicirculo K i n L, Maculę b. Vbi Arcus vtrique vel c e, vel d f, in ortu; vel n o, & o p, ad occasum, erunt maiores atque i K, K l, l m, medijs. tametsi sculptoris incuria arcus o p, aliquanto sit factus minor, sicut e c, paullo maior æquo.

15 Sed his non obstantibus; nihilominus id quod in pronunciato dixi, egregie cernitur.

25 Quod autem hic, exempli causa ostendi, in Maculis duabus a, & b, id verum esse scias, in Maculis omnibus iter sensibiler rectilineum describentibus, anno & tempore quouis. Nam Macula a, pertinet ad Nouembrem anni 1626. Macula vero b, ad Maium & Iunium anni 1627. Et quod in hisce duobus, hoc ego annis præteritis omnibus expertus sum hoc alij vna mecum, licet non aduertentes; nam eadem insunt cursui rectilineo cuicunque, per Telioscopium recte obseruato. eadem deprehendent obseruatores seduli temporibus futuris. Nunc animum & stilum ad cursus arcuatos conuertamus,

40 & an eadem affectione sint præditi ex obseruatis inspiciamus.

45

50

55

*Inæqualitas
arcuum a-
quali tempo-
re decurso-
rum, exem-
plis præsti-
tis compro-
batur.*

*Omnes Ma-
cula itinera
rectilinea
describentes
eandem sem-
per præse-
ferunt inæ-
qualitatem.*



APPARENS IRREGVLARITAS
ostenditur etiam in Motibus
curuilineis.

CAP. XX.

IN cursu rectilineo, ostendi motum apparentium, tempore eodem à Maculis descriptorum inæqualitatem, per chordas & arcus inæquales abscissos à lineis parallelis, quas ex apparentibus Macularum locis emissi in peripheriam paralleli proprii, qui si extra centrum incedat, semper est minor circulo maximo: oportebat autem, si Maculæ in Solari superficie per suos parallelos motu regulari decurrissent, temporibus æqualibus & arcus, & arcubus subtensas chordas & quales intercipi; quod tamen apparenter non fieri, ostensum est modo. Idem nunc ostendemus, accidere in motibus curuilineis, sed vi aliquanto diuersiore: quia cum loca visa Macularum in Circulo obseruatorio seu solari, non cadant in chordam extrema cursus apparentis puncta nequentem, sed flexu quodam curuilineo ab ea deuiant; neq. possumus chordam illam pro diametro paralleli Macularum assumere, neq. parallelas vniformi quodam situ in peripheriam ignotam emittere, neq. peripheriam illam tam facili negotio describere. Igitur vt ex obseruatis & visis Macularum distantijs & progressibus diurnis, non visas in superficie Solis, sed visis correspondentes elicerem, procedendum fuit indagine quadam generaliori, & proposito meo accommodatori. Suppono autem sequentia.

Motuum
curuilineo-
rum Exa-
men aliud
exhiben-
dum.


Supponenda.

Primò. E quolibet sphaeræ puncto in superficie assignato, ad punctum aliud quodlibet in eadem assignatum, describi posse circulum in sphaera.

Secundò. Per duo quælibet puncta in sphaeræ superficie non secundum appositionem diametralem assumpta, describi posse in eadē sphaeræ superficie circulum maximum, & non maximos infinitos.

Tertiò. Rectam quæ puncta illa duo nequit, esse subtensam omnibus circulo- rum per puncta illa descriptibilium arcubus interiectis communem: siue sectio- nem omnibus circulis per puncta eadem designabilibus communem.

Duo quoque, quibus dicenda firmentur, addo Lemmata.



L E M M A I.

Plani pars quadam non est in subiecto plano, quadam vero in sublimi.

Sit enim, si fieri potest, plani ABCD, pars quidem BCEF, in sublimi, pars vero EFAD, in subiecto plano AH, ita vt omnes lineæ, FA, ED, &c. partis FD, iaceant in plano HA, partis vero BE, lineæ omnes FB, EC, &c. supra vel infra planum idem existant. quibus positis; cum pars FC, tota sit extra planum AH, erit etiam linea FB, vel EC, &c. extra: & cum pars FD, tota sit intra planum HA, in eodem erit etiam linea FA, vel ED, &c. Est autē linea tota AFB vna recta, & DEC, vna recta; iacet enim vtraq. in plano vno ABCD. Igitur rectæ lineæ AB &c. pars quadam est in subiecto plano, pars quadam in sublimi. quod fieri nequit, per 1. vndecimi. Non igitur plani pars quadam est in subiecto plano, quadam vero pars in sublimi. Id quod erat demonstrandum.

Explicatio

Demonstratio.

L E M M A II.

Due lineæ rectæ parallelæ, sunt in vno plano.

Sint duæ rectæ AB, CD, parallelæ; dico ambas esse in vno plano.

Iunctis enim AC, BC, DA, rectis lineis, triangulum ABC, erit in vno plano ABCE, per secundam vndecimi: in quo si recta CD, non sit, erit trianguli ACD, pars vna AGC, in subiecto pla-

I.

plano, A E, pars vero altera C G D, in sublimi, quod est absurdum per lemma præcedens. Igitur duæ rectæ lineæ parallele, sunt in vno plano. Quod erat demonstrandum.

PROBLEMA.

EX APPARENTE IN CIRCULO

Observatorio, duarum Macularum simul distantia, vel ex duobus unius Maculae, in eodem Circulo successivè visis, & rectè ordinatis locis, distantiam, vel loca assignare, quæ illis Maculis convenirent, si in superficie Solis fuissent constitutæ & motæ.

Modus inveniendi distantias veras, ex visis inter datas duas apparentes Maculas, vel unius duo loca.

IN adiecto schemate A B C, sit Circulus Observatorius A D B E, in eoque observatæ sint Maculae duæ in locis duobus, 15. & 7, ad diem 15. Augusti ambæ, simul hora matutina 8. prout videre est in XXXVII. pag. 249. Observationum imagine, in qua habes plenam Macularum istarum constitutionem, & Macula numero 15. signata, ibidem vocatur a, littera vero 7, illic est b; huc autem mera illarum puncta centralia, adeoque distantiam apparentem 7, 15. & in circulum Solis, qui idem est cum observatorio, projectam transiit. Distantia igitur illarum 15. 7, est ea, quam dicto die in Circulo A D B C, ex observatione accurata inveni, & appellatur apparens, quia tanto intervallo diiunctæ apparere illæ Maculae, in planum Solaris circuli coniectæ.

Iam quid respondeat huic visæ distantiae in Solis superficie, supponendo Maculas ibidem commoratas fuisse, hac ratione inueniemus.

Ex centro C, emitte rectas ad 7, & 15. centra Macularum, & inde ex 7, & 15. excita duas perpendiculares, ad peripheriam horizontis, in partem vtramlibet terminatas, quæ sint 7, 15, & 15. K. quæ cum sint semisses chordarum, siue sinus arcuum 7, 15; item 7, 15, K; referent quadrantes 7, 15, & 15. K, circulorum sphaericorum è polis 7, 15, & 7, 15, ad intervalla 7, 15, & 15, K, descriptorum qui toti procumbunt in rectas 7, 15, & 15. K; unde si circa axes C, 7, 15, & C, 7, 15, semidiametros 7, 15, & 15. K, eleuari cogites super planum A D B,

II.

donec eidem ad rectos insistant, semper per circumferent extremita sua puncta 7, 15, & K, in suorum circulorum perimetris; & consequenter in superficie Solis. Sunt enim circuli isti in superficie Solis descripti, cum autem diametri hæ, rectæ fuerint ad dictum circulum Solis, A D B, erunt inter sese parallelæ, per 6. Undec, igitur per præmissum lemma secundum sunt in eodem plano, quod representatur per rectam 7, 15; parallelæ vero 7, 15, & 15. K, representantur, per puncta 7, & 15, in quæ perpendiculariter procumbunt. Intelligatur nunc planum illud circa lineam 7, 15, veluti axem, deuolui, donec in circuli A D B E planum reclinetur, eritq; figura 7, 15, quadrangula eadem, quæ dum erecta stans, in lineam 7, 15, procubuerat, ideoque recta 7, 15, æqualis rectæ 7, 15, & recta 15, 7, æqualis rectæ 15, 7, K; adeoque puncta 7, & 15, sunt illa, quæ in superficie sphaeræ seu globi solaris, in sublimi consistebant, unde cum trapezium 7, 15, 7, 15, sit idem reclinatum, quod fuerat erectum; necesse est distantiam 7, 15, esse illam, quæ in sublimi respondebat distantiae visæ 7, 15. Itaque recta 7, 15, est chorda datarum Macularum 7, & 15, in solari superficie, ex hypothesi, consistentium centra connectens, & arcum circuli maximi, qualis est A D B E, subtendens. Unde si ipsa in eundem applicetur, arcus ab illa subtensus, ostendet visarum Macularum distantiam in gradibus, & minutis, distantie apparenti 7, 15. debitam. Et sic ex apparente duarum Macularum distantia, inquisivimus eam quæ eidem in solari superficie responderet, id quod erat faciendum.

Eodem artificio, dabis chordam 7, 15, iisdem duabus Maculis X. 19. die 19. in sublimi debitam; sic die duodecimo, distantie visæ 12, 15, assignabis distantiam superficialem 12, 15, & 15. Et hoc est vnum, quando duæ Maculae simul videntur. In quo casu non est necessarium, ut illarum ad Eclipticam, vel ad perpendicularum verticis situs, & positio habeatur, sed sufficit hoc solum, ut positio illarum in circulo solari seu observatorio ex observatione detur, absque vlla alia notitia, seu temporis, seu loci; ex sola distantia apparente.

Ex visa, distantiam veram in gradibus & minutis assignare.

Duarum Macularum distantia vera acquiritur, sine ulteriori dato, ex sola distantia apparente.

D d d 3 illarum

Demonstratio.

I.

illarum distantia procedatur: quæ res uti in se est facillima, ita ad rem meam maxima momenta adfert: nam vel ex hoc unico capite Maculæ in Sole esse probantur, ut postea videbitur. Hoc examine discuti possunt quæcunque Maculæ, & illarum inter se distantia, motusque conformes vel diffformes reperiri.

*Ex hoc Exa-
minandi mo-
do amplissi-
mo, Macu-
la in Sole
inuenitur.*

*Diurna v-
nius Macu-
la itinera,
quomodo in-
ter se, sint cõ-
ferenda.*

*Exemplum
practicum
Collationis
itinerum
diurnorum.*

Quando vero vnius tantum Maculæ itineraria ratio inquiritur, & interualla diurna mutuis collationibus contendantur, oportet prius iter ipsius disponere, quod sine perpendiculi & Eclipticæ descriptione non fit, ordinato autem curriculo, sedes diurnæ cum sedibus comparantur, & ex apparentibus locis, locus in Solis superficie eodem modo acquiritur, ut in exemplo, si Maculæ a, quæ cursum suum à die 6. ad 19. Augusti confecit, & hic in eodem schemate per solos numeros dierum exprimitur, loca visa diei 12. & 13. conferre velis cum locis visis, dierum quorumcunque aliorum, in hac figura à die 6. ad 19. expressorum; elicies è locis visis, loca in superficie Solis, & ex illis inter se collatis, rationes horum intelliges. ex centro igitur C, emittes rectam C, 12. ex 12. educes perpendicularem 12. g, ad peripheriam vsq. eodem modo emittes rectam c, 13. & hinc perpendiculari 13. h: tum ad rectam 12. 13. educes duas lineas, ex iisdem punctis 12. & 13. quæ sint 12. s, & 13. l, interque se parallelæ & rectæ ad rectam 12. 13. & 13. l, æquetur perpendiculari 13. h, 12. s, alteri 12. g. hoc facto, si extrema puncta s, l, iungantur linea recta, erit hæc chorda, stationes binas Maculæ in superficie Solis incedentis connectens arcusque quem illa subtendit in peripheria circuli observatorii, ostendet, quantitatem veram, distantia visæ 12. 13. in gradibus & minutis. Sic factum vides à me per dies singulos huius Maculæ, quibus Solem peragravit. itaque in propositis trapezijs, 67 r q, 78 t s, &c. linea transversa parallelas angulis inæqualibus connectens, semper est chorda quæsita, per vera Maculæ loca, in superficie Solis traducta, supposito Maculas illi inhærere, de quo postea fusius disputabitur. Linea igitur q r, respondet rectæ 6, 7. & st, rectæ 7, 8. u x,

II.

1 vero debetur distantia visæ 8, 9. & interuallo sequenti 9, 10. attribuitur chorda y z, & sic reliquæ reliquis, ad finem vsque eodem modo possunt & solent 5 dati cursus, quilibet exponi.

COROLLARIUM I.


Ex his facile est ostendere pronun-
19 ciati veritatem etiam in curvilineis Ma-
cularum incessibus, videlicet, æquali
tempore plus decurri circa horizontem,
quam in medio. Quia tam distantia
q r, orientalis, quam s, occidentalis,
15 est maior quam media y a, hæc autem
decursa est, vno die, hora vna, & quin-
que septimis vnius horæ. Orientalis q r,
absoluta est vno die, & vna sexta vnius
horæ parte. Itaque Macula circa ortum
20 à die sexto ad septimum, horis $24 \frac{1}{6}$.
plus spatij percurrit, quam à die 11. ad
12. horis $25 \frac{1}{7}$. Eodem modo ad occa-
sum, horis $23 \frac{1}{8}$. maior distantia s,
25 peruersa est, quam circa medium horis
 $25 \frac{1}{7}$. Multo ergo plus confecerunt,
quam circa medium à die 10. ad 11. vel
à 13. ad 14. tempore quodammodo æ-
quali. ut patet, nam chordæ a b, a b, mul-
to sunt minores chordis marginalibus,
30 q r, & s. Manet ergo veritas pronun-
ciati, si Maculæ in superficie Solis ferri
ponantur, etiam in Curvibus curvilineis
circa margines interualla diurna am-
pliora decurri, quam circa medium:
35 & hoc non tantum in hoc Macularum
cursu, exēpli causa adducto, sed in om-
nibus alijs, (cæteris paribus) est verum.
Probaui & expertus sum hanc constan-
tem & semper sibi similem (cæteris pa-
40 ribus) apparentiam; mille modis & vi-
cibus perennis, irrefragabilis, indubita-
ta est. Inueni eandem, in omnibus cur-
sibus aliorum, rectè elaboratis.

*Pronuncia-
ti Veritas e-
xemplis ad-
ductis soli-
datur.*

*Hanc veri-
tatem etiam
in aliorum
observatio-
nibus esse re-
perire.*

COROLLARIUM II.

45 Imo locum quoq. habet hæc eadem
apparentia in duabus Maculis inter se
circa ortum, medium & occasum per-
pensis. Aspice in schemate Maculas diei
50 duodecimi, 11. & 12. & ex apparente
distantia a, 12, considera superficia-
lem a v, 13 & hanc confer cum distantia
media diei 15. & videbis chordam a v,
55 esse maiorem quam sit s, ex 15.
elici-



I.

elicitā. Et hāc eādē, experieris x 19. occidentalem chordam, rursus maiorem esse, imo orientali, vt patet, æqualem. Similia millies occurrunt in toto libro priore: quinimo reperi paria, in Observationibus Galilaicis, examina distantiam Maculæ y, & eius quæ illi subiacer, sine littera, examina inquam, illarum distantiam, die 26. Iunij, 27.

II.

28. Item 1. 3. 4. 5. 6. Iulij, & videbis, distantias illarum marginales, maiores reperiri medijs; licet in medio vna vel altera obseruatio non conspiret; sed ego scio hoc non à Macularum interuallis, sed hominum inaduerterentia euenire, quando in consignatione loci, in proclui est, nonnihil deuiare.

COROL.

Adem con-
firmantur
ex obserua-
tionibus Ga-
lilaicis.

COROLLARIUM. III.

*Parallelos
Macularum
incessus, vel
vice versa,
conuergentias
elicere.*

Hinc modum & rationem addiscas, quomodo deprehendas Macularum itinera parallela, eorum ad se conuergentias & diuersiones, & singulorum inter se differentias.

SCHOLIUM.

Excessus isti marginales, nec sunt æquales neque similes, sed prout Macularum paralleli magni vel parui, inclinati vel recti sunt ad horizontem, ita de hac apparentia plus, vel minus participatur. Item prout adhibentur ad obseruandum Tubi.

DIFFICULTATES EX HAC
*apparentia enata expenduntur
& amouentur.*

CAP. XXI.

*Apparentia
hæc pugnat
contra Mo-
tus Macu-
larum regu-
laritatem.*

Prima statim, quæ cuilibet occurrat, difficultas est, quod per hanc apparentiam, quæ tamen certissima est, ipsa Solaris Phænomeni in motu regularis uniformitas tollitur. Nam ex hac apparentia, omnes Macularum cursus in ortu & occasu fiunt celeriores, quam sunt in medio, vti satis superque ostensum est hætenus, æquali quippe tempore, maiores arcus percurreuntur; igitur motus in principio & fine semper præcipitatur; omnis autem in motu præcipitatio, tollit progressionem ipsius uniformem: unde sana impossibile videtur, vt cum hac apparentia, flet Motus Macularum regularis uniformitas.

Et confirmatur ex eo, quod ipsa hæc præcipitatio aliter & aliter sese habet, in alijs & alijs parallelis, diuerso modo in rectilineis, diuerso in curuilineis itineribus.

*Respondetur
ad argumen-
ta.*

Respondeo, Hanc difficultatem plus apparentiæ obijcere, quam ex parte rei insit.

Nam. primò. Si quidquam probaret, tolleretur etiam Macularum reuolutionem annuam, semper uniformiter difformem, & cursus modo rectilineos, modo curuilineos, inque situs contra-

rios deducentem. Euerteretur Macularum regressionem, stationem & progressionem. nam hæc omnia videntur repugnare Motui regulari uniformi. Quod si hæc apparentiæ sunt & stant cum motus uniformis ordine, stabit etiam ista, apparens præcipitatio; præcipue cum neque in ipsa ordo quidam stabilis desideretur, nam motus in parallelo eodem confectus, eodem modo præcipitatur, cæteris paribus; igitur certam quandam & necessariam, non casualem huic effectui oportet subesse causam.

Et ideo secundo. Negatur hanc præcipitationem cum Motu uniformi non stare: non enim inest ipsi motui, vt postea patebit.

Quinimo, asseuero tertio. Motum uniformem & regularem Macularum, cum hoc obseruandi genere non stare sine hac Motus præcipitatione.

Et tandem quarto. Si Motus Macularum hoc obseruandi modo inuentus, hac præcipitatione careat, fore vt non sit regularis, non uniformis. Quæ omnia suis locis inferius clarè elucescent. & nunc pro responsione supponimus. Itaq. prima difficultas hac ratione facilis effecta esto.

DIFFICULTAS II.

Apparentia hæc non videtur consistere, cum facta suppositione, qua statuebatur Maculas inesse superficiæ solari. Nam si superficies Solis sphericè continuatur: quomodo possibile est, vt vna ipsius parte mota, non commoueatur etiam quæcunque alia? Igitur si Macule in ipsa & vna cum ipsa velociter aguntur in ortu vel occasu, necessarium est, vt simili celeritate impellantur, circa medium.

*Apparentia
hæc videtur
Maculas à
superficie So-
lis euellere.*

Quare, aut Maculæ cum suo Motu in solarem superficiem non sunt intrudendæ, aut si ita hæc Apparentia, superficies Solis est mirandum, ne dicam miserandum in modum contorquenda, & diutrahenda. Nam quando Maculæ orientales sunt præcipites, stantibus medijs, pars Solis superficialis inter media corrugabitur; quando occidentales præuolent non obsecundantibus medijs, inter media superficiali portio violentissimè diuellitur: hæc autem cogitatu-
ne

I.

ne dum dictu portentosa sunt. Quare Apparentia hæc cum Maculis in Sole latis, non stat.

*Responde-
tur ad argu-
menta.*

Respondetur, vt ante, plus imagina-
tionis & verborum, huic difficultati,
quam rerum subesse. Etenim Primo,
Eadem ratione probabitur, Naues vel
Maritimæ, vel fluuiatili extremitati non
inesse, si quidem eodem tendentes, aliæ
alijs celerius ferantur. Vnde fieri bene
potest, vt aliquid in alterius superficie
inexistens inæqualiter agitetur, sine su-
perficie illius magno incommodo: an
autem, & quomodo Maculæ in Sole
indemni circumferantur, dicetur suo
loco. Interim satis est ostendere, ra-
tiorinationem non esse necessariam,
argumentumque nequaquam cogere.
Imo, Secundo, tantum abest, vt ex hac
apparentia Maculæ Soli eximantur, vt
multo amplius in ipsum inuehantur.
Etenim Tertiò, Si Maculæ solares Soli
non insunt, præcipitatio orientalis, &
occidentalis vt paullo post demonstra-
bitur, nulla est. Et Quartò, Si Macu-
larum ortiua, & occidua præcipitatio
datur prout dari ostensum est; Macu-
las Soli inesse, necessarium est: nam si
non inesse ponantur, statim præcipita-
tio nulla est, supposito motu regulari.
Neque tamen si hæc ita sint, & fieri
concedantur, vlla superficie illius ex
hoc apparente motu corrugatio, aut
violenta diuulsio subsequetur. Imo,
tamen si Maculæ omnes instar clauis, Soli
infixæ essent, præcipitatio ista, ortiua,
& occidua daretur, quemadmodum
liquido constabit ex inferius asserendis.
Quare difficultas ista parum roboris af-
fert. Quomodo autem ista Solis, &
Macularum ampliatio fiat, stante motu
regulari, hærentibus in Sole Maculis,
edocebitur paullo post, suo loco.

D I F F I C U L T A S I I I.

Omniū totius Phænomeni solaris
Apparentiarum nulla est, quæ Macula-
rum ad Solem parallaxin ita plausibili-
ter insinuet, ita verosimiliter suadeat,
sicut ista. Quandoquidem omnia quæ
in Parallaxi deberent contingere, hic e-
uenire fortasse videantur; certe quæ hic
accidunt, in Parallaxin pulcherrimè
quadrant. Etenim si Macularum paral-

*Apparentia
hæc, vide-
tur Macu-
larum Pa-
rallaxin ad
Solem con-
stituere.*

I I.

laxis in hoc negotio esset, ea vtique
circa horizontem semper maxima, &
circa culminationem minima fieret, &
ab horizonte discedendo deficeret, ac-
cedendo augetur. Hæc autem omnia
insunt huic Apparentiæ: nam arcus &
interualla diurna horizontalia orientem
versus, sunt maxima, deinde versus sum-
mum seu medium Solem sensim decre-
scunt, & in summitate circa centrum
sunt minima, tum rursus versus Hori-
zontem occiduum diminuuntur. Ergo
hanc apparentiam in Parallaxin referen-
dam, facile sibi persuadeat, qui peni-
torem vtriusq; notitiam vel ignoret, vel
acquirere subterfugeat.

Verum enim vero, cui & huius Phæ-
nomeni natura intimius perspecta, &
Parallexeos ratio perscrutatus discussa
fuerit, is in omnia alia potius abibit,
quam, vt in Parallexeos censum hanc,
de qua agimus, apparentiam admittat.

Nam primo. Vbi parallaxis interce-
dit, illic res parallaxi obnoxia simul &
semel è diuersis regionibus conspecta,
in diuersis cæli locis apparet, & Macula
quidem eadem, quamcunque Solis pla-
gam occupet, orienterioribus occiden-
tior, occidentioribus orientior
apparebit, id quod hic nunquam fit; sed
semper omnes totius orbis obseruato-
res, eandem eodem tempore Maculam,
in eodem Solis loco contemplantur. Igi-
tur hæc apparentia non est parallaxibus
accensenda.

Secundo. Si hæc apparentia paralla-
xis esset, idem ex eodem loco obserua-
tor eandem Maculam sub ortum Solis
magis orientalem, sub occasum magis
occidentalem reperiret, quam regula-
ris & ordinarius motus pateretur: sed
hoc nunquam in hoc Phænomeno con-
tingit, teste experientia. Ergo apparen-
tia hæc, parallaxis non est.

Sequela maioris est euidentis, quia
oriante Sole, idem obseruatoris locus
est occidentalissimus, vnde Macula
parallaxin passa plus æquo in ortum
sub Sole reijceretur occidente autem
Sole, idem locus sit eiusdem Solis intui-
tu orientalissimus; vnde Macula visa
si parallaxi subiecta est, solito plus in
partes Solis occidentales proijceretur.
Quorum neutrum cum fiat, patet hic
parallaxin nullam interuenire. Similia
pos-

*Responde-
tur ad argu-
menta, &
Parallaxis
procul able-
gatur.*

I.

possent afferri, de Parallaxi latitudinis.

Tertiò . Parallaxis , si Phænomeno huic inest ; semper in omni obseruandi modo datur &c. hæc autem Apparentia non datur semper in omni obseruandi modo ; Ergo hæc apparentia non est parallaxis. Maior clara & per se nota est. Minor probatur per Reflexionem , & nudum foramen ; si Sol à speculo plano reflexus obseruetur, hanc præcipitationem Maculæ non subeunt ; ab eadem immunes sunt , si nudo immissionis foramine res transigatur. quod vtrumque experientia testatum faciet , exploratori sedulo : cuius exemplum postea dabo .

Quartò . Ipsa tandem veritas , & genuina huiusce effectus causa in medium paullo post expromenda , palam euincit , inter Parallaxes , experimentum hoc annumerari nullo modo posse . Apparentia igitur hæc , cum Parallaxi commune nil habet .

DIFFICULTAS IV.

N EX HAC APPARENTIA IN
solare Phænomenon introducendi sint
Epicycli : qua occasione reii-
ciuntur idem etiam
absolute ab eo-
dem .

CAP. XXII.

*Apparentia
hec videtur
Epicyclos
circa Solem,
in quibus
Macula mo-
uantur, cõ-
sistere.*

SI quidquam est in hoc solari Phænomeno , quod epicyclos , seu circulos paruos , in quibus totis extra sed circa Solem Maculæ deuoluantur , effingendi occasionem prabeat , ex ista vtique apparentia trahi queat . Nam si Macula oriens æphelia siue in Auge Epicycli esse intelligatur , & in Epicycli semicirculo inferiore , ab ortu in occasum voluatur , ab occasu in ortum in superiore ; ponaturque semel conuerti dum infra , semel dum supra Solem incedit ; habebimus fortassis istam Macularum circa solares margines in motu festinationem , habebimus circa medium tarditatem . Ne igitur , quibus eiusmodi nugamentis tempus inutiliter terere , & animum inanibus oblectamentis pascere volupe est , speciosis suis , (vt autumant ,) re vera ta-

II.

men , ludicris machinis , & puerilibus crepitaculis , & se & alios fallant ; operæ pretium duxi , hanc ipsam contentiosam ferram hic opportunè reciprocare ; facile alioquin neglecturus , & suum cuique sentire relicturus , si per ipsos liceret : qui non contenti suas circa rem , hanc quisquillas doctissimorum Virorum grauissimo aspectui proponere , etiam publicas insuper sanctiones sibi pollicentur , quibus ipsi soli sapiant , alij nihil : ij soli ductores alios iniectis manibus & pedicis , vna cum veritate in triumphum ducant . Quod ne fiat , esto .

Affertio prima . *Impossibile est , Ma- Horizontalium apparentem circa ortum & occasum præcipitationem defendi per Epicyclos , propter ipsarum sollemnem & perennem ad dictas partes gracilitatem .* Maculas & Faculas , & quidquid de-
20 mum in Sole est , circa horizontem Solarem & multo magis in eodem , semper & constanter contrahi , adeoque in ap-
25 parentem quandam proceritatem extenuari , ex ipso Phænomeno , adeoque libro præcedente toto , experientiaque tot annorum continua , exploratius est , quàm vt vltioribus probationibus res
30 isthæc solidetur , neque arbitror vllum in hoc puncto vlllo modo difficilem fore , propter nimiam ipsius certitudinem , in tantum , vt ab hac affectione , neque vlla vnquam Macula immunis existerit , om-
35 nes enim gracilescent .

Hoc posito , fieri nequaquam potest , vt Maculæ , ad tuendam illam apparentiam , de qua hactenus egimus , in Epicyclis proprijs vel dicto vel alio vlllo modo , circumferantur ; nam hoc concessio , in orientalibus & occidentalibus plagis horizonti vicinis , erunt ex positis , à Sole maximè remotæ , & ob hanc causam , à sensibili illa & solita contractione liberæ : id quod est falsum , & perpetuo Phænomeni tenori contrarium . Quod autem à sensibili gracilitate illa sint circa horizontem Maculæ futuræ vacuæ , ex eo conficitur , quod à Sole multum , diametro nimirum integra Epicycli distitæ , non sint habituræ magnam decliuitatem , quæ sola situm & aspectum ad oculum obliquum , & hic cæteris paribus , gracilitatem apparentem causat . Hæc igitur cum per Circulos

*Affertionis
probatio.*

I.

culos Epicyclos, ad sensum demantur; patet illos ad hanc tuendam apparentiam dari non posse.

Motuum consequens Anomalia, Epicyclos refutat.

Assertio secunda. *Impossibile est, hanc Macularum apparentiam per Epicyclos excusare, propter infallibilem in Motibus disco Solari respondentibus, inde secuturam asymmetriam, quam tamen Maculis in Sole positis, nullam prorsus esse, constat ex prioribus, & constabit de posterioribus.* Si vero Epicycli isti introducantur, futuram certum est, propter sensibilem ipsarum à Sole remotionem, à quo distabunt sua diametro, per centrum Solis & Maculæ delatæ transeunt, quæ sua circulatione, maximam inuehet in Motus diuersitatem.

Hæc autem omnia repugnant Phænomeno, igitur & Epicycli, horum causa. Quod si loco Maculæ circumduci cogitemus aliquam Faculam, propter dictas inconuenientias, extra Solem quoque videbitur: quod tamen, Phænomeno aduersatur.

Epicyclos figuræ, & similis Macularum situm, repugnat.

Assertio tertia. *Impossibile est prædictam Macularum apparentiam per Epicyclos defendere, propter Maculæ cuiuscunque figuram & situm ad eandem Solis partem semper conuersum.* Certum est, si dicta Epicyclorum conuersio cuiuslibet Maculæ attribueretur, situm Maculæ cuiuslibet, mutatum iri, ut pars occidentalis, orientalis fieret, & quæ orientem respexit, in occidentem primavergeret &c. propter Epicycli conuersionem; ex quo deinde notabiles & celeres figuræ mutationes existerent, propterea quod Maculæ sphericè rotundæ non sint. horum autem nil euenire, con-

Maculæ non rotantur circa centram propriam.

stat ex obseruatis libro priore; & partem Maculæ quæ occasum Solis in ortu respexit, primo occumbere, & quæ ultimo exorta est, postremo occidere, docet perennis experientia, euincunt Nuclei Macularum, Faculæ Maculis adherentes, siue ante, siue retro infallibiliter demonstrant; Maculæ Maculis associatæ luculenter edocent, nam nulla antegressa secuta est, nulla pone sequens antecessit; apices item & caudæ Macularum, idem irrefragabiliter attestantur, qui quamdiu durant, versus eandem plagam Maculis adhærescunt. Igitur cum Maculæ cuiusuis situs ex his inuariatus constet, euident est, Epicy-

II.

culos istos gratis effingi.

Assertio quarta. *Impossibile est apparentiam præfatam per Epicyclos defendere; quia darentur Macularum Motus simul in eodem Epicyclo ab ortu in occasum simul ab occasu in ortum.* Hæc autem sunt monstrosa, & ab hoc Phænomeno alienissima. Suppono autem Maculas eiusmodi inter se vicinas; à Sole, ex hypothesi, aduersarij distantes quidem, sed æqualiter. quia si inæqualiter ad sensum distarent, id ex ipso motu apparente innotesceret, quod tamen non fit. Quibus intellectis & suppositis, statim id, quod in Assertionem dicitur, elucescit. Nam sepiissime Maculæ in eodem parallelo sese mutuo tractu vicinè consequuntur in distantia tanta, vel tantilla, à semetipsis, ut necessario sint in eodem Epicyclo concludendæ; quo dato, necessario quoque aliquæ aliquibus ut situ ita motu opponantur, quod circa idem centrum eiusdem Epicycli circumstant & gyrentur. nam quæ sunt in semicirculo exteriori, ibunt versus occasum, quæ sunt in interiori, versus ortum, & sic in eodem Epicyclo, circa idem centrum, motu simili ferentur aliquæ Maculæ versus orientem, aliquæ versus occidentem, & contingent illarum mutuarum coniunctiones, anticipationes, & postpositiones, &c. quæ tamen omnia sunt falsa, & veritati Phænomeni contraria.

Assertio quinta. *Impossibile est prædictam Macularum apparentiam per Epicyclos saluare, propter mutuas Macularum coalitiones, & dissociationes, faciendas per Epicyclos, si plures Maculæ in eodem Epicyclo ponantur, ut ponendas ab aduersariis ante probavi.* Nam duæ Maculæ in ortu, v.g. à se aliquantiſper disiunctæ, processu ab horizonte versus medium, semper ad se magis magisque accederent, donec omnino vniarentur. deinde in semicirculo Epicycli interiori, seu perihelico vicissim disiungerentur: hoc bis faceret Epicyclus quiuus, Maculæ cuiusuis. quæ cum sint falsissima, Epicyclos inter vera annumeret, qui errores pro veritate amplectatur.

Assertio sexta. *Impossibile est prænotatam Macularum apparentiam propugnare per Epicyclos, propter mutuas Epicy-*

Motuum secutura contrarietas Epicyclos exuertit.

Coadunatio & dissociatio Macularum, auferit Epicyclos.

I.

*Penetratio
corporum,
& mutua
Epicyclo-
rum intrin-
secus co-
sequens, e-
uertit Epi-
cyclos.*

*Epicyclo-
rum & motuum
implicationes.*
Nam cum totus Sol alternis Maculis &
Faculis, secundarijs æqualiter à centro
Solis distantibus, (quod similiter, vt in
Assertionem quarta ita & hic, ex aliunde
probaris in Meditullio, suppono) & sibi
immediate coherentibus, plenissimus
sit, aut singule habebunt suos Epicyclos
aut nullæ. Neque enim est maior ratio
cur huic tribuatur, & alteri negetur, cum
omnium & singulorum sit, cæteris pari-
bus, idem motus, communis, eadem du-
ratio, similis cursus &c.

Deinde ordinariæ illarum figuræ
sunt oblongæ, quæ in Epicyclum sine
adiectarum sectione nequeunt. Quod si
duas aut plures in vnum Epicyclum con-
cludes, non est maior ratio cur, vnam
quamque cum hac porius, quam cum
alia quavis illi coniuncta, connectas.
Tandem spatia inter Epicyclos vacua,
simulq. Epicyclo-
rum implicatio dabitur.
Quorum tamen neutrum potest cum
veritate admitti. Stat ergo proposita
assertio.

Igitur si nullis tribuuntur Epicycli,
habeo intentum; si singulis, habes mu-
tuas corporum & motuum implexio-
nes, adeoque penetrationem, & cursuum
impeditiones &c. Hæc autem sunt im-
possibilia, ergo & Epicycli.

*Diuerse
Maculæ
à Sole distā-
tiæ, magis
intrinsecus.*

Dices, maiore & minore Macularum
à Solis centro distantia, hæc omnia pos-
se euitari. Respondeo, lutum luto non
lauari, neque bene defendi absurdum,
absurdiori commento. Nam primo, vn-
de constat, tam confidens assueveratio,
videlicet Maculam vnam à centro Solis
magis distare quam alteram, idque ex-
tra Solem? qua id ratione, quo experi-
mento, dic fodes, astruis? Suppono, ais;
& illo supposito, id quod volo approbo,
quod tu non vis defendo. an vero? &
quia tu supponis, ex hoc solo fidem
meam exis? Quid hoc philosophandi
genere non adstrues falsi? quid non de-
strues veri? Suppositionibus falsis vis
credi; & Phænomenis veris, tot ratio-
nibus, tot experimentis comprobatis fi-
dem non habes.

Sed demus interim, in tui gratiam,
varias Macularum & Facularum à Sole
remotiones, vt locus sit, tantæ Epicyclo-
rum, si ita vis, congeriei, videamus quid
hinc sit euenturum: hoc opinor, vt So-

II.

lem minimè rotundum firmis aspecturi.
Faculæ enim, in ortu & occasu horizon-
tem Solarem tantum excedent, quan-
tum à Sole per Epicyclos remouentur.
Hæc autem falsa esse, ipsum Phæ-
nomenon, & totus liber antecedens
ostendit.

Præterea si fictitia ista extra Solem
distantiarum diuersitas locum haberet,
etiam apparentiæ; propter quam defen-
dendam ista finguntur, notabilis diuer-
sitas in interuallis diurnis animaduerte-
retur; quod tamen haud accidit, vt ex
obseruatis liquet, & liquebit obseruan-
dis, si cætera paria sumantur &c. Ergo
Apparentia hæc per commentitios istos
Epicyclos, & hi per arbitrarias & impos-
sibiles Macularum à Sole digressiones,
stante veritate Phænomeni, sine mutuis
corporum penetrationibus, & motuum
implicationibus, defendi nequaquam
possunt.

Taceo nunc argumenta alia, contra
sensibiles Macularum à Sole secessiones
quales hic necessario fierent, alibi fusc
declarata; taceo alia, alibi declaranda.

Assertio septima. Hanc apparentiam
per Epicyclos frustra defendi vel ex eo
palam fiat, quod si Macula in Epicy-
clis ferrentur, & propter ipsos ista præci-
pitationes fierent, id semper deberet con-
tingere: certum autem est, apparentiam
istam nec in obseruationibus reflexis,
nec in directis per nudum foramen ac-
cidere: igitur Epicyclis adscribi non de-
bet. Et confirmatur; alioquin simul &
semel, euenirent duo contradictoria.
Nam qui Maculas per Telioscopium
intromissas consignabit, is interuallo-
rum diurnorum prædictam anomalam
infallibiliter inueniet; qui vero per me-
rum foramen exceptas annotabit, ho-
rum nihil penitus animaduertet. igitur
eadem Macula simul in Epicyclo fere-
tur, per obseruationem Telioscopij, &
simul non feretur, per obseruationem
nudi foraminis: id quod esse nequit.

Nudum autem foramen, obiectum
non immutat, sed vt est transmittit.
Igitur si Epicycli hanc apparentiam
cauant, foramen adhibeum ipsam
non tollet.

Assertio octaua. Hanc apparentiam
per excogitatos Epicyclos gratis defendi,
imò propugnari sub aliqua saltem vero-
simili-

*Faculæ, con-
tra Phæno-
nomeni ap-
parentiam,
Solem exce-
derent.*

*Obseruatio-
nes absque
Telioscopio
perfectæ, hæc
apparentiæ
non experiri
tur. Vnde
vani sunt
Epicycli.*

I.

*Veritas vanitatem E-
picurorum manifesta-
bit.* *similitudinis umbra nequitiam posse,
Sole ipso clarius fiet, si vera & ge-
nuina illius causa & ratio in medium
afferetur. Hæc enim ut Sol nebulas,
ita omnes vanitatis faeces illico dis-
sipabit.*

Proinde ne lectoris studiosi animum
diutius detineamus, ad rem accedi-
mus, & ipsissimam veritatem sincere
detegimus.

PRONVNCIAT. DVODECIMVM

*Prædicta apparentia, id est, inter-
uallorum diurnorum circa horizon-
tem maior debito amplificatio, mi-
nor circa medium, adeoque distan-
tiarum diurnarum in cursibus quos
Macula conficiunt stata inequali-
tas, cæteris paribus deprehensa,
provenit à sola Refractionis ine-
qualitate, quam lentes Telioscopii
in transmissam Solis speciem in-
ducunt.*

C A P. XXIII.

HÆC vna res est, quæ Phæ-
nomeni solaris sollerti in-
dagatori, laboris & mole-
stia non parum creat: etenim quam-
visus & effectus Tubi Optici passim est
obuius; tam modus, ratio & caus-
sa ipsius abstrusa, & à communi homi-
num intelligentia remota videtur esse.
Certum est, duo maxima à Teliosco-
pio mortalibus beneficia præstari; al-
terum ut res parvæ, in aspectum sub
maxima quantitate producantur: al-
terum, ut eadem malignè prius con-
spectæ, distinctè & acutè cernantur,
& quod amplius instrumenti præro-
gatiuam commendat, cum ocularia
reliqua aut solis miopibus, aut solis
presbytis, & singula ferme singulis
inseruiant; hoc specillum ita affectum
est, ut omni oculo, dummodo sanus
sit, utiliter accommodari, omni o-
bietto applicari possit, tam vicino
quam remoto, tam lata quam globu-
sa pupilla prædito; idque sola contra-
ctione & diductione: nam Miopes con-
trahunt, ubi presbytes diducunt Telio-
scopium, & utrique obiectum idem
acute distinguunt. Ad obiecta vicina

*Commenda-
tur Teliosco-
pium à suis
egregijs effe-
ctibus.*

*Omni oculo
sano, ad
quoduis obie-
ctum seruit.*

II.

utrique diducunt, ad remota iidem
contrahunt pro suo quisque humore,
& in re bene peruidenda omnes voti
compotes fiunt; gaudentque rem-
5 quasi præsentem manu palpare, quam
visu libero neque assequi licuerat. Hæc
inquam omnes experiuntur, & à Te-
lioscopij lentibus miro quodam artifi-
cio confici haud ignorant, & corroga-
10 tione atque prorogatione varia eue-
nire vident, causam tamen & modum
intimum suspiciunt potius quam per-
spiciunt; & in lentibus residere apud
omnes compertum est, modus autem
15 & artis cum natura ingeniosa com-
positio plerisque fugit. De qua re li-
cet multis egerim in Libro Secundò, &
in Sole Elliptico, nec non refractioni-
bus Cælestibus; hic tamen compen-
dio quædam ob Oculos ponam, ut
ardenti Lectoris desiderio aliquatenus
obsecundem.

25 **SVPPONO ERGO EX OPTICIS**
*sequentia principia, vel ex ipso So-
lari Phenomeno, & Telioscopicis
lentibus atque mirificis earundem
effectibus contra refractarium quem-
libet efficaciter comprobanda.*

30 **P**RIMO. Quodlibet rei visibi-
lis punctum emittit sphaeram
radiosam. patet hoc è Macu-
35 la quavis, quæ spectatur simul vbi-
uis. Quod non fieret, nisi quaquæ-
uersum radiaret.

40 Secundo. Quiuis sphaeræ radiosæ
radius, est rectilineus. Alioquin in-
terpositione opaci directæ, non occul-
taretur obiectum, posset enim videri
radio curvilineo, ex latere admissio, &
Maculæ viderentur in auersa Solis pla-
ga &c. quod non fit.

45 Tertio. Omnis radius visorius ab
obiecto visibili emanaturus, exigit
medium diaphanum; quia ubi dia-
phanum non est, illic radij fluxus nul-
lus est. Pater hoc è Maculis Solis, quæ
50 qua parte Solem occupat, radium
lucidum intercipiunt, quia diaphanæ
non sunt. Sic muri, arboris, aut ani-
malis interiora non videmus, quia
radius exire propter opaci obstacu-
55 lum non potest. sic crytalli, aquæ

Ecc ignis

I.

*Penetratio
corporum,
& mutua
Epicyclorū
intricatio
sequens, e-
uertit Epi-
cyclos.*

Epicyclorum & motuum implicationes.
Nam cum totus Sol alternis Maculis & Faculis, secundarijs æqualiter à centro Solis distantibus, (quod similiter, ut in Assertionem quartam ita & hic, ex aliunde probatis in Meditullio, suppono) & sibi immediate coherentibus, plenissimus sit, aut singule habebunt suos Epicyclos aut nullæ. Neque enim est maior ratio cur huic tribuatur, & alteri negetur, cum omnium & singulorum sit, cæteris paribus, idem motus, communis, eadem duratio, similis cursus &c.

Deinde ordinariæ illarum figuræ sunt oblongæ, quæ in Epicyclum sine adiectarum sectione nequeunt. Quod si duas aut plures in vnum Epicyclum concludes, non est maior ratio cur, vnamquamque cum hac porius, quam cum alia quavis illi coniuncta, connectas. Tandem spatia inter Epicyclos vacua, simulq. Epicyclorū implicatio dabitur. Quorum tamen neutrum potest cum veritate admitti. Stat ergo proposita assertio.

Igitur si nullis tribuuntur Epicycli, habeo intentum; si singulis, habes mutuas corporum & motuum implexiones, adeoque penetrationem, & cursum impeditiones &c. Hæc autem sunt impossibilia, ergo & Epicycli.

*Diversa
Macularū
a Sole distā-
tiæ, magis
intricant.*

Dices, maiore & minore Macularum à Solis centro distantia, hæc omnia posse euitari. Respondeo, lutum luto non lauari, neque bene defendi absurdum, absurdiori commento. Nam primo, unde constat, tam confidens assueveratio, videlicet Maculam vnam à centro Solis magis distare quam alteram, idque extra Solem? quæ id ratione, quo experimento, dic fodes, astruis? Suppono, ais; & illo supposito, id quod volo approbo. quod tu non vis defendo. an vero? & quia tu supponis, ex hoc solo fidem meam exigis? Quid hoc philosophandi genere non adstrues falsi? quid non destrues veri? Suppositionibus falsis vis credi; & Phænomenis veris, tot rationibus, tot experimentis comprobatis fidem non habes.

Sed demus interim, in tui gratiam, varias Macularum & Facularum a Sole remotiones, ut locus sit, tantæ Epicyclorum, si ita vis, congeriei, videamus quid hinc sit euenturum: hoc opinor, ut So-

II.

lem minimè rotundum firmus aspecturi. Faculæ enim, in ortu & occasu horizon-
tem Solarem tantum excedent, quan-
tum a Sole per Epicyclos remouentur.
Hæc autem falsa esse, ipsum Phæ-
nomenon, & totus liber antecedens ostendit.

Præterea si fictitia ista extra Solem, distantiarum diuersitas locum haberet, etiam apparentiæ; propter quam defendendam ista finguntur, notabilis diuersitas in intervallis diurnis animaduertetur; quod tamen haud accidit, ut ex obseruatis liquet, & liquebit obseruandis, si cætera paria sumantur &c. Ergo Apparentia hæc per commentitios istos Epicyclos, & hi per arbitrarias & impossibiles Macularum à Sole digressiones, stante veritate Phænomeni, sine mutuis corporum penetrationibus, & motuum implicationibus, defendi nequaquam possunt.

Taceo nunc argumenta alia, contra sensibiles Macularum à Sole secessionem quales hic necessario fierent, alibi fuse declarata; taceo alia, alibi declaranda.

Assertio septima. Hanc apparentiam per Epicyclos frustra defendi vel ex eo palam fiat, quod si Macula in Epicyclis ferrentur, & propter ipsos ista precipitationes fierent, id semper deberet contingere: certum autem est, apparentiam istam nec in obseruationibus reflexis, nec in directis per nudum foramen accidere: igitur Epicyclis adscribi non debet. Et confirmatur; alioquin simul & semel, euenirent duo contradictoria. Nam qui Maculas per Telioscopium intromissas consignabit, is intervallo-
rum diurnorum prædictam anomalam infallibiliter inueniet; qui vero per merum foramen exceptas annotabit, horum nihil penitus animaduertet. Igitur eadem Macula simul in Epicyclo ferretur, per obseruationem Telioscopij, & simul non ferretur, per obseruationem nudi foraminis: id quod esse nequit.

Nudum autem foramen, obiectum non immutat, sed ut est transmittit. Igitur si Epicycli hanc apparentiam causant, foramen adhibeum ipsam non tollet.

Assertio octaua. Hanc apparentiam per excogitatos Epicyclos gratis defendi, imò propugnari sub aliqua saltem vero-
simili-

*Facula, con-
tra Phæno-
nomeni ap-
parentiam,
Solem exce-
derent.*

*Obseruatio-
nes absque
Telioscopio
perfectæ, hæc
apparentiæ
non experiri-
tur. Unde
vani sunt
Epicycli.*

I.

Veritas va- *similitudinis umbra neutiquam posse,*
nitatem E- *Sole ipso clarius fiet, si vera & ge-*
piculorum *nuina illius causa & ratio in medium*
manifesta- *afferetur. Hæc enim ut Sol nebulas,*
bit. *ita omnes vanitatis faces illico dis-*
sipabit.

Proinde ne lectoris studiosi animum
diutius detineamus, ad rem accedi-
mus, & ipsissimam veritatem syncero
detegimus.

PRONVNCIAT. DVODECIMVM

Prædicta apparentia, id est, inter-
uallorum diurnorum circa horizon-
tem maior debito amplificatio, mi-
nor circa medium, adeoque distan-
tiarum diurnarum in cursibus quos
Maculae conficiunt stata inaequali-
tas, cæteris paribus deprehensa,
provenit à sola Refractionis inæ-
qualitate, quam lentes Telioscopii
in transmissam Solis speciem in-
ducunt.

C A P. XXIII.

HÆC vna res est, quæ Pha-
nomeni solaris sollerti in-
dagatori, laboris & mole-
stiae non parum creat: etenim quam-
visus & effectus Tubi Optici passim est
obuius; tam modus, ratio & caus-
sa ipsius abstrusa, & à communi homi-
num intelligentia remota videtur esse.
Certum est, duo maxima à Teliosco-
pio mortalibus beneficia præstari; al-
terum ut res parvæ, in aspectum sub
maxima quantitate producantur: al-
terum, ut eadem malignè prius con-
spectæ, distinctè & acutè cernantur,
& quod amplius instrumenti præro-
gatiuam commendat, cum ocularia
reliqua aut solis miopibus, aut solis
presbytis, & singula ferme singulis
inseruiant; hoc specillum ita affectum
est, ut omni oculo, dummodo sanus
sit, utiliter accommodari, omni o-
bieto applicari possit, tam vicino
quam remoto, tam lara quam globo-
sa pupilla prædito; idque sola contra-
ctione & diductione: nam Miopes con-
trahunt, ubi presbytes diducunt Telio-
scopium, & utrique obiectum idem
acute distinguunt. Ad obiecta vicina

Commenda-
tur Teliosco-
pium à suis
egregijs effe-
ctibus.

Omni oculo
sano, ad
quodvis obie-
ctum seruit.

II.

1 utrique diducunt, ad remota iidem
contrahunt pro suo quisque humore,
& in re bene peruidenda omnes voti
compotes fiunt; gaudentque rem-
5 quasi præsentem manu palpare, quam
visu libero neque assequi licuerat. Hæc
inquam omnes experiuntur, & à Te-
lioscopij lentibus miro quodam artifi-
cio confici haud ignorant, & corroga-
10 tione atque prorogatione varia eue-
nire vident, causam tamen & modum
intimum suspiciunt potius quam per-
spiciunt; & in lentibus residere apud
omnes compertum est, modus autem
& artis cum natura ingeniosa com-
15 positio plerosque fugit. De qua re li-
cet multis egerim in Libro Secundò, &
in Sole Elliptico, nec non refractioni-
bus Cælestibus, hic tamen compen-
dio quædam ob Oculos ponam, ut
ardenti Lectoris desiderio aliquatenus
obsecundem.

25 SVPPONO ERGO EX OPTICIS

sequentia principia, vel ex ipso So-
lari Phenomeno, & Telioscopicis
lentibus atque mirificis earundem
effectibus contra refractarium quem-
30 *libet efficaciter comprobanda.*

PRIMO. Quodlibet rei visibi-
lis punctum emittit sphaeram
radiosam. patet hoc è Macu-
35 la quavis, quæ spectatur simul ubi-
uis. Quod non fieret, nisi quaquæ-
uersum radiaret.

Secundò. Quiuis sphaeræ radiosæ
radius, est rectilineus. Alioquin in-
40 terpositione opaci directæ, non occul-
taretur obiectum, posset enim videri
radio curvilineo, ex latere admissio, &
Maculae viderentur in auersa Solis pla-
ga &c. quod non fit.

45 Tertiò. Omnis radius visorius ab
obietto visibili emanaturus, exigit
medium diaphanum; quia ubi dia-
phanum non est, illic radij fluxus nul-
lus est. Pater hoc è Maculis Solis, quæ
50 qua parte Solem occupat, radium
lucidum intercipiunt, quia diaphanæ
non sunt. Sic muri, arboris, aut ani-
malis interiora non videmus, quia
radius exire propter opaci obstacu-
55 lum non potest. sic crysalli, aquæ

Ecc ignis

I.

ignis . &c. intima quæque perlustra-
mus, quia perspicua cum sint, spe-
ciebus visibilibus transitum ad visum
præbent.

Quartò . Perspicuorum alia sunt ra-
riora alijs, ut aër, rarior est quam a-
qua; alia sunt densiora alijs, ut aqua
densior est, quam aër . Crystallus &
vitrum, densitatem aqueum commu-
niter possident . ita auctores & ex-
perientia docent .

Quintò . Radius visorius ab obiecto
in diaphana quocunque, & qualia-
cunque ad rectos incidens, irretractus
pergit & transit .

Sextò . Radius visorius quicunque
ab obiecto quocunque ex diuerso Me-
dio in diuersum obliquè allapsus, fran-
gitur : hoc est, à rectitudine prio-
ris incessus deflectit, & licet secun-
dum lineam rectam iter suum conti-
nuet, non tamen via itineraria in
medio secundo obita iacet in dire-
ctum, cum vestigio itineris in me-
dio primo descripti; sed hi duo ra-
dij ambo cum sint rectilinei, in duo-
rum mediorum confinio ad angulum
concurrunt . Hoc igitur quando ac-
cidit, radius refringi dicitur : quod
semper accidit, quando radius ex
medio primo, ad medium secundum
obliquus, seu ad angulos inæquales
accidit .

*Obliquitas
incidentiæ,
facit refra-
ctionem .*

Hinc deduco, refractionem ex eo
præcisè non fieri, quia radius viso-
rius in alterius rationis medium in-
cidat; sed ex eo, quia in aliud me-
dium obliquè occurrat .

Septimò . Radius è rariori in den-
sius obliquè incidens, frangitur ad
perpendicularem . Perpendicularis au-
tem ad quam vel à qua refractione fit,
est linea, quæ ex puncto incidentiæ
ad angulos rectos seu æquales insistit
superficiæ Medij seu diaphani se-
cundi .

*Macularum
radij refrin-
guntur in
lentibus ad
perpendicu-
larem .*

Hinc sequitur, radios à Sole, &
Maculis in lentes allapsos, in crassitie
lentium refringi ad perpendiculares .
quia è medio rariore, aère videlicet,
traijciuntur in medium densius, quod
est ipsa lentium substantia perspicua .
Et hoc verum est, non tantum de len-
te conuexa, sed etiam concaua, quan-
quam hæc radios Solis mediatè a len-

II.

te conuexa accipit .

Nomine autem medij secundi, non
intelligo illud tantum, quod simpli-
citer secundum est, sed quod secun-
dum dicitur comparatione illius, quod
immediatè antecessit : sic fieri potest,
ut quodlibet medium, quod non est
simpliciter primum, aut simpliciter
vltimum, sit, & dicatur primum, &
secundum, nam respectu medij se-
quentis dicitur primum seu antece-
dens, respectu antecedentis, seu pri-
mi dicitur secundum siue consequens .
Aër igitur ante lentem conuexam, in
nostro negotio, est medium primum
absolute : lens conuexa in Teliosco-
pio ad Solem directo, est medium
secundum; quæ respectu aëris inte-
rioris ipsam sequentis potest iterum
induere rationem medij primi seu an-
tecedentis, & aër sequens, qui abso-
lutè essent medium tertium, accipit
officium medij secundi, imo etiam
primi, respectu lentis cauæ sequen-
tis, &c. hæc ob vitandos errores, &
confusiones cauendas, præmonenda
duxi .

Octauò . Radius è perspicuo densio-
re in rariis obliquè progressus, sem-
per refringitur à perpendiculari . Hinc
sequitur, Solis vel Macularum radios
è lentibus egressos, refringi à perpen-
diculari, quæ per punctum incidentiæ
superficiæ aëris ad rectos insistit . qui
aër cum sit rarior lentium substantia,
oportet refractionem à perpendiculari
fieri .

*Refractione
à perpendi-
culari .*

Nonò, Punctum incidentiæ est id,
in quod radius è medio antecedente
in medium sequens, primo incidit .
Hinc sequitur, puncta incidentiæ pe-
nes extremam antecedentis, & primam
medij sequentis, superficiem esse sumen-
da, quia in illam radius omnium primo
incidit .

*Punctum
incidentiæ .*

Decimò, Solus radius primus ab
obiecto in medium aliud digressus, est
incidentiæ radius directus, reliqui om-
nes post hunc sunt simul radij inciden-
tiæ, simul refracti . Vltimus in me-
dium terminatum appulsus, potest di-
ci radius consistentiæ, qui tamen sem-
per vltimus refractorum est .

Vndecimò . Sicut incidentia obli-
qua in diuersum diaphanum vera,
genuina,

I.

genuina, & sola refractionis causa est; sic incidentia obliquior refractionem maiorem, minus obliqua, minorem; recta, nullam efficit.

Hinc sequitur primò. Reliquis omnibus paribus figuram lentis seu convexam seu concavam in arradiationibus excentricis saltem, plerumque maiorem facere refractionem, quam faciat plana, quia maior in ea sit obliquitas incidentiæ. &c.

Sequitur secundò. Reliquis omnibus paribus positis, refractionem maiorem fieri à lentibus quæ sunt minorum sphaerarum segmenta, quam fiat à segmentis sphaerarum maiorum. quia in illis incidentia est obliquior, quam in istis.

Sequitur tertio. Maiorem fieri refractionem ab ijs radijs, qui ab axe seu radio perpendiculariter incidente magis distant quam qui minus. Quia quo magis distant, hoc obliquius, quo minus hoc rectius superficiem incidentiæ feriunt.

Superficies incidentiæ.

Duodecimò. Superficies autem incidentiæ, est superficies Medij seu diaphani sequentis, in quam radij incidentiæ affluunt, & semper est simul cum superficie vltima Medij antecedentis; licet non vna & eadem sed omnino distincta, nam media refractoria ordinariè non sunt continua, sed contigua plerumque. Addo hanc limitationem propter tractos vndosos in materia lentium utique continua repertos: & multas alias experientias, hic minime ventilandas.

Cautela.

Planum seu superficies Refractionis.

Decimotertiò. Superficies seu planum refractionis est id, in quo insunt, radius incidentiæ, perpendicularis incidentiæ, linea refractionis, & Cathetus à puncto visibili in superficiem diaphani secundi deducta. Hoc refractionis planum non est superficies deducta in actum reducta, ut existat discretum instar superficiæ incidentiæ, sed est superficies continuans & copulans, intellectu comprehensa, & lenti alijsq; medijs immersa, natura autem nota.

Decimoquartò. Superficies seu planum refractionis, in nostro casu, semper transit per circulum maximum illius sphaeræ, cuius lens segmentum

II.

1 existit; seu fortasse clarius; Lentis & plani refractionis communis sectio, est segmentum circuli maximi illius sphaeræ, à qua lens desumpta est. Et patet
5 ex eo, quia planum refractionis, semper est ad sphaericam lentis superficiem erectum, eo quod in ipso semper iaceat tam linea perpendicularis ad quam vel à qua fit refractionis, quam Cathetus prædicta. &c.

10 Decimoquintò. Punctum à quo Cathetus in superficiem medij secundi deducitur, est ipsum obiecti visibilis punctum primum & immediatum; in medio verò secundo & sequentibus, si eorundem continuatio fiat, Cathetus initium sumit à puncto incidentiæ seu refractionis, & progreditur ad medium sequens, & sic semper, donec ad vltimum incidentiæ punctum perveniat.

20 His ex unanimi Opticorum doctrina præmissis & intellectis; quanquam refractionem ex instituto tractare nec animus neque tempus modo fert, & in prioribus iam multa sunt dicta; nihilominus tamen hic quædam ex praxi magis quam Theoria, attexere necessarium duxi.

25 Dico igitur primò. In Telescopio Species rerum visibilium in circulo observatorio augmentationem fieri, lentium augetur insertarum refractione. Constat hoc omnium sensu & consensu.

30 Dico secundò. In Telescopio refractionem esse compositam è duabus lentibus am-
35 fractionem esse compositam è duabus lentibus am-
lentibus, & eius quæ obiectum respici-
cit refractionem nunquam venire in-
posita.
chartam, sed postrema tantum; quæ
40 nihilominus speciem à prima lente refractam amplius refringit & auget. Constat experientia; nam si lentem cavam demas, habebis cæteris invariatis, minorem multo picturam, quam si addas eandem.

45 Dico tertio. In utraque lente plana refractionis per axem lentis utriusque & singula circumferentiæ baseos puncta ducuntur, & secundum hæc
50 plana Macula & singula Solis puncta refractione discedunt à centro circuli Solis, in charta legitime presentati, & Solem non tantum maiorem proiciunt, quam cono radiofo naturali affulisset, sed etiam magnitudine inæ-

Refractione lucidus Solis circulus crescit inæqualiter, minime iuxta centrū, semper magis versus margines.

I.

qualiter crescente, ita ut partes circuli solaris versus limbum, magis diducantur refractione, quam ea, quae centro sunt viciniores; si quidem basis circuli solaris cum circulo observatorio per omnia coinciderit, Alioquin ista, ut videbitur, hoc modo necessario, non augebuntur, sed diuerso.

Quelibet
baseos luci-
da puncta
equaliter à
centro remo-
ta, equali-
ter refrin-
guntur.

Dico quartò. In planis refractionum omnia Solis puncta equaliter ab axe lentium & coni solaris remota, equaliter refringuntur. Quia quae aequae distant, ad lentium superficiem aequae obliquae allabuntur, angulosque incidentiae aequales efficiunt, ex quo necesse est, aequales refractiones contingere. Sequitur hinc, Maculas à centro Circuli observatorii aequae remotas, aequae fuisse refractas. Quia aequalis Macularum à centro Circuli observatorii distantia, sequitur aequalem punctorum incidentiae remotionem ab axe lentis in superficie refractionis.

Inaqualis
punctorum
lucidorum
à centro di-
stantia, ina-
qualem cau-
ssat refra-
ctionem.

Dico quintò. In planis refractionum omnia Solis puncta, inaqualiter ab axe lentis remota, inaqualiter refringuntur, & minus vicina, magis remota. Quia inaequales sunt incidentiarum anguli, & minus obliqui, qui sunt axi vicini; magis, qui sunt ab axe remoti, hinc plus refractionis ab his, minus ab illis sentitur. Sequitur hinc, Maculas centro observatorii Circuli viciniores subistere refractioni minori, quam quae sunt remotiores.

Refractione
non propor-
tionatur an-
gulis inci-
dentiae.

Dico sextò. Refractio non procedit proportionaliter angulis incidentiae, & incidentiarum obliquitatibus. Est communis omnium Opticorum, & experientijs infinitis huius etiam Phænomeni stabilita. ut proinde de veritate huius dicti non sit dubitandum. causas autem & modos speciales istius effectus indagare, pertinet ad proprias refractionum doctrinas, quas hic enucleatius exponere præter institutum & Lectori morosum esset.

Refractiones
circa
punctum sunt
inter se ad
sensum qua-
si aequales.

Dico septimò. Refractiones in planis refractionum ab axe, & centro circuli observatorii assumptas, ad quartam vel tertiam fere radii seu semidiametri partem; sensibiliter parum vel nihil inter se differre, ita ut aequali ferme passu incedant. Ratio huius

II.

1 quia incidentiae axi vicinae, sunt rectis quam obliquis angulis similiores, & discrepantia illarum in sensum difficulter cadit. Et confirmatur varijs experientijs, prout mox videbimus.

Dico octauò. Refractiones in Refractionum planis, post tertiam, aut quartam semidiametri à centro circuli observatorii distantiam versus marginem procedendo, sensibiliter augentur, incremento angulis incidentiae nequaquam proportionali, sed quo peripheriae magis appropinquaueris, hoc incrementorum differentias amplius, precipitatas senties. Ratio huius rei desumitur ex eo, quod neque anguli incidentiae pergant eadem proportionem cum angulis refractionum, sed 20 hi maiore data obliquitate magis crescant, quam ut sint illis similes; prout communis doctrina & experientia quotidiana docent.

Refractiones
versus
margines
vehementer
augescunt.

COROLLARIUM I.

Ex hisce dictis solvuntur omnes 30 difficultates circa diu agitatae apparentias allatae. Nam ex eo quod Maculae solares circa medium Solis minimus & veluti aequabiliter refringuntur, sequitur statim spatia quae à Maculis in circulo observatorio temporibus aequalibus decurruntur, fore inter sese ad sensum aequalia, & minora illis spatijs, quae tempore licet aequali, absoluuntur circa Solis extrema, sub refractionibus maioribus & inter se minime aequalibus; si tamen cætera paria ponantur; hoc est, si non tantum tempora aequalia assumantur, sed etiam motus ipse Maculae circa Solem regularis & vniformis existat, 40 & Solis imago circulo observatorio perfecte congruat, & Telioscopium idem retineatur ad cursum vnum &c. Vicissim quoque sequitur, interval- 50 la apparentia, à Maculis circa horizontem aequalibus temporibus peragrata, optice ampliora futura medijs, propter refractionem ad extrema maiorem, quam esse soleat circa medium. Dixi intervalla à Maculis

Apparentijs
hactenus a-
gitatis, pul-
cherrime sa-
tisfit, Refra-
ctionis ina-
qualitate.

in

I.

II.

Genuina & verissima Apparentia atque ex ea enatarum difficultatib. solutio.

in circulo obseruatorio descripta, esse ex refractione *optice maiora*, quia geometricè secundum angulos visorios mensurata; sunt multo minora, si vero optice considerentur, prout nimirum ex motu circulari, eoque circa ortum accliu, circa occasum decliu Solem circumeunt, & in similem formam eriguntur, prout facere in prioribus docui; inuenies chordas interuallis marginalibus apparentibus debitas, maiores longè arcus subtendere, quam soleant chordæ centrales; & vice versa, tam arcus quam chordas ex interuallis diurnis centralibus erutas, semper & necessario fore optice minores, quam sint marginales.

COROLLARIUM II.

Periodica cursus reuolutio mensurata per arcum distantie diurne centrali respondentem, exsurget debito maior.

Hinc sequitur primo. Si maculæ in superficie Solis circumeant, debere necessario inuenti paralleli perimetrum, per arcum qui interuallo centrali correspondent, aut chordam isti arcui subtensam, commensuratum æquo maiorem reperiri; ita vt sæpius in eo replicetur dictus arcus, vel chorda, quam tempus obseruationibus, & cursui Maculæ debitum patiatur. Hoc autem ex eo prouenit, quia refractionis inæqualitas, circulum Solis ad extrema æquo maiorem exhibet, in medio vero distantias æquo minores, quam vt circulo illi satisfaciant, iam si maiorem debito circumferentiam mensurem per arcum iusto minorem, quod in proposito fit; sequitur necessario ipsum sæpius in dicta circumferentia, quam oporteat inuentum, & consequenter tempus iustum transfultum iri. Quæ cum omnia fiant, & rationi huic veritas experimentalis semper pulcherrimè suffragetur, quis non videt Maculas in Sole ponendas? Statim enim, atque dicta disparitas à Motu tollitur, Macularum in Sole positarum regularis, & ordinatus motus consequitur.

COROLLARIUM III.

Sequitur secundo. Si iisdem positis, Parallelus alicuius Maculæ inuentus

1 mensuretur per arcum interuallo marginali correspondentem, inuenietur eius perimeter ad dictam mensuram debito minor, & cursus inuento per obseruationes tempori decedet; & hoc 5 ideo fiet, quia mensura illa per refractionem marginalem exhibita est maior, quam vt circulus paralleli inuenti sufficiat; mensura autem iusto maior, 10 in mensurato minus, quam deberet replicatur. Corripietur itaq; tempus. Ergo cum ista ex ratione sequantur, Maculis in Sole statutis, & experientia constantissima roborentur; Maculas in Sole inesse non est dubium: 15

Sequitur tertio. Si vera ad circuli solaris apparentem ex refractione peripheriam adhibenda sit spatiorum diurnorum mensura illam debere esse, maiorem apparentibus interuallis centralibus, minorem marginalibus. Veram autem aut veræ proximam habitum iri, ex sublata aut adæquata Refractionis inæqualitate. 20

Refractionis inæqualitas Maculas in Solem ponit.

PROPOSITIO I.

Si Maculis extra Solem positis, Refractionis inæqualis apparentia in motu earundem extra Solem inuento, disparet: Macula non sunt extra Solem.

C A P. XXIV.

40 **P**Onamus Maculas solares ferri extra Solem, & ex hoc ipso disparere in cursu extra Solem digesto Refractionis iam diu ventilatæ apparentiam; dico, *Maculas solares hoc ipso non esse extra Solem*. Quod sic probo.

Hypothesis explicata

45 Falsum nunquam sequitur nisi ex falso: sed si Maculis extra Solem positis refractionis apparentia tollitur, tunc 50 sequitur, ex Maculis extra Solem positis aliquid manifestè falsi; ergo & ipsa Macularum extra Solem positio est falsa. Quod autem aliquid manifestè falsi sequatur, si Refractionis apparentia hæcenus agitata tollitur, probatur

Probatio Propositionis.

Ecc 3 hoc

I.

hoc modo. Si dicta Refractionis apparentia tollitur, tunc sequitur Refractionem per lentes Telioscopicas factam, non esse difformem sed uniformem; quod est euidenter falsum: sequitur Refractiones sub incidentijs & angulis atque obliquitatibus quibuscunque, fieri semper æquales, quod est falsum &c. Hæc autem omni sensui, omni experientiae, omni auctoritati & doctrinae Opticorum repugnant, ipsaque Scientiæ Optices fundamenta quassant. Quare probatum manet, Si *Maculis extra Solem positis Refractionis apparentia tollitur, Maculas non esse extra Solem.* Nam, si ex extra positis Refractionis apparentia tollitur, statim sequuntur prædicta falsa, unde & ipsarum extra Solem collocatio falsa conuincitur; adeoque ex hoc ipso, quia extra ponuntur ostenduntur extra poni & esse non posse. Id quod erat ostendendum.

Conclusio ostensa.

PROPOSITIO II.

MACULAE EXTRA SOLEM VEL modicum posita, tollunt omnem inaequalitatis in refringendo apparentiam.

CAP. XXV.

Sensus Propositionis.

SERM O est de Maculis per Telioscopium obseruatis & rectè in cursum suum dispositis. Has Maculas omnes si in Sole circumferri ponantur, offerre cursus circa initium & finem refractione præcipitatos, hactenus ostendi, & paullo post vberius demonstrabitur: nunc autem dico; Si quis illas paullulum extra Solis superficiem euexerit, & spharam Soli homocentricam circumduxerit, cuius semidiameter circuli obseruatorij semidiametrum superet, vna tantum particula vicesima, trigesima aut quadragesima, hoc est, non vno minuto primo integro, Sed quadraginta, triginta aut viginti minutis secundis, supposita Solis magnitudine visuali 32. circiter minorum primorum, de qua re suo loco dicitur; si, inquam, aliquis Maculas tantilla à Sole distantia seiunctas in sphaera homocentrica circumuectet: aio, hanc omnem inaequalitatis ex Re-

Macula à Sole non posita sunt seiungi minutis viginti secundis.

II.

fractione procreatae apparentiam sublatum, & à chordis, quæ obseruationum interuallis respondent, æquales vbique arcus subtensum iri. Hæc res alia probatione non eget, quam diligenti examine & praxi expositoria ex obseruatis meis cursibus secundum dicta & docta. Accipe in exemplum, cursus in Imagine LXX. Libro Tertio pag. 341. expositos, & videbis dictorum veritatem. accipe alios, & accurate examina, circumscribe circumferentias paullo maiores, semper quod dixi inuenies.

Propositio nis probatio in exemplis practicis.

Ego certe pericula huius rei infinita poene feci, & quod dico semper reperi probata manet ergo ex obseruatis propositio. Quapropter cum per hanc positionem in Macularum cursum aliquid inuehatur, nimirum temporibus aequalibus motuum quoque correspondentium æqualitas, quod tamen hoc obseruandi per lentes modo, fieri neque debet neque potest: patet Maculas neque tantillo extra Solem collocari posse.

Ex hoc quoque Macula à Sole auelli nequeunt.

PROPOSITIO III.

SI MACULAE EXTRA SOLEM ponantur in tali distantia, ut interuallis obseruationum intra equalia tempora decursis, æquales arcus respondeant, in assumpto cursu illarum circulo; tunc periodica illarum reuolutio debito maior existit. Atque hoc ipso extra poni non possunt.

CAP. XXVI.

QVIA si temporibus aequalibus æquales arcus respondeant, cum circulus in quo Maculae incedere ponuntur, sit extra Solem, punctum ortus & occasus non terminabitur à radijs vtrunque tangentibus, sed secantibus cursum illarum: unde quidquid ex peripheria deinde vtrunque ad horizontem verum superest, & tantundem etiam in altero hemisphaerio, supra periodicum Macularum in Sole alioquin positarum motum accedet; quia cum arcui centrali omnium minimo; reliqui omnes, propter secessum circuli à Sole, item propter hypothesin propositionis, & obliquita-

I.

quitatem imminutam, quam acquirunt inter parallelas quibus intervalla motuum diurnorum distinguuntur, in circulum extra Solem egressas, decrescendo æquentur; (erant enim ipso cæteroquin maiores, Maculis in Sole positis) necesse est, illum arcum sæpius reperiri in circulo maiore, qualis nunc est extra Solem assumptus, quam minore, in Solis superficie contento: necesse igitur est, & plus temporis in illo quam hoc inueniri, sunt enim plures arcus inter se singuli æquales, tot igitur æqualia illis, ob motus regularitatem, debentur tempora. (Suppono autem hic partim ex demonstratis, partim ex demonstrandis inferius, præsertim Macularum reditu, verum Macularum motum in superficie Solis confici.) Quare cum tota reuolutio periodica ex pluribus arcibus & temporibus constet, quam oporteat, si æqualibus temporum intervallis æquales arcus in Circulo foris assumpto corresponsdeant: cum inquam hoc falsum sequatur, ex Maculis extra Solem dicta ratione positis, patet Maculas extra Solem minime, sed intra ponendas esse.

PROPOSITIO IV.

SI MACULAE EXTRA SOLEM

ad unum, duo, tria, aut plura minuta, qualium semidiameter Solis 16. aut 17. circiter esse ponitur, circumcursare permittantur, tunc inter omnes arcus, quos linea parallela è locis observationum diurnis in peripheriam circuli extra assumpti egressæ interceptiunt; is qui diurno arcus solaris centrali itineri respondet, est omnium maximus, reliquorum deinde quisque versus horizontem utrinque semper minor est altiore, maior humilior, omnium autem minimus est, horizonti proximus. Suppono autem accipi primò, Puncta Macularum itineraria in lineam sensibilibiter rectam disposita, temporibus æqualibus discreta; secundò, Motum apparentem beneficio Telescopii observatum, ideoque refractioni obnoxium; tertio, Motum Macularum in se spectatum, esse regularem. His autem ita

II.

se habentibus, Maculae extra Solem ad dictas distantias nequaquam incedunt, sed necessario, eidem viciniores existere probantur.

CAP. XXVII.

HÆC res ex observatis & adhibito practico examine ad oculum statim patet. Nam, si ex centro circuli cuiuscunque observatorij alium circulum descripseris, ad aliquam ex dictis distantiam; puta, minutorum in semidiametro 18. 19. 20. & amplius: & exinde per parallelas ex apparentibus Macularum locis legitime eductas, chordas & arcus intervalis observatorijs debitas, in extra assumpto circulo observatorio exploreris, inuenies semper arcus centralibus intervallis correspondentes omnium, maximos, horizontalis minimos, intermedios maiores versus medium, minores versus extremum. Hæc autem cum in regulari & ordinato Macularum solarium motu, (quem ex aliunde probatis & probandis semper suppono) sint simpliciter impossibilia, eo quod omnem motus uniformitatem pessundent, patet circulos Macularum itinerarios extra Solem assumendos non esse. Quod autem medij itinerum extra Solem assumptorum arcus reliquos decliviores excedant, non accidit quia sic augescant, sed quia illi decrescant, propter deficientem inter easdem parallelas obliquitatem; quæ semper augescente circulo expositorio decrescit, decrescente augescit.

Omnia fere hucusque dicta placet ob Oculos in exposito schemate statuere. Ex A, igitur centro, ad intervallum AB, descriptus intelligatur semicirculus Solis observatorius BCD, in eoque Macula B, ex oriente B, mota sit in occidentem D, secundum incessum apparentem rectilineum BAD; & fecerit Macula B, spatia itineraria diurna temporibus æqualibus decursa, EF, FG, GH, HI, IA, AK, KL, LM, MN, NO; nam spatia residua BE, & OD, sunt minora diurnis, vt patet in arcibus PB, & a D; hinc ab E, incipio numerare in ortu, & in O, desino, ad occasum. Iam si Maculae in superficie solari BCD, regu-

Propositio-
nes prædi-
ctæ ostendi-
tur in figu-
ra.

I.

*Ex hypothe-
si motus re-
gularis, &
aquabilis,
sequuntur
arcus aqua-
libus tempo-
ribus aqua-
les.*

regulariter circa centrum A gyratae fuerunt, si id absque vlla refractione, aut cum refractione æquabili (de cuius possibilitate iam non disputo) factum, & obseruatum fuit; certum est, si ex obseruationum punctis, E, F, G, H, &c. perpendiculares EP, FQ, GR, HS, &c. emittantur, in perimetrum Solis BCD, illas abscissuras, arcus PQ, QR, RS, &c. inter se æquales, motu regulari & vniiformi posito; Est enim vt tempus interualli EF, ad tempus interualli FG, &c. ita arcus PQ, ad arcum QR, &c. tempora autem EF, FG, sunt æqualia; ergo & arcus PQ, QR, inter se pariter æquantur. Et hoc est vnum.

*Obseruatio
motus regu-
laris per len-
tes facta, ex-
hibet in Sole
arcus inæ-
quales.*

Certum deinde est, si Maculis in Sole positis, & regulariter circumlatis, interualla diurna EF, FG, GH, consignentur Sole per lentes transmissio, arcus PQ, QR, RS, &c. ipsis correspondentes, futuros inter se refractione inæquales, & maiorem PQ, quam QR, hunc autem maiorem quam RS, vsque ad arcum TC, & CV, exinde semper priorem posteriore minorem vsque ad Z; & hoc ideo, quia si sine refractione fuissent æquales, accedentibus refractionum arcubus inæqualibus, toti inter se fient inæquales; cumque propter obliquiores incidentias arcus PQ, & OA, fortius refringantur, &c. patet, & hæc veritas; quod est secundum.


Certum præterea est, ex obseruatis, & accuratè discussis, si apparentem Solis semidiametrum AR, in partes, seu minuta 17. tribuas, eandemque dimidia eiusmodi particula Bb augeas, atque ad interuallum Bb, circulum bcp descriptum, in eoque Maculas circumlatis intelligas; arcus de, ef, fg, gh, hi, iK, &c. vsque ad occasum o &c. interual lis obseruatorijs debitos, inter sese fore æquales, adeoque refractionis inæqualis nullum fore sensum; quã tamen ex modo obseruandi intercessisse, & regulari motu supposito in expositionis circulo bcdop, sentiendam esse euident est. Ex quo rursus motus irregularitatem, & nimiam periodi magnitudinem colligas. nam arcus de, ef, fg, ex vero motu, & refractione compositos esse constat ex modo ob-

II.

seruandi per lentes facto; igitur si inæquales refractionum arcus auferantur ab istis compositis æqualibus, residui erunt inæquales, & minores de, ef, &c. maiores hi, iK, quia ab illis maiores, ab his minores demuntur. Residuum ergo & verus Macularum motus erit inæqualis adeoque irregularis: & quia Macula in e, oritur, apud p, occumbit, erit auersus arcus, eo qui ad nos conuertitur multo maior. &c. Et hoc est tertium.

Tandem certum est, si Maculae adhuc in maioribus circulis, quales sunt q, r, t, y, (qui vnus minuti Bq, distantiam à Sole occupat,) z, a, b, qui duobus; y, a, b, qui tribus; i, a, b, qui quattuor minutis à Sole abest, si inquam Maculae in eiusmodi circulis rotari intelligantur, arcus horizontales, r, s, t, u, v, w, itineri apparenti horizontali EF, respondentes, semper decrescent, medij vero, ot, p, q, r, s, t, u, respectu horum semper augebuntur; (licet absolute etiam semper deficient) igitur si arcus isti horizontales v, w, &c. vna cum refractionis arcubus illis coniunctis, minores nihilominus sunt, medijs o, p, &c. quanto minores erunt illi istis, si refractionis arcus vtriusque dementur, illic maiores, hic minores? Vnde patet quantum, ex hac nimirum tantula Macularum à Sole remotione, intolerabilem irregularitatem, & motus inæqualitatem nullis corrigendam industrijs, in hoc alioqui ordinatissimum Phænomenon induci.

Ista autem inæqualitas ideo enascitur, quia quo magis circuli à centro A remoti assumuntur, hoc arcus illorum inter parallelas intercepti amplius in rectitudinem exporriguntur, & de transuerso spatio minus occupant, vt consideranti patet. Cum autem hæc incommoda omnia plenissimè, & planissimè euitentur, sola, & vnica Macularum solarium in Solem collocatione; ipsas in eodem inesse nullum penitus arbitror vlli in posterum dubium futurum.



I.

II.

SCHOLIUM.

Epitome dictorum.

Quandoquidem ex vero, genuino & regulari Macularum motu liquido satis ostensum sit, easdem à Sole ad paucula etiam minuta secunda extrahi non posse, dispiciat nunc secum prudens Lector quid fidei & auctoritatis tribuendum iudicet illis, qui exiguis & male factis, & ab alijs emendicatis observationibus nullis præuijs solidis examinibus, sola animi lubentia, & magis præiudicijs quàm veritate animosi, manus violentas in hoc Phænomenon iniecerunt, Maculasque & Faculas à Sole, non ad vnum minutum; non ad vnum duntaxat gradum, sed ad multos auulserunt. quos per singula refutare non est operæ pretium; satis Phænomenon ipsos castigat, dum errores ipsorum suq̃ quotidiano, ordinato & regulari incessu increpitat.

Primò. Si Macularum cursus liber, aut ablata vel ad æqualitatem redacta Refractionis anomalia habeatur, & ex eo parallelæ in alicuius circuli perimetrum emittantur, vt arcus æquales tam inter se, quam temporibus obseruatis abscindantur; si inquam hæc practicè fiant: circuli isti in quibus ista intersectionum æqualitas accidit, semper inueniuntur præcise in superficie Solis inexistere; & habeo hoc ex praxi & ordinata obseruatorum digestionem: vnde non suppono, sed infero, Si Macularum cursus sit regularis, ipsum ex obseruatis in Sole ponendum.

Secundò. Si vero ex obseruationibus per lentes peractis adeoq̃, Refractionibus inæqualibus obnoxijis procedatur, Nunquam extra Solis circulum vllus cursus regularis, & refractioni conueniens reperietur. Vti fuse probaui.

PRO.

I.

*Ex hypothe-
si motus re-
gularis, &
æquabilis,
sequuntur
arcus aqua-
libus tempo-
ribus aqua-
les.*

regulariter circa centrum A gyrata fuerunt, si id absque vlla refractione, aut cum refractione æquabili (de cuius possibilitate iam non disputo) factum, & obseruatum fuit; certum est, si ex obseruationum punctis, E, F, G, H, &c. perpendiculares EP, FQ, GR, HS, &c. emittantur, in perimetrum Solis BCD, illas abscissuras, arcus PQ, QR, RS, &c. inter se æquales, motu regulari & vniiformi posito; Est enim vt tempus interualli EF, ad tempus interualli FG, &c. ita arcus PQ, ad arcum QR, &c. tempora autem EF, FG, sunt æqualia; ergo & arcus PQ, QR, inter se pariter æquantur. Et hoc est vnum.

*Obseruatio
motus regu-
laris per len-
tes facta, ex-
hibet in Sole
arcus inæ-
quales.*

Certum deinde est, si Maculis in Sole positis, & regulariter circumlatis, interualla diurna EF, FG, GH, consignentur Sole per lentes transmissio, arcus PQ, QR, RS, &c. ipsis correspondentes, futuros inter se refractione inæquales, & maiorem PQ, quam QR, hunc autem maiorem quam RS, vsque ad arcum TC, & CV, exinde semper priorem posteriore minorem vsque ad Z; & hoc ideo, quia si sine refractione fuissent æquales, accedentibus refractionum arcubus inæqualibus, toti inter se fient inæquales; cumque propter obliquiores incidentias arcus PQ, & Oa, fortius refringantur, &c. patet, & hæc veritas; quod est secundum.


Certum præterea est, ex obseruatis, & accuratè discussis, si apparentem Solis semidiametrum AB, in partes, seu minuta 17. tribuas, eandemque dimidia eiusmodi particula Bb augeas, atque ad interuallum Bb, circulum bcp descriptum, in eoque Maculas circumlatas intelligas; arcus de, ef, fg, gh, hi, iK, &c. vsque ad occasum o &c. interualis obseruatorijs debitos, inter sese fore æquales, adeoque refractionis inæqualis nullum fore sensum; quã tamen ex modo obseruandi intercessisse, & regulari motu supposito in expositionis circulo bcdop, sentiendam esse euident est. Ex quo rursus motus irregularitatem, & nimiam periodi magnitudinem colligas. nam arcus de, ef, fg, ex vero motu, & refractione compositos esse constat ex modo ob-

II.

seruandi per lentes facto; igitur si inæquales refractionum arcus auferantur ab istis compositis æqualibus, residui erunt inæquales, & minores de, ef, &c. maiores hi, iK, quia ab illis maiores, ab his minores demuntur. Residuum ergo & verus Macularum motus erit inæqualis adeoque irregularis: & quia Macula in e, oritur, apud p, occumbit, erit auersus arcus, eo qui ad nos conuertitur multo maior. &c. Et hoc est tertium.

Tandem certum est, si Maculae adhuc in maioribus circulis, quales sunt q r e y, (qui vnus minuti Bq, distantiam à Sole occupat,) z a b, qui duobus; 7 d, qui tribus; 8 e, qui quattuor minutis à Sole abest, si inquam Maculae in eiusmodi circulis rotari intelligantur, arcus horizontales, r f, s, a, u, v, itineri apparenti horizontali EF, respondentes, semper decrescent, medij vero, o t, p a, q d, o a, respectu horum semper augebuntur; (licet absolute etiam semper deficient) igitur si arcus isti horizontales v &c. vna cum refractionis arcubus illis coniunctis, minores nihilominus sunt, medijs o a, &c. quanto minores erunt illi istis, si refractionis arcus vtriusque dementur, illic maiores, hic minores? Vnde patet quartum, ex hac nimirum tantula Macularum à Sole remotione, intolerabilem irregularitatem, & motus inæqualitatem nullis corrigendam industrijs, in hoc alioqui ordinatissimum Phænomenon induci.

Ista autem inæqualitas ideo enascitur, quia quo magis circuli à centro A remoti assumuntur, hoc arcus illorum inter parallelas intercepti amplius in rectitudinem exporriguntur, & de transuerso spatio minus occupant, vt consideranti patet. Cum autem hac incommoda omnia plenissimè, & planissimè euitentur, sola, & vnica Macularum solarium in Solem collocatione; ipsas in eodem inesse nullum penitus arbitror vlli in posterum dubium futurum.



I.

SCHOLIUM.

Quandoquidem ex vero, genuino & regulari Macularum motu liquido satis ostensum sit, easdem à Sole ad paucula etiam minuta secunda extrahi non posse, dispiciat nunc secum prudens Lector quid fidei & auctoritatis tribuendum iudicet illis, qui exiguis & male factis, & ab alijs emendicatis observationibus nullis præuijs solidis examinibus, sola animi lubentia, & magis præiudicijs quàm veritate animosi, manus violentas in hoc Phænomenon iniecerunt, Maculasque & Faculas à Sole, non ad vnum minutum; non ad vnum duntaxat gradum, sed ad multos auulserunt. quos per singula refutare non est operæ pretium; satis Phænomenon ipsos castigat, dum errores ipsorum suo quotidiano, ordinato & regulari incessu increpitat.

II.

Epitome dictorum.

Primò. Si Macularum cursus liber, aut ablata vel ad æqualitatem redacta Refractionis anomalia habeatur, & ex eo parallelæ in alicuius circuli perimetrum emittantur, vt arcus æquales tam inter se, quam temporibus obseruatis abscindantur; si inquam hæc practicè fiant: circuli isti in quibus ista intersectionum æqualitas accidit, semper inueniuntur præcisè in superficie Solis inexistere; & habeo hoc ex praxi & ordinata obseruatorum digestionem: vnde non suppono, sed infero, Si Macularum cursus sit regularis, ipsum ex obseruatis in Sole ponendum.

Secundò. Si vero ex obseruationibus per lentes peractis adeoque, Refractionibus inæqualibus obnoxijis procedatur, Nunquam extra Solis circulum vllus cursus regularis, & refractioni conueniens reperietur. Vti fuse probaui.

PRO.

I.

*Ex hypothe-
si motus re-
gularis, &
æquabilis,
sequuntur
arcus aqua-
libus tempo-
ribus aqua-
les.*

regulariter circa centrum A gyratæ fuerunt, si id absque vlla refractione, aut cum refractione æquabili (de cuius possibilitate iam non disputo) factum, & obseruatum fuit; certum est, si ex obseruationum punctis, E, F, G, H, &c. perpendiculares EP, FQ, GR, HS, &c. emittantur, in perimetrum Solis BCD, illas abscissuras, arcus PQ, QR, RS, &c. inter se æquales, motu regulari & vniformi posito; Est enim vt tempus interualli EF, ad tempus interualli FG, &c. ita arcus PQ, ad arcum QR, &c. tempora autem EF, FG, sunt æqualia; ergo & arcus PQ, QR, inter se pariter æquantur. Et hoc est vnum.

*Obseruatio
motus regu-
laris per len-
tes facta, ex-
hibet in Sole
arcus inæ-
quales.*

Certum deinde est, si Maculis in Sole positis, & regulariter circumlatis, interualla diurna EF, FG, GH, consignentur Sole per lentes transmissio, arcus PQ, QR, RS, &c. ipsis correspondentes, futuros inter se refractione inæquales, & maiorem PQ, quam QR, hunc autem maiorem quàm RS, vsque ad arcum TC, & CV, exinde semper priorem posteriore minorem vsque ad Z; & hoc ideo, quia si sine refractione fuissent æquales, accedentibus refractionum arcubus inæqualibus, toti inter se fient inæquales; cumque propter obliquiores incidentias arcus PQ, & Oa, fortius refringantur, &c. patet, & hæc veritas; quod est secundum.


Certum præterea est, ex obseruatis, & accuratè discussis, si apparentem Solis semidiametrum AR. in partes, seu minuta 17. tribuas, eandemque dimidia eiusmodi particula Bb augeas, atque ad interuallum Bb, circulum bcp descriptum, in eoque Maculas circumlatas intelligas; arcus de, ef, fg, gh, hi, iK, &c. vsque ad occasum o &c. interual lis obseruatorijs debitos, inter sese fore æquales, adeoque refractionis inæqualis nullum fore sensum; quàm tamen ex modo obseruandi intercessisse, & regulari motu supposito in expositionis circulo bcdop, sentiendam esse euidens est. Ex quo rursus motus irregularitatem, & nimiam periodi magnitudinem colligas. nam arcus de, ef, fg, ex vero motu, & refractione compositos esse constat ex modo ob-

II.

seruandi per lentes facto; igitur si inæquales refractionum arcus auferantur ab istis compositis æqualibus, residui erunt inæquales, & minores de, ef, &c. maiores hi, iK, quia ab illis maiores, ab his minores demuntur. Residuum ergo & verus Macularum motus erit inæqualis adeoque irregularis: & quia Macula in e, oritur, apud p, occumbit, erit auersus arcus, eo qui ad nos conuertitur multo maior. &c. Et hoc est tertium.

Tandem certum est, si Maculæ adhuc in maioribus circulis, quales sunt q r e y, (qui vnus minuti Bq, distantiam à Sole occupat,) z aß, qui duobus; 7 aß, qui tribus; 8 aß, qui quattuor minutis à Sole abest, si inquam Maculæ in eiusmodi circulis rotari intelligantur, arcus horizontales, r s, s a, a u, u i, itineri apparenti horizontali EF, respondentes, semper decrescent, medij vero, ot, π a, s a, σ a, respectu horum semper augebuntur; (licet absolute etiam semper deficient) igitur si arcus isti horizontales v i &c. vna cum refractionis arcubus illis coniunctis, minores nihilominus sunt, medijs σ a, &c. quanto minores erunt illi istis, si refractionis arcus vtriusque dementur, illic maiores, hic minores? Vnde patet quartum, ex hac nimirum tantula Macularum à Sole remotione, intolerabilem irregularitatem, & motus inæqualitatem nullis corrigendam industrijs, in hoc alioqui ordinatissimum Phænomenon induci.

Ista autem inæqualitas ideo enascitur, quia quo magis circuli à centro A remoti assumuntur, hoc arcus illorum inter parallelas intercepti amplius in rectitudinem exporriguntur, & de transuerso spatio minus occupant, vt consideranti patet. Cum autem hæc incommoda omnia plenissimè, & planissimè euitentur, sola, & vnica Macularum solarium in Solem collocatione; ipsas in eodem inesse nullum penitus arbitror vlli in posterum dubium futurum.



I.

II.

SCHOLIUM.

Epitome dictorum.

Quandoquidem ex vero, genuino & regulari Macularum motu liquido satis ostensum sit, easdem à Sole ad paucula etiam minuta secunda extrahi non posse, dispiciat nunc secum prudens Lector quid fidei & auctoritatis tribuendum iudicet illis, qui exiguis & male factis, & ab alijs emendicatis observationibus nullis præuijs solidis examinibus, sola animi lubentia, & magis præiudicijs quàm veritate animosi, manus violentas in hoc Phænomenon iniecerunt, Maculasque & Faculas à Sole, non ad vnum minutum; non ad vnum duntaxat gradum, sed ad multos auulserunt. quos per singula refutare non est operæ pretium; satis Phænomenon ipsos castigat, dum errores ipsorum suo quotidiano, ordinato & regulari incessu increpitat.

Primò. Si Macularum cursus liber, aut ablata vel ad æqualitatem redacta Refractionis anomalia habeatur, & ex eo parallelæ in alicuius circuli perimetrum emittantur, vt arcus æquales tam inter se, quam temporibus obseruatis abscondantur; si inquam hæc practicè fiant: circuli isti in quibus ista intersectionum æqualitas accidit, semper inueniuntur præcise in superficie Solis inexistere; & habeo hoc ex praxi & ordinata obseruatorum digestionem: vnde non suppono, sed infero, Si Macularum cursus sit regularis, ipsum ex obseruatis in Sole ponendum.

Secundò. Si vero ex obseruationibus per lentes peractis adeoque Refractionibus inæqualibus obnoxijis procedatur, Nunquam extra Solis circulum vllus cursus regularis, & refractioni conueniens reperietur. Vti fuscè probaui.

PRO.

I.

PROPOSITIO V. PROBLEMA I.

INAEQUALITATEM REFRA-

*ctionis hactenus tractatam, & in**Observationes redundantem**experientia practica,**luculenta exhi-**bere.*

CAP. XXVIII.

*Cur expe-
rientia pro
stabilenda
Refractione
afferantur.*

Quanquam huiusce rei euidencia ex prioribus doctrinis abunde elucescit, ut apud rerum opticarum peritos, quidquam scrupuli reliquum futurum haud aestimem; quia tamen apud rudiores, ea quae sensui subiiciuntur magis mouent, & animum suauius erudiunt, ipsosque doctos plurimum communiter oblectant, & res haec non tantum ad meum institutum, sed in se quoque ad vniuersam refractionis naturam multum subsidij confert; supersedendum non censui, quo minus aliquot insignes, neque, ut opinor, ab ullo prolatas, afferam experientias, singulari studio stabilendae veritatis huius gratia, à me exco- gitatas, quarum prima sit ista.

*Descriptio
fabrica ex-
perimenta-
lis.*

Describe in charta aliqua crassiuscu- la & rigida, seu tenui aliqua lamella metallica, circellum aliquem minimum eiusque peripheriam diuide in portio- nes aequales, & pares numero, verbi gratia, duodecim, tum ductis per diui- sionum puncta opposita diametris dua- bus sese in centro ad rectos secantibus, reliqua puncta ab iisdem eque remota, iunge parallelis, sese passim ad rectos secantibus. deinde omnia diuisionum puncta in circelli perimetro, & sectio- num intra circellum in lineis rectis fa- cta, perfora acu subtili: postmodum accipe lentem vtrunque conuexam, sphaerae paruae segmentum, item cauiam sphaerae quoque paruae portionem, sed cauaturae amplae, ut species à conuexa, transmissas simul omnes capiat. Hasce lentes in tubum debite colloca, & cir- cellum foraminosum in proportionata remotione ante conuexam lentem ap- plica: quibus factis Solem per illa fora- minula in lentes admitte, & per hasce in chartam conueniente distantia op-

*Applicatio
ad usum.*

II.

1 positam recipe: videbis omnia forami-
nula tanquam stellulas tralucencia, &
in maximi circuli peripheriam pro-
recta omniaque puncta, quae in,
5 charta pertusa secundum rectam li-
neam fuerant disposita, in alteram
chartam radiorum receptricem venire
lineis curuis, conuexis erga centrum,
concauis aduersum perimnetrum: hoc
10 autem non fieri, nisi sola lentium refra-
ctione sic probo.

*Ab hac ex-
perientia
refractio pro-
batur.*

Primo, Si Solem per nuda foramina in chartam excipio amotis ambabus lentibus, is in chartam per foraminula
15 in rectum disposita affulget stellulis secundum lineas rectas dispositis, idque intra circulum multo minorem. Igitur quod foramina ista in maiorem circu- lum dilatentur, & à situ rectilineo in-
20 curuileum abeant, id totum fit à Re-
fractione.

Secundò, Si alios tubos longiores, vel breuiore praeposito circello fora- minoso adhibeo, fiunt curuitates ma-
25 iores vel minores, licet per eadem fo-
ramina transmittam Solem.

Tertiò. Si eadem tentem ad cande- lam accensam, fient similia, & propor- tionalia, sed semper aliter atque aliter,
30 pro ratione collocationis, & distantia-
rum; nude tamen transmissa, semper augentur secundum lineas rectas, quae sita sunt in rectis, licet augmentum hoc non aequet illud quod fit per lentem.

35 Quod autem describo, & requiro
tubum tam breuem, non est quod lon-
gi idem non efficiant, sed quod in ex-
perientiam practicam difficillimè de-
ducantur, propterea quod circellus in
40 charta, seu lamella perforatus, & soli
antè conuexam lentem apponendus, ita debeat à conuexa lente distare, ut singula foraminula Solem deducant di-
screte non confuse, id quod ob nimiam
45 ipsius distantiam in longis tubis ad pra-
xin vix potest redigi, in breuibz autem commodius: cuius gratia totum nego-
tium per Telioscopium breue descripsi.

Exemplum habes in adiecta figura
50 in qua ex a, assumpto centro, ad in-
teruallum a b, descriptum vides circel-
lum b c d e h i, cuius tota peripheria
diuisa est per puncta b, c, d, & c. in par-
tes duodecim aequales, quae deinde à
55 quattuor principalibus b, e, h, & i,
aque

*Exempli in
figura appo-
siti expla-
natio.*



I. æque utrimque remota, iuncta sunt re-
ctis parallelis, c g, d f, n i, m K; item
n c, m d, K f, i g; quæ rectæ sese interse-
cant in punctis o, p, q, r, s, t, u, x, y, z,
æ, fiuntque spatia quadrata, & rectan-
gula altera parte longiora. oportet au-
tem circellum istum lente conuexa, &
multo magis caua minorem assumi, a-
lioquin speci es foraminum illam exce-

II. deret. Singula igitur ista diuisionum
& intersectionum puncta acu subtilissi-
ma perforauit, Solemque per ipsa trans
Telioscopium apte compositum in
chartam tralucidum excepi, & inueni
diuisionibus, & intersectionibus puncta
correspondentia, in perimetro quidem,
β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν; in area vero,
ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω, ς; quæ cum
iaceant

I.

iaceant in lineis, ut patet, curuis, progressaque sint à punctis in directum digestis; liquet refractione locis proportionalibus esse eiecta. Nam licet extrema puncta omnia in circuli perimetrum conspirent, intervallisque æqualibus à se mutuo distent, adeoque aream circuli perfectam concludant, intermedia tamen simili proportionem non incedunt sed quæ centro vicina, æquo quasi passu refractionis augescunt, ideoque curvitaris exilis differentia visitur; quæ vero à centro magis procedunt, dissimiliter sese dilatant; nam ρ amplius refractione abiit à centro, quam ν , & γ , magis quam ρ &c. Hinc videmus lineas $\gamma \rho \nu$, &c. resultare curvas; quæ tamen ex lege refractionis equalis, & uniformis, (quam nos impugnamus, & ex ipsa hac experientia inæqualem, & difformem astruimus) si qua daretur, aut data supponeretur, deberent esse rectæ, & punctum ρ , itemque γ , in recta linea $\nu \rho$, iacere.

*Circulus extremus substat Refractioni diffor-
mi.*

Hinc Concludo primo. Circulum $\beta \rho$, refractione generatum, esse maiorem, quam ut refractioni uniformi, & æquabili correspondeat alioqui puncta ν , ρ , motus apparentis, in diametro $a \rho$ facti deberent correspondere punctis γ , δ , quod non fit. nam perpendiculares $\nu \rho$, $\rho \delta$, abscindunt arcus $\beta \rho$, $\beta \delta$, minores, quam sint $\beta \gamma$, $\beta \delta$, ut patet. Causa, ut semper dixi quia $a \nu$, est vicinior centro a , quam $a \rho$, & hæc vicinior quam $a \rho$, id est $a \delta$, & $a \gamma$. unde etiam si omnes hæc suppositæ Maculæ vel Faculæ ν , ρ , ν , ρ , γ , vel ρ , ρ , δ , in uno & eodem parallelo Solis, cuius diameter sit 1, 3; vel 2, 4; existant; tamen propter incidentiam in lentem vel lentis Telioscopicas situ, & obliquitate differentem, refractione in chartam saliet extra lineam rectam, & feretur secundum curvam, non obstante, quod in ipsam lentem convexam aut concavā, incidentia sit secundum superficiem planam. quam vocamus planum refractionis.

Concludo secundo, Locum 1, à perpendiculari $\nu \rho$, designatum, non esse verum seu refractioni debitum, sed vero minorem. alioquin, cum ν sit & ponatur in arcu circuli $a \rho$, ad circulum observatorium $\beta \rho$ erecti: si moveri ille

II.

1 circulus $a \rho$, & sensim deprimi cogitetur donec ν ad horizontem $\beta \rho$ deueniat, non caderet ν in γ , sed in 1, & sic refractionis difformitas cessaret. quæ omnia sunt falsa, & contra hanc experientiam, venit enim ν per ρ in γ . Cur autem punctum ν in sphaerica Solis superficie, sensim circa inuariatum axem $a \rho$, in eodem plano, per 1 & 3 traducto, & ad solarem circulum, erecto, &c. descendens, non maneat in linea $\nu \rho$, sed expacietur in ρ , & cum horizontem attingit, appareat in γ , ratio est, quia quo magis à centro Solis Macula ν , verbi gratia, recedit, hoc amplius quoque radius ab ipsa in lentes emissus, ab axe earundem discedit, & obliquiorem incidentiam parit, quæ refractiones maiores, & circulos Solis semper ampliores exhibet. qui proinde etiam loca Macularum ampliant. Et hinc est, quod locus 1 per perpendicularem $\nu \rho$, demonstratus, sit minor, quam ut loco γ , per refractionem facto possit correspondere. Ex quo deinde ratio clara redditur, cur mensura $a \nu$, aut similis in observatis assumpta, sit nimis parua ad peripheriam $\beta \rho$ & plures vel dies vel horas afferat pro cursu vero, quam res patiatur. Assumitur enim ipsa ad perimetrum $\beta \gamma \rho$, refractione maiorem, quam ut sit similis vel æqualis illi circulo, qui subiacet Refractioni circa centrum contingente, qui circulo horizontali semper minor est.

35 Concludo tertio. Mensuram 2, vel $\rho \delta$, ex arcu rectæ lineæ $\rho \delta$, respondente desumptam, esse nimis magnam. Patet ex priore. Quia $a \rho$, dat perpendicularem $\rho \delta$, quæ abscindit arcum $\beta \delta$, nimis paruum, & punctum 2 non est locus verus, ergo complementum ipsius 2, est arcus nimis magnus. Et probatur, ut ante, si ρ ex sublimi moveri cogitetur versus 2, &c. cadet in δ . &c. per refractionem.

45 Concludo quarto. Loca γ & δ , debere cadere post 1, & 2, versus ρ , quia arcus $\beta \rho$, 1, & $\beta \delta$, 2, sunt veris minores, qui veri ergo debent esse maiores, qui sunt ab experientia $\beta \gamma$, & $\beta \delta$.

55 Concludo quinto. arcus $\beta \gamma$, $\gamma \delta$, $\delta \rho$, inter se debere esse æquales, quia respondent arcibus $b c$, $c d$, $d e$, qui sunt etiam æquales; Refractionum autem

I.

si per vitrum vniformis & æquabilis re-
fractio, (quæ alioquin ex parte rei non
fit) antecessisset ; suntque omnia spa-
tia 8, 7; 7, 9; 9, 10; inter se æqualia,
& arcubus, β , γ , δ , ϵ , similia & propor-
tionalia . quod sic probatur. in triangu-
lo a γ 5, sunt parallelæ 5 γ , & ν 7;
igitur vt ν 5, differentia ad ν a, ita 7 γ ,
ad 7 a. &c.

Idem alio
exemplo.

Eodem modo ex habita differentia, 10
 ϕ 8, inter a ϕ , & a σ , inuenietur locus
11, vbi perpendicularis ϕ 2, & radius a δ ,
se se interfecāt, per quam ex a, ad inter-
uallum a, 11, ductus circulus, dabit
reliquos locos, & inter locos motus 15
æquales, 11, 13; & 13, 14, ibi nimi-
rum, vbi radios a β , a γ , a ϵ , &c. in-
tersecat. &c.

Eadem regula applicanda est diffe-
rentijs Refractionum ex obseruationi-
bus per circuli solaris traductiones re-
pertis ; de quibus suis locis .

Quod si Sol refractus in ν secundum
hanc refractionem, per impossibile,
in reliquis æquabiliter processisset, to-
tius æquabilis huius refractionis cir-
culus fuisset, 8, 7, 9, 10. locaque
vera extitissent eadem puncta, 8, 7,
9, 10, in superficie Solis æquabiliter
refracti posita . sed loca deinde appa-
rentis motus ad radium a ϵ , in planum
circuli solaris ex circulo 8, 7, 9, 10, e-
leuato & perpendiculariter superstante,
procumbentem fuissent a, ν , 15, 10;
perpendicularibus 9, 15; 7 ν ; & 8 a, de-
signata: fuissentque tam loci apparen-
tes a, ν 15, 10, locis incidentibus, a, u, x,
e; quam motus apparētes a, ν , 15; 15,
10; motibus in lentes incidentibus non
refractis, a u, u x, x e, similes & per
omnia proportionales . item arcus 8, 7;
7, 9; 9, 12, ex æquabili refractione
creati, similes & proportionales arcu-
bus non refractis b c, c d, d e: sic de-
nique rectangula ν 16; & 15, 17; rec-
tangulis u o, & x r, & quadrata ν π ,
& ν quadratis u z, proportionalia .

Punctum deniq. 7, punctum motus
& loci veri, prout in Sole per lentem
ad ν , refracto haberi potuisset . Eodem
modo punctum 11, dabitur, cum reli-
quis omnibus & singulis homologis at-
que correspondentibus arcubus, lineis
& arcis in circulo 14, 13, 11, 12. Erunt-
que loca vera, prout refractioni inæ-

II.

quali punctorum ϕ , ρ , & ϵ , subiacent, 7,
11, σ , per quæ arcus curuilineus ince-
dens, erit motus, à vitri refractione
caussatus, quæ refractione figuram Solis
sphæricam in lenticularem deducit, ef-
ficatq. Solem latiore quam altiore
vt consideranti patebit .

Si vero loca vera secundum æquatio-
nem interuenientem consideramus, e-
runt ea vel γ , δ , ϵ , in circulo maximo;
vel 14, 13, 11, 12, in circulo medio ex
loco apparente & progenito; vel 8, 7,
9, 10, ex ν prognato: & omnia semper
existent in superficie Solis extima, si
Sol fingatur vniformiter refractus . Et
licet Solis refractione vniformis nulla de-
tur, modo tamen isto, in locorum ve-
rorum cognitionem deuenitur, & scitur
Maculas extra Solis superficiem non
exire, supposito motu regulari .

Obijcies: Refractio vniformis, per
dictas Telioscopij lentes, & præmissam
doctrinam est impossibilis; ergo non
potest fingi vlla facta vel facienda refra-
ctio æquabilis. Respondeo, verum esse,
refractionem talem non dari, vt ipsa
sponte sua ita progrediatur, quæ vel ra-
tioni sinuum, trangentium & secantium
certa aliqua lege conformetur, vel pro-
gressione quadam regulari & propor-
tionali ex se sciatur; nihilominus tamen
esse quosdam modos practicos, quibus
omnino ad æqualitatem saltem sensibi-
lem reducat, vt deinde locus & mo-
tus verus habeatur, haud aliter, ac si re-
fractio nulla vel æquabilis interuenisset.

Etenim sicut certū est, refractionem
circa medium fieri sine magna aut no-
tabili varietatis differentia, propter in-
cidentias ad sēsum rectas, ita vt sensibi-
le discrimen inter illas, vix vllum aduer-
tatur; ita certū est, limites illos, tanquā
refractioni nulli obnoxios, cū itineribus
Macularum naturalibus sine refractione
cognitis cōparari posse per obseruatio-
nes, & assumi in examinibus . nam inter
motum Macularum naturalem omniq.
refractione carentem, & inter motum
refractione affectum, comparatio regu-
laris, non ideo non potest institui, quod
motus & mobile refractioni subiectum,
sit auctum, hæc inquam ratio nō est dis-
proportionis; (nam motus & mobilia
circa centrum refractione aucta, sunt ad
sensum saltem, quod mihi sufficit, non
refra-

Obiectio cō-
tra dictam
reuocationē
æquabilem.

Satisfit.

Doctrina
fundamenta-
lis & nota-
tu dignissi-
ma.

Modus inæ-
qualitatem
Refractionis
ad æqua-
bilitatem
proportiona-
tam reuocā-
di, beneficio
differentia
cognita &c.

I.

refractis motibus & mobilibus proportionalia) sed ideo motus & mobile refracta, irrefractis motibus & mobilibus comparari non possunt, quod refractiones sint irregulares & augeant sine certa & cognita proportionum regula. Unde ut certi & solidi aliquid possit statui, inæqualitas ista, ad quandam æquabilitatem, dictis, & dicendis modis per inuentas differentias est reuocanda: si nimirum ex mediarum & extremarum refractionum cognita differentia, vel diminutione vel augmentatione diametrorum vel perimetrorum proportionali facta & eruta aliquam ad mediocritatem deueniatur. Quomodo autem differentia eruantur, & ex illis deinde procedatur, præter dicta ostendetur sensim vberius.

*Experientia allata Applicatio ad
Phænomenon Solare.*

His nunc ita expeditis, conuerto me ad meas Macularum obseruationes, atque obseruationum expositiones, & dico eodem penitus modo sese res inibi habere, sicut cum allato & explanato experimento. Nam quod Sol & Solis partes sunt per ista minima foramina transmissæ, & in lentes vitreas admissæ, atque ipsarum ope refractæ, hoc sunt in ipso Phænomeno per Telioscopium obseruato, Macule & Facule Solis: eodem namque modo in iisdem lentibus infringuntur. Et quod foramina simul & semel vno obtutu, hoc Macule & Facule successiue agunt & patitur. Si quidem quod vna aliqua Mac. Solis sensim peruagata patitur refractionis à Telioscopio, hoc sustineret ab eodem, si simul & semel vel ipsa, vel aliæ similes, in locis successiue occupandis, ponerentur eo quod lentes eadē & ipsarum in Telioscopio similis & recta dispositio Telioscopijque applicatio debita supponatur.

Macula autē in Sole versata maiorem vel minorem refractionē subit, non præcisè quia in hac vel illa Solis parte heret, sed quia hūc vel illum plani refractionis radiū, prope vel procul à centro aut axe lentium positū subit: quia autem ex vsitato rectoque obseruandi ordine, Solis circulus circulo obseruatorio non tantum æqualis sed & perfectè cōgruus fit, hinc est, ut Macule orientales & occidentales

II.

1 plus refringantur, quam centrales, quia videlicet orientales in Sole Macula, constituantur in orientali & marginali circuli obseruatorij plaga, occidentales in 5 occidentali; & per hoc sub obliquiores incidentiarum radios collocantur, quam centrales. Quod si eadem Macule oriuntur aut occidunt in Sole, occupent medios obseruatorij circuli radios, minus refringentur, quam quæ sunt in Solis medio constitutæ, & ad extrema circuli obseruatorij collocatæ: quia Macularum refractionem maiorem aut minorem non 10 constituit situs in Sole, sed in lentibus & planis lentium refractorijs radiorumque incidentiæ quos incurant, vis & natura qui radij lentium situ inuariato, sunt immutabiles, ipsi autem speciem solarem situ alio alioque incidentem mirum 20 in modum mutant. & hoc est vnum ex ijs, quæ singulariter sunt notanda.

25 In hoc etiam obseruationes cum dicto experimento conueniunt, quod semper, si per arcum circuli obseruatorij diurno segmento centrali respondentem, totum semicirculum, vel ipsius quadrantem mensuro, plus inuenio temporis (ut aliquoties dixi) & moræ quam ex parte rei debet reperiri: si vero idem præsto per arcum horizonti proximum, minus acquirō. Quare? 30 quia minor arcus diurnus, sæpius inuenitur in circulo obseruatorio eodem, quam arcus diurnus maior. Ex arcuum autem differentia arguitur refractionem inæqualitas & illarum differentia obtinetur.

35 Per arcus autem diurnos, intelligo tales arcus qui spatio viginti quattuor horarum decurruntur à Macula in superficie Solis, & interuallo itinerario tanti temporis, in circulo obseruatorio, post legitimè factam obseruationum digestionem respondent. Interuallum verò itinerarium diurnum, est 45 centri Macule in circulo obseruatorio distantia seu progressio apparens, diurna, tempore viginti quattuor horarum designata: & per expositiones legitimas, in chordas arcuum diurnorum redacta. de quibus reductionibus nunc passim edisserui in prioribus.

Macularum in Sole situs ad refractionem nil facit, sed eandem situs ad lentes &c.

Arcus & interualla diurna itineraria.

Applicatio præfati Experimenti refractionis ad Maculas solares.

Doctrina animaduersione digna.

Cur Macule Solis orientales aut occidentales plus refringantur, quam centrales.

I.

PROPOSITIO VI.

PROBLEMA II.

IN AEQUALITATEM

Refractionis solaris, alia experientia practica exhibere.

CAP. XXIX.

Sol suo motu diurno naturali, refractionis inaequalitatem patefacit.

NON est opus alio excurrere, domi vltro offertur, quod tanto studio aliunde accersitur, Sol ipse, & Tubus obseruatorij, in circulo obseruatorio per Maculam quamuis, vim & naturam lentium inaequaliter refringentium multo luculentissime semper & statim ostendit. Modus autem est iste.

Maculam quamcunque vbicumque in Sole consistentem, vna cum Solis imagine, colloca in horizontem circuli obseruatorij orientalem, illudque punctum nota, tum immoto instumento obseruatorio permittre suum Soli cursum diurnum, & per certa intervalla centrum Maculae in charta confige, donec in occasum pertingat, cuius punctum marginale studiosè nota. igitur aut Macula per centrum circuli obseruatorij transit aut non. si primum, habebis semper vestigium incessus rectilineum, & ex illo nihil ad hanc rem colliges. si secundum, semper quidem ex parte rei iter curuilineum, sed centro affine non multum & vix sensibile, à centro remotum plus & sensibilibiter inflexum describetur. curuitatis facies conuexa, ad centrum semper conuertetur, concaua auertetur ab eodem. Hæc experientia est certa & secuta, nec vlli calamitiae obnoxia; cuius pericula plurima feci. Per hanc experientiam examinabis primo rectam tubi ad feretrum, tum lentium ad tubum positionem. Insuper lentium ipsarum bonam vel malam figuram. Nam si omnia hæc rectè habent, oportet duos cursus parallelos à centro vtrinque aequaliter remotos, aequaliter curuari: si hoc non fit, aut dictorum aliquid deficit: aut obseruator errauit.

Experientia secuta, per quam multa alia possunt haberi.

Per hanc insuper experientiam addisces, quantum in assumpta qualibet à

II.

I centro distantia, lentes tubi in refringendo excedant circa margines, quantum deficiant circa centrum. Recta enim, quæ horizontalia puncta in ortu & occasu signata necit, dabit in medio itineris curuati differentiam quaesitam. &c. Hæc regula magni momenti est, & tamen facillima.

Refractionum differentia ad discitur.

Præterea ipsos diuersos tubos inter se comparabis, & ex maiore vel minore curuitate, cæteris paribus, virtutes illorum & differentias in refringendo addisces.

Tuborum in refringendo differentiam indagare.

Causam etiam habes, cur in rectilineis Macularum cursibus fere semper addiderim, illos esse ad sensum æquales vel similes, quia etiamsi motus annuus ad curuitatem nil conferret, etiamsi Macularum axis in horizonte solari planissimè recumberet, iste tamen obseruandi modus, rectilineum Macularum cursum refractione nonnihil inflecteret magis vel minus, pro qualitate tubi, & magno vel paruo recessu paralleli à centro circuli obseruatorij.

Curuitas ex Refractione redundat in itinera Macularum.

COROLLARIUM I.

Hinc sequitur Macularum cursus curuilineos, versus centrum concauos, ob hanc ipsius renitentem apparentiam, nonnihil rectiores; conuexos ob secundantem, aliquanto curuiores fieri.

COROLLARIUM II.

Item fieri posse, vt cursus aliqui verè curuilinei, euadant rectilinei, & qui sunt verè rectilinei, incuruentur.

COROLLARIUM III.

Cursus præterea vere paralleli, à se met diuariantur, aut conuergunt, & vere diuariantes, apparent esse paralleli. &c.

Conuergentia & diuergentia potest oriri ex Refractione

Hæc inquam & hisce paria fiunt, & fieri possunt ex hac refractionis apparentia; quanquam notabilem sensum in multis non inferunt, nihilominus hæc oportet prouidum obseruatorem nosse, ne aut sibi, aut naturæ phænomeni imputet, quod à refractione contingit: & ne in minutis motus apparent.

Admonitio ad prudentes Astronomos.

I.

parentis insectandis minutus & nimis scrupulosus, ad rigorem geometricum vel Arithmeticum, ad minuta secunda, tertia & quarta gratis reuocet, quæ oblucente, & non emendata refractione, nequidquam id istos atomos reduci possunt. cum tanta scrupulositate opus minime habeamus, instructi alijs tot & tam euidentibus argumentis, vt postea suo loco docebo, quot & quantis nullum celeste Phenomenon vnquam productum aut stabilitum fuit.

Obiectio contra curuitatem ex Refractione ortam, ex parallelis circulis Solis diurnis.

Respondeatur ad obiectiorem.

Dices parallelos circulos, quos Sol extra æquinoctia quotidie describit, respectu nostri non esse concentricos, neque circulos maximos, & ob hanc causam in chartam non posse proijci sub linea recta, sed necessario debere esse curuam &c. ideoque ab ipsis redundare posse hanc curuitatis apparentiam. Respondeo argumentum nimis videri minutum; etenim si ex veritate & ratione philosophari placet, Sol nullum omnino parallelum describit vnquam, sed linea spirali voluitur, ideoque in centro paralleli nullius sumus.

Respondeo secundo, Parallelos æquatori vicinos, posse in censum ipsius assumi.

Respondeo tertio, Diametrum Solis non esse tantam, vt arcus paralleli cuiuscunque per centrum Solis protensus, faciat aliquem curuitatis suæ ad nos sensum, vnde hanc omnem curuitatem à Macula per circulum obseruatorij traiecta, esse à sola lentium refractione est euidentissimum; & confirmatur ex eo, quod eadem Macula vtriusque secus centrum Solis imaginem peruagata, describat itinera conuexis inter se concuexitatibus, cauitatibus autem auersis, ijsq. similibus si vero per centrum transeat Macula, fiat iter omnino rectum. Ergo hæc curuitas est à sola refractione.

C O R O L L A R I V M

Ex hoc patet, iter Macule per centrum assumi posse pro ipso Aequinoctiali, cuius ab Ecliptica declinatio, dabit ipsam Eclipticam inscribendam.

Probaui hanc praxin exemplis multis & securam, facillimamque factitatu deprehendi. Itaque inter alia multa bona, quæ Refractionis inquisitio attulit,

II.

etiam hoc commodi dedit, vt Eclipticæ in circulum obseruatorij impositi possit haberi sine vilo perpendicularis vsu, absque vilo scrupuloso & molesto triangulorum computo, ex sola radiorum Zodiaci gnomonica descriptione, & lineæ huius practica inuentione. Quam habebis si Macula datæ centrum in circuli obseruatorij margine orientali & occidentali dum sponte currente Sole illos occupat, diligenter notata, per lineam rectam coniunxeris: nam si huic lineæ aliam parallelam per centrum obseruatorij circuli traduxeris, erit ipsa quæ ad centrum circuli obseruatorij angulum vna cum Ecliptica comprehendet, quem radius Zodiaci pro illo die in delineata figura ostendet. De quæ re pluribus egi in fine Libri tertij.

Noua & facillima Ecliptica in Circulum obseruatorij inscriptio.

P R O P O S I T I O VII. P R O B L E M A III.

25 *Refractionis Solaris per lentes Telescopicas inæqualitatem alia irrefragabili experientia demonstrare.*

C A P. X X X.

Confinium vmbre & lucis, in superficiem aliquam planam, corpori lucenti directe oppositam, terminari in lineam corporis opaci extremitati similem, est certum, & quotidiana experientia comprobatur. idcirco vmbra terræ in Lunam proiecta rotunda apparet, quia terra globosa est. Corpora vero opaca rectilinea, vmbra suas etiam lineis rectis claudunt. His suppositis.

Elige aliquod parietis perpendiculariter erecti, & tersè incrustati latus, à quo Sol ex parte alluceat, ex parte post parietem lateat; certum est, lateris illius vmbra in plano recto ad Telescopium eiusque lentes accidere, certum tamen etiam est, teste experientia, vmbra huius lateris, post lentes in chartam allapsuram sub linea curua, simul, & semel sub vno positu, & aspectu, quam proinde per puncta pro libito signabis. hanc autem curuitatem à refractione esse, hinc fit euident.

Refractionis inæqualitas alio experimento naturali ostenditur.

Probatio aserti.

Curuitas à sola Refractione probatur oriri, euidenti experimento.

I.

Quia si confinium huius vmbrae per centrum circuli obseruatorij incedat, est linea recta; si extra centrum quaquaversus vmbra hanc excipias, semper apparebit curuitate conuexa ad centrum, concaua versus marginem; minori si sit propinquior, maiori si existat à centro remotior. & hanc veritatem experieris circumcirca; Neque enim opus est, vt vmbra illa sit in plano verticali. Oportet tamen à Telioscopij orificio magnam esse corporis vmbrae distantiam. Et confirmatur fortissime, exemptis à Tubo lentibus, tunc enim vmbra semper in chartam percumbit rectilinea; curuitatem ergo causant insertae lentes, &c. Huius rei feci Romae periculum frequentissimum; & vmbrae curuitatem cæteris paribus, eandem reperi, quam facit Macula transcurrentis circulum obseruatorium, distantia à centro eadem. Hinc Tubi in refringendo varietatem & potentiam poteris facillime expiscari. &c. Si parietem domus, turris, aut columnæ rectæ non habes; erige asserem, tigillum, aut arbo-rem planatam, suspende aut extende chordam, vel funem, &c. & voti compos efficiaris.

PROPOSITIO VIII.
PROBLEMA IV.

Refractionis Solaris inaequalitatem, per datam quancumque in Sole Maculam, alio experimento manifestam facere.

CAP. XXXI.

Refractionis inaequalitas probatur artificiali Macularum in Circulo obseruatorio translatione.

Sole procedes, Solis imagine, cum circulo obseruatorio perfecte coaptata, obseruabis centrum Maculae, & notabis eundem Maculae locum, notatum locum iunges ducta per ipsum & centrum circuli obseruatorij, cæca diametro, ita vt ductam hanc diametrum oculus possit bene discernere. Postea instrumentum ita sensim mouebis, vt Macula in alteram diametri cæcae partem trans centrum deueniat, centrumque circuli obseruatorij inter Maculam & marginem solarem lucidum medio ad sensum loco constet: quo facto, signabis denuo in cæca

II.

diametro locum Maculae; deinde Macula in signato loco retenta, signabis limbi solaris cum cæca diametro intersectionem.

Nam mota super circulum obseruatorium solari Macula, etiam totum solarem circulum lucidum moueri necesse est, & à circulo obseruatorio excentricum fieri.

Hanc igitur Maculae & marginis solaris in cæca diametro inuenta circum centrum circuli obseruatorij distantiam, si accuratè operatus fueris, semper inuenies minorem, quam sit ea, quæ est inuenta initio inter Maculam & limbum, Sole cum circulo obseruatorio homocentricè congruente: cum hoc tamen discrimine, vt quo Macula est centro Solis vicinior, hoc differentia inueniatur minor, quo remotior, eo differentia exoritur maior. Ratio vtriusque physica & optica. Quia Macula & solaris ora in centrales circuli obseruatorij plagas traductæ, collocantur sub radios incidentiæ ad lentem minus obliquos, quam habeant, si circuli sibi perfecte congruant, vnde necessarium est, vt minus in medio, plus refringantur in extremo. Quod si Macula margini propinqua sit, patet vehementer & Maculam & marginem refringi, quia vtræque substant radijs incidentiæ valde obliquis; quando autem transferuntur ad centrum, ob incidentias quasi rectas, multo minor refractione contingit; ex quo huius & extremæ maxima differentia existit.

Eadem ferme fient, si Maculam non vltra, sed tantum in centrum circuli obseruatorij colloques; nam distantia, quæ inter Maculam aliquam & marginem solarem lucidum, dum ambo prope centrum circuli obseruatorij translata sunt, semper inuenietur minor, quam si eadem Macula conferatur cum eodem circuli solaris lucido limbo, dum totus cum circulo obseruatorio coincidit. inuenietur enim, hæc distantia marginalis semper maior, quam illa centralis. Neque ratio vlla subest, quam sola lentium inæqualis refractione, ex inæquali incidentia procreata. &c.

COROLLARIUM I.

Ex his constat, si maior assumitur circulus

I.

*Maiores cir-
culus obser-
uatorius,
quando gi-
gnat maio-
rem refra-
ctionem?*

circulus obseruatorius; refractiones maiores fieri circa margines eiusdem, quam si assumitur minor seruata eadem chartæ à lente caua distantia, & iisdem lentibus ritè accommodatis. Nam his ita se habentibus, conus solaris plus occupat de lente caua, & consequenter, extremi radij incidunt obliquius. Dixi seruata eadem chartæ distantia à lente caua; nam si hæc solæ distantia maior assumpta, circulum obseruatorium auget, refractione ob hoc necessario & sensibilibiter non mutatur.

COROLLARIUM II.

*Ceteris pa-
ribus, ma-
ior hyeme
quam æstate
refractio.*

Seruata eadem Circuli obseruatorij magnitudine item Telioscopio, & lentibus iisdem, hyeme maiores contingunt circa margines refractiones, quam æstate. Quia hyeme solaris conus de lente caua plus occupat, quam æstate; sub obliquioribus igitur incidentiæ lineis aduentat; plus igitur refractionis interuenit. Sed hæc discrepantia sensum fugit, &c.

*Obiectio cõ-
tra Artifi-
ciosam Ma-
cularum
translationem.*

Dices primò, Hæc Macularum solarium traiectio, videtur suspecta, & praxi non verà niti.

Nam secundò, Impossibile est, vt sola tubi motione, Macula aliqua ex intermedijs Solis partibus ad eiusdem oram transferatur.

Deinde tertio, Videmus quidem immoto instrumento, Solem vna cum suis Maculis sensim accedere & recedere à circulo obseruatorio in charta descripto, sed non ideo dicendum est Maculam, eiusque refractionem esse translata, & esse talem, qualis esset si incederet, in illam partem vitri, vnde refringitur ad eundem circulum solarum, quem facit extrema Solis orbita.

Præterea quartò, Moto instrumento, non mutatur conus refractus, sed in circulo luminoso & in chartam projecto semper reperitur Macula, quasi eodem modo se habere ad centrum coni & circumferentiam, id quod est signum manifestum, Maculam non esse translata.

*Obiectio
satisfit.*

Respondeo primò, Si hæc traiectio praxi verà non nititur, falsæ sunt duæ priores allatæ experientiæ naturales, &

II.

tandem omnis refractionis cognoscenda via præscinditur.

Nam hæc praxis, cum prioribus experientijs per omnia concordat, prout millies & amplius tentavi. Quod si Sol immoto Telioscopio Maculam aliquam per circulum obseruatorium ad motum suum diurnum traducit, & traducendo in alias aliasque lentis cauæ partes, ob diuersas obliquitatis incidentias diuersis refractionibus illius iter obnoxiam facit; ideone idem non fiet, si manus accedat, & monendo instrumento compenset ipsissimum motum.

15 Solis? ideone suspecta erit hæc praxis, cum tamen idem fiat motus, idem sequatur effectus? Quem vt euidentissimè manibus palpes, si oculis videre detrectes, ecce tibi. Duc per Circulum obseruatorium diametrum quamecunque ceca linea deinde elige Maculam quamecunque in Sole vbicunque versantem, hanc igitur Maculam dum per ductam diametrum traducis, signa alterius Maculæ extra hanc lineam positæ cursum, à margine circuli obseruatorij ad marginem oppositam pergendo; hoc facto, habebis vestigium illius Maculæ in circulo obseruatorio curuilineum; cui si 30 Sol non descripserit sponte sua simile, & æquale, si in æquali à centro circuli obseruatorij distantia Maculam transuerxit, causâ cadam. igitur si quod natura facit, ars ingeniosa ad vnguem imitatur, idcirco hoc suspectum erit, quia 35 ab arte profectum est, aut natura ipsa, vna cum arte pessumdabitur? Facebant igitur, in re tam clara, tam probata, suspiciose istæ, & arbitrariæ argutiæ: quæ 40 vt amplius eximantur, en aliam experientiam.

Elige Maculam aliquam oræ solari, quam centro viciniorem; obserua eius in obseruatorio circulo locum, per quæ 45 duc in circulo obseruatorio diametrum, & huic aliam diametrum ad angulos rectos, quæ erit obseruationis traductoriæ directrix. Nam si perimetrum lucidi Solis circuli secundum hanc lineam 50 in puncto contingentia, per circulum obseruatorium traduxeris, Maculæque prædictæ vestigium interim à margine circuli obseruatorij ad marginem eiusdem oppositam noraueris, conficiet illud Maculæ per puncta crebra notata 55 vesti-

*Alius tra-
ductionis ar-
tificialis mo-
dus euidentis.*

*Sol sponte
sua similia
vestigia de-
scribit.*

*Alia lucu-
lenta tradu-
ctionis expe-
rientia.*

I.

vestigium, lineam curuam & quidem talem, qualem Sol suis habenis in eadem à centro distantia relictus describeret. Potestne aliquid ad veritatem afferri solidius.

Argumentū factum non officit.

In quo Macularum, & Solis Traiectio consistat?

Respondeo secundo, ad id quod affertur, tubi optici, vel instrumenti motionem nullam in Sole Maculam ē sede sua in aliam, multo minus à medio in extrema traduci; verum id quidem esse, sed nostrae de Macularum translatione sententiae nihilum, quidem officere: nam Macularum Traiectio in hoc non consistit ut Maculae situm, & locum in Sole mutant, friuolum esset hoc cogitare ne dum attendere; sed in hoc, ut situm, & locum mutant in circulo charrae obseruatorio, id quod fieri posse, ostendo ex eo, quod Sol ipse, nemine procurante, continenter hoc faciat, qui coni sui luminosi circulum, semper aliorum deflectit in circulo obseruatorio, quod ergo Sol facit, stante machina obseruatoria, aio me, facere posse, quaque versus eadem mota. Vnde

Responsio ad tertium.

Respondeo tertio, ad tertium. quando obijcitur, si Sol immoto instrumento percurrit suo cono, & basi lucida, Circulum obseruatorium, & ad eius centrum defert & aufert iterum aliquā Maculam, hanc non esse dicendam Maculae translationem; respondeo, inquam, negando quod asseritur; nam haec est Maculae meae traiectione quam pretendo, & non alia, quae cum ex ipsa obiectionis confessione datur, & quidem sponte naturae, quid vetat ipsam sic appellare? Certe secundum veram philosophiam ad esse sequitur dici. Macula in Sole, & una cum Sole transit ab oriente circuli obseruatorij per medium ad occidentem eiusdem, idque momentis singulis spectante oculo, & id quod oculus videt nemo vtrique vetabit linguam eloqui, Sed vrget, etiamsi transierit Macula, seu sponte seu manu artificis, &c. non tamen translata est refractione: respondeo duplicem esse sensum; non est translata refractione, id est; plana refractionum per lentes, & circulum obseruatorium transeuntia, hac Macularum translatione, non mutantur, sed situm, & stationem immutabilem tenent, quādiu dispositio Telescopij, & circuli ob-

An & quando dicatur translata Refractio.

seruatorij non variantur, verum est; sed hoc meae sententiae, & praxi non aduersatur, imo ad ipsam praesupponitur: alter sensus est, non est translata refractione, id est, Macula pertranscundo circulum obseruatorium, seu melius, Macula aliam aliamque lentis caue subeundo lineam incidentiae, aliam aliamque non patitur refractionem, hic inquam sensus si in obiectione intenditur, falsus est; deinde ego non dico refractionem transferri, sed Maculae traiectione, mutari eiusdem Maculae refractionem; nam refractione eodem circuli obseruatorij, seu lentis loco, semper fit eadem; Macula autem acquirit diuersam, quia loca diuersa lentis subit. Sed inestas, Macula saltem hoc modo translata, non refringitur eo modo, quo refringeretur, si ad hunc vitri locum deueniret, suo naturali circa Solem motu. Respondeo Maculam in Sole quamcūque loco quocunque sumptam, si veniat in eandem incidentiae lineam, refractum iri modo eodem, quacumque tandem illuc transferatur via, siue id fiat motu Macularum proprio circa Solem, siue motu quotidiano, seu denique manu obseruatoris, idque vel tempore eodem vel diuerso, cito vel tardè, haec enim omnia ad rem nihil faciunt; nam plana refractionum non respiciunt conum, vel circulum solare, sed qui circa axem lentium describi intelligitur, cuius basis est circulus obseruatorius, & horum respectu Maculae transferuntur, & transferri dicuntur, ipsaque translatione refractionem mutant. Negatur itaque assumptum.

Ad quartum, quod dicitur, moto instrumento, non mutari conum Solis refractum, sed Maculam eandem semper distantiam retinere ad centra coni, & bases luminosae, &c. atque ideo signum manifestum esse, Maculae non translatae, &c.

Respondeo primo, dato, sed non concessio antecedente, nego consequentiam; nam argumentum semper sumit, & supponit, translationem de qua ego loquor, debere fieri intuitu Solis, & coni basique solaris, ita ut Macula locum, & situm in Sole mutet; id quod aliter se habet; etenim translationem intelligo eam, ut saepius dixi, qua Macula localiter ex alia coni

Eadem est Macula arte translata & motu naturali delata, in eodem lentium eandem loco, Refractio, &c.

Responsio ad quartum.

I.

coni, & plani refractorij parte, in aliam atque aliam succedit, hæc autem plana & hic conus non est conus Solis luminosus; itaque siue Macula eundem in Sole locum obtineat siue non, ad rem non facit; imo si mente, totum Solem à Macula seiungamus, ipsamque solam per lentes traduci cogitemus, varietati refractionis eidem subiacebit, cui nunc de facto. itaque eadem Maculæ ad Solem habitudo, ad rem non facit, meritoque inutilis inde illata consequentia negatur. Ego enim ex traiectione Maculæ, concludo, & practicè, atque speculatiuè ostendo, ipsam minus in medio, plus refringi in extremo circuli obseruatorij, siue iam in Sole aliquam mutationem patiatur, siue non.

Respondeo secundo. Falsum esse antecedens; nam mutato instrumento, statim mutatur totus conus Solis luminosus refractus, ob mutatas in lentem cauam incidentias; falsum etiam est, Maculam à punctis incidentiæ eandem seruare distantiam, ad centra coni & circuli solaris, sunt, inquam ista falsa, & manifestæ veritati, & quotidianæ experientiæ reclamantia. Vnde carent fundamentis, quæ inde sunt deducta. Neque ex hac traductione plana circuli solaris, obseruatorij, & lentium inter se obliqua euadunt, sed omnis hinc enascens varietas, est refractionis inæqualitati, propter radiorum incidentium variam obliquitatem, adscribenda.

PROPOSITIO IX.
PROBLEMA V.

Inæqualitatem Refractionis è duarum Macularum inter se distantia venari.

CAP. XXXII:

Possunt esse varij duarum Macularum casus, & modi. Vnus est, si per datas duas in Sole Maculas, & centrum circuli obseruatorij agas lineam rectam occultam, & huic aliam diametrum orthogonalem statuas, hæc enim erit traductionis di-

II.

rectrix; nam si alterutram per hanc transigas, reliqua describet lineam curuam, quæ docebit refractionis inæqualitatem.

5 Alius modus est, si prædictas duas Maculas sub radios incidentiæ marginales circuli obseruatorij deducas, aut vnâ tantum, subsistente altera intrinsecus; acquies distantiam maiorem, quam si illas sub partes centrales traducas, ita vt alterutra illarum cum centro Circuli obseruatorij coniungatur, aut centrum inter illas medio loco sistatur; centralis enim hæc distantia, erit minor distantia priori marginali; quæ est 15 omnium maxima, quam habere possunt illæ duæ Maculæ intra latitudinem circuli obseruatorij, centralis autem omnium minima, supponendo, Maculas illas veram inter se distantiam inuariatam seruare, in transendo Sole; hæc enim mutata, oportet etiam apparentem mutari, non autem mutata apparente, continuo necesse est, etiam veram mutari, nam eodem tempore, vitri refractione, mutatur earundem Macularum apparens distantia, sola loci & situs translatione, in alias aliasque vitri partes; euident tamen est, Maculas in 30 Sole veram distantiam suam non mutasse in hoc casu.

Alius itidem casus est, si sumantur 35 duæ Maculæ, latitudinis distantiam inter se eandem in Sole retinentes, cuiusmodi frequentes occurrant, simulque oriantur & simul occumbant (id quod circa tempora motus rectilinei fieri quandoque solet) videbis apparentem illarum distantiam, orientalem & occidentalem inter se æqualem, distantiam vero centralem semper verius minorem, quæ res non aliunde venit, quam à refractione ex lentibus causata. Quod si scire desideras, an 45 duæ Maculæ, quæ simul in Sole concurrerunt, (id est, quæ vel simul aut quasi simul exortæ sunt, aut simul ad medium peruenerunt, aut simul quodam modo occumbunt,) retinuerint inter se eandem constanter distantiam, compara inter se earundem distantias apparentes ortiuas, occiduas & medias. si duæ extremæ orientalis scilicet & occidentalis inter se fuerint æquales re- 55 pertæ, & singulæ maiores media, omnino

Alius Modus.

Alius Modus.

Modus primus.

I.

nino intervalla illarum vere equalia experieris. Et hæc quidem post peractum cursum scies: si vero ante peractum cursum aliquid explorare volueris, traduces utraque in marginem orientem, & occidentem, nec non ad centrum circuli observatorii, & hæc distantias notabis, nam si peracto cursu, similes retinuerunt in medio, & extremo, securus sis de eadem per totum Solem servata intercapedine; si in apparente aliquid variarunt, nec veram ubiq; eandem reperies. Nam veræ distantie sequuntur apparentes, cæteris paribus, si nimirum à refractione abstrahamus: & si in observando, atq; observatis digerendis error nullus admissus fuerit.

PROPOSITIO X.
PROBLEMA VI.

Refractionis apparentiam inaequalem, ex nulla refractionis apparentia demonstrare.

C A P. XXXIII.

Sola Refractionis inaequalitas alitibus causata, parit inaequalem motus apparentiam, &c.

MUltis hætenus argumentis, & rationibus atq; experiencijs evidenter, meo iudicio, satis luculenter probavi, inaequalem Macularum motus apparitionem, circa medium & extremum, esse à sola refractionis inaequalitate, quæ oboritur ex lentibus in Tubum opticum insertis; hoc autem ita esse, præter allata, probonunc vno argumento pratico irrefragabili, cuius nervum pertinacia qualiscunque tandem non infringat.

Tetigi autem argumentum, hoc aliquoties in prioribus, & vim ipsius theoreticè indicavi, nunc ipso facto afferro, & oculis etiam veritatem spectandam propono, Cursum, inquam produco Maculae a, quam observavi Romæ an. 1626 à die 17. Septembris ad 30. eiusdem; industria ea, quam exigere potes ab homine, labore sane inexplicabili: nam subtilitas huiusce praxeos videtur pene superare sollertiam humanæ dexteritatē, id quod experietur quicunque studiosus huiusce veritatis indagator, & sedulus institutæ à me exercitationis imitator.

Quippe intromissum excepi Solem per

II.

1 nudum foramen parvulum, absq; vlllo alio interiecto diaphano, ut sic conus ipsius radiosus in chartam orthogonalter oppositam directus per solum aërem absq; vlla refractione affulgeret, & Macularum umbras sine adventitia amplificatione projiceret. Distantiam autem à foramine accepi variam, pro re nata, quandoq; 15. passuum alias 20, nonnunquam 30. & amplius: & quanquam plurium quam huius Maculae cursus observavi, atq; huius ipsius similem quoq; antemeridianum consignavi, non minus exactum; hunc tamen solum, tempore, labori, & sumptibus parcendo, sufficere censui: quia cordatus plus non exiger, quin & suum experimentum adiunget; alioquin autem, qui semel vni experimento contradicit, qui auctoritatem semel respuit, repugnabit mille, contemnet semper. Contra unam, & veram aliquam experientiam, ait Philosophus, mille rationum argutiae, nihil valent.

Quamobrem in adiecto schemate, circulus A B C D, non est observatorius, sed expositorius, quia Solem sub tanta figura non intromissi, sed sub minoribus diversisq; magnitudinibus, ad hunc autem ampliaui singulos, ut postea compararem hanc naturalem immisionem, cum transmissione Telioscopica, nam semper eodem tempore Solem quoque per Telioscopium excepi, cuius circulus observatorius huic A B C D, omnino

35 æqualis fuit; quare, & hunc expositorium illi æquum statuere debui. A B, igitur, est Ecliptica, C D, axis eiusdem. Macula, a, die 17. hora vespertina 4. $\frac{1}{4}$. primum conspecta est, nam tempore matutino ipsam ubiq; in horizonte versatam non adueri, & ob hanc causam adduco cursum vespertinum, non matutinum, quod ille horizontem vtrinq; proximè attingat, non obstante, hunc in medio pleniorē ab observationibus pluribus extitisse. Horas singulis diebus adnotatas habes in Tabula diaria Observationum Imagini inferius inscripta, procedo autem per horas, & horarum fragmenta, quia ex tempore argumentor ad motum: etenim superius sæpe dixi, si sit ut tempus ad tempus, ita arcus motui apparenti temporario respondens ad arcum respondentem tempori; vel, ut tempus ad tempus, ita iter in parallelo ad iter in eodem

Plures eiusmodi cursus observati.

Vna vera experientia æquivalet mille.

Eodem tempore, eadem Macula est etiam per Telioscopium observata.

Cursum absq; Telioscopio excipiendorum, praxis laboriosissima.

I.

eodem, tempore correspondente decursum, &c. tunc Maculas necessario hæsuras in Sole: & hoc manifestè deprehensum iri, si Maculæ obseruarentur sine lentibus; quod cum hic fiat, & sicut prædixi inueniatur; manet sua vis argumento. Considera in adiecto schemate trapezia diurna, biduana, triduana, quatruiduana, erunt ad se, vt tempora illis debita inter se.

Explicatur & ostenduntur dicta in exemplo pratico.

Incipiamus à diurnis. Sunt autē ea, ab ca; a de a; a e f a; a g h a; a i K a: diebus 25. 26. 27. 28. 29. 30. debita, & respondent chordæ b c, d e, e f, g h, i K, interuallis temporarijs motuum apparentium, a a, quorum tempora cum sint quodammodo æqualia, ipsas quoque chordas ad sensum saltē inter se æquales inueni: sed & arcus ab illis subtensos pariter æquales experior. Sic chordæ duorum dierum l m, à die 17. ad 19. & n o, à die 19. ad 11. inter se æquantur, & subtendunt arcus æquales, quibusque duorum dierum arcubus, in superficie Solis subrentis, &c. Sic trium dierum arcus, à chordis p q, r s, t u, x y, subtenti, sunt inter se, & quibusque trium dierum assumptis arcubus æquales; quare hoc? quia temporibus æqualibus sunt decursi.

Sic si chorda z a, interuallo temporario 17, 21, dierum nempe quattuor debita assumatur, æquabitur ipsius arcus, quibuslibet dierum quattuor numeratis arcubus per chordam quamcunque diurnam g h. vel per chordam biduanam n o. &c. Et quod de vnus diei chorda, de duorum, de trium, & quattuor exempli causa, dictum & doctum est, id intelligi debet etiam de quinque, sex, septem, & pluribus.

Nota primò, Quando arcus cum arcubus comparantur, assumendos esse eiusdem circuli, vel maximi A B C, vel paralleli, de cuius inuentione paullo post dicetur.

Cautela.

Nota secundò. Me dixisse chordas & arcus illis respondentes, esse ad sensum aut quasi æquales, propter paruum horarum differentiam, eo quod in rigore quidem non possit geometrica statui linearum æqualitas vbi temporis non est, quia tamen inter tempus diurnum, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, &c. vnus horæ,

II.

in tantillo apparentis motus interuallo, ad sensum vix est notabile, voco ego ipsa ad sensum saltem æqualia, id quod ad propositum meum satis est.

Nota tertio. Quando dico, vt tempus ad tempus, ita chorda ad chordam verum esse tantum, quando tempus æquale ad æquale refertur. quando autem tempus inæquale assumitur ad tempus inæquale, tum respondent arcus à chordis subtensi, assumptis temporibus.

Ex hac ergo Temporum & Motuum æqualitate, per hunc obseruandi modum eruta, liquet omnem aliam inæqualitatem ex Telioscopio in obseruationes inductam, esse à sola lentium Refractione, id quod erat probandum.

Conclusio.

Liquet secundò. Maculas extra Solem supposita motus regularitate, non posse collocari; quia quamprimum hoc fiat, vel motus irregularis, contra Phænomenon, vel temporum cum motibus dissonantia introducetur.

Eadem commonstrantur ex æqualissima Macularum à polo suo Mobili distantia, in schemate eodem.

Refractione per lentes inducit etiam aliquantulam inæqualitatem in distantiam Macularum à suo polo mobili, vti in adducendis exemplis patebit. Hæc eadem tota cessat in hoc obseruandi genere. Polus autem mobilis est in circello polari, qui circellus sic acquiritur. Quando Maculæ sunt in cessu rectilineo, describitur is ad declinationem maximam paralleli Maximi ab Ecliptica, quam semper fere inueni quasi 7. graduum ab ipsa; quando Maculæ sunt motu maximè curuilineo, beneficio curuitatis summa idem quantitatis quasi eiusdem reperitur: & quia in præfenti cursu, ab æquilibrio non multum recessum est, iidem gradus septem sunt ferè reperti, hoc modo. Maxima huius cursus chorda, à puncto ortus Maculæ a, ducitur ad occasum eiusdem linea nimirum, 17. 30. huic deinde, per centrum E, agitur alia ad angulos rectos F E G, quæ cum repræsentet planum axem mobilem, cursus medij, secabit chor-

Ex Circello polari Macula in Sole esse demonstrantur.

Quomodo Circellus polaris inueniatur & describatur.

chordam $\gamma\delta$, bifariam in H, & cur-
sus vestigium in I, & acquireretur per H
L semidiameter circelli polaris $\beta\gamma$, ad
ad sensum, quæ est $\beta\delta$, vel $\gamma\delta$, sinus sci-
licet arcus C β , vel C δ , graduum plus
minus septem, & cum ab æquilibrio
non multum recesserit iste cursus, sensu
de curuitate sua quasi nihil remittit.

Cumque in medio cursus sectio plani
per axem sit E I H. in principio cursus
id est die 17. incessit ista sectio per cen-
trum E, & peruenit in θ , illuc enim pro-

cumbit polus mobilis ex 1. quod au-
tem die Septembris 17. polus mobilis
fuerit in 1, probatur ex eo, quod circa
8. Septembris ordinarie fiat æquilibrium,
& in 7, reperiatur, axis, ut ex observa-

tis libri prioris fusè ostensum est, & ex
hac ipsa observatione abundè constare
potest. Loco autem apparente tam po-

li mobilis, quam Maculæ habito, locus
utriusque verus in superficie Solis, &
distantia inter eos vera consequenter
habebitur, beneficio Circelli ad hunc

modum. die 17. visus & apparens Ma-
culæ locus fuit in ortu ad a, apparen-
tem poli locum designat recta 1 a, pa-
rallela ad rectam $\gamma\delta$, ubi enim 1 a, se-
midiametrum secat in puncto θ , illic
est sedes poli mobilis, ex loco suo pri-

mo, in punctum θ , solaris circuli, &
diametrum $\beta\beta$, proiecta. Quia cum
polus ille semper in circulo polari, per
integrum annum circumeat, alio non

potest projici analemmatice, nisi in dia-
metrum $\beta\beta$, quod hæc sola sit sectio
communis circuli solaris A B C D, &
circelli polaris $\beta\gamma$, unde locus ap-

parens poli mobilis semper est quæren-
dus in hac diametro, & locus verus
semper in peripheria huius circuli, in
globo descripti: cum autem hic omnia

sint in plano peragenda, praxis paullo
aliter est instituenda, ut locorum vero-
rum ex apparentibus, distantia sincera
acquiratur. Igitur ut dixi, ad locum
Maculæ apparentem a, die 17. habi-

tum, itemque ad locum poli apparen-

tem θ , eodem quoque die ex observa-
tis inuentum, applica regulam, & con-
iunge duo apparentia loca, θ , & a, recta
linea a θ , deinde ex a & θ , educ perpen-
diculares ad quamcunque, sed eandem
ambas partem, quantum satis est, & ex
polo quidem apparete β , abscindes $\beta\theta$,
æqualem $\theta\gamma$, at vero ex a, abscindes
a ν , æqualem a δ quæ est perpendicu-
laris ex a, viso Maculæ loco, in superfi-
ciem Solis emissa, & habetur, si in ra-
dium E a, è centro Solis egressum ex
apparente Maculæ loco sit ad angulos
rectos in circuli observatori perimetrum
emissa, & est semper sinus rectus &c.
quem radium hic, vitandæ confusionis
caussa, non expressi; sed in alijs figuris
passim cernitur.

Punctum igitur ν , & punctum ν , sunt
quidem puncta locorum verorum ex lo-
cis apparentibus deducta, propterea
quod rectæ $\theta\nu$, a ν , non tantum sint æ-
quales rectis $\theta\gamma$, & a δ , verum etiam ad
rectam $\theta\gamma$ a perpendiculares & inter se
parallelae; non tamen iacent in locis ve-
ris, sed locorum verorum distantiam

veram $\nu\theta$, ad vnguem exhibent. unde
si intelligatur trapeziū a $\theta\nu$, circa a θ
immutam erigi in altum, donec rectæ
a ν , $\theta\nu$, sint rectæ ad circulum ABCD,
tunc puncta ν & ν , stabant in sublimi,

locaque vera occupabunt in superficie
Solis globosa, & distantia vera erit ea-
dem $\nu\theta$; quia ergo, in plano ista subli-
mibus suis locis non possunt aptari, so-
lent dicto modo in planum circuli ob-

servatori reclinari, ad lineas perpendi-
culares & parallelas, ex locis apparen-
tibus studiosè repertas, loca autem ap-
parentia habentur è solis observatio-
nibus. Quamobrem si Maculæ solares

suum iter in superficie Solis regulari, &
uniformi motu circa axem & polos mo-
biles peragunt, & si axis & poli mobi-
les circa axem & polos Eclipticæ fixos,
uniformi motu annuo feruntur; necesse

est, Maculam a suis polis mobilibus
semper æqualiter distare: & si æquali-
ter distat, omnino oportet illam in su-
perficie Solis regulariter esse motam.

Distantias autem veras huius Maculæ
a, a polo mobili inter sese perfectissimè
per totum cursum esse ad hilum æqua-
lissimas, claret ad oculum, ex rectis $\theta\nu$,
 $\theta\gamma$, $\nu\theta$, $\nu\gamma$, a b, c d, e f, g h, i K, hæc
enim omnes inter se sunt æquales, & ve-

riissimas distantias locorum verorum
præsentant, è locis apparentibus sum-
ma fide deductas; ut videre est ex tra-
pezio a $\theta\nu$ x, diei 24. debito, quod si
erigeretur super rectam a θ , distantiam
videlicet apparentem, inter locum ap-

paren-

Ex locis ap-
parentibus,
distantia ve-
ra inquiri-
tur in Solis
superficie.


Polus mobi-
lis è perime-
tro Circelli
in solam
eiusdem dia-
metrum pro-
iicitur, &c.

Puncta lo-
corum vero-
rum, & di-
stantia ve-
ra situs ve-
rus, quomo-
do concipia-
tur?

Æqualis
Macula a
polo suo mo-
bili distan-
tia vera, ar-
guit Macu-
lam in Sole
esse motam.

M.DC.

XXVI.



Ex Cursu Maculae a, per nudum foramen absq^{ue} refractione, à die 17, ad 30, Septembris observata, apparens refractionis per Telioscopium inaequalitas, et verus Macularum in physica ☉ superficie loc, luculenter ostenditur.

SEPTEMB.

ROMAE IN Romano

D	H	D	H	D	H
17.	u. 4 $\frac{1}{4}$	24.	u. 5.	28.	u. 4 $\frac{1}{2}$
19.	u. 4.	25.	u. 4.	29.	u. 4 $\frac{3}{4}$
21.	u. 4 $\frac{1}{4}$	26.	u. 4 $\frac{3}{8}$	30.	u. 4 $\frac{5}{8}$
22.	u. 3 $\frac{1}{2}$	27.	u. 4 $\frac{1}{4}$		
	D		F		

COLLEGIO Societatis.

Situs verus distantia vera in superficie Solis.

I. parentem Maculae a, & polum Apparentem μ ; certum est, locum verum poli ϕ , & locum verum Maculae χ , directo supra locos apparentes in ipsa Solis superficie staturos; quia recta a χ , aequalis est rectae a l, & recta $\mu \phi$, aequatur rectae $\mu \mu$; hæ vero ambæ habent sua puncta μ , & l, in superficie Solis si erigantur, igitur & rectae

II. $\mu \phi$, atque a χ , si erigantur, puncta χ , & ϕ , locabunt in Solis superficie. id quod de reliquis omnibus eodem prorsus modo demonstrabitur &c.

COROLLARIUM.

Ex his iterum constat, inaequalitates per Telioscopium apparentes, esse
Ggg meris.

I.

II.

*Refraetio so-
la lentium,
inaequales
motuum di-
urnorum
apparentias
facit.*

*Circellus po-
laris ex na-
tura rei de-
ductus est.*

merillimas Refractionis negociationes. Deinde Circellum polarem, & poli motum annuum in ipso, contra Macularum tendentiam, non esse arbitrarium positionem aut figmentum ingeniosum, sed omnino in rei natura, & verticatione Solis, axisque Macularum cum ipso Sole mobilis, (Solem enim totum sic proportionaliter moueri colligimus, ex Maculis & Faculis tam primarijs Soli inexistere demonstratis, quam secundarijs Solem vbique integrantibus, & circa eius centrum conuolutis, eodem qua Maculae primariae rotatione,) intimè radicatam, sine quo apparens Macularum motus commode defendi nequeat,

Eadem demonstrantur ex vera paralleli, quem Macula a, descripsit, designatione, eiusque periodica reuolutione, & diametri exhibitione.

*Ex conditio-
nibus paral-
leli a Ma-
cula descri-
pti, in Solem
inabitur
Macula.*

*Descriptio
paralleli,
quomodo
fiat.*

*Macularum
motus cur-
uilineus in
parte poli e-
leuati, ma-
ior est dimi-
dio sub chor-
da minore
quam sit dia-
meter.*

Si Maculae solares in solari superficie inhaerentes, circa polum supra planum solaris circuli eleuatum, ordinatè voluuntur, necesse est eas quae ad partem poli eleuati incedunt, non tantum tempore, sed & plus medietate circuli supra horizontem existentis praeualere; necesse est, diametrum paralleli esse maiorem chorda, quae ortum cum occasu apparente connectit; necesse est partem paralleli occultatam, minorem esse patente &c. Haec omnia vera sunt, in parallelo Maculae a, cuius semicirculum $u x q$, $e x y$, centro descriptum habes. eius autem descriptio sic fit. Inuentam Maculae veram à polo, super quem voluitur distantiam, u^p , vel o^p , vel quaecumque tandem, ex puncto quocumque C, circuli maximi, ad arbitrium tuum assumpto, abscinde utrimque in u , & q , & recte rectam $u q$, quae erit diameter paralleli ex y , tanquam centro proprio descripti, cuius semicirculum tantum $u x q$, exhibeo. Hanc autem diametrum $u q$, maiorem esse chorda $17, 30$, patet experientia, & probatur, quia si circinus in G, ponatur vno pede, & alter secundum veram distantiam Maculae & poli mobilis, extendatur in peripheria, transietur hic quidè ortus 17 , illic occasus 30 . id quod etiam

patet ex arcu $30, q$, qui maior est quam $17, u$, unde consequens est, arcum $u C q$, esse maiorem arcu $17, C, 30$: id quod etiam elucescit in recta $E y$, breuiore, quam $E H$: sed haec, ex praxi constare, probari non debent: imo discursu euidenti & antecedenti isthoc sciuntur. Ex eo quod in circello $\beta 7^a$, polus mobilis eleuatus sit supra horizontem, clarum est, iter apparens Maculae a, esse portionem semicirculo maiorem, unde necesse est, chordam $17, 30$, ab ortu ad occasum protensam, esse diametro minorem, subtendit enim ex hypothese portionem circuli maiorem: igitur diameter $u q$, est maior quam chorda $17, 30$. Cumq. hanc euidentem rationem praeuiam, subsequatur experientia clara palpabilis, quis non videt pulcherrimam, veritatis harmoniam? quis palmam illi lubens non concedat? cum haec veritas non stet, si Maculae extra Solem, vel ad vnum minutum secundum collocentur? nunquam enim plus semicirculo supra horizontem apparebit, sed semper minus. & hoc est vnum.

Alterum, quod dixi, est, Maculam debere plus morae trahere supra horizontem, quam dimidia reuolutio periodica exigat, id quod planum euadit, in designato semicirculo $q x u$, in quo, secundum inuentos arcus diurnos, bi-duanos aut triduanos, i K, n o, t u, reperiuntur dies tredecim, horae plus minus sex, cum tamen Macula supra horizontem insumpserit minimum dies 13, horas 18.

Haec veritas non stat, cum vlla alia Macularum extra Solem constitutione & motu regulari. itaque ex hoc quoque capite, Maculae in gremium Solis sunt necessario recipiendae. Hoc autem semper fit, quando Maculae in plaga poli patentis decurrunt; contrarium euenit, cum in partibus poli latentis suas periodos absolunt, illic enim in ora supra horizontem medium periodicae reuolutionis nunquam assequitur. Hoc tamen aduertendum, excessum illum vel hunc defectum, non esse eundem in omnibus Macularum curriculis, sed maiorem vel minorem, pro ratione distantiae, quam habet parallelus Maculae à parallelorum maximo; nam quo magis distant, hoc diffe-

Ex diametre maiore inuenta per obseruationem & demonstrata per rationem. Macula in Sole.


Ex cursus tempore, & segmento apparente maiore, Macula in Solem collocatur.

Periodi dimidia quantitas.

Cursuum apparentis inaequalitates differentes &c.

MDC.

XXVI.



Ex Cursu Maculae, a per nudum foramen, absq;
refractione, a die 17. ad 30. Septembris obseruata,
apparens refractionis per Telioscopium inaequalitas,
et uerus Macularum in physica O superficie
loc, luculenter ostenditur.

SEPTEMB.

ROMAE IN

COLLEGIO

Romano

Societatis.

D	H	D	H	D	H
17. u. 4 1/4	24. u. 5	28. u. 4 1/2			
19. u. 4	25. u. 4	29. u. 4 1/4			
21. u. 4 1/4	26. u. 4 3/4	30. u. 4 1/2			
22. u. 3 3/4	27. u. 4 1/4				

differentiae notabiliores exurgent, quo
minus, hoc minores. Iuuat etiam hunc
effectum, maior vel minor curuilineus
Macularum incessus. &c. Item veloci-
tas vel tarditas propria. Et hoc erat
secundum.

Pars autem occultata emergit, si ea
quae supra horizontem apparuit, sub-

I trahatur à periodo tota, periodus au-
tem emergit, ex inuento arcu semicir-
culari duplicato, ut, quia arcus semi-
circularis u x q, inuentus est dierum
5 13. horarum 6. erit tota periodus die-
rum 26. horarum 12, à quibus si aufe-
rantur dies 13. horae 18. cursus parentis
restabunt dies 12. horae 18. pro cursu la-

Periodica
reolutio to-
ta.

Cursus patē-
tis & Latē-
tis quātitas,
eorumq. dif-
ferentia.

I.

tente; & sic inter segmentum apparens & latens intererit vnus diei differentia quam ex alijs quoque cursibus, cæteris paribus passim inuenio; conspirant etiam cum hisce, Macularum reducum circuli; prout suis postea locis, accuratius videbimus. horum interim prægustum quendam Lectori præbentes, ne ad hanc tantam rem, quasi ex abrupto & imparati accedere, vel alios adducere velle videamur; haud ambigendo, quemuis inspecto nostrorum argumentorum pōdere, manus veritati sponte daturum, in tanta omnium momentorum, rationum, experimentorum & sensuum conuentione.

DE REGULARITATE
Motus Macularum. &c.

CAP. XXXIV.

Q Vando quidem in toto hoc Tractatu Regularitatem Motus Macularum toties inculco, totiesque repeto, illa vel similia verba., *supposita Motus Regularitate &c.* Ne quis in prauum verborum meorum sensum, atque ex eo, in errorem aut falsas suspiciones incidat, quasi ego Regularem Macularum Solarium Motum ex obseruatis non producam, sed potius in obseruata ex præsupposita persuasione inducam, & sic doctrinam meam male stabiliam: opera pretium me facturum existimaui, si quod res est, hic paullo fusius explicem; ita præsertim ijs petentibus, qui purgato iudicio, censuerunt opus esse, studiosis beneuoli Lectoris conatibus succurrendum, prudenter occurrendum malis.

Motus caelestes esse regulares, omnibus persuasum est.

Omnibus itaque hominibus à natura insitum & persuasum est, vt ea, quæ cælitus sunt & fiunt, ordinatissima, & regularissima esse credant, accedente præsertim diuinæ Scripturæ attestatone, Deum omnia in numero, pondere, & mensura cōdidisse; cum hæc inquam & sacra pagina dicat, & communis ratio persuadeat; Astronomi id multo maxime in rerum cælestium motibus inesse firmissimè tenuerunt: vnde Motus apparentes quoslibet, quantumuis irre-

II.

gulares viderentur, ad regularitatem semper conati sunt reuocare. Supponunt nimirum, motus per se regularissimos esse, sed irregulares fieri & nobis apparere ex accessu & compositione plurium, hinc compositos deprehensos in simplices eosque regulares resolunt, ea qua possunt sollertia, & hæc Ptolomæum ad Excentricos atque Epicyclos, non orbis, sed circulos adegit, quibus persuasam sibi motuum cælestium regularitatem tueretur. Hæc Aristotelem in Homocentricis tenuit. Itaque in motibus cælestibus proportionem quandam regularissimam omnes inesse semper iudicauerunt, atque ob eam causam summo studio quæsiuerunt, idque suppositionibus diuersissimis. Quo autem quisque in suis statuendis Hypothesibus ad Motuum defendendam regularitatem, accessit propius, hoc veriores sunt habite ipsius doctrinæ.

Nemo igitur mirabitur, si me quoque, inuentis & apparentibus Phænomeni solaris motibus ad aliquam regularitatem, ex communi & recepta ab omnibus regula, aspirare viderit; si namque Apostolo teste, quæ à Deo sunt ordinata sunt, in huius vtique Phænomeni reuolutionibus summum versari ordinem, vix est ambigendum; eo quod ipsum mobile, cui inesse deprehenditur, sit omnium corporum cælestium, principalissimum, Sol scilicet, Vniuersi totius Rector, atque Gubernator.

Motum igitur Phænomeni ab ipso proficiscentis dum animaduerto, eumque varium ex apparentijs & obseruationibus legitimis experior, primum quod Astronomo oboritur dubium est, Vtrumne apparens iste motus sit regularis, & ordinatus necne?

Quod si tumultuariâ & quasi fortuitam mobilium concursationem, quæ in nullum ordinem digeri valeat, senserit; superuacaneam ipsius ordinandi curam dimittit: at verò si aliqua regularitatis indicia nactus sit, ijs insitens, eo usque rimando progreditur, quousque ingenij vires, & Phænomeni propoliti apparitio finit.

In præsentī igitur Phænomeno, tametsi ad primam statim illius inuentionem

Mobilium temeraria in considerationem Astronomicam non cadunt.

I.

tionem non pauca occurrerint, quæ
animum obseruatoris à stabili aliqua
regularitatis certitudine auocare, aut
certè suspensum tenere potuerint; qua-
In solari les fuerunt, variæ & quasi subitæ Ma-
Phænomeno cularum coalitiones; repentinæ di-
irregulari- gressiones; deuiationes inordinatæ fi-
tatis indicia gurarum perpetuæ transformationes;
noui & improvisi Macularum in medio
Sole exortus, & vicissim veteranarum
interitus; augmentationes, aut in con-
trarium diminutiones prodigiosæ: Fa-
cularum varietates incredibiles; & su-
per hæc omnia Phænomeni Secundarij
copia, & instabilitas longè maxima:
tamen inquam Phases istæ atque ap-
parentiæ prudentem Astronomum,
à speranda aliqua, ne dum indispic-
cenda vel probabili regularitate Phæno-
meni huius potuerunt auertere: nihilo-
minus tamen ex alijs regularitatis ex-
pressissimis signis, in contrarium ita
ab ipsomet Phænomeno inductus sum,
vti de admirabili Motuum harmonia
& proportionem elegantissima haudqua-
quam addubitarim.

Signa autem latentis regularitatis
mihi ex motu apparente in manus tra-
dita fuerunt ista.

Regularita- Primò. Constans & perpetuè Macu-
tis manife- larum ab orientali Solis plaga in occi-
sta signa. dentalem progressio.

Secundò. Constans Macularum in
medio Sole celeritas, circa extrema
tarditas.

Tertiò. Duarum aut plurium Macu-
larum secundum longitudinem à se di-
stantium, circa extrema congressio, cir-
ca medium dissociatio, pro ratione in-
terualli, & temporis.

Quartò. Spatiorum itinerariorum
angustia circa limbum Solis, amplitu-
do circa medium.

Quintò. Macularum omnium gra-
cilitas circa margines solares, dilatatio
circa medium.

Sextò. Motuum apparètium stata si-
milis & annua in parallelis ipsdè reditio.

Septimò. Eorundem singulis seme-
stribus apparens tendentia rectilinea.

Octauò. Eorundem admirabilis &
vniformiter difformis, augescens & de-
crescens semestris curuitas, per me-
dium annum in Austrum, per alterum
medium in Aquilonem obliquata.

II.

1 Nonò. Eorundem in apparente So-
lis hemisphærio inæqualitas, itemque
duratio non casu, sed summa cum ra-
tione inæqualis.

5 Decimò. Interuallorum diurnorum
ab vna Macula decursum, æqualis ad
sensum mora, tametsi interualla appa-
rentia sint æqualia.

10 Vndecimò. Aequales motuum re-
ctilineorum supra horizontem moræ.

Duodecimò. Macularum reducum
cursus periodici, motibus apparenti-
bus responsantes.

15 Decimotertiò. Figuræ Cursuum
curuilinearum ab Ellipticis parum di-
screpantes.

Decimoquartò. Diuturnæ Macula-
rum in limbo hærentium moræ.

20 Hæc & hisce similia motuum appa-
rentium argumenta, nimis manifestè
clamabant, admirabilem quandam in-
tus latere ordinis venustatem, eamque
veluti intento digito, apertè demon-
strabant; hocque Phænomenon non te-
merarium, non casuale aut fortuitum,
non ærium aut sublunare, sed celeste,
solare atque adeo regulare indicabant.

30 Hisce ergo instructus præsidijs, sen-
su videlicet & conceptu quodam vni-
uersalissimo, si Phænomenon hoc cæ-
leste quiddam sit, oportere subesse
pulcherrimam quandam in motu sym-
metriam; Phænomeni deinde ipsius
statis, & sollennibus apparitionibus,
35 tot nunc annorum lapsibus animad-
uersis; applicui iamdudum solidatum
in sententia regularitatis inhærentis
animum, factisque experimentis innu-
meris, eandem omnino ita reperi,
40 vt aliter saluo Phænomeno decerni non
queat. Vnde.

Dico primò. Si Motui Phænomeni so-
laris non apparenti sed vero, aliqua com-
petit & attribuenda est ab Astronomis ex
45 motu apparente & sensu communi pro-
pter tot præhabita indicia, regularitas,
ea habenda est Maculis in Solem illatis.
Sed Phænomeni solaris Motui vero,
(quicunq. tandè is sit, inquiritur enim
50 & non supponitur) competit & attri-
buenda est ab Astronomis ex motu ap-
parente & sensu communi propter tot
præhabita indicia, regularitas aliqua:
Igitur ipsa habenda est ex Maculis in
55 Solem illatis.

Vero Ma-
cularum
Motui Re-
gularitas nō
poteſt attri-
bui, niſi Ma-
culis in So-
lem illatis.

I.

Sequela Maioris, (quæ breuiter & claritatis ergo talis est: Si Motui vero Macularum inest regularitas, Maculae insunt Soli:) hæc inquam sequela, probata est hætenus fusissimè, tota prima libri huius parte, tam ostensiuè, quam diductione ad varia, contra ipsum Phænomenon & motum eius apparentem, absurda. Igitur patet Maior.

Minor patet tam ex indito à natura omnibus hominibus instinctu, meliora semper esse præferenda deterioribus, & regularia atque ordinata si possunt haberi, anomalis & perturbatis, &c. quàm ex ipso motu apparente, quem sine certissima ordinis proportionem talem semper redire, omnino impossibile est: quemque sine inuenta aliqua regularitate defendere non possumus: imo si ipsum ad aliquam commodam regularitatem deducere possunt Astronomi, id facere promptissimis animis solent.

Quanto igitur amplius, si ipsum Phænomenon ad propositam regularitatem non tantum prouocat, sed aliam quamcunque obtrusam respuit?

Probatam igitur Maiorem & Minorem, sequitur conclusio.

Ex Maculis nimirum in Solem illatis, habendam esse Motus illarum Regularitatem.

Macula in Solem posita, efficiunt motum regularem. Dico secundò, Si Macula Solares in Solem introducuntur, ipsarum Motus verus & proprius, semper inuenitur Regularis. Hæc propositio, est passim demonstrata in prioribus nec eget nisi sedulo Lectoris oculo & intelligentia, perspicaci: sed & in posterioribus summam collectis argumentis efficaciter ostendetur.

Macula à Sole extra-cta, motus Regulares, nunquam describent, apparentijs Phænomeni semper relictantur &c. Dico tertio, Si Macula solares à Sole eximantur, Motus illarum verus, nunquam inuenietur Regularis, semper anomalus, & ipsi Macularum Motibus apparentibus aduersarius. Probata sunt omnia, & varijs modis ostensa in prioribus. Maculae certè solæ reduces, id quod dico euidentissimè patefaciunt. Vnde rursus conclusum esto, Si Maculae solares in Sole sunt, verus illarum motus regularis est, nec aliter fieri potest; & si verus Macularum motus Regularis est, ipsæ in Sole sunt; & fieri aliter non potest.

Macula in Sole regulariter feruntur.

Sed Maculae solares in Sole sunt, vt

II.

1 pluribus medijs, quæ infra recolligam, probatum est; & illarum Motus Regularis est, vt ex totius Phænomeni consensu admirabili habetur.

5 Ergo & ipsæ in Sole sunt, & verus Motus illarum Regularis est. Hæc enim duo aliunde sufficienter probata se mutuo inferunt.

10 **APPARENS MACULARVM**
Solarium Augmentatio, & Diminutio.

CAP. XXXV.

15 **M**OTV Macularum Locali apparente explicato, oportet aggredi eum qui versatur circa quantitatem ipsius Mobilis localis. Voco autem apparentem, non quia verus non sit, sed quia oculis ita appareat, siue iam verus siue merè apparens sit; fieri namque potest, & saepe fit, vt res aliqua oculis videatur augeri, 25 quæ tamen omnino nil penitus crescat, imo forsitan & decrescat; fieri potest, vt aucta, putetur imminui.

Maculas ergo solares, & Faculas apparenter ad aspectum oculi crescere, & decrescere, certius est, quam vt vel minima de hac re dubitatio vlli in posterum valeat oboriri, qui Phænomenon hoc vel obiter inspexit, & pater hoc totum vbiq; nimis manifestè in toto libro 35 priore, per omnes obseruationum Imagines, in quibus decumana Macularum & Facularum augmenta, nec non decrementa passim spectantur, & in notis explicantur,

40 Sed nunc alia est quæstio, non vtrum Maculae, & Faculae ad visum nostrum augeri, & diminui videantur; sed, Vtrum verè, realiter, & physicè, non tantum apparenter augeantur? quæ res vt dilucidè euentiletur, sciendum est, 45 aliam esse rei quantæ augmentationem physicam, aliam opticam illa rem in se maiorem aut minorem facit, hæc tantum sistit ad aspectum; de ambabus in ordine ad Maculas est aliquid dicendū. 50 Quæ vero de augmentatione disputantur, valent etiam & applicanda sunt ad diminutionem

Apparens Macularum augmentum & decrementum.

Duplex rerum augmentatio, Physica & Optica.

Macu-

I.

*Macularum solarium, vti, & Facula-
rum augmentatio apparens
optica.*

*Augmenta-
tio optica
per Tubum.*

Affertio prima. Omnes Maculae, & Faculae adeoque totus Sol, augentur merè optice beneficio Telioscopij, & Helioscopij. Patet vñ & experientia. Tubi optici quotidiana, qui dum speciem Solis acceptam refractione amplificat, eundem augere dicitur, tametsi Sol ipse, vna cum Maculis idem prorsus maneat: & sic ista augmentatio non est obiecti physica, sed merè optica, specierum nimirum visibilibus dilata-
tione peracta.

*Apparens
circa mar-
ginem cir-
culi obser-
uatorij.
Macularum
diuulsio.
&c.*

Affertio secunda. Omnes Maculae so-
lares in margine Solis, & circuli obser-
uatorij simul existentes, augentur merè
optice. Quia, vt in superioribus osten-
sum est, excessu refractionis plus æquo
distenduntur, quam in medio Solis, &
circuli obseruatorij simul. Probatur au-
tem hoc dupliciter.

Primo, Si Maculae in Sole margina-
les, traducuntur ex ora Circuli obser-
uatorij ad medium eiusdem, videbis e-
nim Maculam eandem in medio statu-
tam tertia circiter parte graciliorem,
quam appareat in extremo circuli eius-
dem; Vbi semper diuulsa in male distin-
ctam aliquam veluti nebulam exsinua-
tur; quod vtrum ipsa formalis refractione,
an vero aliquis ipsius effectus existat,
merito dubitatur; videtur enim esse po-
tius extra basim communem statio, &
radiatorum à se mutuo diuarcatio, quam
refractio, &c.

Secundo, Si Maculae solares extra
limbum circuli obseruatorij vbicunque
versatae, in limbum eiusdem traducan-
tur, semper apparent maiores quam in
medio. experientia constans de qua
pluribus disserui in prioribus.

*Duarum Ma-
cularum ma-
gnitudo in-
ter se quo-
modo sit cõ-
paranda?*

Hinc sequitur, si Maculae alicuius in
medio Sole existentis, velis nosse pro-
portionem magnitudinis visualis, ad a-
liquam, quae existit in margine, non de-
bere illam sumi, prout Maculae apparēt,
Sole cum Circulo obseruatorio con-
gruente, nam in hoc casu, Macula mar-
ginalis maior apparebit, quam vt possit
legitimè conferri cum centrali; & hæc
tanto minor videbitur, quam vt com-

II.

paretur cum illa: igitur vt conueniens
aliqua ratio magnitudinum ineatur, o-
portet refractionis intercedere quandā
æqualitatem, quod tum fiet, si vel
marginalem in locum centralis, vel
centralem in locum marginalis dedu-
cas, & notatas vtriusque ambarum ma-
gnitudines conferas, centrales cum
centralibus, marginales cum margina-
libus: sic enim veræ proportionēs pro-
ximè inuenientur, quia sub easdem
incidentiæ lineas traductæ, eodem mo-
do refringuntur, & pari modo apparen-
ter crescunt.

Quod si vnius Maculae proportionē
simili ratione lubeat inuestigare, quan-
do ipsa in medio Sole versatur, obser-
uabis eius in medio circuli obseruato-
rij apparentem magnitudinem: tum
eandem educes in eiusdem circuli mar-
ginem, & auctam ipsius apparentiam
notabis: deinde quando eadem Ma-
cula ad horizontem Solis post aliquot
dies descenderit notabis in limbo cir-
culi obseruatorij eiusdem visualem am-
plitudinē; tum idem facies traducendo
in mediū; & sic aspectus medios cū me-
dijs, prius notatis, extremos cū extremis
itidem notatis conferes, hoc vnicum at-
tendendo, an Macula à medio ad extre-
mū, vel ab hoc ad medium pergēdo, per-
stiterit in statu, & notabiliter physicam
suam magnitudinem non variauerit;
quod si accidisset, proportionēs non ita
exactè institui possent. Maculas autem
in eodem magnitudinis statu perdurare
tum scies, cum latitudinis diameter, id
quod frequentissimum est, eadem repe-
rietur. Quæ vero latitudinis diameter
intelligatur, mox explicabo.

Affertio tertia, Dato, sed non con-
cesso, Maculas solares esse perennes, &
immutabiles; nihilominus tamen ipsæ
accessu ad nos, & recessu à nobis auge-
rentur, & minuerentur optice.

Quia per medium annum vna cū So-
le, à 69 vsq; ad Capricor. ad nos accede-
rent, & sicut ipse, ita illæ proportiona-
liter maiores apparerent; altero medio
anno, eadem ratione, discessu à nobis,
minuerentur. Quod autem vna cum
Sole ad nos, & à nobis ambulent eui-
dens est, quia ipsæ easdem circa Solem
periodos, iisdem itinerum arcuationi-
bus, dierum interuallis, semper confi-
ciunt,

*Quomodo e-
iusdem Ma-
culæ visua-
lis magnitu-
do centralis
& margina-
lis inter se
sit compa-
randa?*

*Macularum
apparens
augmentum,
& decremen-
tum ex ac-
cessu Solis.*

I.

ciunt, &c. vti fusissime libro priore ostendi, & quia in ipso Sole inesse, modo docui, & amplius paullo ostendetur. Manet ergo assertio. Augmenta porro hæc, & decrementa vnius Maculæ non facile sentirentur, quia illarum sub Sole mora non est, nisi summum ordinarie dierum 14. sicut autem Sol intra dies quattuordecim visualiter non augetur aut decrescit, ita & Maculæ sub ipso conspectæ è tantillo Solis accessu, aut recessu. Quia tamen, ex hypothesi perennarent, & consequenter sæpe redirent, sub alia, & alia magnitudine viderentur, an autem tam facile noscerentur, non ita certum, ob varias quæ intercedere possent causas.

*Macularum
apparens
augmentum
& decrementum
ex motu proprio.*

Assertio quarta, Dato, sed non concesso, Maculas perennare; & Solem ad nos non accedere, à nobis nihil recedere; nihilominus Maculæ mero accessu ad nos auferentur, recessu minuerentur.

Quia dum Solem ambiunt, ab ortu ad medium ad nos appropinquant, solari semidiametro, & consequenter optice augentur; à medio ad occasum à nobis abscedunt tantundem, & proinde minores apparent. Sed hoc augmentum, & decrementum ratione, non sensu percipitur, quia accessus hic fit secundum semidiametrum Solis, quæ ad distantiam nostram ab ipso, est minimum vt 1 ad 125. aut secundum alios vt 1 ad 100. &c. nam in hoc auctores non consentiunt: cæterum hic accessus vel recessus nullo sensu notatur; & patet experientia, nam Maculæ centrales non sunt latiores marginalibus, cæteris paribus, neque Solis ipsius ad nos accessus ad eiusdem semidiametrum, sensu notatur, &c.

*Macularum
decrementa
seu gracilitas
circa horizon-
tem, augmēta in
medio.*

Assertio quinta, Dato, sed non concesso, Maculas esse perennes & immutabiles, nihilominus omnes, & singulæ in ortu & occasu sunt graciles, & oblongæ, & ab ortu versus meridiem procedendo semper crescunt, dilatando sese in formam aliquam rotundam, à meridie in occasum vsque continenter decrescunt, optice: sit autem istud augmentum & decrementum potissimum secundum longitudinem Maculæ, non latitudinem. Considero autem longitudinem Maculæ secundum eius dia-

*Longitudo,
& latitudo
Macularum,
quænam?*

II.

metrum, qua ab ortu in occasum extenditur; latitudinem vero, qua ab austro in Aquilo. aut vice versa, exporrigitur. & hæc quidem pingui minerua: nam si hanc augmentationem & diminutionem, in rigore geometrico perpendamus, fiet illa, cæteris paribus, secundum radium à centro circuli solaris per centrum Maculæ protensum; sed quia Maculæ motus in parallelo proprio videtur eandem etiam nonnihil secundum iuum tractum inflectere; idcirco apparet ex ipsa Maculæ positione, ab vtriusque luctamine aliquid participari; propterea dixi potissimum; nam quod radius è centro Solis emissus, seu potius arcus circuli Maximi per centra Solis & Maculæ dictumque radium incedentis, mensuret Maculæ gracilitatem, & augmentationem atque diminutionem, argumento magno est, quod, cæteris paribus, Maculæ, præsertim circa horizontem, radio circuli solaris se magis accommodant, quam radio circuli paralleli; assidua namque obseruandi praxi compertum est, omnes Maculas, exceptis extraordinarijs quibusdam, iisdemque raris casibus, circa horizontem, extremam suam lineam, qua versus horizontem clauduntur conformare perimetro lucentis circuli quodammodo parallelam, ita vt sit apparenter segmentum circumferentiæ circuli ex vno eodemque Solis centro descripti, quæ res facit, vt radius è centro Solis per centrum Maculæ eductus, sit perpendicularis ad extremum Maculæ arcum, & chordam ipsi subtensam, quæ est latitudo Maculæ. Quamquam etiam esse posset, ad Maculam vtcunque gibbosam versus extrema, &c.

Quod si Maculæ transuersa in longum configuratio, aut cum alijs Maculis coadunatio, vel Nucleorum distorta forma, & concursus, aliam nonnunquam extremitatem offerunt, id generali huic doctrinæ, ex ordinarijs apparentijs deductæ, nihil præiudicat.

Ex hac apparentia constat primo Macularum superficiem extremam à Sole ad nos conuersam, globositate sua, à solari superficie sensu non multum differre; alioquin, si quas eminentias aut gibbos, vel inæqualitates præ se ferret, omnino in aspectu laterali iuxta ho-

I.

ta horizontem palam faceret.

Constat secundo Macularum exteriorem illam superficiem, extra solarem superficiem aut parum aut nihil emineret, alioquin ad tantam aspectus gracilitatem haud redigerentur.

Constat tertio, Macularum substantiam ex parte saltem Soli necessario immerfam, quod ut planum euadat, sciendum est, me Maculas laterales maiori ex parte ita, in Imaginibus observationum expressisse, sicut sese visui in circulo observatorio per Telescopium obicerunt, nimirum refractione circa marginem crassiores, quam sine eadem apparent, docente id ad centrum translatione; alias tamen non paucas, summo studio ad centrum traduxisse, indeque inspectam & animaduersam illarum gracilitatem centricam, ad margines consignasse, ut videre est, lib. 3. imagine XIX, pag. 177. Macula b; imagine XXV, 255. Macula b; XXVIII, 231. n; XXXIII, 241. a; XXXVI, 247. o, XXXVII, 249. a; XXXIX, 253. a, & c; XLVI, 273. c; LIII, 289. c; LVII, 297. a; LXI, 307. a; LXII, 311. d; & alijs multis, neque enim omnium exempla refricanda sunt.

Iam ut experiaris Maculas in Sole versari, do duas regulas practicas, ab experimentis plurimis haustas & firmatas.

Regula I. pro Maculis Marginalibus, refractione marginali imbutis.

Si in Macula marginali, plus quam tertiam partem à gracilitatis diametro apparente abstuleris, reliqua gracilitatis diameter ostendet Maculae contractae genuinam expansionem, centrali, ceteris paribus, ad sensum æqualem. Quia pars illa ablata, demit excessum, quo refractione marginalis, Maculam facit apparere maiorem, quam eadem Macula circa medium circuli observatorii posita appareat, & sic ablatum ille excessus facit magnitudinem Maculae centricam laterali refractione æqualem.

Regula II. Pro Maculis Marginalibus, ad centrum reductis.

Ex sinu verso, quem gracilitas Maculae lateralis in medium traducta exhibet

II.

in circulo solari, acquies semper plenam Maculae amplitudinem, centrali ad sensum æqualem.

Vnde euidens est, Maculam sola decliuitate in superficie solari facta ad marginem ita attenuari; nam si Solem excidat, tanta contractio Maculae nullo modo sequetur.

Considera exempla in citatis imaginibus; in quibus Maculae marginales praesertim ad aspectu horizonti attiguae, ita subtiles fiunt, ut aliquae sint ad semidiametrum Solis visuales, sub centesima, aliquae subducentesima, aliquae etiam subtrecentesima, omni videlicet filo serico tenuiores, ita ut sinus ipsarum versus, sit tantum $3'' 36'''$ posita Solis semidia metro 18'.

Dices primo, Etiam si Maculae ad aspectum ita gracilescent, ut arcus in superficie Solis illarum gracilitati respondens, sit ad sensum illi poene æqualis, qui totius Maculae amplitudini, siue in latum siue in longum in medio commensuratur, tamen adhuc non sequitur, ex hac diminutione apparenti, Maculas in Solem intrudendas, quia illarum Macularum apparens attenuatio, potest euenire à laterali Solis irradiatione, inquam dum oculus, spectante ad horizontem Macula, incurrit, superficies illa ex obliquo conspecta ad visum imminuitur, tamen si extra Solem Macula incedat, &c.

Ad hanc, speciosam obiectionem respondendo, Primo, Vbicunque sit Macula, si circa Solem ceteris paribus, obambulet, ex eo quod facie ad Solem conuersa plenissime illustratur, nec immiui, nec augeri oppositam partem non illustratam, quae, uti dixi, ceteris paribus, non fit minor, quando Macula circa horizontem, non maior, quando circa culmen versatur, sed eadem inuariata magnitudine manet; neque pars ad Solem conuersa, maior aut minor existit in meridie quam in ortu aut occasu; sed non illustrata ad visum nostrum variatur, non augmentatione, vera, aut diminutione, sed apparenti, idque propterea, quod Macula circa centrum Solis homocentricè gyretur, per quam gyrationem solam fit, ut minor compareat in horizonte, atque extra, secundum partem à Sole auersam:

Obiectio.

Responsio.

I. II

sam: an autem pars versus Solem illuminata maior, aut minor ad aspectum obuenire debeat; id quod etiam obiectio intendit, incertum est, experientia profecto e Phænomeno ipso, quæ alioquin promenda esset, huic voluntariæ imaginationi, nulla suffragatur: ratio quidem certa euincit, partem Maculæ Soli directo oppositam, illuminari debere, si Macula à Sole seiuncta existat, prout aduersarius supponit, at ab oculo nostro tanquam illustrem aspectari aut cerni debere, est incertissimum.

Primo, Quia si Maculæ superficies ad Solem conuersa sit concava, euidentis est, non visum iri.

Secundo, Si sit plana, rursus non spectabitur.

Tertio, Si sit multum compressa & parum cernetur.

Quarto, Et tamen si sit hemisphærica, ex vi argumenti obiecti non necessario in oculos incurret, ut patet exemplo Lunæ, cuius hemisphærium luminosum in conjunctione nunquam apparet.

Quinto, Et tamen si pars illa illustrata videretur, vel non discerneretur ab oculo tanquam aliquid distinctum a Sole, vel potius aliquanto appareret ipso Sole aliquid obscurius: sed illud non facit, ut id quod in auersa Maculæ parte obscurum est & gracilescit, gracilescat ideo, quia pars hæc ad Solem conuersa illustratur.

Sexto, Quia si Maculæ superficies à Sole auersa ponatur esse sphericè rotunda, illa talis apparebit circa horizontem, obiciet enim visui semicirculum; unde rursus & ultimo constat, illam partem quæ Solem respicit, ad gracilitatem nil penitus conferre. Superficies ergo Maculæ exterior valde compressa & quasi plana, aspectusque & situs Maculæ obliquus, hanc apparentem contractionem efficit.

COROLLARIUM

Hinc constat Maculas circa centrum Solis circumduci, non gyras, sed stabiles circa suum centrum; alioquin aliquando in horizonte solari laræ, non semper contractæ viderentur.

II.

Dices secundo, Maculæ augentur & minuuntur physicè; igitur gracilitas Macularum non est attribuenda soli ex illarum positione aspectui, sed multo amplius incremento vel decremento nativo.

Respondeo primo, Maculas quidem augeri, & minui physicè ex ipso Phænomeno palam est, & consequenter ex hoc ipso vel accrescere vel decrescere haud ambigitur, sed ex hoc, ipsa de qua agimus, gracilitas peculiare nil acquirit: etenim augmentum physicum, & decrementum Macularum fit in omnem loci differentiam, ut paullo post ex ipso phænomeno ostendemus, unde si Macula horizontalis physicè gracilescit, physicè quoque curtiatur secundum alias latitudinis dimensiones; similiq; modo si augetur gracilitas, accrescunt etiam extensiones aliæ; ex quo argumentum validum desumitur, si alicuius Maculæ ad horizontem constitutæ latitudo eadem inueniatur, quæ in medio Sole, (id quod ex obseruationis dinudandum erit,) Maculam ad sensum physicè nec auctam, neque minuatam, atque adeo in statu fuisse, ideoque ratiocinationem e linea gracilitatis deductam, suum robur obtinere: & propter hanc maxime causam, in prioribus assertionibus semper adieci illa verba, cæteris paribus, quod ad sensum fit, si Maculæ in statu versantur, qui communiter per dies 6, 8, 10, aut plures perdurat in Maculis nucleosis; &c. ita ut ab horizonte ad medium, aut contra, in statu magnitudinis ad sensum inuariato, quamplurimæ perueniant, quod satis est ad intentum meum, nam quidquid de aliquibus ex attenuatione illarum solide demonstratur, id absque dubio ad omnes & singulas applicari poterit, nisi omnino ante deficerent, quam ad horizontem pertingerent.

Quod si, ut dixi, ex imminutione Physica, Maculæ gracilitas adiumentum accepit, patebit id sequentibus visis.

Primo, Macula cuius in horizonte latitudinis diameter breuior apparet, quam in medio, sine dubio illic physicè minor extitit, quam hic, & consequenter profunditatis, quæ & gracilitatis, diameter minor fuit in horizonte, quam in Sole medio. ubi tamen oportet sedulam

Macularum
apparens
gracilitas
oritur ex
parua ipsa-
rum profun-
ditate seu
crassitie, &
sua ipsarum
ad visum
obliquo cir-
ca horizon-
tem.

Status seu
magnitudo
eadem Ma-
cula, unde
cognosca-
tur.

I.

II.

*Ac, & quo-
modo Ma-
cularum
gracilitas
ab imminu-
tione physi-
ca adiuue-
tur?*

dulam ab Observatore adhiberi curam, ne in hoc genere decipiatur; nam Maculae ad marginem solarem tendentes, & gracilescentes ita videntur ordinariè inuolui & absorberi nebuloso quasi quodam habitu, vt ab oculo, etiam aquilino, ægre admodum discernantur; & hinc euenire posset, vt Macula putaretur magis attenuata apparere; quod physicè quoque aliquid de sua magnitudine amisisset, & exinde vis argumenti elideretur: quod ne eueniat, natura ipsa vna cum arte pulcherrimè cavit. Nam si Maculam marginalem maligne distinxeris sub circuli obseruatorij perimetro, traductam ad centrum eiusdem, synceram & limpidam contueberis.

Secundò, Macula cuius diameter latitudinis in horizonte solari, superauit eam, quæ in Sole medio comparuerit; fuit in horizonte physicè maior, quam in medio; & consequenter minus gracilescerat.

Tertiò, Macula quæ æquales latitudinis diametros exhibet in margine, & medio Sole, utique physicam magnitudinem sensibiliter non variauit, & consequenter profunditatem, adeoque gracilitatem marginalem, ex augmento, aut decremento physico non variauit: & obiectio contra allata, nil obrinet.

Nam si physica auctio vel diminutio in gracilitatem aliquid infert, id scitur è diametro latitudinis, ad quam si Macula assumatur, & ex assumpta ratiocinemur, inuenientur iterum gradus gracilitati apparenti debiti; & Maculae æque in Sole, vt antea inuenientur.

Respondeo secundò, Nullas Maculas hucusque extra horizontem solarem, versus centrum positas, in Sole medio visas esse gracilescere, vel è gracilibus dilatari, cum tamen physicè quotidie ampliuntur & deficiant; vnde signum manifestum est, Macularum contractionem illam, non esse effectum augmentationis aut diminutionis physicè, sed solum ad aspectum positionis, quam circa solem conuersio efficit. Non nego, Maculas aliquas altera parte longiores, & proceriores passim existere, sed illam proceritatem habent vel à natiuitate, vel aliarum adiectione, vel alteratione, non autem è maiori in mi-

norem attenuatione, &c. eaque regulari & ordinata, prout sit circa horizontem.

Dices tertiò, Ex ipso Phænomeno constat Macularum gracilitatem non esse semper eiusdem tenoris, sed in æqualibus etiam Maculis inæqualem, ita vt eius diameter alias sit finis versus duorum, alias trium, alias quattuor, quinque, aut sex plurimumue graduum; ergo signum est, Maculas non necessario in Solem collocandas, sed extra ponendas esse.

Respondeo verum esse, & ex obseruationibus accuratissimis constare; Macularum etiam æqualium gracilitatem, refractione omni seposita, differentem esse repertam, & sine dubio in posterum reperiendam; ex hoc tamen plus non obtineri, quam ipsarum Macularum aliquantam profunditatem in mole, deinde protuberationem supra solarem superficiem, quam illis nunquam negauerim in superficie à Sole auersa; sed hoc ipsas totas extra Solem non euocat in quem alteram sui portionem immerfam habent. Neque enim opinandum est, omnes Maculas, & Faculas ita à centro Solis abesse, vt vnā eandemque indiuisibilem geometricam distantiam sint nactæ, sed aliæ alijs, vt mole, ita recessu non nihil variant; argumenta huius rei suppeditat ipsum Phænomenon, tum ex allatis, tum ex eo, quod multæ Maculae solari luce videantur conspectæ, neque horizontem assequantur, &c. Certe de Maculis & Faculis secundarijs quamplurimis id pro comperto habeo. Propterea dico, Maculas versari in superficie Solis physica, quæ non est Mathematica indiuisibilis, sed sensibili latitudine prædita. Sicut dicimus & videmus naues & aues innatare in summitate Maris. Arborum certe ea natura est, vt quædam aquis plus quam dimidio crassitudinis superuehantur, quædam dimidio; aliæ tandem ad summitatem vsque aquis immergantur, talem esse Macularum in Solis superficie physica statum, arbitrari ex allatis æquum est.

Dices quartò. Si Maculae circa suum centrum gyrentur, & instar disci tenues esse fingantur, gracilitatem circuitu proprio offerrent absque eo, quod in Solem,

*Quomodo
Macula in
physica So-
lis superfi-
cie insint,
doctrina no-
tabilis.*

I.

Solem, aut tantam ipsius viciniam inducantur.

Respondeo primo. Ex data hypothesis hac sequuturam Macularum gracilitatem, sed phaenomeno inconuenientem, quia etiam in medio Sole Maculae gracilescerent, & circa margines frequenter plenissimae expansae essent, quod est contra Phaenomenon.

Respondeo secundo, Si Physicen & rerum naturas velimus, e figmentis proprijs, ratione & experientia destitutis efformare; futurum, vt statuamus quoduis, asseramus quiduis, & voluminibus Quodlibeticis mundum infarciamus. nam fingere non est ex effectibus rerum naturalium causas eruere, sed monstra rerum ex arbitraria imaginatione, somniantium more, parturire. Maculas autem circa centrum suum non rotari, ex istis est euidentissimum.

Rationes, quibus probatur Maculas circa centrum proprium non gyrrari.

Primo, Quia nulla Macula circa centrum gracilescit, quod tamen deberet fieri.

Secundo, Quia nulla circa horizontem amplitudine plena conspicitur, quod tamen aliquando necessario contingeret.

Tertio, Quod nulla vnquam partem suam occidentalem in orientem, aut contra conuertat, sed situ ad Eclipticam, & suum parallelum; eodem constanter permaneat, vt ex obseruatis Macularum figuris, nucleis, atque alijs accidentibus euidentissimè constat.

Quarto, Quod quando summè gracilis esset, etiam latitudinis diametrum amitteret; cum enim ex hypothesis in formam disci effigientur, quando gracilescunt, illustrabitur huius disci perimenter à radijs solaribus, & sic Maculae latitudinis diameter absorbebitur quasi tota. Hæc & his similia, contra Phaenomenon impossibilia contingent, vt nil dicam de Faculis, quæ hanc opinionem funditus euertunt, &c.

Phaenomenon sequendum, non ad praecocia placita violenter trahendum est.

In re autem physica, vbi naturæ ductum sequi, non cæco affectu antecede-
debemus, talia sine præuio aliquo sensus experimento, ex mera lubentia aut nescio quo animi morbo asseuerare, non est veritatem inquirentis, sed vanitatem temerariè obtrudentis, &

II.

vt verbo dicam, cum ratione infanientis.

COROLLARIA

Primum. Omnis Macula cæteris paribus, in horizonte solari est minima, optice, maxima in medio cursus. Quia in horizonte spectatur secundum suam lateralem crassitiem, ideoque gracilis, in medio secundum totam amplitudinem. Dixi, cæteris paribus, quia fieri posset, vt Macula exoriens (id quod sæpe fit) inciperet decrescere physice, & tunc contingere posset, vt aut magnitudo orientalis, accedente præsertim refractione, adæquaret mediam; aut vice versa, vt Macula in medio exorta, physice augesceret (id quod etiam crebrum est,) & tunc rursus accidere posset, vt occumbens, mediam æquaret, vel superaret magnitudine, id quod sæpius euenit. ago autem hic de magnitudine visuali.

Minima & maxima Macularum magnitudo optica.

Secundum. Omnis Macula, cæteris paribus, dum ab horizonte versus medium progreditur, augescit optice. fit hoc ex eo, quod suam superficiem, vmbrosam, semper magis ex obliquo in directum situm versus aspectum prouehat.

Augmentum opticum fit versus medium Solis.

Tertium. Omnis Macula, cæteris paribus, à medio versus occasum declinans, fit minor optice. Quia ex situ ad oculum obliquo, angulus visorius fit minor, cui etiam si Maculae crassities fortassis adijciatur, ex illa tamen non compensantur, quod hinc decedit.

Decrementum opticum fit à medio Solis.

Quartum. Propter augmentationem Macularum physicam, sæpe fit, vt decrementum earundem opticum compensetur, aut quandoque superetur; & propter imminutionem physicam, vt augmentatio optica absorbeatur. Patet vtraque ex experimentis quotidianis, in Obseruationum Imaginibus vbique obuijs.

Augmentum physicum variat opticum, &c.

Quintum, Cæteris paribus, Macularum augmentatio optica, fit continuè & sensim, eodemque modo, diminutio. Quia ipsarum circuitio est continua, semperque dum ascendunt augentur, dum descendunt minuuntur.

Augmentum opticum fit successiuè.

Sexto, Cæteris paribus, Macularum augmentatio optica est similis, & æqualis

æqualis Macula exhibuisset in centro Solis a, constituta, & circa idem seu suum proprium motu proportionali rotata.

*Suppositio-
nes.*

Quod ut ostendam, suppono ex usitata Astronomorum praxi, radios è singulis solaris circuli punctis ad visum nostrum progressos, censerique tanquam parallelos, & ad Solis planum hemisphærij visibilis terminum, perpendiculares, ob anguli nimirum visorij exilitatem. Suppono deinde, semidiametrum Solis d a, ad eam distantiam quæ inter nos & Solem intercedit, optice non esse perceptibilem, ita nimirum, ut si Macula aliqua constituitur in centro Solis a, non sit apparitura minor, quam si videatur in eiusdem superficie apud d, distantia namque solaris tanta est, ut neque ipse Sol, semidiametro a d, nobis vicinior conspectus, ad sensum augetur, quanto minus ergo, una aliqua Macula Sole rãto minor? His ergo suppositis, statuamus cursum Maculae apparentem rectilineum in circulo maximo b d f, & hanc ob causam in eodem cum oculo iacebit plano, ad quem oculus è centro Maculae n, p, r, t, x, egrediantur radij n o, p q, r s, t u, x y, inter se paralleli, & ad circulum solare, quem recta z a, exhibet, recti. Oculus igitur intelligitur esse, o, q, s, u, y, & axes optici in centrum Maculae delati o n, q p, r s, u t, y x; ex quorum in diametrum longitudinis Maculae b c, g h, i K, &c. incidentia, colligitur situs Maculae ad visum rectus vel obliquus. Est autem diameter longitudinis Maculae, chorda b c, g h, i K, l m, e f, sit autem in centro Solis a, Maculae b c, æqualis & similiter posita Macula $\beta \gamma$: & nectantur utriusque Maculae centra, n, & a, recta linea a n; quæ quia in radios n o, a s, parallelos incidit, faciet angulos alternos o n a, s a x, (protracta n a, in x,) inter se æquales; est autem angulus o n a, per 3. tertij rectus, quia chorda b c, secatur bifariam in n, a recta a z, igitur & s a x, atque illi deinceps s a n, rectus est &c. axes ergo optici tam o n, quam s a, in directum protensi sunt cum diametris b c, & $\beta \gamma$; adeoque angulum nullum comprehendunt; & sic similis & æqualis utrinque habetur Maculae utriusque aspectus


Probatio.

ad visum o, & s. Iam quia proportionalis est utriusque motus, si linea motus a n. Maculam b c, deduxerit in p, ut eius diameter sit g h, quoniam Macula $\beta \gamma$, proportionaliter moueri supponitur circa suum & Solis centrum a, dum linea a n, processit in p, diameter Maculae centralis $\beta \gamma$, ex y, peruenit in s, & est angulus y a s, æqualis angulo n a p; addito communi p a y, fiunt æquales p a s, y a n; est autem y a n, rectus ostensus, igitur & p a s, rectus est; sed & g p a, est rectus, quia a p, diametrum g h, secatur bifariam in p: ergo diametri a s, g h, sunt inter se parallelae, & producta p a, in s, facit angulos q p s, s a s, inter se æquales, à quibus ablati recti h p s, s a s, remanent æquales inter se q p h, s a s; & consequenter eadem ad oculum q, habitudo Maculae g h, quæ Maculae a s, ad oculum s: sunt enim similes situs, & aspectus. Sic, ubi Macula i K, medium attigerit, habebit Macula a s, suam promotam diametrum n o, diametro i K, parallelam, ex eo, quod propter similem motum, dum linea a p, ex p, in r, ascendit, diameter a s, ex s, in o, peruenit, adeoque angulus s a o, æqualis sit angulo p a r, additoque communi r a, fiant duo æquales p a s, s a o; cumque hic ob axem s a, rectum ad z a, sit rectus, & rectus etiam i r a, patet diametros n o, i K, inter sese esse parallelas, ideoque angulos rursus omnes, s r K, s a o; & s r i, s a o, &c. inter se æquales, adeoque utriusque Maculae n a o, & i r K, ad oculum s, similem & eundem situm. Eodem modo probabitur angulus n a s, æqualis angulo l t u, & consequenter Maculae n a s, & l t m, situs & aspectus s, & u, similis: idem fiet, postquam Macula e x f, horizontem occidentalem contigerit; idem enim huius, & Maculae $\beta \gamma$, aspectus contingeret, videlicet totus lateralis; & sic ostensa manet allata in principio propositio.

Quam ob eam causam demonstrare volui.

Primò, Ut appareret, quamlibet Maculam, dum ab ortu in occasum tendit ad aspectum nostrum totam pene conuertere, quemadmodum ex Maculae a, diametro $\beta \gamma$, euidenter animaduertitur. Nam punctum y, transit in s, & s

in.



in *a*; rursus ex *a* in *θ*, & illud ex *a* in *u*, in quo situ plena Maculæ facies à Sole auersa conspicitur: postmodum punctum *β* ex *u*, pergit in *u*, & *γ* ex *θ* in *l*; & tandem ex hoc, punctum *γ* consistit in *β*, & *β* ex *u* in *γ*; qua positione totum Maculæ latus orientale patescit, quemadmodum in positione prima orientali, totum occidentale, itemque crassities ex parte, & gibbus superficiei exterioris si quis est. Nam interioris terminus Soli immersus & inflammatus, secerni ab oculo non videtur posse, solaris fulgoris vehementia, & partis accensæ similitudine.

Secundò, Vt constaret, quid ex op-

II.

1 tics & geometricis principiis ad aspectum cuiusque Maculæ sequeretur, si perennes & inuariabiles forent redirent enim eodem medio &c. nunc quia perpetuæ motationi subsunt, hæc omnia, non tamen perfectè, in paucis, iisque quæ parallelos circulos maximo vicinos describunt, experiri licet. Nam aspectus dissimilitudinem physica illarum augmentatio & diminutio, alteratio & figuræ mutatio, supra modum varium inducit; quem proinde explanare aggredimur.

COROLLARIUM

Ex his constat, eam Macularum & facularum superficiem, quæ visui in ortu patet, latere in occasu; & quæ patet in occasu, occultatam fuisse in ortu.

M A C U L A R V M
solarium Agmentatio
& diminutio
Physica.

CAP. XXXVII

Quomodo Maculae solares Optice, vel ex refractione, vel situ & varia ad aspectum positione augeantur vel decrescant, dictum & intellectum est satis: nunc videndum est, an præter communes illas ad aspectum magnitudinum variationes, etiam aliae ex parte rei, quas physicas dicimus existant.

Omnes Maculae physicae augmenta & decrementa suscipiunt.

Dicendum primo. *Ut quæque res naturales, à parvis initiis in magnas excrescunt, atque in eo, quem acquisierunt statu aliquandiu sese conseruant, tum tandem denuo deficiunt.* Ita hoc in Maculis solaribus omnibus & singulis est sollemnissimum: nam ex tot illarum millibus, quas hætenus summo studio per multos annos obseruavi, nulla reperta est, quæ non, saltem aliquantulum auxerit, nulla quæ non defecerit. Tempus igitur Maculae cuiusque est triplex: Augmentationis, status, & decretionis: quæ alia probatione non egent, quam diligenti obseruatione, vel saltem mearum obseruationum inspectione.

Magnitudines Macularum initiales sunt inaequales.

Macularum augmentum successuum varium.

Dicendum secundo. *Cum nihil augeatur, quod non sit quantum, Macula quidem omnes augescenda magnitudine aliqua sensibili sunt prædita, atque initio non adeo magna, ad sensum tamen non equali; nam aliae alijs maiores existunt. Patet ex Phænomeno.*

Dicendum tertio. *Macularum singularum augmentum fit continuè & sensim, sed inaequaliter.* Nam aliae Maculae citius augescunt, aliae tardius. Patet experimento & praxi obseruationum, ex ipso Phænomeno desumptarum.

1 Dicendum quarto. *Macularum status est inaequalis, & plerumque augmentationis tempori proportionatus, nam quæ cito augescunt, non diu hærent in statu, sed breui etiam durant, iuxta prouerbiū, quod cito fit, cito perit.* Dixi plerumque, quia aliquando accidit ut tarde crescens, & diu consistens cito deficiat; aut cito enascens, diu stet, & tarde sensimque deficiat. Patet ex ipsa Phænomeni continua tractatione.

Status Macularum proportionatur tempori augmentationis &c.

15 Dicendum quinto. *Physicum Macularum decrementum, continuè, & successuè fit; sed inaequaliter.* Etenim quædam Maculae cito imminuuntur, quædam valde lentè; & plerumque deficientium tenor, est geminus augescendi modo. Patet ex obseruationibus passim.

Decrementum Macularum proportionatur augmento.

20 Dicendum sexto. *Tam augmentum quam decrementum Macularum Physicum, non est alligatum unicertæ Solis plagæ, quemadmodum dilatio & contractio earundem Optica; sed illa cernuntur in omni vise Regiæ loco, Macularum cursibus visitato, fieri: siue in ortu, siue in occasu, seu denique inter utrumque; idque modo in*
30 *plaga australi, modo in boreali.* Et sic fit, ut eodem Solis loco modo aliqua Macula fuerit augmentata, paullo post succedat alia, quæ ibidem deficiat: cuius contrarium euenit in augmentatione optica, quæ ad locum est alligata. nam ab ortu versus medium omnes augentur, à medio versus occasum omnes imminuuntur. Physica augmentatio & diminutio, hanc legem abrogauit: plurimas enim Maculas auget in occasu, plurimas in ortu deterit, in medio omnino extinguit; quanquam contraria etiam frequenter eueniunt.

Augmentum & decrementum Macularum Primariarum, non alligatur ad certam Solis loca, sed videntur sibi totam viam Regiam, Secundariarum totum Solē.

40 Aliter hæc probari non possunt aut solent aut debent, quam ex ipso Phænomeno, & accuratis eiusdem animaduersionibus, quas inspicias licet toto libro priore. Et hæc quidem de Maculis primarijs, nam secundarijs totus Sol debetur.

50 Dicendum septimò. *Eodem tempore, & in eadem Solis plagæ est sæpe cernere, alias Maculas crescentes physice alias decrescientes.* Patet ex Phænomeno, & experientijs quotidianis.

Eodem loco & tempore, aliae Maculae crescunt, aliae decrescunt physice.

Dico

I.

Tempus quo unaquæque Macula crescit, consistit, & deficit, est quasi idem, le sunt equalia. Dicendum octauò. *Tempora quibus Macula unaquæque crescit physice, quibus consistit, quibus decrescit, inter se ad sensum ordinariè, respectu unius Maculae sunt equalia.* Ita deprehensum est ex approbatis Phænomeni obseruationibus.

Tempora augescendi, consistendi, & deficiendi diuersarum Macularum inter se sunt inaequalia. Dicendum nonò. *Tempora quibus diuersae Maculae augentur, consistunt, & imminuuntur, inter se sunt saepe inaequalia.* Aliquæ enim ad dies plus minus 14, aliquæ ad 8, aliquæ ad pauciores perueniunt; nonnullæ etiam, spatijs horarijs continentur. Patet ex ipso Phænomeno.

Tempora augmentis Macularum non sunt proportionalia. Dicendum decimò. *Augmenta Macularum solarium non sunt proportionalia temporibus augendo, &c. insumptis.* Nam quædam multo tempore parum, quædam paucò multum excrescunt. Patet ex obseruatis.

Macularum diametripri mo visa excrescunt ad varias, & magnas rationes. Dicendum vndecimò. *Augmenta Macularum, & decrementa saepe perueniunt ad rationem diametri primæ, duplam, triplam, & amplius: fuerunt enim quæ sextuplam excederent.* Inspice Maculas a, b, c, in Imagine obseruationum LXIV. pag. 315. Libro tertio & videbis augmenta incredibilia. Inspice Maculas b, in Imagine XXIX. pa. 233. Lib. Tertio, & notas tam harum quam aliarum diligenter lustra.

Vbi tamen vniuersim pro comperto habeto, me initia Macularum studio nunquam minora, & augmenta nunquam maiora fecisse quam apparuerint in proportionem ad circulum solarem, vt sic veritatis vis certior & neruosior prodiret: vt taceam, Maculas per se, horizonti vicinas magis semper dilatatas apparere refractione, quam in medio. ita vt de augmentationis huius quâtitate nō sit vllatenus ambigendū, cum certissimus sim, nonnullas in deculpam vsque rationem diametri primæ extensas esse.

Macularum augmenta sunt à medio earundem versus omnem loci differentiam. Dicendum duodecimò. *Singularum Macularum augmentum physicum solet fieri, ad omnem loci differentiam, à Macula centro versus perimetrum profectum.* Patet experientia, & probatur ordinatione Maculae ad Eclipticam, à qua semper erit remotum centrum Maculae, consistens in itineraria linea, dum reliqua vtrinque excedunt. patet

II.

amplius ex Macularum indagandis veris locis, quæ semper sunt penes Macularum centra sumenda item ex earundem nucleis, &c. medium obtinentibus. &c.

Dicendum decimotertiò. *Physicum Macularum singularum Macularum decrementum, decremētum solet, fieri ex omni loci differentia, à perimetro, versus centrum Maculae procedendo.* Patet experientia physica, & praxi obseruandi, & centri statione fixa, super arcum itinerarium; id enim quod ex imminuta Macula remanet, à polo, super quem ipsa mouetur, semper æqualiter distat, prout ex obseruatis didici.

Dicendum decimoquartò. *Emulgarum paruularum Macularum sibi vicinarum augmentationibus, saepe emergit, vna Macula, & ex unius diminutione saepe multæ paruulae relinquuntur.* Et in hoc casu vna Macula est aggregata è multis, & vice versa, id quod in hoc Phænomeno frequens est.

Huic affine est, quod laterales vmbræ, vel comites nouæ, non motu locali, sed ortu physico atque alteratione ad Maculas accedunt, vel rursus decedunt ocaasu physico, siue alteratione, tum enim Maculae non à centro augeri, vel ad idem imminui, sed ex certo aliquo latere videbuntur. Quod quando fit, nihilominus doctrinæ generali nil officit, quia hæc non propria Maculae augmentatio, sed duarum coalitio. cuius rei in obseruationibus exempla innumera visuntur.

AVGMENTATIONIS

& diminutionis physice proponuntur modi varii.

CAP. XXXIIX.

OMNIS rei extensæ augmentatio aut fit rarefactione sola vt quando idem numero humor aut aer ex attenuatione plus loci occupat. aut alteratione sola, vt quando aliqua ferri pars æruginosa, inficit proximam, dicitur ærugo crescere. aut vtrisque, vt quando ignis in puluerem tormentarium incidit. aut sola figuræ mutatione; vt quando humor ex am-

H h h 3 pulla

I.

pulla sphaerica in fundum planum vasis amplissimi effunditur, augetur aqua, non mole, sed superficie tenus; aut quando aureus Hungaricus in lamellas tenuissimas tusione distenditur, superficies augetur, manente materia & solidi quantitate eadem. Aut similis accessu: ut cum cadente pluvia, torrentes & flumina intumescunt. aut adgeneratione, ut cum planta crescit. aut generatione substantiali, ut cum ex subministrata materia, incendium crescit, &c.

Maculas aliquo dictorum modo augeri, necesse est.

Macula sola rarefactione non augentur.

Præter dictos augescendi modos physicos, alij non videntur ulli naturaliter intelligibiles vel possibiles. Vnde cum Macularum augmenta & decrementa physica ante oculos quotidie obuersentur, necessarium omnino est, aliquo vel aliquibus istorum modorum accrescant.

Conclusio prima. *Maculas solares augeri sola rarefactione, non est ullo modo probabile.* Quia quodcumque aliqua Macula augetur, semper obscuritas illius etiam intenditur, & plerumque in medio sensibilis acquiritur: quorum tamen contraria deberent accidere; quandoquidem rarefactio non fit sine locali partium à partibus distractione, quæ proinde vel transparentiam vel claritatem, non opacitatem maiorem causat, præsertim si inter visum & luminosum corpus rarefaciendum intercedat, ut in nostro proposito accidit: nam inter Solem, & oculum Macula quævis interijcitur, Sol ergo rarefactam magis penetrabit: & confirmari potest exemplis innumeris physicis, à vaporibus, à nebulis, à nubibus, à fumis tenuioribus, quæ quo amplius rarescunt, hoc solaribus radijs magis peruia fiunt.

Amplius si Maculae sola rarefactione augescunt, ergo minuentur sola condensatione, cuius contrarium exhibet experientia ocularis: nam quanto minores euadunt Maculae, tanto illustriores, & consequenter rariores apparent.

Sola locali superficierum extensione Maculae non augescunt.

Conclusio secunda. *Maculas solares augeri sola superficierum extensione, instar aquæ effusæ, instar laminae extensæ, non est ullo modo probabile.*

Primò. Quia quo magis augentur in superficie extrema, hoc crassiores fi-

II.

unt secundum profundum, ut constat, quando ad horizontem existunt.

Secundò. Quia in medio sui minus transparent.

5 Tertiò. Quia diminutio illarum, esset superficierum contractio, & consequenter soliditatis augmentatio, quod tamen falsum est &c.

10 Conclusio tertia. *Maculae solares, sola alteratione physica non augentur.*

15 *Probatur primò.* Quia per huiusmodi alterationem deberet radius solaris à visu variè excludi, iuxta exigentiam Phænomeni, quod fieri nequit, nisi taliter variata interpositione corporis opaci, seu adiaaphani, ac proinde terminati coloribus, à quibus solis specierum lucis transitus inhibetur,

20 Sed talis varia interpositio huiusmodi corporis, iuxta exigentiam Phænomeni, per solam alterationem physicam haberi non potest.

Ergo Maculae solares sola alteratione Physica non augentur. Maior suam secum affert probationem, ex iam declaratis.

30 *Probatur Minor.* Quia si nulla nouæ materiae accessio fiat in augmento Macularum, sed materia quæ coepit in Maculam conformari, eadem semper per actionem Solis alteranda sit, ab agente eodem patibili eidem similiter sese ubiq; habenti similiter applicato; non proueniet in tali materia diuersitas, quam tamen euidenter experimur, dum æquabilis ante umbra, & vestigium Maculae, nucleum in medio sui acquirit, tanto nigrore ad sensum opacatum, præ reliquo circumiacente corpore.

40 *Probatur secundò.* Quia si alteratio sola est quæ Maculas gignit, sola quæ auget, & nucleum addit, aperte sequitur, quod eodem agente applicato ad illam materiam, nullo alio motu quam talis alterationis variatam aut variandam, Maculae nunquam deficient semel per illam procreatae & auctae: hoc autem expressè est contra Phænomenon.

50 Conclusio Quarta, *Maculas solo motu locali, & accursu materiae similis ad similem, secundum varias gyrationes minorum corporum gigni & augeri, pariter quoque solo tali motu imminui & desinere, non est probabile.*

Probatur.

Maculae non augentur sola alteratione.

Augmentatio & diminutio Macularum non fit solo motu locali similis materiae.

I

II.

*Probatio
prima.*

Probatur primo. Quia ex modo quo fit & augetur Macula, iuxta obseruata toties & tam accurate in hoc Phænomeno, colligitur apertè oppositum. Nam non semper quæ tardè crescunt, tarde etiam dissipantur, & è contra; licet vt notauimus, id sæpius eueniat, habeatque suam causam in materia aliter & aliter alterabili.

Præterea nucleus in medio acquiritur, & ibi augetur & apparet tetrior ambiente nucleum vmbroso, neque similiter constipato, & nigricante, quod fieri deberet, si per varias gyrationes aliunde ad totam Maculam propius accederent huiusmodi minora corpora; neque magis rarefcente & dissipato, quod fieret si ex illo ad formandum, vel augendum cum maiori fuscatione nucleum, corpora ad medium accurrerent.

*Probatio
secunda.*

Rursus sæpe Macula in medio aliarum constituta, crescit in mole & opacitate, dum aliæ sibi circumpositæ simul proportionaliter in gyrum singulæ crescunt & tetriores apparent; exempla plura habes in obseruationibus productis, hoc autem signum est, illarum corpuscula, licet præ reliquis mediæ viciniora, ad illam augendam non accurrere tali motu, ac proinde illa sic excrecere, ebulliente aliunde materia quæ per alterationem aliquam principium acquisierit alio & aliter constituendi quam ante.

*Probatio
tertia.*

Adde quod sæpe materia Maculam crescentem vel decrecentem immediate circumstans, est luculentissime faculosa, ac proinde prorsus inepta illius sic nigricantem opacitatem augere, aut ex illa solo motu locali dissipata provenire.

Huc pertinent sinus Macularum varijs anfractibus repentium, ij enim plerumque Faculis illustribus elucet, cum interim Maculæ ordinarie deficiunt, cuius oppositum deberet accidere, si Maculæ solo motu locali, & appositione similis materiæ augeterentur aut decrecerent.

*Probatio
quarta.*

Attende pariter circumiectis Maculis decrecentibus mediam nigram non crescere; vel è contrario hac imminuta circumpositas non augeri; id autem eueniret, si corpuscula per suas perio-

1 dos accurrentia ad vnum locum Maculam constituerent, & augerent; & ab eodem loco hinc inde digrediendo minuerent & dissiparent.

5 Insuper incrementum Macularum ordinarium est vndique sphericæ versus earundem centrum, ex omni loci differentia & decrementum est quaquaversus in orbem, ex medietullo ipsarum; & dum imminuitur Nucleus, circūiectus pariter vaporosus amictus, & colore diluitur & magnitudine deficit: talis autem motus gyrationum in corporibus hisce minoribus, si quæ sunt, ad ea sic aggreganda vel dissolueda, non modo cum reliqui cæli, sed cum corporis solaris duritie est incompossibilis; id quod bene aduertant, qui Maculas ex nescio quarum stellularum confuxu componunt, nam si singulis orbes attribuant, in infinita absurda adigentur.

Et confirmatur validissime eatenus disputata ex eo, quod Macularum medietullium, plerumque densius & nigrius existat, partibus ad extrema vergentibus, iam si, ex mente aduersarij illa materiæ mediæ nigredo ex mera particularum extrinsecus superaggestarum per motum localem exaggeratione pronasceretur, oporteret Macularum insigniorum nucleos aduersus aspectum nostrum in modum turbinis acuminari; id quod Phænomeno manifestè reclamatur: nam turbinata illa superficies, in laterali Macularum circa horizontem consistentium obtutu, sub figura trianguli isoscelis, aut similis appareret. ostendimus autem hucusque ex ipsa Phænomeni praxi, Macularum globosam versus nos superficiem, vix eminere in tantum, quantum satis est, vt ipsam supra sphericam Solis extremitatem aliquantulum euehamus. ex quo necessario sequitur, isto corpusculorum motu locali extrinsecus assumpto, Maculas sufficienter minimè augeri, sed ad subsidia etiam intrinsecus assumenda esse confugiendum, materiamque illam augmentationi Macularum interueniente ex ipsis globi solaris visceribus glomeratione quadam locali, præuijs & comitantibus multis alterationibus physicis, ad exteriora propelli, & sic tandem partes illas conglobatas, in massam

*Probatio
quinta.**Difficorum
confirmatio
prima.*

I.

II.

sam illam durabiliorem constipari. Fa-
uet huic veritati Macularum diuergen-
tia quæ quandoque in motu fit, & con-
uergentia, alioqui defensu & explicatu
satis difficilis, &c.

*Confirma-
tio secunda.*

Amplius hoc ex eo solidatur, quod
corpuscula illa vaga, neque libere ne-
que in sphaeris circumlata Maculas au-
geant: non hoc, quia corpusculis sin-
gulis deberentur sphaeræ singulae, prop-
ter motus singulorum diuersos; unde
sphaerarum infinitus numerus, & mutue
implicationes, atque earum inter se &
cum Sole necessariae penetrationes ex-
surgerent, nam omnes in Macula com-
munes suas conjunctiones & interse-
ctiones facerent: &c. non illud, quia
concurfus illarum aut esset naturalis
aut non. Si naturalis, quando in Ma-
culam confluxerunt, illic omnes hære-
rent, & à motibus proprijs cessarent;
nam motus ille quem Macula circa So-
lem peragit, est omnibus illis corpu-
sculis communis, nullius proprius &
consequenter non naturalis: si igitur in
congesta Macula tanquam loco natu-
rali a motu proprio cessarent, quiesce-
rent illic, neque dissoluerentur, quia
agens quod illa dispelleret non esset,
nisi Sol, hic autem sibi semper similis,
ex hypothese aduersarij, & actionis e-
iusdem, si Maculae collecta corpuscula
dispelleret, impediuisset eadem vi col-
ligenda; si vero Maculae locus non sit
corpusculis illis naturalis, quis tenet
illic ipsa tamdiu collecta? non Sol, quia
semper teneret: non aliud agens, quia
præter Solem nullum est, aut fingi po-
test, Quiescent ergo illic in Maculam
congregata illa corpora, aliunde, non
natura sua retenta; cumque præter So-
lem retinens nullum sit, ipse semper re-
uincta, & catenis perpetuis constricta
tenebit. Maculae ergo perennabunt,
quod est contra Phænomenon.

Quod si Motu naturali istorum cor-
porum Macula fit & crescit, oportet
eodem motu denuo dissoluatur; per-
gent ergo singula illa corpora secundum
suas tendentias; plurima ergo illorum,
imo maxima pars, Solem ipsum pene-
trabunt neque dici potest, ipsa regredi;
nam motus ille priori contrarius esset
violentus, cuius causa efficiens nulla
reperitur idonea.

Iam si confluxus iste non est natura-
lis, sed vel violentus vel præter natura,
necessarium est, corporibus illis à Sole
indi; unde oportet ipsa trahi; cumque
Sol, ex aduersarij suppositione ubique
homogenus & actiuitatis æqualis sit,
impossibile esset, ab ipso ista corpuscu-
la trahi nisi per lineam rectam breuissi-
mam: hæc enim omnes alias actiuitate
antecellit; corpus ergo quodlibet ad
Solem sub perpendiculari linea accessis-
set, & sic Macula nulla vnquam nata
esset, quia corpuscula illa non coiuis-
sent: singula autem visum nostrum ef-
fugiant, Macula ergo spectabilis nulla
collecta fuisset.

Accedit, quod mens nostra non ca-
piat, quomodo corpusculum eiusmodi
loco Maculae centrali superstans, an-
tequam in Maculam deueniat, cum ip-
sa Macula circumeat, sine vlla deui-
atione aut discessu à linea perpendicu-
lari, cum tamen Macula quæuis sem-
per duobus motibus agitur.

Denique, si abeuntibus in varias par-
tes corpusculis, secundum peculiare
gyrationes dissociatis Nucleus Maculae
variaretur, necessario is opacitate de-
ficiens in mole cresceret, & ambiens
illum vapor opacaretur & cresceret
quod est aperte contra Phænomenon.
Postremo ex modo quo Faculae occu-
pant locum Macularum, colligitur e-
uidenter Maculas non defecisse mera
dissociatione corporum minorum, qui-
bus vnitis formarentur, in diuersa ten-
dentium, non enim Faculae sunt merae
Solis partes ante occultatae interposi-
tione Macularum, & illis dissipatis no-
bis allucentes, vt euidenter probatur.
Ergo Maculae solo motu locali, & ac-
cursu materiae similis ad similem, &c.
non gignuntur, quod erat proban-
dum.

Hæc ergo, & hisce similia absurda in-
numera emergunt, si Maculas ex mate-
ria in Solem attracta generemus; quæ
omnia euitantur, si ipsas ex interna
scaturigine deriuemus, id enim & ra-
tioni & experientiae à Phænomeno de-
ductæ magis congruit, quia hac ratio-
ne Maculas cum Sole sine vlla pertur-
batione circumducimus; hac ratione
Maculas nebulosas & ambigua luce
perfusas, facillime tuemur; hac ratione

recens

I

recens natarum magnas digressiones, & multa alia, alioquin defensu atque explicatu difficilia, summa cum facilitate expeditimus, &c.

Macularum solarium Motus alterationis.

Varias Macularum solarium apparere alterationes in confesso est, & statim patent illi, qui hoc Phænomenon vel eminus, & à primo, vt aiunt, limine salutat. Incipiam à notissimo & maxime obuiò.

Macularum solarium variabilis obscuritas & claritas.

C A P. XXXIX.

SI Macula Maculam in obscuritate aut claritate superaret, quælibet tamen quam semel nacta esset, retineret; alteratio ex hoc capite locum non haberet; nunc autem, quia vna eademque Macula, modo obscurior, modo illustrior visitur, merito ambigitur, verum id, an tantum apprensus ostentum existat.

Aggredior autem primò omnium hanc apparentem Obscuritatis & Claritatis qualitatem, quia hæ duæ in rebus visibilibus & primæ & postremæ in sensum incurrunt. Res enim quæcunque malignè conspectæ, speciem quandam umbrarum obijciunt oculo: constat autem experientia quotidiana, obiecta quæcunque non illustria, intra, aut iuxta lucidi radios collocata, ægre admodum discerni; & visui umbrarum instar offerri; cuius rei causa est, quod lucidi radiosa imago fortissima, speciem obiecti obscurioris in visu suffocet quodammodo sua efficacia, ita vt videndi potentia ab illa specie abripiatur, quæ in præsentatione sui, maiore vi pollet. Sic videmus summorum Altarium artificiosas alioquin imagines semper minus rectè distingui; quando ipsæ intra fenestras laterales aliquantulum posticas constituuntur; faciem hominis iuxta Incernam nocturnam consistentis, si non irradietur, &c. umbram putabis, &c.

Quid igitur mirum, si & corpora

II.

illa, quæ velut in Sole inambulantia, aspicimus, nullo alio, quam umbrarum colore affecta notemus? vnde & nomen Macularum (licet id quidam Tarde, sed non bene censeat,) indidimus. Nimirum nimis potentem aduersarium sentiunt, vt præ fulgore Solis, quidquid habent natui coloris, perpetuis tenebris abdere cogantur. Verum ex his ipsis, pro Phænomeno nostro, lucem non exiguam excitare possumus, si sensus experimento præuiò, & rimam aliquam lucis præbente, rationis oculos intendamus.

Macularum ordinarium, ratione claritatis & obscuritatis duplex genus.

Ordinariæ seu primariæ Maculæ sunt idem, secundariæ seu umbræ sunt etiam idem. De prioribus hic ago. Omnis igitur in Sole Macula, aut habet nucleum, aut non habet.

Earum quæ nucleis carent, iterum duplex classis reperitur. Quædam enim sunt claritatis & obscuritatis per totum corpus, & cursum Solis, æquabilis & vniiformis; quædam sunt inæqualis & difformis, & hæ conueniunt in omnibus cum nucleosis, eo solo excepto, quod nucleo priuantur.

Macularum ordinarium diuisio.

Maculæ aquabiles.

Maculæ æquabiles habent obscuritatem apparentem, æquali ybique luce singulæ tinctam, tenuem, coloris velut cinerici, umbras seu Maculas secundarias obscuritate non multum superant, duratione alias Maculas æquât, sunt enim aliquæ moræ longæ, aliquæ breuis, more aliarum; magnitudinem suam, more communi, vt & figuram variant. Imaginare solari superficiæ alicubi obduci subtile velum, aut flatum hyemali frigore conspicuum appingi, &c. vel tenuem nebulam fumumque adhærescere &c. & assequeris imaginatione, coloris & obscuritatis apparentiam. Et licet singulæ suum obscuritatis tenorem ad sensum retineant similem, apparent tamen aliæ alijs obscuriores & clariores; ad margines rarius conspiciuntur, quod

Macularum æquabilium descriptio.

Cur lucidi, & obscuri apparentia primo tractatur?

Minus lucida à magis lucidis obscurantur, & quare?

I.

quod vel in Faculas abeant, vel tenuitate nimia, visum effugiant; vel certè umbrarum secundarum speciem referant, aut à caliginosis Solis partibus abscondantur. Sunt tamen etiam, quæ ad extremos vsque margines sese ostendant.

Maculae nucleis fata.

*Proprietates
Macularum
Nucleis gra-
uidarum.*

Primò, Omnis Macula nucleo prædita, circumuestitur corpore quodam alio, minus obscuro, magis claro, & tenui quam sit ipse nucleus. constat hoc ex phænomeno.

Secundò, Hoc circumiectum nucleo amiculum, ad margines quasi semper est minus obscurum, versus nucleum ferè semper minus clarum.

Tertiò, Corporis huius nucleo circumiecti, non semper est similis obscuritas & claritas, etiam tempore eodem & cæteris paribus sumptis: nam sæpissime, pars alia est valde obscura, alia contra vehementer illuminata, idque instabiliter; nam vicissitudinarias apparentias subeunt.

Quartò, Nucleus huic suo corpori in communi confinio, quandoque ita, sensim apratur, ut mixtione obscuri, & clari proportionali facta, vnum continuum corpus effici videantur, ex medietullo obscuro, sensim in lucidiores margines desinente: quandoque vero ita marginibus obscuritate distinctis insidet, ut merito quis ambigat, continuus an contiguus circumeunti corpori existat nucleus.

Quintò, Omnis Macula nucleosa, augescens, auget obscuritatem, ordinariè tam in corpore, quam in nucleo. Est experientia semper obuia.

Sextò, Omnis Macula nucleosa, decrescens, clarescit & nucleo & circumiecta massa. Patet ex probatis Phænomeni obseruationibus.

Septimò, Omnis Macula nucleosa, cæteris paribus, ad horizontem Solis luce magis tincta apparet, quam remota ab eodem. aliquando tamen, ex accidenti aliter fit. Hæc eadem proprietates est etiam ab alijs animaduersa.

Octauò, Omnis Macula nucleosa, circa orientalem & occidentalem Solis plagam nucleum cum reliqua mole

II.

confusum obijcit, amboque ex maligna luce, cœu nebula videntur. Experientia sollemnis.

Nonò, Multæ Maculæ ita apparent aliqua luce superfusæ, atque eadem, quasi conspultæ, ut ipsarum corpus subalbidum ægre admodum, neque bene præcisum videatur: idque contingit multis circa ortum, multis circa occasum, multis in medio, multis per totum curriculum; cum tamen aliæ interim horum nihil patiantur, sed satis limpida & bene præcisæ suum cursum absoluant.

Decimò, Eodem tempore aliæ Maculæ in Sole clarescunt, aliæ obtenebrescunt tam dissitæ inter sese, quam vicinæ; imo eadem Maculæ coniunctæ, vicissitudines similes frequenter subeunt, atque adeo eadem etiam Macula, ut ante insinuavi, dum parte alia obscuratur, alia elucidatur, & vicissim.

Vndecimo, Frequentissimè accidit, ut duæ Maculæ nucleis graues sibi vicinæ, corpus reliquum, ijs partibus quibus nuclei se mutuo respiciunt, ad aspectum penitus extinguant, Faculisque luculentis interlustrent: quanquam hoc non semper eueniat, sed communes etiam corporum illorum sectiones mutuo consortio obscuriores reddant. Experientiæ ex ipso Phænomeno passim suppeditantur.

Maculae sine nucleis, & tamen obscuritatis inæqualis.

Multæ Maculæ sine expresso nucleo oriuntur, durant, & occidunt, augentur & minuuntur, obscuriores & clariiores euadunt, media extremis minus lucida exhibent; quibus quia omnia, præter nucleos, cum nucleosis conueniunt, non est opus hic multos & novos Catalogos contexere.

Cæterum, quandoquidem nuclei multa scitu digna offerunt, oportet illa hic strictim persequi.

I.

II.

NVCLEVS MACVLARVM
solarium.

C A P. X L.

Nuclei descriptio.

NON omnes, sed quædam & satis multæ Maculæ solares, præsertim maiores, in meditullio sui ita peculiari quodam modo nigrescunt apparenter, ut præ nigrore interdum quodammodo nitere videantur.

Hunc ego nigrorem, seu potius massam nigrore hoc imbutam, voco Nucleum Maculæ, propterea quod in medio ipsius plerumque oriatur. Pro cuius meliore intelligentia notanda sunt sequentia.

Nucleorum proprietates

Primum, Multæ Maculæ sunt, quæ totum Solem ut ante dixi, pertranscunt absque vlllo nucleo, & sunt caliginis diuersæ iuxta ea, quæ paullo ante dixi.

Secundum, Multæ sunt, quæ vna cum nucleo Solem ingrediantur, perambulant & exeunt vna cum eodem. & quando hoc fit, nucleus ad horizontem solarem vna cum reliquo Maculæ corpore gracilescit; imo fere solus spectatur, euanescente nonnihil reliquo tenuiore corpore lucis circumfusæ copia.

Tertium, Multæ Maculæ in Sole primum post superatum horizontem acquirunt nucleum, & euehant.

Quartum, Multæ Maculæ in Sole illatum supra horizontem nucleum amittunt, priusquam ad occasum pertingant.

Quintum, Multæ Maculæ absque nucleo astronomicè ortæ, eundem in Sole acquirunt, & vicissim amittunt, astronomicèque absque eodem denuo occidunt.

Sextum, Multæ Maculæ in Sole physicè absque nucleo ortæ, acquisitum nucleum exportant.

Septimum, Multæ Maculæ vna cum nucleo in Solem astronomicè illato, physicè occumbunt.

Octauum, Multæ Maculæ vna cum suo nucleo physicè in Sole oriuntur & occumbunt.

Nonum, Nullum hactenus nucleum simul cum Macula physicè nascentem animaduerti, sed semper prius aliquid

Maculæ inueni; & nullam Maculam physicè occumbentem deprehendi, quin sensim prius defecisset nucleus.

Decimum, Quædam Maculæ à natiuitate sua statim fere & parue quidem peperere nucleos, quædam magnæ primum & satis adultæ.

Vndecimum, Tametsi non facile sit videre magnam aliquam Maculam sine nucleo, nihilominus tamen hæc affectio non est ita propria magnarum Macularum, ut parue ijs omnino destituantur. Paruæ itaque Maculæ sepe numero equabiles sunt atque nucleis carent, multæ tamen nihilominus multoties suos etiam gestant & circumferunt nucleos minimos.

Duodecimum, Nuclei magnitudine sunt varij; & magna quandoque Macula paruum, parua etiam satis magnum habet.

Decimumtertium, Nuclei sensim è paruis magni, & eodem modo è magnis fiunt parui. alius tamen alio citius crescit & decrescit, pro duratione & augmento Maculæ. nam plerumque qui non diu durant, citissime auferuntur & minuantur, qui vero sensim grandescunt, diutius etiam consistunt.

Decimumquartum, Varia est Nucleorum in obscuritate apparens intensio. Quidam enim nigrorem intensissimum & quasi atrorem carbonis referunt; quidam aliquid albi seu cinerici coloris inspersum exhibent.

Decimumquintum, Nuclei nigri plerumque a circumstante caligine ita distincti apparent, ut margines quasi distinctos representent; qui vero subalbicant, suum colorem sensim remittunt ut cum circumiecta materia mollior mixti conformentur, continuique non contigui videantur, de qua re, etiam superius monui.

Decimumsextum, Nuclei non semper consistunt præcisè in medio suæ Maculæ, id quod etiam ante dixi, sed ad latera subinde declinant, & maiorum Macularum molem reliquam in occasum fere semper præuergunt parte perimetri sui occidentali, trahentes quodammodo post se reliquam clariorem Maculæ massam; quæ Pater Schönberger in suis obseruationibus non inscite, solet vocare Nebulam, refert,

Nucleorum augmenta & decremēta.

I.

fert enim quid simile.

*Nucleorum
nascentium
varij modi,*

Decimumseptimum, Exoriuntur nuclei diuersimodè: nam quædam Maculae initio tanquam ex profundo Sole tum exigua quædam & minima sui indicia ostentant, luce dilata, tum de die in diem & mole & obscuritate augescunt, & simul in Maculam aliquam conformata fuerint, etiam in medio nigriora atque nuclei semina fieri incipiunt; quæ deinde cum ipsa Macula quoque excresecunt. eodemque modo denuo in nihilum abeunt, & hic nascendi & denascendi modus est ordinarius, saltem, prout hætenus obseruaui, frequentissimus.

Decimumoctauum, Alter nucleorum producendorum modus est, quando multæ Maculae parua, sibi met vicinæ diu sæpe incedentes, paullatim, imo satis cito aliquando coalescunt in vnam, & statim etiam nucleum in medio producant. Vbi nota, istam Macularum paruarum coalitionem rarissimè fieri ad partem aliquam vel Maculam lateralem, sed ordinariæ ad omnium locum medium. Nota secundo, ita ordinariè muniri, vt Macularum commixtio & vera ad sensum vnio appareat & duret. Nota tertio, spatium coalitarum paullo minus esse, eo quod occupauerant separata. Nota quarto, Coadunationem hanc secundum longitudinem itinerariam esse satis frequentem. Imaginare bullas aquæ in vnam maiorem coeuntes.

Decimumnonum, Nuclei prognerandi modus est, quando multæ quidem Maculae simplices & æquabiles in vnam Maculam magnam continuantur, sed spatia; situs & loca non mutant, sed superueniens aliqua noua vel Macula vel umbra, ita illas omnes & spatia intermedia; etiam lucidissima, occupat, & nebulae nubisue instar replet, vt ex omnibus vna quasi Macula difformis tamen, resultet. quo contingente, vel illæ priores singulae, vel nouæ etiam nucleos acquirunt, qui deinde crescunt, durant, augentur, deficiunt & abeunt, prout ipsa tota Macula sese in augendo vel decrecendo gerit. Et hic Macularum & nucleorum gignendorum modus est omnium ferme vñtatissimus.

II.

Vigesimum. Quartus nucleorum efformandorum modus, & sæpe vñtatus est, quando vna informis, & tenuis aliqua Macula vel umbra, satis longa, gracilis alibi, alibi lata & nullius figuræ regularis, per modum fumi vel nebulae sparsa, vel contrahitur in vnam densiorem Maculam; vel nona ibidem physicè exorta Macula aut umbra, sensim efformatur melius, & sic Nucleum vel nucleos stabiles acquirit, pro ratione ipsius Maculae.

Vigesimumprimum. Ordinariè Nuclei figura est similis figuræ Maculae figuræ circumscriptæ.

Vigesimumsecundum, Ordinariè, quando mutatur figura Maculae, mutatur etiam Nuclei, & vice versa.

Vigesimumtercium. Ordinariè quando augetur physicè Macula, augetur etiam nucleus. quando minuitur illa, decrescit & iste, & vice versa, licet hoc non semper.

Vigesimumquartum. Ordinariè augmentum Maculae, & decrementum, fit ex omni parte, in omnem loci differentiam, sic etiam nuclei.

Vigesimumquintum. Ex multis nucleis separatis vnus Magnæ Maculae, sapissime fit nucleus vnus, non coitione aut locali illorum coniunctione, cum centra illorum seruent eandem inter se distantiam, sed noua spatiorum interiectorum similis materiae repletionem, vel quacunque tandem extensione alteratiua.

Vigesimumsextum, Ex vno sæpe magno nucleo fiunt duo, tres pluresue, non locali partium ipsius distractione, sed interuallorum nescio qua exinactione. manent enim illorum centra, inter se æqualiter diffusa.

Vigesimumseptimum, Sed & vicissim, sæpe vnus nucleus multi, iidemque denuo vnus fiunt, &c.

Vigesimumoctauum, Situm nuclei sicut & Maculae non mutant localiter, sed quam partem in boream vertunt, non amouent, quam in austrum non diuertunt; orientalem non faciunt occidentalem, nec vice versa; nisi in quantum conuersio semicircularis, illis tribuit circa Solem, partialis autem figuræ mutatio, situm totius non mutat.

Vige-

I.

Vigesimalmnonum. Nuclei disiuncti sub ingressum atque exitum optice coniunguntur sepe, licet disiuncti physicè, & interualla lucida, aut ex parte aut ex toto sæpius elidunt.

Trigesimum. Nuclei vna cum Maculis ad margines ordinariè nonnihil albescunt, & ad morem nebulae intumescunt: & ille tumor apparens, gracilitatem ad sensum imminuit.

Trigesimumprimum. Nuclei duo vel plures ad marginem sese optice tangentes, faciunt apparenter vnum & nigriorem, & ex gracili crassum; quod fit nonnunquam.

Ex hisce, quæ hucusque de Maculis & ipsarum Nucleis summam allata, & in priore libro obseruata atque annotata sunt, euidens est de variationum circa obscuritates, circa claritates Macularum apparentia, ambigi rationabiliter, non posse à quoquam; nam Maculas obscuriores, & minus obscuras, itemque magis minusque claras apparere, certissimum est: sed non statim inde videtur necessario Sequi, isthac fieri per veras physicas alterationes. Umbra certè terræ, Lunam obscurat, & magis & minus, physicè tamen non alterat. Videndum, itaque ante omnia est, an iuxta Phænomenon obscuritas Macularum sit aliqua realis & physica qualitas?

Deinde an inhæreat Maculis? & tum an ex potentia illius materiæ educatur, actione alteratiua, & quomodo? Similia sunt inuestiganda, & comprobanda de claritate Macularum, quid, vnde, quomodo sit?

D V B I V M I.

AN APPARENS MACULARVM

solarium obscuritas, sit mera umbra?

C A P. XLI.

VMBRAM esse meram lucis priuationem in subiecto apto, nemo est qui nesciat. Vnde consequens est, omne subiectum vmbrosum, esse potentia pro-

II.

xima luminosum, ita vt alia dispositione non sit opus, quam lucidi præsentia.

Sicut ergo lux subiectum perspicuum interminatum per totam profunditatem, terminatum autem exteriori superficie physica imbuit; ita quoque in umbra accidere videmus.

Et sicut radij lucidi à lucido, ita experimur suo modo procedere umbras ab opaco, in directum enim, iuxta fluxum radiorum luminosorum protenduntur, cum nil aliud sint quam ipsorum radiorum opaci interiectu abscessio.

Igitur cum videamus oculis nostris quotidie Maculis solaribus homogeneum faciei solaris splendorem, infici, & veluti umbris interspersis, deturpari: quæstio nunc est, an istæ umbræ in solarem superficiem extrinsecus proijciantur, sicuti in Lunam Umbra terræ?

Conclusio. Impossibile est, in Solem ullam umbram aliunde induci, & terminari, atque conspicabilem fieri. Quia in lucidum nulla umbra cadit, vt sentiat, imo omnis umbra à lucido, præsertim Sole, dispellitur: deinde nullum in rerum natura agens tam illustre reperitur, quod villo modo umbram aliquam posset versus Solem proicere: tandem quia nullum etiam opacum eiusmodi reperitur, à quo umbra in Solem deferretur. Ergo ex hoc capite, & modo, Maculas in Solem induci est simpliciter

impossibile, adeoque in merarum umbrarum censum Maculæ computandæ non sunt, &c.

Impossibile est Maculas esse umbras in Solem proiecetas.



D V B I V M II.

AN MACVLARVM SOLARIVM

*apparens obscuritas, sit merè**apparens diaphani**opacitas,*

C A P. XLII.

Corpora solida, adiaphana, colorata, esse verè & dici opaca, certum & apud omnes in confesso est. Diaphana vero corpora, ut aer opaca sæpe non esse, sed apparere, itidem experientijs quotidianis comprobatur. Nam qui eminus v.g. per aper-
tas habitaculi obiecti fenestras visum infert, præter obscuram noctem nihil imaginabitur; rerum intus positarum, aut hominum inambulantium formas nullo penitus indicio animaduertet: cū tamen certum sit, omnium rerum inter-
narum species atq. colores, habita-
culaq. ipsa luce diurna multo illustris-
sima esse. Quæstio igitur est, an simili-
quopiam apparitionis genere, Macula-
rum solarium apparens obscuritas, &
eius variatio possit definiri atque de-
cidi?

*Merum, &
verum dia-
phanum ap-
paret opa-
sum.*

*Status Qua-
stionis.*

*Impossibile
est Maculas
esse merè ap-
parentem o-
pacitatem.*

Conclusio. *Impossibile est, apparen-
tem & variabilem Macularum sola-
rium obscuritatem, esse merè apparen-
tem opacitatem.* Aut enim hæc merè
apparens opacitas est in profundo Solis
aut circa extrema.

Non primum, darentur enim hiatus
in Solem obscuri, variabiles; hos au-
tem hiatus, qui faciant merè apparen-
tem in Sole obscuritatem, non dari sic
probo.

Aut enim hiscentis Solis super-
ficies, quæ hiatus illum ambit, seu in-
quam hiatus terminatur, est æque luci-
da, atq. alia Solis superficies, aut non.
si primum, vorago illa æque illustris ap-
parebit, atque alia Solis pars quæcun-
que, & sic nullam Maculam referet, ne-
que variabilem obscuritatem ullam, con-
tra hypothesein & veritatem Phænome-
ni: si secundum, iam variabilis illa ob-
scuritas, non erit merè apparens, sed
vera opacitas, videlicet obscurior Solis
superficies, in quam visus terminatur,

1 nos autem supponebamus merè appa-
rentem opacitatem.

Eodem modo probatur hæc merè
apparens opacitas non posse versari cir-
5 ca extrema Solis. Aut enim superficies
illa Solis, quæ apparenti huic opacitati
correspondet, est æque lucida atque
aliæ, aut non. Si primum, illuminabit
illam merè apparentem opacitatem;
10 corpus enim non verè sed merè appa-
renter opacum, cuiusmodi nos poni-
mus, definit esse opacum in lucidi præ-
sentia. Si secundum, iam superficies
Solis, obscurior, erit obiectum verè
15 non apparens opacum contra hypo-
thesin.

D V B I V M III.

20 AN MACVLARVM APPARENS
*obscuritas fiat ex obiectu cor-
poris verè opaci?*

C A P. XLIII.

NON ignoro corpora diapha-
na ita posse effigiari, ut ex
ipsa illorum figura, & posi-
tione solares radij alio diuertantur, ut
inter oculum & Solem interposita, as-
pectum Solis adimant, umbrasque re-
fundant, quemadmodum in opticis de-
monstratur; dupliciter autem potest
diaphanum tale considerari, vel certis
35 & regularibus figuris, iisque lævigatis-
simis inuestitum; vel incertis, neque
regularibus, neque politis, sed remere
concurrentibus, in vnam quandam
impolitam atque asperam superficiem.
40 Quia igitur experientia docet; utroque
istorum modorum umbras à corpori-
bus alioquin intrinsecus perspicuis
proijci, posset aliquis arbitrari, etiam
circa Maculas solares simile quid fieri.
45 Quod tamen secus euenire docebunt
sequentia. Quorum aliqua virumque
figurationis modum impugnat, aliqua
nunc hunc nunc illum determinatè re-
ijciunt.

50 Nam primò, Casus propositus sup-
ponit corpus inter oculum & Solem.
statutum esse secundum profundita-
tem perfectè diaphanum, adeoque ex
sola superficie externa istam umbram
55 causari.

Cum

I.

Cum autem Macularum solarium plerarumq. interiora intra ipsam illarum profunditatem immersa, ut saepe demonstro, per situm & extrauagantem tenuiorem massam, sint vel nigri nuclei, vel partes densiores, manifestum est, illarum obscuritatem ab exteriorifiguratione non esse.

Quam secundò, neq. regularem neq. terse læuam, aut stabilem esse, docent perpetuum augmentum & decrementum, figuræ variatio, perimetri exasperatio, situs ad aspectum iugis mutatio.

Accedit Tertiò Nucleorum noua generatio, aut desitio, qui cum sint nigredinis intensioris quam sit circumfusa ipsis caligo, patet hæc è sola superficialium externarum varietate non accidere. Nam ut ex Phænomeno & dictis constat, Nucleorum & caliginis ambientis figuræ sunt plerumq. similes & similiter positæ: quanquā sepe etiam figura Nucleorum variet, manente inuariata nigredine.

Quartò, Maculæ sensim abeunt in luculentas Faculas, ipsa ordinaria Solis superficie lucida splendidiores, quæ res neque positioni, neque superficiali mutationi adscribi potest.

Quintò, Maculæ perdurarent & in formam pristinam redirent, si è solo situ istam obscuritatem paterentur: alia quippe mutationes excluduntur.

Sextò, Ex proportionali Maculæ allicuius augmentatione sequeretur eiusdē maior claritas, è diminutione maior obscuritas, quorum contraria eueniunt.

Septimò, Maculæ circa horizontem deberent apparere nigriores, quam circa medium, quia propter decliuem aspectum qui in horizonte euenit, plus superficiali venit sub angulo valde paruo.

Octauò, In medio quoque Sole radij solares ad superficiem Maculæ perpendiculares facile penetrarēt ad visum nostrum, præsertim superficie data polita.

Nonò, Aequabiles in Sole Maculæ, & situm & figuram mutant, eadem semper seruata obscuritate. Igitur obscuritas ista Macularum, non est a Macularum situs & figure mutatione.

Decimò, Plurimæ Maculæ retenta eadem figura, mutant obscuritatem, vel in intensius, vel in remissius, vel in Faculam, idque aut ex toto, aut ex parte. Igitur ambiens Maculam super-

II.

ficies ad hæc nil confert. Vnde sola Maculæ configuratio varia, vna cum diuersa positione, aut ambientis Maculam superficiali inæqualitas, apparentem ipsius obscuritatem sufficiēter non defendit. Nam quanquam non negem corpora dura perfectè diaphana si superficie impolita amiciantur aliquam obscuritatem repræsentare, talem tamen referre qualem Maculæ solent, semper est falsum. Ad quorum pleniorē intelligentiam hæc addo.

Primò, Si supposita Macularum perfecta diaphanitate, sola exterior inæqualis superficies versus nos intercederet, non futurum ut augescēte Macula, intenderetur nigredo, deficiente remitteretur, eo quod superficies æque aspera in paruis & magnis similem effectum exhiberet.

Secundò, Maculæ in horizonte maxime nigrescerent, in medio maxime ablescerent: quia illic multæ superficiali scabræ partes plicatiles radios lucidos arcerent, hic pauciores: quod tamen repugnat Phænomeno.

Tertiò, Quia Nulla Macula vquam acquireret Nucleum, quem uti dixi, intra Maculæ substantiam profundam immersum, satis ostendunt phasēs horizontales, multarum saltem Macularum, dum nucleum tenuior caligo ambit.

Quartò, Quia euidentis est, omnem Maculam horizontalem, nucleo facundam, obuerrere visui halitum illum subtilem, cuius superficies inter nos & nucleum interiecta non discernatur à nigra nuclei corpulentia, nisi quando ascendendo optice sese expandit Macula, suamq. longitudinem patefacit, ex quo constat, apparentem coloris variationem non esse ab externa Maculæ superficie, sed ab internis alterationibus.

Conclusio. *Macularum solarium apparens obscuritas, est vera realis, & physica, corporis opaci qualitas.*

Probatum primò. Omnis visibilis obscuritas, aut est Umbra; aut est merè apparens diaphani opacitas; aut est opacitas vera. aliud enim non datur. Sed Macularum solarium obscuritas apparens, non est Umbra, ut probatum; non est merè apparens opacitas, ut demonstratum; est ergo opacitas vera; igitur qualitas realis & physica.

I.

Probatum secundum. Id quod radio solaris transitum intercludit ad visum non est nihil, neque mera lucis negatio, sed aliquid physicum & reale: at apparens Macularum obscuritas solari radio transitum intercludit; ergo non est nihil, sed aliquid physicum & reale.

Dices diaphani cuiuscunque certam configurationem & inter lucidum applicationem radium etiam, quo minus transeat, prohibere, ut paullo ante dictum; & tamen in hoc casu, omnes alias qualitates exulare: ergo non esse solidam argumentationem. Respondeo, figuras illas diaphani, quarum dispositione & oppositu radius solaris alio auertatur, ad hoc munus in nostro Phænomeno præstandum insufficientes esse, ex dictis iam constare; quæ tamen si in gratiam admittantur, constabit, utique qualitates esse, & quidem ex Phænomeno variabiles, quæ cum non introducantur in subiectum absq. maximis præuijs dispositionibus, evidens est, ob eas ipsas subiectum supra modum alterari; quod amplius confirmatur, quia cum subiectum Macularum continenter vel angeat vel decreseat, itemq. obscuritatem augeat, & minuat: necesse omnino est, & figuras immutari, non tantum siu, sed multo amplius magnitudine: idq. non superficialiter tantum, sed per totam profunditatem Maculæ prout evidens est, in Nucleis, intra Maculas corporaliter inclusis: hæc autem absq. alteratione fieri est prolixius impossibile. igitur ex apparente obscuritate mutabili, etiam qualitates, & alterationes mutabiles Maculis solaribus inesse, omnino est fatendum illi, qui ad veritatem aures non obturavit.

Macularum obscuritas est vera opacitas.

Probatum tertium. Opacitas vera est Physica qualitas; Macularum apparens obscuritas est opacitas vera: ergo est physica qualitas. Maior patet ex ipsa veri opaci natura, quod in eo consistit, ut speciebus visibilibus sit imperium, hæc autem qualitatem esse veram physicam corporis opaci affectionem quis non videt? alioquin omnia corpora luci & colori essent penetrabilia, & nullum corpus non diaphanum, quod est aperte falsum. Minor est probata in prioribus. Ergo.

II.

Probatum quartum. Omne obiectum visus proprium, est vera Qualitas; Macularum apparens obscuritas, est obiectum visus proprium: ergo est vera Qualitas. Maior est certa: minor probatur. Quia obscuritas non est ex obiecto visus communis, & non est obiectum visus per accidens, quale est Umbra, quæ lucis tantum beneficio conspicitur, & tamen videtur; ut patet ex quotidianis observationibus, & paullo ante ostendi Maculas umbræ non esse &c. igitur est obiectum visus proprium, & patet conclusio.

D V B I V M IV.

QUALITAS MACULARVM solarium apparens obscuritas sit in specie Qualitas?

C A P. XLIV.

Conclusio. Macularum solarium apparens obscuritas, est verus Color. *Macularum solarium obscuritas est verus Color*

Probatum primum. Macularum obscuritas apparens, est verum & proprium visus obiectum, uti probatum; & non est Lux: ergo Color verus. Quia omne verum & proprium visus obiectum aut est Lux, aut Color.

Probatum secundum. Opacitas perspicui terminati non est aliud ex parte rei, quàm color; sed omnis Macularum solarium apparens obscuritas, est perspicui terminati opacitas: igitur Macularum solarium apparens obscuritas, est color. *Opacitas vera non est nisi Color.*

Maior probatur quia si perspicuo terminato colore deinas, fit continuo perspicuum interminatum, adeoq. luci & speciebus visibilibus peruium. Minor probata est hactenus, & patet ad oculum, quia Macule solares excludunt radium Solis. Sequitur ergo conclusio.

Confirmatur quia quando iuxta vel ante Lucernam ardentem aspiciamus hominem non collustrata facie &c. videmur velut umbram cornere, & tamen colores vniq. veros aspiciamus, sed non distinguimus, ob lucis, colorum species hebetantis, in oculo vigorem: sic Luna Solem eclipsans, sub eodem, quo Macule colore vel in charta, vel directo per Helioscopium obtutu conspicitur; umbra mera tamen non est, quod de Luna videtur, sed color Lunæ est. Sed & nu-

I.

& nubes, & obiecta quævis, ut arbores, turres, columnæ, globi turrium aurati, si à Sole per Telioscopium projiciantur in chartam, faciunt quidem umbras nigras, sine vlllo propriorum colorum discrimine, instar Macularum: umbras tamen meras, in obiectis illis non esse, sed colorum verorum species in chartam deferri, & ratio & oculus videt, ut planum sit in speciebus per foramen paruum vel lentem conuexam in obscuram cameram immisissis, quæ maioris lucis præsentia fuscantur, si solæ immittantur, picturam obiectorum foris positorum pulcherrimam repræsentant. Igitur cum cætera circa Maculas similiter eueniant; non est dubitandum, obscuritatem ipsarum apparentem veris coloribus accensendam esse.

D V B I V M V.

QVISNAM MACVLARVM

Solarium sit color.

C A P. XLV.

Apparens Macularum nigredo, nigredinem veram non persuadet necessario.

Conclusio prima. Quandoquidem omnia colorata una cum Sole per Telioscopium in chartam ita lapsa, similitudinem Macularum seu umbrarum induunt, coloris cuiuscunque tandem ea sint: certum est, ex hac obscuritatis, vel nigroris apparentia, nigrum de Maculis colorem certo statui non posse. Nam alba æque atque nigra, apparent coloris similis & eiusdem.

Macularum apparens color, probabiliter est nigredo, &c.

Conclusio secunda. Probabile tamen est, apparentem Macularum colorem, esse nigrum, vel nigro affinem. Huius rei signa præbet Helioscopium, nam Maculas oculo nigriores exhibet, quam Telioscopium in charta, cum tamen si nigrae non essent, deberet dilutiores ostendere, ex partium maiore diductione, adhibito Tubo potentiore; sicut fit in Eclipsi Lunari: quæ nigrior offertur in charta, quam per Telioscopium conspecta; & nigrior per Tubum minorem, quam amplum. Item nubes per Tubum in chartam deducta nigrior compareret, quam conspecta per Telioscopium: contrarium facit

II.

1 Tubus cum colore Macularum; nigriores videntur per Tubum ab oculo conspectæ, quam allapsæ in chartam. Argumentum aliud & satis vrgens offerunt aliqui Nuclei Macularum admodum nigri & densi.

Qui cum æque nigri compareant, quam vllus mons, aut moles constipatissima; videtur apparens illa Nucleorum nigredo, non esse caussata, à sola corporis opaci coloratione compacta, quacunque. sed excellenti, & insito ipsis atrore. Cui sententiæ suffragatur ortus Macularum & Nucleorum physicus, & transmutatio tandem in Faculas. de quibus postea.

COROLLARIUM

20 Ex hæcenus disputatis, planum esse existimo, non tantum qualitates physicas alterabiles in Maculis reperiri, sed & factò ipso alterari quotidie. Nam augmentationem, & diminutionem 25 Macularum quotidianam, absque præuijs alterationibus euenire, nemo dicet; colores generari, & rursus destrui, absque alteratione physica non solent.

Sed cum iidem Macularum nigrores augeantur non tantum extensiuè, verum etiam intensiuè, oritur nunc.

Colligitur ex dictis vera alteratio.

D V B I V M VI.

AN MACVLAE SOLARES

nigrescant ex condensatione, ablescant seu clarescant ex rarefactione.

C A P. XLVI.

Sciendum primò, Aliud esse intensiorem qualitatis in subiecto, atque remissionem; aliud condensationem atque rarefactionem. Intensio & remissio respicit qualitatem magis minusuè talem in subiecto eodem: condensatio subiectum multum cum extensione parua, rarefactio subiectum paucum, cum quantitate multa: vel, condensatio exhibet eandem materiam minorem, rarefactio maiorem &c. cæteris omnibus 55 paribus.

Notandum primo.

Quomodo Intensio, & Remissio differant, à condensatione & Rarefactione?

*Notandum
secundo.*

*Condensa-
tionis & Re-
fractionis
diffusio.*

Sciendum secundo. Aliud condensa-
tionis & rarefactionis genus esse, quan-
do corporis continuitas soluitur, inter-
mixtis alterius corporis vel speciei par-
tibus: aliud, quando eiusdem speciei
continuum rarefcit, aut densescit. Sic
primo modo rarum dicimus pumicem,
raram spongeam, pulverem, spumam,
quando multos & magnos poros in-
teriectos habent. Densam vero aut
crassam nebulam, nubem, vaporem,
quando paruos, & angustos poros
occupat, sed hæc condensatio magis
plebæa quam philosophica est.

*Notandum
tertio.*

Sciendum tertio. Nigrum & lucidum
non opponi contrariè, sed nigrum albo
lucidum obscuro.

*Notandum
quarto.*

Sciendum quarto. Si coloratum te-
nue, similiter colorato tenui superpo-
natur; tunc inde conflatum, apparitu-
rum magis tale: si superpositum aufe-
ratur; apparituum minus tale. simili-
ter si lucidum lucido; obscurum, ob-
scuro. &c.

*Macularum
solarium ni-
grorem pro-
prie intendi
non est cer-
tum.*

Conclusio prima. Macularum sola-
rium nigrorem intendi ex condensa-
tione proprie dicta, non est certum.

Primò, Quia condensatio & rarefa-
ctio proprie dicta, non est ad indu-
cendum vel expellendum colorem: vi-
demus enim aërem purissimum densa-
ri & rarefieri, absque vlla colorum
acquisitione vel amissione. Imo aër
hyemalis densior & compactior, est
magis perspicuus æstiuo attenuato,
oculo teste.

Secundò, In carbonem attror indu-
citur, dum subiectum saltem non den-
satur & calcis albedo, rarefactione ac-
quiritur; quæ aqua superfusa, rarefcit,
& albescit amplius; sic aër radijs per
refractionem aut reflexionem coactis:
inque conum lucidum acuminatis illu-
stris, quo plus lucescit, hoc rarefcit
amplius. Elychnium certè in media
flamma, dum nigrescit aut rubescit, po-
tius rarefcit.

Igitur ex eiusmodi experientijs pa-
tet conclusio; nimirum, etiamsi Ma-
cularum nigredo intensa, aut remissa
ab oculos quotidie versetur, non ta-
men ideo necessario inferendum, ipsas
ex condensatione subiecti intendi, cum
intensio qualitatis fiat frequenter ra-
rescente subiecto. Quanquam non ne-

go, si subiectum addenferur, qualita-
tes ordinariè etiam inde fieri sensi-
biliore.

Conclusio secunda. Macularum sola-
rium nigredinem intendi, materiei si-
milis superaggectione, Phenomenon
inducat.

Primò, Quandocunque Maculae ni-
grore crescunt, semper etiam vèdique
crescunt magnitudine: signum ergo est
materiei affluxu id fieri.

Secundò, Quando imminui inci-
piunt, simili proportionè clarescunt.

Tertio. In medio ordinariè sunt ni-
griores, & sensim ad margines suos cla-
riores; signum ergo id fieri ex materia
profundiore in medio, tenuiore versus
extrema, alioqui Sol per æque tenuem,
per æque tinctam, æque etiam tra-
luceret.

Quartò, Id ipsum maxime patet,
ex laterali ipsarum aspectu, quando
iunguntur horizonti; nigriores enim,
ordinariè videntur crassiores &c.

Conclusio tertia. Macularum præfer-
tim insigniorum, materiam aliam alia
compactiorem esse, & non tantum si-
milis adiectione, sed vera physica actio-
ne alterius ipsarum nigrorem effici atq;

intendi suadent, imò quodam modo
euincunt nucleis; qui cum non sint adeo
profundi, præ reliquo Maculae circum-
stante corpore, ut ex ipsorum aspecti-
bus in ortu & occasu ad margines Solis
constat, ita tamen intenso colore sunt
præditi, ut fulgori solari ne mini-

mum quidem transitum concedant,
quemadmodum partes circumiectæ
faciunt. Quod si solius materiei simi-
lis superfusione, nucleus Maculae con-
surgeret, oportebat etiam illam cir-
cumstantem molem proportionaliter
saltem, nigrorem effici; oportebat
ipsius cum nucleo confusum ab utris-
que medium quid participare, quæ ta-
men ordinariè non fiunt; neque tamen
interca Nucleus in profundum pro a-
troris exhibiti ratione excrefcit, unde
argumentum fortissimum pro adden-
satione, vel intensione proprie dicta,
trahitur.

Secundò, Suadent id multæ Ma-
cula minutissimæ, & tamen ita nigrae,
ut multas alias quinquages latiores,
& nigredine, & duratione superent.

Ter-

*Macularum
ex materia
similis adie-
ctione, In-
tensio.*

*Macularum
in colore ve-
ra intensio,
suadetur ex
Nucleis.*

*Macularum
in colore ve-
ra intensio,
suadetur ex
Nucleis.*

I.

Tertiò, Suadent crebra inter Maculas & nucleos frequentes interlustra, quæ illæsis plerumque nucleis, alteram materiam tenuiorem adiacentem absumunt: unde argumentum validissimum elicitur, Nucleum ab amiculo illo tenui plurimum discrepare.

Quartò, Denique Macularum in umbras, & umbrarum in Faculas ordinaria resolutio, ea quæ dixi manifestè euincunt. Nam in locum Macularum etiam minimarum plerumque succedunt ymbrae, & has excipiunt Faculae multo maiores, quæ omnia cum fieri nequeant, absque præuijs dispositionibus, alterationibus, atque rarefactionibus, in confesso est Phænomenon solare, motui alteratiuo, ut quam maxime subiacere.

DE NUCLEIS MACULARVM

*Solarium; aliquot singulares**Quæstiones.*

CAP. XLVII.

NON ægre feres, Amice Lector, si de Nucleis Macularum hic seorsim quæstiones aliquas mouero, sparsim fortassis, in prioribus cum de Maculis agerem, ex occasione, & quasi per transennam tactas: quia vero Nucleorum materia, inter nobilissimas huius Phænomeni partes merito adscribitur, dabis, opinor, veniam; si hic ex instituto eandem sub incudem quodammodo reuocauerim, in quo tamen negotio, mihi ita attemperabo, ut si Quæstiones priores resuscitauero, non alteram solutiones priores, aut certe modo alio tractandi, uti videat.

*Suppono autem ex obseruatione**dictis.*

Primò. Nullum unquam Nucleum visum esse solum, sine præuia illa caliginosa, & rare materia quam sit Nucleus.

Secundò. Omnem Nucleum intra illam caliginem, undique, secundum omnem sui dimensionem, totamque corpulentiam immersum, consistere.

II.

Q V A E S T I O I.

Virum apparens Nucleorum nigredo sit mera lucis priuatio, an vero

color positivus.

Prima Conclusio. Color seu nigredo Nucleorum apparens non est mera lucis priuatio.

Probatum. Quia mera lucis priuatio non est nisi in corpore purè diaphano: igitur si Nuclei nigredo statuatur pura lucis priuatio, spatium quod occupat

nucleus, luce priuatum, erit pars mediij purè diaphani, nusquam terminati: omne autem purè diaphanum, inter visum & lucidum positum illustratur perfectè à lucido; nucleus ergo inter visum

& Solem interiectus lucebit; quia Sol est, & ponitur lucidus. Quod autem nucleus luceat, est falsum & contra Phænomenon. Essent enim omnes Maculae nucleosæ in medio faculis conspicuæ.

Nuclei igitur color non est mera lucis priuatio. *aliter.* Omnis mera lucis priuatio in medio diaphano in præsentia lucis cessat; nuclei color in præsentia lucis, nimirum Solis, non cessat; igitur

color nuclei non est mera lucis priuatio. *aliter.* Impossibile est, ut mera lucis priuatio præsentem, & directum lucis radium ab oculo præscindat: sed nuclei apparens nigredo, præscindit ab

oculo præsentem lucis solaris radium; ergo impossibile est, ut nuclei nigredo apparens sit mera lucis priuatio. Maior est evidens, alioquin nunquam pellerentur tenebrae à luce præsentem, & tenebrae essent luci positivè contrariæ, contra omnem veritatem & experientiam.

Minor probatur, quia si nuclei color vel re vel mente seponatur ab illa Solis parte, Sol illico mittet ad oculum suum radium, qui semper præsens & paratus est lucere, & quidem in oculum, quia solus nucleus est & ponitur esse inter visum & Solem, conclusio igitur manet.

Aliter. Si nuclei nigredo est mera lucis priuatio, tunc medium illud luce priuatum attinget Solem: igitur ille communis Solis & mediij contactus erit luce priuatus, nam si lucidus est, medium diaphanum in quo nucleus est,

luci-

*Conclusio-
nis varia
probationes.*

I.
lucido terminatum, seu in lucidum ap-
pellens, illustratur, &c.

SCHOLIUM.

Priora de Maculis probata, possunt
etiam huc ad Nucleos transferri; & hæc
de Nucleis, accommodari possunt ad
Maculas.

*Nucleorum
nigredo est
verus color.*

Secunda Conclusio. Nigredo appa-
rens Nucleorum est color verus & posi-
tius.

Probatur primò. Omne id quod
transitū luci ad visum in semicirculari
situ prohibet; est color, vel coloratum; 15
nigredo nucleorum luci transitum pro-
hibet in situ ad visum respectu Solis se-
micirculari. Ergo nigredo nucleorum
est color vel coloratum. Maior est in-
prioribus satis stabilita. Minor constat
experientia, quia nucleus ab ingressu 20
ad exitum visque procedens, percurrit
quasi semicirculum Solis, & eiusdem
tamen lucem semper impedit.

Probatur secundo. Omne visibile 25
propriū aut est lux aut color aut lu-
cis priuatio per accidens, seu opacum,
&c. Nucleus Macularum non est opa-
cum aut lucis priuatio, vt probatum
conclusionē prima, non est lux expe- 30
rientia teste, ergo est color.

QVÆSTIO III.

Qualis apparens Nucleorum nigredo 35
sit color?

Conclusio prima. Non potest certo
sciri, qualisnam Nucleorum existat co-
lor. Quia omne coloratum inter visum 40
& lucem positum; (nisi aliunde illu-
stretur,) apparet nigrum. & omnis
lychnus ex igne candelæ procul con-
spectus apparet plerumque niger. & Lu-
na Soli supposita apparet nigra. 45

Conclusio secunda. Probabilis est ta-
men, colorem illum Nucleorum
esse nigrum. Cuius ratio da-
bitur, vbi de nucleo-
rum generatione
agetur.

QVÆSTIO III.

Vtrum Nigredo Nucleorum sit tantum
superficialis an in profundo?

Conclusio. Nuclei Macularum sunt
profundi.

Primò, Quia diuersa & intensa ni-
gredo hoc satis indicat.

Secundò, Quia duo nuclei ex solo
aspectu laterali sæpe semet attingunt
optice, & interiectum spatium ab aspe-
ctu auferunt.

Tertiò, Quia circa margines Solis
adhuc aliquid crassitie ostendunt, illa
autem visa crassities pertinet ad illo-
rum profunditatem, absque eo, quod
Soli immersum splendet & visum
fallit.

Quartò, Quia ex qua parte Solem
aspiciunt nonnihil acciduntur, cuius rei
experimentum euident habemus ab illa
luce quæ inter duos nucleos intercepta,
eosdem nonnihil imminuit. itaque nu-
cleos profundiores esse quam in limbo
appareant, certum est.

QVÆSTIO IV.

Vtrum Nuclei sint corpora densiora,
quam illas circumstantes cali-
go & Facula.

Conclusio. Nuclei sunt densiores;
quam caligo circumstantes, & hac densior
quam Facula.

Primò. Quia Solis radius rara cor-
pora citius penetrat quam densa, &
densa difficilius quam rara; signum est
Nucleum densissimum, qui à Solari ra-
dio nunquam perumpitur; & rariorem
ipso circumpositam massam, cui plus
lucis incorporatur; rarissimam denique
post hæc Faculam luce plenam ad mo-
dum flammæ.

Secundò. Quia augescēte Macula
ambiente, augeſcit & intenditur nu-
cleus, decreſcente decreſcit & remit-
titur; signum ergo hæc etiam Materiæ
accessione fieri, quam condensatio ple-
rumque comitatur aut sequitur; quod
si quis contenderet non esse condensa-
tionem propriè dictam, est certè ma-
teriæ similis multa aggestio, id quod
suffi-

*Nuclei Ma-
cularum
sunt densio-
res Macu-
lis & Facu-
lis.*

I

sufficit ad propositum meum in hac integra disputatione. Sed de hoc puncto etiam in prioribus actum est.

Tertiò, Quia ex resolutis Maculis plerumque & Vmbræ, & Faculæ resultant, loco longè ampliore & spacio maiore; igitur Macularum materia fuit rarefacta, &c.

Quartò, Quia Maculæ Nucleis facundæ, maiores semper, & luculentiores, & diuturniores, & circumcirca plerumque circumuectant Faculas; signum ergo evidens Nucleos valde compactos esse.

Q V A E S T I O V.

Virum Nuclei præter reuolutionem suam circa Solem, gyrentur quoque circa suum proprium centrum?

Conclusio. *Nuclei non gyrentur circa suum centrum.*

Nuclei circa suum centrum non gyrentur. Primò, Quia non mutant situm, vltimo modo proportionatè ad gyrationem quod tamen necessario fieret.

Secundò, Si vna cum Maculis rotarentur, mutarent & hæ suum situm, quod non fit: si vero soli rotarentur reliquo corpore Macularum non rotato, dissimilem situm & figuram à Maculis induerent, quod est ordinariè contra phænomenon.

Tertiò, Quia penetratio corporum non euitaretur, si corporum tam irregularium conuersiones darentur & Sol, Nuclei, Maculæ, Faculæque corpora dura ponerentur.

Quartò, Quia inter Nucleum & caliginem continuatio rumperetur, quod repugnat Phænomeno, secundum, quod nucleus non est sphaericus, imò ordinariè inæquales habet inter se, longitudinis, latitudinis, & profunditatis dimensiones.

Q V A E S T I O VI.

Virum Nuclei in Epicyclis & excentricis circumferantur.

Conclusio, *Impossibile est in Epicyclis & Excentricis ferri Nucleos.*

Primò, Quia, suppositis omnibus

II.

1 duris, penetratio corporum non euitaretur; siue ponatur nucleus in proprio Epicyclo, siue non: Nucleus enim extra visibilem Solis superficiem sola

5 sua profunditate eaque non tota potest eminere, vt ex obseruatis liquidissimè, constat, & alibi fuscè ostenditur, hæc autem multo minor est latitudine. orbis autem Epicyclaris debet sese extendere etiam ad latitudinem totius nuclei capiendam. igitur intrabit multum in corpus Solis, &c.

Secundò, Quia mutaret extraordinariè situm, quod est contra priorem.

15 Tertiò, Sæpe appareret in medio gracilis, in horizonte latus. quod est falsum.

Quartò, Fieret celer, tardus, progressius, retrogradus, &c. quod est falsum.

20 Quintò, statis temporibus mensuris & annuis rediret, quod est falsum.

Sextò, Modi etiam quibus nuclei generantur & intereunt, excentricos arque Epicyclos nulla ratione patiuntur.

Septimò, Augmentatio item & decrementum eisdem funditus euerit.

30 Octauò, Nuclei sunt intra corpus illud nebulosum inclusi, omnibus ergo duris positus, rotari non potest in Epicyclo ipse solus, sine associatis aliquot illius massæ partibus, quod tamen repugnat Phænomeno. &c.

Q V A E S T I O VII.

Quare nuclei circa margines subalbescunt, circa medium instar Carbonis sæpe nigrescunt?

45 Quia nuclei in medio sole per breuiiores & pauciores Solis partes quasi atmosphæricas ad visum perueniunt, per multo plures in extremis, qui cum sint aliquomodo illustres tingunt candore suo nucleum & imminuunt.

Hinc evidens est, nucleum in Solari superficie aliquatenus versari. Et hæc quidem ratio est generalis; specialis autem, quia massa nucleum ambiens ante nucleum in visum incurrit; hæc autem luce perfusa est, &c.

55 Accedit alia ratio optica; quod radij Solis, Nucleo circa medium eiusdem versante

Nuclei non feruntur in Excentricis aut Epicyclis.

Rationes dantur, cur Nuclei circa extrema albore quodam tingantur.

versante, in caliginosam illam massam recepti, non possunt percipi in illo recto Maculae situ, possunt autem in laterali. Amplius, inter nos & nucleum, non multum illius materiae reperitur, propterea, quod Solis gyratio copiosam caliginis illius redundantiam quodammodo abstergit. Et tandem, quod nimius splendor Solis medij, minus lucida suffocat, ut non appareant distincte. Probant hoc Faculae, quae versus extrema longè illustrius fulgent, quam in medio. Sic etiam, nebula illa Nucleo circumsepta, quando inter nos & illum iuxta limbum interijcitur, cum sit luce perfusa, apparet oculo; qui proinde nigrorem Nuclei ex hoc minus obscurum indicat. &c. Quia obiectorum mediorum colores, imputantur à visu remotioribus.

QVAESTIO VIII.

Quare Nuclei, ut & Maculae informam nubecularum intumescent ad marginem circuli observatorii, minuuntur ad centrum?

Fit hoc à sola vitrorum refractione: quae Maculae, & Nucleos in obliquas incidentiae lineas delatos, ampliant; in medio autem sub lineis incidentiae ferme rectis, parum patiuntur &c. Sed de his in Macularum gracilitate sit.

DE LUCE SEV CLARITATE Macularum solarium.

C A P. XLVIII.

QUādoquidem ipsa occasio monet, ut de Macularum solarium claritate, post discussas obscuritates, dicamus aliquid; nolo illam vacuum dimittere, & una saltem Quaestione, rem breviter expediam, quia et ad punctum Alterationis pertinet. esto igitur.

QVAESTIO VNICA.

Verum lux seu claritas, quae caliginosae Macularum massae inesse cernitur, sit fixa, permanens, inherens; qualis inest Luna, stellis &c. An vero transiens, qualis inest aëri? & sic Sol per illas ad nos tantum traluceat?

Ad hanc quaestionem non potest melius responderi, quam ex ipso Phænomeno, suppositis eiusdem exquisitis observationibus. Quaestio autem est, an lux Solis Maculis inhaereat permanenter, quemadmodum Lunae & stellis, an vero transeunter, ut aëri, & sic sit Sol tralucens, non Macula allucens?

Suppono Solem in medio multo luculentiorē apparere, quam in extremis, prout experientijs quamplurimis ad sensum constat. Et quanquam in Traluentia Facularum, istius resolutionis veritas luculenter constabit, hic tamen eandem obiter ostendere, non est abs re, ut vera subiecti Maculosi alteratio, inde pateat.

Conclusio. *Claritas Macularum solarium, est à luce ipsis inherente, non autem à Solis transparente.*

Probat^{ur} primò. Quia pleraque Maculae circa horizontem, magis albescunt, quam in medio, quod fieri non deberet, si candor illarum è sola transparentia oriretur, cum Sol in medio fortissimus, clariore, & potentiores euibret fulgores; ab extremis vero, obtusa satis iacula emittat: qui ergo fieri potest, ut hebetiore lumine, quale est marginale, amplius fulguret, quam synceriorē, cuiusmodi est medium? Et confirmatur vehementissime è capite duplici; quorum alterum desumitur ex ipso nucleo, qui in medio Sole plerumq. constanter niger, in horizonte eiusdem nigredine diluta & lumine superfluo apparet: quod profecto transparentia non facit, quia nuclei praesertim maiores luce penitus destituuntur: est ergo lux illa, nucleis in margine Solis incumbens ab abhacante, eiusdem nuclei caligine, ut clare patet, ex apicibus supra, & infra nucleum, versus boream & austrum excurrentibus, qui similiter subabescunt, alterum desumitur, à Macularum pro-

I.

profunditate; quæ longitudini aut latitudini (vt magna ex parte dictum est supra, & paullo post plenius probabitur infra) multis partibus cedit; igitur si Sol medius paruam Macularum profunditatem luce sua robustissima non penetrat; qui fit. vt marginales radij, & obliqui, totam longitudinem transversim, tam per Maculam quam nucleum eiusdem percurrant?

Mens certe & ratio hanc rem cum sola radiorum tralucencia non conciliat.

Obiectio.

Dices ex alijs capitibus hanc Macularum ad horizontem dealbarionem posse defendi.

*Experientia traductio-
nis Macu-
larum ad cen-
trum, & à
centro ad
limbum.*

Nam id euenire ex figura lentium quæ Maculas refractione distractas apparenter rarefaciant, & sic visui minus nigras offerant, idque ex eo confirmari, quod à margine circuli obseruatorij ad medium eiusdem traductæ, minores quidem, sed præcisiore & nigriore compareant; & vicissim, quod ex Maculæ quæ cum in medio Sole versantur & circuli obseruatorij medium tenent, mundæ, nigræ, & distinctæ comparent; si ad margines eiusdem motu instrumenti protinus confusiores, & minus nigræ visuntur. Vnde non sequitur necessario, apparentem illam albedinem ad margines enascentem esse aliquid Maculis insitum, cum possit extrinsecus dicto modo aduenire.

Responsio.

Respondeo; Maculas in Sole marginales, quocunque tandem, etiam in medium circuli obseruatorij, traductas esse minus tetras & luce dilutiores, quam fuerint olim, dum in medio Sole expansæ incederent; & eas quæ in medio Sole expansæ sunt, ad marginem tunc motu instrumenti tralatas futuras quidem maiores refractione, & aliquanto lucidiores non tamen ita dilutas luce apparituras vt fiunt, quando ad horizontem solarem spontaneo motu appellant. Vnde tamen si refractioni suum ius permittā, ipsa tamen ea omnia quæ Phænomeno ostētar, circa claritatē, sola minimè facit, neq; experientia satisfacit. Quare manet suum robur argumento, & neruus veritati. Feci autem huius rei, ad hanc dubitationem eliquidandam experimenta innumera, atque id quod modo tradidi, semper

II.

verum reperi. Vnde necessarium est, Macularum claritatem ipsis durabiliter inherere.

Probaturssecundò, Ex faculosis Nucleorum, & Macularum interlustris, quæ cum sint sæpiuscula minora ipsis nucleis, visuntur tamen ad exitum usque; quod non fieret, si per solam transparentiam illa res eueniret; quia minus à centro Solis abesset quam Nuclei, aut Maculæ, & sic ex aspectu dechui nucleorum mutuo contactu optico elideretur, & confirmatur, quia quando ista interualla, Faculis ita collustrantur, massa illa Nucleis circumflua, ex illa parte, qua se mutuo Nuclei respiciunt, penitus inclarescit; quod si soli transparentie datur, quare non circa totum nucleum Sol ita transparet? Sunt enim omnia vbique paria; materia circumiens vbique æque rara, æque mollis, Sol subiectus eiusdem fulgoris, & actiuitatis. cur ergo per æque tenuia non æque tralucet? signum ergo euidens, interlustrum illud Nuclei, & Maculæ corpori in summitate Solis adhærescere, adeoque Solem non tralucere.

Probaturs tertio, Quia plurimæ Maculæ visuntur vndique luce superfusæ, quæ non potest esse ex transparentia. Est enim illa lux inter oculum, & Maculam.

*Lux circuli-
vestit Ma-
culas.*

Probaturs quarto, Quia quædam Maculæ habent circa sese, peculiare quosdam instar halus pulcherrimos nimbos, siue areas, idque per totum quandoque, alias per partes, atque multos dies, suntque isti nimbi pulcherrima colorum albi, subflauo, subviridis, & furui mixtione, variegati. Hanc autem apparentiam huius venustam inter sese colorum temperiem, non esse à lentibus Telioscopicis, probatur; quod semper similia deberent exhibere in Maculis similibus; & non esse à luce Solis, quod similia semper deberet circa Maculas similes operari. igitur eiusmodi adscribenda sunt ipsi inhaerenti & adhærescenti Maculæ claritati, &c. & confirmatur solidè ex eo, quod P. Georgius Schönberger easdem lucis Maculosæ affectiones etiam Ingolstadij obseruauit, & annotauit: prout ego quoque in Notis obseruationum

*Macularum
colorati nim-
bi.*

*Refractione
Macularum
ad marginem
non est ade-
quata albi-
cantium Ma-
cularum caus-
sa.*

tionum eadem fideliter exposui.

Sed de hac materia plura inferius dicentur, ubi de Faculis solaribus, & Corporis solaris traluentia ex professo agetur, quando de Ortu & Occasu huius Phænomeni disputabitur.

MACULARVM SOLARIVM figura.

C A P. X L I X.

Figura est qualitas quantitatis finitæ. Quarum alia est superficiei, alia corporis. Nam lineæ & anguli fissuras completas non habent: habent tamen initia ipsarum. Figurarum autem tam superficialium quam solidarum siue corporalium, alia est absoluta; alia respectiua ex situ scilicet atque aspectu. Nam figura, v. g. sphaeræ solida, absolute & simpliciter, est corpus globosum, vnicaeque vndique æqualiter à medio distante superficiei comprehensum; si vero optice eandem sphaeram ex certa aliqua distantia consideraueris, dices esse circulum vel discum, &c. sic cylindrus ab oculo qui in axe colloccetur conspectus, erit circulus; in recta ad axem bifariam diuisum perpendiculari, rectangulum, in recta ad axem obliqua, referet figuram aliam, & sic proportionaliter de corporibus alijs, &c.

Eodem modo Maculae Solares, possunt considerari.

Nam Primò omnes, nulla dempta, horizonti vicinæ gracilescunt.

Secundò, Circa medium omnes per modum superficierum explicantur: vnde dubium alicui merito exoritur, sitne hoc à situ, an à figura propria, an aliunde?

Figura gracilitatis respectu speciei.

Dicendum primò, Horizontalis Macularum gracilitas, non est absoluta illarum figura. quia omnes, nulla dempta, quo magis ab horizonte descendunt, eo amplius grandescunt, & quo magis ad eundem accedunt, hoc iterum amplius gracilescunt.

In media verò ab horizonte distantia apparent omnes in sua maxima latitudine, variè terminata, vti mox dicetur.

Dicendum secundo, Gracilitas Macularum est partim ex illarum ad oculum situ, partim à lucis solaris interuentu.

Patet primò, quia si sunt iuxta horizontem, aspiciamus illas ex latere & oblique, tanquam discum obliquum ad oculum.

Patet secundum, Lux Solis multum ex Maculis radijs suis obliterat vndique. Quod vt solide sciatur.

Dicendum tertio, Macularum soliditatem non esse foueas, fissuras, lacunas aut hiatus in Sole obscuros.

Primò, Quia partes lucidæ circumstantes illas obliterarent, prout videmus nigra ab albis, obscura à lucidis extingui.

Secundò, Quia illæ foueæ non colorarent, aut halones circa se ferrent.

Tertio, Quia faculas non traherent post, sed supra se.

Quartò, Quia semper penitus obtegerentur ante exitum, & primum post ingressum retegerentur. Partes enim lucidæ illas in visu absorberent, teste experientia quotidiana: hæc autem non fiunt.

Et Quintò, Ipsæ non tegeant, neque minimum interuallum lucidum, quod tamen fit.

Sextò, A se mutuo non discederent aut accederent, prout fit.

Dicendum quarto, Macularum figuras non esse labes quasdam superficiales seu infectiones in sola extremitate Solis extensas.

Primò, Quia hæ notæ interstitia lucida nunquam obtegerent iuxta horizontem, quod tamen sæpe faciunt.

Secundò, Quia in horizonte versus centrum in solem vulnus non facerent, quod tamen frequenter accidit.

Tertio, Quia parua Maculae, in vicinia horizontis non viderentur, quod tamen frequentissimè euenit.

Dicendum quinto, Macularum solarium soliditas conflat ex corpore solido opaco, obscuro adaphano, atque extra superficiem solarem lucidam plerumque secundum aliquam sui portionem protuberante.

Quod sit ex corpore, compacta Macularum soliditas constat ex eo, quia

Gracilitas unde oritur

Soliditas Macularum non est foueæ, &c.

Soliditas Macularum non est labes.

Soliditas Macularum ex corpore opaco.

trinam

I.

trinam habet dimensionem, & de longitudine atque latitudine est aspectus & experimentum quotidianum, de profunditate saltem aliqua, probatur

Primo, Quia in rerum natura nulla superficies Mathematica sola datur.

Secundo, Et licet aliquis in Maculis hanc reperiri vellet contendere, tamen ex eo ipso inferentur ista.

Primo, Omnes Maculas æqualis tenuitatis futuras, & densitatis nullius, id quod est falsum.

Secundo, Nullam Maculam in Sole animaduersum iri. nam sicut punctum non coloratur, ita neque superficies ratione profunditatis, qua omnimodè caret. & sicut tenuissima nubecula in Solem nullam Maculam sensibilem inducit teste experientia, ita neque talis superficies quidquam ageret.

Tertio, Nuclei Macularum nulli essent.

Quarto, Maculae declives sese non attingerent.

Quinto, magis nigrescerent.

Sexto, Interualla lucida non obumbrarent.

Septimo, in margine nullam profunditatem ostenderent, &c. quæ tamen omnia sunt falsa & contra Phænomeni experientiam.

Manet ergo Macularum soliditatem ex corpore sensibilibus trinæ dimensionis constare.

Quod autem illud corpus sit opacum, obscurum, & adiaphanum, manifestum est, experimento quotidiano. Nam cum existat apud ipsum lucis fontem, Solem inquam, si esset corpus illud diaphanum, non exhiberet nobis obiectu suo umbram; neque solaris lucis fluxum abrumperet, idque magis vel minus, prout ipsæ Maculae magnæ vel parvæ, densæ vel raræ existunt.

Denique quod ex Sole plerumque aliquantum saltem protuberent, ex eo euincitur, quia circa margines intercapedines lucidas frequenter mutuis concursibus elidunt, itaque sese coniungunt ut duæ, tres, pluresve Maculae una videantur. quod simpliciter impossibile esset, nisi Maculae extra superficiem Solis extimam aliquantulum eminerent; supposita illarum æquali à centro

II.

Solis, ad sensum saltem distantia, quam probamus alibi.

Nam si aliquæ magis versus centrum accedant, aliquæ minus, idque sensibilibus, non esset necessarium, ut extra Solem prominerent, ex eo quod sese occultarent circa margines, &c.

Dixi plerumque, quia non raro contingit, ut magnæ Solis Maculae, antequam ad horizontem accedant, repente ita luce obruantur, ut omnino videri nequeant. & in talibus casibus, argumenta in contrarium magnam vim habere possunt. Etenim illas semper physice occumbere, vix est

credibile; quare luce nimia superfusa, sepeliri omnino probabile, imo quasi necessarium videtur: & tales in Solem mergi, aut lucem exundare, nullum potest esse dubium.

Dicendum Sexto, Figura Macularum ex oppositione visus directæ, cum in medio Sole spectantur, non est absoluta corporis quam quærimus, sed superficialis, & inter eas quæ ex situ & aspectu habentur numeranda, in obiectis valde remotis: unde cum Maculae Solares à nobis valde distent, ex directo illarum intuitu, de vera & solida illarum configuratione, ex hoc indubitatum quid statuere non possumus. nam ut in opticis demonstratur, sphaera eminens conspecta, apparet circulus; & cylindrus quadrangulum vel quid aliud, & denique omnia solida apparent plana, & multa vnum, & talia quidem, sub quilibus extremis conspiciuntur terminata. Unde etiam si solares Maculae appareant ex aspectu medio seu directo rotundæ, vel ellipticæ, vel angulares, &c. non tamè idcirco ex his illarum soliditas, vel corpulentia scietur aut inferetur.

Dicendum Septimò, Figura Macularum simplicium superficialis ex oppositione directæ, apparet ordinariè, aliquantulum rotunda, vel rotundæ amulapater experientia quotidiana, ex ipso Phænomeno tot annis deducta. Perimeter enim Macularum simplicium semper refert lineam curuam in semet reuersam, & interdum exactè circularem. Vide Imagines.

Dicendum Octauo, Figura Macularum compositarum, est composita e

K k k multis

Solida Macularum figura ex aspectu directo non acquiritur.

Perimeter Macularum curuilineus

I.

multis rotundis. Patet itidem eadem tot annorum experientia.

Maculas compositas voco, quando duæ vel plures Maculae formatae, ita vicinae sunt, ut vnum quasi corpus continuum efficiant. id autem maxime elucescit è diuersis illarum nucleis, vel separatione antecedente, quæ est frequenter vsitata, vel etiam consequente.

*Figura
Macularum
informium.*

Dicendum Nono. Figura è Maculis informibus, aut vmbreis, aut mixtim composita, est informis, instabilis, mixta, incerta. Patet etiam experientia quotidiana, & inpropositis schematibus ob oculos iacet. Informes voco Maculas, quæ cum rotundæ non sint, sed multiformes, etiam nucleis plerumque carent. Vmbra voco, quæ initium macularum referunt, aut finem illarum tanquam reliquæ reseruant, aut Facularum limites & custodes agunt, vel per transennam Solem inficiunt. Imagines Observationum hisce rebus plenæ sunt.

*Informes
Maculae &
Vmbra.*

Sol autem toto anno & semper plenissimus, sicut Oceanus crispantibus vndis: sed hæc ob multitudinem & continuam variationem, & nisi præstantissimis tubis obseruari nequeunt, quia minima tenuitas istarum vmbrearum visum fallit, cui Telioscopium excellens, & locus obscurus multum subueniunt.

*Macularum
solida figura
cognoscitur
ex aspectu,
& positione
omnium ex-
tremorum.*

Dicendum Decimo. Vera, absoluta & solida, quam hic quærimus Macularum figura sciri & afferri non potest, nisi ex omnimoda illarum ad visum positione & aspectu. Patet hoc experientia & inductione omnium rerum visibilium. Positio enim & aspectus ostendit corporum extremitates in omni situ, & ex his Geometra, vel Astronomus, vel opticus, solidas figuras enunciat. quare nisi Maculas ex omni situ circumcirca contemplari valeamus de absoluta & rotali illarum figura statuere certi quid non possumus.

*Omnis pos-
itio, & aspe-
ctus Macu-
larum non
potest haberi.*

Dicendum Vndecimo, Omnem Macularum situm, positionem & aspectum habere non possumus. Patet ex eo, quod situs rei aspiciendæ diuersus non acquiratur nisi vel re ante oculum, vel oculo ante rem ad omnem loci dif-

II.

ferentiam moto. Oculus noster circa Maculas nec mouetur nec moueri potest; nam totius terræ amplitudo diuersitatem aspectus ad Maculas penitus dat nullam, etiam si momento ab extremo ad extremum transires, &c. Maculae tametsi ante oculum circa centrum Solis moueantur, tamen quia ex obiectu Solis in latente hemisphærio non conspiciuntur; item quia in latitudinem parum diuagantur, & quandoque nihil, in Decembri nimirum & Iunio, præsertim in parallelis maioribus delatae: idcirco omnem illarum in situ quocunque configurationem aspicere, est impossibile: quare impossibile est, absolutam illarum & solidam figuram perfecte venari.

Dicendum Duodecimo, Nihilominus tamen Macularum solarium figuræ solidæ & absolutæ qualitas satis certa cognosci potest, ex illarum Orientali, Meridionali, & Occidentali positione & aspectu. Nam ortiuus & occiduus aspectus, dant aspectum laterum diametraliter oppositorum, & Meridianus dat inter illa superficiem interceptam. unde euidenter saltem habetur; Maculas esse corpora aliquo modo sensibilibiter profunda, & hoc in re tam remota, tam abstrusa, tam subtili, etiam per diuinationem probabilem haberi sufficeret, si verò tanta certitudine tantum acquiratur, omnino magnificendum. immo si Maculae vel in Austrum vel in Boream declinant vel inclinantur, multum etiam ex illis lateribus aspiciuntur.

*De figura
solida Ma-
cularum sa-
tis multum
scitur.*

Dicendum Decimotertio, Maculae solares sunt crassiores, quam communiter in margine apparent.

Probatum primo, Quia certum est, ex ea qua Solem aspiciunt parte, illarum crassitudinem solaris lucis allapsu multum imminui.

Secundo, Quia certum est, attestante obseruandi experientia, Maculas etiam ex alijs dimensionibus deficere, non veritate, sed lucis vndique ambientis vehementia, & copia.

Tertio, Quia quando venit ad extrema, ut horizontem attingere incipiant, id quod extra exporrigunt, senti-

tiri

I.

tiri nequit.

Quarto, Quia quamdiu sunt intra, à solari luce circumstante, semper ad aspectum imminuuntur. Habemus in Physicis exempla quotidiana innumera. Ex his deduco,

Macularum solarium absolutam magnitudinem esse maiorem, quam sit ea, quæ visui nostro obijcitur.

Primò, Quia corpus non lucidum, inter lucida positum semper apparet minus.

Secundò, Quia Sol circumstans, plus quam dimidium illustrat. Maculæ cuiusvis.

Tertiò, Quia nescimus quanta Maculæ portio intra Solem mergatur, quam visus à reliquo Solis corpore illustri, non distinguit.

Dicendum Decimoquarto. Macularum crassities siue profunditas apprens non est tanta, quanta vel latitudo vel longitudo. constat hoc experimentis & obseruationibus quotidianis; & probatur. quia ea apparet maxime circa horizontem; si enim media, & clarissima Solis lux in medio circumstans Maculam absorbere non potest, multo minus id faceret lux horizontalis debilior. Et docet hoc extrema ipsas terminans linea, quæ parum curua, sed quasi recta apparet, &c.

COROLLARIUM.

Hinc sequitur, si ab eo, quod intra Solemmersum & lucidum est, abstrahamus, residuum & ymbrosum Maculæ corpus esse quodammodo figuræ lenticularis.

Dicendum Decimoquinto, Macularum figura solida semper alteratur physicè.

Probaturs primò, Quia semper augeatur vel minuitur. Hæc autem absq; præuijs, comitantibus, & consequentibus alterationibus in præsentī negotio non fiunt.

Secundo, Quia continenter densantur, & rarefiunt.

Tertiò, Quia nigredine & luce insita,

II.

intenduntur, & remittuntur. Hæc autem ex genere alterationum physicarum sunt.

Quartò, Quia extremas superficies continue mutant.

Quintò, Quia nuclei maxime variantur: qui cum in visceribus Macularum concludantur, alterationem principaliter redarguunt.

Dicendum Decimosexto, Macularum circa centrum Solis incedentium superficies ad nos conuersa, est curuilineo perimetro terminata, & aduersum nos gibbositate conuexa; rotundarum quidem sphaerica ad sensum, non rotundarum varia.

Quod sint superficies circularibus, aut varijs lineis finitæ ostendit perimenter, dum medium Solem occupant: quod sint conuexæ erga nos, patet ex situ illarum horizontali.

Dicendum Decimoseptimo, Maculæ cuiusque figura superficialis, est inconstans, vt paullo ante insinuauī, tam in quantitate, quam in qualitate; nam augetur & minuitur, & in formas varias transmutatur. Nec opus est rem quotidie obuiam multis probare. Aspice imagines obseruationum, & notas perlege.

Hæc autem aut sunt alterationes physicæ, aut sine alterationibus physicis non fiunt.

Dicendum Decimooctauo, Perimeter figuram Macularum superficialem dereterminans, nec constans, aut sibi similis, nec æquabilis, aut præcisus; sed varius, asper, lacunosus & molliter deficiens, qua parte lucidiori superficiei Solis committitur, floccidus, ex reciproca lucis & ymbrarum commixtione existit. Hæc doctrina alia probatione non eget, quam usu oculi, & ratione mentis. Nam iniuria fit naturæ, si quæ sensu indubitato patent, aliunde conquisitis tanquam incerta, fulcire tentamus argumentis. Verum quidem est, dari quandoque Maculas, quarum circumferentia constans, & sibi similis permanet, per totum Solem, prout rotundis quibusdam contigit, docente hoc aspectu ipsarum optico, sed cum hoc satis rarum, & in solo Macularum statu ve-

Maculariæ superficies curuilinea, versus nos est conuexa.

Figura Macularum superficialis, alteratur.

Terminus figura Macularum superficialis semper variabilis.

Maculariæ figura solida semper variatur.

I.
rum sit; assertio ex ijs, quæ plerumque fiunt procedit: Etenim laceratio extremitatû, & anfractuosa lumininofa cum obscuro congressio, ita huic Phænomeno familiaris est, vt in dies, & ferme horas alij vmbrae anguli, alij lucis sinus exsurgant: illud interim sollemne manet, vt qualescunque tandem finium circuitiones & lineamenta enascantur, seu curua, seu recta, siue denique mixta, nunquam tamen mundæ, præcisæ, aut æquabili filo exporrectæ, sed semper, asperæ, dentatæ, serratæ, & fibrulis quibusdam respersæ compareant, & hoc ipsum, nunquam modo, situ & statu eodem, sed semper summa cum varietate coniunctum.

PHÆNOMENI SOLARIS

alteratio ex alijs etiam apparentijs arguitur.

C A P. L.

QVAE hucusque de Maculis primarijs ventilata sunt, alterationem satis, opinor, veritatis amatori persuadebunt, & licet pleraque Maculis secundarijs, & Faculis ipsis associatis, accommodari valeant; tamen placuit hic obiter, generales quosdam alterationis fontes aperire, vt habeat qui veri indagandi studio tenetur, vnde ulterius progrediatur.

VARIÆ ALTERATIONIS

fontes.

Primus ergo est, quod totus Sol Vmbra seu Maculis secundarijs, & luculis seu Faculis secundarijs refertus inueniatur, iisque semper mutabilibus. Nam non solum loco, & mole, & figura, & claritate atque obscuritate in dies mutantur, sed mutuo in se invicem conuertuntur. Vnde ipsas non alterari, est omnino impossibile.

Primus alterationis fons ex vmbra, & luculis.

Vide Meditullium cum Notis, libro priore.

Alter fons, è quo alterationes emanant est, quod circa polos parallelorum à Maculis descriptorum, visuntur superficiei solaris spatia satis ampla, Maculis & Faculis primarijs & secundarijs penitus orbata, splendore Solis tranquillo, & superficiei fulgente æquabili superfusa, & allucentia; ea tamen ipsa, nec spatia, nec figura, nec tempore sibi constant, sed variantur, & Maculis luculisque secundarijs sæpenumero asperguntur; quemadmodum & alia vicissim Maculis aut Faculis referta, expurgantur, & in aspectum vniuniformem serenantur. Imo, quod magis admirare, similes solaris superficiei portiones, quietæ, placatæ, ab omni difformitate Maculæ aut Faculæ vllius tam primariæ, quam secundariæ vacuæ, nonnunquam in ipsam Zonam Torridam, seu viam Macularum regiam inuehuntur, vnaque more Macularum promouentur, quæ profecto vicissitudines, absque vera alteratione contingere non possunt.

Tertius alterationis fons ex eo colligitur, quod Sol totus multis sæpe diebus omni Macula primaria vacat: quod absque maxima alteratione non fit: idem nonnunquam de Faculis quoque primarijs tenendum est.

Tertius alterationis physica fons; ex absentiâ Macularum, & Facularum.

Quartus alterationis fons, & is quidem euident ex eo erumpit, quod purissimæ Faculæ in Sole accenduntur, & rursus extinguuntur, spatio illo quod occupabant, in priorem superficiei solaris minus lucidæ formam conuerso; quo in casu, alterationem interuenire necessum est: nam mutationem hanc tralucentiæ Soli non posse adscribi vel inde euincitur, quod eiusmodi luculentæ Faculæ in extremam Solis conspiciui superficiem protenduntur, quandoquidem in ortu, & occasu horis perimetrum insident, teste frequentissima experientia & continuo obseruandi vsu licet de his, fusius, infra de generatione: vnde necesse est, tam nascente, quam denascente simili Facula, ipsum physicum & visibile Solis, quod aspectui patet, fuisse alteratum,

Quartus alterationis physica fons ex accensione & extinctione purarum facularum.

nam

I.

II.

nam locum ipsius occupavit Facula, et ipsa vicissim in locum huius succedit, non numero, sed specie.

Quintus alterationis Physica fons ex Maculis in Faculas conuersis.

Quintus, et vberimus alterationis fons inde ebullit, quod Maculae omnes fere haecenus animaduersae sunt abire in Faculas, & in ipsis quandoque Faculis medijs prodire Maculae, quae Metamorphosis ingentem secum absque dubio trahit alterationum segetem, praesertim si eas Faculas, quas ipsae Maculae in comitatu suo secum vehunt, huic scaturigini, prout oportet, adnumeremus; Passim enim enascuntur, passim quoque abolentur, & variationes, non ex aspectu optico decliui & laterali, sed directo & pleno, innumeras ostendunt.

Sextus, Alterationis Physica fons.

Sextus alterationis isque pulcherri-
mus ebullit fons, quod sicut in solari
superficie spatia splendida, quieta, &
similia apud polos & nonnunquam in
medio, per dies aliquot visuntur, vti
fonte Tertio exposui: ita vicissim in
eadem solari superficie consurgunt saepe
tractus quidam ampli, aequabili, &
tenera quadam caligine Soli obducti,
more tenacis fumi, aut lentae nebulae,
vel nubeculae splendidioribus partibus
superfusi. Differunt autem eiusmodi
apparentiae a Maculis primarijs, quod
sint multo tenuioris & delicatioris um-
brae, magnitudine maiore, duratione
minore, neque in Maculas facile trans-
mutentur. A secundarijs umbris in hoc,
quod obscuriores, constantiores, & ma-
iores existant; ordinarioque obseruan-
di Telioscopio deprehendantur. Ma-
ximas Solis partes eiusmodi fuliginum
exundationes non raro occupant. Tan-
dem absumuntur, & Solem communi
fulgori restituant. Haec autem omnia,
si alterationes non arguant, nescio quid
sit alteratio.

Hosce fontes & hisce similes, oportebat quidem deducere vberius, sed per temporis angustias non licebat; tuo vero Marti, Candide Lector, & curis meis secundis etiam aliquid concedendum erat.

DE PHAENOMENI SOLARIS
Ortu, & Interitu.

Ex obseruato Solis Phaenomeno summam proferuntur & expenduntur ea, quae ad Ortum, & Occasum physicum Macularum & Facularum pertinent.

C A P. L I.

TAmetsi ea, quae de motu locali, de augmentatione atque diminutione, quae de alteratione Macularum, & Facularum ex ipso Phaenomeno satis efficaciter, vt arbitror, adduxi, per se satis indicent, atque obseruatorem quasi manu deducant, fieri non posse, vt in corporibus tantis, tantae & tam subitae mutationes eueniant, sine consequente, aut concurrente subiectorum mobilium, interitu vel ortu: quia tamen multis forsitan is euentus aut incredibilis, aut inexpectatus fuerit, oportet indicia huius rei propria, & tum demum argumentum afferre, idque in veritatis, & eorum, qui desiderio illius flagrant, gratiam; quibus omni studio & officio inferuire semper vnice conatus sum. Patienter autem sustine, Amice Lector, vt te ducam per gradus, ad penetralia huius reconditoris disquisitionis.

Maculas & Faculas nasci & denasci indicium primum ex earundem apparitione & disparitione in aspectabili Solis disco desumptum.

Maxima pars Macularum immediate in facie Solis patente, de nouo nascitur, augefcit, progreditur & astronomicè occumbit; rursus magna ipsarum copia, oritur astronomicè, sed prius deficit tota, quam occasum assequatur; multae quoque sunt, quae neque ortu, neque occasu astronomico potiuntur, sed inter vtrumque in Sole incipiunt, & desinunt esse; tandem multae quoque sunt, quae totum Solem ad nos conuersum perdurant ab ortu in occasum vsque. Itaque quadruplicem reperimus Macularum classem, quaedam occumbunt, sine ortu astronomico prauius; quaedam oriuntur

Macularum ortus, & occasus physicus, est magnum generationis indicium, &c.

I.

nullo sequente occasu; quædam neutro fruuntur; quædam utroque. De ultimis argumentum quod præmanibus habeo, non concludit directo; priores ex instituto respicit.

*Macula sine ortu sed cum occasu
Astronomico.*

*Macula in
Sole ortu
physico tan-
tum, non a-
stronomico
enata, ar-
guunt gene-
rationem.*

Maculas quæ in Sole repente & ex abrupto comparent, vnaque cum reliquis via ordinaria progrediuntur, ibidem de nouo generatas esse, sunt isthæc indicio. Quia sub minima magnitudine, & cum tenui obscuritate incipiunt, sensimque in utroque crescunt. certe nec magna nec intensæ nigredinis hactenus vlla primo comparuit: igitur ante non extiterunt; alioquin visum non effugissent. Probatum enim supra est, ex concursu plurium per suas gyrationes hinc inde sibi occurrentium corporum, eas non apparere de nouo, ut quid sensibilius aggregatum, nec illis iterum alio abeuntibus, disparere. Et infra determinate ostendetur, impossibile esse, ut Maculae solares fiant ex concursu partium opacarum, ortibus duris circa Solem perenni rotatione conuersis. Cum autem neque alteratio quoque, præsertim in nucleis, & Faculis formandis sufficere videatur; restat ut ad Generationem confugiamus.

*Macula sine occasu, cum ortu
Astronomico.*

*Macula in
Sole occasu
physico, non
autem astro-
nomico oc-
cumbentes,
innuunt cor-
ruptionem
parundem.*

Eodem modo, plurimæ supra horizontem solarem ortuum ascendunt, sed ante deficiunt sensim, quam occasum consequantur. deficiunt autem, & magnitudine & obscuritate, ita ut ipsis simile nil penitus, sed sola communis Solis superficies remaneat, vel quid illa lucidius: igitur cum ita absumantur, ut nullum sensibile ipsis conueniens accidens reliquum sit, illas interire admodum suaderetur.

Et confirmatur, quia nec dissipatio ne per motum localem, neque rarefactione aut alteratione sufficienter explicantur; unde corruptionem interuenire, veritati conueniens est. Præsertim quando in ipsis Macularum ge-

II.

mijs, grandes nuclei in ardentibus Faculas euadunt: quod non raro fit, vel ex toto, vel ex parte.

*Macula absque ortu, & occasu
Astronomico.*

Eius generis Maculae, ortus, & occasus Astronomici ignaræ, sunt valde frequentes, & raro est magna aliqua Macula, quæ simili comitatu temporario, ad tempus saltem aliquantulum non gaudet, præcedunt aliquando, sed pone sequuntur frequenter, aut late- ra cingunt, modo boreale, modo australe, modo seorsim, modo utrumque simul. officium autem, nec diuturnum, nec fidele præstant, nam aliquæ non sunt diurnæ, aliquæ biduanae, nonnullæ tri- duanae & ulterius etiam, sed eadem leuitate sese subducunt à famulatu, qua irrepsérunt, clanculum & inad- uertentur, parua & subalbida plerum- que veniunt, parua & pallida ordina- riè abeunt, augescunt celeriter, & cito decrescunt. Has igitur omnes Maculas si quas alias generari & corrumpi, ex eo colligas quod illis ad ortus & interitus naturam, ut distinctius infra, nihil deesse videatur. Si quæ in Phæno- meno accidunt, bene perpendantur. Huc etiam reuocantur interlustra tem- poraria, Maculis faces subministran- tia, nimbi diuersicolores; & si quid si- milium apparentiarum, in scenam pro- dit.

Quæ de Maculis dixi, eadem appli- canda sunt Faculis separatis, etenim simili modo sese habent, quoad ortum & occasum; Nascuntur enim multæ de nouo ante occasum, multæ post ortum intereunt, sunt etiam, sed rario- res & difficiliores animaduersu, quæ in medio Sole, velut in scenam pro- deunt, & ante sese proripiunt, quam horizontem occiduum assequantur. Has igitur vere, & propriè generari haud inficiabitur is, qui illas ex natura sua reliquo Solis corpore maioris, & insitæ lucis internum principium possi- dere cogitabit, de qua re, suo loco mox pluribus.

*Facula sepa-
rata, Gene-
rationis in-
dices.*

I.

II.

Maculas, & Faculas generari, & corrumpi, motuum secundum ex eo quod non redeunt.

Macularum generatio, et corruptio innuitur ex eo, quod non redeant. Et quod Solomino vacet ipsam non raro.

Si Maculae non interirent, deberent redire, spatio circiter 27. dierum, quemadmodum ex aliquarum reditu, & alijs multis rationibus constat. Sed non redeunt, teste quotidiana, & perenni experientia. Igitur intereunt.

Ergo, & generantur. quia quod ingenerabile est, interire nequit. Hactenus certe nulla Macula, nulla facula perennauit. Quod autem deberent redire, constat ex eo, quod in Sole versentur, ut distincte rursus probabitur infra.

Huc pertinet Macularum & Facularum secundarum perpetua mutatio.

Item, quod Sol quandoque Menstruo ferme spatio Maculis primarijs caret.

Igitur interijisse omnes tunc oportuit, quae prius patentem eius faciem percurrerunt.

MACULAS, ET FACULAS generari, & corrumpi, Argumentum palmarium, ex eo, quod ex Maculis Faculae fiant; ad cuius argumenti robur, ex professo reiicitur generatio facularum per traluentiam.

C A P. L I I.

MAior Macularum numerus in Faculas degenerat, teste experientia: iam hoc fieri absque ortu & interitu non est credibile, Nam Maculae, hoc ipso quia tales, sunt coloratae & opae praesertim si nucleos attendamus; haec autem omnia conuertere in substantiam ipso Sole lucidiorem, sola rarefactione, sine vlla consequente generatione, est omnino impossibile; neque huius rei facile est inuenire exemplum.

Rarefactio enim ex natura sua non tendit in lucidum, imo quo rariorgnis, hoc minus illustris, & magis diaphanus apparet. Ex eo igitur, quod Maculae solares rarefiant, non sequitur necessario, clariores futuras.

Rarefactio excluditur.

Dices hoc sequi, in subiecta materia; Maculas enim Eclipse Solem, quibus dissipatis & actiuitate Solis rarefactis & consumptis, obstaculo remoto, synceriores, & sereniores ex illo loco affulgere Solem ipsum, & hunc deinde splendorem praecellentem, censeris Faculam.

Respondeo hanc obiectionem coincidere cum Solis traluentia, quam impossibilem ex ipso Phanomeno ostendimus in superioribus. Placet tamen hic aliquid reuocare, & distinctius idem argumentum tractare, ut hoc inane effugium omnino pracludatur.

Traluentia Solis Faculae non generantur.

Nam contra est, quod innumerae Faculae in horizonte nunc ortiuo, nunc occiduo, limpidissime alluceant, in quem tamen protendi nunquam possent, per solam traluentiam, quae Solem ut vult aduersa opinio, tersissimum politissimum, aequae ubique fulgidum & intra circumiectam superficiei crustam sphaericam, tanquam caucam conclusum tenet, & nobis tantundem lucis limidae permittit, quantum ipse acutissimis suis spiculis de carceris illius parietinis perterebrat; quae tamen ipsae fissurae, nescio a quo Vulcano identidem obstruuntur, ne miser Phaebus vultu Quo calum tempestatesque serenat, liberaliore nos exhilaret. Data igitur & admissa traluentia, nulla vnquam Facula in horizonte comparebit. Quod sic demonstro.

Ex A, in sequenti figura, descriptus semicirculus B C D, sit Solis apparens haemisphaerium, circaque ipsum tralucida sphaera, radiorum solarium moderatrix, esto B E D, Soli concentrica, duabus superficiebus B C D, interiore, & F E G, exteriori definita; & sit haec sphaera illa, quae sua varietate, & mutabilitate omnem in Solem inferat apparentem circa Maculas & Faculas instabilem diuersitatem, prout placet aduersario. Quibus positus, fuerit aliqua Macula E H, eaque ex rarefactione, & consumptione transmutata, per solam transparentiam in Faculam luculentam C K, cuius nulla pars ingreditur circumsitam sphaeram crassiuem C H, vel H K, sed tota finiatur splendidissima & politissima Solis superficie C K,

I.

CK, inde in oculum, LM, qui in eodem plano, quod per parallelum Facula BCD, transeat, versetur; affulgeat radijs CL, KM; quibus positis.

Per scintillam Solis tralucetiam, Faculae hori- zontalis intuitus, contra Phaenomenon, adi- mitur. Dico primo. Ex Facula CK, etiam si perduret, & in suo vigore permaneat, atque ad Horizontem B, viuacissimè perueniat, ad oculum tamen N, neque scintillam quidem lucis peruenturam.

Peruenerit igitur Facula CK, ad Horizontem B, & sit ipsa BO, affulgeatq. ad oculum N, radio citimo ON, qui ex postremo Faculae puncto O, procedat, & sphaerae circumiectae superficiem exterioriorem FE, secet in puncto P, ad quod educta recta AP, diuidat sphaerae Solisque communem superficiem BOK, in puncto Q, iunctaque chorda OQ, fiat triangulum OPQ; & quia angulus AQO, est recto minor, est enim minor angulo mixtilineo OQA, est angulus ad peripheriam circuli rectus internus, ideoque & ipse recto rectilineo minor; hinc sequitur angulum rectilineum OQP, angulo OQA, deinceps, esse recto maiorem; quia ambo simul sunt aequales duobus rectis; igitur QOP, in eodem triangulo OPQ, est recto minor; & consequenter multo minor; OQP; igitur recta PQ, minori angulo O, subtensa, est minor recta OP, quae subtendit in eodem triangulo OPQ, angulum maiorem PQO. Vnde si punctum Solis Q, aequè potes atque punctum O, radio suo directo & breuiori, QP, circumstantis sphaerae crassitiem perpendicularem PQ, penetrare non potest, prout vult & supponit aduersarius, & ex parte rei non penetrat, suffragante ipso Facularum & Macularum Phaenomeno, &c. quomodo radius OP, obliquus & multo longior, eandem sphaerae interiectae obliquam latitudinem superabit? Manet igitur verum, ex Facula CK, siue BO, ad oculum N, nil peruenturum, si quidem ea ad nos ex sphaera rarefacta per solam tralucetiam pertingant; id quod erat demonstrandum. Et hoc est vnum.

Cui cum reclamet continua Phaenomeni natura, nam Faculae hori- zontales sunt propemodum infinitae; manifestum est, & ipsum falsum atque impossibile esse; Non igitur ex mera

II.

1 tralucetia oriuntur Faculae, sed ex vera mutatione talis materiae illarum. Vel sic. Si punctum Solis O, tralucet illasum in P, per lineam longiorem, OP, ergo punctum Q, per breuiorem, tralucebit in idem P. & sic de singulis punctis solaris superficiei. Sol igitur vbique aequaliter tralucebit; quod rursus est falsum & contra Quotidianam Phenomeni consuetudinem. Quod autem probaui de puncto Faculae O, idem demonstrabitur de puncto B, & quolibet interiecto, inter B, & O.

15 Sed dicet aduersarius, hanc demonstrationem non concludere nisi supposita aequabili sphaerae circumiectae BP 10 K in raritate & densitate dispositione: nam si quis neget partis BRQ, esse eandem temperiem dum Facula B, Horizontem insidet, quae fuit ipsius dum eadem medium Solem occupauit in CK, sed asserat Facula B, circa horizontem versante, portionem BRPQ, rariorem, adeoque radio OP, Faculae BO, tralucido peruiam factam; & hoc 25 ex natura Solis & huius Phaenomeni exigente, in tali Facularum circa horizontem versantium situ semper fieri, si quis, inquam haec pertinaciter obijciat; praemissa demonstratio, eiusmodi refractarium non cogit: nam radius longior OP, tralucebit per longiorem sed rariorem tractum, cum interim radius QP, breuior, nequeat perrumpere breuiorem, sed densiorem circumpositae sphaerae intercapedinem. Et sic elumbis est allata demonstratio, nec euerfa, sed fortius roborata manet Solis tralucetia.

40 Respondeo, verum quidem esse, allatam demonstrationem procedere, & vim habere inter caetera, ex aequa 35 densa aut aequè rara corporis Solem ambientis affectione; nihilominus an haec arbitrariè obtrusa, ratione aliqua 45 nitantur, vel cum facta hypothese, & Phaenomeni veritate consistent, oportet intimius perspicere, & accuratius considerare.


50 Hypothesis autem est haec, Primò Solē ABCD, esse perfectissimè sphaericum, homogenum, uniformem, aequaliter lucidum, natura incorruptibilem duritiae plus quam adamantina rigidum. 55

Secundò,

Obiectio pro Tralucetia.

Responsio generalis.

Suppositio- nes ad Homi- nem.



Secundo. Hunc eundem Solem esse
Lucidiorem quocunque alio corpore
naturalilucido.

Tertiò, Ipsūque hunc Solis glo-
bum esse minorem corpore FK G, ipsi
circumdato.

Quartò. Et hanc circumiectam glo-
bosolari sphaeram esse eodem maiorem,
crassitie nimirum tanta, quantam Ma-
cularum quarumuis vna cum nucleis
ipsarum profunditas exigit.

Quinto, & hoc Solis involucrium
esse natura sua æthere cælesti spissius,
opacum quidem, luce tamen aliqua
decoratum, & in aspectum, qua parte
corpus Solis excedit, incurrere: (Nam
de positione excessus in aspectum non
cadentis, dicetur postea ex instituto in
fine huius demonstrationis, interea
ego intentum meum prosequor, ex hy-
pothesi, sphaeram Sole maiorem, appa-
rere vnum quid cum eodem, & ybique
etiam qua parte Solem exit visum ter-
minare.)

Sexto, huius sphaerae naturam fluxam, mobilem, & omni modo mutabilem esse: ideoque omnem in Solem

i varietatem ab ipsa prouenire.

Septimo, Faculas autem solares in hac sphaera non esse, sed in superficie Solis, & per hanc tantum tralucere, sicubi per rarefactionem, aut aliam quampiam mutationem, apertas tralucendi fenestras inuenerit, quales semper inueniri vult aduersarius à Facula horizontali.

Hisce igitur ita suppositis, videamus
vtrum rationi congrua, & suppositis
Phænomeni solaris apparentijs, possibi-
lia sint, quæ tanto conatu ab opposita
parte pro fictitia traluentia, contra fa-
ctam demonstrationem oggeruntur.
Vt autem maioris claritatis ergo, &
omnis æquivocationis euitandæ caus-
sa, omnis errandi ansa præcindatur,
ego totam illam massam lucidam, quæ
quotidie nobis supra horizontem ascē-
dit, & infra eundem rursus descendit,
& in qua nobis explicata hætenus hu-
iusce Phænomeni varietas residere con-
spicitur, appello Solem aspectabilem,
& repræsentatur semicirculo A G H F,
siue iam ista moles sit vna continua
sphæra, siue ex mente aduersarij con-
flectitur

I.

tur ex inclusi Solis corpore ADKB, & circumfusæ sphaeræ massa DHB. Vocemus autem huius massæ extremum perimetrum horizontem Solis aspectabilis externum, siue horizontem Macularum, qualis est GHF. Solis autem inclusi perimetrum, DKB, vocemus horizontem internum, siue Facularum, quibus prænotatis.

*Responsiones
particulares*

Dico fieri non posse ut Facularum solarium apparentiæ per traluentiam horizontalem OP, quacunque tandem ex causâ saluentur, propter sequentia absurda.

Primò, Nulla vnquam Facula solaris videretur oriri aut occumbere in horizonte Solis externo, id est, nulla Facula D, oriretur in puncto G; nulla B, occumberet in F. Hoc autem est falsum, & perpetuo constantique Phænomeni solaris tenori contrarium, quemadmodum è multis obseruationum millibus, & eorum expositionibus in libro tertio ostendi, &c. Facula ergo BO, non tralucet ex O, per OP, ad oculum N, sed vere si spectatur ab oculo N, existit in P, alioquin vt dixi, in occasum descendens, non reperiretur in extima Solis aspectabilis superficie, ad punctum F, id quod tamen, saluo Phænomeno solaris, semper fit. Vbi tamen aduerte, me non dicere, omnes Faculas peruenire ad occasum solaris horizontis, quædam enim prius extinguuntur, quocunque tandem modo, hoc tantum me dicere, in plano horizontis solaris à me nullam esse animaduersam Faculam, iuxta varias expositionum & examinum regulas, quam in horizonte exteriori non repererim.

Secundò, Nulla vnquam Facula aut oriri aut occidere est à me deprehensa, in Solis horizonte interno: quod tamen deberet fieri, supposita Solis per sphaeram circumfluxam maiorem traluentia. Nam cum Sol inclusus finiatur per horizontem BCD, Facula oriens consistet in D, occidens in B, & sic intra Solem aspectabilem omnis Facula necessario orietur, videlicet in puncto D; intra eundem occidet omnis, nimirum in B; cui cum perennis Phænomeni tenor è diametro repugnet, tute iudica, an vera sit ista traluentia.

Tertiò, Omnis Facula in ortu aut

II.

1 occasu erit longior, quam in meridie: quia in occasu secundum totam lineam BOP, Solis pars BOQ, vt postea probabitur, tralucebit; cum tamen in meridie non traluxerit nisi secundum lineam CK. Hæc autem aduersantur Phænomeno, quia etiam Faculæ circa horizontes gracilescent.

10 Quartò, Omnem Faculam orientalem, aut occidentalem tantus hiatus intra Solem obscurus comitaretur, quanta est linea GD, vel BF. Hoc autem repugnat Phænomeno.


15 Quintò, Facula orientalis DS, cum traluceat per totum spatium DSβ, etiā in medio per tantum spatium apparebit maior, quam experientia Phænomeni ferat; quod confirmabitur infra, præclusis varijs euasionibus.

20 Sextò, Nulli Facularum cursus cum cursibus suarum Macularum legitime copulabuntur; nulli in extimam Solis aspectabilis superficiem collocabuntur; omnes irregulares, & inordinati inueniuntur; contra totius Phænomeni tenorem, contra praxim probatam priorum; contra tot allatas expositionum, demonstrationes.

30 Septimò Tandem, vt etiam physice discurremus. Facula BO, tralucet partem OP, vel quia situs obliquus est, vel ex alia causâ ordinata à Sole, vel fortuito. Si primum; Nullæ Maculæ erunt in horizonte, ob situm obliquum, & totus Sol circumcirca tralucebit: est enim vbique obliquæ seu decliuis positionis ratio eadem.

35 Si secundum, causâ illa, quæ sphaeram circumeuntem rarefacit vt traluceat Sol, aut est giratio Solis, aut lux, aut alia qualitas in Sole rarefaciendi vi prædita: non primum, quia sphaera illa cum Sole circumfertur, vt indumentum cum corpore vestito, vtriusque enim 40 motus est tanquam vnus, prout ex obseruatis satis liquet. Igitur non apparet cur Solis rotatio non æque condenseret illam sphaeram atque dissipet, præfertim cum Maculæ in iisdem partibus, 45 vbi motus feruet condensentur, & vbi circa polos magna quies est, neq. Maculæ neque Faculæ primariæ confurgat: motus ergo aut quies huc parum conducunt; dato tamen, id motui transcribendum; cum sit in medio æque ve-

55 scribendum; cum sit in medio æque ve-



loz Solis conuersio, vt in extremis ho-
izontalibus, non est maior ratio, cur
solaris motus non dissipet sphaeram cir-
ca Solis medium, dissipet autem circa
extrema: ergo aut vbique aut nusquam.
 Sed ob eandem causam sequitur,
 non posse ad rarefactionis huiusce effe-
 ctum assumi lucem Solis, quia cum ex
 hypothese ipsa vbique aequalis virtutis
 existat, quae tandem erit ratio cur in
 vicinia horizontis sphaeram ambientem
 attenuet, non autem in medio est ea-
 dem vbique agendi vis, idem & eodem
 modo applicatum patiens, & tamen
 pars Solis C K, non potest in partes
 sphaerae punctis H, & E, vicinas, dum
 Facula in sublimi Sole voluitur; quod
 eadem numero Solis pars & Facu-
 la C K, potest in easdem partes, quan-
 do descenderit in Solem humilem ad
 B O, & F K, nam ex hac tralucenciae
 hypothese, Facula non est aliud, quam
 pars aliqua certa Solis detecti, qualis
 in exemplo est C K, haec ergo pars So-
 lis C K, luce sua sphaerae circumuenien-
 tis portionem R O P, dispellit iuxta ho-
 rizontem in B O, non autem disgregat

in C K, licet agens necessarium sit, &
 caetera omnia simpliciter paria ponan-
 tur, agens Sol lucidus, patiens sphaera
 circumducta, virtus agendi eadem nu-
 mero lux, applicatio eadem, immedia-
 tus Solis & sphaerae contactus. Sola
 diuersitas in hoc consistit, quod tem-
 pus & situs intercedit; haec autem in
 hoc casu rarefactione ordinate, prout
 hic fieri solet, nec promouent nec im-
 pediunt: quia in ortu eadem Facula
 D S, iam tegebat rarefaciendo partes
 S A, debebat ergo modo dicto, etiam
 in medio continuare, aequae atque in
 extremo iuxta B O, renouare. Itaque
 hanc ego philosophiam neque didici,
 neque intelligo. quae cum oriatur ex
 assumpta Solis incarcerati tralucencia,
 amplectatur illam, cui vanitates contra
 patentem veritatem arrident. Ego ob-
 stantibus his rationibus contra lucem
 meridianam cecutire non possum.
 Accedit aliud, quod si Facula B O,
 illustri radio O P, tralucet, necesse est
 partem O R P, luci peruiam esse factam;
 igitur etiam partem O P Q, alioqui So-
 lis pars lucida O Q, superasset portio-
 nem

I.

nem remotam ORP, & non vicisset vicinam OPQ, quod est absurdum: tota ergo portio RQ, tralucet. igitur si hoc potest Solis portio occidua, idem potest hæc eadem portio meridiana. Quod cum non faciat in meridie, teste experientia, neque facit in occasu. Fictitia est ergo radij OP, tralucencia, & inaniter excogitata. Et hæc quidem causam hanc à luce efficaciter amouent.

Sed eadem rationes, idem omnino efficient contra aliam virtutem rarefactionem quamvis, aut enim illa toti Soli similiter inerit, aut certis partibus. si primum, argumenta eadem resumuntur, quæ contra lucem agebant. si secundum, non est maior ratio cur illa virtus sphaeram illam aperiat ordinatè modo dicto circa horizontem, quam circa medium: cum sit eadem numero, & reliqua in indiuiduo eadem, & si aliter alibi aperiret, sunt in contrarium quæ contra tralucenciam absolute paulo ante tradidimus.

Tandem quælibet Solis inclusi pars horisonti respondens est intra superficiem concavam sphaeræ ambientis; & nulla Facula apparens est intra superficiem concavam sphaeræ ambientis, sed extra in superficie conuexa: cum radat visibilem Solis horizontem, tam in ortu, quam in occasu, non minus quam Macula: igitur nulla Facula apparens, est Solis inclusi pars. Igitur Sol inclusus, etiam si transparenere daretur, non causabit nobis Faculas per tralucenciam. Fictitia est igitur hæc tralucencia, & in suo robore manet prima demonstratio.

Vel sic. Si Faculae sunt partes Solis tralucences; tunc aut Sol est inæqualis, aut sphaera Solem obrundens penetrat, eundem, propterea quod omnes Faculae horizontales, in aspectabili eiusdem Solis superficie insint. at neutrum concedet aduersarius; tralucenciam igitur Solis gratis confictam, & Phænomeni solaris, ROSAEQ. VRSINAE destrutricem, haud inuitus dimittat, & experientiae, rationi, potentissimæq. veritati palmam lubens concedat.

Refutatur casus ille, quo sphaera Soli circumducta ita subtilis asseritur, ut id quod ex ipsa Solem excedit, in visum præ tenuitate non cadat.

II.

Venio nunc ad illum casum, quo pertinax Soli quidem ABCD, sphaeram FKG, circumducit, ita tamen affectam, ut qua parte Solem tegit, obtundat, qua extra cadit, in oculum non incurrat; & hinc sequi vult, ut de portionibus DBG, in ortu, BPF, in occasu, extra Solem cadentibus, oculus nil percipiat: nam in ea aut sunt Maculae, & hæc opacitate sua visum effugiunt, aut ipsa sphaeræ ambientis substantia, & hæc tenuitate sua tantum luminis non haurit à Sole, ut refundat ad aspectum, manet igitur obscura: & sic iuxta huius sphaeræ Soli subiectæ portionem, omnia in ipsummet Solem transcribentur, quæ in ipsa tamen physice contingent, sicut è contrario ipsa Solis lux per illam traducta, eidem attribuetur, cum ex parte rei, id per meram tralucenciam eueniat. Et hoc quidem plausibili discursu, tanquam vallo insuperabili sese munitum & defensum sperat refractarius, quam inaniter autem, mox patebit.


Nam stante Phænomeno solari, stantibus obseruationibus tam meis quam alienis, stantibus cursibus Macularum expositis, stante loco vero Macularum & Facularum, tot modis & medijs demonstrato; impossibile est hanc sphaeram Soli circumpositæ positionem & explicationem stare. Etenim

Primo, Ex obseruatis & expositis Phænomeni cursibus, omnes Maculae sua centra collocata habent in sensibili Solis superficie DCB, ex hac autem refractaria phantasia, Nullæ Maculae quidquam sui in Sole habent.

Secundo ex obseruatis & demonstratis Macularum cursibus, vnus idemque regularis cursus conflatur & continuatur, tam ex Macula in locum Faculae, tam ex Facula in locum Maculae succedente, id quod frequentissimis exemplis patefecit, & innumeris possem ostendere; ex hac autem refractarij contentione, impossibile est, vllius Maculae cursum, cum cursu vllius Faculae componi, propterea quod Faculae sint semper partes Solis, Maculae autem extra eundem, adeoque illarum cursus, cursibus istarum Solis centro A, viciniore, ideoque hisce minores.

Tertio, Ex obseruationibus meis earumque

Sphaera ambientis tenuitas inuisibilis refellitur.



rumq. demonstratis, censis & legitime approbatis expositionibus, omnis Macula in superficie Solis exposita, qualis est DCB, summam regularitatem motus exhibet; extra prout vult refractarius in superficie GHE, nullam seruat: quia in exponendo assumitur ad cursum fictitium maiorem, diameter minor DB, &c.

Quarto. In meis observationibus & expositis cursibus, inueniuntur innumeri Macularum cursus a solaris horizontis ortu puncto D, ad occiduū B, non solum optice incurrentes sed de die in diē per totum arcum semicircularē ordinatissime in solari superficie progressi; secundū hanc autē imaginationē, horū nil est vniquā possibile, quia Macula quāvis quæ in D, apparet optice, oritur verē circa β, occidit iuxta P, eo qd sū perimetrū GβP, maiorē decurrere ab aduersario ponatur.

Quinto. Secundum mea obseruata, exposita, demonstrata, legitime approbata, curuilinei Macularum cursus, ellipseon segmentis non sunt multū absimiles; Maculae in horizonte diu morantur; ibidem vehementer gracilescent; & apparentia itinerum segmenta, aliquando ad ellipseos dimidium pertingunt, aliquando supra dimidium excrescūt; hec

omnia, propter assumptum extra Solem cursum, vti in prioribus demonstraui, nequeunt consistere.

Sexto. Secundū obseruata & veritatē Phenomeni, omnes Macularum cursus hemisphere solaris apparentis intra quadrantē quē polus eleuatus & parallelorum maximus definit, contenti sunt latentibus æquales aut maiores; secundū hanc autē positionē, propterea qd in horizontali linea DB, nec oriatur nec occidat Maculae, sed oriantur diu post in β, occubant multo ante in P, hoc non euenit.

Septimo. Secundum hanc positionem Maculae reduces non saluātur, quia cursus parentes sunt nimis breues quam vt latentibus respondeant, & tempora temporibus nullo modo proportionantur.

Octauo. Secundum hanc positionem, dum Facula D, v.g. oritur, Macula G, eadem recta superstitans longe adhuc extra ortum versatur, quem cum assequitur circa β, Facula D, ascendit in γ, superauitque arcum Dγ, rursus quando Macula eadē ex β, peruenit in ε, Facula γ, ascendit in δ, at verō quando Facula eadem in CK, medium Solis deuenit, Macula illi directo superstitabit in HE, (pono autem secundum Phæ-

I.

nomenon ambas in eodem parallelo proportionem simili moueri) tum delata Facula in Q, occumbet Macula in P. occumbente vero Facula in B, diu & procul extra horizontem versabitur Macula in F. Et sic eadem Facula eandem Maculam & tempore & loco antecederet & subsequetur in Solis apparente disco. quæ cum Phænomeno Solari aperte reclamant, tanquam inaudita, & monstrosa admitti nec possunt nec debent. Vnde & eam ex qua sequuntur, opinionem de prædicta Solis tralucencia, falsam esse, pro certo, tenendum est.

Argumenta positiua ex obseruationibus desumenda, contra prædictas tralucencie phantasias,

Primo. Multæ Faculæ Maculis contiguæ vel versus Septentrionem, vel versus Austrum, horizonti ortiuo simul insident, deinde eodem modo sibi coherentes, per multos dies progrediuntur, donec alterutra absumatur; multæ rursus eodem tenore à medio Sole in occasum usque simul pergunt, simulque in contactum horizontis deueniunt; hæc autem fieri impossibile est, si Maculæ in alia superficie existunt quam Faculæ. Nam horizon in quo existit Facula, est ultimus solaris globi terminus, quem Macula pridem transcendisset, si in alia & remotiore superficie à centro Solis incederet, quam Facula, ut aperte cognosces reuocando in memoriam dicta paullo ante num. 8. Cum autem sibi mutuo semper connectantur intra Solē & apud extremum, ea coniunctio non tantum optica, sed physica existit. hoc argumentum bene perpensum, effugium non habet.

Secundo. Multi Macularum nuclei fissi sunt, & illo exiguo interlustrato luculentæ faculam ad horizontem usque fouerunt; quæ multo citius obtrexissent, si ipsi eodem ut vult aduersa pars, tanto altiores fuissent. ut pariter colligitur num. 8.

Tertio. Multæ Maculæ in horizonte Facularum splendoribus ita obruantur, ut discerni vix queant, nisi admodum maligne: signum ergo euidentis eiusmodi Maculas à Faculis quodammodo inuolui.

Quarto. Centra Facularum & Maculis enatarum, in eodem parallelo, eademque Solis superficie reperiuntur, in qui-

II.


bus inuenta sunt centra Macularum, secundum examen rigidissimum, usque ad minutias vnius capilli. cuius rei dedi specimina plurima.

Igitur si Maculæ & Faculæ in eadem lucida & aspectabili Solis superficie incedunt, eandemque à centro sensibilem distantiam seruant, patet exulare Solis tralucenciam, & ipsas mutuis alterationibus fieri. Quod si quis intra hanc nihilominus physicam & alterabilem Solis superficiem, inclusum esse velit immutabilem, sed tamen nunquam aspectabilem solaris corporis globum, lucisque perennis fontem, per me licebit fingere cuius quoduis; dummodo ex dictis constet faculas solares, nec esse, nec esse posse, aut dici aut fingi villo modo dicti Solis velut tralucidi partes, saluo solari Phænomeno. Nunc ad telam pertexendam redeamus.

Dico Secundo. Nullam Maculam vel ortiuam vel occiduam conuersum iri in Faculam nobis conspicuam.

Fuerit enim, si fieri potest Macula occidua FR, conuersa in Faculam OB, quæ affulgeat in oculum N, radio OPN. Quia igitur Facula videtur sub radio ON, sphaera OPK, perspicua erit segmento longiore OP, quæ tamen perspicua non erat nec est segmento breuiore PQ, non obstante, quod punctum Q è directo, punctum O, ex obliquo fulgeat: Hoc autem est absurdum. non igitur tralucet Facula BO, ex abitu Maculæ FR. Manet ergo, nullam Maculam ortiuam vel occiduam euanescentem relicturam post se Faculam ibidem visibilem oculo N, &c. id quod erat demonstrandum nam quod de occidentali demonstraui, idem valet de orientali, GV, &c. Et hoc est secundum. Cui cum Phænomenon perpetuo tenore aduersetur nam Maculæ sexcentæ & amplius circa ortum & occasum in Faculas luculentissimas sunt conuersæ; & conuertuntur quotidie; euidentis est, etiam hypothesis, ex qua falsitates istæ sequuntur esse falsam. Falsa igitur est Solis tralucencia, & ex ipsa facularum apparètia, falsa & conficta circūposita ab aduersarijs Soli sphaera: vera autem nostra Facularum ex Maculis productio.

Dico Tertio. Nullas unquam Faculas diuisas, circa horizontem solarem tam matutinum, quam vespertinum, in



I.

*Hæc fictitia
Solis trans-
parentia, pe-
rit optica
Facularum
horizontalium
eolitio-
ne.*

vnam Faculam coituras optice.
Sint duæ Faculæ orientales S, & T; cum igitur S, ad oculum Z, radio SZ, non perueniat, obstaculo portionis sphaeræ VX; T, vero, ad oculum α, non pertingat, obiectu partis TY; patet neutram Faculam visum iri, latent quippe tanquam valles in superficiem Solis D S T, depressæ, inter alta sphaeræ ambientis promontoria prominentia VX, & T & Y. Prolucent autem Faculæ tantum per directum, secundum apertos rarefactione hiatus VG, & βX, ex arbitraria Adversarij transparentia. Quare, cum duæ aut plures Faculæ horizontales, omnino quasi post carecta deliteant: patet optice non coalituras in vnam, id quod erat demonstrandum. Cuius contrarium, cum à Phænomeno nobis identidem exhibeatur, manifestum est, hanc hypothesin falsitatis conuictam, explodendam, doctrinæ vero nostræ à Viro cordato subscribendum esse id quod erat tertium.

Dico Quarto. *Ex hac hypothefi,*

II.

x quamcumque Faeculam horizontalem, etiam maximam multo minorem visum iri, quam deberet fieri, ex usu & practi Phenomeni.

5 Nam Faculae ad horizontem non
perinde semper gracilesunt & confi-
dunt, instar Macularum, sed saepe sa-
pius valde latae, & luculentae apparent:
cuius contrarium semper & necessario
10 fieret, si Faculae e sola tralucencia ori-
rentur.

Fingamus enim totum interuallum,
 arcui $DST\gamma$, correspondens, esse
 rarefactione apertum in Faculam, quæ
 15 maior non apparebit, quam sit distan-
 tia inter duos radios DZ , & $T\alpha$, com-
 prehensa. Hoc autem repugnat veritati
 Phænomeni: repudianda est igitur hu-
 ius figmenti vanitas, & sententia nostra
 20 amplectenda.

Dico Quinto. Omnes Maculas remotiores, omnes Faculas centro Solis A, viciniores futuras.

25 Nam ſecundum hanc Tralucentiæ
ſuppoſitionē, omnes Maculę verſantur
in ſphæra Soli circumpoſita, & nullæ

Commenti-
tia Solis trā-
sparentia, nō
stat cum ap-
parente Fa-
cularum be-
rizontalis
amplitudi-
ne.

I.

Faculae superficiem Solis DCB, vnamquam egrediuntur; est autem tota sphaera remotior à Centro A, quam superficies Solis. Patet ergo propositum, id quod erat quinto loco demonstrandum. Hoc autem falsum esse, constat ex toto ferme libro priore. Falsum ergo & id, ex quo istud sequitur; & verum id, quod nos asserimus contrarium. Vbi tamen nota, nos non asserere, omnes Faculas, & omnes Maculas, esse semper eiusdem inuariabilis & indiuisibilis distantiae à centro Solis, hoc non asserimus, sed hoc dicimus, omnem Maculam quae conuertitur in Faculam, aut omnem Faculam à qua oritur Macula, non magis aut minus abesse à centro Solis, quam absit ipsa producta vel Facula vel Macula. Diuersas autem diuersarum nonnunquam esse à centro Solis remotiones intra latitudinem seu crassitiem superficiei solaris physicae, vix esse ambigendum, cum ipsum Phaenomenon id satis videatur quandoque indicare, praesertim si secundarias Maculas & Faculas velimus inspicere.

Imaginaria Solis Traluentia eliminat ortum & occasum Macularum cum Faculis.

Dico Sexto. *Secundum fictam traluentiam, nullam unquam Faculam orituram aut occasuram cum Macula; item nullam Maculam visum iri in mediis Faculis, aut viceversa.* Liqueat hoc satis ex dictis, & demonstratis prioribus. quod quam sit falsum, experietur is, qui vel paruum huius Phaenomeni usum contraxerit.

Excogitata Solis transparentia, Maculas in alienum Solis locum transfert.

Dico Septimo. *Nullam Maculam respectu superficiei solaris DCB, visum iri suo, sed semper alieno loco, praeterquam quando Macula culminat, seu medium Solis ad sensum tenet: de reliquo in perpetua parallaxi omnes versabuntur: & hoc verum atque sensibile est, etiamsi sphaera Soli circumdata, crassitie sua quartam aut sextam unius minuti partem tantum attingat.* Quod ut recte intelligatur, notandum est; Macularum parallaxin, respectu Solis, posse deprehendi triplici ratione.

Prima & ordinaria est, quando ex diuersa obseruatorum in terra distantia simul vna eademque Macula spectatur, & inuenitur in loco Solis vel

II.

diuerso, vel eodem, tum dicitur illa Macula vel carere aspectus diuersitate seu parallaxi, vel praedita esse: ut si cui Sol oriatur, & alteri occumbat, distabunt hi hemisphaerio terrestri; qui simul aspectam in eodem Solis loco Maculam aut Faculam, liberabunt à parallaxi, prout factitatum esse ostendi in libro priore passim in Obseruationum Imaginibus & earundem Notis.


Alter parallaxeos deprehendendae modus, dependet ex motu Solis diurno, & loco terrae eodem, sed tempore diuerso, ut quando mane obseruo Maculam in Sole, & rursus vespere; quae si in Sole non est, & ab eodem sensibilibiter distat, vespere in alio debet videri, subtractis subtrahendis, vel additis addendis quae illi competunt ex motu proprio, vni diei respondente. sed & de hac parallaxi actum est in superioribus.

Tertius, & forsitan non adeo cognitus modus est is, qui desumitur ex ipso Macularum motu proprio circa Solem. In quo casu, quia locus verus & locus visus Macularum indagatur in ordine ad Solem; Locus visus erit is, quem radius visualis per oculum & centrum Maculae incedens, designabit in superficie Solis; locus verus erit is, quem semidiameter Solis per centrum Maculae ostendet in Solis superficie.

Sic Macula Y, locum visum habebit T, locum verum γ. Et Macula P, habebit locum visum O, verum Q. Vnde patet, quomodo ex data ista sphaera, oriatur semper aspectus diuersitas, respectu superficiei solaris BCD. E quibus deinde, quae & quanta absurda inducantur in ipsum motum, alioquin ordinatum & regularem inuentum, non est operae pretium retexere, cum satis sint declarata in prioribus.

Quod si quis, ut has absurditates euadat, eo velit declinare, ut dicat Faculas modo in sphaera ambiente, modo in Sole ipso incluso reperiri, is in difficultates sese multo maiores inducet, ut consideranti iam dicta patebit; aut certe nomine tenus à me discrepabit, &c.

Cæterum ut sphaeram hanc Soli circumductam, praeter allatas rationes geometricas



I.

metricas, etiam quasi physico ratiocinio funditus evertam.

Dico Octavo. Ex eo ipso, quod Sphæra ista ponatur, ipsam necessario tolli. Nam sphærae istæ ideo Solem circumuestiunt, ut ipsum ab omni, ut putant, iniuria defendant: ut Mathematicè sphæricum tersissime politum, nitidissimè splendidum, adamante solidiorem, chrystallo puriorem, vnum, eundem, uniformem, homogœneum, semper sibi similem conseruent.

Faciamus ergo ita esse, dicamus, scribamus, sentiamus idem.

Igitur si globus Solis D C B, æqualis ubique virtutis & actiuitatis est, si contra istam sphæram, qua veluti fascia constrictus tenetur, à primo sui ortu, semper implacabile bellum gessit, si eandem qua potest ratione dissipat, & multis sæpe vijs lacerat, atque patientes ad nos fenestras aperit, oriuntur nunc multæ graues, & fortassis haud expediendæ quæstiones.

Nam certum est Primo. Solem esse agens naturale necessarium non libe-

II.

rum; atque adeo in subiectam circum-euntis sphærae materiam omnem suam, quam natura dedit exerere agendi vim.

Certum est secundo. Nihil se ipsum corrumpere; vnde statuendum sphærae illius dissipationem non ab ipsa, sed à Sole tanquam efficiente causa futuram si derur.

Certum est Tertio. Maculas esse densiores, reliqua circumstante sphærae illius materia; alioquin solares radij ab ipsis non interciperentur magis, quam ab ipsis sphærae ambientibus partibus.

Certum est Quarto. Multas sæpe plagas in apparente Solis hemisphærio vacuas ab omni Macula aut Facula reperiri, æquabiles & tenoris per omnia uniformis. quibus positis,

Proponuntur aduersariis Quæstiones haud ita facile soluendæ.

Quæritur primo. Quare apud polos nullæ oriuntur insignes Facule?

LII 3 Nam

I.

Nam virtus Solis sphaeram illam dissipandi, ubique est eadem: certum porro est, ex observatis, partes Solis polares à Maculis puriores esse quam alias; ergo Sol illas facilius ad tralucendum attenuabit. Igitur ibidem Faculae frequentius & clarius elucebunt.

Dices, apud polos debiliorem Solis motum, ideoque minorem sphaerae refractionem fieri. Ex hac igitur responsione;

Quæritur secundo. Quare ad partes Solis polares, nullæ vnquam visuntur, aut colliguntur Maculae primariae? cum praesertim causa Maculas dissipans, & consequenter Faculas creans, ibidem non praeualeat?

Quæritur tertio. Quomodo vertigo Solis licet vehemens uniformem sphaeram ita contrario modo in suis partibus disponat, ut alicubi tam valide densetur, alibi omnino dissipetur nullo notato signo tumultuariæ agitationis partium in Maculas collectarum, vel plagarum in Faculas apertarum?

Quæritur quarto. Quis Maculas producit? Non Sol; qua enim virtute Sol congregaret Maculas? non luce; non motu locali; confugiendum ergo ad qualitatem nescio quam occultam ex iisdem capitibus impugnandam: quod si Sol virtute sua cogit Maculas, quis illas tandem dissipat? An idem immutabilis Sol, simul congregat, simul dispergit? Nam si virtute Maculas dissipandi Sol pollet alicubi, pollet ubique; si pollet semel, pollet semper: & cum agat ex necessitate, quamcumque datam Maculam dissipabit semper; sed & semper colliget, si quidem vis Maculas congregandi Soli inest: simul igitur eandem Sol Maculam & congregabit & disperget; si disperget non congregabit; simul ergo congregabit & non congregabit, quod est impossibile. Vis ergo cogendi Maculas, per hæc Soli non est attribuenda; adscribetur igitur, sphaerae circumstanti. Vnde,

Quæritur Quinto. Quare Sol non obstat, quo minus circumscisa sphaera Maculas alias aliasque coaceruet? Nam eadem facultate, qua coalitas resoluit, impedire potest ne coeant novæ. cum praesertim ibi agens contrario modo disponens sufficienter non adsit.

II.

1 Sexto. Quare Sol densissimos Macularum Nucleos attenuando in nihilum redigit, tenuiorem autem massam minus dispellit? Nunquid qui potest maius nequit minus? qui dissipat opaca corpora, tenues vapores dissolvere nescit? Est virtus eadem; actio non libera; aget igitur.

10 Septimo. Quare Sol Maculas maiores, densioresque in Faculas conuertit, & simul vicinas, contiguas, adhaerentes, easque minores & rariores illasas, imo augescentes sæpe relinquit? Efficacia Solis ubique est eadem, minores igitur & tenuiores Maculae citius in Faculas rediguntur.

20 Octauo. Quare Sol, Maculas opacas in Faculas attenuat; circumstantem autem tenuiorem sphaerae materiam, in easdem non transmutat? Causa efficiens ubique eodem modo est applicata, & patiens magis dispositum ad Facularum apparentiam, ut ab aduersariis explicatur; sequetur igitur effectus.

25 Nono. Quare Sol, eandem Maculam alia sui parte in Faculam adaptat, alia sui portione intactam relinquit? cum actio Solis & applicatio agentis ad patiens sit eadem?

30 Decimo. Quare Sol, locum semel dissipatae Maculae, semper apertum & Facula tralucentem non retinet? nunquid in parto loco tuendo impotentior, quam in acquirendo existit? at æqualis semper roboris nervo est praeditus. Faculas igitur semel partas, semper tuebitur.

40 Undecimo. Quare Sol Faculas inæquali luce illustres ad nos transmittit? Nunquid alicubi omnia obstacula amoliri valuit, alibi non potuit? At vigorem æque pollentem ubique possidet: igitur qui tenebras & opacitates densiores fugat, rariores tolerabit? & qui aliquibus in locis, medium ad purissimam diaphanitatem perpurgat, in alijs, eadem actiuitate donatus idem non praestabit? Vtique. Sol enim est agens necessarium.

50 Duodecimo. Quare Sol in æquabili sphaerae ambientis plaga, hic Faculam aliquam suscitatur? & non illic, aut alibi? cum sit eodem modo disposita sphaera, eodem modo affectus Sol? aut ergo ubiq. apparebunt Faculae aut nullibi.

Deci.

I.

Decimotertio, Quare Sol Maculas primarias ita delet, vt quandoque totus ab omnibus liber & immunis euadat, à secundarijs autem nunquam? An ab hoste debili superatur, qui longè potentior prostrauit?

His & similibus interrogationibus, (cuiusmodi ex Phænomeno suscitari possunt sine numero) oportet satisfacere illum, qui Solis nitorem candidissimum circumposita sordida sphaera laeterna obscurat: quod cum verosimiliter fieri nunquam possit, (quemadmodum aqua lance omnia rerum momenta ponderanti, ipso Sole multo lucidius apparebit:) restat, vt relictamera Transparentia, repudiata sphaera, ista fictitia, ad veras & solidas, dignasque philosopho cogitationes animum transferamus, & veram Macularum Facularumque generationem, ducente & ita docente Phænomeno recognoscamus, vt tenetur recognoscere, ex primo allatis à nobis rationibus quilibet, etiam si ab his physicis quæstionibus soluendis abstinere vellent, vel eas sub probabilitatis specie à se solutas putaret. Quod vt eo libentius faciat operæpretium duxi à Macularum generatione & interitu reijcere (prout ante promissimus) illum modum, quo eam explicare nituntur aliqui, per partes circumpositarum sphaerarum dissimulares, secundum varios occursum congregatas & disgregatas.

IMPOSSIBILE EST MACULAS

Solares fieri ex concursu partium

opacarum, orbibus duris circa

Solem statutis, & perennanti rotatione con-

uersis

Græc. P. L. I. I. I.

Sunt qui pro rigida cæli, & immu-

tabili substantia tuenda, nullum

non mouent lapidem, vt Macu-

larum & Facularum solarium Phæno-

menon, quod ipsis vehementissime im-

minet, omni modo possibili vel elidant

vel eludant. Itaque cum earundem in-

stabilis, & semper noua varietas ipsos

ad oculum quotidie premat, quando-

quidem motus ipsarum per orbium

II.

planetariorum, quos ipsi, contra Pto-
lomei, & communem Astronomorum
sententiam duos ponunt, intercursan-
tium variam densitatem & raritatem,
tueri nullo modo valeant, quemadmo-
dum efficaciter hucusque ostendi; ad
nouas molitiones ingenia exacuunt, &
globo Solari vniformi, immutabili, ahe-
nea adamantinaque duritie compacto,
sphaeras itidem duras, incorruptibiles
infinitas quodammodo circumducunt,
non vniformi sed difformi perspicuitate
atque opacitate variegatas, vt harum
vário interlapsu, & partium opacarum
conuentu Maculae, diaphanarum Facu-
lae, solo motu locali, absque vlla alia in-
terueniente mutatione creentur. Sic e-
nim fieri posse putant vt Maculae exur-
gant plurium opacorum subtercursu,
plurium vero diaphanorum aut lucido-
rum Faculae.

Cæterum vt harum imaginationum
vanitas elucescat, suppono ex obserua-
tis Maculis, & inde digestis obseruatio-
num Imaginibus, expositisque & variè
ventilatis Macularum cursibus, & locis
earundem indagatis,

Primò. Omnium Macularum & Fa-
cularum centra, esse eiusdem sensibilis
à centro Solis distantiae: vt constat ex
indagatis veris illorum locis.

Secundò. Omnem Maculam si au-
getur, fere semper augeri in omnem lo-
ci differentiam, à medio sui, versus ex-
trema, augendoque in medio semper
intendi apparenti nigredine. & contra
omnem ordinariè Maculam deficere
vndique ex omni loci differentia, ab
extremis suis oris, versus medium pro-
cedendo, & dum deficit, semper nigre-
dinem remitti. constat hoc ex obserua-
tis, & examinatis illarum veris locis.

Tertiò. Multas Maculas, præsertim
minutas Solem pertransire absque sui
augmento, vel diminutione notabili,
& eas quæ sunt in statu, multis diebus
inuariatas ad sensum persistere.

Quartò. Multas Maculas esse Facu-
lis vndique ambitas, & simul ex omni
parte sæpe crescere, sæpe decrescere,
sæpe crescente altera, alteram imminui,
& vice versa; sæpe vtrinque diu stari.
Similia asseruntur de Faculis Macula-
rum lateralibus.

Quinto. Multas Faculas accendi fre-
quenter

Sententia
partis ad-
uersæ expli-
catur.

Suppositio-
nes ex obser-
uatis, & li-
bro priore
explicatis.

I.

quenter in medijs Maculis & earum nucleis, idque non raro augescentibus utrisque: aut utrisque decrefcentibus, aut vicissim, &c.

Sexto. Neque Maculae, neque Faculae crescunt aut decrefcent aequè celeriter, aut aequè diu stant; sed aliae alijs tardius, aliae citius, aliae diutius, aliae brevius. constant haec ex praxi quotidiana.

Septimo. Dum aliae Maculae crescunt, aut stant, decrefcent aliae: idem sentiendum de Faculis.

Octavo. Spatia polaria tametsi plerumque à mutationibus valde notabilibus immunia existant, quippe Maculas aut Faculas notabiles siue primarias non gignunt, in terminis tamen suis quietis vel amplificandis vel contrahendis, augmenta vel decrementa magna patiuntur, tempore breui, utpote semidiurno quoque.

Nono. Maculae autem & Faculae secundariae, longè plures & celeriores magnitudinum & figurarum mutationes subeunt, ut quae in dies & horas ferè varientur, &c.

Decimo. Medium siue centrum Maculae cuiuscunque, est primum quod nascitur, & ultimum quod ordinariè deficit. experientia stabilis.

Vndecimo. Nulla Macula aut Facula perennat, sed omnes simpliciter tandem evanescent; & Sol totus saepius omni Macula primaria destituitur.

His ita praemissis.

Quandoquidem omnes Maculae in modo augescendi & decrefcenti conveniunt, ut omnes nimirum à centro versus extrema crescant, & ab his versus medium deficient, oportet principium à quo ista proveniunt, in omnibus univèrsale & idem esse: unde in eorum sententia, qui hoc totum motui locali tribuunt, necesse est id accidere in omnibus Maculis modo eodem. Modus autem alius aut concipi aut esse nequit, quam ut partes Maculam integrantes, ad centrum Maculae eiusdem, per orbes mobiles duos, in quibus insunt, conferantur.

Porro An & qua ratione partes haec Macularum constitutivae sensibiles fiant, ante omnia videndum est. Etenim motum illarum localem separatarum

II.

non sentiri certum est; videntur coniunctae, separatae non visuntur.

DE MACVLARVM SOLARIVM partibus,

Partes Macularum solarium, secundum hanc sententiam, aut sunt simplices aut compositae.

Simplex alicuius Maculae pars, est quae per se sola tam opaca non est, ut in visum nostrum cadat, addita autem simili, aut similibus, sensibilis evadit, & hanc voco compositam.

Hinc sequitur ad quamvis partem minimam alicuius Maculae constituentem, sensuique subiiciendam requiri duas minimum sphaeras, quarum mutuo supercursu singulae alioquin imperceptibiles, per modum unius videantur.

DE CENTRI MACVLAE CVIVSQ. generatione sensibili.

Centrum Maculae cuiusque in hac sententia, in se & absolute spectatum semper esse, patet, quia extat in partibus simplicibus, prodit autem generatione sensibili, quando duae eiuscemodi particulae insensibiles concurrunt in unum radium visorium; tunc enim aspectui patere incipiunt. Cum autem experientia Phaenomeni quotidiana edoceat, centrum Maculae cuiuslibet esse ordinariè primum & ultimum sensibile, iuxta Suppositionem 11, dubitatur; quo modo in dato Solis loco talis Maculae centralis pars perduret? Nam certum est ex Phaenomeno, mediam seu centralem Maculae partem integro cursu, hoc est, dies 13. & amplius illam manere: certum etiam est, Macula augescente, nigrorem intendi apparenter, licet in hac suppositione vera intensio non eveniat; quia color partis super partem positione augescit. Certum denique est, in Maculae statione, centrum quoque suum statum quoad opacitatem tenere. Duorum autem modorum altero centrum permanere necesse est, vel partium simplicium è quibus constat quiete, vel si non quiescunt, similium continua successione. Si primum, necesse est & sphaeras, à quibus partes illae simplices deferuntur circa Solem in statione Maculae

Partes Macularum simplices & compositae quae

Quomodo centrum Maculae cuiusque perduret?

I.

culæ quiescere : igitur & omnes illæ sphaeræ, quæ partes centro superpositas agglomeratas tenent, & per hoc centrum nigrius reddunt, similiter stabunt, atque ex hoc, tanta sphaerarum contigua conglobatio stabit immobilis, quanta est datae Maculae profunditas siue crassities, quæ arguitur maxime ex maiore vel minore apparenti nigredine, quam sola partium super partes per motum localem superpositio causat, maior ergo maiorem superpositionem, maior autem partium superaggestio, crassiorem sphaerarum centrum constipantium seriem secum vehit. Quando deinde Macula imminui & centrum seu medium Maculae à nigrore sensim deficere incipit, sphaeras hæc eatenus stabiles, denuo moueri necesse est.

Eodem autem modo ratiocinandum est, de sensibili centri generatione Macularum omnium & singularum quia cum sit in omnibus idem augescendi & deficiendi tenor, qualis est origo vnius, talem & omnium esse recte utique concluditur. Hinc cum alijs Maculis stantibus, aliæ augescant, aliæ deficient, sequitur in hac hypothese, singulas Maculas sphaeras sibi proprias vendicare, quia motus & quies eidem sphaeræ simul non conuenit, &c.

Quod si eadem centri sensibilis constitutio obtinenda est, non quiete sed continua partium simplicium successione, necesse est sphaeras illarum partium delatrices ita moueri, ut motus illi non sint casuales aut fortuiti, sed ordinati & regulares, id quod ex ordinata & similiter sese habente centrorum coloratione, densatione & rarefactione, item Macularum augmentatione & diminutione, satis colligitur. Vnde varia exsurgunt dubia, qualisnam ille sphaerarum partes centrales deferentium motus existat? super quos polos, & secundum quos circulos, maximos an non, maximos? quantæ celeritatis motus ille sit? Et motum quidem totius sphaeræ eiusmodi particulam deferentis esse Soli homocentricum suppono cum ipsis, qui sphaeras & motus istos excogitant, & probatur etiam ex ipso Phænomeno; quia alioquin multæ contra Phænomenon anomalie contingerent, illa inprimis, quod plurimæ Maculae non tantum in

II.

inæquali sed etiā nimis magna à Solis centro remotione enascerentur: cui tamen locus illarum verus reclamatur. Porro plurimas Maculas in nimis magna à Solis centro remotione exorituras, ex data vnius sensibili excentricitate, inde constat; quod tota Maculae excentrica sphaera sit excentrica & impenetrabilis. Dato ergo Maculam datam versari in perihelio, id est, puncto Soli viciniissimo; necesse est, aliam quampiam Maculam in Aphelio seu puncto opposito versantem, (id quod frequentissimum est dum vna oriente altera circa occasum versatur) à Sole nimis remotam incedere. Nam data vna sphaera excentrica, reliquæ omnes circa ipsam etiam excentricæ erunt, seclusa corporum penetratione, &c. in diuersis autem sphaeris non tantum Maculas sed & partes illarum singulas ferri, in hac sententia concedendum est. Motum porro hunc centralium partium fieri secundum circulos maximos, suadet probabiliter ipsa proportionalis Maculae circa centrum augmentatio & vicissim diminutio; quantus autem sit, & quæ celer, diuinandum potius quam statuendum est. Etenim sensibilis extra Maculam portio, ab eadem discedens, vel ad eandem accedens, nulla visitur, teste Phænomeno, vnde accedentes vel recedentes per motum localem, oportet omnes esse simplices & extra sensum.

Continuari tamen oportet in suo circulo per centrum Maculae incedente, per quod cum incedat etiam alter circulus similiter simplicem portionem circumducens, ipsa communis in centro Maculae intersectio, seu potius conuentio, facit semper partem compositam & visibilem.

Partis ergo centralis visibilis constitutio, est duarum aut plurium partium non spectabilium, sed simplicium illuc per motum localem communis collocatio, ut sic vna alteri superaddita, opacitatem augeat, & oculo conspicabilem reddat: & quia istæ simplices partes in perpetuo transitu per motum localem versari ponuntur; necesse est, centrum Maculae cuiusvis idem quidem esse situ & positione, respectu Solis, non autem rem quæ centrum Maculae per

I.

per transfennam occupat, sed materiam
semper aliam atque aliam, quia tamen
eiusdem densitatis omnes existunt, id-
circo similem semper intensiorem in
communi sectione referunt. Necesse
deinde est, in Maculis durabilioribus,
quales reduces cumprimis sunt, eius-
modi partium successiorem maiorem
esse factam, quia tempore longiore ma-
ior fit motus, & mobilium plurium
translatio, si motus æquabilis ponatur.
Vnde fieri posset, ut eadem simplices
partes rediissent, &c.

Cum autem duo circuli maximi in
sphaera se necessario bifariam secant in
oppositis partibus, fieri deberet in eius-
modi casibus, ut in opposita centri se-
ctione, etiam centralis Macula pars e-
xisteret, & in conspectum caderet. idem
eueniret, ubi diuersarum Macularum,
circuli & segmenta circulorum centra-
lium in se mutuo incurrerent. Nam
simplex centri portio, cum simplici vel
simplicibus pariter concurrens, compo-
sitam adeoque visibilem facit portio-
nem.

Quæ autem de constitutione centri
visibilis dixi, eadem simili proportionem
applicanda sunt ad aliarum partium cir-
ca centrum consistentium compositio-
nem. Nam quæuis illarum aut simili
quiete, aut simili motu locali, per com-
munem apparentem circulorum partes
illas deferentium intersectionem est co-
stituenda.

Ex hisce tanquam tumultuarijs rudi-
mentis præmissis, oportet ulterius ape-
rire, quid ad propositam nostram in-
quisitionem possit pro veritate afferri.

Dicendum Primo. *Distia centralis
Macularum compositio Phænomeno so-
lari conueniens non est, siue per motum
siue per quietem acquiri & stabiliri po-
natur.*

Ratio, quia ut ex dictis satis habe-
tur, singulis partibus visibilibus singu-
læ ut minimum attribuendæ essent sphæ-
ræ, ad euitandam implicationem motuū
& corporum penetrationem; & sic sin-
gulæ Maculae, singulis se totis aut essent
viciniores aut remotiores à centro So-
lis, quod utique in sensum caderet, præ-
sertim in magna Macularum solarium
multitudine, quæ aliquando simul nu-
merum sexagesimum excedit. cum igitur

II.

1 tur centrum cuiusque in propria sphæ-
ra existat, oportet duo extrema inter
se tantum dissidere, quantum reliqua
intermedia interualli occupant, quod
5 utique est spatium amplissimum, tam-
etsi singula per se sensum quodammodo
effugiant: tanta autem centrorum in-
ter se & à centro Solis discessio, non in
longum aut latum, sed secundum pro-
10 fundum, est simpliciter stanti Phæno-
meno impossibilis. Quod si nuda &
simplex centrorum positio hanc phan-
tasiæ non patitur, quid fiet si multi-
plex singulorum & conglobatio secun-
15 dum totius Maculae profunditatem su-
peraggestio consideretur? exurgent ni-
mirum in Sole moles insuetæ profundi-
tatis, & Macularum marginalis graci-
litas pessum ibit, motus irregulares co-
20 surgent; Macula Maculam teget, & mo-
do anteibit, modo sequetur. vno ver-
bo falsa infinita contra Phænomenon
euenient, &c.

Dicendum secundo. *Eadem centra-
lium partium compositio Phænomeno so-
lari conueniens non esse per dictas sphæras
duras, propter repugnantiam motuum
& mobilium.*

Etenim dum aliæ partes fiunt aliæ
30 deficiunt, aliæ statum obtinent, aliæ
intenduntur, &c. hæc autem omnia &
singula requirunt motus, circulos &
sphæras diuersas, & sic in diuersas sen-
sibiliter à centro distantias reciditur,
35 quæ secundum veritatem Phænomeni
non dantur.

Dicendum tertio. *In eandem impos-
sibilitatem incurreretur, si partes Macu-
larum centrum circumstantes consideren-
40 tur; etenim cum singularum motus sit
vel ad centrum, vel à centro, singula
quoque partes sphæras sibi singulares
vendicabunt.*

Motus enim isti in vna dura sphæra
45 sunt impossibiles: nam vna parte
sphærae rigida mota, mouentur omnes,
igitur si vnum ipsius punctum ad vnum
Maculae datæ centrum accedit, alia trās
consistentia recedent, cuius tamen co-
trarium deberet fieri secundum Phæno-
menon, quia Macula augetur circa cen-
trum simul vbique proportionaliter,
partes igitur accedunt motu locali ex
hypothesi; qui motus cum fieri nequeat
55 in vna sphæra, necesse est tot admitti
quot

I.

quot sunt partes minimæ sensibiles, & sic iterum excrescit multitudo & altitudo diuersarum sphaerarum: & manet prius argumentum de Macularum sensibili à centro Solis accessu & recessu.

Dicendum Quarto. *Eadem Macularum solarium per duras sphaeras circa Solem mobiles collectio Phænomeno consentanea improbat, ex inaequali eandem congregatione inaequali statione, & inaequali dissipatione.*

Nam aliquæ celerrimè augescunt & valde amplificantur, aliquæ tarde neque multum, aliquæ veluti sibi æquales semper manent, &c. motus autem celeres & tardi, non sunt eiusdem sphaeræ, cæteris paribus. Vnde fit Maculas diuersas colligi à diuersis sphaeris. ergo se totis diuersimodè à centro Solis aberūt; quod rursus praxis & experientia Phænomeni non patitur.

Dicendum Quinto. *Localis ista Macularum congregatio & dissipatio non consistit, propterea quod ipsarum eodem tempore intensio cum extensione; remissio vero cum diminutione fiat.*

Certum enim est ex assidua Phænomeni obseruati praxi, Maculas nigrescentes augeri; albescentes imminui. Quod si ipsæ fierent, dicta particularum comportatione, certum est, ipsas ad nigredinis decrementum amplificatum; ad eiusdem augmentum, mole corporis apparente, imminutum iri. Quæ cum falsa sint, persuasio ista vera esse non potest. Sed hæc ratio, etiam alibi tractata est.

Dicendum Sexto. *Si ex allegato partium concursu Maculae fiunt & augentur, debent ipsæ æque circa Septentrionem & Austrum fieri, atque circa ortum & occasum.*

Nam ipsarum in omnem loci differentiam augmentatio & diminutio, requirit sphaeras & circulos quaquauerus mobiles, & consequenter vbique partium simplicium concursus maculosos: hoc autem cum non fiat; patet neque motus istos per tales sphaeras accidere.

Dicendum Septimo. *Si daretur eiusmodi Macularum per circumpositos orbes mobiles duos generatio, daretur quoque Facularum per meram Solis transluceniam.*

II.

Nam sicut Maculae gignuntur interposito & confluxu partium densarum, ita Faculae rararum occursum nascuntur: hoc autem impossibile esse, demonstrauimus in prioribus per sphaeram fluidam Soli circumdatam, ex qua omnia argumenta huc multo amplius applicantur. Et hoc solum argumentum dictas sphaeras sufficientissime euerteret.

Dicendum Octauo. *Propter Maculas in medio Facularum enascentes, & augescentes tam intensione apparente, quam extensione; item propter crescentes simul circumlucentes faculas, fieri nequit, ut hæc motu locali contingant.*

Nam partes Maculosæ aut debuerunt per plagas Faculis luculentas transportari, id quod falsum est, fuissent enim animaduersæ: aut supernè descenderunt in margines Maculae inclusæ, & hoc non, quia orbes harum partium baiuli nec essent homocentrici ad Solem, nec extra eundem vndique, sed intrarent penetrando; aut tandem à centro Maculae inclusæ, quaquauerus localis partiū dilatatio fieret, & hoc non, quia augmentandi modus iste repugnat Phænomeno, nam hæc Maculae exsinuatio, meditullium eiusdem attenuaret & rarefaceret, cum contrarium semper eueniat, crescente enim Maculae amplitudine, semper quoque crescit opacitas, testante Phænomeno. Taceo nunc istos motus desiderare sphaeras diuersas veluti infinitas, quæ altitudinem seu profunditatem Maculae Phænomeno intolerabilem efficerent. hinc ergo manifestum est, per motum localem, istiusmodi apparentiam defendi non posse: quod amplius elucescit, ex ipsarum Facularum circumstantium ampliacione tam secundum locum quam lucem, nec enim ratio, neque mens capit, vnde per localem motum partes diaphanæ illuc transferrentur, & quo Maculosæ abirent.

Confirmatur hoc idem per enatos & auctos intra suas Maculas subalbidas nucleos grandes, atros, quorum materia opaca transferri non potuit ad medium vndique, nisi peruasus extremis exterioribus, quod tamē reclamatione Phænomeno, tincta enim fuissent aliqua nigredine sensibili. Imo cum nuclei vndique ambiuntur tenuiore illa massa, etiam versus nos circumflua, non apparet

I.

ret quomodo augeri possit, non admittit corporum penetratione, non igitur ista fiunt per solum motum localem & sphaerarum durarum circumpositionem.

Dicendum Nono: *Propter Faculas in medio Macularum aut nucleorum repente effulgentes, & continuis cursibus perdurantes, eadem durarum sphaerarum mobilium hypothesis locum non habet.*

Quo enim & per quem motum abiit portio illa nigra in medio? unde & per quem motum successit pars illa diaphana?

Dicendum Decimo. *Quandoquidem è Phænomeno solari passim Faculae margini seu horizonti solari vicine, in unam continuam optice constantur, euanescentibus intermediis umbris, necesse est, umbras illas ipsis Faculis centro Solis aliquanto viciniores esse.*

Faculas igitur tales per transparentiam Solis eluxisse, est impossibile, in hac enim durarum sphaerarum suppositione, omnis Facula debet esse interior, & omnis Macula etiam secundaria, seu umbra, exterior. cuius tamen contrarium dat ipsa Phænomeni praxis.

Tandem Undecimo & ultimo, dato etiam sed non concesso, quod per huiusmodi duras sphaeras, per partium inuisibilium concursationes, Macularum apparentiam aliquatenus defenderentur, (quod tamen suppositis Phænomeni apparentijs) toto caelo repugnat; consideret quisque veritatem inquit, an hac philosophandi ratio solida sit, quando neque sensus ullus, neque ratio aliqua probabilis manuducit, id quod placet idcirco tantum astruere, quia vel ab aduersa parte euentibus rationibus non destruitur, vel aliqua verisimilitudinis specie fieri aut esse posse non efficaciter probatur, sed proterue tantum asseritur: contrarijs veritatibus procul esse iussis, siue eas rationibus euentibus, siue experientijs palpabilibus, siue auctoritatibus omni exceptione maioribus probes siue non. hac inquam philosophandi ratio secundum Logicæ præcepta non valet; potest esse, ergo est, ergo esse tenendum & statuendum est: contra licet ratio, sensus, & omnis auctoritas militet. Sed abjungo, & nugæ serio refutare desino.

Ellebis philosophandi ratio, à posse ad esse.

II.

ne & ipse nugator à prudente Lectore censear: isthæc autem fusius aliquanto prosecutus sum, non quia materiae dignitas aut argumenti grauitas id postulat, sed quia temporum iniquitas & imperitorum conditio ita exigit: sunt enim qui ex hoc ignorantia asylo, & veritatem & hoc Solis Phænomenon vehementer infestant, arbitrati se veritatem patefecisse, si tuta comminiscendi latibula inuenerint. Hæc ergo nugamenta à me serio tractanda & refutada fuerunt, ut ludicra è manibus crepundia extorquerem, & huius Phænomeni ignaris, ne ab imperitis sed audaculis deciperentur, sedulo cauerem.

MACULAS ET FACULAS generari & corrumpi, confirmatur ex ipso incipiendi & desinendi ipsarum modo.

CAP. LIV.

QUANTOQUAM hæc res ex Observationum Imaginibus, illarumque explicationibus, libro priore passim in ipsa praxi est sæpius inculcata; hic tamen eandem breuiter collectam adduco, ut occasionem studioso Lectori præbeam, in hoc Phænomenon ardentius inquirendi.

Qui Phænomeni huius sedulae investigationi operam nauabit, is absque ulla dubio repentinas & antè non præuissas Maculas & Faculas sæpenumero admirabundus aspectabit, easque non ad ortum aut occasum, sed circa medium Solis intuebitur, ideoque disquiret secum, unde aut quo modo huc peregrini hospites tanti aduentarint, nullo introitus sui præmissio indicio! Hæc cogitatio cum me diu & sæpe suspensum tenuisset, & exordia illarum indagatu difficillima probe pernouissem, ex eo, quod Sol Maculis secundarijs seu Umbris tenuibus refertus, nullum certum Macularum indicium præberet, inui aliam viam, & quia Maculas tandem omnes in Umbras & Faculas desinere experimentis quotidianis didici capere diligentissime illarum fines atque interitus contemplari, ut deinde initia atque natiuitatem fortassis similem reperirem

Macularum initia obseruatu difficilia.

I.

rirem. & sane conatui laborique im-
probo, successus perbenignus respon-
dit.

Nam ex modo illarum, quo deficiunt, in cognitionem incæptionis earundem satis luculenter deueni, illasq. nascituras indicijs haud obscuris prænotare didici. Modi autem quibus disparent sunt isti.

*Maculariæ
varij desinē-
di modi ex-
plicantur.*

Aliquæ Maculæ decreſcendo mole,
attenuantur ſimul in umbram ſubtiliſ-
ſimam, ita vt tandem ipſam à reli-
qua Solis ſuperficie non poſſis diſcer-
nere, niſi agitatione. inſtrumenti, &
tale quandoque umbratile veſtigium
durat per vnum aut plures dies, quan-
doque cito euaneſcit penitus; & ali-
quando comitante, aut ſubſequentē
fiunt hæc Faculæ; aliquando ſine Fa-
culæ omni.

Quòd nisi Maculam antecessisse pro
certo nouisses ipsius præteritæ vesti-
gium esse, assueuerant edicere vix au-
deres.

Aliquæ Maculæ, quando sunt in tenuem & æquabilem vmbra attenuatæ, hanc ipsam deinde resoluunt in Maculas minutas, discontinuas, punctorum instar, ita vt inter ipsas reliquæ solaris superfiei spacia elucescant, & quando ista in paruulas Maculas discretio est facta, nihilominus progrediuntur ordine suo, per vnum aut plures aliquando dies, idque diuersimode.

Nam sæpe omnes sensim postea,
more aliarum evanescunt in Faculas,
aut communem Solis superficiem; sæ-
pe aliæ citius, aliæ tardius in alteru-
tras degenerant: sæpe vnum quendam
tractum faculentum post se relinquunt;
nonnumquam umbrosum quoddam &
informe vestigium, sine notabili Facula
reliquum faciunt.

Accidit etiam vt dilatatae in vnā
continua vmbra redeant , ad v-
num alterumve diem , postmodum
denuo seiunctae dictis modis intereant :
fit etiam vt alijs euanescentibus , quā-
dam illarum reualeſcant , & in nouas
Maculas excrescant : imo , eadem ali-
quando , post vnus vel alterius diei
disparitionem , iterum comparet , ita
reciprocae apparent quodammodo lu-

II.

1 Etæ, cum natura nihil sit, quod in
statu suo sese conseruare non stu-
deat, nihil quod ab interitu non ab-
horreat.

5 Nihilominus tamen , omnes tan-
dem Maculæ definunt, vel in Facu-
las , vel in communem Solis super-
ficiem , vel saltem in obscura quæ-
dam umbrarum vestigia , quæ ipsa
10 tandem etiam evanescent, & aut in
Faculas , aut communem Solis su-
perficiem conuertuntur: nisi velis in
circumstantem æthera dissipari.

15 Aliquæ demum Maculæ, videntur
quodammodo materia vndique luci-
diore sensim obrui, & illa augescen-
te ipsæ decrefcere, donec ex obscu-
ro nil amplius residui fiat, sed lu-
culenta Facula ardeat, aliquando
20 pura, aliquando vestigijs quibusdam
nebulosis, vel vndique, vel ex parte
vallata.

Et huiusmodi Macularum defitiones sunt satis frequentes, & in hoc à prioribus differunt, quod illæ maligna ista luce non respergantur, sed Macularum nigredine sincera eaque semper remissione manente deficient. Istæ autem totas Maculas, etiam adhuc nucleis factas, & satis corpulentas, lumine perfusas aspectui adimant, donec paulatim omni opaco absorpto, in Faculas illustres abeant.

35 Et ne quis hanc transmutationem
possit adscribere Macularum ad vi-
sum positioni, dedi operam singu-
larem, vt inquirerem, an hoc cir-
ca horizontem tantum, vel in alijs
40 quoque solaris disci locis accideret; &
post accuratam indaginem, comperi id
in quauis Solis parte indifferenter fie-
ri, itaque statui mecum, tribui hoc
debere peculiariter Macularum defi-
15 tioni.

Et sic omnes tandem Maculas,
aut in Faculas, aut in ordinariam
Solis superficiem, aut in vmbra-
tia Macularum vestigia, immediate,
50 eaque tandem in Solis superficiem,
vel certe in ambieno conuerti, vide-
tur ostendi ab hac ipsa Macularum
evanescentia.

5 iam cognitis hisce , applicavi ani-

M m m mum

A good deal

*Macula à
luce fecula-
ri absorptæ.*

I.

num ad ipsarum inuestiganda initia, & plane similes exitibus introitus deprehendi.

Modus Macularum principia tenuia umbrosa agnoscendi.

Nam ortuarum Macularum multarum quasi prænuncias tenuissimas umbras animaduerti, telæ aranæ instar in superficie Solis expansas, folius instrumenti agitatione notabiles; quæ deinde processu temporum & dierum pedetentim spissiores effectæ, & in Maculas adactæ, conspectum stabilem tulerunt, & ob hanc causam cuiusque observationis initio, totum Solem in circulo observatorio lustro, & motu instrumenti pertento; si quam umbram nouam aduerto, & in spem consecuturæ Maculæ deuenio, illius locum & magnitudinem, atque figuram consigno, raritatemque & densitatem, uniformitatem vel difformitatem scriptis annoto; & hac via multarum Macularum primas origines affecutus sum: quanquam inficias non eo, meras etiam umbras à me sæpius esse deprehensas; quæ proinde in nascendo & denascendo Maculas primarias anteuertunt. nam stabili duratione non diu hærent.

Postea eodem modo, inueni minimas Maculas inter se discretas ebullire, & sensim dilatatas vnâ contiguam facere, augeri, stare, denuo imminui, & simili ratione deficere, &c.

Tandem plurimas multa cum luce, loco Solis quocunque in via regia exoriri conspexi, ita vt initio merissimas sæpe Faculas, cum dubijs umbris notarem, &c.

Et sic experientia stabili comperi, Macularum ortum physicum, esse occasui geminum, & sicut in locum Macularum consumptarum Faculæ succedunt, ita è medio Facularum procedere Maculas, vsu frequenti didici. Exemplum in obseruatis, & notis obseruatorum passim occurrunt, libro priore.

Quod si cui hæc fabulosa videbuntur obseruet, & veritatem adipiscetur, qui mihi asserenti noluit habere fidem.

Notandum primò. Omnia istarum generationum semina valde initio esse exigua, & extensione & intensione, ita vt visum fere effugiant.

Notandum secundò. Augmenta ipsarum, tam secundum extensionem

II.

quam intensiorem esse quidem continua successiua, celeritatis tamen diuersæ; nam aliqua Macularum indicia, per dies maturantur, aliqua in horas augescunt, & spacio medijs diei aut breuiore in Maculas conformantur.

Notandum tertio. Quemadmodum Faculæ Maculis sunt longè instabiliore, & notatu difficilior, ita si eæ puræ sunt, illarum origines præuideri vix posse aut solere; aduertuntur quando iam lucent, sed & desitiones illarum, non vt Macularum discernuntur. Ratio, quia cum Maculæ semper aliquid obscuri præ se ferant, à lucido discriminantur facilius, quam ipsum lucidum, à lucido, propter similitudinem qualitatis.

Notandum quarto. Faculas è Maculis creatas, plerumque esse Maculis suis maiores; tamen aliquando minores appareant.

Notandum quinto. Hæc reciprocas & quasi circulares Macularum & Facularum generationes, non esse ita intelligendas, quasi continuo tractu, & perenni veluti catena connectantur, ita vt quando ex vna aliqua Macula fit Facula, ex hac procreata Facula, rursus noua emergat Macula, quæ aliam deinceps Faculam pariat, & sic in infinitum; non est inquam, iste sensus, nec ista generationis reciprocatio: alioqui via Solis regia aliud modo nil esset, quam continua Macularum & Facularum primariorum congesta farrago: sed hic est dictorum sensus. Quando Macula aliqua in Faculam transit, illa Facula durat quamdiu ratio subiectæ materiæ patitur; qua absumpta in formam communem superficiem solaris sese recipit; aut, quod quandoque sed rarius fieri posse existimo, in alterius vel Faculæ vel Maculæ naturam, accedente noua materia, aut dispositione, &c. traducitur; vel in ambiens dissipatur.

Ex his autem hætenus explicatis, arbitror quemuis cordatum virum, Physices cælestes amatorem satis superque intelligere, has tantas mutationum vicissitudines, non posse esse à solo motu locali, ex sola condensatione & rarefactione, aut alteratione alia, sed vltiora mutationum sub-

I.

subsidia; pro sufficiente Phænomeni apparentia tuenda admittenda esse.

Cum præsertim certo constet, in materia quæ ante maculosa in faculam ampliorem transiit, acquisitum esse principium lucis internum, & quidem maioris quam sit in reliquo Sole.

D E

PHÆNOMENI SOLARIS LOCO VERO.

Ex observatis hætenus & ostensis de

Phænomeno solari, in unum aspectum

recolliguntur potissima argumen-

ta, quibus Macularum &

Facularum solarium

in Sole locus verus

comproba-

tur.

C A P. L V.

ARGVMENTVM PRIMVM EX

nulla Parallaxi.

SI Maculæ solares respectu Solis, omni diuersitatis aspectu carent, utique in Sole inesse censebuntur: atqui illas respectu Solis

omni aspectus diuersitate carere, constat ex observatis diuersorum hominū, in regionibus diuersis & à se multum distitis, partim superiore Libro propositis, partim hic indicandis.

Nam primo, in diuersis locis secundum septem, & octo gradus latitudinis, exempli causa, discrepantibus, sunt earundem Macularum iisdem cursus sine vlla diuersitate declinationis in Austrum aut Aquilonem expositi. Secundo, in diuersis locis, secundum longitudinem quomodocumque distitis, Maculæ horizontales, in horis quibus ex natura sui cursus sunt secundum longitudinem Solis ad sensum quasi stationariæ, observantur & inveniuntur eodem prorsus loco; Tertio, in iisdem sunt aliquæ observationes factæ, quæ in idem tempus & eundem Solis locum incidunt; Quarto, plurimæ vero, quæ licet horis discrepent, in expositione tamen cursus totius in disco Solis observatorio, iuxta cuiusque exactissi-

II.

1 mum computum, nullam sensibilem patiuntur varietatem, sed loco omnino proportionato collocantur. Manet igitur probatum, id quod in Minore assertum erat. Ergo Maculæ in Sole inesse, censendæ sunt.

Et confirmatur à fortiori: Quia hoc ipso, quod aliqua noua stella, omni parallaxi carere demonstratur, respectu firmamenti, in ipso inesse ponitur, consentiente omnium Astronomorum praxi & iudicio.

Dices, ex hoc argumento plus non probari, quam Maculas à Sole non distare tantum, ut aliquam sensibilem parallaxim creent, & ex hoc plus non posse inferri, quam Maculas à Sole sensibilibiter non abesse, respectu nostri in terra constitutorum, tametsi fieri possit, ut ex parte rei à Sole multum absint, id autem sentiri nequeat, propter diametri terrenæ, ad maximam Solis distantiam, insensibilitatem.

Respondeo. Diffitendum non esse, vim obiectionis huius non esse inanem, vel dissimulandam; nihilominus tamen ex eo, quod Maculæ respectu Solis, siue Apogæi, siue Medij, siue Perigæi, omni semper sensibili parallaxi careant; habeo hoc, Maculas à Sole non posse abesse tantum, quantum abest ab eodem Luna, quantum Venus, & Mercurius perigæi.

Quia cum Venus Perigæa secundum Tychonem, quem præ reliquis hic sequor, distet à terra semidiametris terræ 255. eius parallaxis horizontalis est, 13'. 29".

Mercurij vero Perigæi distantia est, 40 est, semidiametrorum terræ 585. parallaxis horizontalis 5'. 53".

Luna Apogæa, distat à terra semidiametris 61. & patitur parallaxin horizontalem 56'. 21".

45 Solis autem Apogæi distantia à terra est semidiametrorum terrestrium, 1182. 56. & parallaxis horizontalis 2'. 55".

Igitur si ab hisce parallaxibus auferamus Solis Apogæi parallaxin, remanebit inter parallaxin horizontalem solarem & eam quæ est Mercurij Perigæi differentia mint. 2. secund. 58. quæ est Veneris Perigæi, 10. 34", quæ

M m m 2 est

Obiectio.

Solutio.

I.

est Lunæ Apogææ, 53'. 26". Vnde sequitur manifestè, si solares Maculas, ponamus in dictorum locorum aliquo versari, ipsas in Sole oriente aut occidente conspectas, similem parallaxim passuras, adeoque futurum, vt verus illarum locus non sit is, in quo ego ipsas in Sole conspicio, sed longe alius, in què nimirum linea è centro terræ per Maculæ centrum emissa caderet. Et in tali casu, Macula in Cælo Mercurij posita, è loco suo eijceretur quinta quasi parte semidiametri solaris, quæ in circulo obseruatorio, si Macula in horizonte solari versari intelligatur, efficeret cursus ordinarij tres integros dies, in medio vnum cum parte tertia, in spatijs intermedijs, occuparetur interuallum duorum dierum, plus vel minus, prout Macula plus vel minus ab horizonte distaret in solari circulo.

Macula vero similis in Perigæo Veneris constituta, è loco vero eijceretur ad sex circiter dies, in horizonte Solis conspecta. Et locus ipsius verus esset circa medium Solis.

At vero reposita apud Lunam Apogæam, si à me in Sole vbicunque tandem, circa orientem vel occidentem Solem reperiretur, locum verum omnino extra Solem haberet, eo quod differat parallaxis Lunæ Apogææ, à parallaxi Solis Apogæi minutis primis 53, secundis 26". quæ faciunt solarem diametrum vnam, & 23'. 26". si ponatur ea minutorum primorum triginta.

Et in hac positione discrimen vigintitriū dierum secundum ysitatum Macularum currendi tenorem intercederet, itaque qui Maculam in vertice haberet, dum ego illam sub ortum aut occasum Solis in plaga eiusdem horizontali viderem, is de eadem nil penitus in Sole conspiceret, & si in simili Solis loco illam vellet reperire, tribus ante hebdomadibus fieri debebat. Itemque mihi, tanto etiam ante tempore, conspicienda fuisset in meridie, in quo Parallaxis maxima ex parte cessat, &c.

Sed instabis fortassis, ista quidem ex istis planetarum à terra distantijs sequi, si Maculas cum ipsis ponamus: ex obseruatis tamen non constare,

II.

1 nullas parallaxes Macularum in locis semidiametro terræ aut vltra diffitis intercedere.

Et ita fieri posse, vt etiam si in locorum 5 vicinia parallaxis nulla habeatur, in maximis tamen terrarum distantijs, omnino aliqua inueniatur. Vnde enim constat, Maculas Solis in eodem semper Solis loco vbique terrarum simul & 10 semel conspici? quis hæc in tantis interuallis terrarum obseruauit?

Respondeo primo. Etiam si ex locis valde seiunctis obseruationes nullæ produci possent, viciniora tamen 15 satis persuaderent, Maculas in remotis quoque locis omni parallaxi probabilissimè carituras, si quidem in minus, sufficienter tamen remotis nullum ipsarum parallaxium indicium præberetur: 20 id quod in præsentī casu fit.

Nam Friburgum, verbi gratia, Brisgoiæ, Roma non multum distat, gradibus videlicet octo, minutis quinquaginta, plus minus, & tamen si cogitemus in circulo maximo per verticem vtriusque loci traducto simul 30 obseruari aliquid cælitus in cælo Lunæ existens, variabit illa rei visæ à terris distantia, locos visos ad octo eoque amplius minuta. Quæ diuersitas aspectus est magna, in tantillo locorum interuallo, & rei visæ supra Horizontem tanta altitudine, quæ esset octuaginta sex graduum circiter.

35 Octo autem minuta in Circulo obseruatorio, auferunt, vt minimum, dimidiam Solaris semidiametri partem, & circa extremos margines dies quatuor, circa medium vltra duos in cursibus Macularum abscindunt. 40

Quod si octo minutorum aspectus diuersitas ab interuallo octo graduum enata, tantum discriminis affert in locum alicuius Maculæ, profecto distantia locorum maiores, qualis est 45 inter Ingolstadtium & Conimbricam, graduum scilicet 20. & minutorum 20. plus minus, plus etiam operaretur; quod cum neque ibi, neque ex vllis alijs Europæ locis fiat, non est credibile in alijs totius orbis partibus, vel tantillum 50 parallaxeos intercedere. In dictis certe orbibus planetarijs non euenire, certum est, quia differentia illa etiam in Europa

I.

Europa, licet non in tanto excessu aut defectu, ob minora locorum interualla, certo fuisset animaduersa. Et ne Solis coniecturis agere velle videar.

Noueris mihi Macularum solarium fideles obseruationes ex vtraque India, Orientali, & Occidentali transmissas esse, ex locis Ingolstadio plus quam circuli quadrante distantibus; inter quas obseruationes non postremum locum occupant P. Gasparis Ruefs, pia memoria, Ingolstadij olim in Mathematicis discipuli mei, quem in Indias Occidentales pro infidelibus conuertendis abiturum, ad hanc rem singulari diligentia, vna cum Telioscopio & lentibus obseruatorijs instruxi; is igitur officio amicitiae egregie perfunctus, multas satis obseruationes, tam ad me, quam ad Patrem Paullum Guldin, Societatis idem nostrae Mathematicum ex orbe nouo misit: quas cum meis, & aliorum in Europa tempore eodem habitis curiose collatas, ad vnguem correspondere expertus sum, quarumque te, beneuole Lector, cum hisce participem effecissem, si ad manum fuissent; sed quia in Germania autographa asseruata, cum amittendi periculo, huc auocare nolui, vna mecum patienter feres, donec occasione fortassis opportuniore cum pluribus alijs tibi olim gratificer.

Neque solus ego sum, qui varias Macularum Obseruationes collegi, fecerunt alij similia, vt Parallaxin inde vel approbarent vel reijcerent. inter ceteros ita ad me perscribit Duaco, Pater Carolus Malapersius, anno 1625. die 3. Aprilis.

„ Habeo itidem Obseruationes Co-
„ nimbricae habitas, à Patre Gulielmo
„ VVely, ab anno 1620. ad 1623.
„ quas mihi communicauit, contuli
„ plurimas cum meis, quae exactissi-
„ me congruunt: sicut & ante aliquot
„ annos Calissio in Polonia alias acce-
„ pi, quae itidem congruebant. Seruo
„ omnes Obseruationes iam plurimum
„ annorum, & illas item quas ab ami-
„ cis accepi. haec ille.

Porro Patrem Gulielmum VVely in Portugalliam discessurum Ingolstadij ego modum obseruandi docui, & rogavi vt pro indaganda parallaxi diligen-

II.

tes obseruationes efficeret, quemadmodum praestitisse, modo ex teste oculato satis percepisti.

Galilaus Galilaei, in epistola sua, anno 1612. die 14. Augusti ad Marcum Velsrum perscripta, Historiae suae pagina 56. eadem ex suis & alienis confirmat: ad quem Lectorem remitto.

Exempla autem domestica plurima, producta habes libro Tertio Imaginibus Obseruationum

I V. pagina 171.

V. pagina 173.

VIII. pagina 177.

IX. pagina 179.

X. pagina 181.

XII. pagina 185.

XIII. pagina 187.

XV. pagina 191.

XVI. pagina 195.

XVIII. pagina 199.

XXVI. pagina 217.

XXXVI. pagina 247.

XXXVII. pagina 249.

XXXVIII. pagina 251.

XXXIX. pagina 253.

XL. pagina 257.

L. pagina 283.

Item in duabus Appendicibus ad Imagines XXIII. XXIV. pag. 227.

In hisce igitur & pluribus non citatis Imaginibus inuenies non tantum Maculas, sed & Faculas obseruatas in diuersis locis sibi congruere. Lege Notas meas, inuenies tempora cum temporibus, & horas cum horis collatas per bene conuenire.

Quod si discrepantia subinde aliqua in longitudinibus interuenerit, scias nonnulla calcographo, nonnulla typo & chartae, nonnulla obseruatorum conuiuetic, vel potius obseruandi difficultatibus, imputanda. Nam in longitudinibus semper citius, quam in latitudinibus deuiatur, ob motus diurni celeritatem, qui Macularum motui in longum, satis affinis est.

Respondeo secundo. Dictas parallaxes etiam sensum iri multo maxime in vno loco, mane, meridie, & vesperi, inque ordinariū & quotidianum Macularū motum tantum discriminis illaturas, quantum terrae semidiameter in dictis planetarum distantijs secum vehit, & ad hanc rem percipiendam, nil suppono,

M m m 3. quam

I.

quam dictas planetarum distantias, & quotidianum Macularum sub Sole aspectum: ad quam rem non parum conducunt, Maculae horis Solis vicinae, videntur enim stare. Igitur cum Maculae solares in tribus dictis temporibus ex eodem loco obseruatae, dictas in Sole aspectus diuersitates non patiantur, imo neque vllum illius diuersitatis indicium praebeant, consequens est, ipsas supra omnem Lunam, Venerem, Mercurium longissime exaltari.

Sol Perigaeus à Sole Apogaeo differt in Parallaxi horizontali minutis secundis 13'', in arcu circuli excentrici numeratis, haec autem in circulo obseruatorio rediguntur ad arcum minutorum 50', qualium vnus gradus est 60'. Reductio autem sic fit. Semidiameter Solis visibilis subtendat arcum minutorum 15'. Haec multiplicata per 60, dant 900''. Et quia hic arcus à linea recta sensibilibiter non differt, assumi potest pro sinu toto, quadrantis circuli obseruatorij. Si ergo fiat, vt 900'', ad 1000000, sinum totum; ita 13'' ad aliud, prodibit sinus 144444, cuius arcus est 50', numeratus in Circuli obseruatorij perimetro. Haec autem 50' minuta sunt sensibilia. Nam sinus reclusus istarum 50', in medio Sole ex vestigio itinerario alicuius Maculae occupat spatium & cursum duarum horarum plus minus, circa limbum, diei medij. quae diuersitas cum non accadat, necesse est Maculas, dum Sol Apogaeum infidet, altiores esse quam sit ille locus, quem Sol tenet, dum terrae vicinissimus existit. Et hinc necessario Maculae ex vi parallaxeos, in caelum Solis suscipiuntur. Et haec quidem parallaxis, quae Sol Perigaeus ab Apogaeo differt, duplicatur tempore eodem in locis integrae terrae diametro distitis; alteri enim Sol oriatur, alteri occumbet; vnde composita parallaxis esset 26''. ideoque Maculae horizontalis parallaxin vnus ferè diei efficeret: haec autem in sensum cadunt vel maxime: quae cum non fiant, euident est, easdem Soli viciniore esse, quam sit Perigaeum Apogaeo. Idem fiet in loco eodem, tempore diuerso, matutino nimirum & vespertino, diei vnus, &c.

Maculae propter nullam parallaxin in caelum Solis euehuntur.

Amplius dico, etià Maculas Soli vici-

II.

niores esse, quàm sit ipse sibi Apogaeo, in distantia media; cuius parallaxis differt à parallaxi Apogaei min. secundis 6'' circiter; haec autem offerunt in circulo obseruatorio sinum minutorum 23. Certissimum autem est, tanti spatij parallaxin in meis Macularum itineribus animaduersum iri, duplicantur enim simul, si Sol obseruetur in locis terrae diametro oppositis, aut in eodem loco mane & vespere; vnde eueniret è tali minutorum 20. parallaxi, vt aliqua Macula in horizonte solari conspecta, eundem pridem superasset, & ad meridiem, nec non vespere iter suum notabiliter praecipitaret: item quod aliqua Macula horis Soli vicina, Sole ad occasum tendente, extra ipsum repente exiret. quorum tamen nil vnquam fit: vnde necessarium est, Maculas supra mediam Solis ab Apogaeo elongationem ad eundem plurimum accedere.

Quin etiam, pauciora quam 5. Eclipticae minuta ego in itineribus Macularum pro certo sentiam, ad quod plurimum iuuat, si Circulus obseruatorius multum amplificetur, & tubi longi, seu vitra conuexa maiorum sphaerarum applicentur, hisce enim fiet, vt propter circuli magnitudinem etiam vnum secundum Eclipticae minutum sensibile in circuli obseruatorij semidiametro intervallo occupet: quae res, vti peculiaris & propria est huius instrumenti, ita nunquam satis deprecanda, vsum enim incredibilem ad rem Astronomicam affert: expertus loquor. sed ad hanc praxin, patientia, dexteritas & industria non vulgaris requiritur.

Et hucusque quidem sese vis & inquisitio Parallaxeos securè extendit, quod ideo vberius feci, vt Philosophis à me id petentibus, solidissima fundamenta in manus darem, quibus Maculas ex vi parallaxeos, supra Lunam, supra Venerem & Mercurium Perigaeos, in caelum vsque Solis, ad Aulam & Regiam ipsius euectas scirent, neque in sublunaribus, aut etiam subsolaribus regionibus, sed in sinu & gremio Solis ipsius quaerere, & dignas de ipsis pro Physica caelesti & veritate quaestiones suscitarent.

Cæterum hucusque de parallaxeos in hoc Phænomeno absentia disputata, con-

Qua ratione pauca minuta secunda calisolaris, in circulo obseruatorio sentiantur.

Maculae à Philosophis supra planetas Lunam, Venerem, & Mercurium, apud Solem sunt quaerenda in posterum.

I.

*Parallaxin
Macularum
nullam esse,
confirmatur
ex alijs ex-
perimentis.*

confirmantur etiam ex sequentibus.

Primo. Quando Sol omni Macula orbatur, id fit ubique in toto orbe, tempore penitus eodem: quod nullo modo fieret, si Macularum parallaxes respectu Solis acciderent.

Secundo. Quando Maculae novae exoriuntur, fit hoc ubique tempore & loco Solis eodem.

Tertio. Quando aliqua Macula centrum Solis aut Eclipticam occupat, fit tempore ubique eodem.

Quarto. Si cursus ex observationibus in ordinem digeruntur, semper fiunt similes, etiam annorum diuersorum, dum modo sumantur temporibus similibus & in iisdem parallelis.

Quinto. Nulla vnquam, à quoquam alicuius Maculae notata est in latitudinem sub Sole deuiatio, quod tamen in Macula qualibet deberet fieri quotidie circa meridiem, & praesertim illo tempore quando Solis locus Eclipticam supra horizontem mediat: tunc enim omnes Maculae in climatis nostris borealibus, reijcerentur in plagas Solis australes, in australibus versus boreales: horum autem nihil fit.

ARGVMENTVM SECVNDVM,

Pro sede Macularum in ipso corpore solaris figenda, desumitur ex ipsa apparente refractionis inaequalitate, in motu Macularum

per lentes obserua-

torias illa-

ta.

C A P. L V I.

HVIVS Argumenti vim profecutus sum fusè superius, ubi ostendi;

Primo. Apparentem illam in motu Macularum inaequalitatem non esse nisi ex refractione per lentes observatorias causata, & hoc multis efficacibus argumentis: inter quae contumacem conuincit, observatio sine lentibus perfecta, in quam cum ista inaequalitas non cadat, patet illam apparentem anomaliam, à Solis lentibus induci.

II.

Secundo. Ostendi, ablata vel per expositionem emendata & ad æquabilitatem tempori & apparentijs congruenter reuocata illa anomalia, motus in superficie Solis ordinatos & æquabiles prodire, tales nimirum, quales periodica Macularum reuolutio, ex Maculis etiam reducibus exhibita, requirit.

Tertio. Ostendi, in quacunque alia Macularum extra circaque Solem decurrentium positione atque hypothesi assumpta, cursus ipsarum tempori observationum coaptatos, semper irregulares, & debito ampliores futuros adeoque in certum aliquem ordinem nunquam redigendos.

Porro, cum Astronomi, per motus apparentes inuentos, semper inquirent motus proprios, ordinatos & si possunt, vlla ratione ad æqualitatem & regularitatem ipsos reuocent, commodamque ad id repertam methodum obuijs vlnis amplectantur; non video quid in hac nostra sententia difficultatis sit futurum cum Maculis in Sole positis, refractionisque ablato vitio, semper inueniatur motus ordinatus & regularis: positis extra Solem Maculis, Refractionisque anomalia ablata, semper sequantur cursus anomali & inordinati. Et vice versa, supposita Motus aliqua regularitate, ad quam tot correspondentibus sibi signis apertè ducit Phænomenon, Maculae in Solem necessario sint imponendae, nam extra nunquam acquireretur.

Hoc argumentum in rebus Astronomicis vim magnam habet. Quis enim credat, falsam assumptam hypothesin, omnibus apparentijs semper ad vnguem responsuram, qualis est nostra Macularum in Sole positio? & veram assumptam hypothesin, nunquam responsuram observatis phænomenis? id quod fit, in assumpta qualibet Macularum extra Solem positarum hypothesi?

Hanc igitur Hypothesin, in quam ipsum Phænomenon manu me deduxit, veram, & omnibus acceptam futuram, atque amplectendam esse, omnino iudico.

ARGVMENTVM TERTIVM.

Macula in Solem ponuntur beneficio Facularum.

CAP. LVII.

FACVLAS solares extra Solem non ferri probatum est multis rationibus luculentis passim. quæ si conuincunt, prout conuincere sanum intellectum, æquum est; sequitur continuo etiam Maculas extra Solem non abire. Quia ex obseruatis Macularum & Facularum in eodem parallelo tempore eodem delatarum cursibus, deprehensus est Motus idem & æqualis: quod nunquam fieret, si Maculae extra Solis superficiem vel tantillum abirent.

Nam Faculae illustriores Solis partes, eundem nunquam exeunt saluo tot annorum Phænomeno.

Vnde talem statuo syllogismum.

Si Faculae insunt Soli, insunt pariter Maculae.

Sed Faculae insunt Soli.

Igitur eidem insunt & Maculae.

Sequela Maioris probata est ex identitate motus vtrarumque; item quod in mutuos alteratae & mutatae locos eosdem sibimet succedant; quod mutuo semet occultent, &c.

Minor probata est, ex obseruatis & rationibus inde haustis.

Manet ergo Conclusio.

ARGVMENTVM QVARTVM.

Macularum circa horizontem vstitata

Gracilitas, easdem in Solem collocat.

CAP. LVIII.

ARGVMENTVM hoc plus habet, in recessu virium, quam prima fronte ostendat: prout bene expendenti manifestum euadet, si Macularum circa centrum Solis apparentium amplitudinem, circa horizontem versantium incredibilem tenuitatem quis considerauerit, in tantum, ut extrema ipsarum superficies, ne

1 dum centrale punctum, ab ipsa solari extremitate eximi atque liberari vix valeat. concinit huic gracilitati, cum figura ipsa Maculae gracilis in tenuem, 5 ad sensum lineam diductio, tum ipsa ibidem in horizonte solari, consistentis diuturna mora, & tandem correspondens sinus versus, & sinui verso arcus in circulo Solis obseruatorio assumptus, omnia enim hæc (dempta refractione) 10 motum in superficie Solis obtrudunt, dant enim arcus extremos medijs ad sensum æquales, &c. si cætera sumantur paria. prout copiose probatum est in superioribus.

15 Argumento huic, Maculis extra Solem eiectis, satisfieri non posse videtur. Quidquid enim dicatur, in Phænomeni contrariam aliquam apparentiam 20 incurritur.

ARGVMENTVM QVINTVM.

Maculae per examen interuallorum duarum Macularum, vel vnius

Maculae diutim progressæ, inueniuntur in Solis superficie.

CAP. LIX.

SI VE interualla ista assumantur in longum, siue in latum, siue mixtim; semper Maculae reperiuntur inesse superficiei solari: quod nequaquam posset fieri, si alteri sphaerae, solem ambientis inhaerent, atque in eadem circa Solem motu regulari cicerentur. Huius generis pericula feci quamplurima, exempla in prioribus multa adduxi.

40 Hoc argumentum omnino videtur concludere. Cuius fundamentum est apud Clauium in Sphaeram, cap. 2. pag. 353. editionis Romanae, anno 1606. ex Maurobyco, &c.

ARGVMENTVM SEXTVM.

50 *Macula cursu rectilineo incedentes, per parallelas è locis visis in Solis superficiem erectas, inueniuntur in eadem moueri, proportionalibus interuallis temporum & motuum.*

*Argumenti
efficax pro
Macularum
in Sole pos-
itu.*

*Macularum
gracilitas,
easdem à So-
le eximi nō
sinit.*

I.

II.

CAP. LX.

*Ex Motu
Macularū
rectilineo,
ipsa in Sole
inesse probā-
tur.*

HOC autem nequaquam posset fieri, si extra Solem seruata temporum & itinerum proportionem incederent. Et vicissim, cum in superficie Solis motæ, hanc harmoniam seruent, fieri nequit, vt extra ponatur. Hoc argumentum passim ex obseruatis multis exemplis est ostensum, & posset pluribus, fortassis erit, vt faciam.

Neruus huius argumenti, supposita Macularum in motu regularitate ad sensum, concludit.

*Argumentū
in forma syl-
logistica.*

Argumentum autem in syllogismum redactum est hoc.

Si Maculæ extra superficiem Solis regulariter in directum incederent, tunc impossibile esset vt in superficie Solis expositæ regularitatem motus rectilinei seruant: seruant autem: Ergo non incedunt regulariter extra, &c.

ITEM.

Si Maculæ in superficie Solis motum rectilineum regularem ad sensum seruant; non possunt cum eodem regulari motu extra poni: sed seruant in Solis superficie motum regularem rectilineum ad sensum. Ergo cum eodem extra poni non possunt.

ARGVMENTVM SEPTIMVM.

Maculas solares in Sole esse probatur ex itinere curuilineo quasi Elliptico.

CAP. LXI.

SI polus axem Macularum deferens in puncto Aequilibrij, siue summæ altitudinis semper hereret, & Maculæ in Solis superficie circumirent, palam est vestigium cuiusque in circulo solari relictum fore arcum verè Ellipticum; nunc autem quia ex occasu in ortum axis annuè retorquetur, polo suo circumcellum describens, (de quo proximè agetur) hinc fit, vt Macularum vestigia itineraria, ab Ellipsi ex parte rei deflectant quidē,

ita tamen parum, vt discrimen à curuitate Elliptica sensu quidem discerni nequeat, scitur tamen ratione, & plurium cursuum comparata successione. Hanc igitur curuitatem itinerum quasi Ellipticam in Solarem circulum à Maculis extra Solem positis eo modo proiectū iri, ac si à circulo in solari superficie descripto ac posito proueniret, est simpliciter impossibile.

Arcus insuper isti in æquilibrij, præsertim ex parte poli apparentis semper sunt maiores, quā dimidij Ellipseos, &c. quod impossibile est, vlli Maculæ cuius extra Solem positi, conuenire. Vnde impossibile est, Maculas hac stante experientia, extra Solem ferri.

Nam circulus quicunque maior, maximo solaris globi circulo, non potest projicere in eundem vllum Ellipseos arcum, dimidio secundum longitudinem æqualem. quia diameter circuli solari circulo maioris, est maior diametro circuli solaris, &c.

Hoc argumentum eludi non potest.

ARGVMENTVM OCTAVVM.

E curuilineis arcuum itinerariorum à Maculis descriptorum, proprietatibus, Maculæ in Sole esse comprobantur.

CAP. LXII.

SEgmenta cursuum arcuata, per Maculas vno semestri descripta, tali ordine & proportionem procedunt, augentur, minuuntur, curuescunt, & rursus in rectitudinem eriguntur, à circulo solari ita intersectantur, vt alteri sphaeræ quam solari aptari prorsus nequeant; ex quo plane sequitur, Maculas extra Solem neutiquam ferri. Nam si ferrentur extra, itinera alteri sphaeræ quam solari aptarentur, imo Soli coaptari nequirent. Itaque etiam ex hoc argumento fieri nequit, vt Maculæ extra Solē circumuolui stantantur. In specie hic non replico, sed tantum insinuo, quia in superioribus fuisse & minutim explanata.

Etiam hoc argumentum, obseruationibus suppositis, vim ineluctabilem intelligentiæ sanæ affert.

AR.

*Argumentū
ex magnitu-
dine arcus
itinerarij
apparentis*

I.

ARGVMENTVM NONVM.

*Ex interuallis diurnis unius cursus cur-
uilinei inter se comparatis, & aqua-
bilis ad sensum in superficie
Solis inuentis, Maculae
eidem inesse pro-
bantur.*

CAP. LXIII.

QUIA si non inessent, inter-
ualla diurna inter se non æ-
quarentur; æquantur au-
tem: Ergo Maculae Soli
insunt.

Sequela maioris ostensa est in prio-
ribus; minor constat ex expositis Ma-
cularum cursibus ubique obuijs, tam
meis obseruatis, quam tuis, si ita vis,
obseruandis, & debite ordinandis, &c.
Sequitur ergo Conclusio.

ARGVMENTVM DECIMVM.

*Beneficio Circelli polaris, Maculae sola-
res in Sole esse probantur.*

CAP. LXIV.

*Macula ex
eadem à po-
lis suis Mo-
bilibus di-
stantia, ne-
cessario in
Solem conij-
ciuntur.*

SI Maculae solares in Sole sunt, &
si in Sole circa axem & polum
quemcumq; tandem secundum
certum aliquem circulum in
extremitate globi solaris contorquen-
tur, tempore tandem quocumque, ce-
leritate aut tarditate quacumque; cer-
tum est, Maculam eiusmodi gyratio-
ne rotatam, à sui circuli polo semper
æqualiter distare, ponitur enim ipsa in
circulo certo circa axem è polo axis de-
scripto suam periodum absolueret. Cum
autem ex obseruatis constet, gyros quos
Maculae circulis suis describunt, in pla-
num solaris circuli proiectos, non offer-
re lineas plene ellipticas, sed nonnihil
ab Ellipsi exorbitantes, inde circuli in-
quo Macula circumcursabat, & conse-
quenter axis necnon polorum, mobili-
tas necessario colligitur. Cognito er-
go Circello, secundum quem vterque
polus axis mobilis decurrit, locoque po-
li mobilis apparente inuento, idque de
die in diem, (quotidie namque alius po-

II.

lorum mobilium locus in circulo solari
& obseruatorio insidetur) habetur ad
datum diem, & tempus diei, apparens
Maculae & Poli distantia in plano circu-
li solaris: ex hac deinde inuenta distan-
tia apparente seu visa, elicitur vera &
non visa, quam eadem duo puncta oc-
cupant in globosa seu sphaerica Solis su-
perficie. Vnde formo syllogismum ta-
lem.

Si Maculae in superficie Solis exposi-
tae eandem & æqualem semper pro-
noquoque cursu seruat à polis suis mo-
bilibus distantiam, ipsae utique veros suos
motus in eadem Solis superficie descri-
bunt, inque eandem sunt ab Astrono-
mis admittendae.

*Argumentū
in forma syl-
logismi.*

Atqui Maculae in superficie Solis ex-
positae, eandem semper seruant pro-
noquoque cursu à polis mobilibus di-
stantiam.

Igitur ipsae in eadem Solis superficie
suos veros motus describunt, & in ean-
dem ab Astronomis sunt admittendae.

Maiores sequela est clara.

Minor probatur ex obseruatis & fi-
deliter examinatis.

Sequitur ergo Conclusio.

In contrarium autem sic.

Si Maculae circulis extra Solem as-
sumptis, distantias à polis inæquales
fortiuntur, & motus in longitudinem
irregulares nanciscuntur; ipsae extra
Solem non sunt ponendae. prius fit. Er-
go posterius non est faciendum.

Examinaui singulos totius anni men-
ses, & Maculis in Sole positis cursuum
regularitatem semper inueni: extra po-
sitas, semper secutae sunt anomaliae.

ARGVMENTVM XI.

*Maculae è suo periodico reditu in Sole
versari comprobantur.*

CAP. LXV.

SI Maculae solares in superficie So-
lis essent, circaque centrum eius-
dem gyrarentur illae utique redi-
rent; sed non redeunt: ergo in su-
perficie Solis non gyrantur.

Ita multi passim arguunt, & hoc ra-
tioni-

*Argumentū
sophisticum
contra Ma-
culas in So-
le ponendas.*

I.

tiocinio, tanquam fune contentioso, incautis nescio quos nodos gordios necant, quibus neminem magis quam seipsum implicant, secumque caeco impetu ipsas Maculas & Faculas à Sole longissimè abducunt, & in cauos coecos tam Excentricos quam Epicyclos orbes, abdunt, ut hac ratione, aut nunquam, aut non nisi sero admodum, post finem forte Mundi, sub Solem redeant, nec si forte redierint, deprehendi facile aut agnosci possint; praesertim ob figuram interim, diuerso corpusculorum, ex quibus constant motu, disturbatam. Et per hoc Maculas & Faculas perennes opinione sua seruant: sed quam bene & quamdiu, patebit modo.

Argumenti fallacia designatur.

Nam dum aiunt, Maculas in superficie Solis circumlatas, esse redituras, non sequitur, nisi addant, Maculas incorruptibiles in superficie Solis circumlatas alioqui si generentur & corrumpantur, non est necesse ut redeant, possunt enim in altera Solis parte periisse: quæ admodum plerumque euenire, dubitare nequit, qui naturam huius Phænomeni intimius penetrauerit. Itaque ut sequela maioris robur obtineret, sic esset instituenda.

Si Maculae solares in superficie Solis circaque centrum eiusdem perennes vel diuturnae saltem gyrarentur, illae utique redirent: si, inquam tali modo propositio maior efformaretur, posset sequela aliquid indulgeri, suppositis supponendis ex ipso Phænomeno, nimirum ipsas tantum in longitudinem ferri, cum aliqua parua latitudinis variatione, ite totius Solis latitudinem Zona quadam media circumscriptam nunquam solere excedere, &c. his & similibus circumstantijs ex ipso Phænomeno desumptis, munita maior consistit. Nunc ad minorem; sed Maculae non redeunt.

Minor hac propositio, ut aliquid concludat vniuersalis sit oportet, hoc modo: Nullae Maculae redeunt. Qua data interim, sed non concessa, quid sequitur? Ergo nullae Maculae in superficie Solis circaque centrum eiusdem perennes vel saltem diuturnae gyrantur.

Hæc Conclusio, e datis præmissis admissa, quem ferit? neminem profecto. Nam plus non probat, quam Maculas in superficie Solis non esse perennes vel

II.

diuturnas, id quod nos aduersarijs ultro concedimus, imo ex instituto hucusque probatum obtrusimus: inde autem inferre; Ergo Maculae Solis absolute in superficie Solis non gyrantur; est fallacia ex adiacente secundo, ad absolutum. Maculae solares non sunt aut non gyrantur in superficie Solis perennes, vel saltem diuturnae; ergo absolute non sunt, aut gyrantur in superficie Solis.

Antecedente concessio, negatur consequentia: est enim manifesta & sophistica fallacia: & multo magis inde deducta Macularum & Facularum in regiones alienas violenta commigratio. Nam nisi probaueris Maculas & Faculas in ipso Sole stabiles aut perennes, nisi probaueris Maculas & Faculas nasci & interire non posse; aut solere: nihil facis, sed falleris & fallis; argumentum non stringit: ideoque frustra easdem à Sole liberas, frustra extra Solem in Excentricorum & Epicyclorum orbium nugacia ergastula & inscitiae Asylum compingis.

Nam etiamsi in Sole sint, fieri potest, & de facto fit, ut dissolutae non redeant: non ergo necesse est, ipsarum non reditum, per effectum, nulloque experimento, nullo sensu, nulla ratione suffultam, sed solo affectu ingestam ipsarum à Sole elongationem palliare; & imperitis falsis persuasionibus imponere. Quod ut ipso Sole multo clarius elucescat, resumo Minorem, eiusque vultum detracta larua penitus inspicio, erat autem hæc:

Sed nullae Maculae redeunt. Hæc Minor, inquam negatur. Et falsitatis manifestæ, ex ipso Phænomeno arguitur. Phænomenon ipsum solare tam secundum tam potens, tam clarum, tam promptum & patulum est, ut veritatem sponte & ultro inquirentibus aperto sinu liberalissimè, tanquam è Cornu copia effundat: quam si voluissent isti serio amplecti, potuissent utique pridem eruere: sed non tam Phænomeni veritas, quam præiudicata persuasio erronea confirmanda ipsis cordi videtur esse, prout id ipsum non dissimulant, sed satis aperte indicant, paratos se figmenta quævis potius verosimilia amplecti, & excogitare, quam à proposito suo vel latum vnguem discedere. Quod si

laten-

Minor aduersariorū propositio est falsa. Macula enim redeunt.

I.

latentem in Phænomeno veritatem hucusque expromere non potuerunt, agnoscant vel observationum suarum ad hanc rem, alioquin lubricam, insufficientiam, atque ex ijs cautius decernant, vel suam in ipsis pertractandis imperitiam, & contenti sint errare, nolint alios, vna secum in errores inducere.

*Macularum
reducumra-
tioni conue-
niens expe-
ctatio.*

Equidem, ut quod res est eloquar, ab initio huius à me inuenti Phænomeni in Macularum, saltem aliquarum redditum, semper erectus fui: etenim in tanta ipsarum ad Solem vicinia, quantum peruidebam & in Apelle meo producebam, ratio semper instabat, fieri non posse, quin aliquæ saltem quandoque reuerterentur, non obstante illarum naturali & physico interitu. Quia sicut multæ per totum Solem conspicuum inuariatæ propemodum durabant, ita consequens erat, in occulto perstare atque ad nos post simile tempus aliquas regyrare. Quæ ratiocinatio cum vehementer præmeret, videbā rursus ex altera parte, etiam si Maculæ fortassis redirent, id tamen certò sciri vel negari non posse ex eo, quod de motu ipsarum apparente, neque dum liquido constaret.

*Macularum
reditus vel
non reditus
cognitu dif-
ficilis, &
quare?*

Hoc enim non cognito, Macularum redditus frustra indagatur: quia tametsi aliquam verè reducem nactus fueris, reducem esse vel non esse, asserere non audes, nisi tibi de motu illius apparente constet; ubi exiuerit data Macula? ubi & quando debeat reuerti? quo incessu polleat, rectilineone an curvilineo? Ad Eclipticam parallelo an obliquo?

Hæc cum ego perspecta haberem, suspendi iudicium meum, & in futuras observationes atque discussiones me prouidus semper reieci: cumque à multis sæpe vrgerer, ut tandem de Macularum regressu vel affirmarem vel negarem, respondi semper, motum apparentem ad hanc decidendam quæstionem exactissimè prænosendum; cui rei opus essent plurimæ continuatæ, atque acerrimè examinatæ, nec non in ordinem itinerarium dispositæ observationes; quas cum per occupationes nondum excussissem, patienter ferrent meam cunctationem; satius esse seram & se-

mel veram, quam præcocem & semper falsam proferre sententiam. Emissem semel verbum, esse irrevocabile, & amissam semel famam nunquam restitui.

Itaque factum est, ut, sicut per tot elapsos annos Maculas redire non asserui, ita non redire ullam vnquam, nequaquam pronunciarim; sed semper dubius, sedulo obseruari, ut vel hoc nomine ad certam aliquam metam peruenirem. Quam etiam tandem me contigisse arbitror, parum moratus quid alij vel affirmando vel negando, inconsulto Phænomeno, pro affectu contraveritatem effutiuerint; quæ resorbere nunc dedecorosum, propugnare sit impossibile.

Postquam ergo omnes ferme observationes in ordinem redegi, cursusque singularum summo studio adaptaui, cepi tandem dispicere. Vtrum aliquæ Maculæ cursibus & Circellis conuenienter reuerterentur nec ne? & sanè indicia satis multarum luculenta reperi, sed nolui quidquam dubium editis intermiscere; neque tamen omne certum promere, uti mihi nil penitus reconditum seruarem.

Ex ijs ergo Maculis, quas Romæ reduces inueni, quattuor haud multis temporum interlapsibus produco, sunt autem istæ.

35 *Macula I. Australis Redux à Martio ad Maium, Anno Iubilei 1625.*

In Imagine XV. pag. 197. anni 1625. habes cursum Maculæ c, à die 22. hora matutina 8 $\frac{1}{2}$. mensis Martij, ad diem 4. Aprilis, horam vespertinam 1 $\frac{1}{2}$. Hanc eandem Maculam in Imagine XXI. pag. 207. sub littera a, reuersam esse, suadet locus, tempus, motus, & parallelus idem. Cursus vtriusque totus australis fuit, sed prior sub littera c, magis ad Eclipticam AB, recurus, quam posterior sub littera a. Causa vtriusque quod curriculum c, Acquilibrium verno vicinior extitit, & polum austrinum in Circello polari supra planum solaris Circuli eleuationem habuit, quam cursus posterior a. In Cursu primo c, hæc Macula creuit; in postremo

I.

mo a, defecit; in intermedio latentis hemisphaerij, constitit. Consule citatas Obseruationum Imagines, & Notas in eadem.

MACULA II.

Boreo-australis redux, anno eodem.

1625. obseruata à die 11. Maii,

ad 18. Iunii.

*Macula
redux,*

Hanc Maculam descriptam inuenies in Obseruationum Imagine XXIII. pag. 211. à die 11. ad 23. mane, vbi ipsa quidem non amplius comparuit, paullo tamen ante penitus occubuisse, ostendebant Faculae ipsius horizontem illustrantes, insigniui ipsam littera a. Post confectum in hemisphaerio occultato cursum, redijt die 6. Iunii, mansitque supra horizontem nostrum, vsque ad 18. Iunii, post quem noctu omnino occubuit; & sic mane diei 19. de ipsa nil amplius comparuit. Inuenies ipsam plenissime conformata in hoc cursu secundo, ad Imaginē XXV. pag. 215. sub littera h. Ipsius cursus vterque, fuit ad sensum ferme rectilineus, vti insipienti patet, magis tamen posterior in Iunio, quam prior in Maio; quia hic à conuersione seu statione Tropica aestiua paullo plus absuit, quam ille Iunii. Vterque etiam ex vtraque plaga aliquid participauit, boreali videlicet atq. australi; minus tamen ex aquilone, quam meridie. Totus autem cursus a, polum australem N, adhuc horizonti quodammodo incumbens, & mox occubiturum respexit, id quod cursus ipsemet nutabundus quodammodo innuit. Totus deinde cursus h, ad polum boreum Z, recenter exorsum respexit. Cursus vero intermedius, quē in auersa Solis plaga eadem Macula confecit, à 23. Maii, ad 6. Iunii, ex vtroque polo aliquid participauit, vnde apparentem ipsius incessum, in planum circuli solaris proiectum, oportet extitisse omnium rectissimum.

Ceterum vtrumque huius Maculae cursum in vno & eodem parallelo confectum esse, manifeste indicat eadem vtriusque à centro C, breuissima distantia, quae latitudinem ipsius, propter cursum rectitudinem, quinque vtrinque gradibus determinat, plus minus.

II.

Igitur qui loca, tempora, interualla, sectiones Eclipticae, declinationes ab eadem, Maculae plenae & decrescens similitudinem considerat, & omnia a qua lance pensat, vna mecum hanc Maculam sub aspectum nostrum redijisse, sine vilo dubio firmiter statuet.

COROLLARIUM.

Ex horum duorum itinerum mutua collatione deprehendes quam verum sit, id quod saepe dixi, Macularum vestigia rectilinea ortiua & occidua, ad sensum tardas afferre differentias: nam ipsidem ferè locis ortus & occasus acciderunt, tanto temporum interlapsu: ratio, quia axis & polus in circello polari ab horizonte ascendendo, tanto tempore, opticum ad axem fixum accessum sensibilibiter vix variat: & sic declinatio quasi eadem manet. A die autem 10. Maii, ad diem 18. Iunii, intercedunt dies 39. Probatum itaque habes exemplo practico, assertam saepius veritatem.

Per hoc tamen mediae itineris curuitati detractum nihil velim, quae inclinationem quam axis mobilis ad Eclipticam planum facit, semper sequitur, &c.

Chordarum tamen ortus & occasus puncta connectentium, ad lineam Eclipticam inclinationi, varietatis sensibilis ad multos dies parum inferunt. Sicut vicissim, quando Macularum summæ in itineribus peragendis curuitates fiunt, tunc in his per multos dies sensibilis mutatio non est, est autem circa & magna in chordis & angulis chordarum cum Ecliptica.

Quia curuitas itineraria, sequitur inclinationem & eleuationem axis & poli mobilis, qui in aequilibrijs ad sensum consistit: declinatio autem chordarum, sequitur declinationem opticam.

axis mobilis ab axe fixo, quae illis temporibus velox & maxima est.

MACVLA III.

Anno eodem 1625. à die 8. Iunii, ad 15.
Iulii redux, ex Borea in Austrum.

Macula re-
dux.

In Imagine XXVIII. pag. 231. enata, est vna composita Macula k, à die 8. Iunii indicij minutis è Faculis emergens, continuoque augmento excrescens, donec satis magna & compacta, die 19. in statu, vel potius adhuc crescens exiuit, atque oppositam Solis regionem superficie tenus emensa, post dies tredecim, mense Iulio, die tertio, hora matutina 8. iterum sese stitit, in Imagine XXXIII. pag. 241. horizontem transgressa, quam insigniui littera a; cursus ipsius prior paullo rectior fuit, quam hic posterior, eo quod polus ad Z, illic humilior, hic eleuatio extiterit, ascendit enim in Circello polari, versus æquilibriū, vtrinque tamen in eodem parallelo, latitudinis quatuor duntaxat graduum Macula incescit, itaque circulum confecit, à polo suo mobili apparente Arctico 94. gradibus distantem, siue à polo Antartico latente, gradibus 86. & sic à maximo parallelorum non multum abfuit, ideoque apparentis & latentis cursus discrimen exiguum intercedit. Nam maximus parallelorum, vtrumque cursum toto anno semper æqualem facit, latentem patenti, & hunc illi. Reliqui vero Paralleli, quo huic sunt propiores, hoc illi similiores; quo remotiores, eo describunt apparentes cursus dissimiliores, in sphaera Solis obliqua, nam in recta, quæ bis in anno ad sensum obtingit, omnes etiam cursus apparentes, parallelorum quorumuis, inter sese, cæteris paribus, sunt quasi similes & æquales duratione seu tempore supra horizontem.

Macula istius vestigium curuilineū, totū fere, vt patet australe fuit, circa orientem ab Ecliptica aliquantā portionem diremit. Motus totus periodicus, ad dies 27. non omnino peruenit.

Vide citatas obseruationū Imagines XXVIII. pag. 231. & XXXIII. pag. 241. Hanc Maculam secundum cursum posteriorem, obseruauit etiam P. Christophorus Gruenberger, atque exposuit vti ipsam habes in Imagine XXXIV. p. 243.

MACVLA IV.

Redux anno 1625. à die 12. Iulii, ad 19. Augusti.

Macula re-
dux.

In Obseruationum Imagine XXXV. pag. 245. occurrit cursus borealis o, Maculae o, in Sole ex Faculis sensim enata, à die 12. & 13. Iulij, quæ augmentis magnis ad horizontem appulit die eiusdem 24. inde auersa latentis Solis peragrata superficie, nos in Oriente reuifit, die 6. Augusti, hora 7 $\frac{1}{2}$ Matutina, à quo rursus ad horizontem occiduum deuenit, die 19. hora pomeridiana 4 $\frac{1}{2}$, in Imagine XXXVII. pag. 249.

Hanc ergo Maculam esse illam eandem, quæ mense Iulio, dicto loco & diebus Solem insedit, suadent omnes ad hanc rem requisitæ conditiones, quas in gratiam Lectoris, exempli causa, libet expromere.

Argumenta Maculae reditum persua-
dentia. A Loco.

Primo. Locus, quia locus ortus in Augusto Eclipticæ puncto A, tanto fuit vicinior, quam fuisset in Iulio, si Macula horizontem tenuisset, quantum Motus annuus poli in circello postulabat: similique ratione tantum recessit punctum occasus in Augusto ab Ecliptica, B, præ illo occasus puncto in Iulio, quantum eidem circello debebatur. Amplius puncta itineraria Maculae media in cursu o, à centro solaris seu obseruatorij circuli plus distant, quam puncta cursus a, in Augusto, & distantiarum differentia, per belle respondet, itineri interim in circello polari peracto. Præterea vtriusque cursus tam o, quam a, singula assumpta puncta, à polo mobili, in superficie Solis examinata, distant arcubus æqualibus, qui in maximo Solis circulo, seu circuli obseruatorij perimetro assumuntur: & sunt in dictis cursibus graduum 68. minutorum 20. Vnde confurgit

Secundo. Idem in vtroque cursu parallelus, quem dat latitudo eadem, quæ habetur ex eadem vtriusque circuli inuenta à polo mobili distantia, quam dixi esse graduum 68. min. 20.

Ab vno eodemq. parallelo.

Hæc

I.

Hæc ablata à gradibus 90. relinquit latitudinem paralleli à Macula utrobique descripti, qui à parallelorum Maximo recedit gradibus 21. minut. 40. in Boream. Parallelus igitur vnus idemque numero Maculam loco conueniente deferens præfenti negotio pondus maximum addit.

A qualitate cursuum apparentium.

Tertiò. Cursuum amborum situs & configurationis qualitas. Etenim cursus Iulij est rector, & ab Ecliptica in ortu magis abscedit, minus in occasu, quam cursus Augusti curuior, & ita debebat fieri, si Macula eadem redijset, propter circellum polarem, penes quem est huius anomalie gubernaculum.

A Tempore.

Quarto. Tempus vndique in vnam eandemque Maculam condicit. Nam hæc Macula in cursu, 0. die 24. Iulij, hora Matutina 8. (vt ex inspectis autographis liquet) horizontem occidentalem ultimo insidere visa est; eundem deinde redux mense Augusto obtinuit ultimo conspecta die 19. hora sexta vespertina; & sic pro vna integra reuolutione; ab horizontis occidentalis contractu ad contactum eiusdem, insumpsit dies 26. horas 10. plus minus. Iam si idem tempus computemus per partes, ab occasu diei 24. Iulij, ad ortum diei 6. Augusti, habebimus pro segmento cursus latentis, dies 12. horas 16. quibus si adiungamus cursum patentem, à die 6. Augusti, ad 19. eiusdem dierum nimirum 13. horarum 18. fiet summa tota cursus periodici, dies 26. horæ 10. plus minus: nam hic illud non ago, vt rem hanc subtilissimam, ad horas & minuta rigore geometrico, à quo diuelli nefas sit, velim alligare, sed sufficit ad meum propositum, sensibilem motus periodici quantitatem enunciare, ad diem & horas, quantum ex obseruatis sobrijs haberi potest, plus minus. Nam ad ultimam & indiuiduam præcisionem, plures anni, & obseruationes, addo etiam, sub circulis obseruatorijs maioribus, requiruntur.

II.

Ad hoc autem vt ostendam vel Maculam eandem redijse, vel cursum in superficie Solis transegisse, exactissima ista temporis ratio, necessaria non est. Seruiret quidem mirum in modum, si haberetur, sed dum illam inquirimus, vt astruamus, supponere non debemus, sed ex obseruatis probare.

Eandem igitur inueniemus, collatis inter se, Maculæ culminationibus, ad diem 16. Iulij, & 12. Augusti, vbi nota, in Maculis diei 16. notatis, orientiores esse sumendas, ea enim, successu dierum in Maculam hanc excreuerunt, & tempus idem in reditu exegerunt, dies videlicet 26. horas 10. plus minus.

Idem tempus emerget, si, motus apparentis a a a, interualla diurna ad superficiem Solis euehantur & in eadem inuestigentur, prout factum esse vides in prioribus; nam si circa apparentem cursum a a a, diametrum, quam latitudo Maculæ graduum 21. minut. 40. exhibet, describas circulum, qui periodica Maculæ reuolutioni æquatur, & in eiusdē circumferentia, spatium diurnum centro vicinum replices, inuenies dies quasi 28. si vero spatium aliquod diurnum horizontale in eandem peripheriam applices, toties quoties potest, reperies dies veluti 25. si denique accipias diei cursum qui inter centalem & marginalem medius existit & eodem perimetrum inuenti circuli mensurando percurras, adipisceris omnino dies 26. & horas plus minus 10. & hinc patet, id quod hucusque toties inculcaui, inæqualitatem istam defectus & excessus, à sola refractionis inæqualitate oboriri.

Cætera reditionis argumenta, habes annotata in ipsis Obseruationum Imaginibus citatis.

Eodem modo aliarum Macularum reuersarum circuitus, cum apparentibus contuli, & similes conuenientias inueni, semperq. conuersionem inter dies 26. & 27. plus minus versantem reperi.

An autem aliquando possint, aut soleant excedere, vel infra dictum numerum deficere, non habeo modo asserere; ego enim Phenomenon sequor, non anteco, conscribo non præscribo, Interim hæc pulchras numerorum harmonias dissimulare non possum.

N n n 2

Si

*Argumenta
plura sunt
in annota-
tionibus ob-
seruationum.*

I.

Si fiat ut totum tempus periodicum curriculi Maculae a, id est dies 26. horae 10. seu 12. ad totius circuli perimetrum, qui sunt gradus 360. ita dies vnus, siue horae vigintiquatuor, ad aliud prodibunt $13\frac{1}{6}\frac{2}{3}\frac{2}{6}$, pro itinere vnus diei, quod Macula cursu proprio in suo parallelo conficit, plus minus.

Rursus si fiat, ut 636. horae, ad vnā nam reuolutionem, ita 8820. id est dies anni 365. ad aliud, prodibunt reuolutiones vnus anni, $13\frac{5}{6}\frac{5}{3}\frac{2}{6}$. Si vero permittamus vni reuolutioni dies vigintiseptem, id quod aliquando euenit, prodibunt reuolutiones vno anno $13\frac{1}{2}\frac{4}{7}$.

Eodem modo, cum Macularum poli secundum motum annum in Circello quotidie promoueant ab occasu in ortum vnum quasi gradum, dum media Maculae periodus absoluetur, polus in Circello percurrat gradus tredecim & semis plus minus.

Et sic Macula quaelibet motu suo diurno proprio tot gradus paralleli sui conficit, quot reuolutiones periodicae contingunt vno anno, quot dies absumit periodus media; quot gradus in circello, polus mobilis vteruis, &c. Sed haec leui brachio & pingui Minerva indicata potius, quam discussa, sunt.

Exempla expositionis practicae pro asserta hactenus veritate stabilienda, plura proferentur paullo post in parte secunda huius libri: quae proinde inspecta considerabis.

Argumentum hoc pro Maculis in Sole collocandis, videtur dubitatio-

nem, & tergiversationem,

omnem adimere. Sed

suum relinquo sapi-

ienti Lectori iu-

di-

cium, nec volo ratio-

nes plus posse,

quam va-

leant.

†

8698

A R G V M E N T V M

Duodecimum.

*Maculae in Sole esse comprobantur
è secundariis huius Phae-
meni Phaebus.*

C A P. L X V I.

OSTENDI in Libro priore fuse, dum pagina 345. Meditullij solaris obseruationes explicui, esse in Sole vniuerso sparsim Maculas, & Faculas secundarias alternas, esse partes æquabiles, & quietas potissimum apud polos, & circellos polares; ostendi istarum rerum non tantum variationem perpetuam, verum etiam motum eundem, qui est Macularum & Facularum primariarum; cumque hæc omnia simul sumpta, constituent & integrent superficiem Solis aspectabilem; palam est ipsa in Sole esse, alioqui de Sole nil vnquam videremus.

Atque hæc sunt duodecim argumenta, quibus Maculas & Faculas in Physica Solis superficie inesse efficaciter suadetur; quæ passim in toto opere sparsa, hic breuiter collecta, vno quasi intuitu Lectori præsentare volui: possem plura producere, sed si hæc non euincant, cætera plus fortassis non præstabunt, à nolente enim & momenta rationum non pensante aut spernente, assensum quis extorquebit?

Nam, ut in prouerbio habetur, Vnus stultus plus potest negare, quam decem sapientes probare.

Ego igitur is non ero, qui contranegantes principia, obseruationes & experientias certas & palpabiles conculcantes, velim bellum suscipere: feruet sibi, qui vult, sua deliramenta, per me licet, & tenebras cum talpis humilis & obscurus sectetur; mihi cum Philosopho & veri amatore res est, sub dio in claro æthere, & Sole ipso omnium conscio & teste, Veritatis lucem eruimus, & falsitatis tenebras fugamus: hic fucatum, confictum, violentum, aut proprium Genium redolens nihil est; mea non profero, sed quæ

Aut Sol lucidus nō est Sol, aut Macula & Facula secundariae sunt in Sole: aut Sol ipsemet extra semet excedit.

I.

quæ in Sole facem præferente admira-
bundus animaduerti, hæc fideliter pa-
refeci: in quem tamen Maculas non
ita intruſerim, vt eas ſemper totas im-
merſas velim, poſſunt enim aliæ alijs
plus, aliæ minus extare aut ingredi, pro-
ut videmus nauem naue in pelago pro-
fundius hære. Propterea ſemper di-
co, Maculas hære in ſuperficie Solis
Phyſica, quæ non eſt concipienda mo-
re Mathematico omnis craſſitieci expers
ſed phyſico, profunditate nimirum
ſufficiente donata: cum qua & in qua

II.

1 Maculæ ſolares circa Solem contor-
queantur.

Atque hæc pro vero Macularum
Facularumque ſolarium loco disputa-
5 ta ſunto; cum quibus in Sole locatis
conquieſco, & finem primæ par-
ti huius Libri impono, pro

Gloria Trini & vnius

Dei, qui ſolus

mirabilia fa-

cit in

Cælo & in

terra.



11
 Maculae solares circa Solem con-
 spiciuntur.
 Atque haec pro vero Macularum
 speculaminibus solarium loco digne
 et tuto: cum quibus in Sole locatis
 conductis, & circumstantiis par-
 ti huius Solis imparet, pro
 Gloria Trini & vobis
 Dei, qui solus
 immobilia
 est in
 Caelo & in
 terra.

que in Sole faciem præterea admi-
 randa animadvertitur: videlicet pa-
 recit: in quibus tamquam in speculis
 etiam ipsius, ut etiam in speculis
 mutas velint, possunt etiam alia
 plus, alia minus extare et ingredi pro-
 ut videmus naturam in delago pro-
 fundius haurire. Iste igitur semper di-
 co, Maculae hæc in superficie Solis
 Physica, quæ non est conprensiva mo-
 re Mathematico omnis crystallinae ex-
 cel physico, profunditate naturæ
 immensæ donata: cum quæ in qua



ROSÆ VRSINAE SIVE SOLIS

Libri Quarti Pars secunda & vltima .



Summarium .



AFFERT hæc pars Libri Quarti & Operis mei vltima,
Primo de Motu Macularum & Facularum solarium Theo-
riam, eamque rudem quidem verbis, sed tamen solidam & fun-
datam rebus, atque ex ipsis Phænomeni motibus haustam: o-
portet enim serium obseruatorem naturam sequi, non anteuer-
tere.

Secundo. Zonam seu viam Macularum Regiam perstringit,
& ipsius causas indicat.

Tertio. Apparentem Solis arcum in circulo ipsius maximo, & quanto is minor
sit arcu latente, aperit: de magnitudine item diametri solaris tam visæ quam veræ
indaganda atque determinanda multa noua & scitu digna passim affert.

Quarto. Phænomeni solaris naturam mirificam; ætatem perennem; causas ef-
fectusque nobiles; atque ex ijs veritates eximias, præstantesque vtilitates com-
monstrat,

Quinto. De luce item & colore huius Phænomeni selecta quædam & hætenus
non tacta documenta necnon experimenta producit.

Sexto. Edocet quid ex his atque alijs nouitatibus cælestibus ab aliquibus pro So-
lis, astrorum & cæli natura ignea; quid pro eorundem corruptibilitate; quid deni-
que pro fluida cæli substantia, iuxta mentem Sanctorum Patrum, conformiter Scri-
pturæ atque Interpretibus sacris, atque secundum omnigenam Litteratorum doctri-
nam, concludatur: in quorum proinde & tuam, Lector amice, gratiam, easdem
auctoritates, laboriose collectas, & in ordinem digestas ex ipsis fontibus ad verbum
fideliter propono, & sic tandem opus meum finio, ROSAMQ. hanc VRSINAM
difficili atque diuturno partu nouissime editam, oculis, manibus & naribus tuis
trado: quam arbitrato tuo perlustrabis, contrectabis, odoraberis. Quod si ex cul-
tura mea parum voluptatis, ex admirabili certe Dei structura plurimum inuenies in
ROSETO hoc gratiarum & amænitatis. Romæ in Domo Professæ, pridie Idib.
Nouemb. MDCXXVIII.

PHAENOMENI SOLARIS SEV ROSÆ VERSINÆ THEORIA.



I.

CAP. I.



THEORIAM huius Phænomeni non pono aut fingo arbitrio, sed naturam ipsius tot tantisque exploratam vijs secutus, à posteriori, illorum more, qui primi definire astrorum motus ausi sunt, describo, & historiam quandam, vt ita dicam Theoricam propono, melius fortassis, quam Censor Apellis; sed tamen breuiter, & propterea forsitan minus dignè, quia temporis angustia pressus, maiora ventis explicare vela non valeo: erit fortasse, quando abundantiore donatus otio, id præstabo: interim succinctam, sed factam à natura, inditam à Deo, non fictam à me vel hypotheticè excogitam, sed ex obseruatis depromptam, ob oculos pono totius huius Apparentiæ & speculationis constitutionem.

Motus Macularum rectilineus.

Constat enim ex obseruatis & iam sæpe dictis, apparentem Macularum Motum duplicem esse circa centrum Solis, regularem, statum, eumque annum alterum, alterum ferè menstruū. Hic cum suum aspectum ad nos variet, & bis in anno oppositis sex mensium interuallis, Iunio nimirum & Decembri rectilineus ad sensum contingat; necesse omnino est, illis temporibus axem ipsius circa quem Maculæ voluuntur, in apparente Solis circulo iacere: & quia reliquis intermedijs mensibus iste mo-

II.

1 tus ex rectilineo in curuilineum abit, idque sitibus contrarijs, ita vt anno medio conuexa curuitas Boream, altero medio Austrum spectet; & vtraque

Idem curuilineus.

5 curuitas sensim intumescat, sensim detumescat, proportionem temporum & curuitatum seruata æquabili, &c. necesse est dictum axem vnà cum polis, in quibus & circa quem Maculæ voluuntur, altero medio anno suam medietatem supra planum solaris circuli eleuare, altero tantundem deprimere, & quia Macularum apparens curuitas à Mense Decembri, prout satis dictum, per tres

Axis mobilis altera medietas infra, altera supra horizontem solarem existit.

15 menses crescit in summum, deinde per alios tres iterum decrescit; postea idem fit in opposita Solis plaga: oportet axem circa quem Maculæ motu proprio aguntur annuè circumuolui, & ab eius polis circellos duos describi in Solis superficie, tam ad Austrum, quàm ad Boream, quorum singulorum medietas altera pateat in hemisphærio manifesto, altera delitescat in occulto, poli ipsorum sint in perimetro circuli solaris ab Ecliptica Solari quadrante circuli remoti, axis eandem Eclipticam per centrum Solis ad angulos rectos secans.

Circellorum polarium origo & descriptio.

30 Quod si annua ista axeos Maculas deferentis circumuolutio non eueniret, Macularum motus proprius semper aut rectilineus esset, aut curuilineus; idemque perfectè sibi similis & vniformis ad nos. nunc autem, quia axis Macularum in perpetua situs mutatione versatur; & annua polorum circellique reuolutione nunc in plano circuli solaris iacet, idque vel

I.

vel in Orientem vel in Occidentem Solis plagam; nunc supra illud eleuatur, idque vel in patente vel latente Solis hemisphærio: hinc omnis ferè in Maculis solaribus admirabilis illa motuum apparentium varietas contingit. Igitur cum Circellus annuus axem & polos axis circumferens, sit harum variationum maxima & ferme vnica caussa, de ipsius inueniendi, & constituendi ratione nonnulla sunt dicenda. Et vt res ordinatior existat, per Quæstiunculas procedemus.

QVAESTIVNCVLA I.

Quot sint Circelli?

Dico esse duos, in oppositis Solis partibus. Cum enim Circellorum, qui & fixus est Eclipticæ axis per centrum Solis transeat, in oppositis ipse partibus superficiem Solis ferit; & puncta hæc sunt poli è quibus Circelli describuntur.

QVAESTIVNCVLA II.

Vbi poli horum circellorum respectu Eclipticæ solaris consistant?

Ecliptica Solaris est plani Eclipticæ cælestis & circuli solaris patentis seu horizontis solaris communis sectio. Polos igitur Circellorum, Dico æqualiter vtrunque ab eadem remoueri, adeoque in medio consistere, ita vt inter extrema Eclipticæ lineæ orientis & occidentis plage solaris puncta, & polum quemlibet, quadrans circuli solaris in perimetro horizontis interiaceat, constat hoc,

Primo, E summa curuitate motus apparentis cuiuslibet Maculæ tempore æquilibrj; quo chorda ortum occasui in arcu itinerario nectens, Eclipticæ aut congruit, aut est parallela.

Secundo ex maxima declinatione duorum parallelorum æqualium, à centro Solis vtrunque in Boream atque Austrum æquè distantium; eæ enim declinationes ab Ecliptica æqualiter distant. Hæc autem declinatio maxime accidit in cursibus Macularum rectilineis, &c.

Tertio. Ex maxima declinatione tã Australi quam Boreali paralleli maximi, in Oriente vel Occidente vtramque sumendo. Nam sicut parallelus maximus

II.

ad horizontem rectus ab Ecliptica, ita axis & polus ipsius ab axe & polis Eclipticæ recedunt. Parallelus autem maximus ab Ecliptica vtrunque æqualiter recedit, ergo & axis ab axe similiter.

Huc multa possunt applicari quæ in fine libri tertij dicta sunt, &c. Quo Lectorem ablego.

COROLLARIUM.

Ex dictis patet, Polos Circellorum esse etiam Polos Eclipticæ solaris.

QVAESTIVNCVLA III.

An Circelli duo Boreus & Austrinus inter se sint æquales?

Dico esse. saltem qui ad cursum vnum referuntur: nam si cursus plures spectentur, ordinarie & ad sensum æquales inueniuntur: de qua re postea. Quia tam declinationes, quam inclinationes apparentium motuum, super parallelos æquales in diuersis plagis descriptorum, sunt inter se ordinarie & ad sensum æquales.

QVAESTIVNCVLA IV.

Quisnam sit axis Circellorum?

Est diameter Solis lineam Eclipticæ Solaris per centrum ad angulos rectos secans. Coincidit quotidie cum ea verticalis & circuli solaris communi sectione, quæ fit quando locus Solis Eclipticam cælestem supra horizontem mediat, seu quadrante Eclipticæ vtrunque ab horizonte distat.

QVAESTIVNCVLA V.

Quantus est Circellus?

Non quæro de area, neque de perimetro, sed de diametro, seu semidiametro, quot nimirum gradibus in circulo Solis seu obseruatorio numeratis distet circelli perimenter, à suo polo: seu quantus sit arcus, in circulo Solari assumptus, quem subtendit tanquam chorda circelli diameter, aut cuius dimidiū tanquam sinus subtendit circelli semidiamete-

Status questionis exponitur.

I.

diameter? ad cuius denique arcus interuallū circellus in globo describitur? In plano verò, ad interuallum finis arcum illum subtendentis?

Dico, huius rei definitionem, & certā scientiam, esse in hoc Phænomeno aliquid ex præcipuis & capitalibus punctis. Vnde summa mea industria ad hoc semper cernit, ut hac in re, ad aliquem fundū & solidam certitudinem peruenirem. Deprehendi autem circellum nonnunquam 6. graduum semidiametro respondentium, nunquam quod sciam infra: aliquando octo, neque ultra: maiore vero ex parte septem, aut septem cum dimidio. Vnde assumpsi ipsum in expositionibus ordinarie graduum septem, qualium peripheria solaris circuli est 360.

Neque tamen ita hanc rem decisam aut præcisam velim, ut si aliter (quod tamen vix puto) à quoquam reperiatur, ad stipulāri non velim aut valeam. nam dimidius gradus ex istis solaribus plus minus additus vel ablati, sensibilem differentiam vix inducit; prout in multis exemplis probavi.

Ordinaria circelli quantitas videtur esse gr. 7

Septem autem elegi, ut media incederem via, deinde quia septem gradus inueni frequentius, & tum maxime, quando plusquam singulari studio hanc rem indagavi, & excessum illum vel defectum suspicor aliunde posse induci, ut infra insinuabo.

QVAESTIVNCVLA VI.

Quibus potissimum rationibus Circelli quantitas inuestigata sit?

Primo. Quando solares Maculae cursum apparentem repræsentant rectilineum, oportet axem lationis ipsarum in plano Circuli solaris ad sensum existere, ideoque punctis suis extremis, qui & poli mobiles dicuntur, in Circelli maximis ad visum nostrum elongationibus, adeoque in extremitate chordæ, seu diametri transversæ versari, summamque ab axe stabili Eclipticæ distantiam visuale efficeret: cum autem iter rectilineum quod Macula quævis efficit, sit ad axem suum perpendiculare, si itineri eiusmodi dato cuilibet & in circulum Solis proiecto, parallela linea

II.

1 cogitetur transire per centrum Solis; tantundem declinabit illa linea ab Ecliptica, quātum recedit axis Macularum mobilis ab axe fixo circelli. Dato igitur 5 cursu rectilineo Maculae cuiuslibet, datur etiam distantia Maxima axis Mobilis ab axe fixo circelli; idem autem est axis Eclipticæ qui circelli: per inuentam autem istorum axium apparentem distantiam maximā, habetur pariter quæ- 10 sita amplitudo circelli, quæ nihil aliud est, quam semissis chordæ arcum inter axes dictos maxime distantes è circulo solari interceptum subtendens, aut arcus subtensus à dicta semisse. 15

Secundo. Quando cursus Macularum apparet summe curvilineus, quod accidit in Aequilibrijs & chorda 20 extremitates itinerum horizontales orientalem & occidentalem connectens Eclipticæ parallela, neque multum distans ab ea, aut omnino coincidens, tunc arcus ex perimetro solari, seu horizonte inter chordam illam & tangentem puncti medij cursus interceptus, 25 est quantitas circelli. Quia in hoc casu axis mobilis summam habet ad circulum Solis, inclinationem, & polus axeos mobilis apparet maximam supra horizontem altitudinem, & tam axis, quā polus mobilis congruit optice axi fixo circelli, seu quod idem est, in ipsum 30 projicitur, & polus axis mobilis tantū distat in sphaera à polo fixo circelli, quantum linea cursus dati summitatem mediam contingens, à chorda cursus extrema neciente. Cum igitur per ob- 35 servationes detur cursus; & eius ab chorda distantia, datur etiam beneficio ductæ tangentis quantitas circelli, ordinariè septem graduum, aut paulo 40 plus minusve reperta.

Tertio. Idoneam circelli quantitatem optimè ostendit praxis seu experientia expositoria. Cum igitur ex v- 45 triusque circelli ad septem gradus descripti polis per omnes totius anni menses cursus Macularum exposuerim, maximamque locorum congruentiam inuenerim; bonitas ipsius in dubium reuocari vix posse videtur. 50

Ex Motu Macularū summe curvilineo.

Ex praxi expositoria.

QVAESTIVNCVLA VII.

Quare circelli polaris quantitas aliquando Maior, aliquando Minor septem gradibus reperitur?

Primo. Quia Maculae propter continuam magnitudinis variationem & alterationem naturalem, possunt facile aliquid huc illucque deuiare, & sic curuitati itineris aliquid vel addere, vel demere, quae res circelli quantitati statim aliquid affert vel aufert.

Secundo. Quia idem euenire potest motione seu trusione locali, seu agitatione Macularum, cuius multiplices possunt subesse & assignari causae, quas modo Physicis considerandas relinquo.

Per haec tamen ipsi primo & primario mobili, quod est sphaera corporis solaris regularissime mota, nihil penitus subtrahitur. Causas autem suo tempore promam, si Deo placuerit.

QVAESTIVNCVLA VIII.

Quanto tempore circellus suam periodum absoluit?

Circellorū periodica reuolutio ab soluitur, vno anno.

Haecenus inueni annum, ut sicut axis & poli Eclipticae caelestis, totius anni curriculo circulos polares in sphaera, ita poli axis Macularum mobiles percurrant circellos duos in Sole polares, absolueno quotidie quasi vnum cuiuslibet gradum. An autem ita praecisus & stabilis sit iste motus, ut nihil in antecedentia vel consequentia vnquam desit vel superfit, aut nihil defecturum vel abundaturum aliquando; me latet adhuc. Res est subtilis, & obseruatione, vsu, collationeque multorum annorum indiget: ego primus horum inuestigator ianuam aperio, & quae ad sensum deprehendo fideliter dico.

Obseruationes certe & earundem practicae applicationes, ad sensum satis conspirant & in vnus anni reuolutione inclinant. Considera Obseruationum Imagines LXV. pag. 321. LXVI. pag. 325. vsque ad LXX. pag. 341. & eorum quae scribo veritatem intelliges, ob hanc enim causam illas in medium produxi.

QVAESTIVNCVLA IX.

Vnde, quo, & qualis est circelli, seu axeos mobilis in circello motus?

A plaga Solis occidua in ortiuam eiusdem, contra quotidianam Macularum tendentiam, non tamen super polos earundem, sed circa axem stabilem super polos fixos Eclipticae. Est autem circumlatio annua axis mobilis vniformiter deformis, mouenturque poli ipsius maxime & celerrime, medium punctum in centro Solis quiescit, reliqua centro vicina minus, polis propiora magis, proportionem coni annui a motu axeos efformati; cuiusmodi duo sunt, ad vertices in centro Solis oppositi.

QVAESTIVNCVLA X.

Quanta celeritate fertur polus axeos mobilis, vno die, vna hora, in miliaribus & passibus Romanis?

Mille passus faciunt vnum milliarem Romanum. Circulus autem Solis maximus, secundum Tychonem in suo ambitu continet passus 153715000. cuius quadrans erit 38428750. Posito ergo sinu toto 100000000. respondebit arcui graduū 7. sinus passuum 1218693. Igitur si fiat ut sinus totus 100000000. ad 38428750. ita 1218693. ad aliud prodibunt passus 4683284. pro quadrante Circelli: in quo cum polus axis vno die vnum gradum promoueat, prouenient pro vno die passus 52036 $\frac{1}{2}$ fere: pro vna hora, passus 2172 $\frac{1}{3}$. hoc est miliaria Romana duo, passus 172 $\frac{1}{3}$. Quia vero Sol multo maior est, quam ipsum Tycho Brahe facit, patet dictorum veritas amplius.

Maculae motu proprio ab orientali Solis plaga in occidentalem progrediendo, promouent vno die, in Circulo Solis maximo, passus 5693148. hoc est miliaria Romana, 5693. passus 149. Nomine diei intelligo 24. horas. Vna vero hora procedunt in superficie Solis passus 237214, id est, miliaria Romana 237. cum passibus 214. quae faciunt miliaria Germanica 59 $\frac{1}{2}$, vnum pro qua-

quatuor Romanis computando: quæ celeritas est quasi globi e bombardâ emissi, qui vnum milliare Germanicum peruolando, consumit vnum horæ scrupulum sexagesimum plus minus. quæ celeritas sufficeret ad conglobationem corporis, licet alias esset materia minus consistens, sic circa centrum suum conuoluti. Hic variæ suscitari possent quæstiones, Quid Motus isti Soli? quid terræ? quid planetis? quid stellis conferat? nam gratis non esse, certissimum est. Sed hæc breuitatis ergo modo omitto.

QVAESTIVNCVLA XI.

Vnde faciendum est huius Motus initium?

Ex vno aliquo Cardinalium punctorum, quando videlicet poli axem deferentes aut iacent in circulo solari, aut sunt summè supra eundem exaltati. Iacent autem poli in plano solaris circuli, (sed ad sensum tantum, nam ex parte rei nunquam illic consistunt,) quando Macularum iter rectilineum existit: summam exaltationem obtinent, quando itinerum maxima curuitas contingit. Puncta verò ista in circello, quadrante circuli à sese distant, quorum quilibet trimestri spatio à polo mobili percurritur. Vide dicta de his lib. 3.

QVAESTIVNCVLA XII.

Quo anni tempore, Mense, Die, Hora, initium huius motus annui est sumendum?

Resolutio huius quæstionis eò est difficilior, quò & errandi procliuitas maior, & erroris admissi noxa existit damnosior. Periculum autem errandi ex eo imminet maximum, quia si motus initium statuo à puncto quo polus apparens horizontem solarem attingit, id quod in motu rectilineo fieri oportet; difficillimum est, hoc punctum & tempus contactus vera præcisione attingere: quia motus Macularum rectilineus ad sensum satis diu circa horizontem inuariabilis durat, propter poli mobilis in circello ascensionem vel descensionem quasi rectam; ex qua fit, vt declinatio-

nis differentia vix vlla in perimetro Solis sentiat, spatio temporis magno, sicut fit in Tropicis Solis conuersionibus, vbi declinatio quasi nulla variatur. Igitur cum taliter rectilineus Macularum motus sese habeat, vix est modus veram poli cum horizonte coniunctionem cognoscendi; ideoque difficillima hinc motus incipiendi ratio: aliquot enim dies nullo negotio vel anticipantur vel postponuntur. Quod si eueniat, delicti huius culpa in totius circelli decursum annuum promanat: & sic consequenter in cursibus & expositionibus singularum Macularum peccatur; & statim deinde Phænomeno aut Theoriæ tribuitur, quod positionis huius vitio deliratur.

Sin ad alterum punctum Cardinale, quando nimirum polus mobilis altissimus atque axis ad planum circuli solaris minime inclinatus & quam potest maxime eleuatus existit, animum applico, sumpturus inde initium; reperio maximas iterum lubricitates; quia in hoc casu, oportet habere exactissimum Maculæ ortum & occasum horizontalem aut quasi, vt sciam an chorda Eclipticæ parallela incedat nec ne: res autem hæc habitu est rara; non enim promunt sese facillè Maculæ horizonti insidentes: deinde ipsa illarum consignatio est lubrica valde; tandem omnium maximè laboratur in medio circa centrum. Accedit, quòd circa ista tempora, Maculæ quotidianas declinationes cito & vehementer mutant, quæ res chordam spatio diurno à statu parallelo continuo emouet, &c.

Itaque cum tot vbique difficultatibus sit obseptus iste aditus, in quo tamen præcipuus rei cardo versatur. Ego rem non vno simplici modo, sed omnibus aggressus sum, atque per omnia Cardinalia puncta, imo per omnes anni menses periculum feci, cuinam temporis, mensi, & diei, vera Macularum positio corresponderet: & post labores plurimos, inueni circa finem Nouembris, & initium Decembris, itemque circa finem Maii, & initium Iunii; item circa finem Februarii, & initium Martii, nec non circa exitum Augusti atque ingressum Septembris, ita vt contactum poli Austrinum orientale dicamus fieri Mense Decembri, & die Mensis præter pro-

Difficultates initij ponendi ex motu curuili-neo.

Difficultates initij ponendi ex motu rectilineo enarratur.

Initiū cur- sus præter propter.

I.

pter prima; vel Mense Nouembris, & die 28. vel circiter, & tum progrediamur in circello ordine Mensium & signorum Zodiaci, inscribendo eosdem & eadem in circelli perimetrum, vt ex dato tempore liceat cognoscere polum & axem ordinarium circa quem Maculae currunt.

Dico ordinarium, quia plerarumque cursus huic radici & clauis congruentes inueni. Tametsi quasdam extrauagantes non ignorem, vt paullo post explanabitur. Quapropter initium, radicem, & clauem poli atque axeos Mobilis ex obseruatis auguror diem primum vel circiter, Decembris, in horizontis austrini plaga occidentali: hinc enim circellus in ortum contra Macularum tendentiam nititur; & inde eundem polum quotidie vno veluti gradu in eiusdem circelli peripheria promoueo; & quia Maculae quaelibet in suis parallelis circa axem mobilem mouentur, inde fit vt non vno motu simplici circa illum axem, sed variè mixto moueantur. Cum enim peripheria circelli in superficie globi iacens, ab horizonte ascendat partim versus boream, partim versus ortum, manifestum est omnes Maculas versus hunc polum collocatas, dum ab ortu in occasum tendunt, simul ab occasu in ortum simul à borea in Austrum ferri, & eas quae respiciunt polum opposita facere & pati.

QVAESTIVNCVLA XIII.

Verum omnes Maculae eundem axem, & polos mobiles ab & in circello delatos respiciant?

Maculae circumaguntur circa eundem sensu axem.

Respondetur ex Phænomeno compertum haberi hucusque, plerasque Maculas & cursu ordinario ferri circa eundem sensu axem. Nihilominus tamen à nonnullis quandoque nonnihil exorbitari est animaduersum in motu apparente, eo quod alias celeritate motus sui anteuertant; de qua re consule ob-

II.

seruationum Imagines & earum Notas. Feruntur tamen eę retentis nihilominus polis axis sui in perimetro circelli; quod patet expositione cursus ex datis aut positis illis polis; omnia enim haud aliter congruent, quam si statuta tempora & loca seruauisses.

Sed & Refractionis negotium ex lentibus obseruatorijs perfectum, ad hosce excessus aut defectus etiam aliquid conferre potest & solet.

An autem ista exorbitantia ex alio quodam eoque proprio principio procedat, an verò ex omnium communi; vel ex mutua motuum contrariorum concursatione, atque conflictatione, seu Macularum laterali impulsione, &c. non habeo dicere. Hoc interim certum, etiam harum Macularum euagationes ordinatas, & axes illarum circello alligatos, ipsasque superficiei Solari adstrictas esse: ex hoc Phænomeno argumentum fortissimum trahitur pro superficiei solaris fluxibilitate, &c.

QVAESTIVNCVLA XIV.

Verum propriae Macularum conuersiones sint omnes inter se temporis duratione aequales, & quantae?

Respondetur ex obseruatis cursibus apparentibus, & accuratè examinatis, non esse. Nam multi cursus bene explorati dies 25. vix excedunt.

Multi ad 27. perueniunt: & nonnulli ad 28. aspirare videntur. Deducuntur ista euidenter, ex indagatis locis & motibus veris, per

da-
tos apparentes. Consule Imagines Obseruationum, & Notationes in ipsas lib. 3. allatas.

Duratio conuersionis Macularum inequalis.

560 ROSAE VRSINAE LIB. IV.
Systema Generale Motus Phænomeni
Solaris.

CAPVT II.

I.
HVCVSQVE dicta intelligen-
tur melius, si res oculis su-
bijciatur.

In apposito ergo Schemate descri-
ptus circulus A B C D, sit Sol, cuius
centrum E, linea Eclipticæ Solaris sit
A B, voco autem Eclipticam solarem,
illam portionem, quam Eclipticæ planū
cum Sole communem habet, & est cir-
culus in Sole maximus: cuius commu-
nis cum apparente Solis circulo, sectio,
est linea A B, dicta Ecliptica; cuius a-
xis C D, habens polos C, quidem Bo-
reum, D, vero Austrinum in Solaris cir-
culi perimetro C A D B, assumptos.
Et quanquam tam circulus Solis A C
B D, quem & horizontem sensibilem
dico, quam axis C D, seu Ecliptica
A B, non sint diametri aut circuli ma-
ximi, pro maximis tamen assumuntur,
quia in hoc negotio sensibilem magni-
tudinis differentiam, propter maximā
Solis ab oculo distantiam, non inge-
runt: de qua re postea ex instituto,
cap. 3.

*Circellorū
polarium
explicatio
& descriptio*

Iam si ex C, & D, polis fixis vtrin-
que abscissi cogitentur in peripheria
ad G, & O, ad F, & P, septem gradus,
qualium tota circumferentia ACBD, est
360. & abscissionum puncta rectis GO,
& F P, nectantur quæ axem C D, secant
in a, & b, atque ex ijs tanquam centris
descripti sint ad interualla a O, & b P,
circelli c F d P, & e G f O; erunt illi
ijdem in quibus annuus motus perfici-
tur, & per quos magna ista motuum va-
rietas in hoc Solare Phænomenon indu-
citur. Appellatur autem circellus c F
d P, Australis, siue Antarticus, quia So-
le Meridianum loci tenente, in plaga
Australi versus polum Antarticum ia-
cet; alter verò e G f O, dicatur, ob si-
tum & plagam oppositam Borealis siue
Arcticus.

Cogitandi autem sunt isti circelli ad
planum circuli solaris ACBD, erecti. Qui
ambo in superficie sphaerica Solis è fixis
Eclipticæ polis C, & D, motu annuo à

II.

- 1 polis mobilibus vel O, P; vel F, G, descri-
buntur, dum axis mobilis O P, vel F G,
circa axem fixum C D, voluitur incessu,
quantum ex obseruatis hactenus con-
stat æquabili & vniformi. Iidemque di-
ctum axem Macularum solarium Mo-
bilem deferunt polis diametraliter op-
positis. quales sunt F, & G, axis F G: vel
O, & P, axis O P: vel g, k: axis g k: vel d, &
f, axis d f. ita vt dum polus O, & medie-
tas axeos O E, in superiore hemisphærio
patentem circelli borealis semicirculū
O f G, ex ortu suo O, in occasum G,
perambulat; interea altera axis portio
E P, in latente Solis portione, describat
polo opposito depresso P, semicirculū
latentem P d F, circelli australis, ex or-
tu suo P, in occasum F. Radix seu mo-
tus initium potest sumi in circello au-
strino D, apud punctum F; in circello
Boreo C, apud punctum G, idque cir-
ca initium mensis Decembris. quo tem-
pore paralleli in quibus Maculæ motu
proprio voluuntur ab ortu in occasum,
id est ex A, versus B, sunt ad Eclipticā
A B, obliqui; & H E I, maximus, ma-
ximam declinationem A H, australem,
vel I B, borealem circelli quantitati seu
arui C G, vel D F, facit æqualem. Mi-
nores circuli paralleli sunt, ex eplī causā
KL, boreus, & M N, austrinus, quorum
cursus; quia hoc tempore poli F, & G,
ad sensum in plano circuli Solaris incu-
bant, & declinatio axis F G, sensibilibiter
non variatur, cum diametris seu chordis
H I, K L, & M N, omnino congruit, i-
deoque cursus Macularum qui in ipsis
contingunt, rectilinei ad sensum fiunt
tamdiu, quamdiu poli F, & G, ab iisdē
horizontis punctis F, & G, apparenter
seu sensibilibiter non recedunt; quod tum
tandem fit, cum perpendiculares in dia-
metrum circelli F P, vel G O, ex loco
poli mobilis demissæ, notabilem ab ea-
dem portionem auferunt, quod ante
24. Nouembris, & post 8. Decembris
diem vix contingit ad sensum.

Quamquam non ignorem inclinatio-
nem axis mobilis super planum hori-
zontis

SYSTEMA VNIVE

THE ORICVM
RSALE

DE MOTV
SOLA

MACVLARVM
RIVM



I.

*Poli mobilis
iter.*

zontis, & ex ea aliquam itinerum circa medium curvaturam accidere. quæ tamen sensum harum speculationum nescium, non mouebit, vt ipsam phænomeno potius quā obseruatori, aut refractioni tribuat, nisi continua praxis & theoria ipsum doceat. Mense Ianuario polus australis (Qui nunc quidem vna cum suo semicirculo $F d P$, exaltatus, vt $G f O$, depressus est imaginandus) habet hospitium in g ; & polus boreus G , in K , puncto semicirculi latentis: quorum hoc quidem projicitur in r , illud autem in h : & quia axis $F G$, id est $g k$, duplici motu est promotus, vno à plaga Solis occidentali B , versus orientalem A , contra successionem Macularum; altero ex australi plaga D , ascendendo versus C , borealem, dum scilicet polus ex F , eleuatur supra planum horizontale versus g : idcirco primum motum, quo nimirum F , & dimidius axis $F E$, accedit versus axem fixum $D E$, sequitur ad vnguem diameter paralleli $H I$, quæ ex H , peruenit in l , & ex opposito puncto I , in m , versus Eclipticam $A B$; quam diametrum $H I$, seu $l m$, pari modo imitantur omnes sectiones reliquorum parallelorum minorum quæ sectioni quam Maximus parallelorum cum circulo solari $ACBD$, communem habet, semper solent esse parallelæ ad sensum. Motum verò inclinationis seu altitudinis supra planum horizontis ex F , in g , non sequitur sectio paralleli, & circuli solaris $H I$, in horizonte, sed eiusdem arcus itinerarius in sphaerica Solis superficie descriptus, & ex centro Maculæ in planum horizontis solaris projectus, qui arcus circa medium itineris seu Solis, tantum recedit ex E , versus k , quantum polus mobilis ex F , versus g . & hinc itineraria macularum curuitas oritur.

Eadem ratione dum axis idē $g k$, per totum Ianuarium procedit in n , & p , sectio communis paralleli maximi $l m$, seu diameter arcui ipsius semicirculari subtensa, ex l , & m , pari passu processit in r , & s ; similiterq. parallelorum reliquorum minorum communes cum horizonte sectiones, seu chordæ arcuum, similes progressus fecerunt: & altitudinem poli n , austrini, seu depressionem poli p , arctici, quam indicat perpendicularis $n o$, vel $p q$, in punctis o , & q , æquat summitas

II.

arcus itinerarij, per tria puncta $r t s$, incedentis: quanquam ex ipso præter tria puncta nil expresserim. Complementum verò inclinationis $b o$, quod huic altitudini ad gradus septem in arcu FD , complendos deest, semper respondet declinationi paralleli Maximi ab Ecliptica $A B$, qui in proposito est arcus $r A$.

Circa initium Martij axis mobilis $d f$, occupat summum seu medium punctum circuli australis d , infimum borealis f : & hoc latet in opposito hemisphaerio, illud patet in aduerso: & est paralleli Maximi $A u B$, super solaris Eclipticæ planum inclinatio summa $E u$, in meridiano $d f$ expressa æqualis Circuli semidiametro $b d$, seu declinationi maxime $A H$, vel $A K$. Declinatio verò hoc die nulla: sed paralleli maximi diameter coincidit cum Ecliptica $A B$, & axis $d f$, cum axe Eclipticæ $D C$.

Vocatur autem hæc statio, Aequilibrium inclinatorium.

Omnes autem parallelorum minorum inclinationes super plana circulorum Eclipticæ parallelorum, sunt inclinationi paralleli Maximi æqualia in re, non tamen apparent. sic & declinationes.

Ab hoc tempore axis $d E$, cum suo polo incipit iterum descendere versus partes orientales P , nam hætenus ex F , occidentali plaga ascendebat; & in opposito circello C , ascendit: donec perueniat illic descendendo in X , & hic ascendendo in Z , ad Aprilis initium, vbi meridiana inclinatio est $E \beta$, in axe $Z X$, ad punctum β , notata, lineæ perpendiculari $x y$, æqualis, cuius complementum ad 7 , est arcus sinus seu rectæ $b y$, declinationi $A \gamma$, vel $B \delta$, æqualis: ex quo autem tempore, axis mobilis $d f$, incipit transire in partes orientis ex d , versus x ; diameter paralleli maximi in plaga eadem orientali ascendit in boream trans Eclipticam; in occidente descendit in Austrum: vt patet ex $E \alpha$, & $E \gamma$, eiusdem medietatibus. Similia faciunt paralleli minores, si sunt parallelo maximo vicini: qui non sunt vicini, Eclipticam quidem non secant, discessus tamen & accessus à plagis ad plagas chordis suis, diametro maximi parallelis proportionales exhibent.

Quando




SYSTEMA VNIVERSALE

THEORICVM MACVLARVM

DE MOTV SOLIS

MACVLARVM RIVM



I.

Quando axis poli ex X, & Z, delati fuerint in ϵ , & π , Maius arridebit, & Meridianus ϵ , attollet Macularum arcum maximum, secundum E; æqualem perpendiculari ϵ , cuius complementum ad septem gradus, est arcus sinus b, declinationi A, siue B, æqualis. Similia fiunt in parallelis minoribus.

Hinc ex ϵ , ad P, & ex π , ad O, decurrens axis, insidet denuo Horizonti, qui est Circulus Solis ABCD, idque circa initium Iunij, vbi occumbit Polus P, & axis austrinus PE; contra verò emergit axis boreus EO, idemque polus O, vbi rursus parallelus maximus nullam habet inclinationem: ideoque ipsius complementum PD, id est AK, vel BN, declinationem obtinet maximam, & rursus arcus Macularum cum suis diametris & chordis KN, HQ, RI, coincidunt, ideoque cursus rectilineos describunt: & sic absolutus est patentis circelli australis FdP, decursus semestris; cuius beneficio omnes Maculae itinere curuo conuexo versus C, polum arcticum, concauo versus D, polum antarcticum incesse.

Nunc alterum circellum boreum, OfG, prosequamur. Oportet autem imaginarij circellum OfG, super horizontem erectum & PdF, infra eundem depressum esse.

Polus igitur boreus O, vnà cum suo axe OE, oritur circa primum Iunij, faciuntque Maculae itinera in parallelo maximo KEN, quasi rectilinea; media ex parte KE, borealia, ex altera media EN, australia, in reliquis parallelis minoribus vel tota australia, vt est in linea HQ, quæ tota extra Eclipticam AB, incedit, vel tota borealia, cuiusmodi est RI; vel mixta denique magis & minus, pro maiore ipsorum vel minore à polis vel centro E, distantia: omnia tamen nullo dempto sunt obliqua ad Eclipticam, secundum obliquationem axis OP.

Mense Iulio dum polus superior attingit H, & inferior π ; inclinatio arcus itinerarij in parallelo maximo est E, declinatio eiusdem paralleli maximi A, vel B. In parallelis minoribus proportionalia fiunt.

II.

Initio Augusti poli & axis ZX, faciunt inclinationem meridianam E, & declinationem A, vel B.

Principio Septembris Maculae rursus faciunt Aequilibrium Inclinatorium, seu Auctumnale, vel boreale, omni- que declinatione carent diametri, & chordæ, quæ vel coincidunt cum Ecliptica, vel eidem existunt parallelæ; sed inclinationes maximas faciunt paralleli & plana in parallelis iacentia cum circulo Solari.


Post hoc tempus chordæ parallelorū obliquitates suas ad Eclipticam mutāt, in contraria, quemadmodum & axis patens OE, qui postquam altissimum circelli punctum f, consecutus est, ex occidentali fit orientalis, & chordæ aliquæ ex arcticis antarcticæ, & contra, omnes tamen ad Eclipticam obliquæ, &c. Contraria fiunt in latente medietate axis EP, & Ed, &c.

Igitur poli p, n, Octobris initio, summam Macularum apparentem curuitatem in parallelo maximo exhibent, Eo; declinationem vero Al, australem, Bm, borealem; similia fiunt in parallelis minoribus.

Initium Nouembris, offert polos & axem in K, & g; altitudinem E, declinationem Ar, australem, Bs, boream: similiaque faciunt in sua proportionem paralleli minores.

Post hæc ad initium Decembris venit polus boreus in G, & australis in F, totusque axis GF, sensu in horizonte iacet, post quod tempus occumbit polus G, & axis septentrionalis GE, in oriente; oriturque polus F, & axis Meridionalis EF, in occidente: & eodem modo iter officiumque suum perficit, prout anno superiore. & sic ordinarij Macularum cursus perennant, tametsi Maculae ipsæ ætatem mensuram non multum excedant, etiam cum multum durant. Sicut via eadem manet, à viatoribus alijs atque alijs calcata; alius fluminis idem, sed aquæ ipsum diuersæ occupantes, &c.

Hanc autem Theoricam Phænomeni huius constitutionem atque explanationem non effinxi arbitrato meo, sed, vt præmonui, ex ipsis illius visceribus, atque fidelissimis obseruationibus passim productis & ordinatis desumpsi; omnia



I.

omnia enim in illis reperi effectu ipso, quorum hic causam in illis latentem, atque modo erutam toti mundo palam facio.

Vnde impossibile esset ita omnia & singula mutuo sibi correspondere, si ex parte rei sese ista Theoria non haberet. Hinc enim ad oculum statim patet,

*Quare cur-
sus Macula-
rum bis tan-
tum in anno
sint rectili-
nei ad sensu*

Primo. *Quare bis tantum in anno*
*Maculae cursus ad sensum rectilineos ef-
ficient, & seu quidem obliquo ad Ecli-
pticam, eoque decussatim opposito?*

Quia videlicet axem Macularum in, circellis polaribus mobilem, sequuntur plana parallelorum quoad inclinationem. siue motum apparentem latitudinis; & chordae seu subtensae arcuum quoad declinationem. Cum igitur axis mobilis sit axis parallelorum, ex hoc ipso omnibus circulis parallelis rectus insisteret: igitur cum idem axis bis tantum in anno in circulo solari iaceat, nimirum in FG, & OP; necesse est, etiam omnes ipsius parallelos cum ipso mobiles, bis tantum in anno circulo solari ad rectos angulos insistere: ideoque tam arcus quam chordas seu diametros arcuum in vna communi illorum cum horizonte sectione collocare. Eadem ratione, cum idem axis GF, & OP, ad axem Eclipticae immobilem CD, sit obliquus, idque decussatim atque aequaliter, propterea quod eiusdem axis CD, poli C, & D, sint etiam poli circellorum GFO, & FDP, axem Macularum mobilem FG, deferentium, inde rursus est, ut simili modo paralleli Maximi ad Eclipticam situs sese habeat, & minores ratione proportionali.

Secundo. *Quare declinatio paralleli Maximi, semper sequitur complementum altitudinis axeos? &c.*

Quia illud complementum fit à projecto axe in circulum solarem, quae est sectio communis horizontis & plani per axem atque oculum in terra existentem traducti; hoc autem planum semper est rectum ad horizontem solarem; igitur cum axis ad planum paralleli Maximi sit rectus, debet etiam esse rectus ad quamlibet eductam ex E, in eodem plano paralleli Maximi, & sic chorda paralleli Maximi semper erit ad angulos rectos communi sectioni horizontis, & plani axem deferentis. igitur si-

II.

cut se habet illa sectio ad axem Eclipticae CD, ita se habet chorda paralleli Maximi, quadrante diffusi, ad Eclipticam AB, in horizontis plano AC BD.

Tertio. *Quare paralleli Maximi meridiana altitudo sequitur altitudinem poli mobilis in Circello?*

Quia distant ista puncta integro quadrante. vnde si polum F, ex horizonte promoueo eleuando in g, necessario ex E, tantundem promouetur f, quod est communis sectio duorum arcuum circulorum maximorum, qui sunt parallelus maximus, & circulus axis seu meridianus, nam in hoc semper existit punctum medium paralleli supra horizontem existens. Ex hoc deduco quaedam,

COROLLARIA:

PRIMUM. Zonam quam parallelus Maximus vno anno peruagatur, esse aequalem latitudine diametro circelli cuiusvis axem deferentis. è quo fit, vnam eandemque Maculam in parallelo maximo circumlatam, etiam si duraret semper, tamen neque orituram secundo, quo oriebatur loco primo, neque occubituram sedibus iisdem, nisi post annum, & vno anno subituram omnem varietatem, quae huic Zonae ratione situs & positionis inest. Eadem proportionaliter asserentur de parallelis minoribus, nam sicut in Zona paralleli Maximi HKIN, annuas vicissitudines efficeret Macula aliqua durabilis. ita si Macula aliqua in parallelo MN, fuisset dum polus in F, versaretur, eadem annua reuolutione exhausisset Zonam sibi debitam MHNQ, & illi opposita K L, Zonam KRLI, &c.

Zona paralleli Maximi

Zona parallelorum non maximorum.

Ex hisce Zonis componitur Zona Solis media, seu via Macularum & Facularum ordinaria, quam Regiam, & si placet Zonam torridam appellare possumus, propter assiduum in ea Facularum incendium, de qua paullo post pluribus agam.

SECUNDUM. Arcum quemcumque itinerarium Macularum apparentem, ex horizonte ortiuo in occiduum continuatum, esse paullo altiore circuli simplici.

Quia

SYSTEMA
VNIVE

THEORICVM
RSALÆ

DE MOTV
SOLA

MACVLARVM
RIVM



I.

omnia enim in illis reperi effectu ipso, quorum hic causam in illis latentem, atque modo erutam toti mundo palam facio.

Vnde impossibile esset ita omnia & singula mutuo sibi correspondere, si ex parte rei sese ista Theoria non haberet. Hinc enim ad oculum statim patet,

*Quare cur-
sus Macula-
rum bis tā-
tum in anno
sint rectili-
nei ad sensu*

Primo. *Quare bis tantum in anno Maculae cursus ad sensum rectilineos efficiant, & seu quidem obliquo ad Eclipticam, eoque decussatim opposito?*

Quia videlicet axem Macularum in circellis polaribus mobilem, sequuntur plana parallelorum quoad inclinationē. siue motum apparentem latitudinis; & chordae seu subtense arcuum quoad declinationem. Cum igitur axis mobilis sit axis parallelorum, ex hoc ipso omnibus circulis parallelis rectus insister: igitur cum idem axis bis tantum in anno in circulo solari iaceat, nimirum in FG, & OP; necesse est, etiam omnes ipsius parallelos cum ipso mobiles, bis tantum in anno circulo solari ad rectos angulos insistere: ideoque tam arcus quam chordas seu diametros arcuum in vna communi illorum cum horizonte sectione collocare. Eadem ratione, cum idem axis GF, & OP, ad axem Eclipticae immobilem CD, sit obliquus, idque decussatim atque aequaliter, propterea quod eiusdem axis CD, poli C, & D, sint etiam poli circellorum GfO, & FdP, axem Macularum mobilem FG, deferentium, inde rursus est, vt simili modo paralleli Maximi ad Eclipticam situs sese habeat, & minores ratione proportionali.

Secundo. *Quare declinatio paralleli Maximi, semper sequitur complementum altitudinis axeos? &c.*

Quia illud complementum fit à projecto axe in circulum solarem, quae est sectio communis horizontis & plani per axem atque oculum in terra existentem traducti; hoc autem planum semper est rectum ad horizontem solarem; igitur cum axis ad planum paralleli Maximi sit rectus, debet etiam esse rectus ad quamlibet eductam ex E, in eodem plano paralleli Maximi, & sic chorda paralleli Maximi semper erit ad angulos rectos communi sectioni horizontis, & plani axem deferentis. igitur si-

cut se habet illa sectio ad axem Eclipticae CD, ita se habet chorda paralleli Maximi, quadrante diffiti, ad Eclipticam AB, in horizontis plano AC BD.

Tertio. *Quare paralleli Maximi meridiana altitudo sequitur altitudinem poli mobilis in Circello?*

Quia distant ista puncta integro quadrante. vnde si polum F, ex horizonte promoueo eleuando in g, necessario ex E, tantundem promouetur f, quod est communis sectio duorum arcuum circulorum maximorum, qui sunt parallelus maximus, & circulus axis seu meridianus, nam in hoc semper existit punctum medium paralleli supra horizontem existens. Ex hoc deduco quaedam,

COROLLARIA.

PRIMUM. Zonam quam parallelus Maximus vno anno peruagatur, esse aequalem latitudine diametro circelli cuiusvis axem deferentis. è quo fit, vnam eandemque Maculam in parallelo maximo circumlatam, etiamsi duraret semper, tamen neque orituram secundo, quo oriebatur loco primo, neque occubituram sedibus iisdem, nisi post annum, & vno anno subituram omnem varietatem, quae huic Zonae ratione situs & positionis inest. Eadem proportionaliter asserentur de parallelis minoribus, nam sicut in Zona paralleli Maximi HKIN, annuas vicissitudines efficeret Macula aliqua durabilis. ita si Macula aliqua in parallelo MN, fuisset dum polus in F, versaretur, eadem annua reuolutione exhausisset Zonam sibi debitam MHNQ, & illi opposita KL, Zonam KRLI, &c.

Ex hisce Zonis componitur Zona Solis media, seu via Macularum & Facularum ordinaria, quam Regiam, & si placet Zonam torridam appellare possumus, propter assiduum in ea Facularum incendium, de qua paullo post pluribus agam.

SECUNDUM. Arcum quemcumque itinerarium Macularum apparentem, ex horizonte ortiuo in occiduum continuatum, esse paullo altiore circuli simplici.

Quia

Zona paralleli Maximi

Zona paralleli minoris

SYSTEMA
VNIVE

THEORICVM
RSALE

DE MOTV
SOLA=

MACVLARVM
RIVM



I.

Quia Macula oriens non occidit, quo illius diei arcus protenditur in horizontem occidentalem, sed quo ultimo occasus die pertingit.

In exemplo. Orta sit Macula aliqua in r , puncto ortiuo paralleli Maximi: meridianum illius diei punctum erit t , occidentale s , post dies 14. plus minus, quibus Macula supra horizontem versata fuit, poli axis mobilis consistunt in circellis ad puncta e , & σ , eritque demissa perpendicularis ρ , altitudo meridiana illius diei in arcu itinerario paralleli Maximi, declinatio vero illius diei ab Ecliptica erit in ortu $A\phi$, in occasu $B\chi$. Igitur si r , primum cursus huius in oriente punctum iungatur cum postremo χ , in occidente, cadet cursus chorda infra centrum E , fietque altitudo meridiana maior circulari simpliciter, excessu, lineolæ ψ E . Vnde ne erretur, inter r , & ϕ , s , & χ , media, incedendum videtur via, &c.

ZONA MACULARVM solarium.

Est ea Solis plaga, intra quam primariae Solis Maculae sese videntur continere, suaeque itinera absolueri, quæ secundum longitudinem concipienda, est Eclipticæ parallela, & in patente Solis hemisphærio ab horizonte orientali in occidentalem usque extenditur, & hinc per hemisphærium latens, ad orientem usque in semet redit, ita ut Solem medium quasi una aliqua fascia præcingat; latitudine utrinque ab Ecliptica versus polos eiusdem excurrit.

Cuius excursionis licet certus & præcise omnino limes non habeatur, hætenus tamen ex habitis tot annorum observationibus, triginta latitudinis gradus in unam partem; seu versus polum, eundem excessisse non videtur: tamen si spectando Faculas & umbras secundarias, ab ipsis polis sæpe non multum absit. Vide observationum Imaginem, septimam Februarij, pag. 185. tertiam Martij: p. 191. Iulij à die 12. ad 22. p. 231. Nouembris primam, pa. 273. & à die 6. ad 22. p. 275. necnon à 15. Decembris omnes anni 1625. p. 277. Tandem quæ est à die 24. Februarij ad 15. Martij anni 1626. p. 187.

II.

Quod dixi Zonam esse Eclipticæ parallelam, intelligendum est de circulis qui per maximam Macularum ab Ecliptica remotissimarum declinationem, ducuntur eidem paralleli: & hic est Zonæ quasi quidam terminus & campus limitaneus; si vero de Zona ipsa, formali, & via quam Maculae & Faculae designant loquamur, ipsa componitur ex innumeris Macularum vestigijs itinerarijs, inter sese flexibus inextricabilibus & spirabilibus implicatis, & Eclipticæ nunquam æquidistat, sed eandem semper secat, & situ quasi rectilineo bis in anno, secante se in Ecliptica decussatim, idque in Decembri & Iunio; situ vero curvilineo, atque ad Eclipticam inclinato, in Martio & Septembri, pro varietate nimirum motus Macularum, menstrui incedit, &c.


Huius occasione Zonæ, Sol in Zonas quinque siue climata haud inconcinne videtur posse distribui. Nam Zona principalis & media, est de qua agimus hic via Macularum regia, quæ & propter maximam Facularum copiam torrida, & propter motus vehementiam violentiamque intempesta, atque adeo ob perpetuam Macularum Facularum atque Umbrarum mutationem, tumultuaria, inquieta, turbulenta dici potest.

Duæ alteræ huic utrinque versus ambos polos adiacentes sunt Zonæ quietæ & pacatæ, quarum limites sunt Zona media modo explicata, & duæ polares. Latitudo cuiusvis istarum interiectarum est graduum 53. Maculas Faculasve primarias raro habent, secundarijs scatent fere semper.

Duæ extremæ inter polos Eclipticæ & circulos polares (ideoque polares dicendæ) clauduntur, latitudinem habent graduum septem. Superficies istarum quasi semper equabiles, uniformes, & quietæ apparent: propterea quod ibidem solaris globi quies satis magna existat, nam axis Macularum annuo motu contranitens motui diurno Soli non multum exagitat, uti ostensum supra est, & motus diurnus est ibi multo lentior quam ad medium Solis.

Itaque Sol in Zona polari ordinariè pacatus apparet; in laterali paullo turbatior; in media maximè varius & turbulentus visitur: tamen si totas etiam subin-

Solaris superficie distinctio in Zonas quinque.



I.

subinde ferias agere & æquabiliore vultu arradiare & veluti nobis arridere soleat.

Quantum Solis horizon sensibilis ab horizonte vero; seu apparens Solis circulus à Maximo eiusdem differat?

CAP. III.

CVM certum sit Solem oculo esse maiorem, certum quoque est, de Sole minus quàm dimidiam cerni: vnde certum quoque est, eum in Sole perimetrum, qui à potentia videndi in Sole circumscribitur, perimetro circuli solaris Maximi minorem esse. Et quanquam propter maximam oculi à Sole distantiam, duorum istorum circulorum in magnitudine differentia pæne evanescat: quia tamen huius rei tractationem initio capitis secundi promisi, & in ea rerum, valde vtilium doctrina conspicua continetur, superfedere nequivi, quin fidem datam liberarem: quod vt efficacius præstem, accipe sequens

L E M M A.

Si in protracta vtcunque dati circuli diametro, assumatur punctum quoduis extra circulum, ex eoque excitetur tangens circuli, & ad protractam tangentem exeat altera diameter, priori perpendicularis; itemque ex contactu ducatur ad centrum radius, atque ex comuni diametri primo protractæ necnō tangentis puncto, ad dati circuli centrū maior descriptus sit circulus: secabuntur tam latera triangulorum, quam circulorum perimetri proportionaliter.

*Constructio
propositio-
nis.*

Datus sit in adiecto Schemate, circulus $abcd$, & per eiusdem centrum a , protracta sit diameter bd , vtcunque in e , vsque; ex hoc deinde puncto acta sit dati circuli tangens, quæ alteri diametro ca , ad priorem bd , perpendiculari, & protractæ occurrat in puncto g ; postea ex f , contactu, ducta sit fa , & ad interuallum ae , descriptus sit ex e , circulus hai ; hisce positis.

II.

Aio duo triangula efa , afg , esse rectangula similia, & tangentem eg , sectam esse ratione media in f ; itemque esse, vt tota peripheria hai , maioris circuli, ad totam dfb , minoris; ita segmentum siue arcum ka , ad segmentum siue arcum fl : quod sic demonstratio.

Angulus eag , est rectus ex hypothese; angulus efa , est rectus ex contactu: igitur duo triangula eag , efa , sunt rectangula, & habent angulum ad e , communem; reliquus ergo ega , est reliquo efa , æqualis. Rursus duo triangula efa , afg , habent duos angulos ad contactum f , rectos; & duos, ega , caf , vt modo probatum, æquales; igitur & reliquum afg , reliquo gaf , æqualem. Similia sunt ergo triangula efa , & afg ; & latera æqualibus angulis opposita homologa. Ergo vt ef , ad fa ; sic af , ad fg . & sic linea eg , in puncto f , est secta ratione media per fa .

Rursus quia anguli afg , & fag , probati sunt æquales, arcus ak , circuli maioris, & fl , minoris illis subtensi sunt similes: ergo vt tota peripheria maioris circuli ad totam minoris; sic arcus ak , ad arcum fl . & hæc erant demonstranda.

Ex quibus demonstratis, facile respondetur ad quæsitum. Si enim circumlum $bmdf$, ponamus Solem, & hai , Eclipticam; & e , locum obseruati ex terra Solis: dico id quod ex arcu solari patente mdf , restat ad medium vsque l , & c , nempe arcum fl , & mc , simul, tantum esse ad Solis perimetrum, quantum arcum Eclipticæ patefacit visualis Solis diameter fm , quem arcum, na , k , intercipiunt duæ tangentes seu radij visorij extremi, em , & ef , in punctis n , & k .


Cognito igitur angulo visorio fem , per obseruationes sedulas, seu diametro Solis visuali fm , habebitur etiam m arcus in

Eclipticæ $k a n$.

Vnde noua
exur-
git Quæ-
stio.

55

Quanta



I.

Quanta sit visibilis Solis diameter, in minutis Eclipticae?

Omissis multis, alibi vel tractatis vel tractandis, dico præter communem Astronomorum sententiam, Solem visualem multo esse maiorem, quam ipsi statuunt. Etenim, ut postea fuse declarabitur; constat apparentem eius diametrum dum in 90° , moratur, offerre sese minorum $46'$. minimum. Sed nos maioris certitudinis ergo demus illi in sententia Tychonis tantum minuta $32'$. igitur ad hoc ut Solis dimidium cernamus, plus non desunt, in circulo solari, ex modo demonstratis, quam minuta prima 32 . unius gradus, qualiū graduum est Solis circumferentia tota, 360 . idest minorum primorū 21600 . Iam si hunc numerum, diuidamus bifariam, habebimus pro semicirculo Solis maximo 10800 . à quo numero si auferantur 32 . m. remanebunt $10768'$. pro Solis arcu patente; si addantur, exurgent $10832'$. pro eiusdem arcu maximo latente. Quare si habeamus cursum

II.

1 aliquem alicuius Maculae in patenti arcu dierum, verbi gratia 13 . & horarum 12 . hoc est horarum 324 . dabit nobis ex regula proportionum arcus latens
5 horas 325 . & scrupula horaria $55'$. unde arcus latens superabit arcum patentem hora 1 . scrupulis horarijs primis 55 . & sic vna aliqua Macula secundum circulum Solis maximum delata,
10 commoraretur in occultato eiusdem hemisphaerio diutius hora vna, scrupulis quinquagintaquinque, quam in manifesto. Minuta vero 32 . quibus arcus apparens ab occulto differt, faciunt in
15 circulo Solis maximo passus 175087 . miliaria Romana 175 . Germanica $43\frac{3}{4}$. Igitur secundum hanc Tychonis hypothesin, spatium id quod circum
20 circa à quouis tangentis radij puncto ad medietatem Solis restat, in arcu circuli maximi numeratum, complectetur passus $87543\frac{1}{2}$. hoc est miliaria Romana 87 . cum passibus $543\frac{1}{2}$. Milliaria Germanica 21 . cū passibus $3543\frac{1}{2}$.
25 Vnde si Dominus Deus vel animam aliquam damnatam, vel ipsum Luciferum

I.


constitueret ad punctum e , & iuberet super lineam $b e$, infinite protractam, ex parte e , eo usque ambulare, quousque radij visorij $e f$, atque $e m$, ad media Solis puncta c , & l , peruenirent; etiam si spiritus ille in omnem aeternitatem ambularet, etiam si celeritate infinita ferretur; tamen radij visorij ad media Solis puncta c , & l , nunquam peruenirent, non obstante quod semper propius propiusque accedant, & semper plus de Sole videatur, quam visum erat ante: medius tamen Sol in aeternum, etiam ab oculo infinitae virtutis non videbitur.

Rursus discessu plus de Sole videbitur, sed minus apparebit, quia angulus

$m e f$, semper minuetur; accessu minus de Sole cernetur, sed amplius apparebit, quia angulus $f e m$, visorius augebitur. Suppono autem oculum spectatorem in puncto e , Sole minorem.

Hoc Lemma in rebus Opticis & Astronomicis habet usum incredibilem; nam oculus ex centro circuli aspiciat alium circulum extra constitutum, scietur ex angulo visorio, quanta sit portio arcus aspecti circuli. Eodem modo, quanta sit portio apparens de conspecta sphaera, de conspecto cylindro.

Hac eadem in apparentes siderum globos transferre licet. Plura alia ingenioso Lectori considerata studio relinquo.



I.

II.

DE APPARENTE SEU VISIBILI Solis Diametro inuenienda, Disquisitio.

C A P. I V.

POST inuentum & determinatum verum Macularum & Facularum solarium locum, qui est ipsa Solis superficies, consequens est, vt aliquid de Magnitudine ipsarum decidamus. Cum enim ex obseruatis, Macularum ad Solis circulum ratio magnitudinis habeatur; patet, si absoluta Solis magnitudo detur, datum etiam iri Macularum.

Visualis Solis diameter necdum plene cognita.

Cæterum, tametsi inter omnia quæ Deus in vsum generis humani condidit, Sole nihil sit notius: ipsius tamen absoluta magnitudo, à sole condito, vsque huc, perfectè cognita non habetur. Laboratur enim in hanc vsque horam, ab Astronomis de cognoscenda & definienda ipsius visuali diametro; sine qua in eius veram quantitatem deuenire est impossibile.

Deinde in assignanda ipsius à Terris distantia vehemèter insudatur, sine qua rursus veram ipsius magnitudinem pronuntiare non possumus. Hæc igitur sunt, quæ Macularum quoque veram, & absolutam magnitudinem in certa aliqua mensura cognitu atque enunciatu difficilem reddunt. De qua tamen multa præclara dici, atque decerni possent, si solaris globi mensura aliqua nota esset; qua cum destituti simus, ex ijs, quæ ab alijs traduntur postea discurremus.

Nunc vt aliquid ex proprijs etiam afferamus, modum solaris diametri visualis inuestigandi producemus, non vt ex eo statum. Quæstionis finire, & visibilem eiusdem diametrum in præcis minutis certam atque indubitatam statuere hac vice velimus, sed vt peritorum hac super re iudicium latque sententiam audiamus, & occasionem veritatis eruenda, multosque errores propulsandirationem aliquam solidam ostendamus. Nam si modus quo vtor, fallacia caret, euident est, ianuam certam ad res in Astronomia incredibiles patefaciendas apertam esse; si vero, quod equidem non video, occulta quedam

1 deceptio, aut natiua quedam vis hucusque optice abscondita, praxi huic inesset, gratias habebō, quicunque latentem veritatem deprompserit, & errandi ansam tam mihi quam alijs amputauerit.

Visualem Solis diametrum facilis indagandi modus.

10 In dato tigillo ligneo, per figuram præsentem a b c d e f, parallelepipedo, recto & politè planato, longitudinis 10. 20. aut 30. pedum, diuisa sit linea g h, superficiiei a b e f, media, in partes æquales, mille, aut decies, aut, quod optabilius, centies mille, vel amplius. ad finem autem præsentis negotij non est opus totam lineam in tot particulas distinguere, sed sufficit eiusmodi habere centum, qualium tota est mille, aut ducentas qualium tota est decem milium, &c. diuisa ergo hoc modo recta g h, erigatur perpendiculariter ad tigillum lamella quadrata metallica a b i k, in puncto l, perforata, foramine quam fieri potest physicè minimo. tum in altero tigilli fine, statuatur asserculus chartifer m n e f, etiam ad rectos, cui affixa sit charta o p q r: his ita positis, paratum erit instrumentum obseruatorium, pro indaganda Solis diametro visoria.

35 *Vsus sue praxis.*

40 Intra cameram clausam vndique, ita vt nil lucis penitus vsquam intret, oppone instrumenti laminam a i, Soli s t u, ita vt per vnicum foramen l, traluceat in chartam q o, ibique depingat lucidam sui speciem circularem x y z; quo facto, si extento circino eiusdem diametrum x z, acceperis, eamque in lineæ g h, consignatis partibus mensuraueris, peruenies illarum beneficio in visualem diametri solaris notitiam, partibus minorum determinatis comprehensam, vt paullo post doceberis.

I.
DEMONSTRATIO.*Præ eos
prædictæ de-
monstratio.*

Radij Solis ux , & sz , sunt rectilinei ex natura emanantis lucis & communi Opticorum doctrina, & quia foramen l , minimum quantum potest fieri, assumitur, multoque minus quam sit hic expressum, ideo in eodem sese dicti radij interfecabunt, fietque ipsum duorum radioforum Solis conorum lus , & lxz , vertex communis, eritque conus lus , situ recto, lxz , situ everso; & illius quidem basis erit apparens Solis circulus usu , huius autem projecta Solis imago xzx . Cumque axis ty , per utriusque coni centra t , y , & verticem l , incedens, assumatur ex praxi bona observatoria, rectæ gh , parallelus, recta autem gh , tam plano $hemf$, quā lamellæ $gbik$, ad rectos sit angulos, in punctis g & h , erit quoque axis ty , eisdem ad rectos, in punctis t , & y , per 8. vndecimi. Et quia idē axis ad circulum Solis usu , in puncto t , rectus insistit, idem circulus Solis erit lamellæ ia , & tabellæ chartiferæ fn , parallelus, per 14. vndec. Igitur planum per axem ty , faciet in basibus conorum sectiones us , & xz , parallelas, per 16. vndecimi. Anguli ergo subalterni ad s , & z , item ad u , & x , inter se æquabuntur; sunt autem & anguli ad verticem l , oppositi inter se æquales; æquiangula igitur sunt duo triangula lus , & lxz . Latera igitur in utrisque homologa, inter se sunt proportionalia; latus videlicet zl , lateri ls ; & xl , lateri lu , & basis xz , basi us . Est autem xz , disci solaris xzx , in chartam $opqr$, projecti diameter, quemadmodum us , eiusdem diameter exemplaris in ipso Sole.

*Regula in-
dagandi quot
habeat vasa
Solis diame-
ter minuta.*

Cognita igitur diametro xz , in partibus lineæ gh , cognoscetur etiam us , eo quod sint proportionales. Ratio autem diametri xz , ad lineam x , vel lz , habetur, si circino inquiratur, quoties diameter in alterutra dictarum contineatur; aut si dimidium dictæ diametri quadras, & productum quadrato axis ly , addas, ex toto deinde radicem quadratam extrahas; erit enim ea recta lz , vel lx .

Angulum autem xlz , acquies, si axem ly , constituas in expositis partibus lineæ gh , quæ est axi semper æqua-

lis, sinum totum, & partes lineæ xy , vel zy , ex praxi observandi & doctrina iam tradita cognitæ, facias semissem chordæ: unde si fiat ut axis ly , ad sinum totum, ita yx , vel yz , ad aliud & opereris secundum intentas partes lineæ gh , prodibit sinus quæsitus, & ipsi respondens arcus dabit angulum xly qui est visualis semidiametri solaris quantitas subtendens anguli quæsitum xlz , dimidium, cuius duplum exhibebit angulum totum, &c. Cuius postea exempla plura dabo.

15 *Lucidi Solis circuli per foramen l , immisi, proprietates, quarum multa etiam inferius ubi de colore Solis agitur, verberius explicantur.*

20 *Prima. Lux huius imaginis solaris yzx , non est ubique æque intensa, sed in medio clara, verius margines ad quam tam semidiametri partem valde debilis & obscura id quod alibi fusius declarabitur.*

25 *Secunda. Neque decrementum ipsius uniforme, sed difforme videtur; in medio enim magno spatio æquabili ferme nitore candicat, deinde vehementer ad extrema deficit, in colorem ex rufo & furuo mixtum.*

30 *Tertia. Tota lux à centro ad margines usque continua, nusquam interrupta visitur.*

35 *Quarta. Hæc lucis temperies, in Imagine Solis sæper in omni anni tempore, quacunque diei hora, sub altitudine Solis qualibet, reperitur, si eodem foramine, ad eandem distantiam chartæ obserues.*

40 *Quinta. Si eodem retento foramine l , chartam rpi , propius admoucas, circulus lucidus minuetur, & margines minus lucidi etiam contrahentur in arcibus versus centrum y , si amoucas chartam, omnia dilatabuntur.*

45 *Sexta. Imago hæc Solis, posito foramine rotundo, est semper circularis, præterquam, quando Sol circa horizontem à vaporibus contrahitur.*

50 *Septima. Quando Sol supra horizontem emittitur, ante Solem ipsum corporaliter visum & arradiantem, huius imaginis in charta nil penitus appa-*

*Speciei sola-
ris immissæ
proprietates*

Instrumentum

Observatorium pro capiend
da uisuali Solis Diametro.

Observationes Visualium Solis Diametrorum
Annis 1625, 1626, 1627, Romæ.

AB, Linea ducentarum decem particularum, qualis
tota foraminis à charta distantia, fuit 10000.

A. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 B

Annus	Mensis	Dies	Diametri uisuales obseruata.	per Foramen
1625	Octob.	15.	$\frac{39}{114} \frac{47}{137} \frac{51}{150}$	Minimum.
	Nouēb.	23.	$\frac{35}{100} \frac{37}{115} \frac{41}{120} \frac{45}{130}$	Minimum.
		28.	$\frac{38}{110} \frac{45}{120} \frac{49}{143}$	Minimum.
	Decēb.	25.	$\frac{37}{106} \frac{40}{117} \frac{43}{125} \frac{37}{136}$	Minimum.
1626	Mart.	23.	$\frac{39}{115} \frac{42}{122} \frac{47}{136} \frac{53}{155}$	Minimum.
	Iulij.	14.	$\frac{36}{103} \frac{41}{119} \frac{43}{125} \frac{47}{137}$	Minimum.
	Octob.	19.	$\frac{43}{125} \frac{55}{160}$	Minimum.
	Decēb.	21.	$\frac{32}{93} \frac{38}{110} \frac{48}{138}$	Minimum.
		22.	$\frac{30}{87} \frac{37}{107} \frac{42}{122} \frac{48}{140}$	Minimum.
		a.	$\frac{31}{90} \frac{38}{112} \frac{47}{136} \frac{56}{165}$	1. Minimum.
		a.	$\frac{55}{160}$	2. Maius.
		23.	$\frac{30}{85} \frac{36}{104} \frac{41}{120} \frac{50}{144}$	3. Ampli ⁹ priore.
		a.	$\frac{29}{83} \frac{32}{93} \frac{39}{114}$	4. Mai ⁹ priore.
		a.	$\frac{29}{84} \frac{33}{95} \frac{37}{105}$	5. Maximum.
1627.	Iunij.	21.	$\frac{33}{95} \frac{38}{110} \frac{48}{140} \frac{53}{155}$	Minimum.
	Sept.	23.	$\frac{37}{108} \frac{45}{130} \frac{49}{142} \frac{56}{162}$	Minimum.

I.

apparet, etiamsi vel aurora maxime rubicunda, vel candor cæli sereni splendidissimus vicinū Solem anteuertat; mox autem ut Sol primo ictu emicat, huius imaginis initium in charta elucet, situ tamen inuerso; quæ ad corporis solaris emerfionem proportionaliter crescit. in ipso autem puncto, quo Sol hori-

II.

zontem totum superat, hæc imago, circulum suum, & non ante complet.

Octaua. Similia fiunt Sole sub horizontem descendente, nam in momento quo finitorē Sol attingit, hæc imago circulo suo secari incipit, qui totus in charta extinguitur, quando Sol vltimum radium occultat, reaccenditur,

PPP 3 fivt

I.

si ut saepe fit, Sol resilit. Post occubitum Solis, tametsi caelum ardeat & fulgoribus lucidissimus in eius vicinia excandescat, in chartam tamen nil nisi tenebrae merissimae incumbunt, neque luculae ullius indicium praebetur.

Nona. Eadem tentavi circa meridiem, ubi Sol altissimus, circumiectum aethera vehementissime illustrat: dum igitur post remotum parietem latitasset, excepi prodeuntem: & vicissim dum post alium parietem sese subduxisset, observavi abeuntem, & nihil ante, nil post ipsum, sed solum in ipsius praesentia chartam circulo lucido illuminari sensi, integro vel fracto, prout Sol integer aut sectus apparuit. Et ne vlla dubitationis ullius vel leuissimae umbra mihi alijsve remaneret, constitui qui simul Solem aduentantem aut abeuntem observaret intuitu libero, Helioscopico, & Telioscopico in chartam: omnibusque interdixi ne alter alterum de prima vel ultima Solis absentia monerent, sed hanc provinciam mihi relinquerent: ego itaque intentus in meam imaginem, quando Sol ultimum in horizonte orientali punctum, vel primum & ultimum in occidentali tenuit, ex meae solius imaginis aspectu monui: & sicut ego in charta, ita ipsi experti sunt visu libero, Helioscopico & Telioscopico: eademque circa meridiem experti sumus. Et has experientias omnes Romae, & olim alibi quoque verissimas opere ipso comperi.

Decima. Peripheria huius solaris imaginis non est munditer praecisa, sed molliter lacera & aspera, ut a tenebrarum consortio aegre discernatur, praesertim si oculus vicinus conatum adhibeat: nam si paullulum absistat, distinctione confinium inter lucem & tenebras maiorem assequetur: id quod etiam alijs umbris a Sole projectis familiare est.

Vndecima. Imago haec caeteris omnibus paribus, minima est, Sole Apogaeum occupante, maxima Perigaeum, media in distantia media. Excessus tamen maximae supra minimam, aut huius defectus ab illa aegre acquiri potest, ob lucis marginalis tenuitatem, & perimetri inaequalem praecisionem.

Duodecima. In hoc observandi modo, haec perpetua & constans proprietas

II.

reperitur, quod quo minus foramen adhibetur, caeteris omnibus paribus, circulus solaris lucidus maior extensione, sed minor intensione luminis euadit: quando foramen maius intercedit, minuitur extensio circuli luminosi, sed intensio augetur, id ipsum tamen intra certam magnitudinis metam verum, quam usus & experientia facile ostendit observatori sedulo. Nam si foramen notabilis magnitudinis adhibeas, figura Solis maior euadet, quam per foramen minus, &c.

Instrumentum Observatorium, & visuales diametri observatae, oculis subiiciuntur, & explicantur.

CAP. V.

TIGILLVM seu perticam parallelepipedam c f, bene planatam & rigide extensam, una cum suis asserculis b K, & e m, Solemque t, & eius exceptam speciem y, satis explicata habes, in conscripto modo, & praxi, eorumque demonstratione, nunc reliqua huius Tabulae, pro rei exigentia declaro. Titulus igitur in summo, post instrumenti observatorii ideam, ostendit hasce diametrorum observationes esse factas Romae, annis tribus, vigesimo nimirum quinto, sexto, & septimo supra millesimum sexcentesium, ubi autem & quo mense aut die, quibus testibus, & qua accuratione, aut ad quem finem sint ea peracta, non indicat; quaedam igitur istorum significantur in ipso schemate, ut tempus, & partes diametrorum consignatarum, ipsa quoque assumpta foramina, de quibus postea fusius edisseram; quaedam in hoc diagrammate subticentur, de quibus nunc singulatim monendus est Lector.

Finis harum Observationum.

Non est iste, quem sibi fortassis imaginaretur ardens istarum rerum inquisitor, praecisa nimirum visualium Solis diametrorum determinatio: iste inquam finis per hasce observationes a me intentus non est, neque enim rem tantam, & ipsis etiam Astronomis novam, inauditam,

Instrumentum				
Observatorium pro capiendae visuali Solis Diametro.				
Observationes Visualium Solis Diametrorum, Annis 1625, 1626, 1627, Romae.				
AB. Linea ducentarum decem particularum, quatuor tota foraminis à charta distantia, fuit 10000.				
A. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 B				
Annus	Mensis	Dies	Diametri visuales observatae	per Foramen
1625	Octob.	15.	a. $\frac{39}{114} \frac{47}{127} \frac{51}{150}$	Minimum.
	Novēb.	23.	a. $\frac{35}{100} \frac{39}{115} \frac{41}{120} \frac{45}{130}$	Minimum.
		28.	a. $\frac{38}{110} \frac{45}{120} \frac{49}{143}$	Minimum.
	Decēb.	25.	a. $\frac{37}{106} \frac{40}{117} \frac{43}{125} \frac{37}{136}$	Minimum.
1626	Mart.	23.	a. $\frac{39}{115} \frac{42}{122} \frac{47}{136} \frac{53}{155}$	Minimum.
	Iulij.	14.	a. $\frac{36}{103} \frac{41}{119} \frac{43}{125} \frac{47}{137}$	Minimum.
	Octob.	19.	a. $\frac{43}{125} \frac{55}{160}$	Minimum.
	Decēb.	21.	a. $\frac{32}{93} \frac{38}{110} \frac{48}{138}$	Minimum.
		22.	a. $\frac{36}{87} \frac{37}{107} \frac{42}{122} \frac{48}{140}$	Minimum.
		23.	a. $\frac{31}{90} \frac{38}{112} \frac{47}{136} \frac{56}{165}$	1. Minimum.
			a. $\frac{55}{160}$	2. Maius.
			a. $\frac{36}{85} \frac{36}{104} \frac{41}{120} \frac{50}{144}$	3. Ampli ⁹ priore.
		a.	$\frac{29}{83} \frac{32}{93} \frac{39}{114}$	4. Mai ⁹ priore.
			a. $\frac{29}{84} \frac{33}{95} \frac{37}{105}$	5. Maximum.
1627.	Iunij.	21.	a. $\frac{33}{95} \frac{38}{110} \frac{48}{140} \frac{53}{155}$	Minimum.
	Sept.	23.	a. $\frac{37}{108} \frac{45}{120} \frac{49}{142} \frac{56}{162}$	Minimum.

I.

tam, paradoxam & forsitan suspectam, insalutato, & inconsulto Peritorum Senatu, in publicum veluti certam producere ausim.

Finis ergo istarum mearum curarum fuit:

Primo, Modum observandi Viris in hoc genere versatis exhibere effectum illius edocere, & iudiciū audire: & quod

II.

I nunc quoque facio,

Secundo. Occasionem dare, Modi huius, si probus est, amplectendi, & usurpandi, ipsoque facto, ea quæ promo, periclitandi, & sic veritatis firmiter stabilizandæ: si vitio latente infectus, illud ipsum, boni publici causa, proderet.

Tertio. Supposita hac observandi ratione, tanquam legitima quemadmodum

I.

dum esse omnino mihi persuadeo, in genere ex hisce obseruatis ostendere, Solis visibilem diametrum, haecenus credita, longe maiorem esse, & Astronomis ansam præbere, hac facili & parabili via, ipsam in specie indagare; quod si fecerint, experientur me non de nihilo monere.

Minor iusta Solis diameter semper est accepta, idque studio.

Nam in hisce obseruationibus, mihi summo studio à maxima, quam visus aspexit, circuli solaris amplitudine sumenda temperaui, vt argumentum pro magnitudine depromendum, maiori robore polleret.

Si namque apparens diameter minor quam affulserat, assumpta, omnes haecenus assignatas, multum longitudine antecedit, multo amplius maxima apparentium superaret.

Visualis Solis diameter est opinione multo maior.

Finis igitur in hisce afferendis est, generatim palam facere, Solis diametrum aspectabilem opinione inueterata multo maiorem esse, quanto autem maior sit, audita sapientum Astronomorum sententia, suo tempore patebit.

Aliae circa has Obseruationes Circumstantiae.

Factae sunt aliquae in Domo Professae Societatis nostrae, pleraeque ferè in Collegio nostro Romano, coram viris prudentibus, & ea quae hic conscribo oculis contuentibus: similia etiam olim feci in Germania, Ingolstadij, Oeniponti, Fryburgi, Viennae, Pragae: & semper eisdem foraminum effectus expertus sum, magnitudinesque, haecenus receptis maiores.

Reliquorum in Tabula comprehensorum explanationes.

Vera linea particulae ad quas haec diameter sit obseruata, & mensurata.

AB, est linea in partes ducentas & decem diuisa, sub magnitudine vera, quam habebant in ipsa pertica, & eius linea gh. vnde sumere potes ipsius perticae longitudinem totam: etenim si lineam A 200. quinquies continuaueris, acquies partem decimam tigilli gh, ex qua totam perticae extensionem facile aestimabis, &c.

Non autem ob hanc tantum causam ob oculos hanc lineam statuo, sed multo magis, vt ex ea allatas diametros in

II.

partibus lineae mensures, atque ex illis angulum visorium practice elicias: vt paullo post dicam.

Reliqua figurae pars partita est in quinque descendentes series seu columnas, quibus singulae in summitate superstant inscriptiones, indicantes, quid in quauis serie cuiusvis columnae contineatur.

Prima itaque ad sinistram inscriptionem annorum continet; secunda mensium; tertia dierum, quibus obseruatum fuit; quarta ipsas diametros obseruatas, cum numeris partium, & minorum, quinta & vltima foraminis, per quod Sol immissus fuit, magnitudinem denotat: si tamen magnum dicendum est, quod angustia sua etiam visum bonum effugit.

Obseruationes igitur allatas habes, anni 1625. peractas mensibus, Octob. Nouemb. Decemb. diebus annotatis. Anni 1626. perfectas mensibus Martio, Iulio, Octobre, Decembre. Anni 1627. absolutas mensibus Iunio, & Septemb. cum respondentibus columna tertia diebus.

Diametrorum explanatio.

Diametri visuales notatae sunt characteribus alphabeticis a, b, c, d, &c. quarum quaelibet tot obseruationes atque diametros obseruatas denotat, quot litteras apud numeros consignatas habet. In exemplo, diameter a b, ad diem 15. Octobris, anno 1625. obseruata, iuxta numeros adscriptas habet litteras, b, c, & d; signum est tres diametros ex immissa Solis idea esse transumptas, videlicet a b, vnam; a c, alteram minorem; & demum a d, tertiam & minimam, in hac obseruatione.


Explicatur diameter.

Iam si scire desideras, quot partium fuerit a b, quales in linea A B, sunt praescriptae, aspicias numerum immediate ad b, subscriptum, & inuenies 150. quibus immediate supra, respondent minuta prima 51.

Eodem modo, diametro a c, respondent partes 137. infra; minuta 47. supra.

Similiter, visuali diametro a d, tribuentur particulae 114. minuta prima 39.

Per



Observationes Visualium Solis Diametrorum,
Annis 1625, 1626, 1627, Roma.

AB. Linea ducentarum decem particularum, qualis
tota foraminis à charta distantia, fuit 10000.

A. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 B

Annus	Mensis	Dies	Diametri visuales observatae.	per Foramen	
1625	Octob.	15.	$\frac{39}{d} \frac{47}{c} \frac{51}{b}$ 114 137 150.	Minimum.	
		Novēb.	23.	$\frac{35}{e} \frac{39}{d} \frac{41}{c} \frac{45}{b}$ 100 115 120 130.	Minimum.
			28.	$\frac{38}{d} \frac{45}{c} \frac{49}{b}$ 110 130 143.	Minimum.
	Decēb.	25.	$\frac{37}{f} \frac{40}{e} \frac{43}{d} \frac{37}{c}$ 106 117 125 136.	Minimum.	
1626	Mart.	23.	$\frac{39}{e} \frac{42}{d} \frac{47}{c} \frac{53}{b}$ 115 122 136 155.	Minimum.	
		Iulij.	14.	$\frac{36}{e} \frac{41}{d} \frac{43}{c} \frac{47}{b}$ 103 119 125 137.	Minimum.
	Octob.		19.	$\frac{43}{c} \frac{55}{b}$ 125 160.	Minimum.
		Decēb.	21.	$\frac{32}{d} \frac{38}{c} \frac{48}{b}$ 85 110 138.	Minimum.
	22.		$\frac{30}{e} \frac{37}{d} \frac{42}{c} \frac{48}{b}$ 87 107 122 140.	Minimum.	
	a.		$\frac{31}{e} \frac{38}{d} \frac{47}{c} \frac{56}{b}$ 90 112 136 165.	1. Minimum.	
	a.		$\frac{55}{b} \frac{160}{a}$	2. Maius.	
	23.		$\frac{30}{e} \frac{36}{d} \frac{41}{c} \frac{50}{b}$ 85 104 120 144.	3. Ampli ⁹ priore.	
1627	Iunij.	a.	$\frac{29}{d} \frac{32}{c} \frac{39}{b}$ 83 95 114.	4. Mai ⁹ priore.	
		a.	$\frac{29}{d} \frac{35}{c} \frac{37}{b}$ 84 95 105.	5. Maximum.	
	Sept.	21.	$\frac{33}{e} \frac{38}{d} \frac{48}{c} \frac{53}{b}$ 95 110 140 155.	Minimum.	
		27.	$\frac{37}{e} \frac{45}{d} \frac{49}{c} \frac{56}{b}$ 108 130 142 162.	Minimum.	

I. Per quantum autem foramen hæ ob-
servationes sint transactæ, indicatur
versus dextram arcola ultima, scilicet
per minimum, quod visu etiam perspi-
caciſſimum fugit.

Eadem ratione singulas diametros,
cum adscriptis litteris, & numeris intel-
liges, & examinabis; partes quidem
in linea A B, minuta autem per Ta-

bulas sinuum, & Tangentium, hoc
modo.

Partes inuentas diuides bifariam,
deinde facies ut fiat sicut 10000, par-
tes perticæ ad sinum totum, ita dimi-
dium partium ad aliud, prodibit enim
sinus semidiametri visualis quæſita. Ut
in exemplo dicta diameter a b, fuit par-
tium 150. quæ diuisa bifariam dant 75.
si er-

I.

dum esse omnino mihi persuadeo, in genere ex hisce obseruatis ostendere, Solis visibilem diametrum, haecenus credita, longe maiorem esse, & Astronomis ansam præbere, hac facili & parabili via, ipsam in specie indagare; quod si fecerint, experientur me non de nihilo monere.

Minor iusta Solis diameter semper est accepta, idque studio.

Nam in hisce obseruationibus, mihi summo studio à maxima, quam visus asperxit, circuli solaris amplitudine sumenda temperaui, vt argumentum pro magnitudine depromendum, maiori robore polleret.

Si namque apparens diameter minor quam affulserat, assumpta, omnes haecenus assignatas, multum longitudine antecedit, multo amplius maxima apparentium superaret.

Visualis Solis diameter est opinione multo maior.

Finis igitur in hisce afferendis est, generatim palam facere, Solis diametrum aspectabilem opinione inueterata multo maiorem esse, quanto autem maior sit, audita sapientum Astronomorum sententia, suo tempore patebit.

Alia circa has Obseruationes Circumstantia.

Factæ sunt aliquæ in Domo Professæ Societatis nostræ, pleræque ferè in Collegio nostro Romano, coram viris prudentibus, & ea quæ hic conscribo oculis contuentibus: similia etiam olim feci in Germania, Ingolstadij, Oeniponti, Fryburgi, Viennæ, Pragæ: & semper eisdem foraminum effectus expertus sum, magnitudinesque, haecenus receptis maiores.

Reliquorum in Tabula comprehensorum explanationes.

Vera linea particulae ad quas haec diametri sunt obseruata, & mensurata.

A B, est linea in partes ducentas & decem diuisa, sub magnitudine vera, quam habebant in ipsa pertica, & eius linea g h. vnde sumere potes ipsius perticæ longitudinem totam: etenim si lineam A 200. quinquies continuaueris, acquies partem decimam tigilli g h, ex qua totam perticæ extensionem facile aestimabis, &c.

Non autem ob hanc tantum causam ob oculos hanc lineam statuo, sed multo magis, vt ex ea allatas diametros in-

II.

partibus lineæ mensures, atque ex illis angulum visorium practicè elicias: vt paullo post dicam.

Reliqua figuræ pars partita est in quinque descendentes series seu columnas, quibus singulæ in summitate superstant inscriptiones, indicantes, quid in quauis serie cuiusuis columnæ contineatur.

Prima itaque ad sinistram inscriptionem annorum continet; secunda mensium; tertia dierum, quibus obseruatum fuit; quarta ipsas diametros obseruatas, cum numeris partium, & minorum, quinta & vltima foraminis, per quod Sol immissus fuit, magnitudinem denotat: si tamen magnum dicendum est, quod angustia sua etiam visum bonum effugit.

Obseruationes igitur allatas habes, anni 1625. peractas mensibus, Octob. Nouemb. Decemb. diebus annotatis. Anni 1626. perfectas mensibus Martio, Iulio, Octobre, Decembre. Anni 1627. absolutas mensibus Iunio, & Septemb. cum respondentibus columna tertia, diebus.

Diametrorum explanatio.

Diametri visuales notatæ sunt characteribus alphabeticis a, b, c, d, &c. quarum quælibet tot obseruationes atque diametros obseruatas denotat, quot litteras apud numeros consignatas habet. In exemplo, diameter a b, ad diem 15. Octobris, anno 1625. obseruata, iuxta numeros adscriptas habet litteras, b, c, & d; signum est tres diametros ex immissa Solis idea esse transumptas, videlicet a b, vnam; a c, alteram minorem; & demum a d, tertiam & minimam, in hac obseruatione.

Explicatur diameter.

Iam si scire desideras, quot partium fuerit a b, quales in linea A B, sunt præscriptæ, aspicias numerum immediate ad b, subscriptum, & inuenies 150. quibus immediate supra, respondent minuta prima 51.

Eodem modo, diametro a c, respondent partes 137. infra; minuta 47. supra.

Similiter, visuali diametro a d, tribuentur particulae 114. minuta prima 39.


Per

Instrumentum

Observatorium pro capiendā
visuali Solis Diametro.

Observationes Visualium Solis Diametrorum . Annis 1625, 1626, 1627. Roma.

AB, Linea ducentarum decem particularum, quāvis
tota foraminis à charta distantia, fuit 10000.

A  B

Annus	Mensis	Dies	Diametri visuales observatae	per Foramen	
1625	Octob.	15.	$\frac{39}{114} \frac{47}{137} \frac{51}{150}$	Minimum.	
	Novēb.	23.	$\frac{35}{100} \frac{39}{115} \frac{41}{120} \frac{45}{130}$	Minimum.	
		28.	$\frac{38}{110} \frac{45}{130} \frac{49}{143}$	Minimum.	
	Decēb.	25.	$\frac{37}{106} \frac{40}{117} \frac{43}{125} \frac{37}{136}$	Minimum.	
1626	Mart.	23.	$\frac{39}{115} \frac{42}{122} \frac{47}{136} \frac{53}{155}$	Minimum.	
	Iulij.	14.	$\frac{36}{103} \frac{41}{119} \frac{43}{125} \frac{47}{137}$	Minimum.	
	Octob.	19.	$\frac{43}{125} \frac{55}{160}$	Minimum.	
	Decēb.	21.	$\frac{32}{95} \frac{38}{110} \frac{48}{138}$	Minimum.	
		22.	$\frac{30}{87} \frac{37}{107} \frac{42}{122} \frac{48}{140}$	Minimum.	
		a	$\frac{31}{90} \frac{38}{112} \frac{47}{136} \frac{56}{165}$	1. Minimum.	
		a	$\frac{55}{160}$	2. Maius.	
23.		$\frac{30}{85} \frac{36}{104} \frac{41}{120} \frac{50}{144}$	3. Ampli ⁹ priore.		
1627	Decēb.	a	$\frac{29}{83} \frac{32}{95} \frac{39}{114}$	4. Mai ⁹ priore.	
		a	$\frac{29}{84} \frac{33}{95} \frac{37}{105}$	5. Maximum.	
		Iunij.	21.	$\frac{33}{95} \frac{38}{110} \frac{48}{138} \frac{53}{155}$	Minimum.
		Sept.	27.	$\frac{37}{108} \frac{45}{130} \frac{49}{142} \frac{56}{162}$	Minimum.

I. Per quantum autem foramen hæ observationes sint transactæ, indicatur versus dextram arcola vltima, scilicet per minimum, quod visu etiam perspicacissimum fugit.

Eadem ratione singulas diametros, cum adscriptis litteris, & numeris intelliges, & examinabis; partes quidem in linea A B, minuta autem per Ta-

II. bulas sinuum, & Tangentium, hoc modo.

Partes inventas diuides bifariam, deinde facies vt fiat sicut 10000, partes perticæ ad sinum totum, ita dimidium partium ad aliud, prodibit enim sinus semidiametri visualis quæsitæ. Vt in exemplo dicta diameter a b, fuit partium 150. quæ diuisæ bifariam dant 75. si er-

I.

Si ergo fiat vt 10000. ad 10000000. sinum totum, ita 75. ad aliud, inueniatur sinus 75000. minor sinu 75630. cui respondet 26'. & maior sinu 72721. cui respondent 25.m. & hinc pro semidiametro accepi 25.m. 30. sec. pro tota 51. min.

Iam si idem quærere placet per Tangentes, inuenies idem. Talique modo, per datos duos numeros, perticæ & diametri inuentæ, minuta anguli visorii semper inuenies. Nunc de singulis obseruationibus aliquid dicamus, ex ipsa Autographorum fide.

Annotationes in obseruationes allatas, ex ipsis originalibus desumptæ.

Annotationes in obseruatione 15. Octob. anno 1625. factâ.

Anno 1625. die 15. Octobris immisi Solem per minimum foramen, in domo Professæ, spectantibus P. Christophoro Grünenberger, P. Ioanne Brisselio & nonnullis alijs, accepique eius diametrum non omnino maximam, sed ita vt ambo circini crura à radijs immixtis notabiles intra ipsam speciem umbras projicerent, ex quo constabat, aliquid de specie extare extrorsus, neque extensum esse circinum ad extremam vsque illuminationem; & sic inueni secundum extensionem a b, particulas 150. qualium tota distantia ad immissionis foramen est 10000. accepi autem studio minorem vt magnitudo visa euidentior euaderet. Deinde intraui in speciem Solis, contractis circini cruribus, & in diametro a c, vtrique curta respectu circuli solaris totius, inueni partes 137. tandem ita contraxi circinum, vt in plenum imaginis lumen vtrosque pedum apices figerent, & excepi diametrum a d, vtrique mancam, partium 114. Et sic visibilis Solis diameter, ex prima extensione, esset minorum 51'. ex secunda 47'. ex vltima 39'. Hanc autem minimum admitti debere, vix esse potest vllum apud sapientes dubium, eo quod quartam veluti partem Solis, tametsi illustrem, remiserim, &c. Iam si per inuentas diametrorum a b, a c, a d, partes, diuidas totam distantiam partium 10000. inuenies Solis à terra distantia, secundum acceptas diametros; itaque in prima mensura a b, Sol à terris abesset diametris suis 66. in secunda 73. in

II.

1 tertia 87. id quod in alijs obseruationibus eadem ratione poteris elicere; hic autem exempli causa indicasse sufficiat. Res autem hæc magnum ad Geographiam momentum affert.

Annotatio in obseruationem diei 23. Nouembris anno 1625. factam.

10 Anno eodem 1625. die 23. Nouembris, curtas iterum Solis ad minimum nuperumque foramen immixti diametros accepi, a b, partium 130. a c, partium 120. a d, partium 115. a e, partium 100. & inueni angulos visorios, minorum 45'. 41'. 39'. 35'. Et quanquam in omnibus hisce obseruationibus, ab ostensa Solis magnitudine studio recessi, accipiendo minus, id tamen maxime præstiti in a e, quam ex medio lucidæ speciei abscidi. Peregi autem hæce obseruationes, vt & sequentes omnes in Collegio Romano, in pertica eadem, ad partium earundem decem millium distantiam, foramine minimo.

Notationes in obseruationem die 28. Nouembris anno eodem 1625. factam.

30 Anno & mense eodem, die 28. in præsentia P. Ioannis Erhardi Ziegleri, & P. Christophori Gruenbergeri, ad foramen minimum immixti Solis accepta diameter a b, data opera iusto minor, spectantibus ambobus Patribus, obrulit partes 143. idest minuta 49'. postea amplius ingressus in Solem, accepi curtatam diametrum a c, partium 130. quibus respondent minuta 45'. Tandem ex ipso Solis lucidi meditullio, de quo nemo oculatus & cordatus, tanquam non vera Solis specie ambigat, accepi diametrum a d, partium 110. minorum 38'. Præter hæc ostendi iisdem Patribus immixtum Solem per paullo maius foramen, ad distantiam eandem 10000. partium, notabiliter minorem, sed simul etiam illustriorem, ideoque ex illius admodum nitida portione accepi diametrum partium 120. quæ dedit minuta 41'. Et cum de hisce alijsque experimentis iucundè discurremus, mora fuit quæstio, cur Sol per figuras angulares illapsus, lucem tandem projiciat circulari base terminatam?

Instrumentum				
Observatorium pro capiendā visuali Solis Diametro.				
Observationes Visualium Solis Diametrorum, Annis 1625, 1626, 1627, Romæ.				
AB, Linea ducentarum decem particularum, qualis tota foraminis à charta distantia, fuit 10000.				
A 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 B				
Annus	Mensis	Dies	Diametri visuales observata.	per Foramen
1625	Octob.	15.	a. $\frac{39}{114} \frac{47}{137} \frac{51}{150}$	Minimum.
	Novēb.	23.	a. $\frac{35}{100} \frac{39}{115} \frac{41}{120} \frac{45}{130}$	Minimum.
		28.	a. $\frac{38}{110} \frac{45}{130} \frac{49}{143}$	Minimum.
	Decēb.	25.	a. $\frac{37}{106} \frac{40}{117} \frac{43}{125} \frac{37}{136}$	Minimum.
1626	Mart.	23.	a. $\frac{39}{115} \frac{42}{122} \frac{47}{136} \frac{53}{155}$	Minimum.
	Iulij.	14.	a. $\frac{36}{103} \frac{41}{119} \frac{43}{125} \frac{47}{137}$	Minimum.
	Octob.	19.	a. $\frac{43}{125} \frac{55}{160}$	Minimum.
	Decēb.	21.	a. $\frac{32}{93} \frac{38}{110} \frac{48}{128}$	Minimum.
		22.	a. $\frac{30}{87} \frac{37}{107} \frac{42}{122} \frac{48}{140}$	Minimum.
		a.	$\frac{31}{90} \frac{38}{112} \frac{47}{136} \frac{56}{160}$	1. Minimum.
		a.	$\frac{55}{160}$	2. Maius.
		23.	a. $\frac{30}{85} \frac{36}{104} \frac{41}{120} \frac{50}{144}$	3. Ampli ⁹ priore.
		a.	$\frac{29}{83} \frac{32}{93} \frac{39}{114}$	4. Mai ⁹ priore.
1627	Iunij.	21.	a. $\frac{35}{95} \frac{38}{110} \frac{48}{140} \frac{53}{155}$	Minimum.
	Sept.	23.	a. $\frac{37}{108} \frac{45}{120} \frac{49}{142} \frac{56}{162}$	Minimum.

I.

tam? Putabam ego, quemadmodum
etiam nunc, ex eodem fundamento fie-
ri & decidi, ex quo maius foramen mi-
norem Solem præsentat. Fortior enim
lux utrimq. sensum debilioris suffocat;
& sic, luces illæ angulares, ob sui tenui-
tatem, reliquarum vigore, & abundan-
tia obruuntur, testante id quotidiana
experientia. Sed de hac re alibi si Deo

II.

1 placuerit ex instituto.

Notationes in observationem diei

25. Decemb. anni 1625.

5

Anno eodem, die 25. Decembris, per
minimum foramen, accepi Solis diame-
tros non maximas, sed imagini lucidæ
bene immerfas, a c, partium 136. mi-
nuto.

I.
nutorum 47'. a d, minorem, partium
125. minutorum 43'. tum a e, parti-
cularum 117. minutorum 40'. & tan-
dem a f, in partibus 106. minutis 37'.
Et sic finiebam annum 1625.

A N N V S 1626.

*Annotatio-
nes in obser-
uationes fa-
ctas, anno
1626.*

Huius anni propositas habes obser-
uationes satis multas, mensibus quat-
tuor, Martio, Iulio, Octobri, Decem-
bre, omnes factas in Collegio Romano,
instrumento eodem, ad distantiam ean-
dem, quæ fuerat adhibita in prioribus,
per foramina diuersa, &c.

Die 23. Martij immisi Solem, per
ordinarium foramen minimum, quod
P. Gregorius Vincentius, libero aspectu,
ob paruitatem non vidit. Diameter a b,
quasi maxima, non tamen omnino, par-
tes 155. continebat, quibus minuta 53'.
respondebant; c d, media, in lucem
multum progressa erat; e f, ex ipso nu-
cleo lucido transumpta est. Sol in me-
dio illustris, ad extrema subfuruus, &
non bene præcisus. Accepi autem hæc
distantias ita, vt semper crura circini ab
ipso solari cono, manifestè inumbraren-
tur. Hæc ibi.

Iulij obseruationes peculiare nihil
habent, suos numeros annexos offerunt
more aliarum minores debito diame-
tros præbent.

19. Octobris, exhibui immisum So-
lem, R.P. Petro Antonio Rauizza, nunc
Rectori Parmensi, fuitque visualis dia-
meter a b, non penitus luminoso disco
adæquata, partium 160. minutorum
55'. altera a c, extra omnem contro-
uersiam Solis ipsius, minutorum 43'.

Diebus 21. & 22. Decembris immis-
sum Solem per minimum foramen osten-
di Patribus Iacobo Biderman, & Anto-
nio Iordino, Solemque sub diametris
multo minoribus, quam ipse affulgebat,
circino ex industria traduxi, vt sic vis
maior veritatis appareret.

Eiusdem mensis die 23. in præsentia
Patris Nicolai Zucchi, repetiui summo
studio obseruationes, & per minimum
foramen consignaui diametros, a b, non
quidem maximam, sed tamen extremi-
tati satis vicinam, reliquæ ex luculenta
immagine traductæ sunt.

Deinde per foramina alia quattuor,

I ordine sensim maiora, figuram Solis
proposui, quæ ad maiora foramina sem-
per & sensibilibus minor, sed luce vali-
dior affulsit. Tandem edocui ipso expe-
rimento, paruum admissum aliunde lu-
men, imminuere solaris coni basin, per
foramen haustam, augere demptum.

A N N V S 1627.

Hoc anno Solem examinaui ter, mē-
se Februario, Iunio, & Septembri. Et
accepi diametros extremo limbo satis
vicinas. per incuriam autem Februarij
15 obseruationes in figuram non apposui.
Contigit autem ea cura die 4. quæ dia-
metrum offerebat partium 152., id est
minutorum 52'. Minimam vero ex lu-
culento Solis nucleo hausi partium 93.
minutorum 32'. Excessus ergo maxime
super minimam fuit partium 59. quæ fa-
ciunt maximæ quasi vnā tertiam.
Fulgentem ergo Solis imaginem immi-
nuere vnā tertia diametri, quæ neque
ipsa tamen absolutè sit maxima, por-
tione, & residuam ex interiore coque
copioso iubare decerptam, triginta-
duorum nihilominus minutorum repe-
rire, multum arguit, imo coniungit, in-
tegram Solis diametrum, multo capa-
ciorem esse, quam multorum persuasio
ferat. Cui tamen veluti torrenti, nolo
me è directo in transversum statim op-
ponere, sed sensim grassanti vanitati
35 viam obstruere tento, ideoque & alio-
rum experimenta animique sensa per-
quam lubenter acceptabo: vt veritati
collatis operis, manus porrigamus.

Die 21. Iunij, quo tempore Sol in
40 maxima à terris distantia versatur, &
magnitudine minima conspici debet,
intromisi ipsum summo studio, & ma-
ximam fere diametrum perspicabilem
a b, inueni partium 155. quibus in Ta-
bula sinuum respondent minuta 53.
45 Reliquas vtrinque certatas diametros
a c, a d, a e, inueni minutorum 48. 38.
33. fuitq. defectus minime a e, ad maxi-
mam a b, partium 60. qualium a b, re-
periebatur esse centum quinquaginta-
50 quinque; qui numerus plus est, quam
vnā tertia pars, diametri a b, & tamen
etiāsi ipsa hac tota portione fuerit im-
minuta, nihilominus residua portio a e,
55 è visceribus baseos lucidæ hausta, ad
huc

*Notationes
in observa-
tiones, anni
1627.*

Instrumentum				
Observatorium pro capiend da visuali Solis Diametro.				
Observationes Visualium Solis Diametrorum Annis 1625, 1626, 1627, Romæ.				
AB. Linea ducentarum decem particularum, qualis tota foraminis à charta distantia, fuit 10000.20				
A. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 B				
Annus	Menfis	Dies	Diametri visuales obseruata.	per Foramen
1625	Octob.	15.	a. $\frac{39}{114} \frac{47}{137} \frac{51}{150}$	Minimum.
	Novēb.	23.	a. $\frac{35}{100} \frac{39}{115} \frac{41}{120} \frac{45}{130}$	Minimum.
		28.	a. $\frac{38}{110} \frac{45}{130} \frac{49}{143}$	Minimum.
	Decēb.	25.	a. $\frac{37}{106} \frac{40}{117} \frac{43}{125} \frac{37}{136}$	Minimum.
1626	Mart.	23.	a. $\frac{39}{115} \frac{42}{122} \frac{47}{136} \frac{53}{155}$	Minimum.
	Iulij.	14.	a. $\frac{36}{103} \frac{41}{119} \frac{43}{125} \frac{47}{137}$	Minimum.
	Octob.	19.	a. $\frac{43}{125} \frac{55}{160}$	Minimum.
	Decēb.	21.	a. $\frac{32}{93} \frac{38}{110} \frac{48}{138}$	Minimum.
		22.	a. $\frac{30}{87} \frac{37}{107} \frac{42}{122} \frac{48}{140}$	Minimum.
		a.	$\frac{31}{90} \frac{38}{112} \frac{47}{136} \frac{56}{165}$	1. Minimum.
		a.	$\frac{55}{160}$	2. Maius.
		23.	a. $\frac{30}{85} \frac{36}{104} \frac{41}{120} \frac{50}{144}$	3. Ampli ⁹ priore.
		a.	$\frac{29}{83} \frac{32}{93} \frac{39}{114}$	4. Mai ⁹ priore.
		a.	$\frac{29}{84} \frac{33}{95} \frac{37}{105}$	5. Maximum.
1627.	Iunij.	21.	a. $\frac{35}{95} \frac{38}{110} \frac{48}{140} \frac{53}{155}$	Minimum.
	Sept.	23.	a. $\frac{37}{108} \frac{45}{120} \frac{49}{142} \frac{56}{162}$	Minimum.

I.

huc suppeditat minuta 33'. vnde dubium nullum esse potest, visibilem Solis diametrum debito longè minorem hucusque iudicatum esse.

Similem industriam deprompsi, die 23. Septembris, quando Sol α , subiit, mediamque à terris elongationem præbuit, cuius diametrum ferè maximam, decerpsi partium 162. minutorum 56'.

II.

I. aliæ diametri vtriusque accisæ, intraq. corpus lucidum comprehensæ, a c, a d, a e, sunt partium 142. 130. quibus ordine respondent minuta 49'. 45'. 37'.
5. Perfeci omnes hasce huius anni observationes, eodem foramine minimo, ad distantiam inuariatam, partium 10000. è quibus manifestè liquet, Solis visualem magnitudinem longè aliam existere.

Qq q

ab

I.
ab ea quæ passim traditur: quam tamē
hīc non decerno, auditurus prius alio-
rum quoq. experientias, & rationes,
cum sententijs suis.

DE SOLIS, ET MACVLARVM
solarium comparata inter se ma-
gnitudine, tam visuali, quam
absoluta, ex hypothesi-
bus Tychonicis.

CAP. VI.

EX haftenus disputatis de visi-
bili Solis diametro.

Constat primò, Absolutam
ipsius in magnitudine diametrum, ad
certam & determinatam mensuram,
puta pedis, passus, stadij, milliarij, &c.
necdum esse cognitam.

Constat secundò, Tanquam Solis à
terra distantiam, quantam aliqui sibi
imaginantur & fingunt, non esse spec-
tādo Solis superficiem, nam quo maior
Sol in diametro visuali reperitur, hoc
terræ euadit vicinior superficie tenus,
& rarius in sua à terra distantia repli-
catur.

Constat tertiò, Maculas, & Faculas
solares etiam maiores esse, quam multi
sibi persuadeant, idq. ex duplici causa;
quarum altera est, quod inter obseruan-
dum ordinariè ipsas minores consigna-
ui, quam sese præsētauerint; altera, quod,
(ut visum,) Sol visus maior sit, quam
haftenus creditum, unde etiam absolu-
tam eius magnitudinem crescere oportet.
Cognita autem est ex obseruatis
Macularum ad Solem habitudo, quæ
eadem siue in magno siue in paruo Sole
credito manet. Nam Macula, cuius dia-
meter ad Solis diametrum est, ut 1. ad
30. si visualis Solis diameter assumatur
minutorum 30. habebit diametrum mi-
nuti vnus. si Solis diameter censeatur
minutorum 45. Macula illa eadem con-
tinebit vnum minutum & semis in dia-
metro, nam $\frac{1}{3}$ pars ad 30. est 1. at ve-
rò $\frac{1}{45}$ pars ad 45. est $1\frac{1}{2}$. ut patet si
30. per 30. diuidas, prodibit enim 1. si
vero 45. partiaris per 30. acquies $1\frac{1}{2}$.
id est $1\frac{1}{2}$. Sole ergo visuali crescente
crescunt omnia, quæ eidem superficia-
liter n̄ sunt.

Constat quartò, Ex habita visuali So-

lis diametro, posse dari visualem diame-
trum visæ in Sole Maculæ; & ex data,
diametro Maculæ dandam etiam Solis.
Loquor autem de diametro Maculæ cir-
ca medium Solis plenæ expansæ, aut
certe de diametro latitudinis non longi-
tudinis; hæc enim ex accliuitate Macu-
læ in ortu, & decliuitate circa occasum
contrahitur optice, illa semper & opti-
ce & geometricè extenditur.

Constat quintò, Data absoluta Solis
diametro, dari etiam Macularum: &
vicissim data cuiuscunque Maculæ dia-
metro, dari etiam Solis. Cum autem,
hucusq. in mensuris determinatis neu-
trius detur, ut tamen aliquid certi dica-
mus, & lectorem nec ieiunum nec flu-
ctuantem dimittamus; accipiamus Hy-
potheses Tychonis, quia tametsi ipse
visualet Solis diametrum debito mino-
rem prodiderit possumus nihilominus
nos ex ipsa supposita & assumpta, de
Macularum & Facularum absoluta ma-
gnitudine aliquid solidi, & certe enun-
ciare. Nam cum Sol Tychonicus minor
statuatur quam ex parte rei sit, maculæ
ex illa hypothesi deductæ etiam mino-
res emergent, quam veritate ipsa exi-
stant: argumentum igitur eo maiorem
neruum assequetur, & hoc minimum
obtinēbimus, Maculas minores non
esse quam assignentur, sed tantas certo,
& quasi certo maiores.

Constat sextò, Ex obseruatis Macu-
larum atque Facularum corpulentia, &
consequenter superficiem versus nos
conuersam extra Solem nonnihil pro-
tuberare; ac proinde maiorem esse ea-
solaris superficiei portione, quam ipsa
occupat atque à visu nostro, sui obiectu
aufert. Nam si circulus minor maiorem
secat, arcus minoris externus inter duo
sectionis puncta interceptus, simplici-
ter maior est, arcu circuli maioris inter-
no, inter eadem puncta ad easdem par-
tes comprehenso, uti rectè ex Archime-
de sub alijs verbis demonstrat Clavius,
l. 3. Sphæricor. Theodosij, in Lemmate
ad Theorema 6. Propositionem 6. Un-
de sequitur, si sphaera vel sphaeroides
minor, sphaeram maiorem secat, su-
perficiem minoris extantem fore
maiorem superficiei maioris sphaerae,
quæ segmenti extantis basis exi-
stat.

Qua-

I.

Quapropter ut in demonstranda Macularum amplitudine & fortius & regularius procedam, iam non ab illarum prominente superficie, utpote instabili atque vaga, sed ab ea, quam convexitas Solis præbet argumentabor. Demonstrato enim, quanta sit ea solaris superficiei portio, in data aliqua certa mensura, quam Macula aliqua aut Facula insidet, ostendo pariter superficiem Maculae aut Faculae tantam minimum admitti debere, cum ipsa ex parte rei maior sit.

Constat septimo. Tam Maculas quam Faculas, ex ijs quæ tribus libris passim adduxi, non esse opticas deceptiones, aut fallaces apparentias, sensusve ludificationes inanes, sed veras physicas apparentias, adeoque substantias corporeas in quibus trina dimensio reperiatur, longitudinis, latitudinis atque profunditatis: & quanquam hæc ultima indagatu atque declaratu difficilis admodum existat, latitudo tamen atque longitudo vera ad certam aliquam assumptam mensuram utcumque assignari potest ex data magnitudine apparente. quam dari per observationes certum est, ut mox indicabimus. Longitudines autem siue lineas tres præcipue in præsentī negotio inquiremus, Diametrum videlicet siue semidiametrum Maculae tam secundum longitudinem, quam secundum latitudinem, tum arcum cuius ipsa in circulo Solis maximo vel sinu rectus vel chorda est; & tandem sinum versum. ex hisce enim & amplitudo superficialis, & profunditas ex parte videtur posse in-

II.

dicari. in maculis saltem minoribus.

Octavo. Mensurae certæ & nominatae, ad quas Macularum diametros exigemus, quasque in diametris visualibus inquiremus, erunt passus geometrici, quorum mille faciunt unum milliare Romanum; quattuor millia unum milliare commune Germanicum. Unde si datos passus in data Maculae diametro, vel arcu, diuidas per 1000. acquires milliaria Romana; si per 4000. nancieseris milliaria Germanica; è quibus deinde Maculae amplitudinem facile aestimabis, comparando ad notas terrarum prouincias.

Nono. Secundum Tychonem Braheum, Danum Instauratorem Astronomiae libro 1. Progymnasmatum, pag. 97 & 98. semidiameter terrae complectitur milli. Germanica 860. Romana 3440. Passus 3440000.

Diameter milliaria Germanica 1720. Romana 6880. Passus 6880000.

Iam semidiameter terrae passuum 3440000. dabit pro eiusdem semicircumferentia passus 10807076. milliaria Romana 10807. cum passibus 76. Germanica 2701 cum passibus 3076.

Diameter autem terrae in passibus 6880000. exhibet ambitum terrae maximum itidem in passibus 21614152. in milliariis Romanis 21614. cum passibus 152. in Germanicis milliariis 5403. cum passibus 2152.

Sed placet hæc omnia ad usum commodiorem sub unum aspectum proponere in adiecto laterculo.

TERRAE	PASSVS	Mill. Romana	Mill. Germanica
Semidiameter	3440000	3440	860
Diameter	6880000	6880	1720
Perimeter Maximus.	21614152	21614 $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{5}$	5403 $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{2}{5}$
Semiperimeter.	10807076	10807 $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{6}{5}$	2701 $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{6}{5}$
Quadrans.	5403538	5403 $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{3}{5}$	1350 $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{3}{5}$

I.

Ab huius perimetri calculo non multum discedit iste, qui vni gradui ambitus terreni tribuit milliaria Germanica 15. Si namque totius terræ circumferentiam maximam in partes æquales trecentas & sexaginta partitus fueris, & singulas deinde in partes 15. acquires milliaria Germanica 5400. pro toto terræ circuitu: quæ dant milliaria Romana 21600. passus 2160000. differt igitur hic ambitus ab illo passibus 14152. id est milliarijs Romanis 14. Germanicis 3. & semis.

Hæc porro terreni globi mensuras ideo adduxi, ut Macularum magnitudines paullo post assignandæ ex comparatione ad datam terræ amplitudinem melius menti valeant præsentari atque imprimi. Nunc Solis magnitudinem in dictis mensuris ex mente Tychonis statuendam accedamus.

De Solis diametro & circumferentia maxima visibili in passus & milliaria reuocandis.

Decimo. Arcus Eclipticæ quem Solis diameter visualis subtendit, à linea recta in nostro proposito sensibilibiter non differt, unde Astronomi, quasi pro eodẽ utrumq. sumunt. Semidiameter igitur Solis si statuatur esse min. 16'. dabit secunda 960". si verò assumatur min. 17. dabit secunda 1020". si medium inter

1 hæc accipiatur emergent minuta secunda quasi 1000". Quot autẽ isthæc minuta vel prima vel secunda efficiant passus in Tychonica Solis à terra distantia sic eruetur.

5 Secundum Tychonem media Solis (hanc enim assumere placet) à terra distantia facit semidiametros terræ 1150 id est milliaria Germanica 989000. Romana 3956000. passus 3956000000. 10 Iam si fiat ut sinus totus 10000000. ad 3956000000. distantiam terræ à Sole in passibus; ita 46541. sinus m. 16'. ad aliud: prodibunt operatione peracta passus 18411619. pro Solis semidiametro visuali minorũ 16'. Milliaria Romana 18411. Germ. 4602. $\frac{3}{4} \frac{6}{10} \frac{1}{10} \frac{2}{10}$.

15 Diameter autem horum omnium duplũ continebit, id est passus 36823238. Milliaria Romana 36823. Germ. 9205. $\frac{3}{4} \frac{2}{10} \frac{3}{10} \frac{8}{10}$. E quibus 20 prodit ambitus Solis maximus in passibus 115683612. in milliarijs Romanis 115683. in Germanicis 28920. $\frac{3}{4} \frac{6}{10} \frac{1}{10} \frac{2}{10}$. At vero Semicircumferentia Solis passuum 57841806. milliariorum Romanorũ 57841. Germanicorum 14460. $\frac{1}{4} \frac{8}{10} \frac{0}{10} \frac{6}{10}$.

25 Quarta pars Circumferentiæ totius, 30 Passus 28920903. milliaria Romana 28920. $\frac{2}{10} \frac{0}{10} \frac{9}{10} \frac{3}{10}$. Germanica 7230. $\frac{2}{10} \frac{0}{10} \frac{9}{10} \frac{3}{10}$. Quæ omnia vno intuitu habes in subiecta Tabula.

Solaris diametri atque perimetri in passibus, & milliarijs expressa mensura.

SOLIS	PASSVS	Mill. Romana	Mill. Germanica
Semidiameter	18411619	$18411 \frac{1}{10} \frac{6}{10} \frac{1}{10} \frac{9}{10}$	$4602 \frac{3}{4} \frac{6}{10} \frac{1}{10} \frac{2}{10}$
Diameter	36823238	$36823 \frac{2}{10} \frac{3}{10} \frac{2}{10} \frac{8}{10}$	$9205 \frac{3}{4} \frac{2}{10} \frac{3}{10} \frac{8}{10}$
Circumferentia	115683612	$115683 \frac{1}{10} \frac{6}{10} \frac{1}{10} \frac{2}{10}$	$28920 \frac{3}{4} \frac{6}{10} \frac{1}{10} \frac{2}{10}$
Circumferentiæ dimidium.	57841806	$57841 \frac{1}{10} \frac{8}{10} \frac{0}{10} \frac{6}{10}$	$14460 \frac{1}{4} \frac{8}{10} \frac{0}{10} \frac{6}{10}$
Circumferentiæ pars quarta.	28920903	$28920 \frac{2}{10} \frac{0}{10} \frac{9}{10} \frac{3}{10}$	$7230 \frac{2}{10} \frac{0}{10} \frac{9}{10} \frac{3}{10}$

I.

*De Variis Macularum solarium
Classibus.*

Vndecimo. Vt autem omnia ordinatius peragantur, distinguendæ sunt Maculae in suas certas classes, quarum duas potissimum inuenio.

Sunt enim Macularum aliae simplices, aliae compositae seu mixtae.

Simplicium nomine intelligo Maculas continuas, nullis Faculis mixtas. Quae rursus aut sunt integrae & figurae utcumque regularis; aut non integrae, sed varie sectae & lacerae, neque ullis figuris ordinatis conclusae.

Mixtarum seu compositarum Macularum nomine intelligo Maculas vel non continuatas, in vnum tamen manipulum congestas, vel ex Maculis & Faculis coherentem sibi congeriem.

Exemplum. Maculae simplicis & regularis habes in Observationum Imagine XXXIII. pag. 241. item LXII. pag. 311. in Macula d, & alibi passim.

Maculae simplicis & lacerae atque irregulariter terminatae exempla ubique occurrunt, considera Maculam a, in Imagine XXXVIII. pag. 251. ad diem 22 23. & 24. Augusti; item in Imagine XLV. pag. 271. Maculam a, & alias Imagines Observationum, &c.

Exempla Macularum compositarum in omnibus paene Observationum Imaginibus cernuntur; vide manipulum Macularum C, in Imagine XLVI. pag. 273.

Item a b c, in Imagine LXIV. pag. 315. Observationum insuper Imaginem XXI. pag. 207. &c. in quibus Maculas cum Faculis & nimbis illustres videbis, &c.

In Maculis igitur tam simplicibus vtriusque generis, quam compositis, hunc seruabimus tenorem, vt totam illam longitudinem vel latitudinem exprimamus, tanquam vnum continuum, etiamsi vacua spaciola intercurrent.

Antequam autem ad particularia descendamus, oportet prius

aliquas generales regulas tradere, omnibus communibus.

II.

REGVLÆ GENERALES.

Prima. *Macula cuiusque assumpta diameter visualis, toties continebitur in solari diametro, quoties ipsa in circuli obseruatorii diametro reperietur.*

Id quod scies, si circino exploraue-
ris, quoties dicta diameter Maculae in
diametro obseruatoria contineatur. Ra-
tio à priori. Quia sicut se habet visa Ma-
culae diameter ad circuli obseruatorij
diametrum; ita se habet vera Maculae
diameter in caelo ad diametrum sola-
rem, non enim distant à Sole Ma-
culae.

Secunda. *Si assumptam visualem Solis diametrum, in partibus 2000^{''}. vel semidiametrum in partibus 1000^{''}. diuiseris per Quotientem iuxta regulam primam inuentum; scies quot eiusmodi minuta secunda contineat visa Macula diameter.*

In exemplo. Maculae diameter re-
perta sit in diametro obseruatoria
vicies; in semidiametro decies. siue
iam diametrum Solis obseruatoriam
secundorum 2000^{''}. per 20 siue se-
midiametrum 1000^{''}. per 10 diuidas,
semper acquires diametrum Maculae il-
lius 100^{''}.

Tertia. *Si fiat vt 1000^{''}. Solis se-
midiameter ad 18411619. passus ei-
dem semidiametro respondentes, ita par-
tes per Regulam secundam inuenta, &
Macula diametro respondentes ad aliud;
prodibunt operatione perfecta, passus qui
Macula diametro debentur.*

In exemplo. Solis semidiameter
1000^{''}. dat passus 18411619. quot
passus exhibet inuenta Maculae diame-
ter 100^{''}.? fiunt passus 1841161.
Milliaria Romana 1841. Germanica
460.

Idem eueniet, si per integram Solis
diametrum procedas, hoc modo.
2000^{''}. dant passus 36823238. quid
100^{''}.? prodibunt vt ante passus
1841161. Idem & breuius fiet, si per
quotientem in semidiametro circuli
obseruatorij repertum, diuidas semi-
diametrum solarem passibus expressam:
diametrum autem solarem per Quotiē-
tem inuentum in diametro circuli ob-
seruatorij.

In exemplo. reperta est alicuius Maculae diameter contineri in diametro observatoria vicies, in semidiametro decies: si diametrum Solis passibus 36823238. definitam per 20. aut semidiametrum passibus 18411619. commensuratum per 10. diuideris, ytrinque acquies pro Maculae quæ sita diametro passus 1841161.

Quarta. Si fiat ut semidiameter Solis 100'', ad sinum totum 10000000. &c. ita data Maculae diameter 100''. verbi gratia, ad aliud, acquies sinu 1000000. Maculae diametro correspondentem, respectu sinus totius 10000000. dicto autem sinui respondebit in tabulis sinuum, arcus quodammodo graduum 6. quos in solari circulo dicta Macula diameter subtendit.

Idem breuius, & citius fiet hoc modo.

Assumptum sinum totum 10000000. diuide per illum numerum, qui indicat quoties Maculae diameter in semidiametro observatoria contineatur, & in Quotientie diuisionis, acquies sinum Maculae diametro debitam.

Vt si Maculae diameter in semidiametro circuli observatorii decies fuerit inuenta, si per 10. partiatis sinum totum 10000000. acquies numerum 1000000 cui in tabula sinuum proximè debentur gradus 6. Dices ergo Maculam quæ in Sole sua diametro occupat 100''. qualiū Solis diameter faciat 100''. in eiusdem Solis arcu maximo subtendere gradus sex: cui sex graduum arcui, quot insint passus geometrici, modo dicetur.

Quinta. Si fiat ut arcus 90. graduum ad 28920903. passus arcui quadrantalibus in circulo Solis maximo respondentes; ita arcus 6. graduum à Maculae diametro subtenfi ad aliud: prodibunt passus 1928060. Milliarum Romana 1928. Germanica 482.

Quod si arcus à datae Maculae diametro subtenfi minor sit gradibus integris, tunc integri gradus 90. sunt ad similem denominationem reuocandi; ut si arcus à Maculae diametro subtenfi esset minorum primorum 5. tunc gradus 90. sunt mutandi in 5400'. ex quibus si fiat ut 5400'. ad 28920903. ita 5'. ad aliud: acquies 26778'. passus, qui insunt arcui solari minorum 5'. 55

Iam si etiam sinum versum cognoscere libet, qui Maculae datae respondeat, & aliquid pro eiusdem indaganda profunditate adiumenti afferat, ita positum assequeris.

Sexta. Si sinum complementi illius arcus, quem Macula data diameter subtendit, subtraxeris à sinu toto, residuum erit sinus versus quem quæris. Tum per Regulam proportionum dices: sinus totus 10000000. dat passus 18411619. quot passus dat sinus versus? In exemplo.

Macula cuius diameter est decima semidiametri observatorii pars, seu quæ 100''. partes facit, quales semidiameter 1000''. est sinus arcus graduum 6. huius arcus complementum est arcus graduum 84. cuius sinus rectus est 9945219 qui subtractus ex sinu toto 10000000. relinquit sinum versum 54781. Iam si fiat ut 10000000. ad 18411619. ita 54781. ad aliud, acquies passus 80860. Eodem modo in alijs Maculis procedes. nam ex hisce regulis generalibus omnium & singularum Macularum magnitudines nullo negotio assequeris; cuius rei aliquot exempla subnectam.

Macularum solarium magnitudines in particulari.

Macula respectu huius circuli observatorii quo usus sum Romæ minima; instar ynius puncti calamo notari soliti, cuius diameter visualis est ad semidiametrum solarē ut 1. ad 1000. faciet in sua diametro passus geometricos 18411. miliaria Romana 18. germanica 4½. erit sinus arcus 4'. qui complectetur passus 21422. miliaria Romana 21. Germanica 5½. sinus versus faciet passus 12.

Tales Maculas exhibebit non paucas Imago Observationum.

XV. pag. 191
XXII. pag. 209
XXVIII. pag. 231
XXXVI. pag. 247
XLIV. pag. 267
& aliæ passim in earundem decursu.

I.

II.

SCHOLIUM.

Age Deo gratias, qui nobis artem communicavit, qua tantillum in Sole punctum, quod vni secundo in Ecliptica respondeat, acutè dispicere valeamus. Exosculare nobilem Refractionis naturam; sine qua minutias istas sensu nullo deprehenderes. Ipsas tandem istas minutias suspice, & magnificas, quæ cum exigua punctula compareant, terrenos tamen Principatus exæquant; quippe hinc Roma ultra Braccianum, protenderentur,

Macula mediocris minorum secundorum 10. in diametro.

Macula cuius diameter est 10". qualium Solis semidiameter est 1000"; seu quæ se habet ad semidiametrum Solis, vt 1. ad 100. facit passus in diametro 184116. in arcu 35'. complectetur passus 187450. id est milliaria Romana 187. Germanica 47. sinui verso 515. competent passus 948. Tales Maculæ fuere g, in Observationum Imagine XII. pag. 185. ad diem 16. 17. 18. 19. & 20. item Macula e, ad diem 14. necnon f, ad diem 20. Februarij: & innumera alia alibi. consule Observationum Imagines XIV. pag. 189. XV. p. 191. XIX. p. 201. XX. p. 203. XXII. p. 209. & alias passim nam ubique occurrunt.

Macula Mediocris minorum secundorum 50. in diametro.

Macula cuius diameter ad semidiametrum Solis est vt 1. ad 20. quæque talium partium est 50". qualium Solis semidiameter est 1000". talis inquam Macula in sua diametro continet passus 920580. in arcu trium graduum, quem in superficie Solis occupat, facit passus 964030. milliaria Romana 964. Germanica 242. sinui verso 13705. respondent passus 25233.

Talis Macula occurrit in Observationum Imagine XXXIII. pag. 241. & passim in totius Operis decursu.

Macula Mediocris minorum secundorum 100. in diametro.

Macula cuius diameter est ad Solis semidiametrum vt 1. ad 10. seu quæ complectitur particulas 100. cuiusmodi solaris semidiameter habet 1000. facit in longitudine sua passus 1918060. in sinu verso, qui est 54781. sunt passus 30860. Talis est Macula a, in Observationum Imagine XXIII. pag. 211. per totum quasi curriculum, à die 11. Maij ad 19. eiusdem. Itaque Macula hæc extensione sua arcuali in superficie So-

lis adæquavit milliaria Romana 1928. Germanica 482. adeoque minor quidem fuit Europa, multo tamen maior quam vasta Germania. huius Maculæ nuclei in arcu solari occupauerunt gr. 2. m. 37. quibus debentur passus 784386. Milliaria Romana 784. Germanica 196. Huius generis Maculæ fuerunt, a, in Imagine XXXVII. pag. 249. cum nimbo suo; item a, in Imag. XXXVIII. pag. 251. item Macula, c, in Imagine XLVI. pag. 273. & b, in Imagine XLIIX. pag. 277.

Macula magna minorum secundorum 143. in sua diametro, equalis ferme Europa.

Macula a, in Observationum Imagine XXI. pag. 207. se habet ad Solis semidiametrum, si nimbum circumfusus addas, vt 1. ad 7. facit in arcu solari graduum 8. minorum 13. passus 2640371. Milliaria Romana 2640. Germanica 660. itaque Europam ferme æquabit.

Macula composita minorum secundorum 285. in sua diametro, maior Africa.

In Imagine LXIV. pag. 315. congeries quædam Macularum, a b c, ad diem 21. Maij in Sole exortarum, fuit in diametro longitudinis ad semidiametrum Solis vt 1. ad 20. & exæquavit passus 920581. at vero ad Solis medium & Maij diem 26. intra quinquiduum ita excreuit hæc longitudo, vt sese habuerit ad semidiametrum Solis, absque nimbo circumfuso, quemadmodum 2. ad 7. in qua proinde reperti sunt passus 5260462. in arcu vero, qui fuit graduum 16. minorum 27. inuenti sunt passus 5339655. milliaria Romana 5339. Germanica 1334. Et sic excessus iste excreuit intra dies 5. ad passus 4419074. milliaria Romana 4419. Germanica 1104. vnoque die promouit ultra ducenta viginti milliaria Germanica vna hora ultra nouem: totaque huius manipuli longitudo maior fuit longitudine totius Africae.

Ma-

I.

Macula composita minutorum secundorum 333. in sua diametro, æqualis Asia.

In Obseruationum Imagine XV. pag. 19. habes ad diem 24. & 25. &c. Martij, Macularum, vmbrarum atque Facularum, congestum quendam cumulum b c d, cuius diameter se habet ad semidiametrum Solis vt 1. ad 3. ideoque in illa continentur passus 6137206. in arcu vero correspondente, qui est graduum 19. minutorum 28'. numeratur passus 6292519. hoc est milliaria Romana 6292. Germanica 1598. quæ longitudo Asiæ longitudinem exæquat; & tamen istæ tantæ moles, intra paucos dies enascuntur & denascuntur in Sole.

Macula composita minutorum secundorum 500. in sua diametro, æqualis superficie terrestri.

In Imagine XXI. pag. 207. Macula a, ad diem 19. Aprilis, ex vmbrarum & Facularum comitatu dilatata, si longiorem ipsius diametrum cum semidiametro Solis comparemus, inueniemus talem inter ipsas proportionem, qualis esse solet 1. ad 2. ac proinde complectetur passus 9205809. in arcu vero solari occupabit gradus 30. quibus commensurantur passus 9640301. milliaria Romana 9640. Germanica 2410. quibus terræ ambitus dimidiatus haud multo maior existit. Itaque si talis ali-

II.

qua Macula composita in medio Sole, vndiquaque ex æquo secundum talem, longitudinem excurrat, terræ habitabili sine dubio haud minor, si non etiam maior euadet; Quia

Primo, Maculas eiusmodi potius minores in obseruando designaui, quæ apparuerant.

Secundo, quia Solem minorem assumo secundum hypothèses Tyconicas quam absolute sit.

Tertio, quia Macularum superficies est maior quam solaris.

Quarto, Quia terræ diameter secundum quosdam recentissimos Geographos diametro solari comparata multo minor repetitur, quam multi alij senserunt. quæ si veritati consonant, multæ Maculæ simplices, qualis est dicta a, in Obseruationum imagine XXI. pag. 207 & similes aliæ, terrenum globum tam diametro quam superficie propemodum assequuntur: ponunt enim ipsi diametrum terræ ad Solis diametrum vt 1. ad 12. vel 13. cum Macularum istarum ad Solem haud dissimilis habitudo reperitur.

Atque hæc quidem de visuali nec non absoluta Macularum magnitudine, ex certa assumpta hypothese exempli causa disputata sunt. Nam per singula progredi non erat animus; poterit hoc ex allatis Regulis quouis præstare, & singulas ad calculum reuocare.

Nunc vltius procedere libet, & ROSAE VRSINAE natium odorem atque colorem, internasque affectiones perlustrare.



PARS II. Cap. VII. 591
 ROSAE VERSINAE
 siue Solaris Phænomeni, natura
 mirabilis.

CAPVT VII.

I.
Quemadmodum in hoc vniuerso & mundo sensibili Deus mortalium generi & toti huic elementari machinae prestantius Sole nil dedit, cuius concursu omnia generantur, augentur, conseruantur; ita suae sapientiae & potentiae quasi quoddam compendium in eodē posuisse videtur. Nam si ea quae inter sese contraria aut pugnantia apparent, vsquam alibi, profecto in hoc admirabili globo sapientissime & supra humanae intelligentiae captum, idem omnium rerum opifex prudentissimus colligauit. Quid enim? in purissimo illo mundi oculo quisquam vllas labe inesse vquam suspicari ausus esset? an vllus sibi vllō modo persuasisset, è clarissimo lucis fonte, tenebras scaturire? Vastissimum illud luminum pelagus, perpetuis quasi fluctuum quibusdam voluminibus agitari, macularumque atque umbrarum continua successione, mutuis inundationibus, seriēque indissolubili, variari. Et hoc primum sit quasi paradoxum, quod in hoc Phænomeno suspiciamus: *Lux & Tenebrae, siue lucidum & obscurum*, & tanta quidem necessitudine atque amicitia, vt vnum absque

II.
 I. altero reperire vix liceat.
 Secundum paradoxum. *E lucido tenebrosum, & ex hoc lucidum*. Nam vicissitudinaria statione succedunt Maculis Faculae, & Faculis Maculae vel umbrae, vel denique partes minus fulgidae.
 Tertium. *Circa idem centrum corporis eiusdem motus ab ortu in occasum, ab occasu in ortum*.
 10 Quartum. *Augmentatio rei minima maxima vti visum paullo ante tempore breui, eiusdemque diminutio summa, & velox*.
 Quintū. *Raresactio & condensatio maxima*.
 15 Sextū. *Ex alteratione perpetua, stabilitas cum inconstantia summa*.
 Septimū. Opacitas maxima in Nucleis cum perspicuitate ambientis.
 20 Octauū. Mutationum successio continua, neque interim redundantia aut consumptio apparens vlla in sphaera globi solaris.
 Nonū. Sol idem cum videatur, idem nunquam videtur tam optice quam physice spectatus.
 25 Decimū. Sol omnia cum mensuret tempore, à temporis mensura neque ipse immunis est.



ROSAE VRSINAE

siue Phænomeni Solaris,

Aetas.

I.

NIHIL in rerum natura est, quod duratione sua careat, eaq. vel successiua vel permanente. ROSA nostra, si radicem, si truncum, si fructicem spectas Soli coæua est, à mundo condito est, cum Sole enim ipso procedit; si florem & folia, eadem quidem & sibi similis est specie, adeoque perseverans; semper enim Faculas, semper Sol profert Maculas: non autem si singularia; hæc enim subsunt temporis, ætatem sentiunt, nascuntur, augescunt, minuuntur, intereunt, & qui temporis omnia subiecit, ab eodem neque semetipsum excipit.

ROSA tamen una est, & anni integri lapsu progerminat, & perficitur à Decembri in Decembrem, interea dum folia alia alijs succrescunt, fecunda, Macularum & Facularum vicissitudine, quarum ætas, an ad duos menses quandoque perueniat anceps, non superare quasi certum videtur.

Quædam breuiore vita fruuntur, aliquæ ad diem non perueniunt.

Annuus igitur motus uti in se reuersus, uti nouas Maculas, & Faculas profert, ita curlibus quasi mensuris noua folia ROSAE subministrat: adeoque cum nouo foliorum germine nouam ROSAM continenter reproducit; neque vetus unquam ita senescit, ut iuuentam totam exuat, neque ita reflorescit iuuenis, ut omnem vetustatis habitum excutiat, sed utrumque semper mirabili quodam & indissolubili societatis nexu ita confociatur, ut ROSAM hanc semper iuuenem semper natu grandem, semper ena-

II.

scientem semper maturam, semper inchoatam semper absolutam, semper incæptam semper finitam, semper plenam, nunquam clausam nunquam caducam, nunquam marcidam, summa cum delectatione contemplemur. Vere quippe & æstate perpetuis gaudet; autumnus fecunditate læta; sterilis & tristis hyemis ignara: & sicut annus annum, mensis mensem, hebdomas hebdomadem, diesque diem sine interruptione cõsequitur; ita huius ROSAE folia, successiuis sese completuntur nouarum generationum sequelis; dum Maculam Macula, aut Facula excipit, & dum hæc ætatem suam complent, nouæ succrescunt, ut mutuo itinerum & cursuum implexu, catena hæc perpetua periodorum seriè extendatur: quod si ut fit nonnunquam, Maculae, aut Faculae primariæ nullæ extant, secundariæ certè sine defectu abundabunt. Et ex hac etiam continua tenoris eiusdem successione, possumus Phænomeno huic vnitatem quandam & durationem stabilem perennemque attribuere: quemadmodum Tyberim, Danubium, aut Rhenum eundem dicimus, tametsi alia aliaque aquæ, semper subeant, præcedentibus absumptis aut alio dilapsis: sic candela ardēs aut fax accensa eadem æstimatur, tametsi noua semper nouaque flamma adgeneretur.

Aetna idem tot nunc sæculis ardet, licet incendio flammarum diuerso. Oceanum per tot nunc annorum centurias eundem nauigamus, super aquas tamen omnino alias.

ROSAE VRSINAE

siue Solaris Phænomeni, causæ & effectus nonnulli.

CAPUT VIII.

I.

SI Deus & Natura, ut verissime dicitur, nihil frustra faciunt, etiā in hisce inferioribus minimis rebus, quæ utilissime alioquin & inter casuales euentus vulgo adnumerantur; multo magis cogitandum est, Phænomeno huic tam sublimi, tam constanti atque regulari causas altissimas & omnino cælestes subesse. Quarum diuinissimam & primam appellare non dubitem, Intentionem & finem propter quem Vniuersi Conditor Deus, ipsum iam tum ab æuo condito, sic ordinavit.

Rerum conditarum vniuersalissimus & ultimus finis, maior Dei Gloria.

Quia verò omnium rerum conditarum finis vltimus & vniuersalissimus est ipsemet Deus, aut maior Dei gloria, ex operibus ipsius in ipsum resultans; hæc autem ipsi à rebus intellectu destitutis attribui nequit: necesse est, Phænomenon hoc & eius internas affectiones ab aliqua creatura rationis capace cognosci atque penetrari; ut inde sapientissima Conditoris prouidentia cognita, in admirationem, amorem & laudem ipsius assurgat: etenim si cæli enarrant gloriam Dei, multo amplius id præstat Sol, & hoc Solis gloriosum Amphiteatrum, in quo nobis Deus ter Optimus Maximus, quotidiana suæ infinitæ sapientiæ spectacula visenda & rimanda offert; inde nemo mirabitur, aut extra limites exspatiari existimabit, si non ficcum tantum aut Abcedarium Geometram; aut Hypotheticum Astronomum, vel scrupulosum Calculatorem, aut obseruatorem denique operosum, & mechanicum Promum Condum; sed multo magis Philosophū Christianum, in hoc pertractando Phænomeno expertus fuerit: id enim & Maior Dei gloria, & ratio Phænomeni, & publici boni utilitas postulare videtur.

II.

I Quia nisi ea, quæ in hoc Phænomeno sapientiæ suæ arcana Deus recondidit, aliquatenus eruantur, & in apertam lucem promantur, & digito, ut aiunt, intento rudioribus saltem indicijs, monstrantur, ex ipsis nulla in Deum à mortalibus laus redundabit; & cum sit ipsum Phænomenon Astronomicum simul & Physicum, physicisque apparentijs refertissimum, natura ipsius postulat, non tantum Mathematicam, verum etiam Physicam ipsius inspectionem, idque potissimum ob eam causam, ut veritas pateat, non affectus præiudicet.

15 Tandem, ut quid ex hoc Phænomeno, eiusque cognitione, in publicum rei litterariæ ararium commodi inferatur, omnibus palam innotescat. Hæc enim tria, Maior Dei Gloria, innatum veritatis studium, omnibus inseruiendi desiderium, iam tum ab initio ad hoc tam implicatum naturæ arcanum & reconditum thesaurum inuestigandum & vētilandum me perpulerunt. Cumque eius plena & digna pertractatio intra solius Matheseos claustra coerceri nequeat, excurrendum nonnunquam in campos Christianæ erit Philologiæ, ut competentibus exornatum phaleris in Theatrum prodeat eruditorum.

20 Fas est enim cuilibet ex ijs quæ magnificus rerum Opifex architectatus est, non tantum Gloriam Dei, veritatē rerum, communem omnium utilitatem omni eruditionis genere haurire, sed & alijs communicare.

In huius Phænomeni inquisitione tria spectantur: Maior Dei gloria, Veritas; bonum publicum.

QVOMODO SOL DESERVAT

Prima causse secundum actionem in inferiora. & ex eius Phenomeno cognito ab aliis obscurius asserta illustrentur & comprobentur?

CAP IX.

SOLEM esse inter corpora Mundum constituentia quid præstantissimum, non solum communi omnium sensu docemur, sed & ratione doctrice, & multo magis ductrice Fide diuina conuincimur. Eo enim tanquam instrumento vniuersali ad hunc subsolarem Mundum gubernandū potissimum vtitur Deus, vt passim Sacri eloquij paginis edocemur; quæ res etiam Sapientissimum Regem Salomonem in admirationem rapuit, dum in hanc exclamationem erupit: *Sol admirabile vas Altissimi*: vnde cæca antiquitas nimium progressa, inter Numina ipsum collocauit. Philosophi certè non pauci anima rationis particeps ipsum donauere; causam rerum omnium generabilium vniuersalissimam ita multi constituunt, vt absq. illius concursu quidquam produci posse aut solere negent. vnde tandem etiam concludunt, Sole consistente, cælestes influxus cessaturos, & causarum secundarum efficaciam euanidam futuram, quæ si accuratè perpendantur, insignitam Dei in hoc corpore perficiendo sapientiam commendant; quæ in operibus suis humanum captum tantum excedit, quantum ipse Sol à terra distat, quantum diuina ab humanis. Sed hæc generalia, nunc ad particularia magis accedamus.

Suppono autem.

*Suppositio-
nes.*

Primò. Non dari actionem in distans.

Secundò. Solem esse substantiam, quandam corpoream.

Tertiò. Cum Sol distet à terra, & tamen in ipsam agat, id fieri non posse, nisi per vim quandam corpoream, & materialem.

Quartò. Terram esse opacam, & radijs solaribus imperuiam, saltem ex maxima parte, & magnam profundi-

tatem.

Quintò. Radios solares progredi in directum.

Sextò. Terram esse minorem Sole, & velut amiculo circumdatam Regione vaporosa, siue Atmosphæra.

His suppositis, sciendum est, ex Opticis, tametsi iter cuiuslibet radij seu lucidi seu colorati sit rectilineum, illud tamen triplici modo posse & solere propagari; videlicet Radio directo, retracto, reflexo.

Directus in proposito radius est, qui à Sole ad terram vsque continuatur secundum vnius lineæ rectæ fluxum, seu qui nullum angulum vsquam facit. *Radius directus, Refractus, Reflexus.*

Refractus, qui componitur è duabus vel pluribus rectis lineis luminosis, seu radiosus per diaphana diuersa ad nos tralapsis, quæ lineæ ad angulos Refractionum communibus, punctis computantur.

Reflexus radius est (in nostro negotio,) qui ab opaco aliquo per Solem illustrato, ad oculum in terrâ consistente reuerberatur, & punctum Reflexionis cum Radio directo idem habet.

Dicendum primò. *Actio Solis in hæc inferiora fit specie Solis radiofa.* Quia vt præsupposui, Sol non agit in distans, & cum corporaliter per substantiam suam hic inferioribus non adsit, oportet ipsum præsentem esse producta à se aliqua virtute; quæ cum sit sola radiofa à semet emissâ species, ipsa erit cuius beneficio Sol in corpora subsolaria influit. Vtor autem vocabulo speciei radiofæ, vt non tantum lucem, sed & colores atque alias Solis qualitates, profluuijs rectis ab ipso emanantes includam. *Sol in hæc inferiora influit per speciem radiofam.*

Dicendum secundò. *Sol agit in illustratam terrâ portionem simul radio directo, simul refracto, simul reflexo.* Primum constat, quia è quolibet Solis puncto versus terram conuerso, promanat vnus aliquis indiuiduus radius perpendicularis. hic autem semper fertur incessu recto, tam per Atmosphæram quam per aërem, &c. Secundum constat, ex aliqua speciei solaris in Atmosphæram incidentia; quæ radios refractos in terram deducit. Tertium patet, quia Sol omnia sidera supra horizontem existentia illuminat, hæc autem acceptam à Sole lucem in terram etiam lucen-

Species Solis radiofa quæ?

Sol in terrâ agit semper radio triplici, directo, refracto, reflexo.

I.

lucēte Sole, refundūt. Nec obstat, quod obſtāte diei luce, radios reflexos nō videamus; nā terra & naturæ terreſtres illos ſentiūt, etiamſi viſu non percipiant.

Actioſolarium, quāvis?

Dicendum tertio. *Actio Solis fortiffima eſt, quæ ſit ſpecie directā: minus fortis quæ ſit refractā; minime quæ ſit reflexa.*

Probatur primo.

Primum patet ex eo, quod omnes radij ſine vllō impedimento ad ſuperficiem terræ delabuntur: & confirmatur ex poſitione ſphæræ rectæ, in qua Sol Meridianus ex Zenith arradiat.

Probatur ſecundo.

Secundum ex eo, quod radij ſolares per Atmosphæram traducti hebetentur refractione, & magis quidem, quo lōgius ab incidentia perpendiculari abeunt, vt cōſtat ex ſitu ſphæræ oblique, & parallelæ, itēq. ortu occaſuq. Solis quotidiano.

Probatur tertio.

Tertiū ex eo eluceſcit, q̄ aſtra radios ſolares reflectētia, ob maximā remotiōnē, & apparentē paruitatē molis, itemq. quod plurimos in ſe abſorbeāt, aut aliorum ſpargāt, ſpecies valde debiles remittant, vt videre eſt quot noctibus ſerenis præſertim illunibus. Hæc autem intelligēda ſunt de illuminatione prout à Sole prouenit & agit ille radius, nam de virtute radij ſolaris à ſtella accepta, iam non diſputo &c.

Actio Solis in idem terræ hemiſphærium diuerſa.

Dicendum quartō. Sol totus agit in hemiſphærio terræ illuſtratum, ſed diuerſimode. Nam actionem directam, & refractam exercet ex hemiſphærio ſui globi ad nos cōuerſo; reflexam vero, ex hemiſphærio auerſo, quo illuſtrat ſtellas ſupra horizontem verſantes, & illæ imbibitā Solis lucem in terrā reiaculantur.

COROLLARIUM.

Hinc ſequitur terræ patēs hemiſphærium à toto Sole, adeoq. latēte eiſdem etiam hemiſphærio illuſtrari etiā de die.

Dicendū quintō. Solis hemiſphærium nobis apparens, agit in latentem & auerſam terræ portionem, ſola reflexione; quæ terræ pars à Sole, præter hāc Solis influentiam nil accipit. Et probatur. Quia terra eſt adiaphana, vt ſuppoſui, & Solis radij feruntur in directum, ideoq. tota terra à toto Sole ſimul radijs directis nūquam aſpicitur; nam omnes radij ex auerſa Solis parte verſus cælum ſupra nos eleuatū exporriguntur; radij autem refracti oriuntur ex ijs Solis, qui ex aduerſo Solis vultu in Atmosphæram terreſtrem,

II.

delabuntur, & hi ipſi auerſam terræ plagam nunquam percutiunt; reſtat ergo, ſi vlli Solis radij in latentem terræ partem deferuntur, eos eſſe reflexos ab aſtris, quos à patente nobis Solis hemiſphærio acceperunt; nam ij qui à latente procedunt, cadūt in ſidera diurna, quos autem nocturna accipiunt, & in terram nocturnam reflectuntur, ij à plaga Solis terram affulgente proficiſcuntur. vti conſideranti patebit. neq. alia opus eſt in re clara probatione,

COROLLARIUM.

Hinc patet totum terræ ambitum irradiari ſimul à patente Solis hemiſphærio ad terram conuerſo, à toto autem Solis ambitu illuſtrari terram tantum patentem & ad Solem conuerſam.

Dicendum ſextō. Diuerſa Solis agendi viſ, quā in terreni globi ſuperficiem illuſtratā ſimul non ſucceſſiue in hoc mundi ſtatu exercet, non prouenit ex parte Solis; quod ipſe ad extremas illuſtinate terræ partes, radios aut pauciores aut ex ſe debiliores, aut aliter configuratos emittat; neque ex eo, quod terra rotunda cum ſit, minus idonee poſſit illos radios excipere, neq. ex eo, quod Sol cōnū longiorem projiciat ad cōtactum terræ, & partes ipſi cōtactui vicinas, quā ad locum vertici ſubiectum; ſed ex eo quaſi ſolo, quod Atmosphæra radios Solis in terram directos non tantū refractione, ſed multo magis longi tranſitu hebetet, atq. ita elūbet, vt cōparatione directorū admodum parū valeant.

Terrā ſimul ac ſemel à Sole ita illuſtrari, vt extremitas terræ illuſtrata ſit ſuperficiæ ſphæricæ ſegmentum maius eo, quod nō illuſtratur, ex illo, quod Sol terrā ſit maior, apud omnes notum eſt; hanc item ſuperficiē lumine Solis perfuſam, inæqualiter illuminari, & vehementiſſimē quidē in medio, debiliſſimē vero ad extrema, medio deniq. modo inter vtrāq. cōſtat inter omnes vel mediocriter rerū phyſicarū & Mathemat. peritos, & experimentis quotidianis datur cernere: nā Solis oriētis aut occidentis lux, eſt rotius diei tenuiſſima; meridiana intensiſſima; medijs temporis, media. Sol item ſub horizontem varie & coloratur & figuratur, auctus & minutus cernitur, aliter quā in meridie: ex hac igitur diuerſarum poſitionum attempe-

Diuerſa Solis agendi in terram ratio, vnde proueniat?

Explicatur dictum.

Quomodo vnus idemque Solis radios co-nus, terrarū diuerſimode afficiat?

*Diuersus il-
lustrandi mo-
dus, causat
diuersam a-
gendi vim.*

*Primum di-
cendi sexti
membrum
probatur.*

*Inter Solem
& terram
medium v-
biq. simile
& uniforme
est supponē-
dum, ad id,
quod pro-
bandum su-
scipitur.*

*Secundum
Dicendi sex-
ti mem-
brum pro-
batur.*

ratione lucis solaris, dico etiam solarem
agendi vim commensurari.

Vnde qui causam actiuitatis variæ
vult nosse, oportet indagare illustratio-
nis & reliquorum accidentium; id quod
modo exequor, per aliquot membra,
quorum

Primum est, *Diuersam Solis agendi vim
in diuersas illuminate terre partes non
promanare ex eo, quod Sol ex sua parte
in illuminando desit, videlicet mittendo
illuc radios vel pauciores, vel debiliores,
vel alio modo formatos & firmatos, sed
dico ipsos eodem prorsus modo sese habere
ubique quantum est ex parte Solis.* Ad
quod probandum, debemus cætera o-
mnia, quæ disparitatem aliquā ingerere
possunt, cogitatione separare, & inter
Solem atq. terram diaphanum vnicum
uniforme imaginatione concipere. quo
posito, patet statim veritas dicti. Ete-
nim ad quodcunq. terræ illuminatæ assi-
gnabile punctum, terminabitur conus
radij solaris, cuiusque alteri similis &
æqualis; cuius quidem coni basis erit vi-
sa Solis superficies, vertex punctum in
terra designatum atque illustratum, su-
perficies conica radij ex assignato terre-
ni puncti vertice Solem circulariter tan-
gentes. Cumque tot eiusmodi coni ra-
diosi possint haberi, quot in terra illu-
strata sunt assignabilia puncta, omnesq.
inter se ad sensum sint figura similes, æ-
quales, magnitudine, & lucendi virtute,
seu vt loquuntur, extensione ac inten-
sione, omnesq. e meris radijs directis,
non refractis, vt supponitur, conflati, pa-
tet vim agendi singulorum æqualem fore;
quia radios numero pares, magnitu-
dine æquales, & agendi efficacitate si-
miles habebunt: cum igitur illustratio
cuiusvis puncti terreni sit æqualis illu-
strationi puncti cuiuslibet: patet et æqua-
lem in quolibet produci debere ex illu-
stratione effectū. Disparitas ergo agendi
ex hac parte à Sole in terram non pro-
uenit, id quod erat probandum primo.

Secundum Membrum; *Disparitatem
agendi, vel potius virtutis solaris reci-
piendæ, inæqualitatem, amolitur à terra.
posset enim aliquis sibi imaginari, id ex
eo prouenire, quod radii solares, ad glo-
bosam terræ superficiem oblique incidant;
siquidem passim experimur; in ijs quæ
motu recto feruntur; si in oppositam,*

1 molem recta impingunt, fortius ferire,
minus fortiter si oblique appellant. Et
confirmatur ex angulo resultus, quem
angulo impactus æqualem fieri, non est
5 dubium. Quando autem assultus ita ac-
cidit, vt obuersum corpus leuiter ex o-
bliquo stringat, tunc mobile sine vilo
ferme impe dimento, cæptum iter pera-
git, sine sensibili rectitudinis mutatione
10 donec intentum obtineat locum. Eo-
dem igitur modo, lucis tendentia à So-
le promanans, cum fluxu rectilineo
promoueat, vti supposuimus, vbi ter-
ram tangit, non sistetur, sed ulterius
15 absque vlla directionis deuiatione pro-
gredietur, quia angulus contingentie
radium rectilineum neque sistit, neque
frangit, neque repercutit. Vnde per
consequens, Sol in contactu, vel conta-
20 ctus vicinia, terram vel omnino non il-
lustrat, vel in locis contactui vicinis mi-
nus, quam in remotis, & illuminationi
perpendiculari propioribus.

Ad hanc venustam philosophiam
25 respondeo; verum quidem esse, lucis e-
manationem secundum rectitudinem
propagari, & argumento neruum for-
tassis aliquem adfuturum, si terra aut
diaphana, aut geometrice spherica atq.
30 adeo superficie tersissima æquabilissi-
maque inuestita esset. Sic enim lux dire-
ctius allapsa, in ipsam profundius intra-
ret, & magis vtiq. radicaretur, quam cir-
ca extrema: at vero, cum terra opaca,
35 neque Mathematicè spherica, sed inæqua-
lis & aspera existat, lux item non sub-
stantia sed accidens, neque motu locali
sed alterationis in rectū procedat, neque
ipsa sit mobile, sed motus siue illumina-
40 tionis terminus; præterea nos hic de
contactu physico disputemus; dico par-
tes terrenas vltimæ illustrationi subiectas
aut vicinas, à lucido Solis cono plerumq.
non minus illuminari, quam medias; si
45 quidem medium uniforme supponamus.
Nam conus solaris incidet in obiecta su-
perficie terrestris corpora ad angulos
rectos; distat quippe Sol oriens aut oc-
cidens, à vertice loci cuiusque, cui oritur
aut occidit, integro circuli quadrante;
50 radij igitur Solis orientis, aut occiden-
tis, adeoque conus solaris, ad lineam loci
dicti verticalem, sunt recti. & quia
montes terræ, eriguntur secundum li-
neam verticalem, & plantæ similiter as-
sur-

*Vtrum lu-
cis fluxus
rectus, ad
subiectū il-
luminandū
se ita habeat
sicut se ha-
bet, Mobilis
latio recta,
ad corpus
obstans?*

*Illuminan-
tis & Mobi-
lis secundum
tendentiam
rectam di-
sparitas*

I.

II.

sursum versus Zenith loci, homines item & bestiae horisonti perpendiculariter insistant, etiam si secundum verticalem lineam erigantur, adeoque haec omnia ad planum Horizontis sunt erecta, quemadmodum & turrium, palatiorum, Templorum, domorumque parietes, necnon pyramides, columnae, Colossi secundum perpendicularum excitata, itemque naues, & navium mali, necnon pendula ex hisce carbasa, &c. manifestum est, ipsorum latera ad Solis orientis aut occidentis faciem obversa, radijs Solis recte non oblique illustrari. Quia radij Solares iacent in plano horisontis; ipsorum autem illustratorum corporum superficies altitudinum sunt in planis verticalibus. Sol igitur oriens aut occidens, si per medium vnum & pure diaphanum affluat, ipsas omnium fortissime illustrabit; & homo, verbi gratia, hic Romae, sub dio stans, orientemque aut occidentem Solem excipiens, aequale clarum, aequale vehementem imo feruentiorem experietur, atque in summa aestate sentire soleat ipsum meridianum: ratio, quia Meridianus ad hominem erectum est obliquus in sphaera obliqua, orientalis autem aut occidentalis semper rectus est; omnibus ergo reliquis paribus dempta nimirum vapida caeli regione, plus agit hic quam ille. Et sic elucidatum est etiam Membrum secundum; Solis scilicet in terra illuminanda & vegetanda inaequalem, & versus decliviora atque remotiora decreascentem virtutem non oriri, propter globosam eiusdem terrae prout nunc constituta est configurationem, & partes declivitate luminis recipiendo inhabiles.

Et confirmatur primo, Experimentis manifestissimis Lunae tam novae, quam dimidiaae atque plenae. videmus enim in nova & crescente, seu contra in veteri & senescente, iuga montium Lunarium luce solari perfusa, vehementissime praelucere, tamen si Sol secundum extremos illuminationis radios ipsa contingat: in plena vero, margines aequales atque medios campos aspicimus; quae omnia in terreni orbis collustratione dubio procul evenirent, si per medium ubique uniforme solares conij à Sole in ipsam delaberentur.

Confirmatur secundo, Ex inaequali superficiei terrestris, partiumque ipsius singularum, ut dictum, positione, haec enim facit ut radius Solis quasi semper incidentiam rectam adeoque ad agendum maxime opportunam, etiam in situ depresso inveniatur. Et sic probatum manet membrum secundum.

Ad quod melius intelligendum, & obiectionibus occurrendum,

Notandum est primo, Me non negare, solarem radium in sphaeram perfecte rotundam & politam incidentem, operari vehementius apud incidentiam rectam quam obliquam; id enim certum est apud omnes; sed hoc solum affirmare, hanc diversitatem, etiam si terrae globus geometricè sphaericus, & optice instar speculi tersus esset, ab ipso radio incidente precise spectato non proficisci; si namque ab ipso incidentiae puncto, radioque reflexo abstrahamus, omnes radij directi aequalis potentiae invenientur. an autem punctum reflexionis, vel ipse reflectendi modus, aut denique radius reflexus operationis huius differentiam efficiat, hic ego non excutio, in Opticis namque eventuari solent similia. Unde,

Notandum nihilominus secundo, Eam quam Sol horizontalis in splendendo hebetudinem & calefaciendo debilitatem modo ostendit, etiam si cogitatione terram Mathematicè glabram statuamus, ex hoc tamen Solem illustriorem humano oculo non futurum, quia effectus Atmosphaerae non pendet ab incidentia radij solaris quacunque. quanquam in hoc casu, fateatur terram aliter, quam modo ex actione Solis alterandam, sed hoc mea quaestio non petit: cum solum illud urgeam, Solis horizontalis accedentes in hoc terrae statu obfuscationes ab incidentia solari non esse. Quod ut amplius constet,

Notandum tertio, Me id ex terra prout modo exasperata est, probare, propter incidentiam manere, meridie & vespere, fere similem. Nam mare tam asperum quidem non est, attamen translucidum est & sic radios obliquos & laterales imbibendo alius ad extrema quam circa medium, multa in lumine compensare potest.

Hinc recte dicitur, si prout terra nunc constituta est, Atmosphaeram tollamus, Solem orientem aut occidentem

I.

tem tam vehementem futurum, quam nunc in meridie quocunque existat: ex quo patet, istas horizontalis Solis differentias, vni Atmosphære modo explicato adscribendas esse.

*Dicendi 6.
Membrum
tertium pro-*

solarium debilitatem, & inaequalem a-
gendi vim, non enasci ex inaequali co-
norum solarium longitudine: quod vt
rectè intelligatur, sciendum est, totum Solem apparentem in superficie terre-
næ sibi aduersæ quodlibet punctum, promittere vnum conum illuminationis, cuius basis sit apprens Solis circulus, vertex quodlibet terræ illustratæ punctum: quia igitur terra globosa est, sequitur eos conos, qui ad eleuatiore superficiei terrestris puncta acuminantur, esse breuiores, ijs qui ad depressiorem finiuntur: nam si à centro Solis in superficiei terrestris illuminatæ centrum, demittatur radius, per quem arcus circuli maximi in superficie terre transire intelligatur, & in hunc deinde arcum maximum descendant radij, alij à Solis centro, erit ille minimus, qui inter centrum Solis & terræ diametrum interponitur, aliorum vero is, qui propinquior, est minimo remotiore semper erit minor &c.

*Eucl. lib. 3,
propof. 8,*

Et quia eiusmodi radij conorum solarium de quibus ago, sunt axes conorum solarium, certum est istos conos inæqualis esse altitudinis, quam axes illorum inter se inæquales mensurant; & longissimi erunt ij coni, quorum axes terram tangunt, breuissimi, qui eidem perpendiculariter incidunt: eritque altitudinum differentia summa, paullo maior semidiametro terræ.

Hanc autem altitudinum vel longitudinum discrepantiam, ad præsens negotium nil penitus conferre, ex eo patet, quod Sol perigæus sit terræ propinquior 80. terræ semidiametris, quam Apogæus; & tamen si conorum altitudo vel humilitas sensibilis, Solem efficacior vel remissior redderet, deberet hoc maximè sentiri in situ Solis Perigæo & Apogæo, quod tamen non fit. Quandoquidem Sol hyemalis nobis vicinior est, 80. terræ semidiametris quam æstivalis, & ad sensum maior apparet quam æstate; & tamen magis luminosum aut actiuum sensibilibus non

II.

1 experimur, cæteris omnibus paribus positis. Si igitur tanta conorum radio-
forum differentia, differentem ad sensum actiuitatem Solis in terram non inducit, quanto minus id faciet, vnica
5 terræ semidiameter, quæ planè in hoc negotio insensibilis existit.

Cum enim Sol perigæus absit à terra semidiametris eiusdem terræ 1101. si vniam addamus aut demamus, ad hanc
10 distantiam, quis sensus percipiet? multo minus vnitas ad 1182. est sensu perceptibilis, quod accidit conis solaribus apogæis. Et sic demonstratum manet
15 etiam membrum tertium. *Quod nimirum solarium conorum in singula terræ puncta delapsorum, longitudo diuersa, non causet diuersam Solis in illustranda & alteranda terra, virtutem.*

20 Quapropter restat quartum, quod erat, omnem difformitatem quam solaris radius in illuminanda terra patitur, existere à sola regione vapida seu Atmosphæra, quæ terram veluti indumento
25 delicato amicit, & à iaculis Phæbeis ita protegit, vt vehementiorem ipsorum impetum variè retundat, prout magis vel minus obliquè inceserint, & prout ipsa quoque Atmosphæra densior aut rarior,
30 profundior aut tenuior extiterit. Nam ipsam inperpetua quoque variatione versari, certissimum est. Radij ergo solares per ipsam in terræ superficiem propagati, & retunduntur & refringuntur diuer-
35 simode, de quibus vtrisque fuse disserui in Sole Elliptico & Refractionibus meis cælestibus. Hosce autem duos effectus, Refractionem videlicet, & lucis hebetationem esse inter se distinctos, patet
40 ex distinctis causis: nam Refractio sequitur densitatem aut raritatem diaphani, quæ consistit absque vlla necessaria coloratione siue opacitate; hebetatio vero lucis, ex opacitate siue coloratione potissimam originem trahit.

45 Vnde cum in Atmosphæra vtrumque reperiatur, & densitas & satis notabilis ex insitis coloribus opacitas; haud mirum si ipsa tantum iuris in
50 illustrem Solis conum exercet: accedente præsertim situ obliquo, qui facit vt radius solaris horizonti vicinus in ista Atmosphæra longum iter insit, ideoque lucis & vigoris plurimum amittat. Quemadmodum experientia quo-
55 tidia-

Dicendi se-
xtum Mem-
brum quar-
tum, in quo
omnis diuer-
sitatis caus-
sa in Atmo-
sphæram
conijcitur.

I.

ridiana manifestat in orientis & occumbentis Solis aspectu, quem visus liber impune sustinet; secus in meridie.

Quæ vero hætenus de terra illustrata disputauimus, proueniunt ex ipsa illustrandi natura, considerando Solem sine motu locali, secundum stationem fixam: ista enim fiunt ex eo solo, quod Sol terram illuminet, per tale medium: ex quo sequitur; Si Sol circa terram non conuolueretur, in ijs locis, quorum verticibus ipse stans immineret, futuram sæuissimam & torridam æstatem; in declinioribus moderatiorem temperiem, in extremis illustrationis partibus, magna frigora; in oppositæ terræ plagis perpetuam noctem & sæuissimam hyemem.

VNDE NASCUNTUR NONNVL-
la resoluenda dubia.

C A P. X.

DVBIUM PRIMVM.

An si Sol, Luna, reliqui planeta & sidera starent, aliqua circa terram Atmosphæra, & qualis esset?

Atmosphærâ ex halitibus terrestribus & vaporibus aqueis actione Solis & reliquorum astrorum concitari, inter doctos conuenit. Hanc eandem Atmosphæram, ob Solis & reliquorum astrorum conuersiones varie mutari & attemperari, apud eosdem indubitatum est.

Conuersionibus igitur tam Solis, quam astrorum circa terram cessantibus, merito dubitatur inter doctos, An Atmosphæra esset cessatura? Aut, si non desineret, qualisnam ea esset futura?

Ad resolutionem huius quæstionis prænotandum est, causam Atmosphære productiuam non esse motum Solis circa terram præcisè spectatum, sed virtutem Solis quam in terram per illuminationem exerit; Motum verò Solis, esse id quo virtus illa circumfertur, & varie applicatur ad partes terræ alias aliasque.

Respondeo ergo primo. Etiam si Sol, & reliqua astra tam fixa quam er-

II.

atica starent, nihilominus virtutem illuminandi, terram, & quæ inde consequitur agendi vim, neque Soli, neque astris stantibus ademptum iri, & consequenter Atmosphæram, per educationem vaporum nihilominus procreandâ. Habemus Solis stantis & tamen lucentis exemplum in sacra Scriptura.

Respondeo secundo, hanc Atmosphæram, stante Sole producendam, ei quæ nunc est, valde dissimilem futuram, propter dissimilem causæ producentis applicationem. Quia Sol consistens in terram perpendiculariter subiectam vehementissimè aget, versus latera remissus; in nocturnam verò plagam non nisi mediare per radios ab astris reflexos, hoc est luce & calore debilissimo: è quibus facile est iudicare, constitutionem Atmosphære futuram supra modum difformem, & huic quæ modo est, multum dissimilem.

An autem hæc ipsa Atmosphæra esset in sua hac difformitate quieta & stabilis aliquando futura; relinquo partim excutiendum Philosophis, partim è dicendis utcumque intellectum iri confido.

DVBIUM SECVNDVM.

An & quomodo, stante Sole, & Luna, &c. Sol nihilominus per motus Phænomeni huius proprios, perpetuaret, & dirigeret vicissitudines generationum & corruptionum?

Recepta est apud multos philosophia sine Solis mobilis vniuersali concursu & influxu in mundo hoc sublunari nil fieri; vnde fere concludunt, stante Sole, actiones & rerum productiones quodammodo cessaturas.

At hæc quidem sententia, postquam Phænomenon ipsum etiam stantem Solem circa centrum suum conuolui, & varie alterari edocet: virtutem eiusdem etiam stantis in totum terræ globum identidem immutari concedere debet; vnde generationes omnino cessaturas, non est liquidum.

Hoc certum videtur, Sole staturo mundi huius terreni gubernationem lo-

I.

tem tam vehementem futurum, quam nunc in meridie quocunque existat: ex quo patet, istas horizontalis Solis differentias, vni Atmosphære modo explicato adscribendas esse.

Dicendi 6. Membrum tertium pro-
Membrum tertium erat, *batur.* solarium debilitatem, & inaequalem agendi vim, non enasci ex inaequali conorum solarium longitudine: quod vt rectè intelligatur, sciendum est, totum

Solem apparentem in superficiei terrenæ sibi aduersæ quodlibet punctum, promittere vnum conum illuminationis, cuius basis sit apparens Solis circulus, vertex quodlibet terræ illustratæ punctum: quia igitur terra globosa est, sequitur eos conos, qui ad eleuatiore superficiei terrestris puncta acuminantur, esse breuiores, ijs qui ad depressiora finiuntur: nam si à centro Solis in superficiei terrenæ illuminate centrum, demittatur radius, per quem arcus circuli maximi in superficie terræ transire intelligatur, & in hunc deinde arcum maximum descendant radij, alij à Solis centro, erit ille minimus, qui inter centrum Solis & terræ diametrum interponitur, aliorum vero is, qui propinquior, est minimo remotiore semper erit minor &c.

Eucl. lib. 3, propof. 8,

Et quia eiusmodi radij conorum solarium de quibus ago, sunt axes conorum solarium, certum est istos conos inaequalis esse altitudinis, quam axes illorum inter se inaequales mensurant; & longissimi erunt ij coni, quorum axes terram tangunt, breuissimi, qui eidem perpendiculariter incidunt: eritque altitudinum differentia summa, paullo maior semidiametro terræ.

Hanc autem altitudinum vel longitudinum discrepantiam, ad præsens negotium nil penitus conferre, ex eo patet, quod Sol perigæus sit terræ propinquior 80. terræ semidiametris, quam Apogæus: & tamen si conorum altitudo vel humilitas sensibilis, Solem efficaciorum vel remissiorum redderet, deberet hoc maximè sentiri in situ Solis Perigæo & Apogæo, quod tamen non fit. Quandoquidem Sol hyemalis nobis vicinior est, 80. terræ semidiametris quam æstivalis, & ad sensum maior apparet quam æstate; & tamen magis luminosum aut actiuum sensibilibus non

II.

1 experimur, cæteris omnibus paribus positis. Si igitur tanta conorum radioforum differentia, differentem ad sensum actiuitatem Solis in terram non inducit, quanto minus id faciet, vnica terræ semidiameter, quæ planè in hoc negotio insensibilis existit.

Cum enim Sol perigæus absit à terræ semidiametris eiusdem terræ 1101. si vniam addamus aut demamus, ad hanc distantiam, quis sensus percipiet? multo minus vnitas ad 1182. est sensu perceptibilis, quod accidit conis solaribus apogæis. Et sic demonstratum manet etiam membrum tertium. *Quod nimirum solarium conorum in singula terræ puncta delapsorum, longitudo diuersa, non causet diuersam Solis in illustranda & alteranda terra, virtutem.*

Dicendi sextum Mem-
Quapropter restat quartum, quod *brum quartum, in quo*
erat, omnem difformitatem quam solaris *omnis diuersitatis causa in Atmosphæram*
radius in illuminanda terra patitur, *conijcitur.*
existere à sola regione vapida seu Atmosphæra, quæ terram veluti indumento

25 delicato amicit, & à iaculis Phæbeis ita protegit, vt vehementiorem ipsorum impetum variè retundat, prout magis vel minus obliquè inceserint, & prout ipsa quoque Atmosphæra densior aut rarior, 30 profundior aut tenuior extiterit. Nam ipsam inperpetua quoque variatione versari, certissimum est. Radij ergo solares per ipsam in terræ superficiem propagati, & retunduntur & refringuntur diuersimode, de quibus vtrisque fuse disserui in Sole Elliptico & Refractionibus meis cælestibus. Hosce autem duos effectus, Refractionem videlicet, & lucis hebetationem esse inter se distinctos, patet 40 ex distinctis causis: nam Refractio sequitur densitatem aut raritatem diaphani, quæ consistit absque vlla necessaria coloratione siue opacitate; hebetatio vero lucis, ex opacitate siue coloratione potissimam originem trahit.

45 Vnde cum in Atmosphæra vtrumque reperiatur, & densitas & satis notabilis ex insitis coloribus opacitas; haud mirum si ipsa tantum iuris in illustrem Solis conum exercet: accedente præsertim situ obliquo, qui facit vt radius solaris horizonti vicinus in ista Atmosphæra longum iter insistat, ideoque lucis & vigoris plurimum amittat. Quemadmodum experientia quotidiana

I.

ridiana manifestat in orientis & occumbentis Solis aspectu, quem visus liber impune sustinet; secus in meridie.

Quæ vero hæcenus de terra illustrata disputauimus, proueniunt ex ipsa illustrandi natura, considerando Solem sine motu locali, secundum stationem fixam: ista enim fiunt ex eo solo, quod Sol terram illuminet, per tale medium: ex quo sequitur; Si Sol circa terram non conuolueretur, in ijs locis, quorum verticibus ipse stans immineret, futuram sæuissimam & torridam æstatem; in declinioribus moderatiorem temperiem, in extremis illustrationis partibus, magna frigora; in oppositæ terræ plagis perpetuam noctem & seuiissimam hyemem.

VNDE NASCUNTUR NONNVL-
la resoluenda dubia.

C A P. X.

DVBIUM PRIMVM.

An si Sol, Luna, reliqui planeta & sidera starent, aliqua circa terram Atmosphæra, & qualis esset?

Atmosphæra ex halitibus terrestribus & vaporibus aqueis actione Solis & reliquorum astrorum concitari, inter doctos conuenit. Hanc eandem Atmosphæram, ob Solis & reliquorum astrorum conuersiones varie mutari & attemperari, apud eosdem indubitatum est.

Conuersionibus igitur tam Solis, quam astrorum circa terram cessantibus, merito dubitatur inter doctos, An Atmosphæra esset cessatura? Aut, si non desineret, qualisnam ea esset futura?

Ad resolutionem huius quæstionis prænotandum est, causam Atmosphæra productiuam non esse motum Solis circa terram præcisè spectatum, sed virtutem Solis quam in terram per illuminationem exerit; Motum verò Solis, esse id quo virtus illa circumfertur, & varie applicatur ad partes terræ alias aliasque.

Respondeo ergo primo. Etiam si Sol, & reliqua astra tam fixa quam er-

II.

ratica starent, nihilominus virtutem illuminandi, terram, & quæ inde consequitur agendi vim, neque Soli, neque astris stantibus ademptum iri, & consequenter Atmosphæram, per educationem vaporum nihilominus procreandam. Habemus Solis stantis & tamen lucentis exemplum in sacra Scriptura.

Respondeo secundo, hanc Atmosphæram, stante Sole producendam, ei quæ nunc est, valde dissimilem futuram, propter dissimilem causæ producentis applicationem. Quia Sol consistens in terram perpendiculariter subiectam vehementissimè aget, versus latera remissius; in nocturnam verò plagam non nisi mediatè per radios ab astris reflexos, hoc est luce & calore debilissimo: è quibus facile est iudicare, constitutionem Atmosphærae futuram supra modum difformem, & huic quæ modo est, multum dissimilem.

An autem hæc ipsa Atmosphæra esset in sua hac difformitate quieta & stabilis aliquando futura; relinquo partim excutiendum Philosophis, partim è dicendis utcumque intellectum iri confido.

DVBIUM SECVNDVM.

An & quomodo, stante Sole, & Luna, &c. Sol nihilominus per motus Phænomeni huius proprios, perpetuaret, & dirigeret vicissitudines generationum & corruptionum?

Recepta est apud multos philosophia sine Solis mobilis vniuersali concursu & influxu in mundo hoc sublunari nil fieri; vnde fere concludunt, stante Sole, actiones & rerum productiones quodammodo cessaturas.

At hæc quidem sententia, postquam Phænomenon ipsum etiam stantem Solem circa centrum suum conuolui, & varie alterari edocet: virtutem eiusdem etiam stantis in totum terræ globum identidem immutari concedere debet; vnde generationes omnino cessaturas, non est liquidum.

Hoc certum videtur, Sole staturo mundi huius terreni gubernationem longè

I.

ge aliam & statum turbulentum futurum, neque terræ globum ubique habitabilem, prout aunc experimur, idque propter Solis benefici & omnia vegetantis atque conseruantis absentiam. Quibus ex rebus munifica diuinæ prouidentiae bonitas eluxit, quod huic sideri motum longitudinis diurnum, & latitudinis annum eumque excentricum attribuit; sic enim Atmosphæra ad æquabilem mediocritatem & humanis vñibus accommodatam temperiem digeritur: sic vicissitudines temporum, Hyemis & Aestatis, Auctumni, & Veris habemus; sic curricula annorum, mensium, hebdomadum nec non dierum transigimus: quorum vicissitudines & diuersitates vnus idemque Sol sua præsentia & absentia efficit.

Virtus igitur Solis terreno globo à diuina prouidentia communicatur per motum localem diurnum & annum, ipsius virtutis delatorem.

Deinde per Lunam circa terram, & planetas circa Solem tanquam centrum conuersos. qui acceptos à Sole radios in terram refundunt.

Et quandoquidem ipsorum corpora ipsos Solis fulgores non tantum superficialiter sed corporaliter in se hauriunt, & natiua sua proprietate tingunt, idcirco aliter longè affectos in terram remittunt,

Diuersi astrorum colores non sunt à Sole.

Quod autem tinctura ista ita sese habeat, palam fit ex ipsorum diuersissime coloratis lucibus, quam colorum varietatem à luce Solis non esse ex eo conficitur; quia si à Sole prouenirent, eodem tempore, simili colore omnes planetæ imbuerentur, & si vnus color mutaretur, omnibus idem accideret: simili ratione ipsorum colores non prouenire ex medio, patet, quia singuli suas tincturas in omni loco, situ, & tempore seruant; vnde ex insitis ipsorum coloribus aduenientem Solis lucem infici, atque inde in terram vna cum suis qualitatibus reuerberari, & sic eandem diuersimode affici, omnino fatendum est.

Hæc autem ipsorum in terras influenza variatur ex accessu ipsorum, & recessu tam ad Solem quam ad terram, nec non situ vario.

Quemadmodum enim ipsius Solis conii radiosi ab interiecta Atmosphæra

II.

varie hebetantur, ita planetæ cuiusuis allapsos in terram radios, aliter atque aliter affici, pro directo vel obliquo per ipsam transitu non est dubium.

Nam planetam horizonti vicinum obtusius affulgere, quam Vertici proximum, experientia quotidiana comprobabat: huius autem differentiae causa sola est Atmosphæra, per quam planeta iuxta Zenith rectius, ideoque breuiori spatio transmittit radium vegetiorem; ex horizonte, propter traiectum transversum multum de lucis viuacitate amittit: id quod etiam ipsa stellarum scintillatio manifestissime ostendit, hæc enim iuxta verticem pacata est, iuxta horizontem valde inquieta. Quare? Quia vapores versus horizontem plures, pauciores versus Zenith interueniunt. Hi vero vnici tremorem stellarum radiationum intercissione in astris apparentem efficiunt.

Stellæ etiam fixæ, acceptos Solis radios, pro suæ naturæ conditione modificant, ijsque refusus corpori terreno suas virtutes impertiunt. Nam lumen omne Soli acceptum referunt; quod in terras remittunt, non vt specula tersa & polita; sed vt Luna, vt Venus, vt alia lacunosa corpora à Sole illustrata. Et sic liquet, omnem lucem cælestem, ex tota vniuersitate orbi terreno, quocunque tandem modo impertitam, esse solarem vel immediatam ab ipso Sole, vel mediata per stellas: & hanc quidem in ratione luminis esse multo imbecillior illa, in ratione tamen virtutis acti-
Omnis lux calidus in terram delapsa, à solo prouenit.

Cæterum pleraque hucusque dicta admirabilem diuinæ dispositionis ordinem & sapientiam commendant, ex ijs quæ de Sole eiusque motibus ab Astronomis cognita, & docta fuere: ex quibus tamen orbis mundani plena gubernatio non satis agnoscitur.

Quia motus isti, corpori solari non sunt proprii, sed accidentarii, Phænomenon autem nostrum, alios Motus, globo solari à primo sui conditu agnatos edocet.

I.
SOLIS GYRATIO.

Primus est localis, quo Sol singulis vicenis septimis diebus circiter, vnam circa centrum proprium reuolutionem conficit, & huius conuersionis beneficio, quidquid lucis, quidquid virtutis radiosæ continet, successiue tam in terram, quam vniuersum cælum adeoque sidera singula abundantissime effundit; & hanc quidem Solis circuitiōnem in terræ præsertim gratiam à Conditor esse Soli inditam, videtur ex hoc patere; quod ipsa non sit simplex, sed composita ex annua circumductione axis mobilis, circa quem prior motus describitur, quo fit vt Sol circa summitatem borealem, & depressionem australem, versus terram annuat sex mensium tempore, & abnuat ab eadem, vicissitudinaria polorum, & axium mobilium apparitione supra horizontem solarem, & occultatione infra eundem, vti satis ostensum est ex obseruato Phænomeno passim, & singulariter in Theoria.

Hanc igitur Solis vertiginosam librationem Circellorum polarium beneficio ad vtilitatem quoque molis terrenæ fieri, arbitror inter peritos controuersum vix iri. Quod si dies vnius anni trecenti sexaginta per 27. diuidamus, inueniemus totius Vniuersi lustrationes solares futuras vno anno tredecim, & semis. Et quia terrestris superficies ex hoc capite semper alia & alia luce solari irrigabitur, ita alia aliaque virtute solari haud dubiè imbuetur.

Quod si quis contendat hunc motum ad Solis ipsius conseruationem ab Auctore Deo ipsi potissimum attributum, & quodammodo naturalem esse; huic ego nihilominus aurem vellico, & in mentem reuoco, Solem ipsum propter terram quoque illustrandam, vegetandam, & veluti animandam esse factum, vnde consequens est, quidquid est propter Solem, esse etiam propter terram. ex quo mirifica Phænomeni huius excellentia emergit.

Possset autem diuina prouidentia Solem facile conseruare absque hac ipsius rotatione, radios autem directos, & virtutem hemisphærij solaris aucti immediatam, ad nos conuertere non potest, absque motu tali.

II.

Motus ad Quantitatem.

Secundus Solis, seu potius Phænomeni solaris motus est augmentatio, & diminutio, imo nouæ Macularum, Vmbrarum, & Facularum apparitiones, atque disparitiones, itemque perpetua figurarum variationes, mutue coniunctiones & separationes; quibus rebus Solis speciem incredibiliter variari, quis non videt? Quod si Astrologi & Physici tantum tribuunt aspectibus, coniunctionibus planetarum, & Lunæ Solisq; Eclipsibus, quid tandem sentiri par est de hoc Phænomeno, cuius opera Sol nonnunquam Eclipses quinquaginta aut sexaginta Macularum notabiliorum simul patitur? quæ Maculæ Lunam magnitudine sæpe æquant, quandoque superant? quid dicemus de perpetua Macularum secundarum in toto Sole dispersionem? Quid quod maxima Solis pars Faculis luculentis, iisque maximis, & terræ superficiem hemisphæricam excedentibus sæpius illustratur? Tandem quod sæpe etiam, absque his æquabili & placido vultu Sol affulget? Certe ista in terram diuersimode agere, effectus dissimiles producere, ratio & vera phylosophia docet. Variant enim impediunt, aut promouent, augent aut minuunt ipsam Solis lucem.

Motus Alterationis.

Tertius Motus est superficiei solaris continua alteratio, dum mutuis actionibus in se transmutantur Maculæ, Vmbræ, Faculæ, idque in tota quodammodo solaris Globi visibili superficie. Ex qua cum præcipua Solis in terram actio promanet, patet hac continue mutata, mutari quoque continenter solarem in terras, & subsolaria influxum.

Ex hisce igitur tribus perennibus solaris Phænomeni scaturiginibus, diuinæ Maiestatis inscrutabilem in hoc terrestris Mundo gubernando sapientiam, posse quadantenus hauriri, breuiter indicatum potius, quam dictum esto. Prolixioris & verioris speculationis materiam hinc Sapiens quilibet sibi eruet. Mihi satis est, portam aperire, & viam ostendere, qua ex hoc Phænomeno in

Acter-

Motus quantitatis qui in Sole inuenitur, inferiora mutat.

Motus alterationis in Sole spectatus, in sublunaria multum potest.

Motus localis Soli proprius & recens inuentus, inferiorum mutationum origo est.

Sol vno anno circa suum centrum decies & ter circumuoluitur.

I.

ge aliam & statum turbulentum futurum, neque terræ globum ubique habitabilem, prout nunc experimur, idque propter Solis benefici & omnia vegetantis atque conseruantis absentiam. Quibus ex rebus munifica diuinæ prouidentiae bonitas eluxit, quod huic fieri motum longitudinis diurnum, & latitudinis annum eumque excentricum attribuit; sic enim Atmosphæra ad æquabilem mediocritatem & humanis vsibus accommodatam temperiem digeritur: sic vicissitudines temporum, Hyemis & Aestatis, Auctumni, & Veris habemus; sic curricula annorum, mensium, hebdomadum nec non dierum transigimus: quorum vicissitudines & diuersitates vnus idemque Sol sua praesentia & absentia efficit.

Virtus igitur Solis terreno globo à diuina prouidentia communicatur per motum localem diurnum & annum, ipsius virtutis delatorem.

Deinde per Lunam circa terram, & planetas circa Solem tanquam centrum conuersos. qui acceptos à Sole radios in terram refundunt.

Et quandoquidem ipsorum corpora ipsos Solis fulgores non tantum superficialiter sed corporaliter in se hauriunt, & natiua sua proprietate tingunt, idcirco aliter longè affectos in terram remittunt,

Quod autem tinctura ista ita sese habeat, palam fit ex ipsorum diuersissime coloratis lucibus, quam colorum varietatem à luce Solis non esse ex eo conficitur; quia si à Sole prouenirent, eodem tempore, simili colore omnes planetæ imbuerentur, & si vnus color mutaretur, omnibus idem accideret: simili ratione ipsorum colores non prouenire ex medio, patet, quia singuli suas tincturas in omni loco, situ, & tempore seruant; vnde ex insitis ipsorum coloribus aduenientem Solis lucem infici, atque inde in terram vna cum suis qualitatibus reuerberari, & sic eandem diuersimode affici, omnino fatendum est.

Hæc autem ipsorum in terras influenza variatur ex accessu ipsorum, & recessu tam ad Solem quam ad terram, nec non situ vario.

Quemadmodum enim ipsius Solis coni radiosi ab interiecta Atmosphæra

II.

varie hebetantur, ita planetæ cuiusuis allapsos in terram radios, aliter atque aliter affici, pro directo vel obliquo per ipsam transitu non est dubium.

Nam planetam horizonti vicinum obtusius affulgere, quam Vertici proximum, experientia quotidiana comprobabat: huius autem differentiae causa sola est Atmosphæra, per quam planeta iuxta Zenith rectius, ideoque breviori spatio transmittit radium vegetiorem; ex horizonte, propter traiectionem transversum multum de lucis viuacitate amittit: id quod etiam ipsa stellarum scintillatio manifestissime ostendit, hæc enim iuxta verticem pacata est, iuxta horizontem valde inquieta. Quare? Quia vapores versus horizontem plures, pauciores versus Zenith interueniunt. Hi vero vnici tremorem stellarium radiationum intercissione in astris apparentem efficiunt.

Stellæ etiam fixæ, acceptos Solis radios, pro suæ naturæ conditione modificant, iisque refusus corpori terreno suas virtutes impertiunt. Nam lumen omne Soli acceptum referunt; quod in terras remittunt, non vt specula tersa & polita; sed vt Luna, vt Venus, vt alia lacunosa corpora à Sole illustrata. Et sic liquet, omnem lucem cælestem, ex tota vniuersitate orbi terreno, quocunque tandem modo impertitam, esse solarem vel immediatam ab ipso Sole, vel mediata per stellas: & hanc quidem in ratione luminis esse multo imbecillior illa, in ratione tamen virtutis acti-
Omnis lux calitus in terram de lapsa, à solo Sole prouenit.

uæ aliquid peculiare, ex proprietate stellæ secum deuehere, quasi certo constat. Et hinc influentiarum cælestium scaturigo aliqua manat.

Cæterum pleraque hucusque dicta admirabilem diuinæ dispositionis ordinem & sapientiam commendant, ex iisque de Sole eiusque motibus ab Astronomis cognita, & docta fuere: ex quibus tamen orbis mundani plena gubernatio non satis agnoscitur.

Quia motus isti, corpori solari non sunt proprii, sed accidentarii, Phænomenon autem nostrum, alios Motus, globo solari à primo sui conditu agnatos edocet.

SOLIS

Diuerfi astrorum colores non sunt à Sole.

I.
SOLIS GYRATIO.

Primus est localis, quo Sol singulis vicenis septimis diebus circiter, vnam circa centrum proprium reuolutionem conficit, & huius conuersionis beneficio, quidquid lucis, quidquid virtutis radiosæ continet, successiue tam in terram, quam vniuersum cælum adeoque sidera singula abundantissime effundit; & hanc quidem Solis circuitiōnem in terræ præsertim gratiam à Conditor esse Soli inditam, videtur ex hoc patere; quod ipsa non sit simplex, sed composita ex annua circumductione axis mobilis, circa quem prior motus describitur, quo fit vt Sol circa summitatem borealem, & depressionem australem, versus terram annuat sex mensium tempore, & abnuat ab eadem, vicissitudinaria polorum, & axium mobilium apparitione supra horizontem solarem, & occultatione infra eundem, vti satis ostensum est ex obseruato Phænomeno passim, & singulariter in Theoria.

Hanc igitur Solis vertiginosam librationem Circellorum polarium beneficio ad vtilitatem quoque molis terrenæ fieri, arbitror inter peritos controuersum vix iri. Quod si dies vnus anni trecenti sexaginta per 27. diuidamus, inueniemus totius Vniuersi lustrationes solares futuras vno anno tredecim, & semis. Et quia terrestris superficies ex hoc capite semper alia & alia luce solari irrigabitur, ita alia aliaque virtute solari haud dubiè imbuetur.

Quod si quis contendat hunc motum ad Solis ipsius conseruationem ab Auctore Deo ipsi potissimum attributum, & quodammodo naturalem esse; huic ego nihilominus aurem vellico, & in mentem reuoco, Solem ipsum propter terram quoque illustrandam, vegetandam, & veluti animandam esse factum, vnde consequens est, quidquid est propter Solem, esse etiam propter terram. ex quo mirifica Phænomeni huius excellentia emergit.

Possit autem diuina prouidentia Solem facile conseruare absque hac ipsius rotatione, radios autem directos, & virtutem hemisphærij solaris auersi immediatam, ad nos conuertere non potest, absque motu tali.

II.

Motus ad Quantitatem.

Secundus Solis, seu potius Phænomeni solaris motus est augmentatio, & diminutio, imo nouæ Macularum, Vmbrarum, & Facularum apparitiones, atque disparitiones, itemque perpetua figurarum variationes, mutæ coniunctiones & separationes; quibus rebus Solis speciem incredibiliter variari, quis non videt? Quod si Astrologi & Physici tantum tribuunt aspectibus, coniunctionibus planetarum, & Lunæ Solisq; Eclipsibus, quid tandem sentiri par est de hoc Phænomeno, cuius opera Sol nonnunquam Eclipses quinquaginta aut sexaginta Macularum notabiliorum simul patitur? quæ Maculæ Lunam magnitudine sæpe æquant, quandoque superant? quid dicemus de perpetua Macularum secundarum in toto Sole dispersionem? Quid quod maxima Solis pars Faculis luculentis, iisque maximis, & terræ superficiem hemisphæricam excedentibus sæpius illustratur? Tandem quod sæpe etiam, absque his æquabili & placido vultu Sol affulget? Certe ista in terram diuersimode agere, effectus dissimiles producere, ratio & vera philosophia docet. Variant enim impediunt, aut promouent, augent aut minuunt ipsam Solis lucem.

Motus Alterationis.

Tertius Motus est superficiei solaris continua alteratio, dum mutuis actionibus in se transmutantur Maculæ, Vmbræ, Faculæ, idque in tota quodammodo solaris Globi visibili superficiei. Ex qua cum præcipua Solis in terram actio promanet, patet hac continue mutata, mutari quoque continenter solarem in terras, & subsolaria influxum.

Ex hisce igitur tribus perennibus solaris Phænomeni scaturiginibus, diuinæ Maiestatis inscrutabilem in hoc terrestri Mundo gubernando sapientiam, posse quadantenus hauriri, breuiter indicatum potius, quam dictum esto. Prolixioris & verioris speculationis materiam hinc Sapiens quilibet sibi eruet. Mihi satis est, portam aperire, & viam ostendere, qua ex hoc Phænomeno in

Aeter-

Motus quantitatis qui in Sole inuenitur, inferiora mutat.

Motus alterationis in Sole spectatus, in sublunaria multum potest.

Motus localis Solis proprius & recens inuentus, inferiorum mutationum origo est.

Sol vno anno circa suum centrum decies & ter circumuertitur.

I.

Aeternae Providentiae admirabiles thesauros contemplandos possit Veritatis Amator intrare: satius enim esse existimo, plura & praestantiora acutioribus ingenijs scrutanda & ruminanda relinquere, quam magnifica sapientissimi Conditoris opera, verbis meis inanibus deterere potius, quam pro Maiestatis dignitate meritis laudibus celebrare. A Laude igitur Dei, ex his apparentijs insinuata, ad veritatis fontes partim apertos, partim aperiendos me confero: quod & ipsum ad Gloriam Dei amplificandam haud parum praesidij affert.

EX PHAENOMENO SOLARI

*Veritas patescit, edanescit
Falsitas.*

CAP. XI.

*Veritatis
consequen-
da & dete-
genda stu-
dium, hoc e-
lucubratio-
nes cōtexuit*

Confiteor ingenue quod res; post maiorem Dei ter Optimi Maximi Gloriam, quam in hoc eruendo Phaenomeno pra Oculis omniū praecipue semper habui, id quod me eidem tam improbo & pertinace labore tot nunc annis affixum tenuit, fuisse merissimum, & sincerissimum Veritatis inveniendae, & si Deo atque meis Superioribus aliquando placeret, inuentae in communem vtilitatem, propalandae studium; quod eo amplius in animo meo exarsit, quo plures vanitates ab alijs circa hoc ipsum sublimissimum Phaenomenon indignis sane modis committi perspexi. Cum enim iam tum ex initijs & continuatis per me & meos discipulos observationibus Ingolstadianis, de plerisque quae hic trado, aut in genere aut in specie apud me quidem certissimus essem, per occupationes autem intercurstantes pro rei exigentia, ad ea, quae ego Phaenomeno inesse cognoram, solide probanda, necessariae observationum digestionem facere nequiuissem; ex alia vero parte multorum commenta Phaenomenon hoc male habentium prodirent; Religioni mihi tandem duxi, ulterius dissimulare, & aequo animo ferre, tantam rem, tam profligatè tractari, & Veritatem indignissime Falsitati pessundandam relinquere. Destitutus autem paratis iam

II.

dudum subsidijs, neque longinquitate locorum & temporum iniuria illa securre potius spe aliqua probabili fretus; animum ad novas observando conflandas copias, ex quibus aciem instruerem induxi; quibus aliunde etiam ab Amicis supplementa idonea corrogata opportune adiunxi. è quibus labore, studio, & candore summo in ordinem, & cursum apparentem libro priore ordinatis, sequentes tandem Veritates, pro veris Sapientiae Amatoribus produxi.

15 *Ex Phaenomeno Solari, Veritates pro
Astronomia.*

Astronomus teste Ptolomæo, lib. 1. Alm. cap. 1. considerat Corporum caelestium Quantitatem, & quidem illam quam in Praedicamento declarat ipse Aristotiles, & in physicis docet tam a physico quam a Mathematico considerari sed diuersimodè, & ea quae ipsi annexa sunt. Ingressum autem ad illorum inuestigationem sibi praestruit ordinariè per observatum Motum apparentem, cum alia media infallibilia plerumque desint. Motum autem huius Phaenomeni apparentem, accuratè observatum, & rite digestum, produxi libro toto priore. Hoc verò libro, ex Motus Apparentis qualitatibus recto iudicio perpensis, erutum & stabilitum habes, 35 Macularum & Facularum locum Verum; Motum verum; Magnitudines visuales, figuras, durationes, augmentationes, diminutiones, & lucum necnon colorum apparitiones tam veras, quam fallaces &c. Itaque sit,

40 Prima Astronomica Veritas: *Macularum, & Facularum solarium tam primarum, quam secundarum, Locus in celo verus, est ipsa lucida & physica Solis superficies.* Probata est haec Veritas fuisse in parte prima huius Libri. Ex hac Veritate patescit, & in fenum abit illorum vanitas, qui hoc Phaenomenon in aëre sub Luna collocarunt: illorum qui extra Solem in orbem seu spæras proprias duras compegerunt. illorum, qui inter Solem, & aliam sphaeram lucidam Soli circumiectam quae tamen ipsum Solis corpus conspicuum non excederet, 55 veluti carcerem perennem concluderunt.

Secun-

*Subsidia
opportuna
qua & vn-
de compara-
ta.*

*Verus Ma-
cularum
Locus in su-
perficie So-
lis.*

I.

Macularum motus est compositus.

Secunda Veritas Astronomica. *Macularum & Facularum Solarium Motus verus, in superficie Solis descriptus, non est circularis, aut simplex, sed compositus est duobus Circularibus, ad modum lineæ cuiusdam quadratricis, aut spiralis inflexus, à curvitate Elliptica non multum degenerans.*

Motuum autem simplicium in quos resolvitur, alius est annuus circularis, circa polos axem fixum Eclipticæ solaris, ad planum Circuli solaris rectus, ab occasu in ortum, in patente Solis medietate, in latente, ab ortu in occasum. Alius est ab ortu in occasum, circa axem & polos mobiles, ad Eclipticam semper obliquus: & absolvitur intra 27. dies, plus minus, prout nunc cum annuo componitur, si absque hoc solus reuolueretur, tanto tempore citius absolueretur, quantum illi motus annuus contra tendens diebus 27. adimit; quod duorum dierum, arcum superare videtur. Motus igitur iste simplex, si solus esset dies 24. non multum fortassis excederet. Cuius axis si in plano Eclipticæ iaceret, semper rectilineus, si extra semper curvilineus, & ad Eclipticam nihilominus nunquam parallelus esset. Probata sunt ista in Theoria, & passim in prioribus.

Ex hac Veritate tanquam fonte vberimo, scaturiunt aliæ quamplurimæ, partim alibi tactæ, partim ingenioso Lectori ad eruendum relictæ doctrinæ. Patet hinc illorum error, qui Motum hunc vel tridui vel quatruidi temporis intervallo circumscripserunt, vel ad dies 29. aut amplius extenderunt, vel denique semper rectilineum, semper Eclipticæ parallelum, & in omnibus Maculis similem aut æqualem fecerunt, quibus erroribus Censorem Apellis obnoxium esse satis videbit, qui ipsius de Maculis solaribus Historiam, & meum Librum primum perspexerit.

Tertia Veritas. *Sol isdem Motibus, quibus Macula & Facula, circa suum proprium centrum voluitur.* Hæc Veritas hætenus à plerisque fuit ignorata, apud multos dubia, à nonnullis asserta potius quam solide probata, à plerisque denique negata.

Nunc autem Locus, & Motus verus Phænomeni solaris, eandem Sole cla-

Sol gyratur circa suum centrum.

II.

rius probant. Nam totum Phænomenon solare est ipsa Solis apparens physica superficies, ipsum autem movetur circa Solis centrum, ergo & physica Solis superficies circa idem centrum movetur. Quod si physica Solis superficies conuoluitur, ipsum quoque Solem conuolui necesse est. Ergo.

Hinc patet, omnes alios motus qui Solis proprii putabantur hætenus esse, eidem accidentarios existere &c. Præterea verum non esse, vni corpori non posse competere simul plures motus: item ex motuum cælestium pluralitate pluralitatem mobilium esse colligendam; aut ex vnius stellæ diuerso notato motu, cælorum distinctionem necessario inferendam; aut motum circularem deberi corpori simplici, circaque terram tanquam centrum versato; aut stellas orbibus suis, immobiliter infixas putandas esse &c.

Hinc etiam coniectura fortissima sumitur, ipsam corporis solaris sphaeram circa suum centrum motu proprio simplici conuerti in diebus præcisè viginti quattuor, harmonia sanè eleganti ut sicut Sol vno die naturali, vnaque conuersione circa terram insumit 24. horas ita vna naturali circa centrum suum reuolutione consumat dies naturales 24. Quod autem Maculae & Faculae hunc præcisè numerum non assequantur, inter alias causas alibi tactas, adscribi potest priuata ipsarum temperiei & reuolutioni, quemadmodum in rebus naturalibus passim experimur &c.

Quarta Veritas. *Sol sphericè globosus est.* Sequitur ex priore: si enim rotatur, & circularis semper apparet; necessario sphericus est. Hæc Veritas ab omnibus hætenus pro indubitata quidem est habita, sed à nemine quod sciam, sufficienter comprobata. Ex hoc autem Phænomeno, vti in Libro tertio claret, & paullo ante dictum est, sufficienter euincitur.

Quinta Veritas: Ex supposita aut præcognita solaris disci magnitudine, certo ostenditur multas Maculas amplitudine sua superficiali ad nos in medio Sole conuersa, non esse minores Luna, imo maiores, & aliquas fortasse, cum superficie terræ hemisphærica cõtendere. quam à multis luculentis Faculis primarijs & Macu-

Sol est sphericè rotundus.

Superficialis magnitudo Macularum quarundam, hemisphæricam terram fortassis æquat.

I.

Maculis Faculisque secundarijs sæpe excedi, non est vllum dubium. An autem & quantum verorumque profunditas introrsus versus centrum Solis protendatur, mihi hætenus liquido non constat.

*Non gyran-
tur circa
sua centra
Maculae.*

Sexta Veritas. *Figurarum & magnitudinum, tam in Maculis quam Faculis perpetua verietas interuenit. Macula tamen aut Facula, circa centra sua propria non gyran-
tur.* Sunt hæc omnia iam fusissime & clarissime demonstrata in superioribus, neque alia attentione indigent, quam lectione meorum vel oculari propriorum obseruatorum inspectione.

*Superficies
Solis leniter
crispa.*

Septima Veritas. *Superficies Solis, apparens, non Geometrice aquabilis, nec Opticè tersa aut polita, sed Astronomicè spherica est, instar maris fluctuantis, terra, & Luna montibus vallibusque anfractuosa.* Hæc Veritas cuilibet obuia est ex ijs quæ hætenus allata & disputata sunt, de superficie Solis.

Sarfius. Quibus contentit Sarfius in Lib. Astronomica ac Philosophica, pag. 45. *Clauius.* de Luna Clauius in Sphæram, tom. 3. pag. 75. qui ait, mirari se satis non posse, in corpore Lunari tantas inesse inæqualitates.

Octaua. *Vis Solis ex sua gyratione alios planetas in circuitum mouens, nulla, quia circumuolutiones contrariae sunt, neque temporibus proportionalibus fiunt.*

Oleum ergo & operam nonnulli in his explicandis perdunt; falsa enim sunt & huius Phænomeni veritati contraria.

EX SOLARI PHAENOMENO Veritates pro Astrologia.

Astrologus ex moribus cælestibus & siderum varia ad Solem habitudine, situ & aspectu, inter quos coniunctiones maximi fiunt, varios effectus & rerum sublunarium futuros euentus inter cætera, prædicit &c. sed quam vere, quam bene, vel ex hoc vaico Solis Phænomeno ostenditur.

Ex quo, quanquam per singula eundo, possem Veritates multiplices proferre, quia tamen temporis parco, breuitati consulo, & studiosi Lectoris ingenio & sagacitati multa committo, v-

II.

nam dumtaxat instar omnium hæc vice propono Veritatem, videlicet:

Ex hoc Solis Phænomeno Astrologiæ Iudiciariæ Vanitas clarissime detegitur. Nam cum ex hoc Phænomeno perpetua Solis variatio accidat, necesse est omnes Astrorum influentias similiter alterari. Atmosphærae quoque conditio, de qua ipsi vel parum, vel nihil tractant, ipsorum nugacia fundamenta, ex aspectibus & dignitatibus planetarum arbitrarie deducta, penitus destruit.

Audi quid in hanc rem doctissime disputet, Octavius Farnesius, in Questionibus Philosophicis, Lib. 2. Philosoph. Naturalis, cap. 13. pag. 117. Num.

„ seu Thefib. 756. 757. 758. Est aliqua
„ inquit, indirecta cæli motio in hominem, dum organa corporea, vel melius vel deterius habent, directa vero in ipsam animam nulla est. Mendax
„ ergo est diuinatrix, quæ dicitur Astrologia; meritoque ex conuietum mortali-
„ lium exturbantur Genethlaci, qui de
„ futuris contingentibus ex stellarum
„ cursu, situque diuinationem profitentur, quam nosse non possunt. Somnia
„ sunt quæ futura prælegunt in stellarum,
„ quasi elementorum compositio-
„ ne: nec vero mirum est, si ubi multa
„ mentiti sunt, aliquid veri eueniat aliquando, sicut casu fit, ut veri aliquid
„ eueniat ex ostentis somniorum. Creditum est hætenus, hos ipsos diuina-
„ tores facile notare potuisse, in quo quisque fidere, quouè cælesti statu
„ conceptus fuerit, & in quo natus horoscopo, datumque ijs etiam est, ut
„ de corporis habitu deq. complectio-
„ ne sumerent coniecturam; Sed hæc
„ ipsa, quam nunc incerta censenda sunt,
„ facta additione astrorum per noua instrumenta; totq; Maculis in Sole de-
„ prebensis, nulla certa lege, quæ hætenus obseruari potuerit, in immenso illo
„ lucis campo pererrantibus? Hæc ibi, & recte quidem; Nam si nodis Eclipticis, si Capiti, inquam, & Caudæ Draconis, adeoque Eclipsibus Lunaribus & Solaribus, magnam vim & prærogatiuam antiquorum experientijs (ut aiunt) roboratam, attribuunt; Maculis certe solaribus insignioribus multo plus defe-

*Astrologia
iudiciaria
ex hoc Phæ-
nomeno re-
darguitur.*

Nam

I.

Nam Solem etiam ipsa Eclipsant: & licet tantam ipsius portionem ad visum nostrum non abscondant, inducunt tamen illam Eclipsin toti orbi, id quod Luna nunquam facit; deinde Maculae cuiusvis inter Nos & Solem interpositio non durat tribus aut quattuor tantum horis, sed multis plerumque diebus. Vt autem Macularum & Facularum generationes praesciri nequeunt, ita operationes Solis & influxus specialis praesagiri ab ipsis nequaquam potest.

VERITATES GNOMONICAE ET
Cosmographicae, ex hoc Solis Phaenomeno eruendae.

Magnitudo
Solis & reliquorum
Planetarum
visualis as-
quiritur.

Primò. Magnitudo Solis visualis, res inter Astronomos summi momenti, per huius Phaenomeni obseruandi modum potest haberi, quemadmodum ex intromisso per nudum foramen itemque per tubum transmissio Sole, satis superque condocesci.

Et quanquam in specie non determinauerim, quanta Solis visualis diameter existat, tamen ea, quam Tycho Prahe aut etiam alij assignant, multo esse maiorem, ex ijs quae produxi experimentis atque argumentis, indubitatum esse, existimo. Quanquam peritorum super hac re iudicia audire, non grauabor. Intrauerat olim, antequam Ioannes Keplerus in suis Paralipomenis non absimilem semitam, in vtriusque luminaris indaganda visuali magnitudine, sed eius nimietate deteritus, vias minus tritas tanquam suspectas, inconsultius quam cautius deseruit & improbauit.

Ego illis adhuc insisto, quia fallacias vllas neque dum animaduerto. Tychonicam arundinem laudo, sed cur Solem debito minorem exhibuerit, rationes euidentes afferre paratus sum.

Data igitur hac veritate, sequentur plures aliae eaque variae. Terra scilicet ad Solem comparata longe minor; Sol ad terram aestimatus, multo maior. Similiter & Venus respectu Solis aliter se habebit in magnitudine, quam multi putant, augebitur namque; Quia si ponamus, exempli causa, Veneris diametrum visualem ad diametrum Solis visualem esse inuentam vt 1. ad 30. si iam

II.

1 solari diametro demus absolute minuta 30. certum est Veneris diametrum absolutam fore vnus minuti; si vero absolutae Solis diametro attribuamus minuta 45. certum est Veneris diametrum futuram minuti vnus & semis; & sic patet quod asserui, quod idem de alijs planetis dictum volo. Cum enim visualis ipsarum ad Solem proportio constet, si Sol opinione maior inuenitur, & ipsos planetas crescere aequum est.

Eademque ratione Maculae & Faculae solares, assignatam & consequentem ex hypothesebus Tychonicis magnitudinem, plurimum excedent.

Secundo. Magnitudo visualis Luminarium inter se comparata habetur, si sub eadem Tubi apertura, vt Sol ita Luna intromissa annotatur. Sed & Planetarum maiores, quandoque simili modo possunt acquiri. Haec praxis & Veritas est momenti maximi: Hinc enim certo scietur, an, quando, quomodo & quantum Luna plena tam se nouam, quam Solem ipsum diametro visuali superet, & controuersiae astronomicae non paucae finientur. Telioscopium enim ex hac parte non fallit, quoad longitudinis diametrum, quae in quavis positione caeli non variatur vno die, etiamsi luminaria ex diuersa supra horizontem eleuatione propter refractionem variant diametrum altitudinis.

Tertiò. Occasione huius Phaenomeni Refractio Lentium Telioscopicarum respectu Solis, aut Lunae tralucens acquiritur hoc modo.

Per datam lentem conuexam transmittite Solem in chartam debite applicatam, & consigna diligenter magnitudinem circuli solaris. Postea omnibus inuariatis exime lentem, & loco ipsius infere lamellam chartaceam, ligneam, aut metallicam angusto foramine perforatam, per quod ingressi & in chartam allapsi Solis nota magnitudinem. Defectus igitur huius circuli solaris a priore, ostendet lentis refractionem, in diametris circulorum. Dixi in ordine ad Solem, aut Lunam: quia obiectorum caelestium distantiae notabiliter variatae, variant etiam quantitatem refractionis.

Eodem prorsus modo, aestimabis Refractionem duarum lentium in Tubo compositarum. Semper enim in eo loco quem

I.

quem illa, quæ Solem immediate respexerat, occupabat; reponitur lamella, unico paruo foramine aperta, demptis lentibus omnibus &c. Eodem modo, sumetur Refractionis vis, ab obiectis terrenis, in vicinia positis &c.

Dixi foramen in lamella factum debere esse paruum, quod ideo fit, ut Solis magnitudo natiua sine fallacia ostendatur. quod si lubet ad idem etiam foramen lentem conuexam applicare & Solis magnitudinem refractione auctam explorare, poteris id omnino præstare; maius namque foramen speciem per vitrum non maiorem sensibiler, sed clariorem dabit. ut alias sæpe dixi &c.

Horologiorum descriptio minus commoda.

Quartò. Si magnus accipiatur Circulus obseruatorius, & toto die ad vnum idemque perpendiculum immota charta Maculae obseruentur, describent singulae suos veluti arcus diurnos circa centrum circuli obseruatorij: quorum ope, fieri posse horologia Thelioscopica, in quibus Maculae singulae horas diei suo interuentu indicent, non est dubium. Quia tamen tota æstate, ab Ariete vsque ad Libram, Macularum stationes & Regressiones, continuam cursus progressionem interturbant; hūc ipsum laborem, alioquin pulchrum sanè, in medio reliqui. Volui tamen innuere, quia semestri saltem hyemali, continua Macularum Progressio existit, sine vlla regressionis interruptione.

Accessus & recessus Solis.

Quintò. Accessus etiam Solis ad terram, & recessus eiusdem ab eadem habetur, idque duobus modis. Alter si circulus obseruatorius in charta semper idem retineatur; tunc enim Tubus ad Solem apogeuum est contrahendus, ex quo maior distantia Solis consequitur; ad perigeum diducendus, ex quo Sol vicinior probatur. Quia obiecta viciniora tubum eundem productiorem; remotiora contractiorem desiderant. Alter si Tubi apertio & distantia à charta eadem retineatur; tunc enim Sol apogeuus minorem circulum, perigeus maiorem in illam projicit: & hoc Solem vicinior, illud remotiorem euidenter probat.

Longitudines locorum possunt inueniri satisfacile.

Quintò. Ad rem Geographicam affert hoc Phenomenon momentum maximum: etenim beneficio ipsius loco-

II.

rum longitudines in toto terrarum orbe possunt certo, & meo quidem iudicio facile & cito acquiri. Fit autem hoc, si in diuersis Orbis partibus diuersi Astro-
5 nomi obseruent vnam aliquam Maculam, per centrum circuli obseruatorij transeuntem; vel Eclipticam secantem, vel punctum Cursus dimidij, aut similia; de quibus inter ipsos cōuenerit &c.
10 sic enim ex differentia temporum, habebunt longitudines locorum. Sed hæc strictim hic percurro. Erit cum dante Deo, eadem fusius atque exactius enucleabo.

AD PHYSIOLOGIAM CAELI.

bestem plurimæ Veritates panduntur è Phanomeno solari.

C A P. XII.

IN rebus Physiologicis circa ea, quæ cælitus contingunt, plurima ignorantur; pauca certo sciuntur; dubia sunt pleraque, asseruntur multa, falsa; negantur plurima vera. Neque mirum; Deus enim & natura, res istas sublimes tot difficultatibus implicauerunt, ut certus ad ipsas intelligendas aditus humano ingenio vix pateat: ita omnes viæ immensa locorum intercapedine, hætenus fuerunt interseptæ. inde enim prouenit, ut præter lucidos siderum globos, & paucas subinde Luminarium Eclipses, in cælestibus nil penitus ferè sentiremus. Nunc autem Thelioscopij inuento & patefacto vsu, fas est regiones illas ætherias, & aulas diuinas propius accedere, ipsamque Solis Regiam, hucusque inaccessam intrare, & inde absconditos Phylosophiæ cælestis thesauros reclusos non tantum intueri, sed & auferre, orbiq. terreno toti latentem diu Veritatem inferre.

45 Quam qui animo candido inuestigare & amplecti serio gestit, huius ductu Phenomeni absq. vilo obstaculo planissime in multis consequetur. Ego rogatu multorum, digitum tantum intendo, & aliqua rerum capita strictim persequor.

EX

I.

EX MOTU SOLIS PROPRIO
per hoc Phenomenon patefacto,
Veritates Physicae.

Quæri potest in physicis, primo, An astra cæli (inter quæ & Luminaria censentur) sint orbibus cælestibus infixa, vti nodus tabulæ, vel clauus rotæ? secundo, An ex Astrorū motu, rectè colligatur multitudo vel simplicitas cælorum? tertio, An motus cæli solaris circa terram, sit eidem proprius, an vero aliunde? quarto, An Motus Solis, quem à cælo suo ex hypothesi participat, siue quotidie ab ortu, in occasum, siue annuè ab occasu in ortum, sit globo solari per se, an aliunde? quinto, An motus, quæ aliqua Macula vel Facula in Sole & cum Sole circa centrum Solis describit, vel ab ortu solari in occasum, vel ab occasu eiusdem, in ortum eiusdem, sit Maculæ vel Faculæ per se an aliunde? sexto, An Motus Solis circa suum centrum, sit Solis proprius, & non communicatus ab alio orbe? septimo, An Motus Maculæ tam augmentationis, quam deuiationis (vt quandoq. fit) sit Maculæ proprius & Soli per accidens? octauo, An motus localis cælestium corporum, quem Astronomus considerat, sit idem quem inquit & examinat Physicus? nono, An plures motus diuersi, possint inesse simul eidem numero Mobili cælesti? decimo, An Motus Solis circa terram, sit simplex? vndecimo, An si totum cælum Solis esset tale corpus, quale est Sol, & circa terram homocentricè moueretur, Motus eiusmodi simplex esset? duodecimo, An ex huiusmodi dato Motu simplici circa terram, Mobilis simplicitas efficaciter colligeretur? decimotertio, An dato, sed non concessio, Solis motu circa terram homocentrico, Solaris globi simplicitas inde colligatur? decimoquarto, An Motus totius cæli solaris, terræ homocentricus, conueniat illi per se, an ab alio? decimoquinto, An ex illo motu, cæli illius simplicitas, rectè & necessario sequatur? decimosexto, An, si alteruter solaris globi Motus sisteretur, alter esset simplex? decimosextimo, An Mixtus iste Solis motus, sit ob ipsū Solem, an ob terram, an ob Vniuersi bonum? decimo octauo, An iste Solis motus sit Soli naturalis? An violētus? an præ-

II.

ter naturam? decimonono, Quodnam illius sit principium, seu quis Motor? vigesimo, Quis moueat Maculas, Faculas, & Vmbras &c.

5 Hæ & similes Quæstiones suscitatur in physicis cælestibus, occasione huius Phenomeni, quibus omnibus, qui verè & solidè, sine fūco & fallacia satisfacere volent, ad Solem recurret, & inde meliora quam ex tripode delphica ab ipso Apolline responsa eruet. Quibus ego in specie dandis modo prudens supersedeo ne alijs videar omnem circa hanc rem præripere velle disputandi materiam: 10 contentus hac vna scientia, quæstiones has ex Motu Solis nouiter inuento & allato, egregie posse decidi: & hunc Motum Soli ita esse proprium, vt ab vlla cæli solaris parte alia, neq. per se, neq. per accidens participetur. Nā circa centrum Solis, cælū Solis, neq. ex toto, neq. ex parte rotatur: sed solus Sol circa illud cum suis Maculis & Faculis cōglobatur.

25 Hæc autem breuiter nunc insinuo, sapientibus enim pauca. Quibus si hæc arridere sensero, ad plura promenda, animum atque calcar addent.

Ex solaris superficiei Varietate & Variabilitate per Mac. & Faculas cognita Veritates Physicae.

30 Quæri rursus solet in physicis: 1. An cælum & sydera in cælo cōstituta, cōstet materia? 2. An illa materia, qua sydera cōstāt, sit eiusdem rationis, cuius est materia cæli? 3. An materia syderum, omnium sit rationis eiusdem? 4. An corporum cælestium materia sit eiusdē rationis, cuius est Elemētaris? 5. An sydera omnia sint corpora simplicia? 6. An Sol sit corpus homogeneū, seu heterogeneū? 7. An Sol habeat aliquid mixti? 8. An materia cælestis sit ingenerabilis & incorruptibilis? 9. An in regionibus illis ætherijs dentur aliquæ mutationes, in qualitatibus & substantijs? 10. An & quales colores sint in Sole? 11. Qualis in Sole lux, pura an mixta? Aequè vbiq. an inæqualiter intensa? Vtrum in sola Solis extrema superficie, an in profundo Solis? 12. Qualis nā Solis superficies, æquabilisne, an lacunosa? stabilis an fluctuans? polita an horrida?

55 Hæ & similes quæstiones omnes expediuntur ex ipso Solis Phenomeno.

S s i Etc.

Quæstionē istarum & similium physicarum ex hoc Solis Phenomeno suscitatarū, decisio deferatur Physi- cis.

I.

Etenim ipsum ad dispellendas errorum tenebras, ad lucem veritatis propalandam, non vnam sed innumeras præfert faces, nec semel, sed semper: & ne quis fortasse cæcutiat, extinctis alijs, novas identidem accendit: aliud igitur opus non est, quam oculos aperire, & allucentem Veritatis candorem admittere. Quod si Sol à communi vicissitudinum lege immunis non est; nec cælum ipsum nec astra reliqua Sole meliora necesse est æstimare.

*Veritates pro Sacra Scriptura,
& Theologia.*

Quanquam certum sit, scientias naturales in dubijs debere se potius accommodare ad sēsum communem Scripturæ & Theologorum; nihilominus & hoc ab omnibus admittitur, ea quæ vel in Scriptura vel inter Theologos de rebus naturæ controuersa sunt, si naturalis euidencia aliqua accedat, pro ipsa tam à Theologia quam à Sacra Scriptura statui: quia scimus, contra Veritates naturales neq. Scripturam Sacram, neq. Theologiam vnquam enunciare. Quapropter cum ex hoc Phænomeno naturales Veritates circa Solem & corpora cælestia plurimæ & erutæ sint, & in futurum eruendæ, censeo ego, Phænomeni huius adiutorio, quæstiones non paucas, super primum Caput Genesis, de Creatione, Lucis, & Solis, inter sacros Scriptores agitas, satis eliquidari posse. Quod suo tempore, dante Deo, vberius fortasse indicabitur; nunc fontem ipsum eminus notare & à longe salutare, satis esse dixi; præsertim cum in ipso Operis successu, & opportunitate temporis oblata, possint copiosius multa explicari.

*PHAENOMENI SOLARIS
Vtilitates.*

CAP. XIII.

NON prosequor commoda naturæ Vniuersi ab hoc Phænomeno profluentia, quidquid enim iucundi, quidquid vtile in hoc orbe habemus, sentimus, fruimur, ab hoc Phænomeno à Faculis inquā solaribus proficiscitur. Tolle Faculas à Sole, & induxisti orbi vniuerso tenebras. sed

II.

hec non specto modo, quia sparsim ex ijs quæ supra explanavi habentur.

Nunc quid in rem litterariam aut vsum humanum ex huius Phænomeni notitia, præter dicta, emolumenti resultet, cursim attingam.

Et omnium quidem prima atq. maxima boni Litterarij vtilitas est, liberati ab errore, ignorantie tenebris exui, falsis opinionibus non circumueniri: prima enim veri consequendi methodus est, falsum nosse; & semitam rectam ingrediendi, ad auiam non deflectere. In quâtis porro rerum cælestium Physiologia obscuritatibus, & sententiarum cōflictationibus hucusq. versata sit, loquuntur omnes Auctorum probatorum libri. Multum proinde debemus huic Phænomeno, quod Maculis suis ab intelligentia nostra noctem imperitiæ eliminat; & Facularum beneficio diem Veritatis infert.

Proximum enim, quod agnitum errorem consequitur, est ipsius Veritatis clara in animis nostris apprehensio cuius illustratione mens humana perfusa, mirabiles progressus facit, & ex vno fonte, innumeros veritatis riuos deducit.

Hinc postquam Maculas & Faculas solares in ipso Sole easq. ortui & occasui obnoxias cognoscit, ex ipsis repertis tenebris lucem obscuris Veterum monumentis non exiguam affert.

Legimus enim multa passim apud Scriptores, quæ aut fabulosè conficta, aut hyperbolice amplificata videri queant; per hoc tamen Phænomenon verissima esse, sibi quis facile persuadeat.

Ex Annal. Francorum in Bibliotheca Petri Pithæi, anno Christi 1588. Parisijs editis; habeatur in vita Caroli Magni, „ p. 62. partis Posterioris, ista. Hoc an. „ id est, ab Incarnat. Dñi DCCCXVII. „ iv. Kal. Martias, fuit Eclipsis Lunæ, & „ apparuerunt acies eadem nocte miræ „ magnitudinis, & Sol stetit in 11. parte „ Piscium, & Luna in 11. parte Virginis „ & Stella Mercurii xvi. kalendas A. „ prius visa est in Sole, quasi parua „ Macula nigra, tamen paululum superius medio cetro eiusdem syderis, „ quæ octo dies à Francis, conspecta „ est: sed quando primum intrauit vel „ exijt, nubibus impediens minimè potuit annotari.

Idem de se ait, Iosephus Scaliger, Exercit

Vtilitas prima Phænomeni solaris ignorantie depulsio.

Vtilitas altera, Veritatis cognitio.

E Phænomeni solaris tenebris, lux Veritatis Historia affulget.

I.

xercit. 72. cōtra Cardanum. Idem de se, Ioannes Keplerus, anno 1607. 28. Maij.

*Mercurius sub Sole spe-
ctatus, non
Mercurius
sed Macula
fuit.*

Hanc autem apparentem sub Sole Maculam, non fuisse Mercurium, sed veram Solis Maculam, eamque maximam & valde obscuram ex eo dubitari non potest, quod non ab vno, sed indifferenter à Francis conspecta esse scribitur, in Sole autem motam esse inde liquet, quod Annalium scriptor dicat, nubium interuentu ingressum exitumque animaduerti non potuisse.

Neq. Scaligerū aut Keplerum aliud præter Maculā veram vidisse, vllō modo probabile est; prout rectè etiam monet Galileus, in sua Macularū Historia, p. 54.

Georgius Cedrenus in Annalibus Constantinopolitanis, Basilææ editis, sub 7. Iustiniani Magni annum, p. 304. „ versu 60. hæc habet. Toto eo anno „ Sol Lunę instar sine radijs lucem tri- „ stem præbuit, plerumque defectum „ patienti similis.

Idem pag. 389. anno 7. Constantini, qui fuit Christi, 786. secundum hunc „ auctorem. Anno 7. (ait ipse) Impe- „ rator cū Matre Pusam ad thermas ve- „ nit. Cumq. ei post paucos dies filius „ nasceretur, (cui Leoni nomen ipse „ fecit) allato nuncio, Matrem cum om- „ nni imperatorio relinquens comita- „ tu, in urbem (Constantinopolim) „ recurrit. Ibi Irene (Mater) licentiam „ nacta, omnes ordinum Princeps cor- „ rumpit, vt filio Imperium abrogent, „ seq. solam imperare sinant. Itaq. Con- „ stantinum absente Matre, in eius pa- „ latium venientem, proceres in Por- „ phyria, vbi natus fuerat, de sententia „ Irenes includunt, oculosq. ei ita effo- „ diunt, vt nullus Medicinę locus supe- „ rarit. Sol tunc per 17. dies obscuratus „ est, nullos emittens radios: & vulgo id „ ob excacationem Imperatoris euenisse „ ferebant. Tanta autem fuerunt tene- „ bræ, vt naues quoq. à cursu suo aberr- „ uerint. Sed hic imperscrutabilia Dei „ iudicia considera. Nam potest quin- „ quennium ab eo die, quo patris „ oculos eruit (Imperator,) eodem „ anni & mensis die, ipse quoq. oculis „ multatus est.

„ C. Plinius, Hist. Mundi, l. 2. c. 30. „ Fiunt prodigiosi, inquit, & longiores „ Solis defectus, qualis occiso Dictato-

II.

1 „ re Cæsare, & Antoniano bello, totius „ pæne anni pallore continuo. &c.

Simile prodigium sub Augusto con- tigisse Xiphilinus annotauit. Tertullia-

5 „ nus ad Scapulam ita scribit. Nam & „ Sol ille in Conuentu Vticensi, extin- „ cto pæne lumine, adeo portentū fuit, „ vt nō potuerit ex ordinario deliquio „ hoc pati, positus in suo hypsomate „ & domicilio. Habetis Astrologos.

10 „ Hæc & hisce similia portentosa Solis Symptomata, Dissertator Batauus, in Maculas Solis conijcit, quod cuiusmo- di sit non disputo, illud aio, multa in-

*In Disserta-
tione, an-
no 1612. p.
12. 13.*

15 „ Auctoribus reperiri, vel dubie vel suspe- ctæ fidei, quæ huius ope Phænomeni plana euadant, & defendi commodissi- me queant; multa quæ sine assumpto hoc Phænomeno vllō verosimilitudinis colore imbui nequaquam possint. Id certe, quod ex Bibliotheca P. Pithæi, in Annalibus Francicis, parte libri poste- rioris, pag. 414. anno Lotharij Regis 3.

20 „ Dominicæ Incarnationis DCCCC. LV. „ hisce verbis describitur; Luna versa „ est in sanguinē, eodemq. anno mense „ Iunio signum mirabile apparuit in „ cælo, Draco scilicet magnus sine ca- „ pite. & paullo post, eodem anno E- „ clipfis Solis facta est, xv. Kal. Ianuarij,

30 „ & stellæ à prima hora, vsq. ad horam „ tertiam apparuerunt; id inquam pro- pter aspectum tam diuturnū siderum in Eclipsi solari, videri possit alicui val- de esse suspectum: ex altera tamen rur- 35 „ sus parte, cum auctor istorū Annalium syncerissimus appareat, nō videtur tan- ta leuitatis nota inurendus. igitur aut ad Atmosphæram terræ, aut Phænome- 40 „ non Solis cōfugiendum est: in Athomo- sphærā terræ caligo ista Solis iubar he- betans transcribi nequit, quia si tanta- fuisset vt Solis vigorem retudisset, ne is visui aspectum stellarum sua præcellen- 45 „ tia eriperet, ipsarum stellarum splendo- rem valde debilem ex se, penitus obli- terasset; quæ cum per tres quasi horas affulserint, oportet cælum valde sudum fuisse, adeoq. in Atmosphærā terrestrem huius rei causam reijciendam non esse.

*Pen Phæno-
menon Solis
multorum
ostentorum
fides salua-
tur.*

50 „ Restat ergo, aut Chronologum hal- lucinatum esse, quod creditu difficile, quia à sui temporis scriptoribus redar- gutus esset; aut, quod magis probabile, Solem aliquid à caliginosa Macularum

I.

materia hebetudinis passum esse. Sic enim accidit, ut segmenta ipsius lucida & aduersus visum detecta, tantum tamen non lucerent, ut stellarum reflexum lumen præfocarent.

Eclipsis Solis Patiente Christo per hoc Phænomeno cōmōde defēditur

In Epist. ad Apollopphanem & Polycarpum.

Eclipsis Solis, quæ Christo Domino Deoq. nostro patiente contingit, si totum Orbem peruasit, facilem ex hoc Phænomeno fidem atq. explicationem meretur; sine ipso, noua & inusitata Dei miracula exigit. Nam Luna Soli, (ut S. Dionysius se vidisse Heliopoli in Aegypto attestatur,) supposita, & eclipsans totum Solem, ultra 70. in terra milliaria Germanica, seu 350. Italica, (5. nimirum pro vno computando) vmbrae suæ diametrum non extendit.

Vniuersalem autē in toto terrarum orbe hūc Solis defectum fuisse, satis clare indicant Euangelistæ. Marcus, c. 15. v. 33. Lucas, c. 23. v. 44. Mattheus, c. 27. vers. 45. Audi quid scribat Georgius Cedrenus in Annalibus Constantinopolitanis, sub annum Tiberij Imperatoris 19. pag. 155. editionis Basilensis.

Georgius Cedrenus.

„ Dominus noster, inquit ipse, Iesus
„ Christus supplicium adiit, sicut de
„ eo Vates prædixerant. Quo tempore
„ in Græcis Commentarijs annotata,
„ ipsis verbis referemus. Εγένετο ἡλίου
„ ἡλίου μεγίστη τῶν ἐγνωσμένων πρότερον,
„ καὶ νύξ ὥρα ἔστη τῆς ἡμέρας ἐγένετο,
„ ὡς καὶ ἀστέραι ἐν οὐρανῷ φανῆναι· σεισμός
„ σὲ μέγας κατὰ Βιθυνίαν γενομένος, καὶ
„ πολλὰ τῆς Νικαίας κατεστρέψατο· πάντα
„ φεγγών φησι. Quæ sic reddita sunt ab
„ interprete. Solis exstitit defectus,
„ omnibus prioribus maior, noxque
„ diei hora sexta oborta est, ita ut &
„ stellæ in cælo conspectæ sint. Terræ
„ motus quoque ingens in Bithynia
„ fuit, qui magnam Nicææ partem
„ prostrauit. Ita Phlegon. Africanus
„ quoq. narrat, quo die Christus est
„ supplicio affectus, tenebras admo-
„ dum terribiles per totum mundum
„ obortas, terræ motu saxa dirupta,
„ multumq. terræ prostratum. Eas te-
„ nebras Iudæi Solis defectum appel-
„ lant; absorde id quidem, meo iudicio
„ & repugnante natura. Nam secundum
„ Lunæ motū Hebræi Pascha instituūt.
„ Pridie autem Paschatis Christus in
„ Cruce supplicium passus est. Iam So-
„ lis defectus nō fit, nisi cum eum Lu-

I I.

1 „ na subit. neq. potest nisi in Nouilunio
„ cum luminaria coeunt, aut proximè
„ euenire. Quomodo igitur istæ tene-
„ bræ defectus Solis fuerint, cū eo tem-
5 „ pore Luna pene è regione Soli oppo-
„ sita fuerit? Sed esto tamen id, quod
„ multis probatū fuit, erroremq. visus
„ sicuti tenebras toti mundo iniectas
„ defectum Solis putemus &c. Hæc
10 „ Cedrenus. qui ad Fastos Consula-
„ res etiam prouocat.

Similia affert Euseb. in Chron. anno
„ 33. Christi. Scripsit super his, inquit,
„ & Phlegon, qui Olympiadum egre-
15 „ gius supputator est, in l. 14. ita dicēs.
„ Quarto autem anno ducētesimæ se-
„ cundæ Olympiadis, magna & excel-
„ lens inter omnes, quæ ante eam acci-
„ derant, defectio Solis facta est: dies
20 „ hora sexta ita in tenebrosam noctem
„ versus, ut stellæ cæli visæ sint, terræq.
„ motus in Bithynia Nicææ vmbis
„ multas ædes subuertit.

Origenes l. 2. contra Celsum ex hac
25 „ Eclipsi argumentatur. Prouocat & Ter-
tullianus ad Archiua Romanorum,
Tert. Apolog. cap. 21.

Eandem Solis defectionem obijcit
Gentilibus ex eorum monumentis, Lu-
cianus Martyr, in actis sui Martyrij. Te-
30 „ statur quoque Orosius, aliquos Græco-
rum libros huius defectionis meminisse
l. 7. cap. 4.

35 „ S. certe Dionysius Areopagita, cum
obstinatum Apollopphanis Sophistæ gen-
tilis animam, multis diu argumentis ad
Christum conuertere gratis insudasset,
tandem hac Eclipsi in memoriam per S.
Polycarpum reuocanda, ipsum emolli-
40 „ uit, & plusquam cimmerias ab intelli-
gentia ipsius tenebras ipsa huius Ecli-
pseos nocte depulit. Lege epistolam 7.
quæ est ad Polycarpū id ipsum fatetur.
S. Antistes in epistola gratulatoria ad
45 „ Apollopphanem conuersum, in qua ad-
mirabilem huius defectionis modum,
naturæ vires longe excedentem, lucu-
lentissimè describit hisce verbis.

50 „ Cæterum ut superna lux paternæ
gloriæ, suum splendorem in tuæ men-
tis tenebras insulgere sua voluntate
disposuit; protinus cordis mei pene-
trationem & gestæ rei monumentum
55 „ tuis oculis subijcerem,

I.

Vt videlicet in Heliopoli, tu qui-
dem pane mihi coquus, & ego quin-
que & viginti fere annorum tempus
euolens, vna morantes constitera-
mus, cum feria quadam sexta, &
hora etiam ferme sexta, Sol horribi-
libus subito est obsitus tenebris, Lu-
na ipsum intercurrente, quia non
Deus sed creatura Dei in ipsius veræ
lucis occubitu, lucere non potuit. &
post pauca. Offusi enim tenebris ipsi
eramus, orbem Solis vnde quaque
& ex æquo occupante caligine, &
postquam repurgatio & restitutio
facta est, Luna ad Solis diametrum
conuersa aufugit. Et tunc quoque
Regulam Philippi Aridæi assumpsi-
mus: cumque reperissemus, quod &
erat notissimum, eo tempore Solem
Eclipsis molestias laboresque mini-
mè perpeti debuisse, ac nihilominus
Lunam ab oriente solarem splendo-
rem pullis nigrantibusq. velis obdu-
xisse, cum soleat ex occidua parte
Solem ingredi; tunc autem opifices
lucis thesauros caliginibus, quas ipsa
genuerat, ad occiduos vsque Solis fi-
nes peruagata, vt ipsi putauimus, oc-
cultauit. cum tamen & Lunæ id tem-
pus deesset, nec congressus vicinum
tēpus cognosceretur. & paullo post.
Denique annotatum diligenter Feriæ
diem & annum, annūciatione, quam
sacer Paullus nostris attentis auribus
infudit, consentientibus signis con-
spirare & concordare expertus, ma-
nus veritati submissi, & ex falsitatis
nexibus sum absolutus. quam qui-
dem veritatem mirificè effero, quam
& tibi communico. Hæc ibi &c.

Itaque sicut Deus nocte media na-
scens, claritate noui sideris ex Magorum
animis tenebras distulit; ita idem clara
die moriens, istorum philosophorum
obfuscatas errorum caligine mentes,
miraculosi & contra naturæ cursum
viresque excitatis tenebris, diuinitus
illustrauit.

Hæc porro tenebras totum terra-
rum orbem lugubri induisse habitu, sa-
tis patet. primò. Ex Euangelistarum
loquendi modo. secundo. Ex auctori-
tibus modo allatis. Nam ex Phlegonte
euidens est, eam Solis Eclipsationem
fuisse plenissimam, cum quod noctem

I I.

obortam, & stellas visas; tum quod ha-
tenus animaduersarum Eclipsæon ma-
ximam asserat. Certum autem est, tem-
poribus antegressis totales Eclipses, &
stellas visas sæpe esse.

Sed & in Iudæa fuisse plenam, ex E-
uangeliorum textu firmiter elicitur; in
Aegypto, testatur citatus oculatus te-
stis Dionysius. Cum igitur in hisce tri-
bus prouincijs Sol totus fuerit obscura-
tus, neque id totum Lunari interposi-
tioni possit attribui, (nam defectio So-
lis tota vltra 70. miliaria Germanica
in diametro vmbrae in superficie terræ
terminatae non excedit) manifestum
est, istas tenebras aliunde quoque pro-
fectas esse. Eadem igitur causa eripuit
solarem radium Atricæ, & Asiæ, quæ
Europæ. Et confirmatur etiam expressa
aliorum Historicorum non Christiano-
rum testificatione. In alijs Ehtnicorum
Commētarijs, ait Euseb hæc ad verbum
scripta reperi. Solis facta defectio, &
tenebræ super Vniuersam terram. Bi-
thynia terræ motu concussa, & in
vrbe Nicæna ædes plurimæ currue-
runt. tertio Accedit communis sen-
sus & auctoritas doctorum. Lege Baro-
nium, tom. 1. Iacobum Gretserum, tom.
de S. Cruce, l. 1. cap. 31. pag. 102. Bar-
rad. in Euang. l. 7. cap. 19. Iansen. in
Concord. Euang. cap. 143. &c.

Cur autem ministerio Lunæ ad hanc
disectionem vsus sit Dominus, quæ ta-
men sola non suffecit, inter cæteras ra-
tiones possunt esse, vt homines hoc Lu-
næ motu extraordinario, ad miraculi
huius animaduersionem, & magnitudi-
nem suspiciendam amplius extimularen-
tur, id quod factum esse constat è sacris
Euangelijs, & dictis S. Dionysij Episto-
lis, necnon citatis Externorum scriptis.
Deinde vt constaret Christum & Cæli
& Terræ Monarcham. Tandem vt per-
tinacibus Iudæis omnis tergiuersandi
ocasio abscinderetur, videntibus Lu-
nam Soli contra naturæ leges subeun-
tem.

Modus autem obtenebrationis hu-
ius optimè & rationabiliter explicatur
per nostrum Solis Phænomenon, con-
globata videlicet tam multa tam densa
Macularum materia, quæ Solem totum
instar vnius Maculæ à mortalium con-
spectu eriperet. Nam ab Atmosphæra

*Eclipsis pa-
tiente Do-
mino, fuit
Vniuersalis
per totum
Orbem.*

I.

materia hebetudinis passum esse. Sic enim accidit, ut segmenta ipsius lucida & aduersus visum detecta, tantum tamen non lucerent, ut stellarum reflexum lumen præfocarent.

Eclipsis Solis Patiente Christo per hoc Phænomeno cōmōde defēditur

In Epist. ad Apollophe- nem & Polycarpum.

Georgius Cedrenus.

Eclipsis Solis, quæ Christo Domino Deoq. nostro patiente contingit, si totum Orbem peruasit, facilem ex hoc Phænomeno fidem atq. explicationem meretur; sine ipso, noua & inusitata Dei miracula exigit. Nam Luna Soli, (ut S. Dionysius se vidisse Heliopoli in Aegypto attestatur,) supposita, & eclipsans totum Solem, ultra 70. in terra milliaria Germanica, seu 350. Italica, (5. nimirum pro vno computando) vmbrae suæ diametrum non extendit.

Vniuersalem autē in toto terrarum orbe hūc Solis defectum fuisse, satis clare indicant Euangelistæ. Marcus, c. 15. v. 33. Lucas, c. 23. v. 44. Mattheus, c. 27. vers. 45. Audi quid scribat Georgius Cedrenus in Annalibus Constantinopolitanis, sub annum Tiberij Imperatoris 19. pag. 155. editionis Basilæensis.

„ Dominus noster, inquit ipse, Iesus
„ Christus supplicium adiit, sicut de
„ eo Vates prædixerant. Quo tempore
„ in Græcis Commentarijs annotata,
„ ipsis verbis referemus. Εγένετο ἡλίου
„ ἡλίου μεγίστη τῶν ἐγνωσμένων πρῶτον,
„ καὶ οὕτως ὥστε ἐπὶ τῆς ἡμέρας ἐγένετο,
„ ὥς καὶ ἀστέραι ἐν οὐρανῷ φανῆναι· σεισμοί
„ σὲ μέγας κατὰ Βιθυνίαν γενομένοις, καὶ
„ πολλὰ τῆς Νικαίας κατεστρέψατο· τὰτα
„ φερόμενα φησὶ. Quæ sic reddita sunt ab
„ interprete. Solis existit defectus,
„ omnibus prioribus maior, noxque
„ diei hora sexta oborta est, ita ut &
„ stellæ in cælo conspectæ sint. Terræ
„ motus quoque ingens in Bithynia
„ fuit, qui magnam Nicææ partem
„ prostrauit. Ita Phlegon. Africanus
„ quoq. narrat, quo die Christus est
„ supplicio affectus, tenebras admo-
„ dum terribiles per totum mundum
„ obortas, terræ motu saxa dirupta,
„ multumq. terræ prostratum. Eas te-
„ nebras Iudæi Solis defectum appel-
„ lant; absorde id quidem, meo iudicio
„ & repugnante natura. Nam secundum
„ Lunæ motū Hebræi Pascha instituūt.
„ Pridie autem Paschatis Christus in
„ Cruce supplicium passus est. Iam So-
„ lis defectus nō fit, nisi cum eum Lu-

I I.

na subit. neq. potest nisi in Nouilunio cum luminaria coeunt, aut proximè euenire. Quomodo igitur istæ tenebræ defectus Solis fuerint, cū eo tempore Luna pene è regione Soli opposita fuerit? Sed esto tamen id, quod multis probatū fuit, erroremq. visus sicuti tenebras toti mundo iniectas defectum Solis putemus &c. Hæc Cedrenus. qui ad Fastos Consulares etiam prouocat.

Similia affert Euseb. in Chron. anno 33. Christi. Scripsit super his, inquit, & Phlegon, qui Olympiadum egregius supputator est, in l. 14. ita dicēs. Quarto autem anno ducētesimæ secundæ Olympiadis, magna & excellens inter omnes, quæ ante eam acciderant, defectio Solis facta est: dies hora sexta ita in tenebrosam noctem versus, ut stellæ cæli visæ sint, terræq. motus in Bithynia Nicææ vmbis multas ædes subuertit.

Origenes l. 2. contra Celsum ex hac Eclipsi argumentatur. Prouocat & Tertullianus ad Archiuiam Romanorum, Tert. Apolog. cap. 21.

Eandem Solis defectionem obijcit Gentilibus ex eorum monumentis, Lucianus Martyr, in actis sui Martyrij. Testatur quoque Orosius, aliquos Græcorum libros huius defectionis meminisse l. 7. cap. 4.

S. certe Dionysius Areopagita, cum obstinatum Apollopheanis Sophistæ gentilis animam, multis diu argumentis ad Christum conuertere gratis insudasset, tandem hac Eclipsi in memoriam per S. Polycarpum reuocanda, ipsum emolliuit, & plusquam cimmerias ab intelligentia ipsius tenebras ipsa huius Eclipsios nocte depulit. Lege epistolam 7. quæ est ad Polycarpū. id ipsum fatetur. S. Antistes in epistola gratulatoria ad Apollopheanem conuersum, in qua admirabilem huius defectionis modum, naturæ vires longe excedentem, luculentissimè describit hisce verbis.

Cæterum ut superna lux paternæ gloriæ, suum splendorem in tuæ mentis tenebras infulgere sua voluntate disposuit; protinus cordis mei penetralibus infudit, ut piissimam recordationem & gestæ rei monumentum tuis oculis subijcerem,

I.

Vt videlicet in Heliopoli, tu qui-
dem pæne mihi coquus, & ego quin-
que & viginti fere annorum tempus
euolens, vna morantes constitera-
mus, cum feria quadam sexta, &
hora etiam ferme sexta, Sol horribi-
libus subito est oblitus tenebris, Lu-
na ipsum intercurrente, quia non
Deus sed creatura Dei in ipsius veræ
lucis occubitu, lucere non potuit. &
post pauca. Offusi enim tenebris ipsi
eramus, orbem Solis vnde quaque
& ex æquo occupante caligine, &
postquam repurgatio & restitutio
facta est, Luna ad Solis diametrum
conuersa aufugit. Et tunc quoque
Regulam Philippi Aridæi assumpsi-
mus: cumque reperissemus, quod &
erat notissimum, eo tempore Solem
Eclipsis molestias laboresque mini-
mè perpeti debuisse, ac nihilominus
Lunam ab oriente solarem splendo-
rem pullis nigrantibusq. velis obdu-
xisse, cum soleat ex occidua parte
Solem ingredi; tunc autem opifices
lucis thesauros caliginibus, quas ipsa
genuerat, ad occiduos vsque Solis fi-
nes peruagata, vt ipsi putauimus, oc-
cultauit. cum tamen & Lunæ id tem-
pus deesset, nec congressus vicinum
tēpus cognosceretur. & paullo post.
Denique annotatum diligenter Feriæ
diem & annum, annūciatione, quam
sacer Paullus nostris attentis auribus
infudit, consentientibus signis con-
spirare & concordare expertus, ma-
nus veritati submissi, & ex falsitatis
nexibus sum absolutus. quam qui-
dem veritatem mirificè effero, quam
& tibi communico. Hæc ibi &c.

Itaque sicut Deus nocte media na-
scens, claritate noui sideris ex Magorum
animis tenebras distulit; ita idem clara
die moriens, istorum philosophorum
obfuscatas errorum caligine mentes,
miraculosis & contra naturæ cursum
viresque excitatis tenebris, diuinitus
illustrauit.

Hæc porro tenebras totum terra-
rum orbem lugubri induisse habitu, fa-
tis pater, primò. Ex Euangelistarum
loquendi modo. secundo. Ex auctorita-
tibus modo allatis. Nam ex Phlegonte
euidens est, eam Solis Eclipsationem
fuisse plenissimam, cum quod noctem

I I.

obortam, & stellas visas; tum quod ha-
tenus animaduersarum Eclipsion ma-
ximam asserat. Certum autem est, tem-
poribus antegressis totales Eclipses, &
stellas visas sæpe esse.

Sed & in Iudæa fuisse plenam, ex E-
uangeliarum textu firmiter elicitur; in
Aegypto, testatur citatus oculatus te-
stis Dionysius. Cum igitur in hisce tri-
bus prouincijs Sol totus fuerit obscura-
tus, neque id totum Lunari interposi-
tioni possit attribui, (nam defectio So-
lis tota ultra 70. milliaria Germanica
in diametro vmbrae in superficie terræ
terminatae non excedit) manifestum
est, istas tenebras aliunde quoque pro-
fectas esse. Eadem igitur causa eripuit
solarem radium Atricæ, & Asiæ, quæ
Europæ. Et confirmatur etiam expressa
aliorum Historicorum non Christiano-
rum testificatione. In alijs Ehtnicorum
Commētarijs, ait Euseb. hæc ad verbum
scripta reperi. Solis facta defectio, &
tenebræ super Vniuersam terram. Bi-
thynia terræ motu concussa, & in
vrbe Nicæna ædes plurimæ currue-
runt. tertio Accedit communis sen-
sus & auctoritas doctorum. Lege Baro-
nium, tom. I. Iacobum Gretserum, tom.
de S. Cruce, l. I. cap. 31. pag. 102. Bar-
rad. in Euang. l. 7. cap. 19. Iansen. in
Concord. Euang. cap. 143. &c.

Cur autem ministerio Lunæ ad hanc
disectionem vsus sit Dominus, quæ ta-
men sola non suffecit, inter cæteras ra-
tiones possunt esse, vt homines hoc Lu-
næ motu extraordinario, ad miraculi
huius animaduersionem, & magnitudi-
nem suspiciendam amplius extimularen-
tur, id quod factum esse constat è sacris
Euangelijs, & dictis S. Dionysij Episto-
lis, necnon citatis Externorum scriptis.
Deinde vt constaret Christum & Cæli
& Terræ Monarcham. Tandem vt per-
tinacibus Iudæis omnis tergiuersandi
ocasio abscinderetur, videntibus Lu-
nam Soli contra naturæ leges subeun-
tem.

Modus autem obtenebrationis hu-
ius optimè & rationabiliter explicatur
per nostrum Solis Phænomenon, con-
globata videlicet tam multa tam densa
Macularum materia, quæ Solem totum
instar vnius Maculæ à mortalium con-
spectu eriperet. Nam ab Atmosphæra

*Eclipsis pa-
tiente Do-
mino, fuit
Vniuersalis
Orbem.*

I.

terra, id factum non esse vel inde patet, quod ubique serenitas cæli fuerit, alioquin neq. stellæ, neque Luna ad Solem accedens, atq. ab eodem recedens fuisset notata &c. Et hunc ipsum modum satis indicare videtur ipse S. Dionysius, dum ait, lucem Solis caligine, quam Luna generauerit opinione ipsorum, esse obuelatam. Illa igitur caligo, apparuit ipsis apud Lunam esse generata, cum tamen solari Phænomeno, cuius scientia priuati erant, conuenientius ascribatur: sic enim statim elucescit, quomodo hæc tam tetra atq. formidolosa, sed Meridiana nox, fuerit orbi Vniuerso communiter superinducta. In qua notanda sunt sequentia.

Primò, Totam Lunam, vndiq. solari splendore fuisse spoliatam.

Secundo, Omnes stellas hemisphærij occultati sua luce, quam à solo Sole habent, destitutas esse, quia facies Solis ad illas obuersa, caliginosa Macularum materia densis tenebris inuoluta, omnem lucis radium ab illis abscidit.

Hæc prolixius executus sum, ut innotesceret, qua ratione Phænomenon, hoc historijs, & ipse Phænomeno aptarentur.

Errores Idololatriæ circa Solem admissi, per hoc Phænomenon corriguntur.

*Isa. cap. 38.
4. Reg. 20.*

Legimus passim & antiquitus & modo, Solem instar Numinis à multis Nationibus adoratum esse. Persæ ex eo, quod Propheta Isaias Regi Ezechia Solem reuocauerit, decem lineis, id est horis 10. ut vult S. Dionysius, Epist. 7. Ad Polycarpum; in honorem Solis tãquam Dei, diem festum *Triplicitatis* dictum instituerunt: propterea quod Sol motu suo, triplicem fere diem artificialem effecerit. Nam progressus erat decem lineis, ideoq. ad occasum tendebat, crescentibus vmbrijs pomeridianis; deinde iussione prophetae, totidem horis regressus est; tandem easdem horas denuo progressus. Et sic supra vnum eundemque Iudææ horizontem, Sol progrediendo ab ortu in occasum, & ab hoc rursus versus ortum tendendo, & hinc iterum ad occasum pergendo, triginta duas horas, insumpsit confirmante id

1 ipsum Pachymerio, in eundem locum; Et hoc môstrôso Solis motu, Persæ ter-
riti, pacem cum Ezechia fecerunt, missisque muneribus magnis ipsum splendide honorarunt, & ex hoc miraculo, unde Deum verum agnoscere debuerant, impiè negarunt, ipsique Soli ob motum hunc triplicem diuinos honores annuè decreuerunt. Similes am-
10 tias etiam alię nationes admiserunt &c. Quæ omnes hoc vnico Solis Phænomeno erroris sacrilegi conuinci possunt. Nam Deus lux est, & tenebræ in eo non sunt ullæ: in Sole vero nostro, sunt tenebræ; igitur Sol noster, Deus non est. Item
15 apud Deum Patrem luminum non est mutatio neque vicissitudinis obumbratio: apud Solem nostrum mutatio & vicissitudinis obumbratio continua existit; igitur Sol noster non est Deus. Vicissitudinum autem istarum varietates ostendi possunt ad oculum, cuiunque dummodo ad manum sit Telioscopium obseruatorium &c.

25 *Cometa Natales suos videntur debere huic Phænomeno.*

30 Consideratu quoque dignum est, ordinarios Cometas plerumque in vicina Solis oriri & conspicabiles fieri, sensim ab eodem recedendo; multos è Solis radijs barbatis aut caudatis, latente apud Solem capite, nasci; plerosque
35 durationes Macularum Solarium æquales ostendere; imò in modo augescendi, ampliandi, & decrescendi similem tenorem, easdemque proprietates præ se ferre: quemadmodum ex Cometa anni
40 1618. clarum est, quem ego Aeniponti Telioscopio etiam obseruaui, & Pater noster Cysatus in editis suis pulchre ostendit.

45 Nucleorum enim mutationes & varietates exhibuit tales, quales plane Maculæ solent. An igitur similis materia à Sole sese liberet, & inde in Cometam accensa per æthera vagetur? Hunc certè totas regiones cælestes ab Antartico ad Arcticum polum permeasse, &
50 quidem itinere transuerso, omnium meliorum Astronomorum consentiens & vera doctrina est, quam suo etiam calculo & applausu Collegium Romanum Societatis Iesu excepit, in Disputatio-

*Comete Maculis & Faculis solari-
bus nō sunt
ab similes.*

I.

tatione Astronomica anno 1619. ab vno è Socijs de Cometa hoc habita, qui pag. 10. assertione secunda sic scribit.

„ Videtur secundo nulla etiam ratio-
„ ne dicendum, hoc idem (Phænomenon
„ non) sublunare fuisse. id quod fuisse
„ postea probat. Et p. 14. intra Solem
„ & Lunam ipsum collocat, hisce ver-
„ bis. Vt ergo iam Cometæ locum pro-
„ pe verum statuamus: dicimus proba-
„ biliter Solem inter, ac Lunam illum
„ statui posse &c.

Hæc eadem confirmat Lotharius Sarfius in *Libra Astronomica* eodem anno 1619. *Perusiæ* euulgata, pag. 20. & 32. At vero 27. ita loquitur.

„ Assertit præterea Galilæus Cometæ
„ materiam non differre à materia illo-
„ rum corpusculorum, quæ circa So-
„ lem certa conuersione mouentur, ac
„ vulgo solares Maculæ nominantur.
„ Non abnuo. quin illud etiam addo,
„ eo tempore, quo visus est Cometa,
„ nullam per mensem integrum huius-
„ modi inspectam perq. raro postea in
„ eodẽ sordes huiusmodi obseruatas.

DE SOLIS COLORE EX

Phænomeno solari per Telioscopium patefacto.

CAP. XIV.

DVplex est Solis color, is quem è luce, & is quem ex vmbri seu Maculis præfert. Prior varie consideratur, vel Oculo libero, vel Telioscopio. Si libero visu, semper mixtus seu confusus ex parte rei nunquam limpidus & syncerus ad visum venit, cum ob interpositionem Regionis vaporosæ, quæ lucem Solis diuersimode colorat, teste experientia; tum admixtione specierum ex vmbri seu Maculis solaribus profluentium; quas tamen visus sub ratione vnius speciei lucidæ percipit, non discernendo ullam partium solarium in luce varietatem, prævalente nimirum luce, & vmbriificas Macularum imagines suffocante.

Sol itaque visu libero spectatus, ordinarie præter massam lucidam sensui nihil ingerit, nam quod maximæ quandoque Maculæ conspiciantur, id ex a-

II.

1 spectu solo libero, in Solem certo referri non potest: vnde vt alium in Sole colorem, quam meræ lucis, videamus, visumque esse iudicemus, & contra pro-
5 teruum euincamus, præter naturalem oculum, adhibendus est etiam artificialis Tubi Optici, siue Helioscopio placeat hoc luminosum sidus directo intueri, siue Telioscopio in chartam derivare, siue denique alijs modis, prout a libi docui, ipsum velis contemplari.

Artificiosis ergo hisce Telioscopij oculis, acquies non tantum partium Solis lucidarum colores à non lucidarum coloribus secretos, sed & opacorum inter sese varie differentes. Omnes tamen & singulos ordinatos, inconfusos, neque cum alijs mixtos, si lentum debita dispositio adhibeatur, & Sol ita
20 supra horizontem eleuatus consulatur, vt Atmosphæræ terrestris refractionem & tinturam non sentiat. Posteriore ergo & artificioso Solis cernendi modo, amborum Solis colorum lucidi nimirum & obscuri aspectus distinctos nanciscimur, vt ex differentibus ipsorum
25 qualitatibus iudicium philosophicum ferre valeamus.

Tubo igitur optico ad Solem applicato, Maculæ exhibent similitudinem
30 corporis Opaci, & coloris quasi nigri; Faculæ colorem defæcatæ subalbescentis flammæ; reliqua Solis portio medium quendam colorem ostendit, non omnino luce depurata affulgentem, sed
35 fæculenta quasi hebetudine adhuc renitentem, qualis liquefacti stanni aut plumbi apparet.

Inter hunc & Macularum est medius
40 Macularum secundariarum siue Vbrarum solarium color. Et hi quidem colores omnes ordinarie in Sole cernuntur tempore eodem, sed in diuersis singuli partibus: alibi enim sunt Maculæ, alibi Faculæ, alibi Vmbra, alibi æquabiles Solis plagæ &c. Existunt autem
45 & visuntur quandoque in eodem Sole colores quidam alij extraordinarij, vel arearum, vel Iridum ex parte, vel denique variegati: de quibus in obseruationibus monui. Qui cum etiam alibi eodem tempore & loco Solis sint animaduersi, certum est, non fallaciam, sed
50 veram ex obiecto apparentiam censendam esse.

Quales diuersarum Solis partium colores cernantur?

Quia

I.

Quia vero multi Sanctorum Patrum, & modernorum etiam Theologorum, docuerunt & docent, lucem primo die creatam, caruisse omni subiecto materiali atq. inhæſionis, & sic per triduum integrum incesſiſſe, & lumen ſuum in orbem ſparſiſſe; merito quis addubitare poſſet, an talis lux Solis ſi in abſtracto vel data fuiſſet, vel daretur, in ſenſum viſus incurreret? Cuius rei cognitio, quia extra rem præſentem non eſſe videtur, & ad multa alia circa lucem & colorem ſiderum penetrandum fundamenta ſuppeditat, hæc per dubia nonnulla generalia, quali per tranſennam, percurrenda eſt.

De luce in abſtracto, ſeu ſine villo materiali ſubiecto conſiderata;

Dubia Nonnulla.

An lux in abſtracto oculis pateat?

Dubitet quis primò. *An lux natura ſua, ſive in abſtracto, & ſine villo inhæſionis ſubiecto conſiderata, ſit viſibilis?* Nam viſibilem eſſe, inde eluceſcat, quod Lux per ſe & primo ſit obiectum viſus, lucentia autem per ipſam. deinde patet idem ex coloribus, quos in obſtracto videri, euidens eſt, ex Sacroſanctæ Euchariſtiæ myſterio. D. Baſilius expreſſè putavit, lucem primigeniam die primo à Deo creatam, in abſtracto per triduum circuiſſe & illuminariſſe vniuerſum, quem multi tam ex antiquis quam recentioribus grauiſſimi Doctores ſequuntur. Communis deniq. Opticorum doctrina eſt, Lucem eſſe quandam coloris ſpeciem, adeoque per ſe natura ſua aſpectabilem.

Et Ptolomæus in ſermone ſecundo Opticorum, ex manuſcripto. Dicimus ergo, inquit, quod viſus cognoscit, corpus, magnitudinem, colorem, figuram, ſitum, motum, & quietem.

Nihil autem ex his cognoscit Viſus, ſine aliquo lucido, & quolibet prohibente penetrationem. Quæ ergo verè videntur, ſunt lucida ſpiſſa. Res enim viſui ſubiectæ, debent eſſe quocunque modo lucidæ, aut ex ſe aut aliunde, cum hoc ſit proprium viſibili ſenſui, & ſpiſſum in ſubſtantia ad retinendum viſum, vt viſus penetret eas, & non tranſeat, ſine effectu incidenti: vnde impoſſibile eſt aliquid videri ſine ijs vtriſ-

II.

que, cum vnum ſine altero non poſſit videri vere.

In contrarium autem pugnat, quod euidenter ſciamus cæleſtes regiones lumine ſolari ſemper eſſe illuſtriſſimas, & tamen neque miculam illius lucis per immenſa illa ſpatia diſfuſe, à nobis plenius noctibus, vel totalibus Solis Eclipſibus ſentiri. Item quod philoſophi dicunt ſub cœcauo elementū ignis verſari, cuius tamen lucem nemo vnquā vidit.

Dicendū igitur aliud eſſe lucē, aliud lumen à luce propagatū in medio; nam lux ſe habet ad lumē ſicut color ad ſpeciem coloris, eſt enim lumen ſpecies lucis: ſicut autem colorum in aëre verſantium ſpecies non ſentimus, ita lucis ſpeciem quod eſt lumen, non videmus in medio perfecte diaphano; & ſicut ex non viſa in aëre ſpecie albedinis, male argumentaremur, albedinem per ſe non eſſe viſibilem, ita non bene concluditur, ex eo, quod lumen in medio puro non videtur, lucem natura ſua inuiſibilem eſſe. Lux ergo in abſtracto, ſine ſubiecto, natura ſua viſibilis eſſe poteſt, tametiſi in diaphanum perfectum propagata cerni nequeat.

An autem & quomodo ſpecies lucis, ſeu lumen à luce propagatum in viſum cadat, iam non vacat proſequi. Hoc certum, apud me, Lumen Solis in corpora ſtellarum impactum, conſpicabile fieri.

Dubitet quis ſecundò. *An lux Solis ſit eiſdem cum alia luce quauis rationis, ſive ſpeciei?* Affirmant rectè Conimbricenſes, in l. 2. de cælo, cap. 7. Et probant ex eo, quod mutuis iſtarum lucum

coniunctionibus, totum compoſitum lucidius reſultet. Vt igitur huius argumenti certitudo maior euadat, Accipe experimentum ſequens. Per anguſtiſſimum foramen permittite Solem intrare in planum quodcūque obrentum quomodocūque, vt in eius ſuperficie ſplendor Solis reluceat, oportet autem locum obſcuriſſimum eſſe. Hoc facto, ex alio loco etiam obſcurato, & lucis extraneæ vacuo, tranſmitte accenſæ lucernæ, vel tædæ cuiuſcunque per rimam exilem fulgorem, ita vt huius fulgoris radius in ſpeciem radij ſolaris incurrat alicubi, in ſuperficie expaſæ tabulæ, vel chartæ, ſolarem ſpeciem excipiente.

Vide-

Lumen eſt lucis ſpecies.

Lux in abſtracto videtur.

An lux Solis ſit eiſdem ſpeciei cum luce ſublunari quauis?

Affirmatur & probatur experimento.

I.

Videbis enim, speciei solaris & candelæ communem concursus lucidiorem fore, quam sit aut Solis, aut Facule solius. Et hoc semper fiet, quamcunque tandem accendas flammam, & cum Solis specie committas. Igitur cum lux quævis lucem Solis intendat, manifestum est, eiusdem in omnibus ipsam speciei esse.

COROLLARIUM.

Hinc patet & simile à simili, & magis tale, à minus tali, posse & solere intendi.

An lux sit colorata?

Dubitatur tertio. *An lux primigenia in abstracto, colorem referat, & quem? An intensior lux, colorem lucis intendat, remissior remittat.* Difficilis est huius dubij resolutio. Nam lucem in abstracto quis vidit? Lucem tamen ex se visibilem esse dubitari vix potest: at sub quo proprie colore, non ita claret: quia lux in subiecto affectiones corporum quibus inest participat, è quorum coloribus vitiatur, ut postea videbitur. Interim tamen, si colorem lucis è Sole æstimamus, statuendum videtur, nativum lucis abstractæ colorem inter album & flavum incedere, id quod etiam flamma ignis suadet. Colorem lucis concretæ una cum luce intendi & remitti, experimento quotidiano constat. Confirmantur ista, ex fulgetris & chaumatis nocturnis, quorum lux multum albescit. & quia lux ista est in subiecto tenui quod colore quodammodo vacuum est ostendit illa lux suum quasi nativum colorem.

Lux in subiecto simpliciter diaphano nativum colorem non mutat.

Dubitatur quarto. *An lux primigenia in subiecto simpliciter diaphano posita, colorem suum nativum mutet?* Respondetur non mutare. Quia illud subiectum est substantia corporea simpliciter ex hypothesi perspicua; ergo luci in ratione coloris nil confert. Quia si aliquid conferret, id esset vel ex luce vel ex colore; at ex neutro. quia ex utrolibet horum id eueniret, subiectum illud non fuisset simpliciter diaphanum; quia tam lux, quam color ex natura sua est visibilis, ideoque subiectum terminat &c.

Dubitatur quinto. *An lux in corpore simplicissimo posita, colorem suum nativum mutet?* Respondetur si corpus

II.

1 simplex sit perfecte diaphanum lux, iuxta dubium quartum, non mutabit suum colorem; si vero corpus simplicissimum non sit simpliciter diaphanum, 5 necesse est Lucem primigeniam, in corpore tali simplicissimo positam, mutare suum nativum colorem. Quod si corpus illud simplex tantum fuisset affectum luce, aliqua lux superaddita utique 10 mutaret suum colorem, non specie, sed intensione.

Lux abstracta in corpore simplicissimo posita, suum colorem non mutat.

Dubitatur sexto. *An lux primigenia in corpore mixto posita, mutet suum colorem?* Si corpus mixtum est diapha-

Lux in mixto posita, eius coloribus sese accommodat.

15 num per omnia & homogeneous, neque vlla luce tinctum, non mutat, ut modo dictum lux suum colorem. Si est adiaphanum, aut luce aliqua affectum, mutat. Constat ratione & experimentis: quia lux 20 luci aut colori superueniens, illorum qualitatibus aliquatenus assimilatur, & dantur eius generis experientiae infinitae.

Dubitatur septimo. *An lux primigenia, ceteris omnibus paribus, minus luceat in corpore perfecte diaphano, aut simplici raro, quam in eodem perfecte simplici aut diaphano denso?* Ut si sit lux 25 unius palmi cubici, & intensa & quatuor, occupetque palmum cubicum in corpore raro, eademque deinde lux in denso eiusdem rationis corpore occupet etiam unum palmum cubicum; queritur an sit mutatura colorem insitum? 30 an illustrior apparitura in denso, quam in raro?

Resolutio huius dubij pendet ex eo, An corpus simplex, aut perfectissime diaphanum, si condensatur, aliquid ex perspicuitate amittat? & respondetur 40 condensationis terminum non esse colorem, corpusque simplex & perfecte diaphanum etiam si in infinitum condensaretur, ex hoc tamen præcisè capite non futurum opacum aut minus diaphanum. Vnde ad factam dubitationem respondetur, Lucem primigeniam æque extensam & intensam, non mutatum iri in raro ex denso, nec in denso 50 ex raro positam, ceteris omnibus paribus.

Resolutio Dubij. Lux eodem modo se habebit.

Dubitatur octavo. *An lux primigenia in subiecto quocunque posita, subiecto condensato, vel rarefacto, ceteris omnibus paribus mutetur?* Ut si sit subiectum 55 luci-

*Resolutio du-
bii.*

*Resolutio du-
bii.*

lucidum quattuor palmorum cubico-
rum, & condensetur in duos, vel ex tri-
bus rarefcat in sex palmos cubicos, que-
stio est an lucis mutatio sit futura in
colore? Respondeo futuram; quia
illa condensatio æquipollet aliquo mo-
do intensiori lucis, & rarefactio, re-
missioni.

Dubitatur nonò. *An lux abstracta,
& extensa, si cæteris omnibus paribus*
positis, contrahatur in spatium minus;
si intendenda? vel contracta, si exten-
datur, sit remittenda? Respondetur, si
partes contrahendæ sese penetrabunt,
intendetur lux; si distrahendæ extra se
migrabunt, remittetur; si secus, non
erit intensio aut remissio.

Ex horum dubiorum resolutione,
prudens physiologus multa de Macu-
larum & Facularum solarium luce, co-
lore & materia enodabit; multa de co-
lore, luce, materia, simplicitate, & com-
positione stellarum; tandem multa de
luce, colore & materia cælorum. Quo-
rum fundamenta nunc indicasse. satis
est: nam hæc in Opticis pertractari so-
lent & possunt vberius ex instituto.

*Nunc relictis de luce abstracta dubiis
ad ipsum Solis colorem nos recipiamus*
& an & quid inde pro nostro Phæno-
meno decerni queat, videamus.

Conclusio prima. Color lucis solaris
libero oculo conspectus, non suppedi-
tat argumentum necessarium, ad per-
suadendum in ipsius Phænomeno ines-
se Naturam igneam. Quia color iste li-
bero visui semper apparet stabilis, vni-
formis, immutabilis, & splendore igneo
qualis apud nos in igne spectatur, mul-
to vehementior, atque nobilior. Dixi
non posse sumi argumentum necessa-
rium, nam probabile sumplerunt anti-
qui, & id confirmarunt ex colore ignis
fulminei, qui solarem in multis proprie-
tatibus æmulatur, uti postea ex S. Ioan-
ne Chrysostomo & alijs videbitur.

Conclusio secunda. Color Solis tam
Helioscopio quam Telioscopio depre-
hensus, subministrat talia indicia, ut
multi ex ijs Phænomeno solari naturam
igneam tribuendam esse censeant. In-
dicia autem sunt ista.

Primo. Quia Tubus ostendit colo-

rem solaris Phænomeni condensari, &
rarefieri; hæc autem sine colore non so-
lere fieri; neque experientia ylla Physi-
ca similes effectus exhiberi absque si-
milium qualitatum interuentu iudi-
cant.

Secundò, Quia Tubus ostendit in-
tensionem, & remissionem fieri in Phæ-
nomeni solaris partibus tam clavis, seu
lucidis, quam obscuris, seu opacis: hæc
autem absque interuentu caloris apud
nos non fieri dicuntur.

Tertiò, Quia Tubus ostendit Ma-
culas, & Faculas Solis augeri, & minui,
quæ rursus absque partium resolutio-
ne, & varia accedente alteratione fieri
non soleant. Isti autem effectus, aiunt
ipsi, sine calore in alijs rebus non fiunt.

Quartò, Quia eiusdem Tubi benefi-
cio videntur Maculæ, & Faculæ, in ex-
tima Solis superficie de nouo nasci, &
interire, idque sensim, per modum ad-
generationis, & consumptionis, ista au-
tem absque caloris auxilio fieri non
posse contendunt.

Quintò, Quia ex Maculis generari
videmus Faculas, quarum cum flam-
mis similitudo per se in oculos satis in-
currat; cum autem sine calore non so-
leant eiusmodi mutationes euenire,
putant se suam hanc inde sententiam
solide concludere.

Sextò, Quam mirificè confirmari
dicunt ex varia, & admirabili Nucleo-
rum genesi atque interitu perpetuo.

Septimò, Adstipulantur etiam vehe-
menter Nimbi luminosi Maculis ma-
ioribus circumfusi, & colores extraor-
dinarij, flauis, subruis, subuirides, necnò
cærulei, adhærescentes, prout etiam
alii in Germania obseruarunt, & adno-
tarunt. quemadmodum in lib. 3. satis
dictum, & doctum.

Octauò, Tandem aiunt hanc do-
ctrinam ex concessio Phænomeno dedu-
ctam non videri contra mentem Philo-
sophi, qui si negauit eiusmodi mutatio-
nes in cælo esse, id suis principijs conse-
quenter asseruit, nam cælo solam ad lo-
cum mutationem inesse credidit, quod
alias nullas aduerterit, qui si eas, quæ
nunc beneficio Tubi optici quotidie
percipiuntur, animaduertisset, arbi-
trantur ipsum verosimiliter de mobili-
bus illis aliter enunciaturum fuisse. Et
hoc

I. I

hōc quidem modo de hisce philoso-
phantur quamplurimi vt dixi moderni,
apparentijs prælibatis ducti.

DE ALIIS RADII SOLARIS EX-
perientiis, iisque probatissimis.

C A P. XV.

Per radium Solis non intelligo
vnam tantum alicuius puncti
lucentis solaris directam, & li-
nearē protensionem; sed etiam totius
superficialis, & profundæ, seu corpora-
lis lucis extra solem propagatam splen-
dorem. Ex omnibus enim his, id quod
propositum est inuestigatur, & hæc om-
nia Radij solaris nomine complector.

Experientia prima per Nudum immisso-
nis foramen, quam de Magnitudi-
ne Solis productam, hic ad
propositum meum repetō
& explico.

Si Sol per minutissimum foramen
immittatur, ad distantiam 10. 20. aut
plurium palmorum, excipies ipsius ima-
ginem in chartam mundam, sed hisce
proprietatibus præditam.

Primò, Tota imago Solis erit lucis
valde tenuis, & obtusæ.

Secundò, Lux tota erit claritatis dif-
formis, intensioris in medio, remissio-
ris in extremo; neque difformitas ista
progredietur vniuniformiter, seu propor-
tionaliter, sed ad tertiam diametri par-
tē, verbi gratia, coextendetur circa cen-
trum vndique fulgore satis magno, &
ferme æquabili, postea incipiet satis
præcipitanter obscurari, & furuescere.

Tertiò, Figura huius imaginis est
semper rotunda, nisi vel foramen non
sit rotundum, & cum plano excipiente
non in legitima distantia, vel Sol in va-
poribus contractus.

Quartò, Extremitas huius figuræ
nunquam est præcisā, aut munda, sed
molliter lacera, vt si quis floccum niua-
lem, aut lanam circulo expansam spe-
ctaret, vel (melius fortasse) qualis esse
solet perimenter albæ nubeculæ attenua-
tæ, aut apex flammæ in lucerna quiete
ardentis, hunc apicem si in marginem
circuli circumpositum imageris, à

I I.

centro versus exteriora porrectum, ha-
bebis imaginis solaris quoad asperatum
limbum, aliquam similitudinem.

Experimur huius exasperationis ali-
quid in confinio lucis, & vmbre à So-
le, & opaco corpore caussato; illud e-
nim confinium semper fluctuat, & nun-
quam terminum in aliquam mundam
lineam desinentem ostendit. Simile
quid exhibet tremula imago Solis per
Teliocopium immissa in chartam, & à
vaporibus intercisā.

Quintò, Hæc imago fiet sensibili-
ter maior, sed obscurior, à foramine
minore; minor, sed clarior à foramine
maiore.

Sextò, Quo maius foramen, hoc
limbus fit mundior, quo minus hoc
inæqualior.

Septimò, Si locus sit penitus occlu-
sus, ita vt alienæ atque externæ lucis nil
penitus intret, & foramen physice mi-
nutissimum, imago Solis apparebit, sub
eā magnitudine, sub qua potest, si vero
alterius lucis vel parum ingrediatur in
illam cameram, magnitudinē imaginis
aliquid decedet.

Experientia hæc est certissima, quam
à plurimis nunc annis, semper cæteris
paribus, tenoris eiusdem reperi, quam-
que multis Viris doctissimis ostendi;
eorum ergo, quæ per ipsam experimur,
quærentur causæ.

Primò. Quare Sol immissus per mi-
nus foramen, apparet obscurior, quam
transmissus per maius? Nunquid enim
non totus Sol per foramen etiam mini-
mum traicitur? Si totus, ergo lux to-
tius. Aequè ergo clarus per paruum,
atque per foramen magnum.

Sed aliter se res habet, si optice re-
cte pensetur. Certum quidem est, to-
tum Solem ad punctum quoduis vbi-
cumque in terra assignatum accidere;
sed certum iterum est, ad punctum
assignatum, à puncto Solis quouis non
posse duci nisi vnicam rectam lineam;
vnde certum est, ex quouis Solis pun-
cto ad datum aliud punctum, quoduis,
non posse peruenire nisi radium vnum.

Vnde quando argumentum fit à to-
to Sole per datum punctum trajecto ad
lucem totius; concessio antecedente,
negatur consequentia; Est enim falla-
cia à representata quantitate, ad re-
presen-

Causa hu-
ius apparen-
tia inqui-
runtur.

Quid per ra-
dium solarē
intelliga-
tur?

Radij sola-
ris per mi-
nutissimum
foramen in-
tremissio.

Radij sola-
ris immissi
proprieta-
tes.

I
 presentantem qualitatem. Qualitas So-
 lis quantitatem eiusdem representans
 est radius Solis lucidus, à quolibet So-
 lis puncto in vnicum lamellæ punctum
 directus, & per hanc radiosam, & recti-
 linearem lucidam Solis qualitatem,
 quam alio nomine speciem, seu imagi-
 nem Solis nominamus, allabitur tota
 Solis quantitas corradando in illud pū-
 ctum, quod si minimo foraminulo phy-
 sico fiat peruium, conus ille radiosus
 intersectus in illo puncto, transibit in
 obiectam chartam, totiusque Solis lu-
 cidæ magnitudinem representabit: &
 quia propter foraminis paruitatem, ex
 radiosa puncti cuiuslibet in Sole lucidi
 sphaera (nam omne punctum lucidum
 radiat sphaericè) vnus tantum radius
 transit, & consequenter è singulis Solis
 punctis, singuli tantum radij, in conum
 Solis radiosum coordinantur: idcirco
 fit, vt totus Sol cono lucido obscuriore
 visui offeratur; & consequentia à qua-
 litate non tota, ad quantitatem totam,
 vel contra, non valeat. Nam tota Solis
 superficialis quantitas potest represen-
 tari à cono, vel magis, vel minus luci-
 do, cur autem magis, vel minus lucidus
 sit conus, non est magnitudo Solis re-
 presentata in causa, sed radius Solis
 presentans, qui si admittatur multus,
 augebit claritatem; si paucus, immi-
 nuet: vnde per minimum physicum
 foramen, luculam quasi minimam de-
 feret, ex puncto Solis quolibet nimi-
 rum radium vnicum, quia alij infiniti
 foraminis exilitate excluduntur. Quan-
 do autem foramen, vel vno quasi ato-
 mo augetur, statim lux conu immissi
 sensibilibiter clarescit. Quare hoc? Quia
 ex radiosa solaris puncti cuiuslibet allu-
 centis sphaera, per foramen maius plu-
 res radij in basin conu solaris colluce-
 scunt. Accepi autem ego foramen phy-
 sicè quasi minimum, ita vt in lamella
 orichalcea etiam visum acutum, cuius
 modi meum arbitror, effugeret: osten-
 di lamellam multis, dixi ipsi inesse fo-
 ramen subtilissimum, non potuere in-
 uenire, nisi obuersa ad lucem lamina.
 Per talia ergo foramina traiectus in
 locum obscurissimum Sol, suam fi-
 guram tenuissimi splendoris exhibet.
 per maiora autem, statim clarior eua-
 dit, &c.

Foraminis
ex as.

I I.
 Secundò, Quare conus solaris per mi-
 nimum foramen immissus, in medio cla-
 rior, circa extrema est obscurior? Quare
 magna pars mediæ æquabili ferme clari-
 tate refulget, quare circa extrema tanta
 obscuritatis difformitate?

Claritatis
& obscuri-
tatis diffe-
rentis caus-
sa inuesti-
gatur.

Hæc dubia resoluenda sunt ex alijs
 dubijs prius resolutis. Quorum primum
 est; An idem Solis punctum lucidum,
 radios quaquauersum emittat æque luci-
 dos, cæteris paribus? Et responderetur,
 non inueniri vllam causam, cur idem
 punctum non æque luceat in omnem
 loci differentiam, cæteris paribus, quia
 cum sit punctum, & æque lucidum
 in se, atque non sponte, sed necessita-
 te agat, emittere radios æque lucidos
 quaquauersum, ex illo communi, æque
 lucida, æque radiant: quid autem magis
 æque lucidum, atque idem sibi? Hinc
 sequitur punctum Solis laterale, siue
 marginale, si cætera paria sumantur, de-
 bere æque potentem radium procreare
 atque centrale. Nam ex eodem Solis
 puncto prodeunt aliqui radij ad Solis
 superficiem recti, aliqui obliqui.

Dubium
primum.

Resolutio.

Dubium secundum, An punctorum in
 Sole lucidorum diuersa à nobis distantia,
 hæc claritatis diuersitatem creet? Certum
 est, punctum Solis lucidum, quod à
 margine solaris circuli visibilis venit à
 nobis remotius esse, quam sit punctum
 in axe radiofo à media Solis summita-
 te ad nos descendens; est enim hoc no-
 bis vicinius quam illud solari semidia-
 metro: Vtrum igitur, cæteris omnibus
 paribus, hæc distantia tantam splendoris
 differentiam causet, est Quæstio?

Dubium
secundum.

Responderetur neque hanc esse huius
 in claritate discriminis causam: quia
 Sol apogæus recedit à nobis multis in-
 tegræ Solis diametris, & perigæus mul-
 tis accedit, radij tamen, seu laterales nō
 mutant obscuritatem, seu medijs non
 mutant claritatem ad sensum, vt in no-
 stro casu, sed eodem velut modo sese
 habent. Igitur distantia vnius semidia-
 metri non mutat claritatem radij, cæ-
 teris paribus.

Resolutio.

Hinc infero, radij seu speciei solaris
 obscuritatem circa extrema, vel clari-
 ratem circa medium debere aliunde
 proficisci. Quod vt à fundamentis
 eruatur, inquisitio vltius vrgetur, &
 ponitur.

Dubium

I.

I I.

*Dubium
tertium.*

Dubium tertium. *Verum, Sole posito non tralucido, duo puncta radiosæ æque lucida in superficie solari ubicunque tandem posita, æquales sint ad nos eiaculatura radios?* ponuntur autem cætera omnia paria. Sint duo Solis puncta superficialia, & æque lucida, vnumq. marginale, alterum medium, & Sol ponatur secundum profundum non tralucidus; Queritur, vtrum ista duo puncta sint emissura æqualem lucem ad nos? Respondeo, omnino, cæteris omnibus paribus, & constat ex antecedenti. Quia vnumquodq. punctum radiosum, emittit radios quocunque æque lucidos. punctorum ergo duorum æque lucidorum, omnes radij fient æquelucidi. Hinc infero: Si Sol tantum superficialiter luceret ad nos, istam experientiam diversitatis in luce non futuram. Vnde ut ipsa defendatur, veniendum est ad causas alias.

*Dubium
quartum.*

Dubium quartum. *Si Sol in profundum lucidus & ex æquo tralucidus ponatur, Verum hæc experientia sit locum habitura?* Respondeo primo. Si omnia

*Responsio
prima.*

& singula Solis puncta etiam in profundo lucida, æque lucida & æque tralucida ponantur, experientia hæc per omnia non saluatur. Nam licet verum sit, si lucidum lucido addatur, radium lucidiorem projici; tamen punctis Solis lucidis ubiq. eiusdem intensionis itemq. æque tralucidis positis, id quod hic modo supponitur, impossibile est, hanc in Sole experientiam locum habere, duplici ex capite. Nam hæc experientia vix ostendit eam solaris disci portionem, quæ tertie diametri parti respondet, præ reliqua æquabiliter lucidam, alteram deinde circumfusam, à luce media vehementer & difformiter dissentientem habet. Quod si autem istam punctorum lucidorum & tralucidorum æquipollentiam ponamus, solaris baseos claritas habebit se quodammodo ut chordæ ad chordas; & sic circa extrema vix tandem, neque tantum obscurabitur, quantum videmus; quod tamen euidenter ipsi experimento repugnat. Ex altero capite non consistit ista æquipollentia lucidarum & tralucidarum partium, cum modo deficientis claritudinis, & proficientis obscuritatis. Nam secundum experimentum partes medię sunt satis & fere æquabiliter lucidæ, deinde postquam obscuriores red-

duntur, vehementer & non sensim à luce desciscunt. Quod non fieret, si puncta Solis omnia & singula æqualiter essent lucida per punctum autem lucidum intelligo particulam physicā minimam aut quasi, ex qua præcise radius lucidus directè valeat ad nos procedere. Quod autem posita ista æquipollentia tantam in claritate & obscuritate difformitatem non exhiberet imago Solis, manifestum est; quia cum totus Sol æque lucidus per totam suam corpulentiam, in singulis punctis ponatur, & singula sint æque tralucida, donec in specie solari ad margines perueniatur, semper erunt multa puncta semet per tralucientiam intendentia. ut consideranti patet. Hoc ergo procedendi modo, Experientia alioquin verissima non defenditur. Sed multo minus hæc via veritas defēdetur, si quis volet, Medium Solis Opacum & adaphanum, instar nuclei inclusi; cætera verò æqualiter quanta, æqualiter lucida & tralucida esse. Sic enim partes marginales, partibus medijs facile lucis vbertate æquiualebunt, imo potius superabunt: id quod falsum, quia est contra experimentum.

Respondeo ergo secundo, si puncta Solis lucida ita constituta intelligantur, ut à superficie extrema versus centrum intrando semper clariora, & defæciora, & à cetro versus extremam eiusdem superficiem tendendo, semper obscuriora & seculentiora obuersentur, tunc species Solis in chartam proiecta optimè propugnabitur, aliter nequaquam saluo etiam sequenti experimento. Et probatur, quia radius à Sole in chartam profluens debiliior, si non aliunde hebetetur necessario profluit à puncto minus lucido, & fortior à magis fulgido. Hic autē in hoc experimento, radij circa medium semper sunt fortiores & speciē lucidiorem referunt, & extremi seper sunt debiliores quia aliunde non hebetantur ut suppono in hoc casu & constat ex experimento, nam semper talis apparet, & si ipsum aliquid aliud obscuraret, etiam medijs id proportionaliter sentirent, & imaginem Solis totam obscuriorem offerrent, ob Solis apparentem paruitatem, quod tamen non fit. Atq. ex hac eadem positione statim apparet, partium limbo solari propinquarū difformis obscuritas; quia

*Responsio
secunda.
Difformita-
tis in luce
vera causa
redditur.*

I.

nimirum istae feculenta partes semet obscurant amplius, ob traiectionem longiorem transversum, in medio autem brevis & directae ad nos ipsarum oppositio, & lucidior affusio, speciei solaris ideam fulgosiorem relinquit; sicut videmus in ardente rogo fieri, cuius flammam in superiora eluctantes in obscuras expirationes hebetantur.

Atque hac quidem obscuriore partium conglobatione totum Solem circumvestiri, ostendit ipsa solaris coni basis in chartam proiecta, vndique aequae versus margines obscura, & euincit allata ratio una cum experientia; quod Sol videlicet gyretur, & tamen semper ubique sibi similem & similiter affectam speciem projiciat. itaque et versus nos tales umbriferae exhalationes protenduntur, tamen si fulgore medio interno praevalente, non sentiantur.

Sicut videmus nimbum quandam tenuem candelae seu lucernae ardenti instar nebulae adhaerentem; ex aspectu tamen directo de ipso nil penitus observamus, cum nihilominus certum sit, ipsum toti flammae interiori vndique circumfundi, id quod constat, si vel candelam accensam loco suo haerentem circumagas, vel ipsemet immotam circumas; semper enim ex omni situ istum nimbum aspicias; vnde ipsum ubique circumvolui necesse est. Loquor autem de nimbo qui candelae interiori flammam verè ambit, non qui aliquando in oculo per refractionem & luminis confusionem apparere existit. Sed dices ex hoc ipso exemplo posse erui aliud modum, & fortasse meliorem allatae experientiae defendendam. Nam circumiectum candelae nimbum esse flammam rariorem & magis transparentem quam sit media, visus palam facit; ita si quis Solis exteriores partes rariores interioribus asserat, habebunt eae lucem quoque tenuiorem, ex quo deinde consequitur pariter, ut lucida Solis species in charta excepta sit illustrior in medio obscurior in extremis. Respondeo, si quaerimus, allata experientia solius claritatis maioris vel minoris rationem versaret, satis illi fortasse posset fieri per solam lucis densitatem & raritatem allatam, at si color consideretur, & eius in Solem latitudo, sola lux rarior, non satisfacit. haec enim colores illos igneos nunquam ostendit, quos testatur experientia et sequens. quod si candela ardens tali nimbo ambiretur, qualis est supremus flammam

fuliginosa apex, tunc exemplum per omnia cum allata experientia congrueret; tale autem esset, si quis in centro terrae incendium aspiceret; ex ipso enim feculentae illae flammam vndique aequaliter ad superiora eluctatae, visui margines tenebrosiores offerrent, partibus medijs, ob allatas rationes; talis etiam aspectus probabiliter erit conflagrantis ultimo die Mundi: quam flammam qui è caelo contuebitur, in medio lucidiorem, circa extrema fuliginosiorum absque dubio videbit, non obstante, quod impuris illis flammis totum illud incendium ubique circumdetur. Atque ex hisce quidem, similibusque apparentijs atque experientijs, Ioann. Keplerus, & Galilaeus Galilaei, alijque Astronomi caelestium ignium coniecturam atque doctrinam in medium produxerunt, licet tam accurate singula nequaquam exaggerasse videantur. Sed nunc ad telam pertegendam reuertamur.

Tertio. Quare speciei solaris figura est rotunda? Quia Sol est sphaericus, quod scitur, ex eo quod circumrotatus semper in circulum procumbat. alioquin, in chartam circularis non accideret, tamen si foramen perfecte rotundum esset. Probatum hoc in candelae flamma oblonga quae transmissa per foramen circulare speciem longiusculam semper dabit, nisi distantiam improporcionatam sumpseris. Patet hoc etiam ex Luna falcata per foramen rotundum immissa; falcata enim apparet &c.

Quarto. Quare perimenter huius figurae solaris non est aequalis, sed aspera, & male terminatus? Respondeo hoc evenire ex ipsius solaris corporis extremitate lucida; quae simile perimetrum refert, qualem ipsa sibi circumpositum habet à natura.

Quinto. Quare minus foramen, offert maiorem Solis imaginem, maius minorem? Haec experientia fatigavit ingenia multorum hucusque. ostendi enim eam multis peritissimis Mathematicis. Quam exquiri cuilibet est facillimum. Oportet autem caetera omnia esse paria, distantiam foraminis à charta, locum penitus obscuratum, caeli serenitatem maximam.

Ioannes Keplerus Casareus Mathematicus in suis ad Opticem Paralipomenis eandem experientiam profert, sed quia Solis visualem diametrum opinione sua nimis magnam ex ea inveniēbat, idcirco

Rotunditatis causa redditur.

Perimetri male praeter ratio.

Maioris apparentia per minus foramen, minoris per maius ratio.

I

idcirco Soli in æthere igneam veluti sphæram circumponit, eamque non stabilem aut perpetuam, sed temporaneam. Sed num veritatem sagaci labore reperi- tam, tam leui persuasione rectè abiciat, viderit ipse, ego. Astræam ad nos cælitus delapsam liberalius tractandam, hospiti- que liberali excipiendam, non temere exigendam censeo.

Omissis multis ad rē minime facien- tibus opinationibus, causam veram & genuinam dedi in prioribus, ubi de luce Facularum diurna disputaui, quam nūc iterum repeto, & fortasse clarius, & sta- bilio plurib. & rationib. & experimētis.

Genuina causa assignatur.

Dico igitur Solem per minimum fo- ramen maiorem sui speciem in obiecta charta exhibere visui, quam per foramen maius; propterea, quod species ipsius per minimū foramen ingressa, cōstet ex sim- plicibus & bene ordinatis radijs, quorum singuli à singulis Solis punctis sunt alla- pti, & quia singuli luce tenui splendent, eaq. differenti (nam medijs maximo, ex- tremi minimo iubarē pollent) & splen- didiores illi medijs soli & intermixti alijs in chartam accidunt, idcirco tanto ful- gore non præstāt, ut extimorum debilif- sima lumina à sensu visus arceant: quod si autem paullo maior foraminis apertu- ra fiat, statim plures coni solaris radij in- gressi, basin radiosi coni solaris magis quidē lumine intensam, sed minus quan- titate extensam offerent, non quod hæc imago ex parte rei minor fiat quam fue- rit prius, sed quod visus minorem quam re vera sit, percipiat, quippe qui maioris lucis præsentia imbutus, minorem quamvis præsentem, & lucidi circuli extrema oc- cupantē, non sentiat, & hanc esse veram non phantasticam philosophiam, en alia eaq. certissima experiētia confirmatam ostendo. Exceptam sub minimo forami- ne Solis imaginem videbis tātā quan- ta est, loco vndiquaq. ab externa luce va- cuo, quod ut probes adhibito circino cape ipsius diametrum; postea omnibus inuariatis, admitte vel minimam diei lu- culam, & beneficio circini eandem Solis imaginem mensura; inuenies ipsius dia- metrum priore sensibilibiter minorem. & hoc vnde? nunquid imagini aliquid de- cessit, accessione lucis diurnæ? minimè gentium. Sed ex alterius lucule splendo- re visus occupatus, priorem lucem debi-

II.

lissimam discernere non potuit. Et hanc luculentam experiētia etiam alijs Viris peritissimis ostendi. En aliam huic ge- minam. Tentavi Venerem corniculatam in chartam per Telioscopium excipere; transmissi, sed si asserculum chartiferum ita inumbraui, ut à luce crepusculina li- ber, & totus obscurus esset, Veneris astrū in obumbrata charta limpidè aspexi; Si vero vel parum lucis illius alioquin ob- tusa admisi, speciem Veneris vel nil vel maligne admodum vidi. Elisit lux maior in oculo, sensum lucis minoris. Aliam experientiam celeberrimam accipe.

Experimē- tum aliud in cōfirma- tionē prio- rum.

Præterito die 21. Ianuarij fuit Eclipsis Lunæ, (sed hinc Romæ nubium irrequie- to intercursu rectè obseruari nō potuit) fuit tamen Eclipsis, quam per interualla lucida adhibito Telioscopio, quantum licuit cōsideraui. Quādo igitur sub tene- bris Luna tota, sed nō centralibus latuit apparuit instar ferri candentis valde ru- tila; quando rursus suo lumini restitui cepit, cādor ille prior igniti ferri, repen- te immutatus apparuit in tristem, sub- obscurū & ferrugineum colorem priore multo debiliorem. Et hoc non aliunde, quam quod lucida Lunæ portio à Sole illustrata radijs directis minus luci- da partem à sensu secreuit. Aliud exem- plum. Scimus artificiosum & lucentem illū lapidem, si sub diū exporrigatur; accepto lumine in tenebris illucescere; quod si vel micula diurnæ lucis locum occupet, oculus ad lucem illā acceptam caligabit. Quare hoc? Quia maioris lu- cis præsentia, sensum ita occupat, ut mi- nor percipi nequeat. Abstineo à pluri- bus, quæ mihi non deessent, adducen- dis experimentis, quia allata sanum intellectum conuincunt.

Aliud expe- rimētum ab Eclipsi Lu- nari.

Aliud exem- plum.

Imago igitur Solis per minus foramē excepta, non est maior, sed apparet visui maior: & per maius foramen admissa, apparet minor, sed non est: quia magis lucida obfuscatur minus lucida margina- les radiationes admodum debiles & sic illis nō perceptis, spectatur in illustriori portio minor, in minus lucida, maior: quia ppter abundantioris luminis absenti- tiā, quidquid in ipsa lucet, sensus capit. Sexto. Quare sub maiore foramine so- laris figuræ perimenter apparet mūdior, sub minore laceratior? Quia maius fora- men Solē copiosorem admittit, quo fit

Doctrina bene notan- da, ex qua difficultates physica, & optica innu- mere solutur à priore

Confirman- tur dicta experimēto alio palpa- bili.

ut lux intensior & fortior extremos illos
& Solem inæqualiter terminâtes radios
à visus sensu eliminat, alios autem vege-
to & viuaci lumine polientes constanter
sistat ex quo vigore æquabili, oportet et
æquabilem & præcisum solaris disci lim-
bum resultare. Minimi autem foraminis
usu, ingerunt sese semper radij Solis ex-
tremi, qui cum ab ipso male terminato
proueniant, necesse pariter est, male
terminatos margines oculo præsentent.

Et hæc quidem de Imagine Solis atq.
ex Imagine disputata sunt, nunc acce-
damus Solem ipsum, & experiamur an
obutu directo similia in ipso cernantur.

EXPERIENTIA SECUNDA
per Telioscopium & Helioscopium

in Solem directæ

C A P. X V I.

*Explicatio
experientia*

SI Tubi boni Optici vitrum con-
uexum superposita lamella qua-
licunq. opaca ita obtegat, ut in
medio foramen exiguum, acu aliqua
maiuscula aperias, & per illud deinde,
reliquis omnibus rite dispositis, sub a-
pertura tali, qualem Sol exigit oculo ad
lentem cauam applicito, Solem inspicias
videbis ipsius corpus in medio valde
fulgidum, luce ad colorem argenteum
vergente, si quidem Telioscopio utaris;
sin Helioscopio, afficietur ab illo aliqua-
tulum Solis color; extremus autem di-
sci solaris limbus, quarta quasi semidia-
metri solaris, parte, visetur luce multo
debiliore, circumcirca, eaq. in colorem
rubeum seu igneum, flammæ acuminatæ
euibrata similem; & illa lux mediæ lu-
ci ubiq. arctissime continuata atq. copu-
lata comparet, ipsa tamen versus exte-
riora valde attenuatur, & varijs sulcata
apiculis perimetrum asperatum circum-
circa manifestè ostendit. Hanc expe-
rientiam non esse ludibriū aut fallaciam
vllam, probant oculi diuersorum, lentes
generis omnis, seu coloratæ, seu non; si-
ue simplices, qualis est vna conuexa: si-
ue compositæ, conuexa cum caua, seu
deniq. conuexa cum conuexa: situ Solis
erecto seu euerfo: loco cæli quocunque
orientali, meridiano, occidentali, inter-
medio: tempore anni quocunq. regione
terræ quacunque. Soligitur talis appa-

*Apparentia
non est ex a-
liqua Opti-
ces fallacia,
sed vera o-
biecti ita se
habētis præ-
sentatio.*

ret semper, etiam per nubes tenues aut
nebulas, etiam per Atmosphæram subti-
lem tamē, serenam & defæcatam. Opor-
tet autem spectatorem oculum sensim
& lentè, à marginibus Solis incipiendo
ad hoc spectaculum admittere, ne ra-
diorum solarium vigore percussus hor-
reat aut hebescat, sunt enim satis validi;
deinde oportet visū in ipsum obiectum
Solem educere, non in lente conuexa
illustrata hære, neq. morari obuerfan-
tes vmbrulas aut luculas, aut radiosas
quasi lineas, aliaue phantasmata, de qui-
bus cauendis in Oculo meo satis dixi, i-
stæ enim non sunt Solis, sed oculi, len-
tiumq. effectus, ex abundante, & variè
affecto aut afficiente lumine &c.

Præfatam verò coloris solaris appa-
rentiam, non esse à lentibus per refra-
ctionem aliquam, manifestum est, quia
Margo seu limbus solaris talis apparet,
etiam in centro & axe lentium conside-
ratus, & media Solis portio in margini-
bus lentis conspecta, non apparet aliter
quam in medio eiusdem; igitur oblique
radiorum in lentem incidentiæ hæc So-
laris speciei coloratio attribui non po-
test. Et quæ tandem obliquitas in tan-
tilla portione lentis detecta reperiri po-
test? Præexistit ergo ex parte rei in ipso
obiecto. Quo autem Tubus potentior
adhibetur, eo experientia ista fit illu-
strior. Interim tamen moneo, visum,
qui huius experienti sensum capturus
est debere esse satis bonum, & lucis pa-
tientem; deinde hoc etiam addo, in hac
Solis inspicendi ratione, nullam Ma-
culam, nullam Faculam à me potuisse
discerni; & ratio est, quia ob foraminis
exilitatem, omnia nimis extenuantur, ut
præter lucis formam cætera distingui
nequeant. Et confirmatur alia simili ex-
perientia circa Lunæ inspectionem. Nam
si quis Lunam tubo breviori perlustrat,
Maculas ipsius antiquas bene distinguet
sin eandem Telioscopio longiore & po-
tentiore aggrediatis, species illæ Macu-
larū, p. refractionem à lentibus profectā
ampliatæ & apparēter rarefactæ non ita
facile distinctè conspiciētur, sed visū fati-
gabūt. In Eclipsib⁹ Lunarib⁹ extremitates
vmbræ terræ eadem patiuntur: Non
enim discernuntur præcisè à partibus
illustratis Telioscopijs potentibus, o-
ptimè à debilibus seu brevibus.

Sed

*Oculus in
Solem cau-
admittendus.*

I

Sed neque oculo attribui posse hanc apparentiam præter superius paullo ante dicta, addo nunc & has rationes.

Primò, Quia si hoc ab oculo & in oculo esset, appareret etiam tubo in medium Solem obuerso quando margines eiusdem nullos attingeret; quod tamen non fit.

Secundò, Appareret etiam tubo in Lunam obtento, quod tamen fieri non deprehendi.

Tertiò, Quia Sole apud horizontem versante & in Ellipsim confidente, hæc apparitio similiter contrahitur, quod non fieret, si in oculo solo consisteret; oculi enim figura, & humor crystallinus non coarctatur tunc &c.

Quartò, Quia hisce similia repræsentantur in specie Solis per nudum foramen in chartam transmissa, cum igitur illic oculus nihil inferat, sed omnia natura duce fiant; manifestum est, ambas experiētias omni visus fallacia carere; & alteram ab altera firmissimè stabiliri.

Ex hac experiētia duo manifestè eliciuntur per ipsum Solis aspectum immediatum: alterum Solem esse in partibus profundioribus versus centrum luculentiorē, quàm sit in partibus oræ solaris vicinis; quod inde euincitur; quia si in partibus hisce marginalibus æque lucidus esset atque in medijs, appareret oculo etiam æque lucidus; sed non apparet æque, verum minus lucidus, per ipsam hanc irrefragabilem experiētiā. Ergo Sol in partibus medijs centrum circumdantibus est lucidior, quàm in extremis, oræ adhærentibus: & hoc est vnum.

Alterum est, partes Solis perimetro adiacentes apparere & esse tinctas colore tali, qualem videmus in igne, subrufo, in furuum obscurum, sed male præcisum desinente: quod probo eadem ratione. Quia si color iste non esset vere & ex parte rei in Sole prædictis modis, non appareret per Telioscopium talis in oculo: apparet autem, teste experiētia: Ergo vere & ex parte rei talis est. Sequela Maioris probatur. Quia si Soli verè & ex parte rei non inesset, Sol ipsum potentiæ visivæ non posset præsentare, id enim quod non habet Sol, præsentare non potest: sed neque ab alio præsentatur iste color, ratione cuius Soli per er-

II.

rorem transcriberetur.

Nam, vt ostendi, huius coloris præsentatio, nō potest proficisci ab Oculo, non à lētibus tubo insertis, sed neq. à medio; quia id esset Atmosphæra & quidquid ultra ad Solē intercedit: sed huic medio hunc colorem non inesse, clarum est ex eo, quod Sol hanc marginalem colorationem in omni cæli positu vniformiter exhibeat, siue in horizonte, siue in vertice, siue inter vtrumque spectetur, & tempore quocunq. medium autem vbiq. & semper æquali eiuscemodi tinctura imbutum esse, est simpliciter falsum & impossibile. Deinde si simul omnes vbiq. locorum Mathematici dicto modo in Solem intendent, ita, vt descripsi, furuescentem inuenient. vnde ab interiecto medio ea apparētia prodire nō potest. Amplius, Luna istam medijs affectionem multo amplius quàm Sol indueret, quod tamen non fit. Idem de Venere & Ioue alijsque planetis astruerem. Tandem, si à medio color iste in Solem induceretur, non rantum limbus Solis, sed totus Sol æqualiter per totum suum discum decoloraretur: hoc tamen non fit. Igitur impossibile est, à medio, quidquam in Solem per fallaciam vllam inferri, ex hoc colore.

Ioannes Keplerus in suis Paralipomenis, vt ante insinuavi, arbitratur hanc Solis tincturam obuenire non à medio, sed ab ipso Sole ignito alioquin ambientem & adhærentem ætherem inflammari, & sic in extremis minus fulgidum, sed furuo rubore circumfessum videri, luce hac ad sensum reliquo Soli continuata. Sed huic accensioni obstat sequentia. primo, Quod hæc apparentia eodem tenore sit perperua, illam autem ætheris adhærentis inflammationem Keplerus nollit esse solemnem, sed temporariam & satis raram. secundo, Quod eadem sēibili magnitudine semper persistet, quod vtiq. in dicta inflammatione aliter subinde eueniret. tertio, Quod incensionis illius extra apparēs Solis corpus indicium vel vestigium sit prorsus nullū. simul enim atq. Sol occūbit, species Solis tota obliteratur siue in charta p immisionē, siue in tubo p emissionē.

Cum autem incensio vicini ætheris, ante Solis ortum, & post occasum diu videatur obrutu libero; mirum

Præsentatio coloris solaris non est ab oculo, tubo, aut medio; ergo à Sole.

Kepleri de Aethere inflammatione opinio refutatur.

Sol versus partes centrales luculentior.

Color extremi Solis subrufus.

fane est, per intromissionem, aut Te-
lioscopij inspectionem, nil penitus pos-
se notari: cum multo amplius in So-
lis absentia sui presentiam referre debe-
ret. Quod enim se una cum Sole in
chartam depingit, id multo magis po-
terit Sole absente. Taceo nunc multa,
alia argumenta, quibus huius opinio-
nis impossibilitas satis ostenditur. Alibi
enim de hac re, etiam disseritur, & for-
tassis suo tempore vberius dicetur.

*Sequela ex
allatis expe-
rientijs de-
ducenda pro
Solis natu-
ra, alijs de-
fertur.*

Nunc igitur, quia Solem inæquali-
ter lucidum, magis in medio, minus in
extremis, & ad hæc subfuruescentem,
neque munditer terminatum vi-
demus; magnam ex his quo-
que capitibus de natu-
ra ipsius philoso-
phandi oc-
casio-
nem nacti su-
mus.

*QVID EX NOSTRIS, ET
alijs modernis Phenomenis circa
caelestia deduci soleat?*

CAP. XVII.

SVNT qui ex allatis hucusque prin-
cipijs nostris, & apparentijs si-
milibus, inferri posse dicant, &
de facto inferant, *Solis, Astrorum, & cae-
li naturam igneam; vel corruptibilita-
tem; vel denique fluidam substantiam:*
& ad hoc amplius comprobandum,
invidiamque novitatis declinandam,
præter rationes ex apparentiarum atq;
experientiarum visceribus haustas, &
deductas, auxilia à Sanctis Patribus, à
Sacra Scriptura eiusque Interpretibus,
Viris denique vario eruditionis genere
conspicuis, conquirunt. In horum igitur
ego gratiam plures eiusmodi au-
toritates ex ipsis fontibus, quos habe-
re potui in summam collectas, benevo-
lo lectori fideliter subnecto.



DE CAELI ET SYDERVM NATURA IGNEA.

AD AVCTORITATES
SANCTORVM PATRV
De Natura Cælestium

PROLOGVS GENERALIS.

MAGNVS AVRELIVS CASSIODORVS, EX SENATORE
& Consule Urbis Manachus. *De Institutione Sacra Scripturae legenda, ex
Præfatione in lib. 1. floruit magnus hic Vir, sub Annum
Christi 575.*



” **N** ON propriam doctrinam, sed Priscorum di-
” cta commendo, *quæ posteris laudare fas est, & predi-*
” *care gloriosum*: quoniam quidquid de Priscis sub
” laude Domini dicitur, odiosa iactantia non pu-
” tatur. & paucis interiectis. Quapropter dilectis-
” simi fratres indubitanter ascendamus ad diui-
” nam Scripturam per expositiones probabiles
” Patrum, velut per quandam scalam visionis; vt eorum sensibus
” prouecti, ad contemplationem Domini efficaciter peruenire
” mereamur.



Pro Natura Solis Astrorum, & Cæli Ignea, Auctoritates Sanctorum Patrum.

I.

Cautela 1.



NOTANDVM est, non omnia aut singula afferenda testimonia, pro omnibus aut singulis seruire. Nam aliqua omnibus, id est, cælo, syderibus, & Soli accommodata sunt, aliqua certis tantum attribuuntur, id quod ex ipso verborum contextu prudens Lector facile perspiciet.

Cautela 2.

Notandum insuper non omnes adducendos Patres in Sanctorum Catalogum relatos, inscriptionem tamen à pluribus denominatam esse.

AUCTORITAS ECCLESIAE.

Qui autem hac de re sit sensus sanctæ Matris Ecclesiæ Catholicæ, ex ipsius sacris Hymnis quotidianis, quibus facta Dei celebrat, haud obscure colligi potest. Sic enim ad horam sextam, quotidie cantat.

„ Rector potens verax Deus,
„ Qui temperas rerum vires,
„ Splendore mane instruis,
„ Et ignibus meridiem. &c.

Vbi vides *Mane* siue tempus Matutinum ob Auroram promittentem, splendoris vocabulo celebrari; Meridiem vero ob lucis, & æstus abundantiam, ab Iguito Sole; & quod hoc proprie, & non poetice dictum sit, inde colligitur, quod à sanctis Patribus, qui holce hymnos composuerunt, Sol verè igneus esse crederetur, & doceretur, tum quod idem in alijs Hymnis aperte declararent, tandem quod Theologi ipsos ita explicent.

Feria 2. ad Vesperas.

De Sole ignito, sensus Ecclesiæ.
&c.

„ Immenſe cæli Conditor,
„ Qui, mixta ne confunderent
„ Aquæ fluuenta diuidens,
„ Terra dedisti limitem:
„ Immans locum cælestibus
„ Simulque terræ riuulis,

II.

„ Vt unda flammæ temperet,
„ Terræ solum nec dissipent.

Hic vides, ex Ecclesiæ mente, aquas super cælos euectas, ad Solis, & reliquorum syderum refræmandum ardorem, adcoque terram illasam conservandam.

Sed audiamus amplius.

Feria 4. ad Vesperas.

„ Cæli Deus sanctissime,
„ Qui lucidum centrum poli
„ Candore pingis igneo,
„ Augens decoro lumine.

„ Quarto die qui flammæam
„ Solis rotam constituens,
„ Lunæ ministras ordinem. &c.

Hic apparet, & primæ diei lucem, & Solem diei quartæ, censerî naturæ igneæ.

Sabbatho ad Vesperas.

„ O lux beata Trinitas,
„ Et principalis vnitas,
„ Iam Sol recedit igneus,

Hæc Ecclesia toto orbe diffusa. nunc Ecclesiæ Patres attendamus, si prius an & quantum, tam illa quam isti in similibus attendendi sint, ex ipsa sanctæ Ecclesiæ Romanæ orthodoxa fidei professione, iuxta Concilij Tridentini decretum, audiuerimus. In hæc autem inibi ab omni bono Christiano inter cætera verba iurari solet.

„ Item sacram Scripturam iuxta, eum sensum, quem tenuit, & tenet
40 „ S. Mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu, & interpretatione sacrarum Scripturarum, admitto, nec eam vnquam, nisi iuxta unanimem
„ consensum Patrum, accipiam, & interpretabor. &c. Hoc igitur veluti
45 „ fundamento solidissimo iacto, placeat audire sanctos Patres, quid ex Scriptura de

Aqua cur
sint supra
cælum flam-
meum?

I.

ra de propositis dubijs senserint : inter quos qui Solem vel ignem vel ignitæ naturæ expressè docuerunt, sunt isti.

Tertullianus; D. Basilus, Iustinus. Ambrosius. Cyrillus Hierosolymitanus. Augustinus. Cæsarius. Theodoretus. Chrysostomus. Gregorius Nyssenus. Procopius. Anastasius Synaita. Arnobius. Lactantius. Anselmus Cantuariensis. Alcuinus. Beda. Isidorus. Hugo Victorinus. Damascenus. Arhanasius. Claudius Marius Victor. Dracontius. Iunilius. Petrus Damiani.

Quibus accedunt è recētoribus Augustinus Steuchus in sua Cosmopæia. Ascanius Martinégus in Glossa magna in Genesim, & alij, postea recitandi.

Existimo autem Lectori ingratum non futurum, si initium sanctorum Patrum citandorum primitus faciam, ex Annalibus Ecclesiasticis, Veteri Testamento, P. Jacobi Saliani, Societatis Iesu, Lutetij Parysiorum 1619. editis Tom. 1. in diem iv. Genesim, N. iv. pag. 78. & sequentibus : Sic enim ait.

„ Qui cælos Aqueos esse dixerunt,
„ iidem ferè astris igneam naturam
„ attribuunt ; eosque à suis orbibus
„ specie ac natura seiungunt : quorum
„ ex mente videtur Alexander Halensis locutus, cum ait . Rectè ergo videtur dictum, quod luminaria sint perfecta in firmamento, non ex firmamento, sicut dicitur in sequentibus, producant aquæ, producat terra .
„ Et est modus talis loquendi, quemadmodum si poneretur gemma pretiosa in annulo, ad decorem annuli, unde infra sequitur, & posuit ea in Firmamento celi, Sic ipse. Quod tamen populariter, & ad vulgi captum à scriptura dictum videtur, sed pergo .
„ Et ut omittam antiquiores Philosophos, qui Solem, & Lunam, reliquaque astra modo ignitas nubes, modo ferrum candens, modo lapides .
„ flamma ignitos, & id genus alijs nominibus vocitarunt, ut fufius tradit Theodor : Omittam, & poëtas, qui eam doctrinam magno consensu carminibus celebrant, Ethnicos, inquam, & Christianos, cum quibus Ecclesia.

„ Quarto die qui flammeam
„ Solis rotam constituens, &c.

II.

1 „ Certe Tertullianus, Sol, inquit, Tertullian.
„ corpus est, si quidem Ignis, sed quod
„ Aquila confiteatur, neget noctua.

„ D. Basilus ait deliras & aniles esse D. Basilus.

5 „ opiniones eorum, qui Solem negent esse
„ calidum, nec veram esse illorum sententiam, qui Solem ignea natura præditum negant, ubi Peripateticos videtur carpere ; sicut Iustinus in Ari-

10 „ stotelis reprehensione . Ambrosius Iustinus.
„ de more sequitur Basilium . Sed in- Ambrosius.

„ signis est Cyrilli Hierosolymitani
„ sententia . Aqua est calum, & igneus in illo Sol, & Luna, & Sydera, mitanus.
Cyrillus Hierosolymitanus.

15 „ & quomodo ignea in aqua currunt ?

„ Quod si quis de hoc propter naturas
„ contrarias dubitat, recordetur ignis
„ illius in Aegypto tempore Mosis ex-

20 „ currentis in grandine, & consideret sapientissimum Dei opificium .

„ Adde Cæsarium . Quia Crystal- Cæsarius.

„ lum esse dixi Firmamentum, recep-
„ turum erat subiectorum luminarium
„ splendorem, Solem, inquam, & Lunā,

25 „ & reliquum astrorum cæum, ex igne
„ naturam habentem: ne igitur illorum
„ ardore resolveretur, quod fixum est,
„ per id ab illo discreuit infinitam illam
„ aquam, veluti positam super humeros
30 „ eius, ad refrigerandum inflammationem, & ad leuigandum rotationem,
„ ut illa humiditate crassius redditum,
„ resistere possit igni luminarium .

35 „ Et quoniam hæc naturæ vires excedere sentiebat, q. 69. quærit . Qui fieri possit ut glacies resistat igni, quæ nullo modo fert ignis propinquitatem, neque manus contrectationem, neque auram calidiorē,
40 „ neque ut veste tegatur? Et respondit.
„ At non sunt illa ultramundana terrenis per omnia subiicienda ; nam aliter quam pro nostra infirmitate diuina virtus omnia dispensat atque gubernat, &c. Deinceps tamen exemplis à natura petitis id probabile reddit, & miraculis à scriptura desumptis.

45 „ Theodoretus ; Bisariam Deus
50 „ omnium diuisit aquarum naturam,
„ & quasdam sursum collocavit, quæ suo liquore, ac frigiditate non sinerent
„ corrumpi firmamentum ab igne luminarium . Et Sermone primo de
55 „ Prouidentia . Hanc ergo ob causam,

Theodore-
tus.

cum

Alexander
Halensis.

I.

„ cum tantus circa calum hoc ignis
 „ voluatur, Solis nimirum, Luna ac
 „ reliquorum syderum; tot tamen an-
 „ norum evolutionibus nec liquefactum
 „ funditur, nec arescit, nec incensum
 „ ardet. Et infra. Nec ignis naturam
 „ aquarum copia extinguit, nec glacia-
 „ le illud, vel aërium, & nubilum cali
 „ corpus, nimio illo, & ardenti ignis ar-
 „ dore liquefit, aut perit, sed licet vici-
 „ na sibi cohabitent, celant tamen ho-
 „ stiles vires, & Creatoris sui verbo
 „ persuasa, perpetuam sanxerunt ami-
 „ citiam. Hæc ibi. Quibus similia le-
 „ ges in Psalmum 148.

D. Chryso-
 stomus. „ D. Chrysostomus, Solem Ele-
 „ mentum appellat, eique ignis affe-
 „ ctiones, cal faciendi, arescendi, a-
 „ durendi, aliaque multas attribuit.
 „ Clarius etiam cum varias ignium
 „ differentias recenset, alium in Sole
 „ esse ait, alium in Luna, alium in
 „ fulgure, alium in aëre, alium qui fit
 „ ex lignis, &c. Et rursus Iustos stel-
 „ lis conferens, Illarum, inquit, ignea
 „ natura stellarum est, & ista (stellæ
 „ scilicet terrestres) edocentur igneam
 „ sortiri naturam. Sed ibi quidem i-
 „ gnis quem humanus sensus inuenit,
 „ hic autem quem secreta mentis osten-
 „ dunt.

Gregorius
 Nyssenus. „ Gregorius Nyssenus in historia,
 „ sex dierum, docet astra igneæ esse
 „ naturæ, & quidem ex eo, quod
 „ in igne subtilissimum sit, & leuis-
 „ simum.

Procopius. „ Procopius. Deus lucem, Solem,
 „ Lunam, astraque quorum omnium
 „ substantia ignita est, disposuit ad eum
 „ modum, ut motum suum in Firma-
 „ mento peragerent. At ignis ea natu-
 „ ra est, ut congelata, & ex aquis con-
 „ creta potenter dissipet, & dissoluat.
 „ Ne igitur id eueniret forte calo, ne-
 „ cessario tantam aquarum affluen-
 „ tiam in superiore regione collocavit,
 „ quæ calum illasum, & inuiolatum
 „ ab ignis ardore conseruaret.

Anastasio
 Synaita. „ Anastasius Synaita. Qui enim
 „ ex aquis, inquit, firmavit calum,
 „ & super aquas suspendit terram, po-
 „ terat etiam sine aqua indissolubile
 „ custodire firmamentum, etiam ex igne
 „ Solis.

Arnobius. „ Arnobius. sydera ignea esse signi-

II.

„ ficat, & Lactantius. Iam illud quam Lactantius.
 „ repugnans & absurdum, quod cum
 „ celestes ignes, cæteraque mundi elemen-
 „ ta Deos esse affirmant, item ipsum
 „ Deum mundum dicunt.

5 „ Anselmus Cantuariensis, Solem, Anselmus,
 „ Lunam, & stellas natura igneas affir-
 „ mat.

10 „ Item Alcuinus, & Beda. Isido- Alcuinus
 „ rus id de Sole asserit, de cæteris Beda.
 „ tacet. Isidorus.

„ Hugo Victorinus Solem igneum, Hugo.
 „ cætera astra aëria facit.

15 „ In hoc ergo tanto antiquorum Pa- P. Sallianus.

„ trum consensu, quid vetat sicut cele-
 „ stes orbes, ex aqua confectos cum ipsis
 „ fatemur, nec tamen vi ulla, excepta
 „ diuina, dissolubiles, beneficio formæ
 „ illis ab eorum auctore indita; ita &
 „ sydera ex ignis substantia Dei artificio
 „ genita probabile, in gratiam Veneran-
 „ de antiquitatis fateri?

SENTENTIA D. AVGVSTINI.

Nunc D. Augustini insignia testimo- Pro Sole
 „ nia præterire non possum. Qui Sermo igneo
 „ ne 1. de verbis Apostoli ita disserit. Luculenta
 „ Quomodo autem diuinitas à se met- Diui Augu-
 „ ipsa discernitur, cum lucis splendor monia.

„ aut Solis calor nullatenus separatur?
 „ Ecce enim sicut videmus, in Sole tria
 „ sunt, & separari omnino non possunt.

35 „ Quæ autem tria sunt videamus,
 „ Cursus, splendor, & calor. Videmus Calor for-
 „ enim Solem in cælo currentem, ful- malis in-
 „ gentem, calentem. Diuide ergo, si Sole.

40 „ potes, Arriane, Solem, & tum de-
 „ mum diuide Trinitatem. Sed for-
 „ tassis de Sole discernendo difficilis

„ est ratio, quia in cælo est, & à no-
 „ bis longe positus est. Ecce aliud
 „ proponimus elementum, quod mi-
 „ nus est, & in terra nobiscum est,

45 „ Ignem dico, qui in manibus nostris
 „ habetur, & tamen non diuiditur.
 „ Et Ignis enim tria habet, & diuidi Diuus Au-
 „ non potest, hoc est, Motum, Lu- gustinus So-
 „ cem, & feruorem. Si igitur, nefan- lis & Ignis
 „ de hæretice, diuidere non potes proprietates
 „ creatum Solem, & Ignem, quomo- easdem facit

50 „ do potes diuidere Deum omnium
 „ Creatorem?

„ Idem Sermonem primo, Dominica Aliud Diui
 „ proxima ante Natiuitatem Domini. Augustini
 „ testimoniū

55 „ Ecce

I.

Calor formalis in Sole. „ Ecce iterum aliud in Sole . *Calor, & splendor in uno radio sunt* : sed calor exsiccat , splendor illuminat : aliud suscipit calor , aliud splendor . Et licet calor, & splendor ab inuicem non queant separari , suscipit splendor illuminationem non feruorem , suscipit calor feruorem non illuminationem . Aliud simul , aliud singulariter agunt , & tamen ab inuicem non separantur . Sic & Filius suscepit carnem, & non deseruit Patrem, &c.

Aliud D. Augustini Testimonium „ Idem in Appendice . Serm LIX. „ Per creaturam Creator intelligitur , secundum has comparationes , & alias quam plures . *Sol, candor, & calor ; & tria sunt vocabula, & tria unum . Quod candet hoc calet ; & quod calet hoc candet : tria hæc vocabula res una cognoscitur .* Ita Pater , & Filius , & Spiritus sanctus, tres personæ in Deitate vnum sunt , & indiuidua vnitas recte creditur .

Hæc S. Doctor . Neque dicas ipsum istis exemplis docendi tantum causa usum esse, non quod ita se rem physice habere putaret: Hoc enim esset grauem Sanctissimo Patri inurere notam ; vt qui figmentis agnitis vt talibus vellet abstrusos nostræ fidei articulos illustrare , & per inania commenta os hæreticis obstruere ; cum tamen ipse expressè fateatur , se ideo ista adducere , vt per creatura Creator intelligatur . Euidens igitur est, D. Augustinum, & homines illius æui pro indubitata veritate habuisse , Solem tam esse calidum, quam videbant esse lucidum & mobilem ; & calidum quidem non effectiue tantum sed formaliter, atque adeo esse ignem.

B. Petrus Damiani, qui anno Domini 1080. floruit in Sermonem 1. de Epiphania Domini, tom. 2. pag. 2. editionis Romanæ, 1606. ita scribit .

„ In Stella, Fratres, quattuor principaliter ostenduntur . *Stella enim, igneæ naturæ est, stella in se lucida, est & clara; stella ex se radium emittit ; stella in nocte lucet, &c. Stella, vt diximus, igneæ naturæ est.*

Hæc ille . Si secundum hunc Patrem, stella naturæ igneæ est, idque in genere de stella qualibet asserit , vtique multo amplius de Sole intelligendum. Quem

II.

1 dum ab omni Macula immunem facit, vtique secundum quod libero visu & aspectu cognitus erat illis temporibus, accipiendus est .

5 *PRO NATURA SOLIS IGNEA, etiam ii citantur Scriptores, qui Solem quarto die ex nube ignea vel lucida creatum asserunt.*

CAP. XVIII.

15 **P** Ræterea , Quia multi sunt , qui Solem quidem ignem vel igneum esse expressis verbis non scripserunt factum tamen vel perfectum, aut adauctum die quarto dixerunt, ex ea luce, quam primo die conditam, vel ignem, vel igneam qualitatem, nubem aut substantiam formamue agnouerunt; idcirco etiam hos , tanquam primæ sententiæ non dissimiles, huc inferere oportet . Nam qui dicit Lucem primænam à Deo creatam esse ignem, vel naturæ igneæ, aut nubem igneam vel lucidam naturam, aut simile corpus, ex eoque deinde depurato Solem conficit &c. is vtique id quod maximè ad naturam ignis spectat, in Solem transfert: hoc autem fecere plerique citati Auctores, cum pluribus alijs, mox referendis . Et vice versa, qui Solem naturæ igneum agnoscit, & præter ipsum aliam cælestem primigeniam lucem non confitetur, is vtique eam quæ die primo Mundum illustrauit, à Sole & à natura ignis non excludet .

40 Igitur præter auctores, paullo ante nominatos, qui Solem è nube ignea vel lucida, à Conditore effectum sacræ Scripturæ (vt volunt) conuenienter tradiderunt, sunt isti .

45 Magister Sententiarum. Comestor. Alexander Halensis . Bonauentura . Lyranus . Toftatus . Didymus . Apollinarius . Iacobus Billius Prunæus . Fauet D. Thomas . Iuuenicus Presbyter .

50 Et quanquam me non fugit, aliquos inter hosce scriptores Solem nihilominus incorruptibilem statuisse, tametsi ex nube lucida ipsum conformauissent; si tamen Philosophiæ Peripateticæ & doctrinæ Thomæ conformiter insistere vellent,

Auctoribus qui Solem igneum expressè docuerunt, accensendi sunt etiam ii, qui Solem die 4. è nube ignea conditum scripserunt. &c.

vellet, istis vijs nequaquam procederent. Nam ex mente D. Th. p. 1. q. 67. art. ult. ad secundum. Si Sol factus est ex nube lucida, Solis corpus est de natura quattuor Elementorum, & consequenter de natura ignis potissimum. Ita explicat & tuetur D. Thomam, contra Lyranum, Burgenfis, additione septima.

Doctrina „ Sanctus Thomas, inquit ipse, non
D. Tho. ex „ improbat tertiam positionem, quae
Burgenfi. a. „ dicit Solem esse factum de illa nube
pud Marti- „ lucida, per hoc, quod in prima re-
nengum. „ rum productione non est dicendum,
Part. 7. pag. „ quod aliquid sit productum satis cito
863. „ corrumpendum, prout Postillator ei-
„ dem imponit, sed S. Doctor improbat
„ hanc positionem per aliud medium, &
„ conditionaliter, scilicet si ponatur cor-
„ pus Solis esse incorruptibile per natu-
„ ram: quia secundum hoc materia eius
„ non potuit esse sub forma quacunque,
„ distincta a forma Solis quae nunc est,
„ &c.

Verba D. Thoma. D. Thomas 1. parte, q. 67. art. 4. ita scribit.

„ Et ideo alii dicunt, quod ex illa
„ nube formatum est corpus Solis. Sed
„ etiam hoc dici non potest, si ponatur
Notanda „ corpus Solis non esse de natura quat-
D. Thoma „ tuor Elementorum, sed esse incorrupti-
doctrina. „ bile per naturam: quoniam secundum
„ hoc materia eius non potest esse sub a-
„ lia forma; & ideo dicendum, &c.

D. Thomas „ Igitur ex mente D. Thomae & Ari-
sententia de „ stotelis, si Sol natura incorruptibili præ-
Sole ignita „ ditus est, idem ex aliqua nube lucida fieri
natura etia „ non potuit. Et, si ex aliqua nube lucida
admittit. „ præexistente formatus est, ipse ex mate-
„ ria elementari constat, & consequenter
„ corruptibilis naturaque igneus euadit.
Vnde ex interpretatione Burgenfis, &
ipso S. Thoma, S. Thomas sententiam
illam, quae Solem ignitæ naturæ facit,
absolutè ut falsam non improbat, sed
etiam admittit: reijcit autem ipsam
tantum conditionaliter, si nimirum quis
sequi velit positiones Aristotelis, &c.

S. Bonauen- „ Diuus certe Bonauentura. 1. 2. dist.
tura Sanctis „ 14. p. 2. dubio 3. ubi multa egregiè in-
Patribus „ vtramque partem de Luna & eius lu-
deferendum „ mine disputat, & an sit naturæ igneæ
censet. „ inquit, &c. Sententiam sanctorum
Patrum, dicentium Lunam, & Solem,
ex illa primigenia luce esse facta lumi-

1 naria, expresse approbat.

„ Hunc igitur modum sustinendo, Sanctorum
„ inquit, propter Sanctorum Reueren- Patri sen-
„ tiam, & quia securius est verbis eo- tentijs inni-
„ rum inniti in hac materia, in qua ti, securius
5 „ plus proceditur ex coniectura, quam esse docet S.
„ ex ratione certa: Dicendum quod lu- Bonauentu-
„ minaria in quantum constituuntur, ra.
„ ex orbibus suis per aggregationem,
„ plus habent idoneitatis ad suscipien-
10 „ dum quam ad diffundendum: quod
„ verò lucent hoc habent ex lucis primo Lux primi-
„ creata perfectione. Et ideo illud lumi- genia distri-
„ nare, cui Deus multum dedit de illa buta est in
15 „ luce, maximè lucet sicut Sol iste: cui luminaria.
„ minus dedit, minus, & illud cui mini-
„ me, minime lucet ex se: sed si lucet,
„ hoc est ex susceptione solaris influen-
„ tia, &c.

20 Idem S. Doctor, 1. 2. Sent. dist. 13. art. 1. q. 11. ad 5. hæc habet,

„ Ad illud quod obicitur, Quod su-
„ perfluum fuit facere Solem, dicendum
„ quod falsum est; quia & si lux illa
25 „ perfecte illuminaret & diem faceret,
„ secundum quod sufficiebat pro illo tem-
„ pore, ad dierum distinctionem, placuit
„ tamen Deo rebus ad maiorem perfe-
„ ctionem educitis, utpote ad ornatum,
30 „ lucem facere pleniorē, quæ etiam
„ diem faceret clariorem: & propter hoc
„ ex ipsa etiam luce, siue nube lucida So-
„ lem fecit in maiore lumine, sicut dice-
35 „ tur postea. Et per hoc patet illud, quod
„ obicitur ultimo, scilicet quod illa lux
„ debuit manere; dicendum enim quod
„ verum est, quod manet secundum for-
„ mam & naturam: sed non oportet
40 „ quod maneat secundum illam statum,
„ secundum quem primo formata erat:
„ manet autem in Sole, qui ex ipsa for-
„ matus est, sicut innuunt expositores,
„ & melius patet super litteram.

45 Igitur Sancti isti Doctores Bonauen-
tura & D. Thomas istam de Solis cor-
ruptibilitate sententiam non absolute
repudiant, sed tantum conditionaliter,
si quis insistere velit Philosophiæ Stagi-
50 „ reæ &c. Cæterum & libèter admittet
„ Hugo, ait Ascanius Martineng. solare
„ corpus ex igne, seu ex Elementis cō-
„ pactum, quapropter potuisse ex il-
„ la lucente nube effici. cui quidem
55 „ Hugonis sententiæ ad stipulantur o-
„ mnes fere Patres. Nec ipse Diuus
Tho-

Ex nube
lucida fa-
ctus est Sol.

Par. 2. Glos.
sa Magna
in Genes. p.
863.

I

Thomas eam oppugnare ausus est,
nisi Peripateticorū placitis, astra cor-
ruptioni nō obnoxia adstruētū cōces-
sis & subscriptis. Hæc Martinēg. Nūc
ipso antiquos iterum adire & audire lu-
bet fufius : nam vt prouerbum habet.
Ex ipso melius fonte bibuntur aquæ.

Vbi nota, tamenſi ex Aſcanio multos
profero, nihilominus in ipſis fontibus à
me omnes quos habere potui, viſos &
luſtratos eſſe, ita vt de locorum citato-
rum veritate, non debeat alicui ſubre-
pere vlla difficultas.

S. Gregor. Nyſſenus in Hexaem. ſeu
Nyſſenus . „ Gregor. Nyſſenus in Hexaem. ſeu
„ Hiſt. 6. dierum. Non opinor noſtram
„ opinionē ab eo, quod probabile, atq;
„ conſentaneum eſt, aberraturam eſſe,
„ ſi hoc Moyſen intellexiſſe exiſtime-
„ mus, quod ab initio quidem omnis
„ illuminatrix viſ apud ſe ipſā coacer-
„ uata atque collecta, facta ſit lux : ſed
„ quoniam magna quædam in illo ſu-
„ btili & agili, ratione maioris & mino-
„ ris, differentia in vniuerſarum rerum
„ natura eſſe cernebatur, tridui tempo-
„ ris ſpatiū ſatis fuit, vt horū vnumq;
„ perſpicere & abſq. cōfuſione alterum
„ ab altero diduceretur atq. ſecernere-
„ tur, vt id quidem, quod ex ignea natu-
„ ra ſubtile & leue, ac plane materia ex-
„ perſſet, in ſummo loco ſub ſenſum ca-
„ dentis naturæ verſaretur: quā partem
„ ea, quæ mēte cernitur & incorporea
„ eſt, excipit natura. Quidquid autē &
„ tardum & ignauum eſſet, intra com-
„ plexum tenuis & leuiſ illius circa ſeſe
„ coiret, atq. hoc rurfus pro differentia
„ inſitæ ſibi proprietatis in 7. partes ſe-
„ caretur, omnibus particulis lucis, quæ
„ & æquales & eiufdē naturæ eſſent, pro
„ cognatione inter ſeſe coaleſcentibus,
„ & ab ijs quæ alterius generis eſſent,
„ ſeparatis atque diremptis. Sic igitur
„ quidquid ſolaris naturæ illuminatrici
„ naturæ inſperſum erat, cum omnes hæ
„ particule aliæ ad alias concurriffent,
„ vnum magnum lumen factum eſt.
„ Itidem eī in Luna, & in vnaquaq.
„ cæterarum tum errantium & inerran-
„ tium & fixarum ſtellarū vniuſcuiuſq.
„ particularum ad ſui generis res con-
„ curſus vnum quiddam ex ijs, quæ in
„ cælo apparēt, efficit, atq. ita vniuerſa
„ facta ſunt. Satis autem magno Moſi
„ fuit, cum maximè inſignia duntaxat
„ in his nominaffet, magnum luminare

II.

1 „ & minus, reliqua omnia generaliter
„ ſtellarum nomine appellare &c.
„ Claud. Mar. Victor, orator Maſſi-
„ lienſis, Cōmentariorū in Geſen. l. i.
5 „ Iam tribus exactis, motu ſuccēſa citato,
„ In flāmas igniſq; globum ſe cōgere iuſſa
„ Solis prima dies, fundataq; ſemina lucis
„ Puniceos roſeo ſparſerunt fomite crines.
„ Quibus viſus eſt Claudius Marius
10 „ Victor Solem nil aliud exiſtimaffe,
„ quam flammam igniſq; globum con-
„ formi cum Nyſſeno definitione &c.
„ Hugo Victorinus, adnotationibus

Hugo Vi-
ctorinus.

15 „ In quarta die de luce ſiue igne præ-
„ dicto meliorando cum forma & ſplen-
„ dore fecit Solem. Quod de ſup. a me-
„ morato igne factus ſit Sol, inde conii-
„ cimus, & paullo poſt Solus Sol propriā
20 „ habet lucem, & ſolus de igne factus eſt
„ ſtella autem omnes ſicut & Luna, de
„ aëria materia facta ſunt, & tantum
„ relucent, & non lucent.

25 „ Magiſter ſententiarum ſecundo,
„ diſt. 13. vt ſupra referebamus.

Mag. Sent.

30 „ Si autem quæritur, quid de illa luce
„ factum ſit, cum modo non appareat :
„ poteſt dici, aut de ea corpus Solis forma-
„ tum, aut in ea parte calē eſſe, in qua
„ Sol eſt, non quod ipſa ſit Sol, ſed ſit ei
„ ſic unita, vt diſcerni non valeat.

35 „ Petrus Comeſtor, in Scholaſtica
„ Hiſt. c. 6. cum lucis primæ ordialis e-
„ uentus enumerat, hunc non omiſit.

Petrus Co-
meſtor.

40 „ De illa autem nube lucida ſupra di-
„ cta traditur modo, quod vel redierit in
„ materiam vnde facta fuerat, vt ſtella
„ quæ apparuit Magis, & columba in
„ qua viſus eſt Spiritus ſanctus : vel
45 „ quod ſemper Solem comitatur : vel
„ quod de ea factum eſt corpus ſolare.

50 „ Alexander Halenſis, ſecundā,
„ quæſt. quinquageſima prima.

Alexander
Halenſis.

55 „ Ad quod facit quod lux, quæ fa-
„ cta eſt primo die, non deſierit eſſe, hæc
„ enim magis videtur conuerſa in lumi-
„ naria, vt quæ prius diſtinguebat diem
„ & noctem, tunc ampliori modo viſui
„ accommodata, & eidem modo perfe-
„ ctiori, eo quod in eo ſit lumen perfe-
„ ctius, & diſtinctius.

„ D. Bonau. in Commentarijs ſu-
„ per præcit. diſtinct. &c. Ideo eſt tertius
„ modus dicendi, quod ex ipſa factus ſit
55 „ Sol, & in ea ſaluatur tāquā in re eiufdē
„ generis. Sed quoniā nō videtur ſcriptu-

D. Boncuen-
tura.

I.

„ ra exprimere, quod Deus post 1. diem
 „ produxerit nouam lucem, sed solum-
 „ modo luminaria distinxit: ideo est
 „ Quarta opinio, quod ex illa luce fa-
 „ cta sunt corpora luminosa, inter quae
 „ principatum tenet Sol: nec fuit ibi a-
 „ liqua violentia, quia unaquaeque crea-
 „ tura eum locum accipiebat, quem sibi
 „ Dominus per naturam deputabat: &
 „ sic patent obiecta, quia nec fuit illius
 „ lucis corruptio, nec etiā violentia, sed
 „ maior quaedā & perfectio, & distinctio.

Lyranus.

„ Lyranus in Postillis, in secunda
 „ expositione.

„ Hic describitur opus Quartae diei,
 „ & intelligitur hic fieri luminarium,
 „ quantum ad suas formas substantiales
 „ específicas: & secundum istam exposi-
 „ tionē, Sol factus est de illa nube lucida
 „ praedicta, quae tribus diebus praecedēti-
 „ bus fecit diem, & noctem motu diurno.

Tostatus.

„ Tostatus in Genesim. In quarto
 „ die factus fuit Sol, qui nobiliori modo
 „ circuebat quam illa lux. Vnde credi-
 „ tur de illa nubecula factum. profe-
 „ ctum substantialiter in aliam speciem,
 „ & accidentaliter in fulgore & virtu-
 „ te influēdi. Hec ex his de nube lucida.

D. Basilius.

„ Basilius, Hexaëmeron, Homil. 6.
 „ disertius, ac clarius, & globos tan-
 „ quam primogenitae lucis vehicula
 „ congestos, hac die perhibet.

„ Non aduersantur hac illis sane,
 „ quae de luce dicta sunt: Tunc enim ip-
 „ sa natura lucis producta est, nunc au-
 „ tem hoc Solis corpus eo conditum est, ut
 „ illi primogenitae luci vehiculum esset.
 „ Nam ut alia diuersaque sunt, & non
 „ eadem ignis atque lucerna: & ignis
 „ quidem illuminandi vim obtinet, lu-
 „ cerna autem idcirco facta est, ut vel
 „ moderatam lucem subministraret egen-
 „ tibus, sic & illi purissima, sincera, im-
 „ materialique luci, ceu vehiculum
 „ nūc ipsa luminaria sunt extructa, &c.

Porro cum Dignus Basilius Solem
 ipsum esse igneum fusissimē & ex insti-
 tuto probet contra antiquos quosdam
 philosophos id negantes, eosque tan-
 quam deliros ut ipse appellat Hexa-
 Hom. 3. derideat, necesse est, hanc ip-
 sam lucem abstractam, nil aliud quam
 lucem ignis ab illo fuisse agnitam. id
 quod satis ipse multis exemplis ex Scri-
 ptura adductis, probat &c. Verba Ba-

II.

1 filij sunt ista. Quanquam ne illi quidem
 concedunt Solem esse calidum. Tanta isti
 superfluunt ad deliras, & aniles nugas
 copia temporis &c.

5 „ Didymus, ut in Catena Lippomani. Didymus.

„ Ac quemadmodum aquam prius
 „ super faciem terrae diffusam, postmo-
 „ dum tertia die Deus in unum congre-
 „ gavit, unde & maria & flumina &
 „ putei orta sunt: ita & primam illam
 „ lucem toto caelo diffusam, quarta die in
 „ unum coactam in Solem, ac Lunam,
 „ & stellas formavit, ita ut Sol nil aliud
 „ quam dies sit.

15 „ Appollinarius interprete Steucho. Apollina-
 „ E primogenita luce quidquid purissi- rius.
 „ mum esset in Solem selegit, reliquum
 „ Lunae & astris deputauit.

20 „ Damascenus, Orthodoxae Fidei, Damascen-
 „ lib. 2. cap. 7. His luminaribus primi- nus.

„ geniam lucem opifex indidit, non ut
 „ indigens alia luce, sed ne otiosa illabo-
 „ rata lux illa maneret; luminare enim
 „ nō est ipsa lux, sed lucis susceptaculum.
 „ Cuiusmodi autem lux ista fuerit, au-
 „ di ex eodem S. Patre, in eiusdem Asca-
 „ nij Glossa magna, parte 1. pag. 471. sic
 „ referente.

30 „ Ignis unum quattuor Elementorum
 „ existit, ceterorum leuissimum & ocys-
 „ sime sursum emicans, adustium & il-
 „ luminatiuum, prima die a rerum opi-
 „ fice conditum. Inquit enim diuina
 „ Scriptura; & dixit Deus, Fiat Lux,
 „ & facta est Lux. Neque enim aliud
 „ est ignis quam Lux &c.

Neque obstant his, quae idem S. Pater
 citato, lib. 2. cap. 7. dicit.

40 „ Manifestum autem, inquit, & hoc,
 „ quia compositus est Sol, & Luna & A-
 „ stra, corruptioni secundum propria co-
 „ rum naturā subiaccere; quae aut eorum
 „ sit natura nescimus. Hec inquam
 „ non contradicunt prioribus, nihilomi-
 „ nus enim Sol naturae igneae esse prohi-
 „ beri potest, etiamsi nesciatur cuiusnam
 „ sit in indiuiduo naturae. Damascenus,
 „ inquit, Bened. Perer. tom. 1. lib. 1. in
 „ Genesim. pag. 46. videtur existimasse
 „ lucem illam fuisse elementum ignis &c.
 „ Quam cum in Solem, ex mente huius
 „ S. Patris, transtulerit Deus, inuaria-
 „ tam in sua substantia &c.

55 Euidens est, ex mente huius S. Pa-
 „ tris in Sole esse ignem. Tamen si qua-
 „ lissimam

lignam sit in specie infima, nescire se fa-
reatur.

Theodoret.

Theodoretus, Quæst. 14. in Gene-
sim, ex luce prima Deum luminaria
quarto die condidisse, ita prodit.

„ Igitur & lucem creauit, quemadmo-
„ dum ei libuit. Sicuti vero firmamen-
„ to distinxit aquarum naturam, &
„ quasdam sursum collocauit reliquas
„ deorsum reliquit; sic lucem illam di-
„ stinguens pro arbitrio suo, luminaria
„ magna, & parua condidit. Cum
„ autem aliunde ex eodem auctore li-
„ queat Solem esse ignem manifestum
„ est, hanc lucem ab illo habitam i-
„ gnis proprietatem, &c.

Anast. Syn.

„ Anastasius Synaita, Comment.
„ in Genesim lib. 4. Lux quidem trium,
„ inquit, dierum præcedentium expan-
„ sa ac dispersa per totam vniuersita-
„ tem, ostendit lucem increata Trini-
„ tatis quocunque peruenire, & nullum
„ relinquere locum ea vacuum. Quan-
„ do autem quarto die fabricatur orbis
„ Solis, & lux illa quæ est ubique
„ præsens, in eo ponitur &c.

Cum autem Solem ignem agnoscat
ut visum est in prioribus ex Sallustio patet
hanc lucem Solis ab ipso tributam, esse
Qualitatem ignis. &c.

S. Athan.

„ Athanasius, Quæstione in Ge-
„ nesim 83. Et dixit Deus fiat lux, &
„ facta est lux. & post pauca. Hæc
„ lux magna & splendidissima cum
„ esset, diuisit eam Deus in luminaria
„ illa Solem, & Lunam & reliqua. Et
„ post, Quæstione 85. Lucem illam
„ magnam quam Deus fecerat, in lu-
„ minaria diuisit. Quæ lux hinc inde
„ dispersa, aliquatenus est imminuta;
„ quod nisi factum fuisset, non potuis-
„ sent animalia sustinere magnum iu-
„ bar, & splendorem tanti ignis. Atque
„ huius quidem rei gratia post Solem, &
„ Lunam sunt animalia creata, ut il-
„ lius ignis splendorem perferre possent.
„ Quæst. 74. eiusdem Patris hæc ha-
„ bentur. Deus lucem illam magnam
„ quam fecerat, in luminaria diuisit.

Sol ex igne
factus.

Procopius.

Procopius mirifice Basilio consen-
sit Commentarijs in Genesim, capi-
tulo primo, quæ videri possunt, vel
in auctore, vel apud Martinengum;
ego paucula transcribo.

„ Deus purissimam partem, inquit,

1 „ primigenia lucis accipiens, et in stultie
„ in Solem: reliquam partem distribuit
„ inter Lunam, reliquaque astra.
„ Quemadmodum Deus vniuersam
5 „ aquam, quæ prius inundabat totam
„ terram, in vnum quasi receptacu-
„ lum nempe in maria, flumina, pu-
„ tesq; contexit, sic lucem in omnia
„ diffusam vbertim, in vnum contra-
10 „ xit, Solem, Lunam, astraq; inde il-
„ lustrauit.

Bonauentura secundo sententiarum
distinctione quartadecima hanc appro-
bat sententiam. Corruptibilitatem ta-
men Solis non admittit. &c.

Bonauenta-
ra.

Deinde recitatis ordine omnibus
auctoribus, cum locupletibus textibus
quos P. Sallustius citat, plura affert ex
alijs, Ascanius. Iuuenius Presbyter Pro-
logo, l. 1. de Hist. Evangelica, sydera
ignea bis appellat.

Iuuenius.

„ Immortale nihil Mundi compage-
tenetur,
„ Non Orbis non regna hominum,
non aurea Roma,
„ Non mare, non tellus, non ignea
sydera Cæli.
„ Nam statuit Genitor rerum ir-
reuocabile tempus,
„ Quo cunctum torrens rapiat
flamma vltima Mundum.

Alcuinus sine Albinus Flavius, Ca-
roli Magni Præceptor. Quæstionibus
„ in Genesim. Interrogationi, Quæ
„ creature de nihilo factæ sint? respon-
„ det, Cælum, Terra, Angeli, Lux,
„ Aer, Aqua. Animalia hominis. Quot
„ Elementis Mundus stat? Quattuor.
„ Igne, Aëre, Aqua, Terra. Cuius
„ nature Cælum esse fertur? Ignea, ro-
„ tunda, atque volubilis.

Alcuinus.

„ Beda, l. de natura rerum cap. 5.
„ Cælum subtilis igneæque nature, & à
„ centro terræ æquis spatijis undique col-
„ lectum. Et cap. 19. Solis ignem dicunt
„ aqua nutrire, &: Qui dum natura
„ sit igneus, motu quoque nimio calo-
„ rem adauget.

S. Beda.

Anselmus Cantuariensis, de Imagi-
„ ne Mundi, l. 1. c. 23. Sol diuinus est Sol,
„ quod solus luceat cæteris stellis obscu-
„ ratis, vel quod sit super omnia lucens,
„ forma sphaericus, natura igneus.

Anselmus.

I.

„ Et Luna corpus est globosum, natura igneum sed aqua permixtum. De stellis autem cap. 20.

„ Sunt autem omnes stellae rotundae & igneae, quarum dispositio soli Deo cognita est.

S. Isidorus, „ Isidorus Etymologiarum l. 3. cap.

„ 48. Sol cum igneus sit, pra nimio motu conuersionis suae amplius incalescit: cuius ignem dicunt philosophi, aqua nutrir, & e contrario elemento virtutem luminis, & caloris accipere.

Mag. Sententiarum, „ Magister Sententiarum secundo, distinctione 14. Augustino hoc adscribit,

„ Quidam vero caelum, quod excedit aeris spatia, igneae naturae dicunt, asserentes super aerem purum ignem esse, qui dicitur esse caelum. de quo igne sydera & luminaria facta esse coniectant. quibus Augustinus consentire videtur. De Gen. ad litt. l. 2. cap. 3. &c.

Augustinus certe hanc sententiam nunquam improbavit, sed minimum ut probabilem admisit, ut ex eodem suo loco ostendetur, imo Solem formaliter calidum expresse docuit, ut paullo ante ex ipso demonstratum est.

Iunilius, „ Iunilius Episcopus Africanus, qui iuxta Bellarminum de Scripturis Ecclesiasticis, circa annum Domini 545, floruit, in libello de partibus diuinae Legis, his conformia habet. Ait enim caelum primo die factum esse aerem, idque ex Scriptura deducit. Et fiat Firmamentum.

Firmamentum fluidum, „ Vtique inquit ipse, significat fuisse aliquid fluidum ac liquidum, id est, aquas &c.

„ Et rursus luminaria deriuatiua appellauit, quae quarto die facta sunt: ut ex lumine, primo die operato, facta monstraret. In his autem quae primo die facta sunt, neque aperte neque subtili verbo factum aliquid declaratur ex altero.

Idem ibidem ad quaestiones discipuli, Δ, subiungit responsiones Magistri M, prout sequitur.

„ Δ. Ea quae ex aliquo facta sunt, quot materias habuerunt?

„ M. Sex. Terram; Aquas; Aerem; Ignem, Lumen; Costam.

„ Δ. Da in singulis origines suas.

II.

„ M. Ex terra virentia, plantaria, & animalia: Aquis, Firmamentum, mare, natantia ac volatilia: simul

„ autem ex terra, aquis, igne & aere, omnia quae per successiones renouantur: ex Lumine, Luminaria: ex costis, Eua.

„ Δ. Ignis quomodo probatur factus? aut unde? vel quomodo?

10 „ M. Factum quidem ex generali Scriptura possumus approbare, cum dicitur de Deo; Qui fecit caelum, & terram, mare & omnia quae in eis sunt: quia utique etiam ignis in eis est. Ex speciali professione,

15 „ Laudate Dominum de terra, Dracones & omnes abyssi; Ignis, granado, nix, glacies, spiritus procellarum: de quibus ante dixerat, Quoniam ipse dixit, & facta sunt. Et rursus; Benedicite omnia opera Domini Domino, & subiunxit: benedicite Ignis & aestus Domino.

25 „ Vtrum vero ex nihilo, sicut & alia, factus sit, an ex aliquo, dubitatur. Plures enim volunt caelestium luminarium esse porticulam: quippe etiam nunc frequenter videmus homines certamodo ignem ex Solis radiis mutuari. Quod si ita est, primo die factus est. Sed sapientius hoc Scriptura lumine, quam ignem vocauit, ut ex meliore usu nomen acciperet.

35 „ Ex his clarum est, hunc doctissimum Patrem luminare maius esse lucem prima factum agnoscere, & admittere Solem esse igneum; & ignem primo die creatum fuisse dictum lucem, vocabulo illustriori propter usum lucendi nobiliorem: imo & propter finem atque intensionem Operis Dei: quia Deus intenderat dispellere tenebras, & idcirco ignem primo die creatum nominauit lucem, & effectum ipsius appellauit diem.

40 „ Sancto Bruno Chartusiae Patriarcha, tam vitae sanctimonia, quam eruditionis opinione apud Sommos Pontifices spectabilis, in Commentariis super psalm. 148. in illa verba, [Laudate eum Sol & Luna, laudate eum omnes stellae & lumen &c.] Fideles, inquit, eum laudate, (nempe Deum) contuitu omnium horum; (nimirum Solis, Lunae, Syderum, caelorum omnium)

Firmamentum ex a. quis factum

Ignis noster est particula ignis solaris, ex probabili huius & aliorum sententia.

S. Bruno.

I.

II.

„monium, & aquarum supercaelestium)
 „quia ipse dixit, id est, statuit, voluit,
 „disposuit; & ex nihilo facta sunt
 „quattuor elementa, quae fuerunt ma-
 „teria istorum omnium. Ipse postea
 „mandauit in eadem dispositione sua
 „& creata sunt haec omnia, id est, ex his
 „quattuor elementis formata. Ex huius
 „igitur Patriarchae mente, oportet in So-
 „le ignis utriusque praedominium vige-
 „re. Et vno verbo, quicumque ex elementis
 „creatum atque formatum Solem agno-
 „scunt ad huius Patris classem accen-
 „sendi merito videntur: neque enim ab
 „ignita natura Solem villo modo liberare
 „potuerunt.

Omnia ex
 quattuor e-
 lementis for-
 mata.

Rupertus
 Tuitiensis.

Rupertus Abbas Tuitiensis, lib. 1. in
 Genes. cap. 41. sic ait.
 „Hic iam praetereundum non est,
 „quod de hoc magno praeside (Sole)
 „huius caeli eleganter praedicere solent
 „physici, quod sit fons ignis aetherei, cor-
 „caeli siue mens, & temperatio Mundi
 „Cuius doctrinae sensum clariorem affert
 „nobis idem Pater, cap. 46. his ver-
 „bis.

Solferuidus

Hunc ergo Mundum tantummo-
 „do luminaria haec illuminant: de qui-
 „bus nec illud praetereundum est,
 „quod maxime horum causa Firma-
 „mentum volubile esse oportuit, vi-
 „delicet ut Sol, qui tanti est feruoris,
 „ut (sicut superius dictum est) fons
 „ignis aetherei appellatus sit, ad hoc fa-
 „ctus, ut non solum illuminatio, sed
 „& temperatio mundi frequens esset,
 „& cunctis partibus adesset, & stella-
 „rum ordo notabilis toties regyrans,
 „notior existeret. Siquidem multo
 „melius nunc est, cum Solferuidus bre-
 „uiter quidem, sed frequenter adest.
 „Hinc constat tempore huius Abbatis,
 „id est, ante annos 500. ferme, a Physi-
 „cis Solem naturae ignitae fuisse habi-
 „tum.

S. DIONYSII PRO SOLE
 ignito, calido, fluido & corrupti-
 bili auctoritates.

Neque ab hac Solis igniti sententia
 siue doctrina alienus fuisse videtur D.
 Dionysius Areopagita; quem alioquin
 pridem produxisse oportuerat: sed quia
 hanc opinionem non ita liquido pro-

mit, ut alij de eadem non dubitent, aut
 in contrarium inclinent; studio ipsam
 huc veluti ad vltimum locum ventilan-
 dam, & maximorum Virorum iudicio
 declarandam reieci.

Argumenta igitur, quibus Sanctus
 Dionysius Solem igneae naturae adscri-
 pserit sunt ista.

Primo. Quia ipse expressè docet, lu-
 cem tridui primi fuisse transformata
 die quarto in Solem: quod D. Thomas
 ut paulo ante ex verbis eius vidimus,
 generaliter & absolute fieri posse negat,
 si ponatur corpus Solis non esse de natura
 quattuor elementorum, sed esse incorrupti-
 bile per naturam &c.

Argumenta
 ex quibus S.
 Dionysius
 pro Sole i-
 gnito collig-
 itur.

Secundo. Quia ipse lucem illam pri-
 mam absque subiecto & figura stabili
 circumductam statuit, ita explicantibus
 ipsum Viris partim sanctitate, partim
 doctrina clavis, uti mox videbitur. unde
 aperte etiam edicunt, ipsum in hac ma-
 teria cum S. Basilio conuenisse: constat
 autem secundum D. Basilium, Solis,
 Ignis, & primogeniam illam lucem esse
 eandem.

Tertio. Accedunt etiam Theologi
 moderni, qui D. Dionysium aliter sen-
 sisse iudicant, quam ipsum multi scho-
 lastici interpretentur.

Quae omnia ut palam constent, en-
 ipsa S. Dionysii, atque laudatorum Com-
 mentatorum verba.

S. Dionysius Areopagita, cap. 4. De
 diuinis Nominibus, pag. 187. editionis
 Parisiensis. Ex translatione P. Petri Lan-
 sellij. 1615. quae talis est.

S. Dionysius

„Quin etiam, id quod nobis in
 „medio cursu orationis exciderat, cae-
 „lestium principiorum & extremo-
 „rum causa, est summum bonum,
 „eius essentiae ac naturae, quae nec cre-
 „scere, nec minui potest, nec vlla ex
 „parte mutari: atque etiam motuum,
 „qui sine sono, quia ita loqui oportet
 „in maximo caeli cursu feruntur, de-
 „scriptionumque stellarum, atque
 „pulchritudinum, & luminum, fir-
 „mitatumque, ac quarundam stella-
 „rum multiplicis motus quo transferun-
 „tur, duorumque luminum, quae magna scripta
 „diuina, appellant, ab iisdem locis ad ea-
 „dem reuocationis & reuersionis, quae in
 „orbem circumque fertur, quibus dies
 „nostri, & noctes definiti, mensisq. &

„ anni mensura comprehensi tempo-
 „ ris atque eorum, quæ in tempore
 „ fiunt conuersiones, & definiunt &
 „ numerant & moderantur, & con-
 „ tinent.

„ Quid dicat aliquis de ipso per se
 „ Solis radio? Et post multa. *Hæc enim*
 „ *lux ea est, etiam si tum forma certi cor-*
 „ *poris carebat quam diuinus ille Moses,*
 „ *primos etiam illos tres dies nostros de-*
 „ *finisse ac distinxisse commemorat.*

hæc Dionysius, apud quem miras Solis
 laudes Lector inueniet, cuius lucem ab
 omnibus appeti dicit, tam ratione &
 sensu utentibus, quam iisdem carenti-
 bus. non autem possum quin aliqua
 pauca excerpam in eorum gratiam,
 qui isto auctore foras carent. Sic er-
 go ait ibidem, magnus iste Pater.

„ Ex ipso enim bono lumen est, &
 „ bonitatis imago. Itaque lucis nomi-
 „ ne ipsum bonum celebratur, quasi in
 „ imagine primum exemplar expres-
 „ sum. Vt enim diuinitatis omnia su-
 „ perantis bonitas, a summis dignissi-
 „ misque naturis ad ultimas pertinet,
 „ atque etiam omnibus præstat, ita ut
 „ nec superiores ad eius præstantiam
 „ perueniant, nec inferiores comple-
 „ xum transeant, sed omnia quæ pos-
 „ sunt illustrat, & efficit & viuificat,
 „ & continet & perficit, estque eorum
 „ quæ sunt, & mensura, & æternitas,
 „ & numerus, & ordo, & complexus,
 „ & causa, & finis: sic etiam qui clara
 „ expressaque diuinæ bonitatis imago
 „ est, *magnus hic Sol, totus lucens, ac*
 „ *semper splendidus, pro minima ipsius*
 „ *boni similitudine, omnibus etiam,*
 „ *quæ eius lucem capere possunt, collu-*
 „ *ci habetque lumen per omnia diffu-*
 „ *sum, in omnem hunc modum, quem*
 „ *cernimus, radiorum suorum splendo-*
 „ *rem explicans, & sursum & deorsum:*
 „ ac si quid est, quod eos non parti-
 „ cipet, id eius luminis diffusi tenui-
 „ tati aut paruitati non est tribuendum,
 „ sed ijs quæ, quia apta non sunt ad
 „ capiendum lumen, ad illud capien-
 „ dum non explicantur. Hactenus ille.

S. Maximus Constantinopolitanus,
 Nobilis, deinde Monachus & Martyr,
 doctrina & multitudine Scriptorum pro
 Fide celeberrimus, qui floruit anno
 Christi 657. ut habet Apparatus Posse-

1 uini, at ut Bellarminus de Scriptoribus
 Ecclesiasticis, ex 8. tom. Baronij refert,
 anno 660. cui Imperator Constans hæ-
 reticus, anno imperij sui 16. ut refert
 5 Cedrenus, qui fuit Christi 656. quod
 eum ad præsententiam societatem per-
 ducere nequiret, linguam & manum
 abscedit.

Is igitur tantus talisque Martyr, ci-
 tata D. Dionysij loca. sic vertente Lan-
 sellio nostro interpretatur.

„ Cælestem vero essentiam neque
 „ crescere neque minui ait, ut perfe-
 „ ctè & sufficienter finem suum asse-
 „ cutam; ideoque immutabilem ipsam
 15 „ dixit, ex quo facta est, non peruer-
 „ sam. Perfectum autem est quod neque
 „ crescit, neque minuitur. Hæc porro

„ *in uerbo præteritis, non autem in uerbo præteritis,*
 „ vocauit, quia motus est circularis:
 „ improprie uero terminum habet, sed
 „ ueluti terminum, motus qui ad idem
 „ (punctum) sicut ab aliquo princi-
 „ pio ad aliquid ueluti terminum, v. g.
 25 „ orientem fertur.

„ Nota eum dicere cælos sine sono,
 „ & absque sensu moueri.

„ Illud autem, *quarundam stellarum*
 „ *multiplex motus quo transferuntur,*
 30 „ de planetis dicit.

„ Nota insuper istud, *eum solos pla-*
 „ *netas moueri admittere.*

„ Aduerte quoque unde temporis
 „ numerationes. Hæc ex S. Maximo,
 35 „ pag. 130. littera D.

„ Idem sanctus Maximus, pag. 134
 „ lit. D, hæc habet super uerba: *Ipsa*
 „ *enim est lumen.*

„ Nota, Solem etiam cum figura
 40 „ careret tres dies qui eius creationem
 „ præcesserunt, illustrasse, atque lu-
 „ cem quæ prima producta fuit, die quar-
 „ ta in Solem transformata fuisse,
 „ eumque ternionem dierum dicere, ut

45 „ etiam Magnus Basilius in Hexæ-
 „ mero aperte dicit: illud autem non
 „ prætermittas, nimirum ea quæ ante
 „ dicta sunt, non de Sole, sed de pri-
 „ mo creata luce, quæ in Solem trans-
 50 „ mutata est, dici. Hucusque sanctus
 „ Maximus, ex quo & Solem igneum,
 „ & cælum fluidum, necnon natura
 „ sua corruptibile quilibet absque du-
 „ bio cognosceret,

S. Maximus
 D. Dionysij
 Commenta-
 tor Græcus
 pag. 130.

S. Dionysius
 ex Interpre-
 tatione S.
 Maximi
 planetas so-
 las absque
 cælo motu
 mouet, utiq;
 in liquida.

I.

II.

Georgius Pachymerius itidem Græcus S. Dionysij interpres, qui, ut habet Possevinus, tempore Michaëlis Palæologi sub annū Christi circiter 1260. scripsit in eadem loca. Postquam de cæli substantia eadem dixit, quæ sanctus Maximus, sic commentatur.

„ Illam autem, inquit, aliquorum a-
„ strorum multiplicis motus reuolutionē,
„ de planetis intelligit: ipsos enim solos
„ moueri admittit, pag. 106. circa finē.

Et postea pag. 107. Ait cum sancto Dionysio, lucem illam primigeniam esse, solarem, & probat ex Mose, quod tres primos dies mēsurauerit.

Idem ex epistola D. Dionysij septima, pag. 266. & 267. duobus locis in commentarijs suis indicat Solem in cælo ex mente Dionysij libere vagatum esse, &c.

Duos hosce auctores proferre placuit, ut in ore duorum istorum de verbo, mente & sententia sancti Dionysij, nobis melius & certius constaret, quam quorundam recentium, Diuum Dionysium inuitum pro se raptantium: istis enim, qui (ut recte monet Lansellius) „ in Græcia nati & propius ab ipso fonte capite q. distantes, liquidius haurire vim & sonum Dionysianæ orationis potuerunt, fidei plus habendum arbitramur.

Lucis primogeniæ explicatio, ex mente S. Dionysij.

Lux igitur illa triduana, cuius sanctus Dionysius tantas laudes & proprietates celebrat, non debilis aut imperfecta, sed fulgidissima fuit, ἀρχαῖος, autem dicta, à sancto Dionysio, more Mathematico; qui quando lineam incertæ mensuræ volunt exprimere, vocant interminatam, indefinitam vel etiam infinitam aut longitudinis liberæ: superficiem autem rectam ad nullam certam figuram restrictam, vocant planum quodcunque, sub nomine indiuidui vagi: corpus denique magnitudine, aut figura certa non affectum, appellant nomine incerto, solidum quodcunque: sic ergo D. Dionysius lucem illam triduanam, fluctuantem adhuc & nubis instar figuras varias ex celerissima circūuectione inducentem, vocauit informem, quia re vera certa & determinata figura destituebatur: non autem necesse est, ut caruerit omni subiecto materiali. Sicut autem lux illa primo die circūiuit in aëre illo, seu spiritu, qui se-

rebat super aquas; ita etiam parte aquarum supra firmamentum eleuata, confecit suum curriculum die secunda, in eodem loco spiritali, siue aëreo, inter aquas superiores & inferiores comprehenso, qui locus nomine Firmamenti & cæli secundi à Genesi celebratur, quo toto die, terra adhuc immediate non irradiabatur: aquis enim adhuc inferioribus tanquam infantia fascijs circumdata colligabatur. Tertio tandem die, aquis in maria collectis, terram apparentem, libere affulsit. Ex hac igitur triduana & figuræ instabilis luce, trahunt iudicio suo, innictum pro Sole igneo, & cæli liquiditate Astronomi argumentum. Nam ipsam in cælo circumgyratā esse certum est, alioquin nox diei non successisset: si vero figura stabili donata fuisset, frustra ipsam Diuus Dionysius ἀρχαῖος, idest, teste S. Maximo, sine figura, & alij Scriptores nubem igneam aut lucidam appellarent. Et amplius patet id ipsum ex Dionysio, quod omnes planetas in cælo per se liberos esse & ire sinat, quod utique ex gratia huius lucis adepti sunt. Item quod Diuus Maximus ait eam esse transmutatam in Solem: ex quo euidentius esse aiunt Diuum Dionysium circa cæli Solisve materiam nunquam in contraria sententia fuisse. Sed de hac re, lubet etiam audire duos è nostris Theologos del Rium, & Salianum.

Ex Pharo, P. Martini Antonij Del Rio. in Genesin, Cap. 1. p. 54. & 55.

„ Ardua Quæstio est, Qualis, & quæ ista lux primo creata die? Duæ sunt sententiæ cæteris nobiliores, & probabiliores, nam certi nihil occurrunt. Vna volentium fuisse accidens quoddam, corporeum luminosum, non sine miraculo, immediatè, & sine subiecto productum, quod Dei iussu in certa huius molis aquarum parte, ab eo spatio ubi creatum, mox per integrum hemisphærium vniiformiter difformiter diffundi, & illud colustrare cæperit, ad eum modū, quo Sol id postea facturus erat, discurrens ab ea plaga mundi quæ mox oriens, & in eā quæ Occidens properas, curculūq; suū, spatio 24. horis æquali, conficiens.

- I
- „ conficiens. Hoc accidens sine subie-
 „ cto fuisse volunt duo velut fratres a-
 „ mici, Patres gravissimi, Basilus Ma-
 „ gnus, Hom. 6. in Hexaem. & Grego-
 „ rius Nazianz. Oratione in novam
 „ Dominicam; qui quod videtur cor-
 „ poreum negare, non de essentia eius
 „ loquitur, quasi fuerit spirituale quid,
 „ sed subiecto negat vlli inhaesisse, aut
 „ vlli substantiae velut vasculo inclu-
 „ sum, ut Nicetas exposuit, idem te-
 „ nuere alij Patres Graeci, Theodoret.
 „ q. 14. & 16. Athanas. q. 74. Anasta-
 „ sius Antioch. in Hexaem. l. 4. Pro-
 „ cop. hic, & Damasc. l. 2. de fide or-
 „ thodoxa cap. 7. Didym. & Appollin.
 „ in Cathena. hi omnes volunt hanc
 „ lucem quarto die inditam luminari-
 „ bus caeli: quod, si hanc tuearis, pla-
 „ ne dicendum; vel potius quarto die,
 „ ut non amplius necessariam, evanuis-
 „ se, quod de mera qualitate, dici mi-
 „ nime absurdum. Tuentur hanc sen-
 „ tentiam eruditè Paullus de sancta
 „ Maria, vulgo Burgensis vocatus hic
 „ & Ludouicus Molina, de Opere sex
 „ dierum, disp. 7. com. in 1. par. Diui
 „ Thomae. Et crediderim hanc lucem
 „ nubis, in columnam fortassis confor-
 „ matae, forma praeluxisse. Solemne
 „ enim Deo docent Sacrae littere, quo-
 „ tiescunque luce aliqua ordinaria
 „ praeteritam Solis & syderum uti vo-
 „ luit, nube lucida uti: sicuti cum de-
 „ duxit Filios Israël ad terram pro-
 „ missionis. Exodi 14. 19. Deut. 1.
 „ 33. &c. Isaia 4. 5. &c. Ezech. 1. 4.
 „ &c.
- „ Altera opinio est Diui Thomae, &
 „ communior in Scholis, hanc lucem
 „ fuisse ipsum Solem adhuc informem,
 „ & imperfectum: quā probant Diui
 „ Dionysij Areopagitae auctoritate, l.
 „ de diuin. nominibus, cap. 4. Vbita-
 „ men Diuus Maximus in Scholijs i-
 „ stud primo formatum die lumen vult
 „ ex mente Dionysij quarto die in Solem
 „ transformatum, καὶ ἐπὶ τὸ πρῶτον
 „ φῶς τῆς τετάρτης ἡμέρας μετασχηματισθὲν εἰς ἡ-
 „ λιον, & censet à Diuo Basilio hoc di-
 „ lucidius explicatum, non tam de
 „ ipso Sole, quam de huius luminis pri-
 „ mo formati in Solem conformatione,
 „ ut sit ambiguus, utrum Sanctus
 „ Dionysius id senserit, quod sensisse
- II.
- 1 „ Scholastici Latini eum opinantur: au-
 „ vero tantum, hoc lumen id ipsum esse,
 „ quo postea Sol illuxit, quemadmodum
 „ S. Nazianzenus & ceteri illi Patres
 „ censuerunt, à voce etiam luminaris
 „ argumentum ducentes, quod φῶς καὶ ὁ-
 „ λος est.
- 10 „ Salianus in suis annalibus tomo 1.
 „ de die primo in Genesin, pag. 45. etiam
 „ in hanc concedit sententiam, Diuum
 „ Dionysium lucem primo die creatam,
 „ agnouisse abstractam; postquam enim
 „ hanc Diui Basilij sententiam in medium
 „ adduxisset, hæc subiungit.
- 15 „ Hæc & plura in eandem senten-
 „ tiam Diuus Basilus quæ eadem plane
 „ arbitror multo ante sensisse ac scripsisse
 „ se D. Areopagitam. Lux enim ea est,
 „ inquit, etsi cum forma certi corporis
 „ carebat, quam diuinus ille Moses,
 „ primos etiam illos tres dies nostros
 „ definisse ac distinxisse commemo-
 „ rat.
- 20 „ Vbi eum lucem dicit ἀσχηματιστον,
 „ formam utique pro subiecto posuit,
 „ quomodo enim forma dicatur infor-
 „ mis, aut materia immaterialis, probi-
 „ tas improba, aut ratio rationis ex-
 „ pers?
- 30 „ Ita ἀσχηματιστον idem pane est quod
 „ ἄνυλον, aut ἀνυπόστατον, materia vel su-
 „ biecto carens, si has ita placet vsur-
 „ pare voces: Cum enim eo loco de
 „ Sole ageret, significare voluit eam
 „ lucem nondum illi corpori ut pro-
 „ prio subiecto ac suo adhaesisse.
- 35 „ Nisi forte malis φῶς ἀσχηματιστον esse,
 „ μηδὲν σχηματιστον, nullum corpus, pro-
 „ prium scilicet ac perpetuum infor-
 „ mans.
- 40 „ Et in Scholijs, pag. 48. Verba D.
 „ Dionysij, si quis ea requirat, hæc
 „ sunt.
- 45 „ αὐτὸ γὰρ ἐστὶ τὸ φῶς, εἰ καὶ τότε ἀσχηματιστον
 „ ἦν, ὅπως ὁ θεὸς εἶπεν Μωσῆς, καὶ αὐτὸν ἐνάντη
 „ ὀρίσται τὴν πρῶτην, τῶν κατ' ἡμᾶς ἡμερῶν
 „ τριάδα.
- 50 „ Vult utique tunc lucem fuisse
 „ accidens separatum, quod non
 „ esset forma vllius corporis, itaque
 „ intellexit noster Lansselius, expli-
 „ cavitque in suis in Dionysium no-
 „ tis. Diffusa erat, inquit, lux nullum
 „ determinatum corpus, tanquam
 „ propriam materiam informans.
- 55 „ Itaque
- S. Maxi-
 „ mus Diony-
 „ sium contra
 „ D. Thomā
 „ intelligit &
 „ explicat.
- Ambigit de
 „ Rio a: Li
 „ tinorū expli-
 „ catione.

I

Itaque vertit, etiam si tum forma, certi corporis carebat: aut si maius, forma certi corporis non erat. Non enim forma propriè forma caret, cum sit ipsa forma, & formam det corpori non ab ipso sumit, ut forma, certi corporis carere dici debeat. Et fortasse B. Dionysius, vocem ἀσχηματιστον usurpauit defectu vocabuli, quod signaret subiecto carens.

Nam neque ἀύαν satis commode id significat, sed potius quod materia caret, sicut res spirituales, & ἀύαντος est quod non subsistit, non autem per se subsistens: ἀύανον μὲν quoque est quod non subijcitur, non autem subiecto carens. sed de his satis.

Explicatur
D. Diony-
sius ex sensu
Mathema-
ticorum.

Qui considerat, S. Dionysium insignem fuisse Mathematicum (Ideo enim Heliopolim profectus erat, ut hisce studiis excoleretur,) is ex ipso loquendi modo, aliud non eliciet, quam lucē illam caruisse figura certa, id quod interpret Græcus, S. Maximus clare indicat. Lux ergo illa aliud non fuit, quā ignis primigenius tumultuaria conglotatione circumuolutus primo Mundi triduo, & quia inter istam triduanam circumuectionem figuram assiduis flammarum conglomerationibus mutauit, vocauit ipsam S. Dionysius ἀσχηματιστον, vsitato Mathematicis loquendi more. Si quis tamen velit, fuisse lucem abstractam sine subiecto materiali, is nihilo minus in eandem, quam prædixi, figuræ Metamorphosin recidet: nam & accidentibus abstractis, & formis substantialibus separatis, figuræ nihilominus accidunt, neque enim, vel formæ substantiales præsertim materiales, vel accidentia abstracta, sua extensione & figura loco circumscriptiua carent, sicut patet in accidentibus Eucharisticis.

Ex loco D.
Dionysii
Quinta esse
tia nō recte
arguitur.

Porro quod idem S. Dionysius ait, cælestem essentiam, neque crescere, neque minui, ex eoque immutabilem esse, nullo modo sequitur S. Dionysium Quintam quorundam essentiam asseruisse, sed interpretibus citatis tantum ipsius perfectionem adstruxit, & similem statum, ex quo à Deo producta fuit. Alioqui necesse esset, omnes eos, qui Platonem, & antiquos sequuntur,

II.

aut cælestium, & sublunarium eandem materiam esse dicunt, naturaque omnia interitui subijciunt, necesse inquam esset, hos omnes, contra suam voluntatem & doctrinam Quintæ essentiæ assertores esse.

Ij enim vno ore, cum D. Dionysio hætenus asseuerauerunt cæli essentiam neque augeri, neque minui, sed in eodem statu immutabilem permanere: non obstante quod natura sua corruptibili existat. Nam & hoc ipsum ipsi quoque Astronomi asserunt, sed ad sensum. Quod si vel Aristoteles, vel Prisci Patres, vel recēiores denique Theologi, nouarum in cælo apparitionum, vel denique huius ipsius solaris Phænomeni cognitionem aliquam aut sensum tam euidentem atque nunc habemus, percepissent, quid de Quinta illa essentia, vel omnimoda immutabilitate asseruissent prudens iudicabit.

PRO NATURA SOLIS,
astrorum & caliginea, Auctoritates Doctorum recentium.

C A P. X I X.

Augustinus Steuchus in sua Cosmopæia.

Aug. Steuchus Eugubinus.

Prima igitur ex aqua genita res, lucida substantia fuit. Hanc fuisse Solem vna tantum deterret, plures autem aliæ inuitant, persuadentque nos asserere rationes. Deterret quod quarta die satum esse Solem, Lunam & stellas Theologus videtur dicere. Quod autem in contrarium, tantum non vociferatu magno nos attrahunt rationes, hæ cum primis sunt: quod solus Sol (dictus quia luceat solus) lucis corporeæ est genitor. Solus is ignis cælestis, vna terrestris mundi lucerna quam super candelabrum mundi, ut ab omnibus videretur, posuit Deus &c. Et post. Hunc primum ex aceruo debuit Auctor producere, cuius illuc incumbuisse prudentia cernitur, ut ante particulares effectus, vniuersales causas excogiraret. Sicut autem vnde cuncta depromeret, terram & aquas primas iecit: sic quo aërem, anima-

I

- „ conficiens. Hoc accidens sine subie-
 „ cto fuisse volunt duo velut fratres a-
 „ mici, Patres grauiſſimi, Baſilius Ma-
 „ gnus, Hom. 6. in Hexaem. & Grego-
 „ rius Nazianz. Oratione in nouam
 „ Dominicam; qui quod videtur cor-
 „ poreum negare, non de eſſentia eius
 „ loquitur, quaſi fuerit ſpirituale quid,
 „ ſed ſubiecto negat vlli inhaeſiſſe, aut
 „ vlli ſubſtantiae velut vaſculo inclu-
 „ ſum, vt Niceras expoſuit, idem te-
 „ nuere alij Patres Graeci, Theodoret.
 „ q. 14. & 16. Athanaſ. q. 74. Anaſta-
 „ ſius Antioch. in Hexaem. l. 4. Pro-
 „ cop. hic, & Damasc. l. 2. de fide or-
 „ thodoxa cap. 7. Didym. & Appollin.
 „ in Cathena. hi omnes volunt hanc
 „ lucem quarto die inditam luminari-
 „ bus caeli: quod, ſi hanc tuearis, pla-
 „ ne dicendum; vel potius quarto die,
 „ vt non amplius neceſſariam, euaniſ-
 „ ſe, quod de mera qualitate, dici mi-
 „ nime abſurdum. Tuentur hanc ſen-
 „ tentiam eruditè Paullus de ſanta
 „ Maria, vulgo Burgenſis vocatus hic
 „ & Ludouicus Molina, de Opere ſex
 „ dierum, diſp. 7. com. in 1. par. Diui
 „ Thomae. Et crediderim hanc lucem
 „ nobis, in columnam fortaſſis confor-
 „ matae, forma praeluxiſſe. Solemne
 „ enim Deo docent Sacrae littere, quo-
 „ tieſcunque luce aliqua ordinaria
 „ praeſentam Solis & ſyderum vt vo-
 „ luit, nube lucida vt: ſicuti cum de-
 „ duxit Filios Iſraël ad terram pro-
 „ miſſionis. Exodi 14. 19. Deut. 1.
 „ 33. &c. Iſaia 4. 5. &c. Ezech. 1. 4.
 „ &c.
 „ Altera opinio eſt Diui Thomae, &
 „ communior in Scholis, hanc lucem
 „ fuiſſe ipſum Solem adhuc informem,
 „ & imperfectum: qua probant Diui
 „ Dionyſij Areopagitae auctoritate, l.
 „ de diuin. nominibus, cap. 4. *Vbita-*
 „ *men Diuus Maximus in Scholijs i-*
 „ *ſtud primo formatum die lumen vult*
 „ *ex mente Dionyſij quarto die in Solem*
 „ *transformatum, naī ēti τὸ πρῶτον τῶν*
 „ *φῶς τῆ τετάρτῃ ἡμέρᾳ μετασχηματισθὲν εἰς ἡ-*
 „ *λιον, & cenſet à Diuo Baſilio hoc di-*
 „ *lucidius explicatum, non tam de*
 „ *ipſo Sole, quam de huius luminis pri-*
 „ *mo formati in Solem conformatione,*
 „ *vt ſim ambiguus, vtrum Sanctus*
 „ *Dionyſius id ſenſerit, quod ſenſiſſe*
 „ *Scholastici Latini eum opinantur: au-*
 „ *vero tantum, hoc lumen id ipſum eſſe,*
 „ *quo poſtea Sol illuxit, quemadmodum*
 „ *S. Nazianzenus & ceteri illi Patres*
 „ *cenſuerunt, à voce etiam luminaris*
 „ *argumentum ducentes, quod eandem vo-*
 „ *cant.*
 „ Salianus in ſuis annalibus tomo 1.
 „ de die primo in Geſen, pag. 45. etiam
 „ in hanc concedit ſententiam, Diuum
 „ Dionyſium lucem primo die creatam,
 „ agnouiſſe abſtractam; poſtquam enim
 „ hanc Diui Baſilij ſententiam in medium
 „ adduxiſſet, hæc ſubiungit.
 „ Hæc & plura in eandem ſenten-
 „ tiam Diuus Baſilius quæ eadem plane
 „ arbitror multo ante ſenſiſſe ac ſcripſiſ-
 „ ſe D. Areopagitam. Lux enim ea eſt,
 „ inquit, etſi cum forma certi corporis
 „ carebat, quam diuinus ille Moſes,
 „ primos etiam illos tres dies noſtros
 „ definiſſe ac diſtinxiſſe commemo-
 „ rat.
 „ Vbi eum lucem dicit ἀσχηματίστον,
 „ formam vtique pro ſubiecto poſuit,
 „ quomodo enim forma dicatur infor-
 „ mis, aut materia immaterialis, probi-
 „ tas improba, aut ratio rationis ex-
 „ perſe.
 „ Ita ἀσχηματίστον idem pane eſt quod
 „ αὐλον, aut ἀνυπόστατον, materia vel ſu-
 „ biecto carens, ſi haſita placet vſur-
 „ pare voces: Cum enim eo loco de
 „ Sole ageret, ſignificare voluit eam
 „ lucem nondum illi corpori vt pro-
 „ prio ſubiecto ac ſuo adhaſiſſe.
 „ Niſi forte malis φῶς ἀσχηματίστον eſſe,
 „ μηδὲν σχηματίστον, nullum corpus, pro-
 „ prium ſcilicet ac perpetuum infor-
 „ matus.
 „ Et in Scholijs, pag. 48. Verba D.
 „ Dionyſij, ſi quis ea requirat, hæc
 „ ſunt.
 „ αὐτὸ γὰρ ἐστὶ τὸ φῶς, εἰ καὶ τότε ἀσχηματίστον
 „ ἦν, ὅπερ ὁ θεὸς εἶπεν Μωϋσῆϊ, καὶ αὐτὸν ἐνέειπεν
 „ ὁρίσται τὴν πρῶτην, τῶν καὶ ἡμῶς ἡμερῶν
 „ τριῶν.
 „ Vult vtique tunc lucem fuiſſe
 „ accidens ſeparatum, quod non
 „ eſſet forma vllius corporis, itaque
 „ intellexit noſter Lanſſelius, expli-
 „ cavitque in ſuis in Dionyſium ro-
 „ tis. Diffuſa erat, inquit, lux nullum
 „ determinatum corpus, tanquam
 „ propriam materiam informans.
 „ Itaque
 „ S. Maxi-
 „ mus Diony-
 „ ſium contra
 „ D. Thomā
 „ intelligit &
 „ explicat.
 „ Ambigit del
 „ Rio a: Li
 „ tinorū expli
 „ catione.

I

Itaque vertit, etiamsi tum forma
certi corporis carebat: aut si maius,
forma certi corporis non erat. Non
enim forma propriè forma caret,
cum sit ipsa forma, & formam det
corpori non ab ipso sumit, ut forma
certi corporis carere dici debeat. Et
fortasse B. Dionys. vocem ἀσχημάτιστον
vsurpauit defectu vocabuli, quod
signaret subiecto carens.

Nam neque ἄλογον satis commo-
dè id significat, sed potius quod
materia caret, sicut res spirituales, &
ἀνυπόστατον est quod non subsistit, non
autem per se subsistens: ἀνυποκείμενον
quoque est quod non subiicitur,
non autem subiecto carens. sed de
his satis.

Explicatur
D. Diony-
sius ex sensu
Mathema-
ticorum.

Qui considerat, S. Dionysium insi-
gnem fuisse Mathematicum (Ideo e-
nim Heliopolim profectus erat, ut hisce
studijs excoleretur,) is ex ipso loquen-
di modo, aliud non eliciet, quam lucē
illam caruisse figura certa, id quod in-
terpres Græcus, S. Maximus clare in-
dicat. Lux ergo illa aliud non fuit, quā
ignis primigenius tumultuaria conglo-
batione circumuolutus primo Mundi
triduo, & quia inter istam triduanam
circumuectionem figuram assiduis flā-
marum conglomerationibus mutauit,
vocauit ipsam S. Dionysius ἀσχημάτιστον,
vsitato Mathematicis loquendi more.
Si quis tamen velit, fuisse lucem abstra-
ctam sine subiecto materiali, is nihilo-
minus in eandem, quam prædixi, figu-
ræ Metamorphosin recidet: nam &
accidentibus abstractis, & formis sub-
stantialibus separatis, figuræ nihilomi-
nus accidunt, neque enim, vel formæ
substantiales præsertim materiales, vel
accidentia abstracta, sua extensione
& figura loco circumscriptiua carent,
sicut patet in accidentibus Euchari-
sticis.

Porro quod idem S. Dionysius ait,
cælestem essentiam, neque crescere,
neque minui, ex eoque immutabilem
esse, nullo modo sequitur S. Dionysium
Quintam quorundam essentiam asser-
uisse, sed interpretibus citatis tantum
ipsius perfectionem adstruxit, & simi-
lem statum, ex quo à Deo producta
fuit. Alioqui necesse esset, omnes eos,
qui Platonem, & antiquos sequuntur, 55

II.

aut cælestium, & sublunarium eandem
materiam esse dicunt, naturaque om-
nia interitui subiiciunt, necesse inquam
esset, hos omnes, contra suam volun-
tatem & doctrinam Quintæ essentia
assertores esse.

Ij enim vno ore, cum D. Dionysio
hactenus asseuerauerunt cæli essentiam
neque augeri, neque minui, sed in eo-
dem statu immutabilem permanere:
non obstante quod natura sua corrup-
tibili existat. Nam & hoc ipsum ipsi
quoque Astronomi asserunt, sed ad sen-
sum. Quod si vel Aristoteles, vel Pri-
sci Patres, vel recēiores denique Theo-
logi, nouarum in cælo apparitionum,
vel denique huius ipsius solaris Phæ-
nomeni cognitionem aliquam aut sen-
sum tam euidentem atque nunc habe-
mus, percepissent, quid de Quinta
illa essentia, vel omnimoda immutabi-
litate asseruissent prudens iudicabit.

PRO NATURA SOLIS,
astrorum & caliginea, Aucto-
ritates Doctorum re-
centium.

C A P. X I X.

A Vgustinus Steuchus in sua
Cosmopæia.

Aug. Steu-
chus Eugu-
binus.

Prima igitur ex aqua ge-
nita res, lucida substantia fuit. Hanc
fuisse Solem vna tantum deterret,
plures autem aliæ inuitant, persua-
dentque nos asserere rationes. Deter-
ret quod quarta die satum esse So-
lem, Lunam & stellas Theologus
videretur dicere. Quod autem in con-
trarium, tantum non vociferatu ma-
gno nos attrahunt rationes, hæ cum
primis sunt: quod solus Sol (dictus
quia luceat solus) lucis corporeæ est
genitor. Solus is ignis cælestis, vna
terrestris mundi lucerna quam super
candelabrum mundi, ut ab omnibus
videretur, posuit Deus &c. Et post.
Hunc primum ex aceruo debuit
Auctor producere, cuius illuc in-
cumbuisse prudentia cernitur, ut an-
te particulares effectus, vniuersales
causas excogiraret. Sicut autem
vnde cuncta depromeret, terram &
acguas primas iecit: sic quo aërem,
anima-

Ex loco D.
Dionysii
Quinta esse
tia nō recte
arguitur.

- I
- „ conficiens. Hoc accidens sine subie-
 „ cto fuisse volunt duo velut fratres a-
 „ mici, Patres gravissimi, Basilii Ma-
 „ gnus, Hom. 6. in Hexaem. & Grego-
 „ rius Nazianz. Oratione in novam
 „ Dominicam; qui quod videtur cor-
 „ poreum negare, non de essentia eius
 „ loquitur, quasi fuerit spirituale quid,
 „ sed subiecto negat vlli inhaerisse, aut
 „ vlli substantiae velut vasculo inclu-
 „ sum, ut Nicetas exposuit, idem te-
 „ nuere alij Patres Graeci, Theodoret.
 „ q. 14. & 16. Athanas. q. 74. Anasta-
 „ sius Antioch. in Hexaem. l. 4. Pro-
 „ cop. hic, & Damasc. l. 2. de fide or-
 „ thodoxa cap. 7. Didym. & Appollin.
 „ in Cathena. hi omnes volunt hanc
 „ lucem quarto die inditam luminari-
 „ bus caeli: quod, si hanc tuearis, pla-
 „ ne dicendum; vel potius quarto die,
 „ ut non amplius necessariam, evanuis-
 „ se, quod de mera qualitate, dici mi-
 „ nime absurdum. Tuentur hanc sen-
 „ tentiam eruditè Paullus de sancta
 „ Maria, vulgo Burgensis vocatus hic
 „ & Ludouicus Molina, de Opere sex
 „ dierum, disp. 7. comm. in 1. par. Diui
 „ Thomae. Et crediderim hanc lucem
 „ nobis, in columnam fortassis confor-
 „ matae, forma praeluxisse. Solemne
 „ enim Deo docent Sacrae litterae, quo-
 „ tiescunque luce aliqua ordinaria
 „ praeteritam Solis & syderum uti vo-
 „ luit, nube lucida uti; sicuti cum de-
 „ duxit Filios Israël ad terram pro-
 „ missionis. Exodi 14. 19. Deut. 1.
 „ 33. &c. Isaia 4. 5. &c. Ezech. 1. 4.
 „ &c.
- „ Altera opinio est Diui Thomae, &
 „ communior in Scholis, hanc lucem
 „ fuisse ipsum Solem adhuc informem,
 „ & imperfectum; quā probant Diui
 „ Dionysij Areopagitae auctoritate, l.
 „ de diuin. nominibus, cap. 4. Vbita-
 „ men Diuus Maximus in Scholijs i-
 „ stud primo formatum die lumen vult
 „ ex mente Dionysij quarto die in Solem
 „ transformatum, καὶ ἐστὶ τὸ πρῶτον τῆς
 „ φῶς τῆς τετάρτης ἡμέρας μετασχηματισθῆναι εἰς ἡ-
 „ λιον, & censet à Diuo Basilio hoc di-
 „ lucidius explicatum, non tam de
 „ ipso Sole, quam de huius luminis pri-
 „ mo formati in Solem conformatione,
 „ ut sit ambiguus, utrum Sanctus
 „ Dionysius id senserit, quod sensisse
- 1 „ Scholastici Latini cum opinantur: an
 „ vero tantum, hoc lumen ipsum esse,
 „ quo postea Sol illuxit, quemadmodum
 „ S. Nazianzenus & ceteri illi Patres
 „ censuerunt, à voce etiam luminaris
 „ argumentum ducentes, quod φῶς ἔστιν ὁ
 „ λόγος.
- 10 „ Salianus in suis annalibus tomo 1.
 „ de die primo in Genesin, pag. 45. etiam
 „ in hanc concedit sententiam, Diuum
 „ Dionysium lucem primo die creatam,
 „ agnouisse abstractam; postquam enim
 „ hanc Diui Basilij sententiam in medium
 „ adduxisset, haec subiungit.
- 15 „ Haec & plura in eadem senten-
 „ tiam Diuus Basilii quae eadem plane
 „ arbitror multo ante sensisse ac scripsisse
 „ se D. Areopagitam. Lux enim ea est,
 „ inquit, etli cum forma certi corporis
 „ carebat, quam diuinus ille Moses,
 „ primos etiam illos tres dies nostros
 „ defuisse ac distinxisse commemo-
 „ rat.
- 20 „ Vbi eum lucem dicit ἀσχημάτιστον,
 „ formam utique pro subiecto posuit,
 „ quomodo enim forma dicatur infor-
 „ mis, aut materia immaterialis, probi-
 „ tas improba, aut ratio rationis ex-
 „ pers?
- 30 „ Ita ἀσχημάτιστον idem pāne est quod
 „ ἄνυλον, aut ἀνυπόστατον, materia vel su-
 „ biecto carens, si has ita placet vsur-
 „ pare voces: Cum enim eo loco de
 „ Sole ageret, significare voluit eam
 „ lucem nondum illi corpori ut pro-
 „ prio subiecto ac suo adhaesisse.
- 35 „ Nisi forte malis φῶς ἀσχημάτιστον esse,
 „ μηδὲν σχηματίζον, nullum corpus, pro-
 „ prium scilicet ac perpetuum infor-
 „ mans.
- 40 „ Et in Scholijs, pag. 48. Verba D.
 „ Dionysij, si quis ea requirat, haec
 „ sunt.
 „ αὐτὸ γὰρ ἐστὶ τὸ φῶς, εἰ καὶ τότε ἀσχημάτιστον
 „ ἦν, ὅπερ ὁ θεὸς ἔφη Μωσῆϊ, καὶ αὐτὸν ἐνέαν
 „ ὀρίσται τὴν πρῶτην, τῶν καὶ ἡμῶς ἡμερῶν
 „ τριῶν.
- 50 „ Vult utique tunc lucem fuisse
 „ accidens separatum, quod non
 „ esset forma vllius corporis, itaque
 „ intellexit noster Lantseolius, expli-
 „ cavitque in suis in Dionysium no-
 „ tis. Diffusa erat, inquit, lux nullum
 „ determinatum corpus, tanquam
 „ propriam materiam informans.
- 55 „ Itaque
- S. Maxi-
 „ mus Diony-
 „ sius contra
 „ D. Thomā
 „ intelligit &
 „ explicat.
- Ambigit del
 „ Rio a: L.
 „ tinorū expli-
 „ catione.

I

„ Itaque vertit, etiam si tum forma,
„ certi corporis carebat: aut si maius,
„ forma certi corporis non erat. Non
„ enim forma propriè forma caret,
„ cum sit ipsa forma, & formam det
„ corpori non ab ipso sumit, ut forma
„ certi corporis carere dici debeat. Et
„ fortasse B. Dionysius vocem ἀσχημάτιστον
„ usurpauit defectu vocabuli, quod
„ signaret subiecto carens.

„ Nam neque ἀύλον satis commo-
„ dè id significat, sed potius quod
„ materia caret, sicut res spirituales, &
„ ἀύλον σατον est quod non subsistit, non
„ autem per se subsistens: ἀύλον αἰμένον
„ quoque est quod non subijcitur,
„ non autem subiecto carens. sed de
„ his satis.

Explicatur
D. Diony-
sius ex sensu
Mathema-
ticorum.

Qui considerat, S. Dionysium insi-
gnem fuisse Mathematicum (Ideo e-
nim Heliopolim profectus erat, ut hisce
studijs excoleretur,) is ex ipso loquen-
di modo, aliud non eliciet, quam lucē
illam caruisse figura certa, id quod in-
terpres Græcus, S. Maximus clare in-
dicat. Lux ergo illa aliud non fuit, quā
ignis primigenius tumultuaria conglo-
batione circumuolutus primo Mundi
triduo, & quia inter istam triduanam
circumuectionem figuram assiduis flā-
marum conglomerationibus mutauit,
vocauit ipsam S. Dionysius ἀσχημάτιστον,
usitato Mathematicis loquendi more.
Si quis tamen velit, fuisse lucem abstra-
ctam sine subiecto materiali, is nihilo-
minus in eandem, quam prædixi, figu-
ræ Metamorphosim recidet: nam &
accidentibus abstractis, & formis sub-
stantialibus separatis, figuræ nihilomi-
nus accidunt, neque enim, vel formæ
substantiales præsertim materiales, vel
accidentia abstracta, sua extensione
& figura loco circumscriptiua carent,
sicut patet in accidentibus Euchari-
sticis.

Porro quod idem S. Dionysius ait,
cælestem essentiam, neque crescere,
neque minui, ex eoque immutabilem
esse, nullo modo sequitur S. Dionysium
Quintam quorundam essentiam asser-
uisse, sed interpretibus citatis tantum
ipsius perfectionem adstruxit, & simi-
lem statum, ex quo à Deo producta
fuit. Alioqui necesse esset, omnes eos,
qui Platonem, & antiquos sequuntur,

II.

aut cælestium, & sublunarium eandem
materiam esse dicunt, naturaque om-
nia interitui subijciunt, necesse inquam
esset, hos omnes, contra suam volun-
tatem & doctrinam Quintæ essentiae
assertores esse.

Ij enim vno ore, cum D. Dionysio
hactenus asseuerauerunt cæli essentiam
neque augeri, neque minui, sed in eo-
dem statu immutabilem permanere:
non obstante quod natura sua corrup-
tibili existat. Nam & hoc ipsum ipsi
quoque Astronomi asserunt, sed ad sen-
sum. Quod si vel Aristoteles, vel Pri-
sci Patres, vel recēiores denique Theo-
logi, nouarum in cælo apparitionum,
vel denique huius ipsius solaris Phæ-
nomeni cognitionem aliquam aut sen-
sum tam euidentem atque nunc habe-
mus, percepissent, quid de Quinta
illa essentia, vel omnimoda immutabi-
litate asseruissent prudens iudicabit.

P R O N A T V R A S O L I S,
astrorum & caliginea, Aucto-
ritates Doctorum re-
centium.

C A P. X I X.

A Vgustinus Steuchus in sua
Cosmopæia.

Aug. Steu-
chus Eugu-
binus.

„ Prima igitur ex aqua ge-
„ nita res, lucida substantia fuit. Hanc
„ fuisse Solem vna tantum deterret,
„ plures autem aliæ inuitant, persua-
„ dentque nos asserere rationes. Deter-
„ ret quod quarta die fatum esse So-
„ lem, Lunam & stellas Theologus
„ videtur dicere. Quod autem in con-
„ trarium, tantum non vociferatu ma-
„ gno nos attrahunt rationes, hæ cum
„ primis sunt: quod solus Sol (dictus
„ quia luceat solus) lucis corporeæ est
„ genitor. Solus is ignis celestis, vna
„ terrestris mundi lucerna quam super
„ candelabrum mundi, ut ab omnibus
„ videretur, posuit Deus &c. Et post.
„ Hunc primum ex aceruo debuit
„ Auctor producere, cuius illuc in-
„ cumbuisse prudentia cernitur, ut an-
„ te particulares effectus, vniuersales
„ causas excogiraret. Sicut autem
„ vnde cuncta depromeret, terram &
„ aquas primas iecit: sic quo aërem,
„ anima-

Ex loco D.
Dionysii
Quinta esse
tia nō rectè
arguitur.

I.

animalia, plantas conderet, Solem
istarum rerum præmisit Genitorem.
Deus Sol & homo ginunt hominem.
Et post. Iam in Theologia Mosis, i-
dem est nomen effectusque Solis at-
que lucis: etenim cum de Sole scri-
bit idem, ut luceat super terram,
eandem usurpat vocem, atque cum
prodit primo lucem fuisse. Illic, *fuit*
Or, id est Lux; hic *Lebatr*, ad lucen-
dum, vel ut luceant. Et post; Deinde
idem esse & apud Moysen & apud
cæteras Gentes, lucem atque Solem,
satis superque docet loquendi con-
suetudo. Latini lucem vocant diem,
ut ab eodem lucem atque diem effi-
ci monstrent. Moses autem, quod
maximo est argumento illam primo-
genitam lucem fuisse Solem, idem
munus huic primogenitæ rei attri-
buit, atq. ei quæ die quarta est crea-
ta. Virique datur munus fuganda-
rum tenebrarum, utrumque ad ef-
ficiendum diem creatur; utroq. dies
à nocte separatur.

*Solex Scri-
ptura idem
quod Lux.*

Et post. Quid quod alijs Scrip-
tura locis Sol vocatur lux? ut Hie-
rem. cap. 4. Aspexit cælos, & non
erat lux in eis. Et post. Eo etiam
probatur lucem corpoream, id est
Solem, intelligendam hic primo die
creatam, quod omnes Prophetæ, qui
locuti sunt de creatione aut res crea-
tas nominarunt, Solem pro luce ex-
presserunt. Plal. 148. commemora-
tis Angelis, ait; Laudate eum Sol,
& Luna. Tandem sic concludit.
Cum autem lux ista nostra manet
ab igne, à nubibus collisis, à syde-
ribus, à Luna præcipua tamen visi-
bilis est Sol *ἡ ἡμετέρα*.

Ex his satis manifestum est, Solem
huic Auctori natura igneum cense-
re. Id quod alibi quoque frequenter & longe
clarius inculcat.

*Alia argu-
menta ab
Ethymolo-
gia, &c.*

Nam libro septimo, de perenni
philosophia, cap. 4. Maiores item,
inquit, indiderunt Cælo nomen æ-
ther non ab æterno cursu, licet &
id Plato asserat in Cratylo, sed à ni-
tore, ardore, lumine. Cuius substan-
tia luminosa puraque est, & nitens
inardescit, vitalemque terris infun-
dit calorem, omne nomine Aetheris
designatum. Hinc vnus è septem

erronibus, Mars ardens dicitur ab
eis Aethon, & Solis equi cum sint
quattuor, inditum est, vno excepto,
cæteris nomen ab ardore, Pyrois,
Phlegon, id est, igneus, & ardens:
ratioque nominis quod ardeat, desi-
gnat eum esse cælestem ignem, ex ele-
mentorum puritate generatum.

Tradit enim, vetustissimus
Trismegistus, quod apud alios quo-
que maiores videas, & in quo Plu-
tarchus multos Græciæ philosophos
consentire scribit ex limpidissima,
purissimaque aquæ substantia fa-
ctum æther, & Solis orbem, sicut
fiunt purissimæ nubes, facesque, &
flammæ sublimes, & nubes aquosæ,
collisæ flammataque longum æris
tractum illuminant. Hæc illi dixere,
ut ostendam, estque vehementer ra-
tioni consentaneum, cum videamus
eiusdem vis & substantiæ multa lu-
minosa ex aqua, quæ variatur incre-
dibiliter in pulcherrimas quasque,
admirandasque species fieri, ut au-
rum, crystallus, ær nubes, ignes, co-
lorum varietates, nubes luminosæ,
vel in media nocte. Sic potuit à sa-
pientissimo Opifice liquidissima Aë-
ris substantia ex aquis secerni ac se-
ligi.

Plutarchus igitur Auctor est, Philosophi
Empedoclem ex aëre ab igne instar apud Plu-
tarchum
Crystallo densato, in quo igneum,
& ætherum insit, cælum credidisse.
Aristotelem ex quinto corpore, vel
ex calida & frigida contemperatio-
ne. Anaximandrum plenum ignis
esse Solem: Xenophanem ex ignicu-
lis collectis: Stoicos, accensionem
intelligentem ex mari: Platonem
ex igne plurimo: Anaxagoram,
petram igneam: Philolaum, vitreum
ex igne mundano sumentem. Qui-
bus apparet, veteres Aethera non
à cursu perenni, sed ab ardore, &
igne nuncupasse.

Idem in Cosmopria. Atque
illud est verissimum, & a Theolo-
gis quoque vetustissimis assertum,
eadem ratione fuisse ex aquis edu-
ctam ætheriam substantiam, atque
ipsum cælum, expirationesque cælestes.
Videmus enim aquam in aërem, in
nubes, in faces, vapores, igneos mu-
tari.

I.

I I.

*Sol igneus
quomodo sit
aëris?*

„tari. Itaque eodem illo tempore id
„factum existimandum est, cum sa-
„pientia ingeniumque Dei ferebatur su-
„per aquas, & ex his puriores substan-
„tias educebat: Solem primum, cuius
„operosa magnitudo, & pulchritudo
„vincit omnia, caelestia, & terrestria.
„Agitans igitur & concutiens creatas
„ab se aquas secevit, & accendit ignē,
„purissimaeque lumina, defacatasque
„materias veluti speculorum, & nu-
„bium, ut eadem & lumine sint, &
„leuissimae; quales nitidissima nubes,
„qua quo puriores sunt, hoc altiores se-
„des appetunt, ipsaeque ignis, id est flam-
„ma non est aliud, quam accensus aër.

*Ascanius
Martinēg.*

Ascanius Martinengus in tom. primo
in Genesin super illa verba: Fiant lumi-
naria magna; pag. 875. ita philosopha-
tur inter multa. Compellit me for-
tius experimentum quotidianum,
quo astra ac Solem praecipue, illumi-
nare, calefacere & exurere iugiter ex-
perimur. Nec ea Peripateticorum
distinctio de duplici calido allata, qua
non formaliter, sed virtualiter seu
effectiue Solem nos calefacere aiunt,
multum consistere, sed nutare mihi
videtur.

„Non enim nobis alia restat via,
„qua quoduis corpus calidum esse
„proprie, & formaliter ut aiunt, ex-
„plorare possimus, quam eius effectus
„iudicio sensus perceptus. Cum igitur
„non tantum aërem, & alia corpora,
„sed nos ipsos radius Solis calefcere sen-
„tiamus, quid est quod de Solis flagran-
„tia & ardore ambigamus? Quod si de
„Sole iudicium sensuum non sufficit,
„proinde nec de igne illud ipsum suffi-
„cere perhibemus. Cumque non ali-
„ter à Sole quam ab igne nos calefcere
„experiamur, ignem etiam non cali-
„dum formaliter, sed tantum effectiue
„asseuerabimus, cum eadem sit ratio. &c.

*Iacobus Sa-
lianus.*

P. Iacobus Saliarius, uti c. 17. vidimus
postquam numerosum Sanctorum Pa-
trum Catalogum in hanc sententiam
recensuit, in gratiam venerandae anti-
quitatis, ait, probabile, sydera ex ignis
substantia Dei artificio esse genita.

PRO NATURA SOLIS, ASTRO-
rum & caeli ignea, pugnant rationes,
ob quas sancti Patres, aquas veras ele-
mentares auctoritate sacra Scripturae
commoti, supra Firmamentum esse
contestati sunt.

C A P. X X.

A Quas veras naturales adeoque
elementares à Deo ter opti-
mo Maximo supra Firma-
mentum euectas esse, ita clarum esse
dicunt è Scriptura sacra, ut etiam ex ijs,
qui Quintam Aristotelis essentiam pro
aris focusque tuentur non pauci, vna-
nimi Patrum consensui, quem postea
afferam, resistere non audent; & certe
inter doctos passim viget ista opinio;
quanquam vijs diuersis.

Neque enim omnes easdem causas
assignant, neque similes inde deriuant
effectus; sunt qui factum diuinum a-
gnoscant, rationem facti se nescire fa-
teantur.

Ego auctores cum suis rationibus af-
feram, non ut illas probem, vel impro-
bem, sed ut inde euidenter ostendam,
vel Solem secundum illos natura igneum,
vel rationes ab antiquis illis Patribus,
& Sanctis auctoribus gratis allatas esse,
si caelum Solemve igneum non agno-
uerunt.

Ex Martinengo, Parte 1. pag. 637. &
sequentibus.

„Hilarius enarrat. in Psalm. 137. S. Hilarius
„Aquis etenim eleuatis illam ipsam
„primi caeli naturam temperauit,
„quæ superni Dei accensa virtute
„nequaquam esset ab inferioribus pa-
„tencia naturis. Caelum vero infe-
„rius non vniforme, sed multiplex
„tetendit, quod totum Firmamen-
„tum nuncupans, valida ad sustenta-
„tionem aquarum superiorum, tem-
„perationemque aëris nostri, firmita-
„te solidauit.

Basiliius Hexaem. hom. 3. De im-
mensa aquarum copia, prolixam ha-
bet disputationem, ad exstuantis i-
gnis vim reprimendam, tam supra,
quam infra Firmamentum necessaria,
& reiectis Origenis Apollinarijque
sententijs, hæc subdit.

S. Basiliius.

Aquam

I.

animalia, plantas conderet, Solem
istarum rerum praeiussit Genitorem.
Deus Sol & homo ginunt hominem.
Et post. Iam in Theologia Mosis, i-
dem est nomen effectusque Solis at-
que lucis: etenim cum de Sole scri-
bit idem, ut luceat super terram,
eandem usurpat vocem, atque cum
prodit primo lucem fuisse. Illic, *fiat*
Or, id est Lux; hic *Lebair*, ad lucen-
dum, vel ut luceant. Et post; Deinde
idem esse & apud Moysen & apud
ceteras Gentes, lucem atque Solem,
satis superque docet loquendi con-
suetudo. Latini lucem vocant diem,
ut ab eodem lucem atque diem effi-
ci monstrent. Moses autem, quod
maximo est argumento illam primo-
genitam lucem fuisse Solem, idem
munus huic primogenitae rei attri-
buit, atque ei quae die quarta est crea-
ta. Virique datur munus fuganda-
rum tenebrarum, utrumque ad ef-
ficiendum diem creatur; utroque dies
à nocte separatur.

*Solex Scri-
ptura idem
quod Lux.*

Et post. Quid quod alijs Scrip-
turae locis Sol vocatur lux? ut Hie-
rem. cap. 4. Aspexit caelos, & non
erat lux in eis. Et post. Eo etiam
probatur lucem corpoream, id est
Solem, intelligendam hic primo die
creatam, quod omnes Prophetae, qui
locuti sunt de creatione aut res crea-
tas nominarunt, Solem pro luce ex-
presserunt. Plal. 148. commemoran-
tis Angelis, ait; Laudate eum Sol,
& Luna. Tandem sic concludit.
Cum autem lux ista nostra manet
ab igne, à nubibus collisis, à syde-
ribus, à Luna *praecipua tamen visi-*
bilitas est Sol *ἡ ἡμετέρα*.

Ex his satis manifestum est, Solem
huic Auctori natura igneum centeri. Id
quod alibi quoque frequenter & longe
clarius inculcat.

*Alia argu-
menta ab
Ethymolo-
gia, &c.*

Nam libro septimo, de perenni
philosophia, cap. 4. Maiores item,
inquit, indiderunt Caelo nomen æ-
ther non ab æterno cursu, licet &
id Plato asserat in Cratylo, *ἵδ' ἀνι-*
τὸν, ardore, lumine. Cuius substan-
tia luminosa puraque est, & nitens
inardescit, vitalemque terris infun-
dit calorem, omne nomine Aetheris
designatum. Hinc unus è septem

erronibus, Mars ardens dicitur ab
eis Aethon, & Solis equi cum sint
quattuor, inditum est, vno excepto,
ceteris nomen ab ardore, Pyrois,
Phlegon, id est, igneus, & ardens:
ratioque nominis quod ardeat, desi-
gnat eum esse caelestem ignem, ex ele-
mentorum puritate generatum.

Tradit enim, verustissimus
Trismegistus, quod apud alios quo-
que maiores videas, & in quo Plu-
tarchus multos Graeciae philosophos
consentire scribit ex limpidissima,
purissimaque aquae substantia fa-
ctum æther, & Solis orbem, sicut
fiunt purissimae nubes, facesque, &
flammae sublimes, & nubes aquosae,
collisae flammataeque longum aëris
tractum illuminant. Hæc illi dixere,
ut ostendam, estque vehementer ra-
tioni consentaneum, cum videamus
eiusdem vis & substantiae multa lu-
minosa ex aqua, quae variatur incre-
dibiliter in pulcherrimas quasque,
admirandasque species fieri, ut au-
rum, crystallus, aër nubes, ignes, co-
lorum varietates, nubes luminosae,
vel in media nocte. Sic potuit à sa-
pientissimo Opifice liquidissima Aë-
ris substantia ex aquis secerni ac se-
ligi.

Plutarchus igitur Auctor est, Philosophi
Empedoclem ex aëre ab igne instar
crystallo densato, in quo igneum,
& aëreum misce, caelum credidisse.
Aristotelem ex quinto corpore, vel
ex calida & frigida temperatio-
ne. Anaximandrum plenum ignis
esse Solem: Xenophanem ex ignicu-
lis collectis: Stoicos, accensionem
intelligentem ex mari: Platonem
ex igne plurimo: Anaxagoram,
petram igneam: Philolaum, vitreum
ex igne mundano sumentem. Qui-
bus apparet, veteres Aethera non
à cursu perenni, sed ab ardore, &
igne nuncupasse.

Idem in Cosmopæia. Atque
illud est verissimum, & a Theolo-
gis quoque verustissimis assertum,
eadem ratione fuisse ex aquis edu-
ctam ætheriam substantiam, atque
ipsam caelum, expirationesque caelestes.
Videmus enim aquam in aërem, in
nubes, in faces, vapores, igneos mu-
tari.

I.

I I.

*Sol igneus
quomodo sit
aëris?*

„tari. Itaque eodem illo tempore id
„factum existimandum est, cum sa-
„pientia ingeniumque Dei ferebatur su-
„per aquas, & ex his puriores substan-
„tias educebat: Solem primum, cuius
„operosa magnitudo, & pulchritudo
„vincit omnia, caelestia, & terrestria.
„Agitans igitur & concutiens creatas
„ab se aquas ferevit, & accendit ignē,
„purissimaeque lumina, defecatasque
„materias veluti speculorum, & nu-
„bium, ut eadem & luminosa sint, &
„leuissima; quales nitidissima nubes,
„quae quo puriores sunt, hoc altiores se-
„des appetunt, ipseque ignis, id est flam-
„ma non est aliud, quam accensus aër.

*Afcanius
Martinēg.*

Afcanius Martinengus in tom. primo
in Genesin super illa verba: Fiant lumi-
naria magna; pag. 875. ita philosopha-
tur inter multa. Compellit me for-
tius experimentum quotidianum,
quo astra ac Solem praecipue, illumi-
nare, calefacere & exurere iugiter ex-
perimur. Nec ea Peripateticorum
distinctio de duplici calido allata, qua
non formaliter, sed virtualiter seu
effectiue Solem nos calefacere aiunt,
multum consistere, sed nutare mihi
videtur.

„Non enim nobis alia restat via,
„qua quoduis corpus calidum esse
„proprie, & formaliter ut aiunt, ex-
„plorare possimus, quam eius effectus
„iudicio sensus perceptus. Cum igitur
„non tantum aërem, & alia corpora,
„sed nos ipsos radius Solis calefcere sen-
„tiamus, quid est quod de Solis flagran-
„tia & ardore ambigamus? Quod si de
„Sole iudicium sensuum non sufficit,
„proinde nec de igne illud ipsum suffi-
„cere perhibemus. Cumque non ali-
„ter a Sole quam ab igne nos calefieri
„experiamur, ignem etiam non cali-
„dum formaliter, sed tantum effectiue
„asseuerabimus, cum eadem sit ratio. &c.

*Iacobus Sa-
lianus.*

P. Iacobus Salianus, uti c. 17. vidimus
postquam numerosum Sanctorum Pa-
trum Catalogum in hanc sententiam
recensuit, in gratiam venerande anti-
quitatis, ait, probabile, sydera ex ignis
substantia Dei artificio esse genita.

PRO NATURA SOLIS, ASTRO-
rum & caeli ignea, pugnant rationes,
ob quas sancti Patres, aquas veras ele-
mentares auctoritate sacra Scripturae
commoti, supra Firmamentum esse
contestati sunt.

C A P. X X.

A Quas veras naturales adeoque
elementares à Deo ter opti-
mo Maximo supra Firma-
mentum euectas esse, ita clarum esse
dicunt è Scriptura sacra, ut etiam ex ijs,
qui Quintam Aristotelis essentiam pro
aris focisque tuentur non pauci, vna-
nimi Patrum consensui, quem postea
afferam, resistere non audent; & certe
inter doctos passim viget ista opinio;
quanquam vijs diuersis.

Neque enim omnes easdem causas
assignant, neque similes inde deriuant
effectus; sunt qui factum diuinum ag-
noscant, rationem facti se nescire fa-
teantur.

Ego auctores cum suis rationibus af-
feram, non ut illas probem, vel impro-
bem, sed ut inde euidenter ostendam,
vel Solem secundum illos natura igneum,
vel rationes ab antiquis illis Patribus,
& Sanctis auctoribus gratis allatas esse,
si caelum Solemve igneum non agno-
uerunt.

Ex Martinengo, Parte 1. pag. 637. &
sequentibus.

„Hilarius enarrat. in Psalm. 137. *S. Hilarius*
„Aquis etenim eleuatis illam ipsam
„primi caeli naturam temperauit,
„quae superni Dei accensa virtute
„nequaquam esset ab inferioribus pa-
„tienda naturis. Caelum vero infe-
„rius non vniforme, sed multiplex
„tetendit, quod totum Firmamen-
„tum nuncupans, valida ad sustenta-
„tionem aquarum superiorum, tem-
„perationemque aëris nostri, firmita-
„te solidauit.

Basilii Hexaem. hom. 3. De im-
mensa aquarum copia, prolixam ha-
bet disputationem, ad exstuantis i-
gnis vim reprimendam, tam supra,
quam infra Firmamentum necessaria,
& reiectis Origenis Apollinarijque
sententijs, hæc subdit.

S. Basilii.

Aquam

I

„ Aquam nos, ut aquam intelli-
 „ gamus, & segregationem factam
 „ humorum à Firmamento, ea causa
 „ quam assignauimus, accipiamus.
 „ Atque etiam si quando Aquarum
 „ illarum, quae super caelos sunt colloca-
 „ tae, communem omnium Domi-
 „ num laudare tradantur, non natu-
 „ ras ratione praeditas ob id illas esse
 „ decernimus.

„ Et post. Neque enim super ca-
 „ los consistens aqua ob hoc, quod in-
 „ feriores antegreditur honoris prae-
 „ cipi dignitate, ipsa solum ob eximia,
 „ & insignem suae virtutis prerogati-
 „ uam, diuinam adimplet laudem.
 „ At enim, laudate eum, ait, & quae
 „ ex terra sunt, Dracones, & omnes
 „ abyssi. Ex hoc eodem Patre paullo
 „ post apertiora videbis.

S. Ambrosius, post Basilium apud
 eundem Martinengum, pag. 639. ex
 iisdem causis easdem veras & elemen-
 tares supra Firmamentum peniles fa-
 cit, idque praecipue Verbo Dei, con-
 tra illos, qui ipsas effundendas argue-
 bant, fusissimè probat.

Casarius. „ Caesarius in Dialog. Quaest. 71.
 „ Deficientibus igitur, inquit, ultra-
 „ caelestibus aquis, omnia simul lique-
 „ scent abundantia ignis; nam stellae
 „ cadent, ut de vite folia.

En quomodo, & Aquas absumen-
 das, & ignem caelestem augescentem
 atque omnia tandem depascentem a-
 gnoscat iste Pater.

Ex Martinengo. Part. I. p. 661.

Procopius. „ Procopius Comment. in Genesin. 40
 „ Nascitur tamen Quaestio, Quare A-
 „ quarum medietas supra Firmamen-
 „ tum conuecta sit? Verum haec dabi-
 „ tur causa. Deus Lucem, Solem, Lu-
 „ nam, astraque, quorum omnium
 „ substantia ignita est, disposuit ad
 „ eum modum, ut motum suum in
 „ Firmamento peragerent; at ignis ea
 „ natura est, ut congelata, & ex aquis
 „ concreta potenter dissipet, & dissol-
 „ uat. Ne id igitur eueniret fortè Cae-
 „ lo, necessario tantam aquarum af-
 „ fluentiam in superiore regione collo-
 „ cavit, quae calum illa sum, & inuiol-
 „ latum ab ignis ardore conseruaret.

II.

1 „ Verum in hunc modum placuit Deo
 „ tueri caelum supremum, licet sola
 „ eius voluntas ei salutem & incolumi-
 „ tatem praestare potuisset. &c.

5 „ Damascenus. Orth. Fid. cap. 9. S. Damasc.
 „ Cuius autem gratia locauit supra
 „ Firmamentum aquam Deus?
 „ Propter Solis, & aetheris calorem fer-
 „ uentissimum.

10 „ Nam mox post Firmamentum
 „ subducitur Aether, Sol autem cum
 „ Luna, & astris in Firmamento sunt.
 „ Et nisi superlocata esset aqua, existi-
 „ mandum est, & ab illo ingenti feruore
 „ iam conflagrasse Firmamentum, a-
 „ busque in flammis.

15 „ Beda de Nat. rerum, cap. 8. S. Beda.
 „ Aquas supra Firmamentum positas,
 „ caelis quidem spiritualibus humilio-
 „ res, sed tamen omni creatura corpo-
 „ rali superiores, quidam ad munda-
 „ tionem diluuii seruatas, alii vero re-
 „ ctius ad ignem siderum temperandum
 „ suspensas affirmant.

25 „ Iustinus, Quaest. 93. ad Ortho- S. Iustinus.
 „ doxos. Nec vero haec una causa est
 „ cur aquae sint in auersis caeli parti-
 „ bus, quod sit inuictum subiecta astro-
 „ rum flamma, sed etiam quod deor-
 „ sum aquarum, quae in eo auerso in-
 „ sunt, vi, & copia vergat, nec mouea-
 „ tur ventorum impetu, quodque
 „ summum frigus ex eis deorsum
 „ mittatur, à quo dum mixtus est
 „ cum summo Solis calore, commoda
 „ aeris temperatio, ad animalium, co-
 „ rumque quae terra ex se edit, perpe-
 „ tuitatem efficitur.

„ Idem Iustinus ibidem. Et si astra, Iterum Iustinus.
 „ inquit, infra caelum sunt, tamen mo-
 „ tus actionis eorum, quae ignis natu-
 „ ram imitantur essentiae, natura sit ad
 „ superiora.

„ Itaque veram causam attule-
 „ runt ij, qui ad stabilitatem, constan-
 „ tiamque Firmamenti, Caeli supe-
 „ riores partes, aquis deprimi dixe-
 „ runt.

„ Procopius loco cit. eadem fere, Iterum Pro-
 „ copius.
 „ de radijs Solis, & astrorum assert.
 „ Aquae supra Firmamentum, inquit,
 „ collocatae, non solum primi caeli in-
 „ columitatem tutantur, sed & aliam
 „ habent commoditatem, scilicet quod
 „ Solis Lunaeque radios deorsum im-
 „ pellat,

I.

pellunt, vt terrarum orbi lucem sup-
peditent. Si enim cælum esset per-
lucidum, vniuersus splendor in su-
prema contenderet. *Nam ignis sua*
natura sursum tendit. Itaque supre-
mo cælo coniuncta est aqua, vt splē-
dorem ad ima detrudat.

Iterum S.
Beda.

Beda lib. de Rerum nat. cap. 7. Cæ-
lum superioris circuli, &c. Deus aquis
glacialibus temperauit, *Ne inferiora*
succenderet elementa. &c. Caballista,
teste Vielmio Lectione 14. hanc sen-
tentiam non improbant.

Iterum S.
Basilus.

Basilus Hexaem. homil. 3. Infinita
quidem vt videtur aquarum erat dif-
fusio, vnde quaque inundantium ter-
ræ, superficiemque illius in sublimi
ita occupantium, vt ad cætera ele-
menta collatæ, sua proportionē tran-
scendere viderentur. Quapropter &
antea dicebatur, Abyssum vndique
circumdare terram. Causa autem
humorum copiarum tantarum, in ijs quæ de-
inceps dicuntur, nos assignare oportet.
Et post. Quenam igitur necessitas
fuit, vt aquarum natura tanta copia exu-
peraret, nec explicabili copia? Quan-
doquidem *essentia ignis necessaria est*
vniuerso, non solum ad terrestrium rerum
administrationem, sed ad ipsius etiā
vniuersi totius complendam integri-
tatem (mutilum enim esset, si hoc v-
no elementorum omnium maximè
opportuno destitueretur) aduersan-
tur autem sibi mutuo, alterumq. al-
terius corruptiuum est. Ignis quidem
aquam cum excedit, vincit viribus;
ignem autem aqua, cum exuperat co-
pia, nec aut seditionem inter hæc esse
aut alterius defectione causam oport-
tebat emergere, qua dissolueretur v-
niuersum, & deperiret. Tantā humo-
ris naturam, qui omnia disposuit Deus,
parauit, atque recondidit, vt ad defini-
tos vsque fines ipsius mundi constitu-
tionis, cum paulatim ab ignis viribus
absumatur, ipsi resistere valeret. Enim-
vero qui pondere cuncta, mensuraq.
disposuit (in numerato namque ipsi,
secundum Iob & pluuiarum guttarum sunt)
is plane cognorat, quantum præscri-
psisset temporis Mundo ad duratio-
nem: & quantum etiam igni sumptus,
pabuliq; recondere oporteret, non igno-

II.

1 „ *rauit.* Hæc est aquarum redundantis &
„ copiosæ ratio circa creationem.

Præterea Basilus de ignis necessitate,
multa disceptat, quem non tantum pro
earum rerum structura, quæ arte fabre-
fiunt, sed ad gignendam quoque alendā,
ac fouendam rerum omnium vitam, op-
portunum ac necessarium demonstraui.

10 Ambrosius Hexaemeron libro secun-
do, cap. 3. hæc omnia fere à Basilio exa-
minata (vt eius mos est) quasi interpre-
s replicat. Adiungit quoque aquarum in-
gentem copiam procreasse Deum, vt
15 *ignita virtuti, tum in astris, tum in æthe-*
re, tum in his inferi Mundi partibus æ-
stuant, reluctari possent.

S. Ambros.

„ Procopius Comment. in Gen. cap.
„ 1. Cum huic vniuerso opus esset ele-
„ mento ignito, quod resisteret aquæ, al-
„ terumque elementum consumeret,
„ & vniuersi destructioni occasionem
„ præberet, prouidus Deus tantam a-
„ quæ vim substituit, quæ posset ma-
„ chine limites, reniti elemento i-
25 „ gnis, ne penitus ab ipso absumere-
„ tur.

Denuo Pro-
copius.

Eadem Beda, præter locis citatis
etiam docet libro de sex dierum
Creatione.

S. Beda

30 Diuus Thomas, Postilla in Gene-
sim, sibi adscripta, consentire vide-
tur, dum ait:

S. Thomas.

„ Quare autem ibi ponantur aquæ
„ istæ, *credo hoc esse ad contempera-*
„ *dum calorem à calore celesti, & à stel-*
„ *lis, & planetis influentia calida gene-*
„ *ratum.*

Eadem canit, Claudius Marius
Victor, &c. Commentar. in Ge-
nesim.

Claud. Mar.

Sanctus Augustinus de Gen. ad
litteram, libro secundo, cap. 5. Et de
Gen. imperfecto, cap. 8. Et Beda quæ-
stionibus in Genesim, inter cæteras
causas, adducunt hanc, vt Stella
Saturni in frigidetur, &c.

Superfedeo prudens plures aucto-
res, & horum auctorum plura testi-
monia afferre, quia hæc ad propo-
situm meum satis esse iudico, nimi-
rum vt ostendā Scriptores antiquos
Ecclesiasticos ex rationibus quas at-
tulerunt, cur cū script. & ex scrip. sac.

X x x aquas

I
aquis elementares supra Firmamen-
tum à Deo collocatas assererent, eas-
dem etiam rationes consequenter pro-
bare, Solem ipsum calidum, & igni-
ta naturæ esse apud ipsos id quod cor-
datus Lector, si vel hæc ipsa allegata,
testimonia recte pependit, vel (quod
malim) ipsos Sanctos Patres adiuerit,
prout ego in plerisque feci, absque vlla
dubitatione clarissime perspiciet, ut iam
non sit opus ipsi dici faciem præferre, &
per consequentias deducere, quod in-
tuenti sponte sua patet. An autem om-
nes causæ, quas ipsi propter aquas su-
pra Firmamentum positas dederunt,
sint veræ, mea parum refert; hoc ad rem
facit, si ipsæ tales sint, ut inde, absque
vlla tergiversatione liqueat, ipsos solem
in eorum numero habuisse, quæ cali-
dam atque ignitam naturam à Condi-
tore Deo, sint consecuta, ac proinde ad
vim caloris retundendam, tanta aqua-
rum abundantia indigeant.

Auctoritates pro hac sententia plu-
res intercurrent, ubi de corruptibilita-
te & liquiditate cæli postea agitur. Im-
plicantur enim hæc materiæ, & se mutuo
trahunt.

AVCTORES QUI AQVAS ELE-
mentares supra Firmamentum col-
locarunt, absq; eo quod Cælum
ignita naturæ asseruerint.

C A P. X X I.

A Bstrahendo autem à prædictis
caussis, aquas nihilominus
veras easque elementares su-
pra ipsum Firmamentum, auctoritate
sacræ Scripturæ commoti, euehunt cū
antiquis plerique recentiores in sacras
litteras commentatores, è quibus non-
nullos in medium ob oculos statuere
haud abs re fore iudico.

Illustrissimus S. R. E. Cardinalis Ro-
bertus Bellarminus in psalm. 103. super
illa verba:

Card. Bel-
larmini a-
que super
firmamen-
tum.

Qui tegis aquis superiora eius.
„ Alterum est, inquit, quod Deus
„ miro artificio posuerit aquas supra
„ cælum, quasi aquas super ignem; &
„ tamen neque aquæ extinguant ignem,
„ neque ignis consumat aquas. De his

I „ aquis multa Scolaſtici diſputant: ſed
„ communis Patrum ſententia eſſe vi-
„ detur, aquas eſſe ſuper æthereum
„ cælum, quod Firmamentum dicitur,
5 „ non autem ſupra cælum æreum.
„ Vide inter cæteros Baſilium homil.
„ 3. Hexam. Chryſoſtomum homil. 4.
„ ſuper Genef. Ambroſium lib. 2. ſuper
„ Genef. cap. 4. Auguſtinum lib. 2. ſu-
10 „ per Gen. cap. 4. & in hunc pſalmum
„ 103. Eucherium lib. 1. in Genef. c. 3.
„ &c. hæc ibi.

In Pſalmum autem 101. ait idem,
auctor, cælos mutatum & conſum-
ptum iri quoad modum & externam
figuram.

„ Mutabuntur Cæli, inquit, quo-
„ modo mutatur homo, cum veſtimē-
„ ta mutat, quoad externam faciem,
20 „ &c.

Ex his facile intelligas ab hoc au-
ctore aquas ſupercæleſtes admitti,
in quam ſententiam etiam à Lorino
citatur, in pſalmum 148. Præterea
ipſum à natura cæli ignea non videri
alienum, cum quod aquas ſuper i-
gnem positas inſinuet, tum quod
Cælum Firmamenti vbique ætheris
nomenclatura celebret, & cælum li-
quidum agnouerit atque docuerit,
quemadmodum in Sole ſuo illuſtra-
to refert Illuſtris ac Generoſus Do-
minus Ioannes Nicolaus à Smogu-
lecz Smogulecki, &c. atque idem
35 „ mihi met Pater Ioannes Ziegler ſæpe
narravit; imo in epiſtola quadam
ad Patrem Sebastianum Heiſs Roma
Ingolſtadium perſcripta ipſemet Il-
luſtriſſimus Cardinalis id indicauit,
quam & ego legi.

40 „ Huic eidem doctrinæ de aquis ſu-
per Firmamentum ſtelliferum poſitis
valide ſubſcribit Martinus Becanus
Societatis noſtræ Theologus in par-
te prima Theologiæ Scolaſticæ, in
45 „ Tractatu quarto de Operibus ſex
dierum, cap. 2. num. 6. Conclu-
ſione ſecunda, pag. 396. columna
prima, editionis Moguntinæ, anno
1612. & paſſim in hoc Tractatu quæ-
admodum videbitur paullò poſt in
quæſtione de Cæli corruptibilitate,
quo Lectorem remitto.

Martinus
Becanus.

Aquas

I

II.

Aquas veras esse supra Firmamentum.

Ex Pharo Martini Del Rio, in capit. 1.

Genesis, pag. 58. Super verba,
diuisitque aquas &c.

Martinus
Del Rio.

„ Has aquas veras esse & homoge-

„ neas cum inferioribus, tam multi tam

„ graues prodiderunt, ut Oecumenici

„ cuiusdam consilii decretum & consen-

„ sum mihi referre videatur. Enume-

„ rabo Græcos Latinosque ordine suo

„ quos noui. Hoc volunt Clemens Ro-

„ manus, lib. 1. Recognitionum. Iu-

„ stinus, quæst. 93. ad Orthodoxos.

„ Basilus hom. 3. Epiphanius, in Epist.

„ ad Ioan. Hierosolym. Chrysost. hom.

„ 4. & in psalm. 148. Cyrillus Hiero-

„ solymitanus, Catech. 9. Theodore-

„ tus, hic quæst. 11. Procop. hic. Hip-

„ polytus & Senerianus, in Catechesi.

„ Euthymius, in psal. 103.

„ Ex nostris Tertullianus d. cap. 8.

„ Hilarius, in psalm. 135. Ambrosius,

„ l. 2. Hexaem. cap. 3. & 4. Hieron.

„ d. epistola ad Oceanum. Augusti-

„ nus, l. 2. de Gen. sin. ad litteram c. 5.

„ l. 11. de Ciuitate Dei cap. ult. & in d.

„ psal. 103. & ibi. Cassiodor. Haymo,

„ Bruno, Lombardus, Richardus Pam-

„ politen. necnon Eucherius, Rupertus,

„ Hugo de S. Victore, Beda, & Strabus

„ hic. Anselmus Cantuar. dicto loco,

„ cap. 25. & 28. Richardus de S. Vi-

„ ctore l. 2. exceptio. cap. 7. & Vetusti

„ Vates Christiani, Draconius Hispan-

„ nus, & Marius Victor, de opere sex

„ dierum & Drepanius Florus in Hymno

„ trium Puerorum. *Multa concilia*

„ sunt, quibus non tot Patres subscripse-

„ runt. Non desunt recentiores, qui

„ defendant quod diximus. Ut Anton.

„ Honchala, & Oleastrius hic, Vielmus

„ de opere sex dierum, lectione 14. Lu-

„ douicus Molina eodem tractatu, q.

„ 10. & copiosissime differens Asca-

„ nius Martinengus, in tomo 1. Ca-

„ thenæ magnæ in Genesin, a fol. 648.

„ A sensu ergo communi non abhorret

1 „ acceptis, quæ contrarium tenentes

„ tropicè coguntur accipere. Sunt e-

„ nim (meo iudicio) loca Sacra scri-

„ ptura clarissima, præter hunc nostrum

5 „ alia tria, psalm. 103. 3. habes. exten-

„ dens calum sicut pellem, qui tegis aquis

„ superiora eius, ps. 148. Aqua quæ su-

„ per calum sunt, &c. Daniel 3. 59.

10 „ Benedicite omnes aqua quæ super celos

„ sunt Domino. Et post. Aequè pra-

„ babilis est, si rationem spectes.

„ Nam quæ solent obijci nulla nos

„ premit.

15 „ Corruptibiles esse natura sua hasce

„ lymphas fateor, corrupendas actu

„ nego. & post pauca.

„ Finem quo illic posita, nouit qui

„ posuit & creauit, & dispescuit: ego

„ consiliarius eius non fui: sed certus

20 „ sum, quidquid ab eo factum, id op-

„ timo fine prudentissime factum. Et

„ post pauca.

„ Concludo cum Beato Augustino,

25 „ Quoquo modo & qualeslibet Aqua

„ ibi sint, esse eas ibi minimè dubitan-

„ dum: maior est quippe huius scriptura

„ auctoritas, quam omnis humani inge-

„ ni capacitas.

De hac eadem re non oberit ob

oculos ponere luculentum testimo-

30 „ nium Ludouici Molinæ. Qui cum

„ olim in philosophicis, lib. 1. de celo,

„ cap. 3. quæst. 2. docuisset, Mate-

„ riam cæli esse diuersæ speciei à ma-

„ teria inferiorum, nunc hic disput.

„ quinta ex professo contrarium do-

„ cet, objectionemque ex seipso con-

„ tra semet factam, diluit per hoc.

„ quod olim in aliorum gratiam phi-

„ losophatus fuerit, nunc rationum

„ momentis, & Scriptura sacrae Pa-

„ trumque auctoritate, aliter sentire

„ teneatur.

Ad quam rem plurimum impul-

45 „ sum esse, aquarum supercælestium

„ inundatione, qui ipsum legerit, vix

„ dubitabit.

At ipsum magna efficacia, ex sa-

50 „ cra Scriptura sua prominentem au-

„ diamus.

Loca Sacra
Scriptura
clarissima.

Firmat ex
D. Augusti-
no.

I.

Aquas elementares esse supra calos.

Ex Ludouico Molina, de Opere sex dierum Disp. 10. p. 724. litt. D.

Ludouicus Molina.

His rationibus, licet graues sint, in propositam, inquit, sententiam non adducimur.

Contrariam namque aperte sonat contextus Scripturae Genes. 1. nisi violentis expositionibus, indignisque synceritate sacrarum litterarum, eum velimus contorquere, ut ex se est manifestum, & iam ostendimus disp. 2. & 3. Idem aperte sonant testimonia alia scripturae, quae ibidem attulimus, nempe quod in medio aquarum elementarium, quae occupabant interstitium totum, quod est inter terram & caelum empyreum, fecerit Deus secunda die firmamentum de materia earundem aquarum, eoque firmamento diuiserit eas aquas verè elementares, quae supra spacium, in quo conditum fuit, remanserunt, ab aquis inferioribus. Idque quod Scriptura Sacra aperte sonat, censeo constituendum tanquam regulam iuxta quam metienda sint hominum cogitationes, verane sint an falsae.

Nec propter fallaces hominum exsistimationes, violentiam ullam arbitror esse Scripturae Sacrae inferendam.

Vnde sanctus Augustinus 2. super Genesim ad litteram c. 5. cum reuolisset nonnulla, quibus aliqui persuaderi conabantur super calos esse aquas elementares, non iam vaporali tenuitate, ut sunt aquae nubium, sed glaciali soliditate addit:

Augustini auctoritas citata.

Quomodo autem & qualeslibet aquae ibi sint, esse eas ibi minime dubitemus, maior est quippe Scripturae humanus auctoritas, quam omnis humani ingenij capacitas.

Plura pro hac sententia ex ratione & auctoritate aliorum, lectu digna subnectit, &c.

Idem disp. 2. pag. 705. B. 1. Fit etiam ait, ut firmamentum non sit factum de nihilo, atque adeo per crea-

II.

tionem pressè sumptam, sed de materia aquarum, quae antea occupabant spacium, in quo ex illis fabricatum est, quaeque una cum caelo empyreo & terra conditae sunt. Citat deinde pro hac sententia, Clementem l. 1. Recognit.

Iacobus Bonfrerius Societatis nostrae, in Commentarijs suis in Genesim anno 1625. editis, in cap. 1. super illa verba:

Diuisitque aquas quae erant sub firmamento, ab his quae erant super firmamentum.

Intelligo, inquit, haec propriè, ut & sanctus Clemens l. 2. Recogn. & omnes sancti Patres intellexerunt, uti & verba hic Scripturae sonant, nisi quis velit (Nota Lector) supra modum ea torquere. Idem alia loca Scripturae indicant. Psal. 103. Extendens caelum sicut pellem, qui tegis aquis superiora eius. Psal. 148. Aquae quae super calos sunt. Et in Cantico trium Puerorum, Dan. 3. Et post. Nunquam reperietur nomen Firmamenti, vel Graeca vox *ἐπίωρα*, vel Hebraica *רַקִּיָּה* Rakiah, pro aere posita, &c.

Idem pagina 101. Hic vero aquas elementares, & eiusdem speciei cum nostris aquis intelligo.

Aqua super caelestes sunt elementares.

Et post pauca, Vnde subit mirari, quosdam esse, qui istas supercaelestes aquas dicant esse diuersas specie ab his sublubaribus. Et postea causam aliquam ipsarum caelitus collocatarum reddens: Dicamus, inquit, quamdiu nihil aliud melius occurrit, ibi eas esse, ut caeli empyrei vnde quaque lucidissimi aspectum nobis praeipiant.

Petrus Hurtadus de Mendoza Societatis Iesu, in sua philosophia anno 1624. edita, de opere sex dierum disp. 3. sect. 3. §. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ita scribit de Aquis supra firmamentum à Deo collocatis, pag. 381.

Petrus Hurtadus.

Igitur nomine aquarum intellige, quod Scriptura sonat aperte, aquas scilicet elementares, in & sub caelo. Cum aquae elementares sint supra Firmamentum, non potest nomine

I

„ nomine firmamenti aer intelligi, su-
 „ pra quem nullae sunt aquae. Alij
 „ apud Patrem Pererium & Molinam
 „ per Firmamentum intelligunt oc-
 „ tauam caeli sphaeram, quae diuidit
 „ nonum caelum quod glaciale voca-
 „ tur, & aqueum ab aquis elementa-
 „ ribus. Verius ait Pater Pererius, per
 „ aquas caelos intelligere esse nimis inso-
 „ lens, & à Scriptura abhorrens: neq;
 „ credibile est aquam tam ambigue sumi
 „ in eadem dictione, & narratione:
 „ item ait Pater Molina, nulli antiquo-
 „ rum hoc caelum cognitum esse, neque
 „ ipsi Aristoteli, sed esse quorundam Ca-
 „ tholicorum commentum, quo respon-
 „ deant argumento hinc desumpto ad
 „ probandum aquas esse supra caelum?
 „ Et post.

„ Est ergo Firmamentum aggrega-
 „ tio corporum interiectorum inter a-
 „ quas terrestres & caelestes quae sunt
 „ attiguae caelo empyreo.

„ Quae aggregatio includit omnes
 „ caelos mobiles, & aërem. Commu-
 „ nior est hac expositio, quam acriter
 „ tuctur Pater Molina, & ipse Pater
 „ Pererius admittit, quam nouissime
 „ tuctur noster Martinus del Rio ce-
 „ lebris Sacrorum Bibliorum Inter-
 „ pres.

„ Probatur quia in solum caelum,
 „ & aërem solum, non quadrant,
 „ quae hoc capite primo de Firma-
 „ mento dicuntur: aues enim non vo-
 „ lant in caelo, sed in aëre: neque ca-
 „ lum diuidit aquas sublunares, sed
 „ aer: sydera autem & planetae non
 „ sunt in aëre: sed in octo partibus
 „ caeli stellati.

„ Item Firmamentum secundum
 „ ultimam superficiem conuexam ca-
 „ li stellati attiguae aquis superiori-
 „ bus, interfecat vtrasque, ac diuidit.

„ Illudque aperte hanc expositio-
 „ nem commendat, quod plane ac li-
 „ quido, & sine Chymærarum moli-
 „ tione Sacrum textum exponit.

„ Itaque prima die creatum est
 „ caelum Empyreum, & terra, inter
 „ quae duo corpora creata fuit abyf-
 „ sus, complens totam intercapedi-
 „ nem caeli & terrae: non enim erat lo-
 „ cus vacuus.

„ Secunda vero die creauit Deus

II.

1 „ caelum stellatum distans ab Empy-
 „ reo: inter quos duos caelos reliquit
 „ bonam aquarum partem: item crea-
 „ uit ignem & aërem, infra quem
 5 „ erant illa secunda die aquae subluna-
 „ res, & sub his terra: aquae vero quae
 „ occupabant spatium Firmamenti,
 „ non fuere annihilatae; Deus enim
 „ adhuc annihilauit nihil, sed conuersae
 10 „ fuerunt in Firmamentum, quod fa-
 „ ctum fuit ex aquis.

„ Itaque materia caeli, ignis & aë-
 „ ris prius fuit materia aquae, & caelum
 „ stellatum fuit productum ex pri-
 15 „ uatione sui & generatum. &c. Et
 „ mox.

„ Itaque materia caeli stellati &
 „ sublunaris sunt eiusdem speciei.

„ Ita Pater Molina & Rio, qui ait
 20 „ caelos mobiles esse suoapte ingenio
 „ corruptibiles &c. Et post.

„ Porro supra caelos esse aquas,
 „ praeter haec testimonia, sunt alia,
 „ plura: ac primum sit, quia cum id
 25 „ toties repetant Scriptores Sacri, nu-
 „ squam aliquis eorum eam proposi-
 „ tionem exponit, sed vt sonat, relin-
 „ quunt omnes. Item Deus potuit

„ eas ibi constituere; an vero ita fece-
 30 „ rit, pendet ex sola voluntate eiusdem
 „ quam ex eius testimonio debemus
 „ vestigare: sed si Deus id fecisset &
 „ voluisset attestari, quo sermone

„ syncerius & clarius posset? Adde
 35 „ psalmum 103. 3. Extendens caelum
 „ sicut pellem, qui tegis aquis supe-
 „ riora eius, vbi caelum non sumitur
 „ pro aëre, cuius pars superior non

„ tegitur aqua, etiam pluuiali, quia
 40 „ nubes non in vltima aëris superficie,
 „ sed in media regione aërea continen-
 „ tur, superiora autem aëris teguntur
 „ non aquis, sed igne, cui est aer atti-
 „ guus &c. Et post.

„ Quod confirmo ex cantico trium
 „ Puerorum, quod videtur huius psal.
 „ (nimirum 148.) glossa &c.

„ Sed rogas cui fini aquae ibi ob-
 „ feruiant? Sed quid me rogas?

„ roga eum qui eas illic voluit esse:
 „ qui si voluisset, ane honesto, &
 „ optimo fine careret? equidem confi-
 „ liarius eius non fui, neque noui sen-
 „ sum Domini. At inquis, nescimus

„ quo pacto ibi sint, sed scit is, qui eas

50 „

„

55 „

Refutat ca-
 lum nonum
 glaciale.

Quidquid
 inter aquas
 caelestes, &
 terrestres in-
 terest, no-
 mine Fir-
 mamenti in-
 telligitur.

Firmamen-
 tum ex a-
 quis elemē-
 taribus fa-
 ctum est.

Materia
 caeli & sub-
 lunarium
 est eiusdem
 speciei.

Probat va-
 rias tationi-
 bus.

I.

NB. Intel-
lectus huma-
nus est ca-
ptiuandus
in obsequiū
Sacra Scri-
pturae.

ibi reposuit. Neque enim Scripturam
nostro capite metiri, sed nostram men-
tem Scriptura debet captiuare, & re-
digere in obsequium. Qui corpora
conseruat sine cibo in cælis, & qui
membra ambusta æternis ignibus
non finit consumi, non poterit aquas
à calore illasas tueri? &c. Hactenus
Hurtadus.

Et hæc quidem occasione Argumen-
ti ex Aquis cælestibus pro Sole igneo
ex antiquorum placidis probando, de
Aquis Elementaribus cælo illaris, dicta
sufficiant. Nunc ad institutum meum
reuertor, & dico, etiam si Phænomenon
solare, Solem ipsum ardentem, flam-
meum, æstuantem ostenderet, id ipsum
tamen nouum non futurum, sed pri-
dem agnitum & vnanimiter assertum
ab antiquis, ignorantibus tamen, neq;
eminus olfacientibus ROSAM VR-
SINAM. Nondum enim ROSA
VRSINA exorta, multoq. minus ex-
culta fuerat.

Sensus autem & ratio externos Scri-
ptura Sacra, & Ratio nostros ad hoc
sentiendum induxit.

Externorum auctoritates passim no-
strorum immixtas insinuaui: quas co-
piosius inuenias apud Plutarchum, de
placitis philosophorum, apud Sene-
cam, Plinium, Ciceronem, Platonem,
Aristotilem, Cedrenum, Conimbricen-
ses, & alios.

Nostorum vidisti ex maxima par-
te in productis auctoritatibus, & vide-
bis paullo post plura in Propositionibus
sequentibus de cæli Corruptibilitate
& Liquiditate.

Nunc committere non possum, quin
Hieronymi Vilmij ex Ordine S. Do-
minici, Aemone Episcopi, Professoris
Veneti, Sententiam proferam, quæ
ipse in Lectionibus suis Theologicis de
sex Diebus, accurate sane atq. neruose,
si vilis alius, declarat.

Hieronym-
Vilmij
Dominica-
nus depu-
gnat pro a-
quis super-
cælestibus.

Nam Læctione 13 pag. 161. editio-
nis Venetæ, 1575. super illa verba, Et
dixit Deus Fiat Firmamentum &c.
Postquam Seuerianum, Theodoretum,
Guilielmum Antisiodorensen recitasset,
Sequuntur, inquit, ex recentioribus
opinionem hanc Hieron. ab Oleastro,
hoc loco, & Franciscus Forrerius, in
Ela. cap. 40. ad quam stabiliendam

II.

1 „ verba D. Petri proferunt, in 2. cap. 3.
„ quæ hæc sunt. Latet enim eos hoc vo-
„ lentes, quod cæli erant prius terra, de
„ aqua & per aquam consistentes Dei
5 „ verbo. Quæ certe clariora esse vi-
„ dentur, quam ut possint glossis obscu-
„ rari.

Franciscus
Forrerius.

10 „ Potest etiam pro his adferri argu-
„ mentum ab Etymologia nominis
„ Hebræi. Etenim (si Rabbi Iosepho
„ Kimhi, Diuoque Hieronymo ad O-
„ ceanum, & Augustino Steucho cre-
„ dimus) Schamaijm, perinde illis va-
„ let, atque nobis, illic aquæ. Ex a-

Scriptura
locus efficitur
iudicio Viel-
mij.

15 „ quis igitur constat Firmamentum.
„ Porro autem quantum ad aquas illas
„ supercælestes pertinet, mira quadam
„ consensione (vno atque altero exce-
„ ptis) existimant, eas esse elementa-
20 „ res, ac proprie dictas, hoc est, nostris
„ prorsus congenitas: quoniam dixit
„ Deus, Fiat firmamentum in medio
„ aquarum, & diuidat aquas ab aquis.

Ratio ab E-
tymologia.

25 „ Fuit igitur illa diuisio vnus homo-
„ genei corporis partitio, & in gemi-
„ nam partem disiunctio; ambæ igitur
„ partes vnus naturæ sunt: hæc autem
„ quæ pars subcælestis, vera & elemen-
30 „ taris aqua est: ergo & illa supercæ-
„ lestis vera est & elementaris aqua.

Aqua su-
percælestes
sunt vera
elementares
aqua.

„ Et post pag. 163. Quid verat quæ-
„ so sentire, pendere hanc (frigoris
„ qualitatem) & conseruari à super-
„ cælestibus illis aquis, & in eam gra-
35 „ tiam illas ibi fuisse positas? Idem
„ pag. 164. Ait nomine Firmamenti
„ totam cælestium corporum massam
„ contineri. Splendidiores enim, inquit,
„ sunt Scripturae, quas asserunt, quam
40 „ ut possint vlla figurationum caligine
„ obscurari; quod tamen quidam co-
„ nantur.

„ Pag. 165. Num vero massa illa
„ in qua sydera sita sunt, fuerit tan-
45 „ quam CrySTALLUM quoddam ex a-
„ qua compacta aut congelata, an-
„ cept admodum, & impeditum pro-
„ blema est.

Scriptura
sacra pro a-
quis super-
cælestibus
allata non
possunt ob-
scurari.

50 „ (Nam ut pagina 166. ait,) vsque
„ adeo hæc opinio D. Basilio displicuit,
„ ut vulgarem illam vocauerit, & quæ
„ puerilis sit, & simplicitatis ingenii.
„ En quo loco habeat S. Basilius opi-
„ nionem de duritie cæli ex aquarum
55 „ congelatione post creationem super-
„ indu-

D. Basilius
calam ex a-
qua conge-
latum ridet

I

II.

„ admirabilia intersit, licet hoc non
 „ minus quam reliqua omnia in utili-
 „ tatem hominum, & vniuersi orna-
 „ mentum esse non dubitem. &c.

„ *Et si enim exposuit hoc nobis diser-*
 „ *te Scriptura (modo serio ac diligenter*
 „ *perpendatur) esse ibi veras aquas (ut*
 „ *ego sane puto) non tamen explicat*
 „ *quales, hoc est, num fluxiles, vel*
 „ *concretæ, tenues vel crassæ, nec in-*
 „ *quem usum aut finem ibi positæ*
 „ *fuerint.*

„ Pag. 182. Expedit igitur huma-
 „ nas tenebras & nostram ignorantiam
 „ candide accusare, quam ad hanc sen-
 „ tentiam persuadendam inanes pro-
 „ ferre rationes: Sic enim intelligunt
 „ omnes, nos sola Dei dicentis aucto-
 „ ritate niti, &c.

Sola Dei di-
centis aucto-
ritate niti-
dum est.

„ Et post. Hæc in eam gratiam
 „ latius quam soleo prosequor, ut in-
 „ de tanquam à certissimis rationibus
 „ demonstrarem, caligare & falli eos
 „ magno opere, qui ita ratiocinantur.
 „ Non apparet in quem usum aquæ e-
 „ lementares super cælos positæ fue-
 „ rint: amplius & rerum naturæ hoc
 „ non patiuntur. Figmentum igitur
 „ hæc positio est.

Ex verbo
Dei, iuxta
veteres Sā-
ctos inter-
pretes intel-
lecto, Aqua
vera super-
caelestes asse-
runtur.

„ Recte quidem hæc omnia dice-
 „ rentur, & consequentia, ut ille ait,
 „ plausibilis esset, nisi verbum Dei ob-
 „ staret, præsertim iuxta veteres San-
 „ ctos ferme Interpretum, qui aquas
 „ (ut cogor sepe repetere) vnius cognā-
 „ tionis & naturæ cum nostris locari
 „ ac existere super cælos in his verbis
 „ intellexerunt: & fecit Deus Firma-
 „ mentum in medio aquarum, & diui-
 „ sit aquas ab aquis. Sed in ea sumus
 „ Christiani calamitate hoc tempore,
 „ ut ex nostris plures (si tamen ex no-
 „ stris dici merentur) à primo iuuentu-
 „ tis flore assuescant sanctam antiquita-
 „ tem non reformidare, &c.

Dolet Anti-
quitate ne-
glectum.

Et postquam ex psalmo 148. & Can-
 „ tico Trium Puerorum hanc veritatem
 „ potissimum stabiliri dixisset, ita prose-
 „ quitur pag. 183. Ergo cum tres Iuvenes
 „ simpliciter dicunt, *Benedicite Cæli*
 „ *Domino*, vel oratio emphatica est,
 „ ut sensus sit, *Benedicite illi cæli*, vi-
 „ delicet amplissimi & eminentissimi,
 „ quos cælos cælorum dixit Dauid,
 „ vel certe ad omnes cælos absque di-

1 „ scrimine sermonem extendunt?

„ *Et aquæ omnes quæ super cælos*
 „ *sunt, laudent nomen Domini.* Quis
 „ hic non videt super quos cælos sitas
 „ fuisse aquas ab Opifice Propheta ex-
 „ plicet? Contextus certe ac ipsa ver-
 „ borum series nos cogit intelligere,
 „ ut super illos positas fuisse dixerit,
 „ quos iam iam cælos cælorum, hoc
 „ est, reliquis celsiores sublimioresque
 „ vocauerat. Non igitur super solum
 „ aërem sitæ aquæ sunt, ut Aben Esra
 „ & reliqui existimant, sed super altis-
 „ simos quoque cælos.

15 „ *Et est profecto hic Davidis versi-*
 „ *culus illustre quoddam commentariū*
 „ *verborum Dei, quæ perpendimus,*
 „ *Fiat Firmamentum in medio aquarum:*
 „ *ut proinde mihi videatur con-*
 „ *tentius & proterui ingenui, aut certe*
 „ *minus ad diuinos sensus capeffendos i-*
 „ *donei, affirmare aërem hic cæli calo-*
 „ *rum nomine apud Prophetam venire.*
 „ Præterquam quod meminisse oportet
 „ Dauidem nunc in Excelsis esse,
 „ hoc est, in parte superna; at vero aër
 „ in inferna situs est, & quam de cæ-
 „ lis in epigraphe vocauit. Et pagi-
 „ na 184.

Ex contex-
tu & serie
Scriptura
aquas super
caelestes pro-
bat.

Taxat vio-
lentos Scri-
ptura glos-
satores.

30 „ Et sufficere profecto hucusque po-
 „ terat sobrijs & pijs ingenijs Davidis te-
 „ stimonium, sed voluit Spiritus sanctus,
 „ ut hoc quoque quod inuestigamus po-
 „ tentius & latius propter contentiosos in-
 „ sequentibus rursus ita hic ipse Prophe-
 „ ta aperiret. Laudate Dominum de ter-
 „ ra, &c. grando, nix, glacies, spiritus pro-
 „ cellarum. &c. *Hem audis aquas quæ in*
 „ *cælo, quod aër est, sunt, grandinem scilicet,*
 „ *& nixem, atque adeo intellige cum*
 „ *his rorem, pruina, imbres, & nubes, &c.*
 „ Ergo aquæ illæ, quæ super cælos cælo-
 „ rum sunt, aliæ sunt ab his, quæ in aëre
 „ sitæ nobis imminet,

45 „ Sed ut quæ dixi, contraham nunc in
 „ Epilogum: hoc profecto, & distributio
 „ creaturarum, quæ Dauid facit, & gene-
 „ rales nomenclaturæ aquarum, ac spe-
 „ ciales grandinis & niuis usque adeo po-
 „ tenter manifestant, ut super hac re am-
 „ plius immorari superuacaneum existi-
 „ mem, ac ut quibus hæc non persuadent
 „ non dubitem nec meam, nec alterius
 „ orationem facile posse persuadere.

55 „ Quapropter recepta hæc, & per-
 „ nulgata

I

uulgata hoc tempore apud Nouatores opinio, solas aëris aquas dici supercaelestes, euincitur falsa.

PRO NATURA SOLIS IGNEA,

Auctoritates è Sacris Litteris, &

Hebraeis fontibus deprompta.

C A P. XXII.

SACRA pagina numerosa veneranda antiquitatis Phalangi, pro Sole igneo decertantis, vehementer suffragatur.

Psal. 18. In Sole posuit tabernaculum suum, & ipse tanquam sponsus procedens de thalamo suo: exultauit ut gigas ad currendam viam, à summo caelo egressio eius, & occursum eius usque ad summum eius, *nec est qui se abscondat à calore eius.*

Ecclesiastæ, cap. 1. vers. 5. Oritur Sol & occidit, & ad locum suum reuertitur; ibique renascens gyrat per meridiem, & flectitur ad Aquilonem: *lustrans uniuersa in circuitu pergit spiritus,* & in circulos suos reuertitur.

Ecclesiastici, cap. 17. ver. 31. Quid lucidius Sole? *& hic deficiet.*

Eiusdem cap. 43. v. 2. Altitudinis Firmamentum pulchritudo eius, species cæli in visione gloriæ. Sol in aspectu, annuncians in exitu; vas admirabile, opus excelsi. In meridiano exurit terram, *& in conspectu ardoris eius, quis poterit sustinere.* Fornacem custodiens in operibus ardoris. Tripliciter Sol exurens montes, *radios igneos exsufflans,* & refulgens radijs suis obæcat oculos. Magnus Dominus qui fecit illum &c.

Ex his & similibus Scripturæ locis, probant sacri interpretes, Solem formaliter esse calidum, naturæ igneæ, in caelo libere & per se moueri, tandemque ab interitu non exemptum. Quæ cum Moderni Phænomeno solari admodum conformia esse videant propriè ea & sine vlla metaphora accipi, volunt, negantque vllam esse causam cur in metaphoricos & distortos sensus sit cogens Sacer textus. Nam quod ipsum Solem vocat Spiritum lustrantem uniuersa, inque suos circulos reuertentem, digitum quasi intendit in ignitam & ac-

II.

1 censam ipsius exhalationum, seu Macularum & Facularum copiam.

Fontes Hebræi, & nomina Solis.

5 Fontes certe Hebræi, & ipsa Solis vocabula, præter flammam, ariditatem & ardorem nihil spirant.

Nam *Or*, Or, apud Hebræos, teste Pagnino in Thesauro Linguae Sanctæ, significat lucere, illucescere, illuminari, succendere; vnde Græci *ὄψωρ*, *ὄψωρ*. Et eadem vox est etiam nomen, quod in Sacris litteris vsurpatur pro Luce,

15 Sole, Flamma, luce ignis, Lumine nubis, de quibus singulis testimonia scripturæ luculenta apud eundem require, f. 46.

47. Ab ergo voce Or, Lux, deriuatum est Luminare, Maor. Gen. 1. v. 16. psal. 74. vers. 16.

20 Quod autem idem vocabulum Or, significet flammam ignis, habes Isaia, 31. v. 9. & 47. v. 14. item Gen. 15. 7. Ego Dominus, qui eduxi te de Vr, seu

25 Igne Chaldaeorum sic cum alijs explicat Pater Cornelius de Lapide. Com. in Gen. cap. 11. pag. 148. Vnde Benedictus Pererius, lib. 1. in Gen. tom. 1. p. 50.

„ Nomen lucis, ait, absolute positum,

30 „ designare solet lucem Solis, quæ propter suam copiam & pulchritudinem

„ & efficacitatem, simpliciter solet lux

„ appellari: sepe numero enim Scriptura

35 „ diuina, lucis nomen vsurpat pro luce Solis, velut Esa. cap. 60. Non

„ erit, inquit, tibi amplius Sol ad lucen-

„ dum per diem, pro Ad lucendum, he-

„ braice est, *Laor* hoc est, ad lucem:

„ nam etiam lux primo die facta hic

40 „ vocatur Or.

„ Et Hieremias, cap. 4. Aspexi ter-

„ ram, & ecce vacua erat & nihili: &

„ cælos, & non erat lux in eis. Nec in

„ Sacris litteris modo, sed etiam in

45 „ Latino & vulgari sermone frequens

„ est, lucem simpliciter ponere pro lu-

„ ce Solis, vel pro die qui fit à Sole;

„ sic dicitur hodierna luce, & nondum

„ illuxit &c.

50 „ Cum igitur, Lux primo die creata,

„ apud Hebræos ignem, lucem & Solem

„ significet, quid mirum, quod Sancti

„ Patres dixerunt Solem esse ignem?

55 „ Alia Solis vox est, *Chammah*,

„ à radice *Chamam*: *Calescere, in-*

calescere,

Solis natura ignea, ex Hebraicis originibus.

Cornelius à Lapide.

Argumentum ex impositione nominis.

Solem formaliter esse calidum, aliud ex nomine ipsius, argumentū vrgens.

Ex alio Solis vocabulo, argumentum.

Ex ethymologia Firmamenti, tam aqua, quam ignis in celo arguitur.

calefcere, calefcieri, calidum esse, calere, astuare. Exod. 16. v. 21. *וַיִּבֶחֱם* Vechām, & incaluit Sol. Et hæc quidē significat verbū; si verō eadē vox vsurpetur pro nomine significabit calorē. Vide Pagninū pag. 72. Ista certe innuunt Solē formaliter non effectiue tantū esse calidum: nam *astuare, calidum esse, calefcieri, &c. secundum nullam Grammaticam idem significat quod calefcere, &c.*

Est & aliud apud Hebræos pro Sole vocabulum *וַיִּבֶחֱם* Cheres, quod ardorē atq. exsiccationem menti ingerit, teste Pagnino, pag. 804.

Sed & ipsum nomen cæli, quod os Domini nominavit, secundum hebræā antiquorum Rabbīnorum originationem, Solē natura igneum esse, indicat: vocauit enim Deus Firmamentum, Cælum, quod est Hebræicē *וַיִּבֶחֱם* Schamaijm, ex *וַיִּבֶחֱם* & *וַיִּבֶחֱם* schā & Maijm, hoc est Ibi Aquæ, e qua ethymologia scriptores probant aquas super cælestes: vel secundum Rabbīnos, ex *וַיִּבֶחֱם* & *וַיִּבֶחֱם* ex Esch, & Maijm, id

est Igne, & Aquis: quod Firmamentum ex aquis factum interque Aquas superiores & inferiores medio loco consistens, in se ignem, Solem videlicet cōtineat, inquit enim Scriptura, Fecitque Deus duo luminaria magna, & posuit ea in Firmamento Cæli. Cumque Deus ipsemet hoc nomen Schamaijm indiderit Firmamento, hoc utique est nomen eius, & simul naturam essentiamque ipsius ipso significatu quam optime explicat: si namque teste Scriptura, Deus animalia ad Adamum adduxit, ut videret quid vocaret ea, & Adam ex vilis & cognitis eorum per scientiam à Deo infusam naturis, nomina singulis conuenientia atque essentiam indicantia imposuit, ut idcirco Scriptura testetur, hoc esse cuiusque bestię nomen, quod Adam ipsi dedit; quanto amplius, existimabimus Deum ter Opt. Max. Firmamento nomen maxime proprium, impositurum fuisse? & consequenter illuc aquam & Ignem ex vi vocabuli, concordia indissolubili, per verbum suum omnipotens, consociasse? Sic ex nomine Saluatoris nostri IESV, quod ipsemet imposuit, intelligere nos voluit, ipsū totū Mundi totius Saluatorem.

Tandem aliud Solis nomen est *וַיִּבֶחֱם* Schemesch, ita dictum quod Sol administret lumen, ut fusc docet Pagninus pag. 3049. Argumenta autem, e veris, nominum etymologijs rationalia trahi & posse & solere, apud omnes in confesso est, præsertim tanto accedente fundamento, quantum in proposito habemus, videlicet in Sacra lingua voces rebus esse impositas, non ad arbitrium hominum, mere sonantes, sed significantes per se & rerum ad quas significandas assumptæ sunt, naturas & proprietates declarandas. Iam si placet, vnum alterumve argumentum ad Phenomenon nostrum ex mente ipsorum, qui hæc vrgent atque propugnant; applicemus, & videamus cuiusmodi neruus ipsis insit.

Faculas solares esse in Sole, & partes Solis probatur e sacra Scriptura deductis conclusionibus.

Sole nihil est lucidius, ut habetur Ecclesiastici 17. v. 31. vbi dicitur: Sole quid lucidius? quasi diceret, nihil. Sed clarum est, ipsas Faculas solares, tam primarias, quam secundarias, esse Sole reliquo lucidiores: igitur si ipsæ in Sole, si partes Solis non sunt, constat aliquid Sole esse lucidius: contra sacram Scripturam, quod est absurdum. Faculæ igitur Solis, sunt partes Solis.

Item, si Faculæ Solis non sunt in Sole neque partes Solis, non tantum aliquid Sole lucidius datur, sed & ipse Sol erit subobscurus, & omnino non videbitur, quod rursus est, contra sacram Scripturam. Sequela probatur. Quia tota Solis superficies lucida nihil est, nisi mera Faculæ secundariæ: quæ admodum ex ipso phænomeno fulsissime demonstraui, libro tertio, & parte prima libri huius quarti. Ne igitur in ista absurda contra sacram Scripturam incidamus, negare non possumus, Faculas solares esse partes Solis.

Item ex sacra Scriptura certum est, Solem à Deo conditum ut illuminaret terram, & administraret lucem: certissimum autem est, ex ipso Solis Phænomeno, hanc functionem adimpleri per solas Faculas solares, nam si illas à Sole

Ostenditur Faculas solares esse partes Solis argumento ex Scriptura deducto.

Alio.

Alio.

cogitatione fecernamus, Sol lucis residuae nil habebit, quam illam quae Maculis & umbris inest, ut fusc ostendi in prioribus: igitur si Faculae solares non admittantur in censum partium solarium; aliquid administrabit nobis & orbi terreno lucem, & alia Solis officia exercebit, Quod Sol non est; at cum hoc contra Dei ordinationem & Scripturam Sacram, neque cogitari quidem, ne dum affirmari debeat, clarum est, faculas solares esse partes corporis solaris.

Solem esse igneum.

Eadem ratione, ex illo Ecclesiastae loco, lustrans uniuersa in circuitu pergit Spiritus, & in circulos suos reuertitur, argumentum pro ignea Solis natura deducunt. Propter vim enim illam Solis igneam, praedominantem, vocat Scriptura totum Solem spiritum: quem admodum Empyrici destillationibus expressam illam subtiliorem & vegetiorem substantiam, vocant Spiritum; sic vinum generosum dicimus spiritosum, calidissimum & defaecatissimum sanguinem appellamus nomine spirituum. Sol igitur ex eo, quod natura ignea summe praepolleat, secundum ipsos spiritus in Sacris litteris depradicatur. Nam circumstantiae non videntur permittere, ut aether, vel multo minus aer illic intelligatur.

Aliter.

Iterum, Si Sol non esset naturae ignitae, Etymologia illa Firmamento indita, Schamajm, gratis esset. Nam Firmamentum tantum ratione Solis dicitur Ignis, ablato namque Sole, in Firmamento ignis nullus erit. Aut ergo origo vocis, ab igne & Aqua non est, aut, quod aiunt Sol igneus agnoscendus est.

Auctoritates aliorum Doctorum, & Theologorum praecipue, iam habes partim inter allatos, partim inter afferendos, cap. 24. & sequentibus. Nam ipsi hanc quaestionem, utpote magis Naturalem quam Theologicam, ex instituto non admodum urgent, propterea, quod Sacra Scriptura, aut dogma aliquod certum Ecclesiae ipsam non determinauit,

PRO NATURA SOLIS IGNEAE,
Insinuatur Auctoritates Philosophicae, & Obiectiones
dissoluntur.

C A P. X X I I I.

MULTAE fuerunt olim sectae Philosophorum, & omnes, praeter Aristotelem, admitterunt naturam celi & siderum igneam, quanquam modis diuersis; de qua re consule Plutarchum in Placitis Philosophorum, Senecam, Plinium, Ciceronem de Natura Deorum, de Vniuersitate, Platonem, Aristotelem, Cedrenum, alios, praesertim Martinengum in sua magna Glossa. Mathematici certe, Prisci, & Recentes ita senserunt meliores & seniores plerique, & ne, amice Lector, tibi verba dari, atque a me ex affectione imponi putes, sustine patienter, & propositio- nibus sequentibus testes dabo, verbisq. meis fidem faciam facto. Nam hoc quidem tempore, Omnes Mathematici aut sequuntur Tychonicas Hypotheses, aut Copernicanas, aut nouas fortasse architectantur. Qui Copernicanas sectantur, omnes absque dubio & difficultate, naturam Solis igneam agnoscunt, & dicunt Solem in Mundo esse, sicut est cor in animali, &c. Qui Tychoni addicti sunt, omnes caelestem substantiam ignis depurati amplectuntur.

Sed ut dixi, abrumpo nunc, quia, loca cum auctoribus capitibus sequentibus ex instituto, quantum satis est afferam. Sunt enim materiae istae ita inter se agnae, ut vna sine altera tractari, probari, vel reijci vix valeat.

Hoc etiam admoneo, multa argumenta, quae pro hac sententia afferri possent, studio omitti, prolixitatis & tedium euitandi causa. Haec autem pro inuidia nouitatis declinanda sufficere videntur. Ad hunc enim finem potissimum allata sunt. Nunc obiectiones nonnullas audiamus & amoliamur.

Quid

*Quid respondere Astronomi soleant ad
obiectiones quæ contra senten-
tiam allatis auctoritati-
bus comprehensam
militare vi-
detur.*

Varie possunt & solent occurrere,
atque moueri obiectiones & difficulta-
tes, quæ aliquem ab ea sententia pro-
cul auertant, ne cum allatis auctoribus
Solem vel ignem, vel aliquid igneum ef-
se credat. Nam,

Obiectio 1.

Primo, Quandoquidem ex ipsis Ma-
culis, & Faculis constat, ipsum Solem,
in perpetua suimet ipsius consumptio-
ne versari, qua ratione fieri potest, ut
non tandem vel sensibilibus imminua-
tur, vel omnino absumatur, vel denique
exesa materia combustibili, extingua-
tur?

Solutio 1:

Respondent primo. Hoc eodem ar-
gumento multa quæ à condito mundo
huc usque ob oculos indubitata versan-
tur in controuersiam & dubium imme-
rito tamen vocari posse. nam ab orbe
condito, ex quo ex aquis extracta terra
paruit, & montium supercilia in aërem
exporrecta sunt, ipsi montes singulis
sensim annis tempestatum vicissitudine,
caloris & frigoris, humoris & siccitatis
aduersis atque alternantibus conflictat-
ionibus subacti decreuerunt; valles in-
tumuerunt; Oceani voraginosi specus
affluxu fecum terrenarum repleri cepe-
runt; ecquis tamen istarum vel diminu-
tionum vel accretionum, per tot nunc
secula talis sensus, qui spectantem è
longinquo monere possit? qui vel mon-
tium altitudini, vel vallium depressioni
aliquam sensibilem differentiam propor-
tionem ingerat?

Stant altissima Alpium iuga, neque
humiliantur, etiam si singulis annis inte-
gri montes è congelata, & confriata ip-
sorum summitate, ad vnius alteriusve,
palmi crassitiem, aquarum pluuiarum
impetu deuehantur; neque subiectæ id-
circo valles exsaturantur, aut adiacen-
tium Iugorum altitudinem affectant;
& mare ipsum illatæ terræ copia, neque
turgescit, neque littora supergreditur,
notabili saltem exundatione è sublimi
procul despicienti oculo,

Simili ergo ratione, tametsi suarum
partium depastione aleretur Sol, nihil à
nobis tam dissitis ad hanc diem esset
animaduertsum. Vnde aduersarius hoc
telo nihil efficit contra hanc sententiam
sed oportet ut aliunde alia arma expe-
diat, si quid effectum velit.

Solutio 2.

Respondent secundo. Montem Ve-
suuium, Aetnam, & plures alios in ter-
ra sempiterno ardentem incendio, adhuc
sensibilem magnitudinis suæ iacturam
non fecisse, licet vorax flamma iuge si-
bi cōuiuium ex ipsorum visceribus præ-
paret: finge nunc totum terrarum or-
bem, continua similium montium se-
rie constare; nunquid non spectatori a-
licui cælesti, eiusmodi inflammatus glo-
bus quendam quasi minorem Solem,
obijceret, absque vlla sui diminutione
sensibili, licet totius incendiij nutrimen-
tum ex ipsius ardentis globo singulis
partibus traheretur? Quota autem pars
est Aetnæ altitudo ad semidiametrum
terræ? & ipsa vnde ignis ille fouetur ma-
teria, quantam esse putas? minorem
certe ipso Aetna procul dubio, oportet
esse.

Et ipsam totius terræ semidiametrum
ad Solis semidiametrum, quantam arbi-
tratur? Igitur si vnum terræ montem
à tot sæculis ardentem & non consum-
ptum, neque sensibilibus in dicta distan-
tiæ ratione visum, diminutum videmus,
si terram ipsam consimili conflagratio-
ne in sua magnitudine persisturam fa-
tis intelligimus, quid est, quod de sup-
posito ardente Sole, simile quid fieri
posse, aut factum esse negemus, cum
oculis ipsis ita fieri in sublioribus istis
quotidie videamus?

Idem igitur Conditor Deus, qui Aet-
nā flagrantem, sine dicta sui diminutio-
ne fabricauit, potuit & ignitum Solem
sine vilo etiam decremento creare: an
autem sic vel secus fecerit aliunde pe-
tendum est.

Respondent tertio. Si ingenium hu-
manum, (id quod multi concedunt, &
factum esse arbitrantur, certe posse vl-
tro dant) ignem perpetuum in terra
artificiosum exsuscitare potest; sapien-
tiæ Dei non poterit accendere & peren-
nare in cælo naturalem? Ars nimirum
humana ex igne pabulum, è pabulo i-
gnem continuabit, & idem non poterit

Solutio 3.

I

in celo creatrix Dei sapientia, si libue-
rit? libuisse autem, isti volunt & sua-
dent ex allatis Phænomenis nouis, con-
solidantque priscis Sanctorum Patrum
auctoritatibus ex sacra Scriptura de-
promptis.

Solutio 4.

Respondent quarto. Si aurum igni-
tum non minuitur, etiamsi in flammis
perpetuo candescat; Sed quid dico au-
rum, multi id sentiunt de aqua, etiam
modica, quæ inclusa vasi vitreo, vi ignis
acerrime & diutissime applicati, licet re-
soluatur in tenuissimum & velut arden-
tem spiritum, aperto tamen canalis vi-
trei orificio, guttatim perstillat in ea-
dem prorsus, quantum assequi potest
sensus, mensura: si igitur aurum lique-
factum, si aqua ignita, etiam iugi ex-
carnificata flamma non consumitur: nō
sequitur ex eo, quod Sol ardeat, ne-
cessario absumptum iri. Si quod autem
acquirat & absumat, id per accidens e-
uenit.

Et confirmantur hæc multo amplius
ex pulueribus carbonum quibuscūque:
qui quamuis sint ignem conceptu & in
cineres redactu habilissimi; possunt ta-
men nihilominus & solent in testam-
certo artificio inclusi, igniri absque vlla
sui iactura, etiamsi ardentissima illa suc-
censio in dies & annos continuetur.
non audita, sed visa & facta narro. ne-
que deest hisce experimentis ratio phi-
losophica.

Solutio 5.

Respondent quinto. Ex Phænome-
no solari certissimum esse, Maculas So-
lis nasci & denasci, augeri & minui, il-
lustrari & obscurari, addensari & rare-
fieri, & tandem in illustres Faculas, So-
le reliquo clariores abire.

Hæc ergo, aut neganda esse, aiunt,
quæ tamen ob euidentiā experientię,
atque Phænomeni solaris negari nun-
quam possint, tot, tantis & tam mul-
torum roborata obseruationibus & te-
stimonijis, aut suum tandem relinquen-
dum & veritati locum, & Phænomeno
cursum: qui an huc tendat, acriora in-
genia facile sint perspectura: ipsi certe
huc tendere ex allatis persuasum habēt,
& alijs persuasum iri, momentis ratio-
num bene perpensis, haud ambigunt.

II.

OBIECTIO II.

Quandoquidem tantæ in Sole fiunt
5 mutationes, vt alternæ quodammodo
Solis partes sint lucidæ, alternæ vmbro-
sæ; Maculæque primariæ tertiam sæpe,
aut dimidiam orbis terreni partem quo-
dammodo adæquent imo & superent,
10 &c. Qui fit, vt oculus sanus, liber, hoc
non aduertat? ratio enim videtur hoc
suadere, debere huius rei fieri sensum,
si ita sese res habeat.

*Obiectio d
Maculis li-
bero oculo
non visis.*

Respondetur, sensum huius rei ideo
15 non fieri, quod lucidorum species sem-
per obtundant species non lucidorum,
etiāsi iuxta se sint posita, etiamsi non
lucida sint lucidis aut æqualia aut mul-
to maiora. Nam lucida hoc à natura
20 habent, vt speciem viuaciorem in vi-
sum mittant, quam non lucida; & sic
hæc ab illis suffocantur.

Solutio.

Huius rei experimenta sunt plurima.
quorū nō pauca inuenies in meo Ocu-
lo. Si quæ tamen Maculæ aliquando
ob nimiam magnitudinis enormitatem
sunt oculo libero visæ, non tamen fue-
runt pro ostento Macularum habitæ,
eo quod hoc Phænomenon illis tempo-
30 ribus ignoraretur, &c.

OBIECTIO III.

Si Sol esset ignis aut quid igneum,
35 posset ab oculo sano obrutu libero si-
ne offendiculo videri: Sed videri non
potest Sol ab oculo sano, obrutu libe-
ro sine offendiculo. Ergo Sol non est
ignis aut quid igneum.

*Obiectio ex
eo, quod O-
culus liber
aspectu solis
non ferat.*

Hæc obiectio, posset incautum for-
tasse & in eiusmodi rebus minus versa-
tum ingenium, de veritate eorum,
quæ ex Phænomeno hætenus dicta &
deducta sunt ambiguum reddere, eo
45 quod ipsa appareat vtcunque plausibi-
lis, & ad vulgi captum accommoda-
ta. Quippe tam vehementem ignem in
naturalibus sublunaribus, quem visus
bene affectus non ferat, non est facile
50 inuenire: vnde argumentum speciem
præ se fert triumphantis, &c.

Sed enim, re penitus inspecta & per-
specta, omnia euanescent, tanquam
55 puerorum crepitacula.

Yyy

Ad

Solutio.

Ad argumentum ergo in forma respondere, quando dicitur, Solem, si esset ignis, debere videri posse sine læsione ab oculo sano, obtutu libero: responderetur, si propositio vniuersaliter & de omni videndi modo intelligatur, esse falsam sequelam. nam potest dari ignis aut lux etiam ab igne tam vehemens, ut oculus etiam sanissimus ipsius vehementiam non ferat.

Exempla (ut taceam splendores visui intolerabiles artificijs optricis collectos) sunt in fulgetris & fulminibus naturalia quorum efficacia visum quoque sanum vehementer lædit.

Audi quid hac de re scribat Sanctus Chrysostomus, homil. in psalm. 134. super verba, *Fulgura in pluuiam fecit*. Vide rursus aliud mirabile, & diuersas naturas conuenientes. Neque enim fulgure est quidquam magis igneum: neque aquis est aliquid frigidius, & tamen miscentur nec confunduntur, neque contemperantur, sed vnaquæque conseruat suos fines. Manens enim ignis in aqua, & aqua in igne, neque hic illam exsiccauit, nec illa eum extinxit.

Atque fulgur est igne solari acutius, & splendidius, & eo magis secat ac diuidit. Id testatur visus, qui cum radiis Solis assidue congregatur: illius autem impetum ne tantillum quidem ferre potest. Et Sol quidem per totum diem cælum percurrit, illud autem minimo momento temporis vniuersum orbem terræ, quemadmodum Christus quoque testatur, &c. Hæc magnus ille & S. Theologus.

Si vero propositio sit tantum particularis, ut sensus sit, Solem si sit ignis debere tolerari ab aliquo saltem oculo sano, potest sequela admitti, saltem materialiter ut aiunt, non autem formaliter: quia ex eo si Sol igneus sit, necessario non sequitur, debere ipsum ab oculo quocunque tandem posse impune aspici; cum certum sit ipsius quoque ignis splendorem posse in infinitum intendi; non ergo sequitur necessario visui proportionatum iri: sed ut dixi, esto quod videndus sit; concessa igitur sequela maioris, negatur minor. & dicitur multos reperiri, qui saluo oculo Solem

intueantur: quorum ego nonnullos noui. Quod si modum Solis aspiciendi consideremus, iterum clarissime patet, tam sequelam maioris, quam minorem vacillare. Nam si Solis fulgor absolute in se tantus esset, & non potius magnitudo & talis lucidi secundum quid perspicui profunditas ipsum visui intolerabilem faceret; utique etiam particula ipsius quæuis oculum ab ipso inspiciendo auerteret, nam eiusdem rationis esse ipsius flamma ponitur. Quod autem particula ipsius visum à sui aspectu non arceat, manifestat Luna Solē eclipsans. Cum quia falcata Solis portio, non eclipsata, oculum indemnem admittit interea, dum Luna maiorem alteram adimit, teste experientia etiam mea; tum quod etiam cæli sydera conspicua fiunt, non obstante illa solaris lucis particula patente: quemadmodum multis historicis exemplis in prioribus planum feci.

Euidens igitur est, tale Solis segmentum ipsum plenæ Lunæ fulgorem non multum superare aut forte non adæquare in ordine ad potentiam videndi, cum constet in pleniluniis astra cæli satis hebescere, &c.

Cuius autem rationis est vna Solis lucidi particula falcata, non omnino absimilis est & totius. Videri autem potest vna sine damno oculi; possunt igitur & singulæ, successiue & discretè portione non magna præsentatæ, neque simul in oculum incurrentes.

Quod autem totum simul oculus non ferat aut impunitus aspiciat Solem ex nimia ipsius magnitudine & ab oculo distantia prouenit, ratione cuius plus de lucido ipsius hemisphærio videtur, & suffocatis non lucidis Macularum speciebus, partes illius illustres quasi optice condensantur, sub angulo acutissimo conspectæ, ut sic validius formale visus organum in fundo Retinæ concavo constitutum feriant; ad quod

humoris crystallini globositas plurimum confert
docente id quod
diana lentis
con-
uexæ experientia, &c.

I

II.

OBIECTIO IV.

Obiectio 4.

Nullus ignis videtur habere posse tantum splendorem ut efficiat diem; igitur non apparet probabile Solem esse ignem. Hæc obiectio affinis est priori, & in re non multum discrepat ab ea. Illic enim argumentum desumptum est in ordine Solis ad potentiam visiuam, quæ ignem sublunarem quemuis fert, Solem autem nequaquam: hic autem consideratur Sol in ordine ad mundum sublunarem, in quo illuminando diem efficit: qui effectus igni adscribi non posse videtur. Sed respondetur negando antecedens. Ignis enim magnus in vnum collectus hoc potest. Quod autem neque splendor Solis tantus sit ut diem clarum efficiat, nisi à Sole toto huc defluat, patet ex eclipsibus solaribus: quæ pro ratione obumbrati Solis, claritatem quoque diei imminuunt; quemadmodum antea dixi, & exemplis innumeris ostendi potest. Et ego plane puto, si aliqua Solis Facula aut portio illustris, iuxta æquale incendium poneretur, ut hinc spectaretur, æqualem etiam splendorem appariturum. Sed ne temerarijs imaginationibus isthæc proferre iudicer, en exemplum, in quo ignis sublunaris no-

Solutio.


Item in claritatem meridianam conuertit, idque Neapoli in Italia: uti refertur in Chronico, quod Neapoli prodijt anno 1626. euulgatore Antonio Carac-

*Ignis sublu-
naris diem
efficit.*

ciolo, è Manuscripto Codice Cassinensi; inscriptionem libro fecit; Antiqui Chronologi quattuor, &c. sic autem narrat.
Anno Dominicæ Incarnationis 1388. Indictione 11. Ianuario mense, die octauo, serotina hora vna & semis, visæ fuerunt à parte occidentis stellæ ire per cælum, sonitu horribilo versus Neapolim & Caietam, quæ quidem stellæ claritate erant præfulgidæ, & tanti splendoris, ut, quando earum discursus fiebat, esse videretur quasi medius dies, quantitate erant indiscretæ: nam aliquæ ipsarum tantæ quantitatis cernebantur, ac si essent magnæ trabes igneæ, &c.

Habes ergo ex igne sublunari noturno tempore factum diem.

Obiectiones aliæ vulgares, & ex triuio depromptæ iamque passim aliorum scriptis protritæ, vel proprio Marte à quouis soluendæ non adducuntur, ut tempori & studioso Lectori parcatur. Multis etiam ex dictis & dicendis passim obuiatur, ab ipsis qui producuntur auctoribus.



DE CÆLI

ET

SIDERVM NATVRALI

CORRVPTIBILITATE.

Pro Solis astrorum & cæli natura
corruptibili.

CAP. XXIII.

Auctoritates ex sacra Scriptura.



AUCTORITATES Sacrae Scripturae, quibus sancti Patres, & Doctores Ecclesiae Sanctorumque voluminum Expositores pro asserenda caelestium corporum corruptibilitate, passim vtuntur, sunt tam multae, vt omnes in vnum coaceruare non sit operae precium: satis ergo erit vltiores & magis tritas in medium proponere; nam abstrusiores sedulo Lectori, Scripturae atque Auctorum lectione facile occurrent.

Pro cala corruptibili loca sacrarum Scripturarum.

Genesis c. 1. v. 6. Dixit quoque Deus fiat Firmamentum in medio aquarum, & diuidat aquas ab aquis. Et fecit Deus Firmamentum. diuisitque aquas quae erant sub Firmamento. ab his, quae erant super Firmamentum. Et factum est ita; vocauitque Deus Firmamentum caelum.

Genesis cap. 7. v. 11. Rupti sunt omnes fontes abyssi magnae, & cataractae caeli apertae sunt.

Psal. 101. Initio tu Domine terram fundasti; & opera manuum tuarum sunt caeli. Ipsi peribunt, tu autem permanes: & omnes sicut vestimentum veterascunt. Et sicut opertorium mutabis eos & mutabuntur.

Psal. 103. v. 3. Extendens caelum sicut pellem, qui regis aquis superiora eius.

Psal. 148. v. 4. Laudate eum caeli caelorum, & aquae quae super caelos sunt, laudent nomen Domini.

Danielis c. 3. v. 60. Benedicite aquae omnes quae super caelos sunt Domino:

1 Benedicite omnes virtutes Domini Domino.

Isaiae c. 34. v. 4. Et tabescet omnis militia caelorum, & complicabuntur sicut liber caeli: & omnis militia eorum defluet, sicut defluit folium de vinea & de ficu.

5 Isaiae cap. 51. v. 6. Leuate in caelum oculos vestros, & videte sub terra deorsum: quia caeli sicut fumus liquefcent, & terra sicut vestimentum atteretur, & habitatores eius sicut haec interibunt: salus autem mea in sempiternum erit.

10 Isaiae 55. v. 17. Ecce enim ego creo caelos novos, & terram nouam: & non erunt in memoria priora, & non ascendent super cor.

15 Eiusdem, c. 66. v. 22. Quia sicut caeli noui & terra noua, quae ego facio stare coram me dicit Dominus, sic stabit semen vestrum, &c.

20 Iob 14. v. 12. Homo cum dormierit non resurget, donec atteratur caelum non euigilabit, nec consurget de sono suo.

Pro-

II.

II.

Prouerbiorum capite octauo, versio, 27. & 28. Quando preparabat celos aderam, quando certa lege & gyro vallabat abyssos, quando æthera firmabat sursum, & librabat fontes aquarum.

Ecclesiastici cap. 17. v. 30. Quid lucidius Sole? & hic deficiet.

Matth. cap. 24. v. 29. Statim autem post tribulationem dierum illorum Sol obscurabitur, & Luna non dabit lumen suum, & stellæ cadent de cælo, & virtutes cælorum commouebuntur.

Eadem habentur apud Marcum, cap. 13. v. 25. Apud Lucam cap. 21. v. 25.

Apocalip. cap. 6. vers. 13. Sol factus est niger tanquam saccus cilicinus: & Luna tota facta est sicut sanguis; & stellæ de cælo ceciderunt super terram, sicut ficus emittit grossos suos cum à vento magno mouetur: & cælum recessit sicut liber inuolutus.

Matth. cap. 24. v. 35. Marci 13. v. 31. Lucæ cap. 21. v. 33. Cælum & terra transibunt, verba autem mea non præteribunt.

1. ad Corint. 7. v. 31. Præterit enim figura huius mundi.

Apoc. cap. 20. v. 11. Fugit terra & cælum, & locus non est inuentus eis.

Ad Rom. c. 8. v. 20. Vanitati enim creatura subiecta est.

Epistola Petri secunda, cap. 3.

Venient in nouissimis diebus in deceptione illustres, iuxta proprias concupiscentias ambulantes, dicentes, ubi est promissio, aut aduentus eius, ex quo enim Patres dormierunt, omnia sic perseverant ab initio creaturæ. Latet enim hoc volentes, quod cæli erant prius & terra, de aqua & per aquam consistens Dei verbo: per quæ ille tunc mundus aqua inundatus perijt.

Cæli autem qui nunc sunt, & terra eodem verbo repositi sunt, igni reseruati in diem iudicij, & perditionis impiorum hominum. & paullo post.

Adueniet autem dies Domini vt fur, in quo cæli magno impetu transient, elementa vero calore soluentur, terra autem & quæ in ipsa sunt opera exurentur.

Cum igitur hæc omnia dissoluenda sint, quales oportet vos esse in sanctis conuersationibus & pietatibus, expectantes & properantes in aduentum diei Domini, per quem cæli ardentes soluentur, & elementa ignis ardore tabescent? Nouos vero celos & nouam terram, secundum promissa ipsius expectamus.

Apocalip. cap. 21. v. 1. Vidi cælum nouum & terram nouam. Primum enim cælum & prima terra abiit, & mare iam non est.

Ibidem v. 5. Et dixit qui sedebat in throno: Ecce noua facio omnia. Et dixit mihi scribe: quia hæc verba fidelissima sunt & vera.

Ex allatis & alijs similibus sacre Scripturæ testimonijs Sancti Patres, & alij Classici Scriptores, propriè & ad litteram: intellectis, arbitrantur naturam cælestium ita clare corruptioni obnoxiam, ostendi, vt maiore probatione res non egeat, neque vllus tergiuersandi locus in contrarium supersit.

Quod si aliqui ad metaphoricas, aut allegoricas locutiones confugiendum esse existiment, aiunt id sine necessitate fieri non debere, sed sermonis proprietati inhærendum, quamdiu res, & sensus litteralis absque notabili præiudicio id patiatur. neque gratia cuiuscunque aliter sentientis, contra planum atque expressum Scripturæ textum, quidquam essendandum, id quod operis progressu clare perspicias, ex verbis Auctorum.

Quot autem & quanti Patres pro locis citatis stent, videri potest, partim in prioribus auctoritatibus pro cælestium natura ignea productis, partim ex ijs quæ paullo post de fluida ipsorum substantia depromuntur.

Nam materiæ hæ, De ignea, De Corruptibili, De Liquida Cæli natura, ita inter se connexæ sunt, vt vna absque altera tractari vix possit. Loca igitur vtrinque allata, harum rerum studioso inspicienda & sedulo trutinanda sunt.

Nam quicumque naturam corporum cælestium igneam amplectuntur, ij vtrique omnes haud dubiè eorundem

I

corruptibilitati subscribunt: ad quos merito annumerandi sunt, qui totum uniuersum ex quattuor elementis componunt: qui omnibus quæ in mundo sensibili constant, eandem materiam primam attribuunt; si in via Aristotelica consequenter philosophari volunt: qui ex aquis elementaribus cælum effectum docent: qui cælum CrySTALLINUM seu verè congelatum astruunt: qui denique cælum aërium, aut mixtum ex elementis pluribus coagmentatum agnoscunt.

Facile autem mihi persuadeo, eorū numerum, quos pro Sole atque cælo igneo in aciem produxi (demptis philosophis, omiſſis Mathematicis, post habitis Physiologis, quorum seges ingens existit) ad quinquagenarium peruenturum. Nunc ad propositum nostrum ex proprijs de corruptibilitate non omnes, sed exempli tantum causa paucos loquentes audiemus: sunt enim nimis multi, & omnes ipsorum libri hisce rebus pleni.

PRO CAELI SYDERVM QVE
natura corruptibili, Auctoritates
SS. Patrum & Ecclesiæ
Doctorum.

Secundum Ioannem Chrysostomum
omnia mundi corpora sunt
corruptibilia.

Sanctus Ioannes Chrysostomus
tom. 2. in cap. 9. Matth. homil. 32.
pag. 251. Hæc quæ videmus, inquit,
omnia cum sint caduca & instabilia,
nunquam eadem permanent: omnia,
enim transfigurabuntur, & cælum,
& terra, & maria.
Idem in cap. 5. Matth. tom. eod.
hom. 40. pag. 696. Quia nisi hæc facta fuissent, (Natiuitas, vita, passio,
& mors Christi, descensio ad inferos,
Resurrectio, Ascensio ad Cælos, &c.)
nunc autem omnes (Prophetæ) impleti sunt, & adhuc implebuntur, cum
stella ceciderint, cum Sol tenebratus fuerit, cum cælum plicatum fuerit sicut liber.

Idem vel potius, in eodem tomo,
pag. 943. in Cap. Matth. 24. Auctor
Operis imperfecti, super verba: Cæ-

II.

lum & terra transibunt, verba autem mea non prateribunt. Quia cælum & terra ad ministerium vestrū creata sunt, verba autem mea ad gubernationem vestram disposita.
Cælum & terra vanitati subiecta sunt, dicente Apostolo, Rom. 8. vanitati enim creatura subiecta est. Naturaliter autem veritas nescit mentiri, nec potest aliquando perire.

Idem tom. 3. pag. 792. serm. in Pentecoste de Spiritu sancto. Et quomodo consequenter omnis Christianorum munda mens non comprobatur purum cælum, imo etiam cælo preciosior? Cæli enim peribunt, fideles autem permanent in sæculum, quotquot Deum intrinsecus in se ipsis ferunt & vident.

Ex tomo quarto, pag. 142. in epist. ad Rom. cap. 8. Si cæli huius partes eæ, inquit, quas ad nos conuersas vides, tanta sunt tamen tum pulchritudine, tum delectatione: quales tandem esse possint superiores illæ partes quale item cæli cælum esse debeat? Quandoquidem autem nobis id non licet corporeis oculis nunc contueri, cogitatione sursum ascendito, supraque hoc cælum stans, oculos conuertito ad cælum illud hoc nostro superius, ad illam altitudinem nullo fine circumscriptam, ad horroris plenū lumen, ad illos Angelorum populos, ad illas Archangelorum nationes immensas, ad illas alias incorporeas virtutes: & post.

Cælorum enim, inquit, virtutes quantientur: tum enim uniuersum cælum aperitur, tum conuexorum illorum valua relaxantur, &c.

Ex eodem tomo 4. pag. 244. in epistolam eandem, cap. 15. Nam & de futuris, ait, different tibi carmina Daudica, & de inuisibilibus, & de inuisibili creatione, ac de ipso Cælo. Vis discere num in hac statione Cælum sit mansurum, aut aliquando immutandum? Apertè tibi respondebit ac dicet. Quoniam cæli sicut vestimentum inueterascent, & velut amictum inuolues eos, & mutabuntur. Psal. 101. Et de figura, formaque cæli, si velis audire, audies omnia: Qui extendit cælum, inquit, sicut pellem. Et si de

supe-

I

superioribus ac superficie illius amplius quid cognoscere volueris, dicet tibi rursus. Qui tegit aquis superiora eius. Et neque hic consistit, sed & de latitudine atque altitudine illius differuit, ostendens utrobique eandem & æquam esse mensuram. Quantum distat ortus, inquit, ab occidente, tantum elongavit à nobis iniquitates nostras, secundum altitudinem cæli à terra corroboravit misericordiam suam Dominus erga timentes se.

Ex eodem pag. 133. in epistolam ad Rom. cap. 8. hom. 14. Quippe vanitati, inquit, creatura subiacet, non volens sed propter illum, qui subiecit illam.] Quid hoc sibi vult, Vanitati creatura subiacet? *Corruptibilis effecta est.* Quo nomine, & quam obrem? Propter te hominem. Quandoquidem enim corpus accepisti mortale & patibile, idcirco & terra execrationem accepit, & spinas tulit, ac tribulos. *Quod porro cælum una cum terra veterascens, in melius desinens mutabitur, audi Prophetam dicentem:* Initio tu Domine terram fundasti, & opera manuum tuarum sunt cæli. Ipsi peribunt tu autem permanes, & omnes tanquam vestimentum veterascent, & quasi amictum conuolues ipsos & immutabuntur.

Et Esaias cap. 51. Item hæc plana faciens dixit: Inspicite in cælum sursum, atque in terram deorsum: *quod cælum tanquam fumus firmatum est, terra autem tanquam vestimentum veterascet, illiusque incolæ tanquam hæc interibunt.*

Vides ut vanitati seruiuit creatura? & quo pacto liberatur à corruptione? ille enim ait, quasi amictum conuolues ipsos, & immutabuntur. Esaias autem, *Illius incolæ tanquam hæc peribunt, non omnimodum dicens interitum, neque enim illius incolæ, hoc est, homines ipsi talem interitum patientur, sed temporalem, ac per illum ad immortalitatem transmutabuntur, quemadmodum & creatura. quæ omnia his verbis, tanquam hæc significauit: sicuti & Paulus in progressu ait.*

Nunc vero de ipsius seruitute di-

II.

1 „ sputat, ostenditque qua causa talis
„ effecta est. Causam autem ipsos nos
„ ponit. Quid igitur, iniuriæ illi il-
„ lata est, cum ob alterum hæc passa
5 „ sit? nequaquam. etenim propter me
„ facta est. quæ igitur propter me fa-
„ cta est, ea quo pacto iniuria afficia-
„ tur, si hæc illam pati contingat in-
„ mei correctionem? alioqui autem
10 „ quoties iusti & iniusti ratio habetur,
„ non debet me mouere, si quis mihi
„ obstrepat, de inanimatis ac sensu
„ carentibus.

„ Sed Paullus, quandoquidem ip-
15 „ sam per prosopopæiam induxit, nul-
„ la rationum harum, quas dixi usus
„ est, sed alia quadam auditorem su-
„ pra modum consolari studens: qua-
„ li quaeso?

20 „ *Quid ais, inquit, male affecta prop-
„ ter te, & corruptibilis facta est.* verum
„ nullam illa ne sic quidem iniuriam
„ accepit. Eadem propter eundem te
„ rursus immortalis futura est. Hoc e-
25 „ nim sonat verbum id sub spe. Quum
„ autem dicit non volens subiacet, id
„ non dicit ut illam ostendat sententiæ
„ dominam esse, sed ut intelligas ne-
„ gotium totum Christi curam fuisse,
30 „ non creaturæ eiusdem beneficium.
„ hoc vero dicito & quamam spe? Quo-
„ niam & ipsa creatura liberabitur.
„ Quid id verbi est & ipsa? non tu so-
„ lum, sed & quod te inferius est, quod-
35 „ que particeps non est, nec cogitatio-
„ nis nec sensus, vel hoc ipsum bono-
„ rum tecum communionem habitu-
„ rum est.

„ Liberabitur enim, ait, à seruitute
40 „ corruptionis. Hoc est, non amplius erit
„ corruptibilis, sed corporis tui venusta-
„ tem sequetur. Nam quemadmodum
„ corruptibili te effecto, & ea quoque
„ corruptibilis est effecta: sic incorrupti-
45 „ bili effecto te, & ipsa quoque subsequetur,
„ comesque tibi erit, quod declaras
„ addidit: in libertatem filiorum Dei,
„ hoc est, propter libertatem. Et paullo
„ post, confirmat hæc eadem, ex alio
50 „ Paullinæ epistolæ loco, 1. ad Corin.
„ cap. 7. sic.

„ Porro autem cum ostenderet fore,
„ ut una cum corporis interitu, & re-
„ rum item humanarum status euane-
55 „ scat intereatque, scripsit rursus alio
„ quo-

Stellarum
interitus.

quodam loco; Præterit figura huius
mundi.

Ex tomo quinto, pag. 618. Ad
Neophytos Homilia. Illæ (stellæ cæ-
li) sæculorum confusione depereunt,
hæ (stellæ terrestres, iusti) tempo-
rum fine sese clariores ostendunt.
De illis etenim dictum est, Quod stellæ
de cælo cadent, sicut cadunt folia de
vite: de his autem, fulgebunt inquit,
iusti sicut stellæ cæli. Quid sibi vult
quod dixit: sicut cadunt folia de vite,
sic stellæ de cælo cadent? Sicut enim
vites cum vuarum fructibus prægra-
uantur, foliorum auxilium necessa-
rium, ut protegantur exposcunt: cū
autem deposuerint fructum, necesse
est ut folijs denudentur: sic se habet
hoc sæculum: quamdiu habuerit in se
humanum genus, tenebit & cælum
stellas, sicut & vitis folia. Nam nocte
pereunte, sine dubio stellarum utilitas
simul cum nocte deficiet.

Igneæ stel-
larum natura

Illarum ignea natura stellarum est,
& istæ edocentur igneam fortiri na-
turam. Sed ibi quidem ignis, quem
humanus sensus inuenit: hic autem
quem secreta mentis ostendunt. &
mox. Illis quidem stellis nomina
hæc sunt:

Orion, Mezaroth, Arcturus,
Vesperus, Lucifer.

Stellæ vere
de cælo verè
cadent.

Ex quo appareat secundum hunc san-
ctum Patrem, veras de cælo firma-
menti stellæ, non meteora nescio
quæ commentitia ex aëre decasu-
ra, &c.

Ex eodem, pag. 976. De incom-
prehensibili Dei natura, homil. 3.

Cælum hoc formam quidem cō-
camerati gerere nouimus, Idque non
ingento nostro & ratione, sed diuinæ
scripturæ sententia, complectique idem
vniuersam terram non ignoramus,
quod & ipsum ab eodem diuino fonte
hausimus.

Sed qua substantia constet nesci-
mus. Dicat qui contendit, & se no-
uisse affirmat, quid substantiæ cælū
sit: Num humor quidam in gelu cō-
cretus? num obdensata nubes, & in
spissiore obducta substantiam? num
aer crassus & corpulentior? Nemo
certe quid sit plane edocere potest.
Quod si ita est, quis præterea postu-

Substantiā
cæli in spe-
cie ignora-
tus.

let argumentum, quo amentiam in-
telligat & furorem eorum, qui Deum
quid sit se scire autumant? Cæli, quod
quotidie cernis, naturam reddere ne-
quis, & inuisibilis Dei substantiam
scire indubie profiteris?

Ex eodem, pag. 376. Ad populum
Antiochenum, homil. 69. Noli hoc
cogitare quod ille non vterius huc
regreditur, sed quod nec ista quæ
cernuntur, permanent talia, verum
& ipsa transformantur. Etenim & Cælum, &
cælum, & terra, & mare, & omnia terra, & ma-
transmutantur, tunc cum maiori glo-
ria filium tuum recipies.

Ex eodem, pagina 845. & 846. in
Parenesi ad Theodorum Lapsam, e-
pistola quinta.

Tum aperientur, inquit, cælestium
fastigiorum portæ, imo stud ipsum
cælum è medio subducetur, haud ali-
ter atque scena pelles, ac velum contra-
hitur è medio, ut commutetur in
melius.

Hucusque magnus istæ Ecclesiæ
Doctor, qui ex Scriptura cæli corru-
ptibilitatem pro re indubitata vbi-
que in medium profert: cuius omni-
modam abolitionem negat quidem,
sed mutationem physicam haud du-
biè astruit; solam à motu locali ces-
sationem penitus ignorat. Quæ cælo
physicè nil addit melius, alioqui per
motum euasisset deterius.

SECUNDVM S. BASILIVM
Sol & Cælum sunt corru-
ptibilia.

Sanctus Basilius in homilia 6. He-
xaem. tomo primo, pag. 69. litt. C. editionis Parisiensis anni 1618. ita
scribit.

Si magnitudo cæli mentis huma-
næ metiendi facultatem exuperat:
quænam mens, quis intellectus, quæ-
so, rerum inuestigare sempiternarum
naturam posset?

Si Sol istæ corruptioni subiectus, a-
deo pulcher est, adeo magnus, velocissi-
mus quidem motu, suas autem pera-
gens ordine decentissimo periodos,
moderata quidem ad vniuersum præ-
ditus magnitudine, ut haudquaquā
proportionem toti reliquæ machi-
næ

S. Basil. ea-
dem docet.

Sol iste cor-
ruptibilis.

I

næ ad mensuratam transgrediatur: pulchritudine vero naturæ quasi quidam oculus splendidus creaturâ ipsam condecorans, cuius si aspectus insatiabilis est, qualemnam ipsum esse iustitiæ Solem arbitrari nos debemus.

Idem tomo eodem, pag. 249. in psal. 44. litt. C. ita scribit.

„ Seminatur, inquit, Apostolus in corruptione, surget in incorruptione. Vides mutationem?

Seminatur in infirmitate, surget in virtute. Seminatur corpus animale, surget corpus spirituale.

„ Videsne mutationem hanc? Ea, porro fiet, cum omnis nobiscum im- mutabitur corporalis creatura. Etenim cæli quoque ipsi, vt vestimentum veterascent, & sicut opertorium mutabit eos Deus, & mutabuntur. Tunc & Sol erit septuplo maior, vt ait Esaias: & Luna tanta erit, qua nunc est Sol amplitudine. Necesse enim sit, (ait idem Sanctus Pater homil. 1. Hexaem. pag. 6. litt. C.) vt credas mundum hunc oportere immutari, si modo nihil diffidis statum animarum in aliam longe dissimilem vitæ speciem reformatum iri ac permutandum.

Quemadmodum enim vita hæc temporaria cognatam obtinuit, & huic mundo conformem naturam: itidem & secuturæ illius vitæ ratio, sortem conditionemve exceptura est animum nostrarum statu commo- dissimè respondentem.

„ At vero illi (Philosophi) tantam abest, vt verissimis hisce dogmatis animum aduertant suum, vt quoties cum illis conferimus de mundi consumatione, deque regeneratione seculi, in effusissimum risum se resoluant ac laxent; nosque quasi deliros deridiculis sannis proscindant & insectentur.

Et non multo ante, pag. 5. Itidem & tu per hoc, quod corpora hæc quæ orbiculari ciuntur motu, intelligis quasi mutua conspiratione & concordii annutu in se ipsa versari.

Sollerter prospice, ne ipsa eorum æquabilis motio, nec vlllo prorsus intercisâ medio errorem tuæ menti in-

II.

1 „ stillet, aut insertum relinquat, quo
„ male persuasus credas, mundum hunc
„ vt nullam aliquando sortitum origi-
„ nem, ita nec vlllo fine olim contra-
5 „ hendum, Præterit enim figura mun-
„ di huius. Et cælum & terra transi-
„ bunt. vtrumque hoc dogma certo
„ præcinens futuram consumationem
„ mundique in melius permutandi in-
10 „ nouationem, ipsa eadem complecti-
„ tur, quæ & hic verborum compen-
„ dio ad nostram omnium qualemcū-
„ que, nempe elementarem institutio-
„ nem doctrinæ sibi diuinitus aspiratæ
15 „ Moses tradit, dicens: (In principio
„ fecit Deus) Quæ ex tempore ceperūt
„ necesse prorsus, eadem vt aliquando
„ desitura sint & consummenda. Si e-
„ nim temporale initium sortita sint,
20 „ noli de fine dubitare.

Nota bene Lector verba tanti Patris & Philosophi. Plura quæ istius S. Doctor de cæli corruptibilitate ex sacris Scripturis affert, passim in ipso occurrunt, neque enim omnia huc congerere est animus, cum non pauca dicta sint superius vbi de natura cæli ignea agimus, & inferius etiâ de cæli fluida substantia testimonia egregia pro hac sententia sint ex ipso producenda. Nam materiæ istæ ita affines sunt inter se, vt seorsim tractari vix possint: id quod sæpe moneo, ne mireris si permixtim etiam testimonia conglobo.

Secundum sanctum Ambrosium, Sol, stella, & cælum sunt corruptioni obnoxia.

Ex Diuo Ambrosio lib. 1. Hexaem. cap. 6. sequentia habentur.

„ Satis est, inquit, ad præsentem assertionem, quod in principio cælum fecerit, vnde generationis causâ, & terram in qua esset generationis substantia.

„ In his enim elementa creata sunt, ex quibus generantur omnia ista quæ mundi sunt. Elementa autem quatuor aer, ignis, aqua & terra, quæ in omnibus sibi inuicem mixta sunt.

„ Siquidem & in terra ignem reperies, qui ex lapidibus & ferro frequenter excutitur: Et in cælo, cum sit igni-

1. Cor. 7.
Matth. 24.

S. Ambr. yf-
dem fortissi-
me suffragatur.

Ex quat-
tuor elemen-
tis sunt om-
nia, & ipsa
in omnibus.

Græcis S.
Basil. admo-
nitio circa
Mundi incor-
ruptibilita-
tem. &c.

I

ignitus & micans fulgentibus stellis
 polus, aqua esse possit intelligi, quæ vel
 supra cælum est, vel quæ de illo supe-
 riore loco in terram largo frequenter
 imbre demittitur. & post. De natura
 autem & qualitate substantiæ cæli,
 quid enumerem ea quæ disputatio-
 nibus suis philosophi texuerunt? cum
 alij compositum cælum ex quattuor
 elementis asserunt, alii quintam
 quandam naturam corporis, ad con-
 stitutionem eius inducant, atque affin-
 gant æthereum esse corpus, cui neque
 ignis admixtus sit, neque aer, neque
 aqua, neque terra: quod huiusmodi
 elementa suum quendam cursum
 habeant atque usum & motum natu-
 ræ, ut grauiora demergant & in pro-
 num ferantur, vacua & leuia in su-
 periora se subrigant. Est enim pro-
 prius cuique motus. In sphaeræ au-
 tem circuitu ista confundi, & vim
 sui cursus amittere, quoniam sphaera
 in orbem suum voluitur, & superio-
 ra inferioribus, superioribus quoque
 inferiora mutantur.

Sententiam
 philosopho-
 rum pro quin-
 ta cæli essen-
 tia graphice
 describit.

Quorum autem secundum natu-
 ram motus mutati sunt, horum ne-
 cessario ferunt mutari solere qualita-
 tes substantiarum suarum. Quid igitur
 defendimus æthereum corpus
 esse, ne videatur corruptioni obno-
 xium? Quod enim compositum ex
 corruptibilibus elementis est, necesse
 est resoluiatur. Nam hoc ipso quod
 diuersæ sint elementa nature, simpli-
 cem & inuiolabilem motum habere
 non possunt, cum se diuersus ele-
 mentorum motus impugnet. Vnus
 enim motus omnibus aptus esse non
 potest, & elementis distantibus con-
 uenire. Nam qui leuibus accommo-
 dus est, fit incommodus grauioribus.
 Itaque quando ad superiora motus
 est necessarius, terrenis grauatur:
 quando ad inferiora decursus expe-
 titur, igneus vigor ille violenter attra-
 hitur. Etenim contra naturæ suæ vi-
 sum deorsum cogitur. Omne autem
 quod in contrarium cogitur, non
 naturæ seruiens, sed necessitati, cito
 soluitur, & in ea sciinditur, ex quibus
 videtur esse compositum, in suam
 quamque regionem singulis recur-
 rentibus.

II.

Hæc igitur illi considerantes, stabi-
 lia esse non posse, æthereum corpus cæli
 stellarumque esse arbitrati sunt, quin-
 tam quandam naturam corporis in-
 troducentes, quo diuturnam caliputa-
 rent esse substantiam.

Sed non ista opinio Prophetica potuit
 obuiare sententiæ, quam diuina quoque
 Domini Iesu Christi, Deique nostri ma-
 iestas in Euangelio comprobauit. Di-
 xit enim Dauid, Principio terram
 tu fundasti Domine, & opera manuum
 tuarum sunt cæli. Ipsi peribunt tu au-
 tem permanes, & omnia sicut vesti-
 mentum veterascent, & tanquam
 amictum mutabis ea, & mutabuntur:
 tu vero ipse es, anni tui non deficient.
 Quod adeo probauit in Euangelio Do-
 minus, ut diceret: Matth. 24. Cælum
 & terra transibunt, mea verba non
 præteribunt. Nihil igitur agunt, qui
 propter cæli asserendam perpetuitatem,
 quintum corpus æthereum introducen-
 dum putarunt, cum æque videant
 dissimilem cæteris adiunctam mem-
 bri vnius portionem, labem corpo-
 ri magis asserre consueuisse.

Simul illud aduerte, quia Prophe-
 ta Dauid, cum terram priori loco no-
 minauit & postea cælum, credidit opus
 esse Domini declarandum: ne saltem
 prærogatiua primogenitura cælum di-
 uine videatur adiudicari substantiæ,
 cum primogenitura creature priuile-
 gio potius æstimetur.

Quando ergo dixit, & facta sunt:
 simul vtrumque factum esse designa-
 uit. Nihil ergo interest, quid prius
 exprimas, cum scriptum sit, qui viuit
 in sæculum, creauit omnia simul.
 Itaque illos suis relinquamus conten-
 tionibus, qui mutuis disputationibus
 se refellunt.

Nobis autem satis est ad salutem,
 non disputationum controuersia, sed
 præceptorum veritas: nec argumen-
 tationis altutia, sed fides mentis, ut
 seruiamus Creatori potius quam
 Creaturæ.

Ex eodem de Abraham, lib. 2.
 cap. 8. pag. 125. Vnde & Philoso-
 phi superiorem mundi huius substā-
 tiam, quem æthera vocant, non ex
 cæterorum admixtione elementorum

Pro perenni
 cæli conser-
 uanda sub-
 stantia, quin
 tam essentiā
 inuenerunt

I.

Philosophorum iterum recenset, & refutat sententiam. *Sua igitur ab illis non haufit.*

rum constare volunt: sed splendidam
& multo refulgentem lumine, quæ
non terræ fordidum, nec aquarum
humidum, nec aëris nebulosum, nec
ignis ipsius rutilum quidquam reci-
piat, ex quinta quadam usque esse asse-
runt; & veluti volucrem Mundi hu-
ius mentem velociorem puriorem-
que esse cæteris partibus: nam
aliæ mixtæ sibi & concretæ sunt.

Nos autem nihil materialis com-
positionis immune atque alienum pu-
tamus, præter illam solam veneran-
dæ Trinitatis substantiam, quæ vere
pura & simplex sincera impermixta
que natura est. Ex eodem, tomo 5.
p. 233. Comment. in cap. 21. Apoc.
Et vidi cælum novum & terram no-
uam. Primum enim cælum & prima
terra abiit, & mare iam non est.

Cælum & terra & cætera elemen-
ta qua modo videmus, ab igne consu-
mentur, non ut penitus deleantur, sed
ut in meliorem statum, sicut superius
iam diximus, per ignem reparentur,
sicut Psalmista indicat, dicens: ipsi
peribunt, tu autem permanebis, &
omnes ut vestimentum veterascent, &
velut amictum mutabis eos, & mu-
tabuntur. Quod dicit primum cælum, &
prima terra abiit; speciem eiusmodi
cæli ac terræ transfiguram esse demon-
strat. Species enim eorum non essentia
transibit, cum in meliorem statum
commutabuntur.

Quod vero infert, & mare iam
non est, possumus secundum litte-
ram intelligere, ut mare penitus de-
leatur.

Eadem ferme dicit, tom. 2. p. 295. lib. 1. in Iob, cap. 7. super illa verba:

Cum autem dormierit homo, non
resurget usque dum cælum assuatur.

Ex eiusdem tom. 5. pag. 141. Epi-
stolarum, lib. 5. Epistola ad Episco-
pum Horontianum. Sed quia vani-
tati etiam celestis subiecta creatura
est, licet istud in spe; etiam horum
perfidiam & temulentiam vanitate
huius mundi lapsam pertinere ad ve-
niam parietur veritatis pietas, & re-
demptio vniuersitatis.

Ergo ut concludamus, & ille tan-
tus, ac talis Sol, & illa Luna, quam
noctis tenebræ non operiunt, & illa

II.

Stella quæ sunt ornamenta cæli, serui-
tutem corruptionis nunc sustinēt, quia
corruptibile omne corpus. Siquidem
& cæli peribunt, & cælum & terra
præteribit. Postea autem & Sol, &
Luna & cætera stellarum lumina re-
quiescent in gloriam Filiorum Dei,
quando erit Deus omnia in omnibus:
qui & in te & in nobis sit per suam
plenitudinem & misericordiam.

Idem tom. 2. pag. 461. super illa
verba Psalm. 118. In æternum Domi-
ne permanet Verbum tuum in cælo:
Ait, cælum vetus transfigurum, &
futurum novum &c.

Scholia in S. Ambrosium.

Ex his habes, primo, Hunc San-
ctum Patrem suam de cæli corrupti-
bilitate doctrinam ex Sacra Scriptu-
ra, non autem incredulis Philosophis,
quos refutat, didicisse. secundo. Pro
contraria sententia ipsum male à
nonnullis intelligi & citari. tertio.
Cælum mutandum non sola motus
localis cessatione: sed quarto. Vera
physica alteratione, instar terræ. i-
deoque quinto. Comburendum igne.
& sic sexto. In formam elegantiorē
restaurandum, & qualitatibus nobi-
lioribus adornandum: neque septi-
mo, ut aliqui putabant, in nihilum
redigendum; sed sicut terra, & no-
stra corpora corrupta, ita & cælos
igne vastatos reparatum iri, &c.

Secundum S. Hieronymum, Sol, astra,
& cæli sunt corruptiles. ex
editione Parisiensi
1609.

S. Hieronymus tom. 2. pag. 349. Ad stipula-
tur dictis S. Hieronym.
in Isaia, cap. 51. Super illa verba,
Leuate in cælos oculos vestros, &
videte sub terram deorsum: quia
cæli sicut fumus liquefcent, &c.

Hoc est quod Dominus loquitur in
Euangelio, Matt. 24. Cælum & ter-
ram transibunt, verba autem mea
non præteribunt. Et David in psal-
mo 101. canit. A principio tu Domi-
ne terram fundasti, & opera manuum
tuarum sunt cæli. Ipsi peribunt tu au-
tem permanes, & omnes sicut vesti-
mentum

Cæli & ter-
ra cōstigra-
bunt.

Putat mare
omnino abo-
lendum.

I

mentum veterascent. Et sicut pallium
inuolues eos, & mutabuntur. Ex quo
ostenditur, perditionem calorum non
interitum sonare, sed mutationem in
melius. De quibus dicitur: erit calum
nouum & terra noua: quæ ego faciam
permanere in conspectu meo.

Si enim de Sanctis scriptum est:
non omnes quidem dormiemus, sed
omnes immutabimur: & in quattuor
psalmorum titulis legitur: Pro his
qui immutabuntur: Quanto magis
hoc de calo, ac Sole stellisq. credendum
est? quando Luna Solis lumen acci-
piet, & Sol septuplo fulgore rutila-
bit? Vnde & omnis creatura conge-
misit, & parturit, expectans reue-
lationem filiorum Dei, vt mutetur in
melius. Et non solum animæ homi-
num, quæ immortales sunt, sed &
corpora commutentur in glorifica-
tam substantiam.

Oportet enim corruptiuium hoc
inducere incorruptionem, & mortale
hoc inducere immortalitatem.

*A calorum
interitu ar-
gumentatur
ad mortem
hominum.*

Cum autem calum veterascat &
terra: consequenter & ea quæ celi cir-
culo continentur, & homines qui sunt
habitatores terræ, sicut hæc morientur:
non in interitum sui, sed in abolitionem
vilitatis antiquæ, & innouationem fu-
turæ gloriæ: quando fulgebunt iusti
sicut Sol, & abeuntibus præteritis at-
que antiquis, facta fuerint omnia
noua.

Quidam perire & veterascere, pro
abolitione & morte accipiunt: iuxta
illud quod in Catholica epistola le-
gimus: Cæli qui nunc sunt & terra,
eodem verbo reseruata sunt igni.
Et iterum: elementa ardentia soluen-
tur. Quæ quidem & Philosophorum
Mundi opinio est, omnia quæ cerni-
mus igni peritura: vnde & Aposto-
lus: Pertransit, ait figura mundi hu-
ius, contemplantibus nobis non ea
quæ videntur, sed quæ non viden-
tur.

1. Ioā. 2. v. 6.

Quæ enim videntur temporalia sunt,
quæ autem non videntur æterna. Ta-
le quid & Ioannes Apostolus scribit:
(1. Ioan. 2. v. 6.) Mundus pertransit,
& desiderium eius. Et in Hebraico
dicitur: Cæli sicut fumus liquefcent.
Siue iuxta Aquilam & Symmachum:

II.

Comminuentur in nihili. & in salis
modum conterentur, & euanescant.
quorum prior dixit: μεταβολή: alter
ἀλλοιούμεναι, quod à comminutione &
deliquio salis ἐνυμολογία, trahere ma-
nifestum est. Pro quo miror quid
voluerint Septuaginta, ὁ θρανὸς ὡς κα-
πνὸς ἐξεργάσθαι, idest, calum sicut fu-
mus firmatum est. Si enim firmitas
pro robore accipitur, quomodo fu-
mo, quod firmum est comparatur?
Nisi forsitan possumus hoc dicere, quod
omnis calorum firmitas, & robur, &
fortitudo, vento inanissimo, & fumo,
qui in auras soluitur, coæquetur: iux-
ta Ecclesiasten c. 1. Vanitas vanitatum
& omnia vanitas.

Illudq; dicendū: quod si calum & terra
peribunt, atque veterascent, quæ
consequentia habitatores eius sicut ista
moriuntur atque dispercant, cum ani-
mas esse perpetuas & resurrectura cor-
pora nouerimus. Ex quo perspicuum
est, calum & terram non perire, & in
nihili redigi, sed in melius commu-
tari.

*Vt corpora
humana pe-
reunt & re-
surgunt, ita
cali.*

Ex hoc loco constat. Primo à
Sancto hoc Doctore per mutationem
cæli & terræ in melius non posse in-
telligi solius motus localis cessatio-
nem; eo quod calum & terra simili
ratione mutanda sint. terra autem
à motu non cessabit, quippe quo sem-
per caruit.

Secundo, Vt terræ ita cæli physi-
cam alterationem seu mutationem
necessario futuram.

Tertio, Interitum seu abolitionem
totalem & permanentem, seu vt ipse
vocat, redactionem in nihili, tantum
negari. quæ aliqui asserbant.

Quarto, Corruptibilitatem cæli
non minus admitti quam terræ, & ip-
sius quoque hominis. Hominem
autem & terram corruptibilem esse
experientia quotidiana docet; neque
obstat quod anima humana immor-
talis sit. Nam totum corrupti dicitur
etiam si partes constitutiue totius
sint immutabiles. Materia quippe
prima incorruptibilis est, ob compo-
siti totius dissolutionem, &c.

Idem sanctus Pater, tomo eodem
pag. 469. in cap. 65. Isa. super illa ver-
ba: Ecce enim ego creo calos novos, &

I

» terram nouam, & non erunt in me-
» moria priora, & non ascendent super
» cor &c.]

» Cælum autem nouum, inquit, &
» terram nouam, qui putant omnia in-
» terire quæ cernimus, Euangelij in-
» terpretantur testimonio. Cælum &
» terra transibunt. Et Paulli Apostoli.

» Quæ enim videntur temporalia sunt:

» quæ autem non videntur, æterna. Por-

2. Cor. 4.

» ro qui nouitatem & commutatio-

» nem in melius, & non elementorum

» arbitrantur interitum, illo vtuntur

» exemplo. A principio terram tu fun-

» dasti Domine, & opera manuum

» tuarum sunt cæli. Ipsi peribunt tu au-

» tem permanes, & omnes sicut vesti-

» mentum veterascent, & quasi amic-

» tum inuolues eos, & mutabuntur.

» In quo perspicue demonstratur perdi-

» tionem & interitum, non abolitionem

» in nihili, sed commutationem sonare in

» melius. Neque enim illud, quod in

» alio loco scriptum est: Luna fulgebit

» vt Sol, & Sol Septuplum lumen ac-

» cipiet, interitum significat pristino-

» rum, sed commutationem in melius.

» Et post. Quod intelligens & Paullus

» Apostolus loquebatur. Præterit enim

» figura huius Mundi. Consideremus

» quid dixerit: Figura præterit, non

» substantia.

» Hoc idem significat & Petrus. La-

» ret eos hoc volentes: quoniam cæli

» erant ab initio, & terra de aqua, &

» per aquam Dei sermone subsistit: per

» quæ prior mundus inundatus dilu-

» uio periit. Cæli autem qui nunc sunt

» & terra, eadem ratione seruantur i-

» gni: quod quo sensu accipiendum

» sit, postmodum docet. Nouos au-

» tem cælos & nouam terram videbi-

» mus, & repromissionem eius: non

» dixit alios cælos & aliam terram vi-

» debimus, sed veteres & antiquos in

» melius commutatos.

» Ex eodem to. & c. p. 489. super ver-

» ba. Quia sicut cæli noui & terra noua

» quæ ego facio stare coram me &c.]

» Quomodo autem cælum nouum &

» terra noua, erit & noua Hierusalem,

» vt nequaquam dicatur: Cælum & ter-

» ra pertransibunt. & iterum: Inuolue-

» tur cælum quasi liber, & corruptione

» dissipabitur terra. sic in omnibus no-

II.

1 » uis, nouus fiet & populus Dei: dicen-
» te scriptura vetera transierunt, ecce
» facta sunt omnia noua &c.

5 N O T A E .

Hinc liquido constat, ex mente huius Sancti Doctoris, hypotheticam quo-
rundam cæli corruptibilitatem atq. de-
structionem non stare. Quia etiam post
Mundi consummationem ipsa semper
locum habet, etiam de substantia crea-
ta quacumq. etiam incorruptibili natu-
ra: semper enim erit verum dicere, si Deus
10 » uolet, cælum, homo, mens, angelus non erit
semper erit verum, horum quoduis peri-
bit citius quam verbū Dei, &c. Et tamen
Hieronymus ait, post vltimum renoua-
ti Mundi diem, post factum nouum cæ-
lum, nouam terrā & nouam fundatam
Hierusalem, nequaquam amplius dic-
tum iri, cælum & terra pertransibunt.
Quod tamen semper esset verum, si sen-
sus ille hypotheticus in Scripturis inten-
tus esset. Non ergo ista, sed Physica cæli
mutatio necessario amplectēda est &c.

*Hypotheti-
ca seu con-
ditionalis
cælorum cor-
ruptibilitas
non stat.*

CAELORVM CORRVPIBILITATI
subscribit etiam S. Hilarius, ma-
gnum Ecclesię Lumen.

S. Hilarius Pictauorum Episcopus, S. Hilarius.
in psal. 122. edit. Paris. p. 986. ita scri-
bit. Cælum hoc, quod visibus nostris per
» materiem sui subiacet, quod tanquam
» fumus solidatus, Firmamenti & natu-
» ram & nomen accepit, præteribit &
» non erit: Sedes autem Domini ma-
» net in æternum.

Idem in psal. 135. p. 1082. aquas
supra cælos collocat, ad refrigerium
& temperationem cælorum inferio-
rum & aëris nostri. Calidos ergo &
corruptibiles agnoscit.

Idem in psal. 148. p. 1189. ita scri-
bit. Contuendū autem est in his creatu-
» ris, quæ in sæculum sæculi sunt statuta
» neq. cælum hoc quod Firmamentum
» nuncupatur, neq. terram quæ arida di-
» cta est, commemorata fuisse, quia & in
» Prophetis dictum sit: Ecce ego facio cæ-
» lum nouum, & terram nouam. Et Do-
» minus in Euangelio dixerit. Cælum
» & terra præteribunt, verba autē mea
» non præteribunt. Et post multa, p. 1191.

*Firmamen-
tum & terra
non sunt sta-
tuta in sæ-
culum sæ-
culi.*

I.

„ Tum enim calum nouum & terra
 „ noua erit, cum his presentibus dissolu-
 „ tis, noua illa & aeterna succedent, i-
 „ deo confessio eius super calum & ter-
 „ ram reddetur: quia non in hoc saecu-
 „ lo, neque in hoc aere, sed in supe-
 „ rioribus locis sedes beati illius regni
 „ est constituta.

CAELORVM CORRVPTIBILI-
 tatem ex Sanctis Scripturis asserit
 Sanctus Epiphanius.

S. Epipha-
 nius.

Totus Mū-
 dus conflagra-
 bit.

Creatura
 nomine
 Mūndus hic
 visibilis in-
 telligitur.

Sanctus Epiphanius, tom. I. lib. 3.
 aduersus Hereses, pag. 553. litt. D.
 Edit. Paris, 1622. Totus hic Mundus,
 „ inquit, ut purgari instaurarique possit
 „ exundantibus flammis incendio con-
 „ flagrabit, non tamen interibit ac cor-
 „ rumpetur omnino. Et paullo post. Cui
 „ & perspicue Paullus adstipulatur,
 „ dum ita loquitur. Nam expectatio
 „ creaturae reuelationem filiorum Dei
 „ expectat. Vanitati enim creatura
 „ subiecta est, non volens; sed propter
 „ eum qui subiecit eam in spe, quod & i-
 „ psa creatura liberabitur à seruitute
 „ corruptionis in libertatem gloriae filio-
 „ rum Dei. Vanitati quippe creatura
 „ subiecta est, ait. Ab hac porro serui-
 „ tute liberatum in creaturam expe-
 „ ctat: quo nomine Mundum hunc si-
 „ gnificare voluit. Non enim quae vi-
 „ deri nequeunt, sed haec quae aspectabi-
 „ lia sunt corruptela seruiunt.
 „ Manet igitur creatura meliorem in
 „ statum decentioremque renouata, re-
 „ surrectione propter Dei filios gaudens
 „ & exultans: quorum gratia ingemi-
 „ scit & parturit modo, redemptionem
 „ nostram à corruptione ipsa corporis ex-
 „ pectans, ut cum nos à mortuis fueri-
 „ mus excitati, ac mortalitatem carnis
 „ excusserimus, pro ea ac scriptum est:
 „ excute puluerem, & confurge, sede
 „ Hierusalem; cumq. à peccato libera-
 „ ti fuerimus, à corruptione ipsa quoque
 „ liberetur, nec iam vanitati sed iustitiae
 „ seruiat. Et post.

Isa. cap. 66.

Idem, c. 46.

„ Ita & Esai. Quemadmodum enim,
 „ inquit, calum nouum & terra noua,
 „ quae ego facio, manent coram me di-
 „ cit Dominus, sic erit semen vestrum
 „ & nomen vestrum. Ac rursum Sic di-
 „ cit Dominus, qui fecit calum, hic qui

II.

1 „ terram condidit, & fecit illam, ipse
 „ discreuit illam, non in vanum sed ut
 „ habitetur. Et post. Vnde & terram
 „ necesse est, & calum, post illam rerum
 5 „ omnium conflagrationem atq. aestum
 „ exsistere: Et post. At enim obijcient
 „ aduersarij: Si totum hoc vniuersum
 „ nequaquam pereat, quamobrem cae-
 „ lum ac terram transitura esse Domi-
 10 „ nus dicit? Propheta vero, Caelū fumi
 „ instar esse periturum? terram autem
 „ quasi vestimentum inueteraturam?
 „ Sed nos hunc Scripturae morem esse re-
 „ spōdebimus, ut mundi instauracionem
 15 „ atq. in melius praestantiusque mutatio-
 „ nem, interitum appellet: utpote cum
 „ prior forma in illa iucundiorē in sta-
 „ tum conuersione pereat:

20 „ Nihil enim in sacris Litteris contra-
 „ rium est, & absurdum. Praeterit enim
 „ figura huius mundi; non Mundum i-
 „ psū dixit. Sic igitur Scripturis vñta-
 „ tissimum est, antecedētis in id quod
 „ melius ac formosius est, figurae com-
 25 „ mutationem, interitum dicere.

Idem S. Epiphanius, to. 2. edit. Pa-
 risiensis anno 1622. p. 179. De Men-
 suris & Ponderibus, Caelum inter ele-
 menta, ex quibus alia producta sint,
 recenset: & Firmamentum in medio
 30 „ aquarum constitutum asserit: aitque
 „ spiritum creatis rebus omnibus ines-
 „ se, quas calum terraque cōplectitur.

35 „ Physicam ergo caeli conflagratio-
 „ nem hic S. Pater, & per hoc ipsius in
 „ melius instauracionem physicam,
 „ expresse docet. Vnde necesse est, se-
 „ cundum ipsum celum natura sua esse
 „ corruptibile.

A CORRVPTIBILITATE
 Caelorum stat etiam S. Ephraem.

„ Consonat his S. Ephraem, Parane-
 „ tico de 2. Aduentu Domini. Quis igi-
 „ tur tunc perferet, quando signa illa
 „ admirabilia & obstupescēda contue-
 „ bitur? quādo virtutes caelorum com-
 „ moueri aspicias? Quando elementa,
 50 „ dissolui videbis? Quando cernes calū
 „ ut librum conuolui. Solem obscurari.
 „ Lunam in sanguinem cōmutari, astra
 „ ex calo decidentia, sicut folia è ficu?
 „ Terram comburi, & quaecunque in
 55 „ ea sunt opera? Quando tubam ex cē-

Omnimodū
 calorum in-
 teritum ne-
 gat.

Physica
 mundana
 forma tran-
 smutatio.

S. Ephraem.

Matth. 24.
 Luc. 21. A-
 pocal. 6.

I

„ lo horribilem resonantem, & eos qui
 „ a seculo obdormierunt, excitantem
 „ audieris? Quando celos discindi, &
 „ Deum magno cum furore super pec-
 „ catores reuelari cōtemplatus fueris?
 „ Hæc autem omnia ut sonant à S.
 „ isto Patre intelligi, videbit qui ipsum
 „ leget, tam in hoc quam alijs sermo-
 „ nibus &c.

NATVRALEM CAELORVM

corruptibilitatem S. Irenæus è Sa-
 cris Scripturis contra ne-
 gantes ostendit.

S. Irenæus.

„ Sanctus Irenæus, aduersus Hære-
 „ ses, l. 4. cap. 6. ita scribit. Quoniam
 „ malignantes dicunt, si enim cælum
 „ thronus Dei est, terra suppedaneum
 „ eius, dictum est autem, prætereun-
 „ tibus oportet etiam hunc Deum qui
 „ supersedeat prætereire, & ideo non
 „ hunc esse Deum, qui sit super omnia:
 „ primo quidem nesciunt quid sit cæ-
 „ lum thronus, & terra suppedaneum.
 „ Nec enim sciunt quid sit Deus, sed
 „ putant eum more hominis sedere &
 „ contineri, non autem continere, sed
 „ & præteritionem cæli & terræ igno-
 „ rant. Paullus autem non ignorauit di-
 „ cens: Præterit enim figura huius Mudi.
 „ Deinde quæstionem ipsorum sol-
 „ uit David. Figura enim huius mun-
 „ di prætereunte, non solum Deum ait
 „ perseverare, sed & seruos eius, in
 „ centesimo primo psalmo dicens ita.
 „ Initio terram tu fundasti Domine, &
 „ opera manuum tuarum sunt cæli.
 „ Ipsi peribunt, tu autem perseverabis,
 „ & omnes sicut vestimentum vetera-
 „ scent, & sicut coopertoriū mutabis eos,
 „ & mutabuntur. Tu autem idem ipse
 „ es, & anni tui non deficient. Filij ser-
 „ uorū tuorum inhabitabunt, & semen
 „ eorū in æternum diregetur: manifestè
 „ ostendens, quæ sint, quæ præterie-
 „ runt, & quis est, qui semper perse-
 „ uerat Deus, cum sanctis suis. Et Esai.
 „ autè similiter: Alleuate inquit oculos
 „ vestros in cælum, & attendite in ter-
 „ ram deorsum, quoniam cælum sicut
 „ fumus confirmatum est, terra autem
 „ sicut vestimentum yeterascet, qui au-
 „ tem inhabitant in eis, quemadmodum

II.

1 „ hæc morientur; salutare autem meum
 „ in æternum erit.
 „ Si hominibus naturale est mori,
 „ cælis naturale est corrumpi: nam ut
 5 „ cæli corrumpuntur, ita homines mo-
 „ riuntur &c.

INGENITAM CAELI COR-

ruptibilitatem ex elequio diuino

10 docet Sanctus Cyrillus

Alexandrinus.

„ S. Cyrillus Alexandr. tom. II. edit.
 „ Parisiensis, p. 339. lib. 4. in Isai. c. 51.

S. Cyrillus
 Alexandri-
 nus.

15 „ super illa verba, Tollite in cælum,
 „ oculos vestros, & inspicite in terram
 „ deorsum, Quoniam cælum sicut fu-
 „ mus firmatum est &c.] Quando ita-
 „ que, inquit, firmatum cælum mirabi-
 „ mini & velut in specie fumi intuemi-
 „ ni: scitote etiam, inquit, quod quæ pro-
 „ ducta sunt ut sint, rursus dissoluen-
 „ tur. Quæ namque principium ortus
 „ habent, rursus in id quod non est, ali-
 20 „ quando desinent. Vetustate ergo in-
 „ quit, consumetur terra, id est, abor-
 „ lebitur. Et qui inhabitant terram,
 „ sicut illa morientur, Mortem autem
 „ elementorum proprie nominat, &
 30 „ aprè, mutationem in melius.

Ex interitu
 cæli, mors
 hominum
 infertur.

„ Ut etiam Paullus: etiam ipsa crea-
 „ tura liberabitur à seruitute corruptio-
 „ nis, in libertatem gloriæ Filiorum
 „ Dei. Quo autem modo liberabitur,
 35 „ ostendet Christi discipulus, dicens.
 „ Veniet enim dies Domini ut fur, in
 „ qua cæli procelle in morem præteri-
 „ bunt, & elementa ardentia dissoluen-
 „ tur, ac terra & quæ in ea sunt res om-
 „ nes conflagrabit. Nōuos autem cæ-
 „ los, & nouam terram, & promissiones
 „ eius expectamus. Igitur creaturæ re-
 „ nouationem velut ex mortuis resurre-
 „ ctionem, quemadmodum in humanis
 45 „ corporibus, fore ait. Et post. Quanta
 „ autem sit opificis & creaturæ, fictio-
 „ nis & figmenti differentia, planum
 „ facit hisce verbis dicens. Vetustate e-
 „ nim consumetur creatura, & ut ex eo
 50 „ quod non erat, in id quod est produce-
 „ batur, sic non erit etiam à corruptione
 „ aliena. Et vniuersorum Creator, &
 „ artifex Deus sermo, per quem omnia
 „ & in quo omnia, in sempiternum
 55 „ erit, neque deficiet

Cæli conflagrabit.

Cælum non
 est à corrup-
 tione alie-
 num.

I

Psalm. 101. Quod docet etiam diuinus Lyricus cum ait. Ab initio tu Domine terrā fundasti, & opera manuum tuarum sunt cæli. *Ipsi peribunt, tu autem permanebis, &c.*

Idem Sanctus Pater, to. 2. pag. 580 col. 2. l. 3. contra Iulianum Apostatā, ex professo probat, cælum natura sua corruptibile: idque etiam auctoritate Platonis aliquādo solutum iri asserit. Quo pacto igitur, inquit, quod soluitur immortale natura? quomodo autem & absque interitu, quod sola voluntate Opificis incorruptionem sortitum est? &c.

Calum non est immortale natura.

SOLIS, CAELI ET ASTRORVM
naturam corruptioni obnoxiam
expresse confitetur S. Ioannes Damascenus.

S. Ioannes Damascenus.

S. Ioannes Damascenus, Orthodoxæ fidei lib. 2. c. 6. edit. Paris. an. 1577. pag. 200. ita scribit. Iam vero cum alia omnia, quæ ortum habuerunt, iuxta naturæ seriem corruptioni obnoxia sint, tum ipsi quoque cæli: tametsi Dei gratia contineantur atque conseruentur. & post. Eaque etiam ratione ait Scriptura, *ipsi peribunt, tu autem permanes*. Quanquam non prorsus interibunt cæli. Veterascent enim illi, & sicut opertorium conuoluentur, ac mutabuntur: eritque cælum novum, & terra noua.

Idem l. 2. c. 7. hæc habet: *Manifestum autem, inquit, & hoc quia compositus est Sol, & Luna, & Astra, corruptioni secundum propriam eorum naturam subiaccere.*

IN EANDEM CONCEDIT SENTENTIAM Andreas Cæsarensis.

Andreas Archiepiscopus Cæsarensis.

Andreas Archiepiscopus Cæsarensis Cappadociæ, qui vixit sub annum Christi 500. anno autē Christi 1596 primum in lucem editus, Commēn. in Ioannis Apocalypsin, c. 64. sermone 22. super illa verba: *A cuius conspectu fugit terra, & cælum, & locus non est inuentus eius*. Ita scribit: Cæli & terræ fuga, illorum transiitionem & in melius mutationem signi-

II.

ficat. In quibus proinde postea nullus amplius conuersionis aut mutationis locus inuenietur. Si enim nostri causa iuxta Apostoli doctrinam, creatura mutationi & corruptioni obnoxia facta est, nobis in libertatē gloriæ filiorum Dei mutatis & translatis, & ipsa itidem innouabitur, & in lætiorē formam transformabitur: in interitum autem non vertetur, neque uti Irenæus, Antipater & alij sancti viri rectē tradiderunt, in solidum corrumpetur. Verba Irenæi ita sonāt. *Citat verba S. Irenæi.*
Creaturæ substantia & quidditas neutiquam interitura est: verus est, namque & stabilis, qui illam formauit & condidit: sed species & pars illa mundi, in qua transgressio accidit, & homo inueteratus est transibit.

Enimvero cum Deus humanitas præscius esset, voluit partem illam vniuersitatis, quæ humanitatis vñibus ad tempus seruiret, temporariam & omnino eiusmodi esse, quæ in meliorem & stabiliorem statum mutari aliquando posset. Et magnus Patriarcha Methodius in sermone de Resurrectione, de his ita disserit. *Non placet quod nonnulli asserunt, nempe re-*

rum vniuersitatem totam simul interituram, cælumque & terram, & aërem amplius reliqua non futura. Inflammabitur sane ad repurgationem vniuersus orbis, igne quasi diluuium quodam inundatus; attamen non transibit in omnimodum interitum, aut in omnino nihilum. Et infra rursum. & Paullus quoque disertē testatur, dicens. Expectatio creaturæ reuelationem filiorum Dei expectat: *vanitati enim creatura subiecta est, non volens sed propter eum, qui subiecit eam in spe: quia & ipsa creatura liberabitur à seruitute corruptionis, in libertatem gloriæ filiorum Dei. & quæ sequuntur.* Et ante hos Sanctos Beatus Dauid quoque cum Dominum laudare vellet ita aiebat. *Emitte Spiritum tuum & creabuntur, & renouabis faciem terræ.* Cui cognatum est illud Isaïæ.

Ecce ego creo calos novos, & terram nouam, & non erunt in memoria priora

Totus orbis visibilis, mutabilis.

S. Methodius eadem aperte confirmat.

Incendium vniuersi orbis.

I

Homini & celi similis est futura reformatio &c.

„ priora, & non ascendent super cor, sed
 „ gaudebitis & exultabitis usque in sem-
 „ pternum in his quæ ego creo, &c. &
 „ post. Rationi proinde illorum senten-
 „ tia consentanea est quicreaturam quæ
 „ nostri causa facta est, mutationem qui-
 „ dem ad meliorem statum una nobis-
 „ cum suscepturam asserunt, in nihilum
 „ autem nequaquam concessuram: sicut
 „ neque nos quoque post mortem in illud
 „ transibimus quod non est.

Ita clara sunt ista, ut explicatione
 nulla opus habeant; qui legit & verba
 intelligit, cælum secundum hosce San-
 ctos viros natura corruptibile à Deo fa-
 ctum esse, ignorare non poterit.

PRO SOLIS ASTRORVM

& celi natura corruptibili
 auctoritates S. Au-
 gustini.

S. Augusti-
 ni de calo
 corruptibili
 doctrina.

Sanctus Thomas, libro secundo
 sentent. distinctione 14. art. 2. quid
 sanctus Augustinus de hac re sence-
 rit, hisce verbis clare expressit.

„ Expositores sacrae Scripturae in-
 „ hoc diuersificati sunt, secundum quod
 „ diuersorum philosophorum sectato-
 „ res fuerunt, à quibus in philosophi-
 „ cis eruditi sunt. Basilii enim & Au-
 „ gustinus & plures sanctorum sequun-
 „ tur in philosophicis, quæ ad fidem
 „ non spectant, opiniones Platonis,
 „ & ideo ponunt cælum de natura ele-
 „ mentorum.

„ Quam S. Thomæ doctrinam con-
 „ firmat P. Adamus Tannerus in Dis-
 „ sertatione de cælis, q. 3. pag. 55.

„ Item, q. eadem pag. 40. hisce ver-
 „ bis: Sed & Augustinus ipsdem Stoi-
 „ corum ac Platonis placitis insistens,
 „ pluribus locis indicat, cælum & astra
 „ constare natura ignea, ut notauit etiã
 „ Magister lib. 2. dist. 14.

„ Namque lib. de Gen. ad litt. c. 4.
 „ (quem locum citauimus quæst. præ-
 „ cedente, concl. 2.) cum Augustinus
 „ quattuor tantum agnoscat corpora
 „ simplicia, e quibus totus hic mundus
 „ coagmentatus est, terram, aquam, æ-
 „ rem & ignem, hunc maxime calo &
 „ astris assignat.

„ Et lib. 2. de Genesi, ad litteram c. 3

II.

1 „ ait: Itaque super aërem purus ignis, es-
 „ se dicitur cælum, unde etiam sydera,
 „ atque luminaria facta coniectant, il-
 „ lus videlicet ignea lucis in eas formas
 5 „ quas in calo cernimus, conglobata di-
 „ spostaque natura.

„ Idem quæstione 2. pag. 24. sic ha-
 „ bet. De hac re optimè inter alios Au-
 „ gustinus lib. de Gen. ad litteram c. 4.

10 „ Nec ullo modo arbitrandum est,
 „ prætermisum esse in hac scriptura vl-
 „ lum mundi huius elementum; cum
 „ quattuor notissimis eum constare per-
 „ suasum sit, quia videtur hic cælum, &

15 „ aquam & terram commemorare; de
 „ aëre autem tacere. Consuetudo quippe
 „ nostrarum scripturarum est, aut celi &
 „ terra nomine mundum appellare, aut
 „ interdum addere & mare. Aër ita-

20 „ que etiam ad cælum pertinere intelli-
 „ gitur, si qua sunt in eius partibus trā-
 „ quillissima & pacatissima spacia; vel
 „ ad terram, propter hunc turbulentum
 „ & caliginosum locum, qui humida
 25 „ exhalatione pinguescit, quamuis & ip-
 „ se sæpius celi nomine nuncupetur, ha-
 „ ctenus ex Tannero.

„ Diuus Augustinus de libero arbi-
 „ trio, lib. 2. c. 5. tom. 1. In corporibus
 „ inquit, lux primum locum tenet.

„ Idem super Gen. ad litteram, lib. 7
 „ cap. 19. tom. 3. Anima, inquit, om-
 „ nem corpoream materiam dignitate
 „ naturæ præcellit: per lucem tamen &
 35 „ aërem, quæ in mundo præcellentia
 „ sunt corpora, corpus administrat.

„ Idem in epistola tertia ad Volusia-
 „ num, to. 2. Hominum, inquit, iste sen-
 „ sus est, nihil nisi corpora valentium
 „ cogitare, siue ista grassiora, sicut sunt
 „ humor, aut humus: siue subtiliora, si-
 „ cut aër, & lux, sed tamen corpora.

„ D. Bonauentura, lib. 2. sent. dist. 13.
 „ art. 2. q. 1. in conclusione, ait Diuum

45 „ Augustinum, lucis vocabulo intelli-
 „ gere ignem. Vocat enim ibi, inquit,
 „ lucem quod nos vocamus ignem. sicut
 „ ex verbis ipsius Augustini colligitur
 50 „ expresse.

„ Ex eodem D. Bonau. lib. 2. sen. dist.
 „ 14. q. 1. p. 1. ar. 1. in obiectione secun-
 „ da, habetur hoc. August. de Genesi
 „ ad lit. lib. 3. c. 10. & in libro de Ciuit.

Zzz 3 Dei,

I

*Firmamentū
de natura
ignis, secū-
dum Augu-
stinum.*

*Celi nomi-
ne intelligit
Augustinus
elementum
ignis.*

*Pro ignea
corruptibili
& fluida
celi substā-
tia magna
ex D. Augu-
stino fun-
damenta &
testimonia.*

Dei, dicit tantum quattuor corpora
esse mundi, scilicet Humor & Hu-
mus, Aër, & Lux: si ergo firmamen-
tum est aliquod de corporibus, & non
est terra, nec aqua, nec aër: ergo est
ignis. sed postea ex Vielmio de San.
Bonaventuræ sensu plura audiemus,
nunc quædam ipsius D. Augustini
loca afferamus. Libro igitur vno de
Genesi ad litteram, cap. 4. sic ait.
Tertia opinio de hoc spiritu oriri po-
test, vt credatur spiritus nomine aë-
ris elementum enunciatum: ut ita
quattuor elementa insinuata sint, qui-
bus mundus iste visibilis continetur:
calum scilicet, & terra, & aqua &
aër; non quia iam erant distincta &
ordinata, sed quia in illius materia
quamvis informi confusione tamen
exortura præsignabantur: quæ infor-
mis confusio tenebrarum & abyssi
nomine commendata est.

Idem S. Doctor. l. 3. de Genesi ad
litt. cap. 6. ita scribit. Non igitur i-
gnorabat naturas elementorum, eo-
rumque ordinem, qui, cum visibi-
lium, quæ intra mundum in elemen-
tis natura mouentur, conditionem
introduceret, prius cælestia lumina-
ria, deinde aquarum animantia, ter-
rarum autem postrema narrauit: non
quod aërem prætermiserit, sed quod
purissimi & quietissimi aëris, vbi vo-
lare aues non posse dicuntur, si quæ
sunt spatia celo superiori coniungun-
tur, & celi nuncupatione in Scriptu-
ris ad Superiorem mundi partem
pertinere intelliguntur: vt terræ no-
mine vniuersaliter hoc totum signi-
ficetur, ex quo incipit deorsum ver-
sus ignis, grando, nix, glacies, spiri-
tus tempestatis, & omnes abyssi,
donec perueniatur ad aridam quæ
proprio nomine terra dicitur. Aër
itaque ille superior, siue quod ad
cælestem mundi pertinet partem, si-
ue quod nullum habet visibilem
habitorem, de quibus nunc sermo
narrantis est, neque prætermisus est,
celo nominato, neque annumeratus
est in creandis animalibus: iste vero
inferior &c. vbi satis ostendit per to-
tum caput 7. Firmamentum in quo luminaria sunt

II.

partim ex aëre superiore partim igne
sydereo contineri. Quæ amplius elu-
cēt in c. 9. & 10. vbi sic scribit. Quia
præualet in eis elementum (aëris)
quod ad faciendum quam patiendum
est aptius: duobus subterpositis, aqua,
scilicet & terra, vno autem superposi-
to, id est, igne sydereo. distribuuntur
enim elementa ad patiendum duo, hu-
mor & humus: ad faciendum autem
alio duo, aër, & ignis. Et post. aër
autem à confinio luminosi celi vsque
ad aquarum fluida, & nuda terrarū
peruenit.

Non tamen totum spatium eius
exhalationes humidæ infuscant, sed
vsque ad eum finem, vnde incipit iā
terra nominari, secundum illum psal-
mum 148. vbi dicitur: Laudate Do-
minum de terra.

Superior vero pars aëris, propter pu-
ram tranquillitatem, calo cui collimi-
tatur, communi pace coniungitur, &
eius vocabulo nuncupatur.

Idem deinde Sanctus Pater in hoc
quoque capite, dæmones aërea esse
animalia quandoquidem corporum
aëreorum natura vigeant. Idcirco
illos ante lapsum vel in supremo &
quieto aëre, vel in igneo elemento su-
periore habitauisse putat. Post ca-
sum vero detruos in istam infimam
& turbulentam aëris regionem. Vnde

Si transgressores illi Angeli, inquit,
antequam transgrederentur, cælestia
corpora gerebant, neque hoc mirum
est, si conuersa sunt ex poena in aëreā
qualitatem, ut tam possint ab igne;
id est ab elemento natura superioris a-
liquid pati; nec aeris saltem spacia
superiora atque puriora, sed illa ca-
liginosa tenere permitti sunt, qui eis
pro suo genere quidam quasi car-
cer est, vsque ad tempus iu-
dicij. Ad initium au-
tem capitis noni;
ait cælestia
ani-
malia, Partim luminaria
partim Angelos
dici.

*Firmamentū
ex aëre & i-
gne sydereo
sōponitur.*

Psal. 148.

*Calu igneū
accēdit aërē
subiectum
&c.*

COROL-

I.

II.

COROLLARIUM.

Equibus omnibus bene pensatis liquet à Sancto Augustino cælum natura igneum, corruptibile natura, & in substantia liquidum esse habitum. Possent adduci multo plura huius sancti Patris testimonia, sed hæc sufficere videntur.

PRO CAELO CORRVPTIBILI
sententia Vielmij.

Hieronymus Vielmus Lectione decima octava, super illam Quæstionem Num affixa suis orbibus sint luminaria? cum in partem negatiuam multos auctores, & loca Scripturæ citasset:

„ Illud enim, inquit, antea disquirendum est, num corpora hæc ex elementis composita sint, an vero ita simplicia, vt ex alijs corporibus minime sint constituta?

Quæstio, An
cælestia cor-
pora sint ex
elementis com-
posita?

„ Et hic profecto maius nobis & difficilior negotium sese exhibet. Etenim insigniores Patres in ea sententia ferme sunt, luminaria & cælos constitutos fuisse ex quattuor elementis, quoniam natura corruptibiles sunt, quinimo etiam statuto tempore ob Adæ peccatum, vt eorū quidam existimant, dissoluentur. Hanc enim causam Diuus Chrysostomus profert, ac Dauidem in psal. 101. ita sentire arbitratur, cum ait, Initio tu Domine terram fundasti, & opera manuum tuarum sunt cæli. Ipsi peribunt tu autem permanes, & omnes sicut vestimentum veterascent, & sicut opertorium mutabis eos, & mutabuntur.

Patres affir-
māt ex Scri-
ptura.

„ Qui locus potentissimus esse quibusdam videtur, ac neque satis comode ei occurrere à recentioribus, cū hoc idcirco dictum fuisse arbitrantur, quod adueniente ad iudicium Domino, cæli moueri desinant: nec enim de eorum motu, sed de ipsis dictum est, peribunt; & rursum, sicut vestimentum, siue vt vertit Fælix Pratensis, sicut pannus veterascent: quia certe omnia eorum constitu-

Interitus de
calorū sub-
stantia, non
de motu lo-
cali prædi-
ctus est.

„ tionem & substantiam respexisse videntur.

Rursus Esai. 51. Suspiciate cælum, & respiciate, inquit, quoniam cælum vt fumus deficiet, seu quemadmodum recentiores legunt, Quoniam cæli vt fumus corrumpentur.

Adhæc Dominus Marthei 11. ait, Cælum & terra transibunt, verba autem mea non transibunt.

Denique Diuus Perrus in Epistola sua secunda, cap. 3, ita scribit.

„ Cæli autem qui nunc sunt, & terra eodem verbo sunt igni reseruati in die iudicii & perditionis impiorum hominum: hæc & id genus testimonia significare Patres illi intellexerunt futuram mutationem maiorem in cælis, quam vt duntaxat moueri desinant.

„ Et quoniam quidquid corruptioni obnoxium est, constitutum est ex contrarijs; ea propter constare illos ex elementis, ac scripturam per quamdam consecutionem hoc nobis exponere crediderunt.

„ Quapropter obserua diligenter, Patres non inde deduxisse cælos desituros esse, quia sint ex elementis constituti: intelligebant enim nostra quoque corpora post diem iudicii ex contrarijs elementis composita, Deo volente & qui dotes eis magnas datus est, futura incorruptibilia, sed ex data earum desinentia, quam Scripturæ passim testari eis videbantur, collegerunt (& recte profecto) cælum ex contrarijs elementis constare.

„ Contra autem sentit Diuus Dionysius de diuinis nominibus, cap. 4. S. Thom. 1. quæst. 66 & ferme Scholastici, in 2. distinct. 14. Nam Aristotelem sequuti corpora illa cum simplicia, tum generationis & corruptionis prorsus expertia esse arbitrantur, quodque probant, quia eorum naturalis motus & simplex est, & diuersus penitus à motu elementorum: & cum hæc vobis protrita sint, ac vulgata, abstinere nunc ea fusius explicare.

„ Itaque videmus filios, veluti datis inuicem manibus, à Patribus, & Atauis

Animaduer-
sio notanda.
S. Patres Cæ-
los ex elemē-
tis cōponūt,
quia ipsos
ex Scriptu-
ra corrupti-
biles esse di-
dicerunt.

I

II.

*Modeste
refutat San-
ctum Bona-
uenturam.*

*Vielmius
Sanctos Pa-
tres tuetur,
& sequitur.*

*Si de natu-
ra calis olim
decernendum
fuisse, secū-
dum Patres
pronuncia-
tum esset.*

Ataui desciuisse. Quod cum piaculum
esse videretur Diui Bonauenturae, in
2. dist. 14. arbitratu est Priscos non
ita re vera sensisse, sed idcirco calos et
luminaria ex elementis esse composita
dixisse, quia perspicuitatem & rarita-
tem cum quibusdam elementis com-
munem habeant.

Verum danda est hanc responsio,
vel pietati, vel reuerentiae, quam Se-
raphicus Doctor maioribus nostris
vbique exhibuit, vel certe quod mi-
nus accuratè eorum monumenta e-
uoluerit. Proinde sanctus Thomas
in eadem distinctione 14. quæst. 1.
dixit eos opinionem hanc ex Acade-
mia in Ecclesiam importasse: quam-
obrem minus eis tribuendum in hoc
argumento esse, hoc est, non plus
auctoritatis hic eos habere quam
Platonem, cuius doctrinam seque-
bantur: hic enim in Thimæo hanc
eadem quoque antea docuit; & Plo-
tinus lib. 1. Enneadis 2. cap. 7. quo-
rum rationes coaceruauit, & satis di-
fertè illic in Thimæo exposuit Seba-
stianus Faxius recens, & doctus illius
interpres, & fuit Philosophorum om-
nium opinio, qui Aristotelem ante-
cesserunt.

Sed dicamne quod sentio, Audito-
res, an ob reuerentiam tanti Docto-
ris tacebo? Dicam profecto, ac ut
nos decet, præferam veritatem, hanc
vero, ut arbitror, est: hanc sancti
Thomæ responsionem non eximere
omnem scrupulum: quanquam e-
nim verum est, opiniones maiorum
nostrorum quas ex philosophorum
scholis deprompserunt, conficere ar-
gumentum extraneum in Theolo-
gia, quemadmodum & Philosopho-
rum auctoritates, atque rationes, uti
1. quæst. 1. art. 8. idem grauissimè do-
cet: Nihilominus cum ex Scripturis
se eas haurire & docere profitentur, id-
que magna quadam consensione, non
video, cur non multo plus eis tribuen-
dum sit, quam Platoni & Philosophis,
hoc est, cur eorum auctoritas argumē-
tum nobis non efficiat ex propriis, &
auctoritati diuinæ proximum: certe
si de natura calorum in Oecumenicis
Conciliis definiendum olim fuisset, ego

1 „ nunquam dubito, quod fuisset secundū
2 „ Patrum doctrinam citra ullam hesi-
3 „ tationem definitum: hic enim Sancto-
4 „ rum Conciliorum solemnibus & perpe-
5 „ tuus mos est, ut iuxta Sanctorum Do-
6 „ctrinam propositas illis controuersias
7 „ dirimant.

Et forte nunc quoque hoc fieret:
etsi enim grauissimorum doctorum
10 „ auctoritates ex altera parte stare, at-
11 „ que hanc esse communis Theologorū
12 „ nostræ tempestatis opinio videatur,
13 „ & certum sit, nullam Ecclesiæ aetate,
14 „ destitui Christi Domini promissioni-
15 „ bus, ac proinde nullo vnquam tem-
16 „ pore hanc in fide errare: quoniam
17 „ tamen nemo Recentiorum (quantum
18 „ mihi videtur) eam stabilire ex scriptu-
19 „ ra professus est, & omnes tanquam
20 „ opinionem sequuntur, quæ rationibus
21 „ à rerum natura petitis, sit opposita sen-
22 „ tentia probabilior; forte à Patribus
23 „ sententia Ecclesiæ etiam in presenti ca-
24 „ deret; quod, ut dicebam, ex Scripturis
25 „ intelligētiam illam se habere dixerint:

quemadmodum apud Diuum Am-
26 „ brosius Hexaem. lib. 1. cap. 6. D. Ba-
27 „ silius hoc loco, & Gregorium Nyf-
28 „ senum, Ioannem Damascenum lib.
29 „ 2. c. 6. D. Ioannem Chrysostomum
30 „ homil. 14. ad Romanos, & alibi vi-
31 „ dere est: ut interea fileam Diony-
32 „ sium Carthusianum in 2. distinct. 14.
33 „ Ambrosium Catherinum in Com-
34 „ mentar. in Genes. & alibi; Hierony-
35 „ mum de Oleastro Lusitanum, & alios
36 „ quosdam Nouitios homines doctos
37 „ cum primis & claros, qui in Patrum
38 „ sententiam concesserunt. Hactenus
39 „ Vielmius,

SCHOLIA IN DISCVRSVM

Vielmij.

45 „ Si Sanctorum Patrum de natura ca-
46 „ lorum sententiæ, propterea minus pō-
47 „ deris habere censendæ sunt, quod eas à
48 „ Platone acceptas in Ecclesiam inuexe-
49 „ rint, atque ideo tantum valent quantū
50 „ Plato: à pari argumentantur Patrum
51 „ fautores, & dicunt Quintam calis essen-
52 „ tiam, cuiusque sanctis Patribus aduersan-
53 „ tem molitionem, plus auctoritatis non
54 „ obtinere in Ecclesia, quam quantum
55 „ ipsius

*Si de natura
calorum e-
tiam nunc
decernendū
esset, Oecu-
menica Cō-
silia à San-
ctis Patri-
bus starent.*

I.

ipsius Architectus Aristoteles mereatur.

Quantum autem is mereatur. aiunt id ex eius falsis & contra fidem Catholicam pugnantibus principiis, itemque argumentis topicis, quæque ipsimet eius assæclæ passim reiiciant, satis constare.

Quod autem ad S. Patres attinet, ipsi contrarium ipso facto, quam illis adscribitur, & in actu uti dicitur exercito, profitentur; nam pro sua de cælo corruptibili doctrina, solius Fidei Catholicæ institutionem, & Scripturæ sacræ testimonia profertur; atque ex iisdem opiniones omnes philosophicas indifferenter insectantur, uti ex allatis, & afferendis eorum auctoritatibus abunde patet. Idem deinde in actu, ut aiunt, signato impigrè præstant. Etenim, ut exempli gratia, quosdam producam. Magnus Basilus, Homilia 3. Hexa.

Basilus.

Neque Firmamentum, inquit, aut ex vno simplicium corporum, aut ex omnibus mixtum esse, afferere nobis placet (tamen omnia omnibus inesse ex philosophia probe teneat, & doceat, Firmamenti tamen compositionem ad hanc vel illam materiam determinare non audet, utpote) qui tam ab ipsa diuina Scriptura (en à Scriptura, non Academia) ita instituti sumus, ut nihil permittamus menti nostræ ultra ea, quæ concessa sunt, imaginari, &c.

Basilium roborat Damasce.

Idem D. Basilus, (ait S. Damasceus, l. 2. Orth. Fid. i, cap. 6.) Naturam cæli instar fumi tenuem ac subtilem esse tradit, à diuina scilicet Scriptura id edoctus.

Ambrosius.

Nos autem, (inquit S. Ambrosius, l. 2. Hexaem. cap. 3.) Scripturarum seriem atque ordinem sequimur, & opus contemplatione æstimamus. Auctoris (Dei, non opinione Platonis.)

Scripturas se sequi protestatur Ambrosius, in definienda cæli natura, non argutias philosophicas.

Chrysost.

S. Chrysostomus, de incomprehensibili Dei natura, hom. 3. Cælum hoc, inquit, formam quidem concamerati gerere nouimus, idque non

II.

ingenio nostro, & ratione, sed diuinæ Scripturæ sententia, complectique idem vniuersam terram non ignoramus, quod & ipsum ab eodem diuino fonte hausimus.

Ex Scriptura, inquit, & fonte diuino mea dogmata afferro, non ex ingenio humano, aut ratione philosophica.

Vbi obiter nota ipsum agnoscere cælum complecti vniuersam terram.

Sanctus Ioan. Damascenus, l. 2. Orthod. cap. 6. *Ii qui apud exteros inquit, Sapientiæ laude floruerunt, Mosis dogmata sibi vendicantes, (cælum) orbem syderum expertem vocant.*

Damasce.

Et S. Iustinus Martyr, & philosophus doctissimus, qui Anno Christi 153. floruit, id ipsum de Platone atque alijs passim testatur, atque exemplis multis palam facit. Pro Christianis Apologia 2. pag. 72. versu 25. column. 1. Editionis Hieronymi Commelini, Anno 1594. ubi ait Mundi creationem didicisse Platonem à Mose. Apologia eadem pag. 63. & 64. versiculo primo, & sequentibus. Item ad Græcos cohortatione prima, pagina vigesima-seconda, versiculo decimoquinto, & sequentibus. pagina vigesimater-tia, versiculo trigésimo. Et pagina vigesimaquarta, versiculo trigésimoquinto, hæc ad rem præsentem maximè opportuna posteritati tradidit.

Vnde vero eruditus Plato, tempus unicum cælo creatum esse didicit?

Iustinus Martyr.

Ita enim scripsit: Tempus ergo cum cælo extitit, ut quæ simul orta sunt, simul quoque dissoluantur, cum aliquando dissolutio eorum affuerit. An non hoc ex diuinis Mose scriptis intellexit? Et post pauca. Vnde autem de cæli etiam dissolutione opinione concepta ita scripsit? an non id ipsum quoque ex sacris percepit Veribus, atque ab ipsis hoc sic dictum esse est arbitrat.

Plato sua dogmata meliora ex Sacra Scriptura didicit; quomodo igitur S. Patres sua potius ab illo quam ab hac hauserunt?

Itaque Plato cæli corruptibilitatem & Mundi interitum ex Sacrarum lectione Scripturarum didicit. Sancti autem Patres Deo pleni, & diuinitus

I.

diuinitus inspirati id ex oraculis diuinitus assequi non poruerunt, sed magisterio Platonico opus habuerunt, ut suam de cælo philosophiam tametsi ex verbo Dei scripto oriundam, non ex ipsis eloquijs diuini fontibus, sed ex impuris Academiae lacunis hausisse censendi sint. Id quod Vielmio, & alijs sacrae Scripturae tractatoribus, Patrumque propugnatoribus, vehementer displicet. Sed S. Iustinum ulterius auscultemus. Qui in responsione ad Questionem Christianam 94. pag. 349. v. 1. & seqq.

„ *Sanctæ Litteræ inquit, eius (Firmamenti) solutionem, per comparationem assimularunt, aliquando libro qui conuoluitur, quandoque elemento, quod igne soluitur, sicut ait Apostolus Petrus in secunda Catholica vniuersaliue epistola: nonnunquam vestimento veterascenti. Nam inductione melioris calis recens facti, Firmamentum tolli necesse est, tanquam id quod ad constitutionem illam nulli rei sit & vsui: ut eius intuitu vel tum demum coarguatur, vanum esse quod de cælo, expers ipsum & generationis, & corruptibilitatis esse, circumfertur eorum hominum dogma, qui id ingentium æternumque esse, & sine careere dixerunt.*

Clara S. Iustini de cali corruptibilitate sententia.

Hæc S. Martyr Romæ in orbis Amphitheatro dixit, & scripsit, quibus verbum non addo, ne pondus eleuem.

Quantum autem Sanctus Augustinus sacris Litteris detulerit, quam parum profanis; & quam ægre tulerit, si Christiani de Cælo philosophiam potius ex alienis quam proprijs ijsque diuinis libris inuestigarunt: quamque promptus semper fuerit ad veras Mathematicorum demonstrationes, & physicas, atque astronomicas experientias admittendas, semperque paratus ad contrariam sententiam deponendam, ijs vero, qui, ut suas opinioniones manutenerent, & veritati, & scripturae vim intulerunt quantum succensuerit, quantumque laborauerit, ut ostenderet, omnes repertas, & apertas veritates Astro-

II.

1 nomicas vel in sacra Scriptura contineri, vel certè contra scripturam, non esse sed secundum ipsam: hæc inquam, & hisce similia ex ipsomet audire satius est: Sic enim ait.

5 S. Augustini cautelæ in producendis sacris Scripturis circa Quæstiones de cælo Naturales,

10 &c.

S. August. lib. primo de Gen. ad Litt. cap. 18. & 19. grauissime sic moner.

Quomodo tractanda, in materia calorum Scripturae sacra?

15 „ In rebus obscuris, atque à nostris oculis remotissimis, si qua inde scripta etiam diuina legerimus, quæ possint salua fide, qua imbui-
20 „ mur, alias atque alias parere sententias, in nullam earum nos præcipienti affirmatione ita proiciamus, ut, si forte diligentius discussa veritas eam recte labefactauerit, corruamus: non pro sententia diuinarum Scri-
25 „ pturarum, sed pro nostra ita dimicantes, ut eam velimus Scripturam esse, quæ nostra est, cum potius eam, quæ Scripturarum est, nostram esse velle debeamus.

Caendum ne Phantasia propria habeantur oracula scripturae.

30 „ Ponamus enim in eo, quod scriptum est; dixit Deus fiat Lux, & facta est Lux, aliam sensisse lucem corporalem factam, & aliam spiritalem esse lucem in creatura spiritali: quod nostra fides non dubitat. Esse autem lucem corporalem cælestem, aut etiam supra cælum vel ante cælum, cui succedere nox potuerit, tamdiu non est contra fidem, donec veritate certissima refellatur. Quod si factum fuerit, non hoc habebat diuina Scriptura, sed hoc senserat humana ignorantia. Si autem hoc verum esse, certa ratio demonstrauerit, adhuc incertum erit, utrum hoc in illis verbis sanctorum librorum scriptor sentiri voluerit, an aliquid aliud non minus verum. Quod si cætera contextio sermonis non hoc eum voluisse probauerit, non ideo falsum erit aliud, quod ipse intelligi voluit, sed & verum & quod vtilius cognoscatur. Si autem contextio Scripturae hoc voluisse intelligere Scriptorem non

I.

„ non repugnauerit, adhuc restabit
 „ querere vtrum & aliud non potuerit
 „ Quod si & aliud potuisse inueneri-
 „ mus, incertum erit quidnam eorum
 „ ille voluerit: & vtrumque sentire vo-
 „ luisse, non inconuenienter creditur,
 „ si vtriq. sententiæ certa circumstan-
 „ tia suffragetur. Plerumque enim ac-
 „ cidit, vt aliquid de terra, de cælo, de
 „ cæteris huius mundi elementis, de motu
 „ & conuersione vel etiam magnitudi-
 „ ne & interuallis syderum, de certis de-
 „ fectibus Solis & Lunæ, de circuitibus
 „ annorum & temporum, de naturis
 „ animalium, fruticum, lapidum atque
 „ huiusmodi cæteris, etiam non Christia-
 „ nus ita nouerit, vt certissima ratione
 „ vel experientia teneat. Turpe autem
 „ est nimis, & perniciosum ac maximè
 „ cauendum, vt Christianum de his
 „ rebus, quasi secundum Christianas
 „ litteras loquentem, ita delirare qui-
 „ libet infidelis audiat vt, (quemad-
 „ modū dicitur) toto cælo errare con-
 „ spiciens, risum tenere vix possit: &
 „ non tam molestum est, quod errans
 „ homo deridetur, sed quod auctores
 „ nostri ab eis, qui foris sunt, talia sen-
 „ sisse creduntur, & cum magno eorum
 „ exitio, de quorum salute satagimus,
 „ tanquam indocti reprehenduntur at-
 „ que respuuntur.

„ Cum enim quenquam de numero
 „ Christianorum in ea re, quam opti-
 „ mè norunt, errare deprehenderint,
 „ & vanam sententiam suam de nostris
 „ libris asserere, quo pacto illis libris
 „ credituri sunt, de resurrectione mor-
 „ tuorum, & de spe vitæ æternæ re-
 „ gnoque cælorum, quando de ijs re-
 „ bus, quas iam experiri vel indubita-
 „ tis numeris potuerunt, fallaciter pu-
 „ tauerint esse conscriptos.

„ Quid enim molestiæ tristitiæque
 „ ingerant prudentibus fratribus teme-
 „ rarii præsumptores, satis dici non po-
 „ test, cum, si quando de praua & falsa
 „ sua opinione reprehendi, & conuinci
 „ ceperint ab eis, qui nostrorum libro-
 „ rum auctoritate non tenentur, ad de-
 „ fendendum id, quod leuissima teme-
 „ ritate, & apertissima falsitate dixe-
 „ runt, eosdem libros sanctos, unde id
 „ probent, proferre conantur, vel etiam
 „ memoriter, quæ ad testimonium va-

II.

1 „ lere arbitrantur, multa inde verba
 „ pronunciant, non intelligentes neque
 „ quæ loquuntur, neque de quibus affir-
 „ mant.

5 „ Ad hoc enim considerandum &
 „ obseruandum, librum Geneseos mul-
 „ tipliciter, quantum potui, enucleau
 „ protulique sententias, de verbis ad e-
 „ xercitationem nostram obscure positis,

10 „ non aliquid vnum temere affirmans
 „ cum præiudicio alterius expositionis
 „ fortasse melioris, vt pro modulo suo eli-
 „ gat quisque, quod capere possit: vbi
 „ autem quid intelligere non potest,

15 „ Scripturæ Dei det honorem, sibi ti-
 „ morem. Sed, cum tam multis exiti-
 „ bus verba Scripturæ, quæ tractau-
 „ mus, exponantur, cohibeant se tan-
 „ dem, qui litteris inflati sæcularibus,

20 „ hæc ita posita, vt omnia pia corda
 „ nutriant, velut imperitum atque im-
 „ politum aliquid exagitant, sine pen-
 „ nis in terra reptantes, & volatura-
 „ rum auium nidos irridentes. Peri-
 „ culosius autem errant quidam infir-

25 „ mi fratres, qui, cum istos impios de
 „ cælestium corporum numeris, vel de
 „ quibuslibet elementorum Mundi huius
 „ Quæstionibus subtiliter & copiose dis-
 „ sere audiunt, euanescent, & eos sibi

30 „ cum suspirio præponentes, & magnos
 „ putantes, saluberrimæ pietatis libros
 „ cum fastidio repetunt, & quos dulciter
 „ haurire deberent, vix patienter attin-
 „ gunt, à segetis asperitate abhorrentes,

35 „ & spinarum floribus inhiantes.
 „ Non enim vacant videre, quam
 „ suavis est Dominus, nec in Sabbhato
 „ esuriunt, atque ideo pigri sunt pote-
 „ state à Domino Sabbhathi accepta,

40 „ vellere spicas & tamdiu versare ma-
 „ nibus, contritasque purgare, donec
 „ ad escam perueniant. Dicet aliquis,
 „ quid tu tanta tritura disceptationis

45 „ huius, quid granorum exuisti, quid
 „ euentilasti? Cur propemodum in-
 „ quæstionibus adhuc latent omnia?
 „ Affirma aliquid eorum, quæ multa
 „ posse intelligi disputaſti. Cui respon-

50 „ deo, ad eum ipsum me cibum suavi-
 „ ter peruenisse, quod didici non hæ-
 „ rere homini in respondendo secun-
 „ dum fidem, quod respondendum est
 „ hominibus, qui calumniari libris

55 „ nostræ salutis affectant: vt quidquid
 „ ipsi

Obijcit sibi
 & respondet
 Augustinus

Naturalia
 etiam non
 Christiani
 vel ratione
 vel experi-
 mento certo
 scire possunt
 & solent.

I.

Dogmata Scripturis contraria sunt falsa.
Scriptura detegunt falsa philosophia loquacitatem.
 „ ipsi de natura rerum veracibus docu-
 „ mentis demonstrare potuerint, osten-
 „ damus nostris litteris non esse contra-
 „ rium? Quidquid autem de quibus-
 „ libet suis voluminibus his nostris lit-
 „ teris, id est, Catholicae fidei contra-
 „ rium protulerint, aut aliqua etiam
 „ facultate ostendamus, aut nulla
 „ dubitatione credamus esse falsissimū:
 „ atque ita teneamus, Mediatorem
 „ nostrum, in quo sunt omnes the-
 „ sauri sapientiae, atque scientiae ab-
 „ sconditi, ut neque falsae philoso-
 „ phiae loquacitate seducamur, neque
 „ falsae religionis superstitione terrea-
 „ mur.

„ Et cum diuinos libros legimus in-
 „ tanta multitudine verorum intelle-
 „ ctuum, qui de paucis verbis eruun-
 „ tur, & sanitate Catholicae fidei mu-
 „ niuntur, id potissimum eligamus, quod
 „ certum apparuerit cum sensisse, quem
 „ legimus.

„ Si autem hoc latet id certe quod
 „ circumstantia scripturae non impe-
 „ dit, & cum sana fide concordat.
 „ Si autem, & scripturae circumstan-
 „ tia pertractari, ac discuti non potest,
 „ saltem id solum, quod fides sana
 „ praescribit.

„ Aliud est enim quid potissimum
 „ scriptor senserit, non dignoscere; aliud
 „ à regula pietatis errare. Si utrumque
 „ vitetur, perfectè se habet fructus le-
 „ gentis: si vero utrumq; vitari non
 „ potest, etiamsi voluntas Scriptoris in-
 „ certa sit, sanae fidei congruam non
 „ inutile est tenuisse sententiam.

Idem Sanctus Ecclesiae Doctor,
 I. de Gen. ad litt. secundo, cap. 18. 40
 & ultimo ita habet.

„ Solet etiam quæri, vtrum cæli lu-
 „ minaria ista conspicua corpora sola
 „ sint, an habeant rectores quosdam
 „ spiritus suos: & si habent, vtrum
 „ ab eis etiam vitaliter inspirentur,
 „ sicut animantur carnes per animas
 „ animalium, an sola sine vlla mix-
 „ tione praesentia?

„ Quod licet in praesenti facile
 „ non possit comprehendi, arbitror
 „ tamen in processu tractandarum
 „ scripturarum opportuniora loca pos-
 „ se occurrere, ubi nobis de hac re, 55

II.

1 „ secundum sanctae auctoritatis regu-
 „ las, etsi non ostendere certum ali-
 „ quid, tamen credere licebit.
 „ Nunc autem seruata semper mode-
 5 „ ratione pie grauitatis, nihil credere
 „ de re obscura temere debemus, ne
 „ forte, quod postea veritas patefecerit,
 „ quamuis libris sanctis, siue Testa-
 „ menti veteris, siue noui, nullo
 10 „ modo esse possit aduersum, tamen
 „ propter amorem nostri erroris ode-
 „ rimus.

15 ANNOTATIONES IN Sancti Augustini citata loca.

20 Ex hisce elucescit primo. Omnes
 sententias, quas Sanctus Augustinus
 super verba Genesis adducit, neque
 reprobatur, ab ipso probabiles haberi,
 & ut probabiles allatas esse, quousq.
 contraria veritas non proferatur.

25 Secundo. Liberum ab ipso relin-
 qui cuiilibet, ut sequatur quam ma-
 ximè sequendam iudicauerit: Quam-
 diu expressa veritas aliunde non pa-
 tescat.

30 Tertio. Sententias Philosophicas
 Scripturae sanctae, non hanc ancillari
 debere sententijs philosophicis.

35 Quarto. Philosophiam Christia-
 nam potius è Sacris Libris quam
 Scriptoribus profanis petendam.

Quinto. In rebus obscuris & dif-
 ficilibus recurrendum ad regulas
 Sanctae auctoritatis; si certi nil ha-
 beatur, suspendendam & non facile
 praecipitandam in alterutram con-
 traditionis partem tãquam certam,
 sed dum dubia est, dubiam haben-
 dam sententiam, & suum probabili-
 tati relinquendum locum.

Sexto. Exploratis Mathematico-
 rum veritatibus & experimētis pru-
 denter cedendum, neque Scripturas
 inuitas in contrarium temere tor-
 quendas, & cum damno spirituali
 audientium proferendas.

I.

S. GREGORIUS MAGNVS,
pro Cælo corruptibili, cum alijs
Sanctis Patribus con-
spirat.

*Sanctus
Gregorius.*

Libro namque 17. in caput 24.
Iob, tomo 2. pagina 435. cap. 5. ita
scribit.

„ Sed quæri potest, cum per Salo-
„ monem dicitur; Generatio præterit,
„ & generatio aduenit, terra vero in-
„ æternum stat: cur B. Iob omnia hu-
„ miliari asserat & auferri? Quod ta-
„ men facile discutimus, Si terra, &
„ cælum vel qualiter transeat, vel qua-
„ liter maneat distinguamus.

„ Vtraque namque hæc, per eam,
„ quam nunc habent, imaginem tran-
„ seunt, sed tamen per essentiam sine
„ fine subsistunt. Hinc namque per
„ Paullum dicitur. Præterit enim figu-
„ ra huius mundi. Hinc per semetipsum
„ veritas dicit: cælum & terra transi-
„ bunt, verba autem mea non transi-
„ bunt. Hinc ad Ioannem Angelica
„ voce perhibetur: erit cælum nouum
„ & terra. Quæ quidem non alia con-
„ denda sunt, sed hæc ipsa renouan-
„ tur.

„ Cælum igitur & terra & transi-
„ & erit: quia ab ea quam nunc habet
„ specie, per ignem tergitur, & tamen
„ in sua semper natura seruetur. Vnde
„ per Psalmistam dicitur: mutabis ea
„ & mutabuntur. Quam quidem
„ vltimam commutationem suam,
„ ipsis nobis nunc vicissitudinibus
„ nunciant, quibus nostris vsibus in-
„ desinenter alternant. Cælum ergo
„ æque vt terra corruptibile est, ex
„ mente S. Gregorij.

*S. Patherius
idem sentit.*

Hic ad verbum subscribit San-
ctus Patherius Ecclesiæ Romanæ No-
tarius, Diuo Gregorio coæuus, lib. 3.
super Apocalipsin. pag. 219. editionis
Romanæ 1553.

*S. Maca-
rius eadem
docet.*

„ Sanctus Macarius, Homilia 32.
„ ita scribit. A Deo præfixum est, vt
„ dissoluatur creatura hæc, atque cæ-
„ lum & terra transeant. Claruit iste
„ Sanctus anno Domini 350. Editus
est primum latine Francofurti,
1594.

II.

I Sanctus Gregentius Archiepisco-
pus Tephrensis, in Regno Homerita-
rum Aethiopiæ, postquam diu per ali-
quot dies cum Iudæis disputasset, tan-
dem Deum in oratione sua, qua Chri-
stum ex cælo admirabiliter Iudæis in-
credulis spectandum à Patre exorauit,
sic alloquitur. Tu (Deus Pater) qui
„ per ipsum (Filius tuum) cælum
10 „ ac terram firmasti, & Spiritu tuo
„ Sancto fundasti, & super aquis vtra-
„ que texisti &c. floruit circa annum
Christi 390. tempore Palladij, qui
hanc disputationem præfens annotauit:

15 quæ Lutetia prodijt 1586.

Diuus Basilius Seleuciæ Episco-
pus, in Oratione prima, à pagina se-
cunda, ad sextam hanc mundi ex ele-
mentis compositionem aperte agno-
scit, dum aquis à terra ad cælum Em-
pyreum omnia replet. Deinde,
„ (inquit,) intra aquas Firmamen-
„ tum distendit (Deus) in gyrum,
„ veluti tabulatum pectus perido-
25 „ neum. floruit anno Christi 650.
Editus est primum anno 1604.

*S. Gregen-
tius ponit a-
quas super
Firmamen-
tum.*

*S. Basilius
Seleucia E-
piscopus.*

ZACHARIAS PHILOSOPHVS
Christianus cælum natura
corruptibile pro-
bat.

Zacharias Scholasticus Christianus,
postea Episcopus Mitylenes, in sua
erudita disputatione, quam de Mundi
Opificio contra Philosophos tam Pla-
tonicos quam Aristotelicos instituit,
cæli & syderum corruptibilitatem ex
professo fortissime propugnat.

*Zacharias
Episcopus
Mitylenes.*

40 Floruit autem anno 518. circiter, in
latinum translatus prodijt Parisijs anno
Christi 1618. Sic autem ait, pag. 519.

„ Factus igitur est Mundus; si fa-
„ ctus & corrumpetur: cum hæc duo
45 „ habeat sibi à natura coniuncta &
„ consociata, ortum & corruptionem.
„ Et pagina 535. Oportebat locum
„ futuris suis incolis idoneum & con-
„ gruenter esse, neque domicilium
„ ab ijs, qui in eo habitaturi erant,
„ multum discrepare.

„ Necessè igitur fuit, cum nos corru-
„ ptibiles simus & quotidie fluamus,
„ ac labamur, talia esse quæ nos cir-
55 „ cumstant: contra nobis ad immorta-
litate

Aaaa

I.

„ *litatem transfunduntibus*, hęc nos asse-
 „ *ctari*: an non tibi videtur simile fini-
 „ *li gaudere & amicum esse ac socium*
 „ *&c.* & post, pag. 537.

„ *Quo autem pacto mortalis oculi*
 „ *aspectum capissent*, & *ceterorum*
 „ *sensuum capacia fuissent*, *cælum &*
 „ *quæ cæli motu conuertuntur*, *scim-*
 „ *mortalia & incorrupta & interius*
 „ *expertia fuissent*: nam simili acce-
 „ *dere simile*, ratio & veterum sapien-
 „ *tia & res ipsa ostendit & docet*. Sed
 „ *quoniam Opificis providentia*, &
 „ *beneficio reuiuiscemus*, & hęc cor-
 „ *pore quibuscum vitæ munere functi*
 „ *sumus*, in quibus habitauimus & in
 „ *hanc vitam venimus*, immortalia
 „ *& extra omnem mutationis aleam*
 „ *recipiemus*: non enim propterea
 „ *perpetuæ corruptioni nos ratione*
 „ *prædita signēta Bonus condēnauit*:
 „ *vicissim oportebat quæ nos attinent*,
 „ *talia esse qualia nostra corpora*, glo-
 „ *ria & immortalitate plena*, ab omni
 „ *denique mutatione libera*, vt simili
 „ *simile accedat atque propinquet*.

„ *Hęc ò Bone, caussa est*, cur non ab i-
 „ *nitio immortale ac incorruptum hoc*
 „ *uniuersum Deus fecerit*. Et pag. 544.

Sol, Luna,
planetae, &
cælum ipsū
natura sunt
corruptibi-
lia.

„ *Solem tamen & Lunam*, & vt ver-
 „ *bo dicam*, septem quos vocant pla-
 „ *netas*, & cælum ipsum deos esse
 „ *affirmant*, & singularum quæ ge-
 „ *runtur rerum causas esse*, qui natu-
 „ *ra corruptibiles sunt*. & pag. 545.
 „ *Mundum autem natura corruptibi-*
 „ *lem scimus, factus est enim*. Corrum-
 „ *pti autem dicimus non funditus vel in*
 „ *perpetuum*, idque propter opificis bo-
 „ *nitatem*. sed *altam in melius formam*
 „ *induere*, & *cum nostris corporibus*
 „ *immortalem fieri*, post *generalem Vni-*
 „ *uersi consummationem* &c.

„ Et cum corruptibilitatis causam
 „ *dixisset esse cælum hominis primi*,
 „ *post multa obiectionem quandam*
 „ *soluit*, pagina 549. Quomodo cum
 „ *legis contemptus*, quem interitus
 „ *causam esse dicis*, mundi opificio
 „ *posterior fuerit*, anteuerrens ipse,
 „ *mundum fecit corruptibilem*? huic
 „ *obiectioni sic responder*.

„ *Sciebat Opifex*, ò bone, *præno-*
 „ *scendi virtute*, *legem suam contem-*
 „ *pturum*, & *mortalem futurum ho-*

II.

„ *minem*: quod anticipans, mortalem
 „ *ipsi Mundum proprium domicilium*
 „ *constituit*. Hęc hactenus iste. quæ
 „ *manifeste declarant*, quid ipse de
 „ *Cæli*, *Solis*, & *astrorum corruptibili-*
 „ *tate senserit*.

Nec aliter sensit Philippus Solita-
 rius in sua Dioptra, quam noster Pater
 Iacobus Pontanus latinitate donatam
 Ingolstadtij, anno 1604. edidit. Vixit
 autem iste Philippus an. Domini 1105.
 Qui Dioptræ suæ, lib. 3. cap. 6. expressè
 docet Cælum & Terram calore soluenda.
 Deinde cap. 7. ex S. Chrysostomo
 eadem quæ nos superius, in sententiæ
 suæ confirmationem adducit. & tan-
 dem de suis etiam hęc, pag. 125. sub-
 necit.

„ *Nec ista quattuor & prima om-*
 „ *nium corporum, elementa videlicet*,
 „ *aqua, terra, aër, ether siue ignis*, in
 „ *quibus & per quæ tota Mundi ma-*
 „ *china subsistit*, aspectabilem, sensi-
 „ *biliam, animantium, vegetabiliam*,
 „ *& quæ sacra vocantur*, & *planta-*
 „ *rum, inanimatorum, insensibiliam*,
 „ *manebunt*.

„ *Nam ex his quattuor constant om-*
 „ *nia*. Si igitur cum aliis & hac transi-
 „ *bunt*, quibus tanquam principiis uni-
 „ *uersa continentur*, unde ego corpus ad
 „ *resurgendum inueniam*? &c.

ASCANIVS MARTINENGVS

huic sententiæ in sua Glossa
 passim subscribit.

Apud Ascanium Martinengum, to-
 mo primo Glossæ Magnæ in Genesin,
 pag. 591. & sequentibus, super verba,
 Fiat Firmamentum.] Præter philoso-
 phos omnes ante Aristotelem, inue-
 nies auctores classicos facile triginta,
 qui cælum vel ex vao vel pluribus ele-
 mentis constatū censuerunt, quo-
 rum luculenta testimonia sedulus Le-
 stor apud ipsum inspicere potest. Vnum
 certe locum huius Scriptoris præterire
 non possum.

Is igitur, cum Sancti Ambrosij de
 Mundi corruptibilitate verba à me
 superius allata citasset, hanc tonio
 primo, pagina 605. admonitionem
 „ *affert*. Perpendant obsecro ex hac
 „ *Ambrosij doctrina nuperi doctores*,

Cur Mun-
dum corra-
ptibilem fe-
cerit Deus?

Philippus
Solitarius
eādem sen-
tentiā pro-
fert.

Auctores
plures Clas-
fici huius
sententiæ.

I.

qui neglecta auctoritate cunctorum
Priscorum Patrum (nam & Diony-
sium pace Diui Thomae, cum ceteris
incedere congruentiori loco demon-
strabo) calum quintam esse essen-
tiam passim mordicusque defensam,
maluntque scripturas ad peregrinas
& nouas detorquere interpretationes,
quam Aristotelicum hoc de quinta
cali essentia inuentum non probare.

Perpendant inquam, num Ari-
stotelis versutiam penetrarint, Ari-
stotelis inquam, Ecclesiasticis dog-
matibus intensissimi hostis: qui ut
Mundum æternum in fidei nostræ
ludibrium & opprobrium astruat,
Quintam inducit essentiam: perpen-
dantque, & caueant, ne nos qui
Mundum creatum, cælosque si non
dissolubiles, saltem restaurandos,
vel à morione sua arcendos fore cre-
dimus, dum cælos Quinta essentia
compactos esse, cum Aristotile pro-
fiteri nitimur, in nosmetipsos arma

S. Dionysius
nusquam
asseruit, Cæ-
lum natura
incorrupti-
bile.

conuertamus. Ita Ascanius.
Quæ de Sancto Dionysio asserit,
consentientia sunt ijs, quæ ex Sancto
Maximo & alijs commentatoribus su-
pra retulimus. Et sane diuinissimum
illum Theologum aliud non sensisse,
quam cælum valde perfectum quid &
omnibus suis numeris absolutum esse,
tametsi ex elementorum censu exem-
ptum non sit, suadent etiam alij Apo-
stolorum discipuli.

Hermas S.
Pauli disci-
pulus cæli
corruptioni
subiecit.

Quippe Hermas Sancti Pauli di-
scipulus, in suo Libro, quem Pastorem
inscribit, sententiam hanc aperte edo-
cetur ab Ecclesia in Visione prima,
hisce verbis.

Ecce Deus virtutum, qui inuifi-
bili virtute, & magno sensu suo con-
didit Mundum, & honorifico con-
silio circumdedit decorem creatu-
ræ suæ, & fortissimo suo verbo con-
fixit cælum, & fundauit terram,
super aquas, & virtute sua poten-
ti condidit Sanctam Ecclesiam,
suam, quam benedixit: ecce
transferet cælos ac montes, colles ac
maria, & omnia plena fient elec-
tis eis, ut reddat illis responsio-
nem quam repromisit, cum multo
honore & gaudio, si seruauerint

II.

legitima Dei, quæ acceperunt in
magna fide,

Et in Visione tertia. Nam &
Mundus, inquit, per quatuor ele-
menta continetur.

Liber autem iste, ait Cornelius
noster, in Epistola ad Romanos,
cap. 16. ver. 14. apud veteres ma-
gna fuit auctoritatis. Nam ut Bel-
larminus, lib. 1. de Verbo Dei, cap.

Cornelius:

Bellarmini-
nus.

20. ostendit, multi Patrum quasi
Canonicam Scripturam ipsum cita-
runt: cui & Baronius, tom. 2. ad
annum Christi 159. consentanea
ex Eusebio, Irenæo, Origene, Cle-
mente Alexandrino, Athanasio, at-
que Hieronymo affert. Qui, quod
ad Latinos, inquit, pertinet, sic
eis liber innotuit, ut tamen eum
ipsi inter eorum Apocryphorum gene-
ra adnumerarint, quæ legi in Eccle-
sia possint, non tamen citari debere
ad fidem Catholicam astruendam.

Baronius.

Hac enim censura à maioribus
fuisse notatum, Tertullianus affir-
mat. & post. à quorum sententia
recentiores nequaquam recesserunt.
Nam de eodem Ruffinus, in expos.
Symboli Apostolorum agens hæc
ait. In nouo vero Testamento Li-
bellus qui dicitur Pastoris siue Her-
meris, qui appellatur Duæ viæ, vel
Iudicium Petri (tot enim nomini-
bus à diuersis nominari consuevit)

quæ omnia legi quidem in Ecclesiis
voluerunt, non tamen proferri ad
auctoritatem ex his Fidei confirman-
dam. Hæc Ruffinus. Quæ omnia mul-
to maximè confirmantur à Sancto A-
thanasio, ex Epistola festali trigesima
nona, tom. 2. Editionis Commelinia-
næ, anno 1600. pag. 45. litt. C. Quam
etiam inuenies apud Franciscum no-
strum Turrianum in Proæmio ad Con-
stitutiones Clementis. sic igitur Para-
phastes ex Græco.

Sanctus A-
thanasius.

Sed maioris euidentie causa, inquit,
adijciam & hoc necessario, sciens,
quod etiam alij libri sint extra hosce
(videlicet Canonicos) enumeratos,
qui non quidem Canonem constituunt,
sed propositi sunt à Patribus legendi eis,
qui primum accedunt, & simpliciter
edoceri volunt sermonem pietatis.

I.

„ Sapiencia Salomonis , & Sapiencia
„ Sirach , Esther , & Iudith , & Tobias ,
„ & Doctrina quæ vocatur Apostolo-
„ rum , & Pastor .

„ Et tamen , dilecti , sub illis in Cano-
„ nem relatis , & his legendis , nullo
„ modo fit mentio Apocryphorum .
Itaque Sancti Athanasij tempore liber
hic non habitus est Canonicus , sed li-
bris sacris proximus . quæ cum aliqui in

Canonem intruderent , & Hæretici eo
ad suam perfidiam abuterentur : de-
„ mum , vt ait Sixtus Senensis Biblio-
„ thecæ Sanctæ , lib. 2. reiectus est à
„ Gelasio inter fidei dubiæ scripturas ,
„ vt arbitror ad Hæreticorum subuer-
„ sionem , non Arrianorum quidem .
„ &c. sed Nouationarum , quibus ini-
„ tium videtur dedisse &c. vnde de
vnica pœnitentia caute legendum mo-
nent scholia , tom. Biblioth. Patrum ,
editionis Parisiensis 1610. & cauet
Bellarminus de Scriptoribus Ecclesia-
sticis ,

Per decretum igitur Gelasij au-
toritate Canonica spoliatus est , liber
cæteroquin , teste Sancto Hieronymo ,
re vera utilis ; & cuius testimonia fre-
quenter laudant & citant etiamnum
Scriptores , præsertim qui de moribus
& vita recte instituenda tractant . No-
ster Cornelius à Lapide , in Ecclesiasti-
ci , cap. 30. vers. 26. super verba Zelus
„ & iracundia minuunt dies .] *Memo-*
„ *rabile est , inquit , quod ex ore Dei scri-*
„ *bit Hermas , Sancti Pauli discipulus ,*
„ *lib. 2. Pastoris , mandato tertio .* Ni-
„ mirum quod ira & impatientia ob-
„ scuret & extinguat in nobis Spiritum
„ Sanctum &c. Hunc eundem aucto-
rem citant etiam alij Recentiores . Vide
Busæi Panarium . Item Opera Patris Al-
uerez de Paz &c. Sanctus igitur Gela-
sius noluit vt hic liber auctoritate infal-
libili polleret .

Cum autem allati ex ipso tex-
tus Sacræ Scripturæ , Patrumque
interpretationibus conformes sint , suo
vtrique pondere non carebunt , quod
primis Ecclesiæ temporibus ipsis Ca-
techumenis approbantibus Ecclesia-
rum Præsilibus dicto modo prælegi
consueuerint . Præsertim cum Sanctus
quoque Clemens in libris Recognitio-

II.

num , vt paullo post videbitur , hanc
cæli corruptibilitatem expresse doceat :
ipsæque Apostolus Petrus , tum ibi ,
tum in secunda sua epistola , cap. 3.
eandem , vt huius sententiæ auctores ,
atque Diui Petri Interpretes passim
testantur , cælorum resolutionem , con-
tra æternitatis mundanæ assertores ,
clare promulgarit .

PRO NATURA CAELORVM
corruptibili Sancti Petri Epistola af-
fertur , & ex Recentiorum Commen-
tariis explicatur : Sancti simul Cle-
mentis de hac controuersia ex Libris
Recognitionum doctrina recensetur ,
& rationibus Mathematicis ex aquis
Oceani petitis confirmatur , auctori-
tes demum modernorum Theologorum
non pauca producantur .

CAP. XXV.

CV M enim Apostoli prædica-
sent Vniuersalem Mundi re-
generationem futuram tem-
pore extremi Iudicij , restite-
runt Apostolis multi , (vt ex textu &
eius Interpretibus , & Libris Recognitio-
num Clementis colligitur ,) ex hausta
de Cæli incorruptibilitate & necessaria
æternitate opinione ; vnde negauerunt
futurum Mundi interitum , ob natura-
lem ipsius immutabilitatem , id quod
arguebant ex eodem ipsius & inuaria-
bili tenore . Apostolus autem vt futu-
ram cæli resolutionem per vniuersalem
incendium efficacius tam contra sui ,
quam futuri temporis Pseudologos per-
suaderet , ostendit eiusdem destructio-
nem præteritam per vniuersalem Aqua-
rum tempore diluuij inundationem .
Ait enim ipsos cælos aquarum casu re-
solutos , & postea Verbo Dei restaura-
tos , vltimo incendio reseruari . Sed
præstat audire ipsum Apostolum ita
præcauentem .

„ Venient in nouissimis diebus in-
„ deceptione illusores , iuxta pro-
„ prias concupiscentias ambulantes ,
„ dicentes : vbi est promissio aut
„ aduentus eius ? *ex quo enim Patres*
„ *dormierunt , omnia sic perseverant*
„ *ab initio creaturæ .*

Petri , Epi-
2. cap. 3.

Epistola S.
Petri secun-
dæ , cap. 3.

Latet

I.

Latet enim eos hoc volentes,
quod *celi erant prius*, & terra de a-
qua, & per aquam consistens, Dei
Verbo: *per qua ille tunc Mundus a-*
qua inundatus perijt. Celi autem qui
nunc sunt, & terra eodem Verbo repositi
sunt, igni reseruati in diem iudicij, &
perditionis impiorum hominum.
Et paullo post. Adueniet autem dies
Domini vt fur: in quo celi magno
impetu transient, elementa vero ca-
lore soluentur, terra autem & quæ
in ipsa sunt opera exurentur. Cum
igitur hæc omnia dissoluenda sint,
quales oportet vos esse in sanctis
conuersationibus, & pietatibus, ex-
pectantes & properantes in aduen-
tum diei Domini, *per quem celi ar-*
dentes soluentur, & *elementa ignis*
ardore tabescent. Nouos vero cælos,
& nouam terram, secundum pro-
missa ipsius expectamus, in quibus
iustitia inhabitat. Hæc Sanctus Pe-
trus. Ex quibus sic vltcrius ratioci-
nantur Interpretes: cum per cælos re-
positos atque igni reseruatos intelligat
Apostolus *cælos proprie dictos seu Fir-*
mentum; necessarium est, aquis di-
luuij eosdem fuisse destructos. Quod
autem per repositos cælos, intelligat
cælos proprie dictos adeoque Firma-
mentum, inde conficitur, quod eo-
dem Dei Verbo repositos asserat, quo
erant positi prius in creatione: atqui
certum est, Verbo Dei non esse po-
sitos, post primum cælum, nisi Fir-
mentum: Verbo namque Domini
cæli firmati sunt, & spiritu oris eius
omnis virtus eorum: Firmamentum
igitur & positum est primo in Genesi,
& repositum est secundo post diluuium
& comburetur tertio in iudicio extre-
mo. Nihil ergo noui est, in cælo ali-
quid variari, & mutari physicè, si to-
tum cælum aquarum inundatione tur-
batum & variatum est.

Et confirmatur iste discursus am-
plius ex antithesi locutionis: Quod
celi erant prius de aqua & per aquam
consistentes Dei Verbo; *celi autem qui*
nunc sunt, eodem Verbo Dei repositi
sunt igni reseruati.

Quasi velit dicere, primo quidem
vt constat ex Genesi Firmamentum

II.

Verbo Dei in medio Aquarum excita-
tum est, & tanquam murus Aquas
superiores ne deciderent sustinuit, qui
cum in Vniuersali diluuiio ad submer-
gendam terram apertis cæli cataractis
fuerit dissipatus, reparandus fuit eo-
dem Dei Verbo, quo olim ab initio e-
rat conditus. Itaque restitutum qui-
dem est Firmamentum, sed neque
ipsum, neque terra per Aquarum pro-
fluium, promittente ita Deo, peri-
bunt amplius: sed vtraque terra & Fir-
mentum, vltimo incendio consu-
mentur. Quam cæli per ignem conflagrationem ne quis putet esse incredibili-
lem, consideret eiusdem dissolutionem
ad aquas demittendas esse factam.
prius tempore inundationis terrenæ;
neque hoc volentes dissimulent, quia
affectata ignorantia, ipsos à culpa ne-
gata Veritatis non absoluet. Hanc au-
tem Sancti Petri in citato textu esse
mentem, sensum & doctrinam, non
aliunde quam ex ipso S. Petro eiusque
discipulo Sancto Clemente, verbis ex-
pressissimis se probare asserunt, ita vt
vllus alio diuertendi locus non sit reli-
quus. Sic autem scribit Sanctus Cle-
mens, Libro 2. Recog. pagina 45. edit,
Colon. 1569. ex colloquio, quod San-
ctus Petrus habuit cum Simone Mago.
Ad hæc Simon (Magus:) Me-
lius, ait, mihi videtur simpliciter
credere: quia solum istud, quod vi-
demus, sit cælum in Vniuerso Mun-
do. Et Petrus: Non ita, inquit, sed
vnum quidem confiteri conuenit
Deum, qui vere est. Cælos autem
esse, qui ab eo facti sunt, sicut & Lex
dicit: quorum vnum cælum sit su-
perius, quo continetur etiam visibi-
le Firmamentum, illud esse perpe-
tuum, & æternum, cum his qui ha-
bitant ibi. *Istud autem visibile in*
consumatione sæculi resoluendum
esse & transire.
Idem, Libro tertio, Recog. pag.
53. Et tunc, (quando numerus
prædestinatorum impletus fuerit)
istud quidem visibile cælum reuolue-
retur, vt Liber: illud verò quod
est superius, appareret: & animæ
beatorum corporibus suis redditæ
inducerentur in lucem.

S. Clemens
Papa.

S. Petrus
ait, Firma-
mentum in
quo sunt
bellæ interi-
tutum.

I.

„ Impiorum vero animæ pro im-
 „ mundis actibus suis spiritu flammeo
 „ circumdatae, in profundum ignis
 „ inextinguibilis mergerentur, per
 „ sæculum expensuræ supplicia.
 „ Hæc autem ita esse verus nobis Pro-
 „ pheta testatus est. Ib. paullo post.
 „ At Simon, &c. ait: Ad ea quæ vo-
 „ lo, responde mihi & dic: Si visibile
 „ istud; ut ais, cælum resoluetur, cur
 „ ex initio factum est? Respondit Pe-
 „ trus: Propter hominum præsentem
 „ hanc factum est vitam, ut esset in-
 „ teriectio quadam, & diuisio: ne quis
 „ forte indignus habitationem caelestium
 „ & Dei ipsius sedem videret, quæ his
 „ solis, qui mundi corde sunt, viden-
 „ da præparantur. Nunc autem, id est,
 „ agonis tempore, inuisibilia esse pla-
 „ cuit ea, quæ viventibus ad præmium
 „ destinata sunt. Et Simon ait: Si Con-
 „ ditor bonus est, & Mundus bonus:
 „ quomodo bonus bona dissoluet ali-
 „ quando? Si autem quasi malum re-
 „ soluit & destruit; quomodo non
 „ videbitur malus, qui malum fecit?
 „ Petrus ad hæc: Quoniam inquit,
 „ spondimus tibi, ne blasphemam-
 „ tem te fugiamus: Ipse enim reddes
 „ pro his, quæ loqueris rationem: pa-
 „ tienter ferimus. Audi ergo nunc:
 „ Cælum istud quod visibile est, & per-
 „ transit, si quidem propter semeti-
 „ ipsum factum esset, haberet fortasse
 „ quod dicis, aliquid rationis, quia
 „ resolui minimè deberet. Si vero pro-
 „ pter aliud quid factum est, & non
 „ propter se: necessario soluetur, ut il-
 „ lud pro quo factum videtur, appareat.
 „ Sicut verbi gratia dixerim; testa-
 „ uorum, quamuis pulchre facta, &
 „ diligenter formata videatur, necesse
 „ est tamen eam frangi, & resolui; ut
 „ inde pullus procedat: & illud pro
 „ quo totius oui forma expressa vide-
 „ tur, appareat. Ita ergo & huius Mun-
 „ di necesse est transire statum, ut sta-
 „ tus ille sublimior regni caelestis efful-
 „ geat. Et Simon. Non mihi videtur,
 „ quia resolui possit cælum, quod à
 „ Deo factum est.
 „ Ab æterno enim æterna fiunt: à
 „ corruptibili temporalia & caduca.
 „ Et Petrus. Non ita est, sed à mor-

II.

„ talibus quidem omnimodis corrup-
 „ tibilita fiunt, & temporalia: ab æ-
 „ terno vero, non semper corruptibilia,
 „ neque semper incorruptibilia: sed
 „ prout voluerit Creator Deus, ita, &
 „ erunt illa quæ creat. Neque enim
 „ sub lege est virtus Dei, sed lex Crea-
 „ turis suis, Voluntas eius est. Similia
 „ asserit D. Petrus, l. i. p. 9.

10 Hactenus quidem pro se loquen-
 tem, & sensum Epistolæ suæ explican-
 tem audiuius è calamo S. Clemen-
 tis, Petrum Apostolum. nunc si pla-
 cet, percipiamus etiam ipsum Cle-
 15 mentem. Ipse ergo Librorum ad S.
 Iacobum missorum elenchum, & sum-
 mam singulorum sub finem huius Lib.
 terij ita scribit.

„ Quintus (Liber continet:) Quod S. Clemens
 „ duo sint cæli: quorum unum sit i- eadem dicit
 „ stud visibile firmamentum, quod & qua S. Pe-
 „ transibit: aliud vero æternum & in- trum dixit
 „ uisibile. se scripsit in
 prioribus.

Cæterum ne quis dicat cum Bel-
 25 larmino de Scriptoribus Ecclesiasticis,
 hosce Recognitionum Libros esse Apo-
 cryphos, oppono ipsorum auctorita-
 tem in hac præsertim materia, quæ A-
 pocryphum nil cõtinet, passim à Scho-
 lasticis usurpari, prout facit P. Tanner,
 P. Cornelius à Lapide, Suarez, & alij:
 ut taceam hisce affinia esse, quæ in ip-
 sa Canonica Petri Epistola dicuntur.

Sed & ipse Bellarminus in simili
 35 obiectione contra officium S. Ioa-
 chimi introducendum facta, hisce
 verbis respondet in sua manu scripta
 epistola ex qua hæc excerpti.

„ Verum est, quod obiectio ex S.
 „ Augustino, l. 23. contra Faustum, c.
 „ 9. dicit, ex Apocrypha Scriptura
 „ haberi, quod Ioaachim fuerit pater
 „ D. Virginis. Sed respondetur, ve-
 „ rum esse, non haberi hoc in scriptu-
 „ ra canonica, sed non ideo falsum esse.
 „ Quia in Apocryphis multa sunt vera,
 „ ut in tertio Esdra, & Tertio Macha-
 „ baorum &c. & S. Augustinus non
 „ reiicit hoc testimonium, nisi in eo,
 „ quod Faustus dicebat, Ioaachim fuisse
 „ se de tribu Leui.

„ Et S. Augustinus potuisse esse de
 „ Tribu Iuda & Leui simul. Eodem
 „ igitur modo, cum ipso Bellarmino
 respon-

S. Petrus i-
 dem repetit,
 & ait hoc se
 habere à
 Christo.

Cur factum
 sit Firma-
 mentum?

Idem repe-
 tit & probat
 eleganti si-
 militudine.

I.

responderi potest, si Recognitionum, quædā sunt Apocrypha, multa vicissim sunt vera, & incorrupta in iisdem. cum autem grauiissimi Theologi hæc de cælo auctoritates vsurpent, eas pro legitimis agnosci posse, nemo opinor inficiabitur.

Cum autem Sanctus Petrus hisce citatis locis expressè doceat, Firmamentum esse cælum secundum, & à Deo non plures esse factos cælos quam duos & ex hisce duobus cælis destruendum die nouissimo secundum non primum; hinc inferunt nomine Cæli, vel Firmamenti ultimo comburendi, non accipi posse ex mente Sancti Petri, infimam aëris regionem, neque vllum elementum sublunare, neque demum ipsum Planetarum in quo vagantur precise spatium; nam hisce omnibus absumptis, adhuc cælum secundum, id est Firmamentum, staret: quod tamen ex mente Diui Petri amoliendum est. Vt autem pro hac doctrina etiam ratio aduocetur, pauca attingenda sunt fundamenta.

RATIONES EX AQVIS OCEANI & Diluuij petitiæ &c.

Sententia
S. Petri con-
firmatur ra-
tionibus
Mathema-
ticis.

Primo. Constat ex Genesi aquas inferiores esse Maria, cauernis terræ conclusa, & volantes hinc inde in aëre nubes, &c.

Secundo. Certum est ex istis terræ scrobibus exemptos montes assurrexisse. Vnde aquæ plus loci non occupant, quam montes in terra rotundata possederant.

Tertio. Constat ex Geographicis, terræ spatia superficialia à basibus montium occupata, esse longe minora quam sint ea, quæ planities inter montes interiectæ occupant.

Quarto. Constat, Aquarum Aequora secundum superficiem supremam, considerata, esse quodammodo superficiebus extantis terræ æqualia.

Quinto. Docent Cosmographi, ex Nauticis experimentis, Maris profunditatem, vt plurimum, semimilliarium Romanum, hoc est quingentos passus non excedere.

Sexto. Varijs Mathematicorum experimentis & historicorum narrationibus

II.

1 planum fit, altissimi montis verticem supra Oceani libramentum perpendiculariter erectum, facile eminere ad duo milliaria Italica secundum perpendicularum. Sed & montium bases ampliatae, & vertices continuo materiæ lapsu decurtati, considerandi sunt.

Septimo. Ex Scriptura Sacra insuper scimus, super altissimum totius orbis 10 montem, aquas diluuij excessisse quindecim cubitis.

His igitur suppositis, statim absque vlllo calculo elucescit, aquas diluuij in se complexas esse Oceanos minimum 15 octo, imo facile ad duodecim peruenisse. E quibus elucescit, eos auctores qui cum Scriptura Sacra aquas supercælestes deuocarunt, adeo ridiculos non esse, prout aliquibus, rem non satis fortasse ponderantibus, apparent. Inter quos sua nomina profitentur in citatis locis, Epiphanius, Cyrillus, Haymo, Richardus Pampolitanus, Hieronymus Oleaster, Cassiodorus, Iosephus 25 & Eugubinus citatus apud Iustinianum &c. Hi dicunt aquas supercælestes aut in diluuij aut alias depluisse &c. Neque ab istorum doctrina multum abiuisse videntur, Sanctus Basilius, Ambrosius, 30 Iustinus, & alij multi illorum sequaces, qui expressè docent ex aquis supercælestibus Solem & sydera nutrir: hæc autem sine mutatione seu nutrientis seu nutriti non fiunt.

Suam denique opinionem roborant experientia quotidiana, dum aquæ in vapores, aut aërem calore resoluuntur, quo fit vt locum multo ampliorem exigant. Ideoque quærunt, vnde aut quomodo in diluuij tanta aquarum vis, quæ decem, & eo amplius Oceanos exæquarit, cælitus depluerit? an aëris condensatione, aut in aquam mutatione? at totus aër in aquam vertendus vix suffecerit. quid interim aëri successit? non vacuum, non aliud corpus, quod tantam inanitatem expleret. Et vice versa, tot Oceani post diluuium, quo sunt delati? eodem inquit Petrus Verbo Dei, cæli, qui nunc sunt, repositi sunt igni reseruati. Videmus quantas nebulas, & nubes subministret rorida terræ, superficies, aut extremitas fluuiatilis vndæ: quantum caliginis vortice- 55 cem

I

Aëris ex aqua facti multiplicatio.
cem aqua efferuescens, quantum
silex calidus humore exiguo insper-
sus; quantas spirituum procellas, &
ventorum turbines per minimum
foramen expiret Aeolipila aërea aquis
plena: vna certe aquae gutta taliter e-
uaporata centies, atque amplius ma-
iorem locum occupat. Vbi ergo tot
& tanta maria post diluuium vagan-
tur?

Ignis ex terra progeniti augmentatio.
Huc pertinet, quod apud Merfen-
num, quaest. 7. art. 9. pag. 829. de
comis Cometarum scribit Vville-
brordus: qui, Nec mirum videri
debere ait, quod tanta coma à tan-
to capite diffundatur, cum pyrii
pulueris granulum vix 200. pedis
Romani partem implens, accensam
ex se flammam in orbem spargat,
cuius diameter quadrantem eius-
dem pedis exæquet, ut sit diame-
ter corporis ad diametrum flammæ
sub quinquagecupla, & globulus
ille ignitus ad suum fontem eam
habeat rationem, quam 125000.
ad 1. atque adeo flamma, centies
vicies quinquies millies, & quin-
genties maior sit ipso fomite.

Si igitur flamma ex materia ter-
restri procreata suam sementem cen-
ties millies excedit magnitudine, à
vero neutiquam aberrabit, qui aërem
ex aqua factum, fonte suo aqueo duo-
decies millies ampliore crediderit,
&c. Sed nunc ipsos S. Petri interpre-
tes ex parte saltem loquentes audia-
mus.

EX P. ALPHONSI SALMERONIS,
qui ex primis decem S. Ignatii so-
ciis virtute, & doctrina claruit, So-
cietatemque scriptis suis plurimum
illustravit, Tom. 16. Disp. 4. in 3. cap.
posterioris Epist. B. Petri, de Mundi
interitu, &c. pag. 173.

Neque valet, inquit, si quisquam
dicat, caelos iuxta doctrinam Aristo-
telis esse ingenerabiles, & incorru-
ptibiles, cuius tamen oppositum sen-
sit Plato in Timæo, ubi facit eos ge-
nerabiles, & corruptibiles.

*S. Petrus in sua epl. 2. c. 3. voluit e-
uerrere sen-
tentiā Arist.*
Videtur etiam Petrus ista dixisse
ad sententiam Aristotelis euerten-
dam.

II.

Item constat Aristotelem per il-
lud principium, Ex nihilo nihil fit,
mundi creationem negasse, & æter-
nitatem mundi posuisse, & certis
rationibus demonstrationibusque,
ut ipse putabat, euicisse: de animæ
etiam immortalitate iuxta multo-
rum Patrum Græcorum sententiam
hæsisse.

*Quid autem speres à philosopho e-
iusmodi, tam clara, & aperta dog-
mata pernegante? Certe ut verum
fatear, satis patienti animo ferre ne-
queo, cum video quosdam adeo super-*

*stitiose, ac mordicus tueri Aristotelis
dogmata; ut malint multos textus
Scripturæ violentis glossis ac sensibus
torquere, quam in unum impingere
Aristotelem. Nam plus uni loco
Scripturæ, per quam loquitur Spiritus
sanctus,tribuendum est, quam uni-
uersis philosophis unum, & idem con-
stanter dicentibus.*

Postea eadem probat contra Ari-
stotelem ex Oraculis Sybillinis, ex
Lucretio, Ouidio, Lucano, Platone,
Seneca, Plinio, Eusebio, Clem. Ro-
mano, & alijs, itemque Sacra Scrip-
tura alibi, &c. deinde pag. 175. addu-
cit ex S. Hieronymo multa Scripturæ
loca, ad caelorum interitum compro-
bandum.

Idem ibidem. Illud extra con-
trouerſiam etiam contra Aristotelem
producit, caelos, & terram cum re-
bus inferioribus, & elementis, eius-
dem prorsus esse materia: quia aperte
dixit Petrus, caelos, & terram ex a-
quis esse, & per aquam consistere.
Vnde, & igni datur ab eodem Aposto-
lo, ut agat in ipsos caelos, nec opus est
addere aliquam virtutem igni denuo,
ut agere possit. Quod si ignis non
posset, tunc daremus ut ille tanquam
instrumentum Dei agere posset.

Hæc pauca ex multis illius ad-
ducere placuit, quorum le-
ctor sylvam apud ip-
sum inue-
niet.

*Notanda.
Salmeronis
doctrina cō-
tra quosdā
philosophos.*

*Plus tribu-
dum est uni
loco Scrip-
turæ, quam
uniuersis
Philosophis
&c.*

*Eadem ca-
lestium, &
terrestrium
est materia.*

I

PRO CAELO CORRUPTIBILI

& igneo stat

IO. BAPTISTA LAURVS

Perusinus.

Ioann. Ba-
ptista Lau-
rus Perusi-
nus.

Ioannes Baptista Laurus Perusinus
S.D.N. Papæ Urbani Octavi ab inti-
mo Cubiculo, Cæli corruptibilis si-
mul & ignei viuis hic Romæ testis
est, qui Epistolarum selectarum VI.
ad Alexandrum de Angelis Societa-
tis nostræ Theologum sic scribit:

„ Libet exclamare, ò Scorpij hospi-
„ talem domum! in qua duo Cometæ
„ splendide conuiuuium inierunt. atque
„ ut cenaturis siderea aliqua fax è ly-
„ chnuco præfulgeret, percussa à Mer-
„ curio scilicet, hæc, ad quam caterua-
„ tim homines spectandam confluunt,
„ alijs Cæli ignibus lucidior effulsit. e-
„ go quoque ad eam contemplandam
„ multa de nocte pellito vestitus epi-
„ togio, cum Boreas acriter spiret, è
„ lectulo consurgo, & ex ædium nostra-
„ rum editissima turricula, comam
„ longe eiaculantem, contentis ocu-
„ lis clare perspicio. In codice autem
„ exceptorio cælestis eius tractus fa-
„ ciem describo. Tuboque adhibito
„ Optico pulcherrimum Cometem, 30
„ inter Solis, ac Lunæ diuersoria,
„ haud dubie collucentem veneror.
„ de cuius tamen parentibus à Mercu-
„ rione vere, an à Marte procreatus sit,
„ hodie à prandio, cum ad te præstan-
„ tissime Alexander accessero, cupio
„ audire sententiam tuam: nec de futu-
„ rorum nexu euentuum tacueris: non
„ enim Cælum fileri amat, quod tot
„ facibus quasi linguis apertius nunc
„ quam antea proloquitur. ex Aedibus
„ III. Kal. Decemb. MDCXIIIX.

Cometa à
Marte aut
Mercurio
procreatus.

Epistola 24. ad Felicianum de Penna,
Procuratorem Generalem Seruita-
rum, circa medium hæc habet.

„ Miraberis ad quot qualesque exi-
„ lium rerum prædictiones à vulgati
„ Cometæ contemplatione, Gallus di-
„ lapsus sit, quibus nec Chaldæorum
„ quibus superstitiosior, nedum casti-
„ gator Ptolomæus adstipulatur. quã-
„ quam in Turcicis, item in Germa-
„ niæ tumultibus, supra quam Germa-
„ norum cuiquam expediat diuinus

II.

1 „ fuit. Sextilem Mensē quod ma-
„ lum exitiabile, quodve contagium
„ Urbem peruasit, caue, facto ipso
„ periculo, quemquam doceas; sed va-
5 „ lens ac firmus, quid eueniat nos ad-
„ moneas, hinc discedentes, & in salu-
„ briorem plagam hoc æstatis conce-
„ dentes. Tamen ego, quantum ob-
„ seruationes Mathematicorum vacil-
10 „ lare soleant, didici olim ex Comete,
„ qui anno MDXCVI. mense Iulio cõ-
„ spectus est, & ex alio decennio exa-
„ cto, Octobri ineunte, quo quidem
„ tempore non tam creuerat prædic-
15 „ tium insolentia, quam imminuta est
„ fides. Vereque ex inde intelleximus
„ Cælum hisce ignibus, per interualla,
„ exorientibus, ostendere nobis dunta-
„ xat voluisse, se sterilitatis minime ac-
20 „ cusandum. posse autem in dies stellas
„ parere longe pulchriorēs, quod in sui
„ primordio pulcherrimas procreauit.

Calum stel-
las generare
potest.

Vides ut in priori epistola Come-
tem facem & ignem nominat, à Mer-
curio seu Marte accensum; vides ut
dicat nunc Cælū naturam suam cor-
ruptibilibus hisce ignibus exorienti-
bus patefacere. Altera Epistola fig-
menta quorundam explodit, qui
ignes istos non naturali sed diuina
quadam virtute ibi produci volebāt,
ex illisque nescio quæ non vaticina-
bantur. ipse autem ait Cælum, hoc
& alijs Cometis, solum ostendere
voluisse, se sterilitatis minime accu-
sandum, posse autem in dies stellas
parere longe pulchriorēs.

IOANNES MALDONATVS

Comment. in Matth. super illa
verba: Et stellæ cadent de
Cælo] pag. 552.

Maldonat.

45 „ Multorum opinio est, non verè ca-
„ suras, sed fore, ut, quia non lucebunt,
„ cadere videantur; quod mihi ego nul-
„ lo modo persuadere possum: dixisset
„ enim Christus, sicut de Sole & Lu-
„ na dixerat, fore ut non lucerent; nunc
50 „ autem cum dicit fore, ut cadant, ma-
„ ius profecto aliquid significare vo-
„ luit. Itaque Chrysostomo & Euthy-
„ mio libenter assentior, qui verè stel-
„ las casuras putant: magis enim Chri-
55 „ sto, id affirmanti, quam Aristoteli ne-
„ ganti

Christo plus
quam Ari-
stoteli cre-
dendum.

I

„ ganti fieri posse, credendum esse arbitror.

Molina.

Ludouicus Molina, Disput. 5. ex professo docet materiam cæli esse eiusdem speciei, cum materia inferiorum: tamen olim, lib. 1. de cælo, cap. 3. quæst. secunda, in aliquorum gratiam contrarium sese defendisse dicat.

Secundum

Scripturas, cæli atq; speciei fient.

Idem Disput. 3. pag. 707. Ego sane, inquit, consonantius testimonij Scripturæ sacre esse arbitror, si dicamus etiam sidereos cælos esse in die iudicii innouandos, reficiendos, & perficiendos, idque futurum esse per aduentum nouæ formæ substantialis, retenta solum pristina materia. Quare cæli manebunt, sed non iudem specie, qui modo sunt, sed alij longe excellentiores, & pulchriores.

Cornelius à Lapide.

Cornelius à lapide, Comment. in 2. Epist. Pet. cap. 3. super illa verba. [Omnia sic perseverant ab initio.] sic, ait. Aristoteles, l. 1. de Cælo, cælum esse incorruptibile colligit ex eo, quod nulla vnquam in eo visa sit mutatio.

Sed paralogizant, & errant: (ii scilicet contra quos agit) tum quia crebra, imo perpetua sunt in Mundo rerum vicissitudines, motus, generationes, corruptiones, alterationes, &c. uti subdit S. Petrus: tum quia Numen, id est Deus, gubernator, iudex & vindex, maxime demonstratur ex Mundi huius inconstanti constantia & constanti inconstantia.

Et post super illa verba: [Cæli erant prius, &c.] Porro cælos & terram proprie accipe, non autem materiam primam, ut videtur velle S. August. l. 1. de Genesi contra Manich. cap. 7. nec enim materia prima creata est informis, sed cum forma cælorum, & terræ, Rursus cæli non solum aërem, ut vult Beda, & alij, sed & veros cælos significat.

Idem super illa verba [De Aqua, & per Aquam consistens.] Denique noster Lessius, de Attributis diuin. l. 13. cap. 20. de aqua, refert ad cælos, & vero, per aquam, ad Terram, explicatque de diuisione Aquarum superarum ab inferis. Genes. 1.

II.

6. quasi diceret, Cæli constituti sunt ex Aquis, quia Deus initio Mundi constituit fecitque Firmamentum, (puta cælum) quod medium confiteret, diuideretque aquas superas ab inferis, itaque ex vtrisque extraret, & ab vtrisque separatim existeret: terra vero constituta fuit per aquam, quando aquas quæ erant sub Firmamento, congregauit in vnum locum, & per medium aquarum apparuit arida. Similis traiectio Hebr. est psalm. 67. 9. & psalm. 112. vers. 5. & 6. & alibi.

Eadem est huic loco appositæ, ac significat cælos ex aquis non tantum exstare, sed & esse factos, uti explicat Sanctus Clemens, lib. 1. Recogn. qui asserit id se accepisse ex ore Sancti Petri.

Quare hæc expositio videtur plane esse ex mente Sancti Petri, ac genuina, ut & De Aqua, referendo ad cælos, & vero per aquam, referendo ad terram, sic exponas, q. d. Cæli præmitus ex aqua à Deo creati Verbo Dei consistunt, terra vero per aquam ei immixtam, eodem Dei Verbo Firma consistit.

Idem super illa verba. [Per Quæ] Cælos, & terram, dantes aquas diluuii, quæ antiquas suas sedes repeterent (occupando scilicet, & operiendo rursus totam terram) quibus Domini imperio cesserant. Gen. 1. 9. repeterent eas, inquam, nouo miraculo, ad vlciscendum impiorum terrigenarum scelera. Respondet enim illi forum obiectioni, dicentium vers. 4. omnia perseverare sic, sicut initio creata sunt, ac proinde nullum esse vel fore scelus iudicem, & vindicem. Hoc confutat dicens, fuisse Deum impiorum vindicem, cum omnes aquæ diluuii merfit & perdidit: sed hoc, inquit, latet eos, quia id nesciunt, vel scire nolunt.

Idem super illa verba. [Cæli autem qui nunc sunt, &c.] Est Antithesis explens vim argumenti: Opponit enim terræ, & cælis qui erant prius, græcè ἐνταῦθα, id est præcis, olitanis, antiquis, terram, & cælos, qui nunc sunt, puta modernos, quod sicut illi pereunte mundo perierunt,

Probat ex auctoritate S. Clementis, lib. 1. Recogn.

Cælum Firmamenti ex aqua productum.

Cæli antiqui pereunte mundo diluuij tempore, perierunt.

„ com-

I

„communi diluuiū aquarum, ita hi
„peribunt, diluuiū ignis in conflagra-
„tione, volucente Deo hominum sceler-
„ra per ignem, sicut ea olim vltius fuit
„per aquam.

Et conuertendo, sicut in fine
Mundi peribunt igne, ita in diluuiū ru-
ptis cataractis destructos fuisse aqua:
Hoc enim admittere debet, qui ger-
manam Petri sententiam hic, & in li-
bris Recognitionum sectari vult.

Plurimib-
us sententia
auctores ci-
tantur.
„Idem super illa verba, [In quo
„cæli magno impetu, &c.] Idem
„(præter Basilium recensitum) de cæ-
„lis sidereis interituris igneque com-
„burendis fenserunt S. Iustinus, S.
„Hieronymus, Theodoretus, S. Am-
„brosius, Nyssenus, Hilarius, Accu-
„menius: & ex Modernis, Catharin.
„Salmeron, & Serarius neruose id
„probans hic, Hieron. Magius, Franc.
„Valesius, Ludouicus Molina, & a-
„lij, quos citauit Isaiæ 34. 4. vbi plu-
„ra hac de re dixi.

Idem Commentariis in Isaiam
Prophetam, pag. 294. super illa verba
capitis 34. Complicabuntur sicut Li-
ber cæli.

Philosophia
debet sequi
Scripturam
sacram.
„Multi tamen Patres, & recentiores,
„qui philosophiam exigendam volunt
„ad sacras litteras, non contra; volunt
„cælum & terram peritura, etiam quo-
„ad substantiam, ac mutanda in aliud
„cælum nouum, & aliam terram no-
„uam.

Id enim hic, & alibi clarissime
„dici videtur, vt cap. 51. 6. cap. 65.
„17. Apoc. 6. 14. & cap. 21. 1. Eccle-
„siastici 17. 30. Psal. 101. 27. Matth.
„24. 35. 2. Petr. 3. 7. & 12.

Cæli substā-
tialiter mu-
tabuntur,
& plusquā
corpora hu-
mana.
„Vbi nota sacram scripturam longē
„efficacius loqui de mutatione cælorum,
„& elementorum, quam corporum
„Beatorum in Resurrectione, planeque
„significare longē maiorem fore muta-
„tionem illorum quam horum: quia
„illa substantialis, hæc tantum acciden-
„talis erit.

Accedit quod Cæli ex Abyssis, &
„aquis facti sunt, vt docuit Genes. 1. 8.
„ergo non sunt plane incorruptibiles se-
„cundum formam, sed secundum mate-
„riam primam, secundum quam dicun-
„tur permansuri in æternum.

Noue in
cælis mutat.
„Id ipsum confirmatur ex eo, quod

II.

„anno 1572. visa sit noua stella
„in Cassiopæa, quæ post biennium
„disparuit. Plures eiusmodi in cælis
„mutationes notarūt moderni Astro-

5 „nomi: ex quibus proinde nonnulli hi- Cæli nō du-
„sce Phenomenis conuicti, censent cæ- ri sed li-
„los non esse solidos & duros, sed cede- quidi.
„re, mutari, & secari ac diuidi instar
„aëris, aërem tamen excellere subtili-
10 „tate & præstantia: Cælum enim esse
„æthereos, non aëreos, esseque ipsum
„ætherem. Verum hoc alterius est que-
„stionis, & loci.

„Rursum cum lux naturaliter qua- Aliud ar-
„si profluat ex essentia cælorum, tum- gumentum
„que futura sit longē maior, & nobis pro calorū
„lior, videtur pariter quod ex alia for- corruptibi-
„ma substantiali nobiliori manabit. litate, ex lu-
„Nam lux tanta quanta tunc erit, non ce.

20 „est connaturalis formæ Solis quæ iam
„est.

„Ita sentiunt S. Chrysostr. hom. 14.
„in epist. ad Rom. & post eum Theo-
„doret. & Accum. Iustin. quæst. 93.
25 „Ambr. lib. 1. Hexam. cap. 6. Basil.
„hom. 3. Hexam. Nyssen. lib. de
„Creatione hominis, cap. 24. Clem.
„lib. 2. & 3. Recognit. Sibylla a-
„pud sanctum Aug. 18. Ciuit. 3. cum
30 „canit.

„Tempora torpebunt, vidua om-
„nia femina Mundi,
35 „Aër, terra, salum, lux ignis fer-
„uida cæli

„Cardo, dies, noctes, confident
„omnia in ignes;
„Et fiet species quam desertissima
40 „rerum.

„Omnia namque cadent lucentia
„sydera cælo.

Vaticinia
Sibylla.

Sidera de
cælo cadent
omnia.

„Idem fuscè docet Hieron. Magius,
45 „lib. 2. de Exustione mundi, cap. 6. &
„7. & Valesius sacræ Philosophiæ. cap.
„89. & noster Molina Tract. de Ope-
„re sex dierum. disp. 3. &c. Et post
„pauca occurrit obiectioni ex aduer-
„sa scriptura desumptæ, dum sic per-
50 „git.

„Porro quod alibi ait Scriptura,
„quod cæli, & terra in æternum sta-
„bunt, non repugnat huic sententiæ.

55 „Manebit enim eadem terra, idem
„Sol, & iidem cæli genericè: Terra
„enim

I

enim formam terræ, cæli formam
cælorum genericam retinebunt, esto
specificè aliam, eamque præstantio-
rem accipiant.

*Ad Scrip-
turas pro
cælo corrup-
tibili allatas
Partis ad-
uersæ respo-
siones.*

Erit enim tunc totius Mundi inno-
uatio, reformatio, & recreatio. Et
paullo post. Ad hanc & similes scri-
pturas, quæ contrarium videntur di-
cere, tres dant, (Philosophi, & Theo-
logi contra sentientes) responsiones.
Prima est, Quasdam aiunt loqui, hy-
pothetice, & comparatiue, vt illud
Christi: Cælum & terra transibunt,
verba autem mea non præteribunt.
sensus enim esse, q. d. citius cæli,
& terra transibunt, quam verba mea
præteribunt, & promissa mea fal-
lant.

Secunda est, per cælos intelligi æ-
rem. Sic enim vocantur volucres ce-
li, id est æris. Et sic intelligunt il-
lud S. Petri, epist. 2. cap. 3. v. 7.

Cæli autem qui nunc sunt &c. eo-
dem verbo (quo iussu Dei aquis di-
luuii obruti sunt, vt præcessit) repo-
siti sunt igni reseruati in diem iu-
dicii.

*Reprobat
aduersa par-
tis respons.*

Hoc bene: *verum non satis conuenit
hæc expositio v. 10. & 12. vbi cælos
opponit elementis, ergo per cælos non
aëreos, sed sydereos intelligit.* At e-
nim, Cæli magno impetu transient,
elementa verò calore soluentur.

Et efficacius, vers. 12. Cæli ar-
dentes soluentur, & elementa ignis ar-
dore tabescent: vbi coguntur ipsi per
cælos accipere aërem summum; per
elementa verò aërem, aquam, & i-
gnem, qui in terra vel circa terram
sunt.

Tertia est, cum subdit ibi S. Pe-
trus, & Script. alibi. *Nouos vero
cælos, & nouam terram secundum
promissa ipsius expectamus;* hanc in-
nouationem aiunt fore non subtan-
tialem, sed accidentalem: quia sci-
licet Sol, Luna, & cæli maiori luce
ornabuntur, magisque resplende-
bunt, vt participant aliquid de glo-
ria Beatorum, quibus in hac vita ser-
uierunt.

*Sententia
P. Corn. Se-
cundū Scri-
pturā Cæli
potius sunt
corruptibi-
les: secundū
Arist. incor-
ruptibiles.*

*Vtraque sententia est probabilis gra-
uesque habet auctores: prior sacra Scri-
ptura, posterior Philosophia Aristotelica
est conformior. Vtra sit verior, alibi*

II.

pertractabitur. Hactenus P. Cornelius;
secundum quem Phænomenon solare,
& quam deduceret quis de corruptibi-
litate cæli inde doctrinam patronos
habet sacram Scripturam, SS. Patres,
multos Theologos, tandemque ipsum,
& inter probabiles saltem sententias
adnumeratur.

Franciscus Suarez in 3. Part. D. Tho-
mæ, tom. 2. q. LIX. art. 6. disp. 58. se-
ctione 2. p. 691. 692. Pro cæli corrupti-
bilitate & substantiali eorundem in fine
Mundi inuolutione, adhuc plures au-
ctoritates affert, ex Scriptura, Patribus,
& aliis scriptoribus, & quanquam ipse
contrariam sententiam teneat, tamen
hanc vt probabilem admittit, Sic enim
ait.

Fræc. Suar.

Præterea, quia licet de aliis cælis vt-
cunque probabile sit, esse corruppen-
dos propter aliqua scripturarum testi-
monia, tamen de hoc cælo, non est
id verosimile. Et in dicendo tertio.

Tertio dicendum est, reliqua cæ-
lestia corpora innouanda quidem
esse, atque immutanda secundum
aliqua accidentia, permanfura vero
esse eadem numero secundum sub-
stantiam.

Hanc assertionem constituo solum,
vt probabiliorem, non vt certam.

Prior enim sententia licet à scholis
reiecta videatur; non tamen potest il-
li aliqua probabilitas denegari, cum &
in sacra scriptura apparens habeat
fundamentū, & propter illud à mul-
tis ex Sanctis Patribus approbata vi-
deatur, &c.

*Sententia
de corrupti-
bilitate cæli
non potest
denegari
probabilitas*

Leo Castrus in Isaiam, cap. 51. su-
per illa verba, *Cæli sicut fumus lique-
scent & terra sicut vestimentum attere-
tur, & habitatores eius sicut hæc interi-
bunt.*

*Leo Castrus
eadē docet.*

Ex sanctis Patribus Chrysost. Epi-
phanio, Irenæo, Hieronymo, probat ve-
ram cæli syderei corruptibilitatem.

Augustinus Eugubinus, Comm. in 2.
Ep. B. Petri, cap. 3. item Com. in ep. ad
Hebr. cap. 1. &c. huius sententiæ acerrim-
us vindex existit, teste Francisco Feu-
Ardentio, Comm. in cap. 6. lib. 4. S.
Irenæi; vbi ait S. Chrysostomo, & Am-
brosio, qui ex sacra Scriptura, Is. c. 51.
psal. 101. Luc. 21. &c. cælum liquidum
& corruptibile facit, omnes fere Græcos
Patres

*Aug. Eugu-
binus.*

I

Patres consentire . id quod ex citatis illorum auctoritatibus satis liquere potest .

Plures etiam congerit pro hac sententia . Idem Clariss. Vir, qui suprapag. 687. Ioannes Baptista Laurus S. D. N. ab intimo Cubiculo , & Sacri Cardin. Senatus à secretis, in sua Theatri Romani Orchestra, quam Romæ anno Dom. 1618. scripsit, & Riquius Belga 1625. typis euulgauit, de Cometis in Cælo ætherio generatis, p.40. 41. 42. 43. ubi sic ait . [Est & Horatius Grassius, qui examen aliorum improbum, vt Persiana voce utar, de Cometis sua trutina castrigauit . Per hunc ergo, perq. Ioannem Antonium Roffenum, Antonium Lucianum, Albertum Rutilensem, Michaëlem Petrum, & Ioannem Aluarez, eademum assequimur, quæ Seneca scripserat, longioris aui diligentia in lucem extractum aliquando iri; maioresq. nostros tam aperte ignorasse, iam miramur &c.]

P. Saliatus
pro cali cor-
ruptibilitate
deceat.

Iacobus Saliatus, quem supra quoq. pro Natura Solis ignea produxi, de cælo corruptibili, in diem Quartum Genesis, loco citato, tom. 1. suorum Animalium ita scribit .

Eccl. 17. v.
30.
Luc. 21.

[Quod si cælos in die Iudicii ardore ignis soluendos credimus, id de Astris quoq. intelligi par est, ideòq. & dissolubilia esse diuina virtute vt in melius commutentur. Quid lucidius Sole? & hic deficiet . Stelle cadent de calo . Nam quod hæc ad aduentitiam immutationem elementorum pleriq. referunt, cum cælos accipiunt, in quibus nubes & volucres vago cursu circumferuntur; vim asferre D. Petri verbis videntur . Apostolus enim cælos ab elementis aperte fecernit. Adueniet autem dies Domini vt fur, in quo cali magno impetu transient, hæc de veris cælis accipienda sunt, nam sequitur, elementa vero calore soluentur; terra autem & quæ in ipsa sunt opera, exurentur .

Vis D. Petri
verbis in
sententia co-
traria infer-
tur.

Cum igitur hæc omnia puta cæli & elementa, quæ proxime dixerat, dissoluenda sunt, quales oportet vos esse in sanctis conuersationibus & pietatibus, expectantes & properantes in aduentum diei Domini, per quem cali ardentes soluentur, & elementa ignis ardore tabescent? Ecce hic iterum cælos sepositos ab elementis; novos vero calos, & nouam ter-

II.

ram, secundum promissa ipsius expectamus &c.

Quis etiam non videt violentam esse interpretationem, Cæli ardentes soluuntur; cæli sicut fumus liquefcent; cæli magno impetu transient; cæli peribunt; id est, purgabuntur, nitescent, & quasi à rubigine detergentur? At quis nescit aquam, quæ abit in fumum, in alteram transire substantiam? sicut & ligna, quæ ardore soluta in cineres abeunt? nec factis commodè dici, perire, quæ secundum materiam formamq. remaneant? Quis non durum fateatur illam expositionem, mutabis ea & mutabuntur: id est, purgabis eos & renouabis? præsertim cum nullæ à cælis contrahantur sordes? conueniens autem sit cælos, qui seruiunt rerum sublunarium perpetuis alterationibus, ita à seruitute liberari, vt cum maximo incremento gloriæ, sint obiecta corporum gloria prædicatorum, quod incrementum auctum in septuplum, vt affirmat Magnus Isaias, ne sit violentum in perpetuum, à noua forma, quæ sit consentanea tantæ luci, proficisci debeat, vt supra cum Molina dicebamus, quod confirmat Cornelius in quartum diem.

SCHOLIA IN QVARTVM diem, eiusdem Saliati.

In quam sententiam de vera dissolutione cælorum, valde propendet Emmanuel Sà, in Notis in Epist. D. Petri, in illa enim verba, Cæli ardentes soluentur: Aërii, inquit, forte verò etiam superiores, quod etiam indicat illud Christi, Cælum & terra transibunt. ubi parum curandum est, quid Philosophi dicant. Sic ipse.

Emmanuel
Sà.

Adde Cæsarium, in Dialog. quæst. 71. Quid igitur inquit, an nunquam abolebuntur cæli, nec Luminarium illorum erit interitus?

Cæsarius

Respondet. Erit quidem Creaturæ dissolutio, non omnimoda tamen sublatio, sed in melius transmutatio, quemadmodum ex Dauide diuino vate discimus in hunc modum canente. Ab initio tu Domine terram fundasti, & opera manuum tuarum sunt cæli: ipsi intereunt, tu autem permanes. Et rursus de regeneratione subiiciens inquit; Et

Casarius.

omnes sicut vestimentum veterascent, & velut pallium circumuolues eos, & mutabuntur. [Deficientibus igitur ultra-
caelestibus aquis, omnia simul liquefcent
abundantia ignis, nam stellae cadent, ut
de vite folia inquit eximius ille inter
Vates Esaias. In Catholicis autem Epi-
stolis Petrus inquit, Elementa aetualia
soluentur

Quod autem ad melius & in sta-
tum deinceps non amplius desitutum
omnia corroboranda sint, tradit tan-
praesentium quam futurorum diuinus
ille Vates his verbis. *Emitte Spiritum
tuum & creabuntur, & renouabis fa-
ciem terrae.*

Noua for-
ma in calos
inducenda.

Hactenus Casarius, agnoscens cae-
lorum & syderum resolutionem, sicut
videmus metalla ignis ardore resolui.
Deinceps vero ab eorum Conditor in
melius restituenda, per nouam scilicet
formam, qua fiant caeli noui, & terra
noua, ut Apostoli & Prophetae dixe-
runt.

Sol corru-
ptioni obno-
xius.

Verum de hac tota Quaestione
vide Serarium, in Epistolam Diui Petri
secundam, cap. 3. Vide etiam libro 3.
Recognitionum, pag. 53. Basilus, Ho-
mil. 6. vocat Solem τὴν φλογὶ ὑποκείμενον
Corruptioni obnoxium. Et eatenus qui-
dem Salius.

NICOLAI SERARII PRO caelo corruptibili au- thoritas.

Nicolaus
Serar. per o-
mnia acci-
nit.

Nunc si placet, audiamus etiam
aliquantulum Patrem Nicolaum Sera-
rium Societatis nostrae, in cap. 3. Epi-
stolae 2. S. Petri. [Mihi, inquit, pag. 50.
colum. 2. videntur quattuor. Primum
proprie caelos accipi probat Cathari-
nus &c.

Probo primo, Ex nominis pro-
prietate, quae nisi quid obster, reti-
nenda.

Secundo, Quia de principalibus
& quasi extremis huius Mundi parti-
bus loqui voluit Apostolus, ut per eas
totius Mundi mutationem quandam
inferret.

Tertio, Quia versu 10. inter cae-
los & terram ponuntur elementa, per
quae intelligitur ignis & aer. Deinde
refutat Soares &c.

Idem Quaestiuncula prima, *sitne
ignis iste proprie sumendus? respondet su-
mendum proprie, idque ex communi.*

Idem ibidem Quaestiuncula secunda.
5 Sitne totus Mundus & quoad essen-
tiam, an eius aliqua tantum partes, &
quoad aliquid peritura? Respondet ef-
se duas opiniones. Priorem quae ait to-
tum periturum, in quam citat etiam
10 P. Alphonsum Salmeronem, Prolegom.
8. Ipse autem sic scribit.

Caeli syderei
comburentur
quoad sub-
stantiam.

Prima Propositio. Comburentur
inferioris huius mundi principales par-
tes quattuor quoad substantiam. Primo
15 caeli syderei. Secundo Aer. Tertio Aqua.
Quarto Terra. Probat per primo. Verbo-
rum proprietates id apertissime dicit. Nam
primo *comburentur* quando vinculum men-
tio non fit, significat id solui, quod
20 coagmentatum erat, destrui quod con-
structum: ita ut ipsi *comburentur* oppo-
natur v. 5. ut Ioan. 2. 19. Soluite tem-
plum hoc. Et Eph. 2. 14. 1. Ioan. 3. 8.
neque alia esse potest vehemens altera-
tio, quam verbo isto significari vult
25 Soares, Concl. 4. citato loco. Secundo,
Transire, ut supra, ex esse scilicet ad non
esse. Tertio *ignescere*. Quarto *ardere*.
Quinto *colliquescere seu tabescere*. Ab ipsa

30 *comburentur* proprietate, ut habet
communis regula, non discedendum, nisi
gravis causa urgeat, quae hic nulla est,
sed anticipata tantum Aristotelicarum
35 *comburentur*, quae solui facile possunt ra-
tionum opinio.

Anticipata
quarundam
rationum
Aristotelica
rum opinio,
non est causa
sufficiens, ut
a proprietate
te verborum
diuinorum
discedatur.
Probat per 2.

Probat per secundo. Si contrariam
sententiam tradere voluisset Apostolus,
poterat facillime verbis, quae dubita-
tionis aut nihil aut minus haberent, a-
40 lijs vti. Si nostram vero sententiam vo-
luit, neque alijs, neque clarioribus,
communiter loquendo, vti aut poterat,
aut debebat.

Tertio. Propositionis huius subie-
45 cta, proprie, vti ostendi, accipienda
sunt. At contraria opinio etiam praedi-
cata proprie accipit. Confirmatur ex
Soares, lect. 3. &c.

Probat per 3.

Probat per quarto. Ex supra citatis
50 Patribus, quibus addatur S. Hippoli-
tus, lib. de Consum. saeculi. Oecume-
nius hic. Sibylla loc. cit. Addit etiam
Hierony. Irenaeum, Proclum apud Epi-
phanium, imo & Augustinum 20. Ci-
55 uit. cap. 26.

Probat per 4.

Pro-

I.

[Probatur quinto. Noua terra, & noui cæli erunt, vers. 23. Ergo antiqui defierint &c.

FABRITIUS PAVLVCIVS CAELOS
natura corruptibiles
facit.

Fabritius
Paulutius.

Fabritius Paulutius Foroliuiensis, Episcopus primus Ciuitatis Plebis, in Commentarijs, quos Romæ 1625. super Genesin edidit, cap. 1. die prima fusc probat ex sacra pagina, omnia corpora in toto vniuerso esse à Deo facta ex vna eademq. materia prima, etiam cælum Empyreum. Idem aquas elementares atque fluentes ponit supra Firmamentum.

[Non possumus, inquit, pag. 11. col. 2. ignorare, quia Scriptura clarè dicit, aquas positas supra Firmamentum, non fuisse veras aquas, & elementares, prout quæ sub Firmamento remanserunt. & post pauca. Vnde illæ sunt veræ aquæ, & elementares non in alias immutatae, quod Scriptura non dicit, nec nos possumus nouitates fundare.]

Idem in Commentarijs itidem Romæ 1629. super Epistolam 2. Petri, editis, in cap. 3. pag. 538. columna 1. hæc habet. [Cæli magno impetu transiunt. An omnes cæli, vel aëreum tantum? magna difficultas. Videtur Petrus intelligere de aëreis, quia aqua eos tantum tetigit, quos dicit igni reseruos. At in contrarium videtur, quod cum omnes cæli ex prima materia (ex qua vt quattuor elementa compacta) formati sint: Gen. 1. & elementa omnia calore soluenda, inter quæ aquæ, quæ super conuexum Firmamenti sunt, Genesin 1. infra Empyreum: & omnis creatura renouationem expectet; Rom. 8. & id fiat in homine ex eisdem elementis compacto, quibusuis cælis excellentiore, & ipsi transitori & soluendi. & Iob. 14. vers. 13. Sic homo cum dormierit, non resurget, donec atteratur cælum, non euigilabit, nec confurget de somno suo. Et Dauid: ipsi peribunt, tu autem permanes, & sicut vestimentum veterascent, & sicut operatorium mutabis eos & mutabuntur; sic Augustinus de Ciuitate Dei, lib. 21. cap. 24. & si erunt signa in Sole, Luna,

II.

1 & Stellis, si virtutes cælorum commouebuntur, si cælum plicandum vt liber, si cæli non influent, ergo & hi passuri, & consequenter renouandi, transitori, soluendi per ignem; substantiam tamen omnium cælorum, & elementorum permansuram dicas, prout hic alii communiter, & Rup. Abb. in Gen. lib. 1. cap. 28. prout & in homine suscitanda &c.

ANNVIT CAELI CORRVPTIBILITATI Mersennus.

15 F. Marinus Mersennus, qui Opus in Genesin Parisiis anno 1623. edidit in Problema iv. Veneti, inter cætera hæc habet. pag. 12. colum. 2.

Marinus
Mersennus.

[At vt libenter quod sentio fatear, nulla est huius aut alterius sententiæ ratio, quæ facilem solutionem non patitur, cum cælorum incorruptio, aliter defendi possit, nec adhuc certum arbitror, quam ratione cælorum incorruptibilitas defendi possit, an absolute quoad omnes, & singulas partes, an quoad totum; quomodo elementa incorruptibilia dici possunt: nec adhuc ab Ecclesiæ decretum esse video, aut scio, quomodo D. Petri locus, in quo cælos igne cremandos esse ait, intelligendus sit; An nimirum ignis ardore iuxta qualitates, an etiam iuxta substantiam dissoluendi sint.

35 Adde quod non desint experientiæ quædam Astrologorum, quæ cælorum corruptibilitatem astruere videantur. de quibus ex professo alibi egimus.]

40 AQVAS NATVRALES SVpra
Firmamentum euehit Salazar.

45 Ferdinandus Quirinus de Salazar, Societatis nostræ Commentarijs in Proverb. Salomonis, in Cap. 8. v. 27. pag. 673. anno 1619 num. 344. littera D. super illa verba:

Ferdināus
de Salazar.

50 Quando præparabat cælos aderam, quando certa lege & gyro vallabat abyssos.]

Adducit lectionem Septuaginta interpretum, quæ talis est.

55 Cum secerneret sedem suam super ventos.

I.

Difficilem, inquit, sane explicatum habent ista verba, quibus Septuaginta plus de sententia, quam de singulis vocibus solliciti, suam mentem expresserunt. Tamen quantum coniectura affe- qui possum, existimo illos sedem Dei cælum Empyreum appellare. Sequuti autem videntur eam sententiam, quæ aquas super cælos defendit, & super eiusmodi aquas cælum Empyreum, quod sedes Dei, & Beatorum est, defixum esse dicunt.

Et quidem ut dicam etiam, quod sentio, quamvis aduersus hanc opinionem, quam pleraque Scripturæ testimonia robustam reddunt, Gen. I. Et fecit Deus Firmamentum, diuisitque aquas quæ erant sub Firmamento, ab his quæ erant super Firmamentum: Et Psalm. 148. Et aquæ quæ super cælos sunt, laudent nomen Domini, quam etiam ex Patribus plures suo suffragio, & calculo confirmant; multa Astrologi, & Philosophi argumenta congesserunt, docentes eam naturis rerum relictari: tamen existimo sine aliqua iniuria nature, & maximo cum decoro Scripturarum Sacrarum illam defendi, atque ab iniuriis Philosophorum vindicari posse. Quod olim præstitit noster Ludouicus de Molina, ad primam partem D. Thomæ, &c.

Hæc Salazar, qui deinde fusè probat inter primum Mobile, & cælum Empyreum eiusmodi aquas necessario interponendas esse, ne cælum Empyreum primo Mobili contiguum simul rapiatur. Et sic omnes Scripturæ lectiones, Ex Hebræo, ex Calæitano, ex Rodolpho, ex Tigurina versione, ex Septuaginta, ex Aquila, & Symmacho concordant.

&c.

Ait sententiam quæ aquas Firmamento superponit secundum naturam, & scripturam, ab iniuriis philosophorum vindicari posse.

II.

CAELORVM SVBSTANTIALEM interitum ex Scripturis asserit Folenghius Romæ approbatus, &c. editus.

Ioannes Baptista Folenghius Mantuanus Monachus Casinas, Comm. in Psalms Romæ 1585. Gregorij Decimitertij nutu editis, in Psalmum Centesimumprimum super verba: *Ipsi peribunt, tu autem permanes, & omnes sicut vestimentum veterascent, & sicut opertorium mutabis eos, & mutabuntur;* ita discurret.

Sicut indumentum, & pallium, mutabis eos, vertunt ex Hebræo, & mutabuntur.

Hic aperte à Spiritu affirmatur, Tota Mundum nouum marcescente veteri, & pereunte, refundendum esse cælum, nempe di Machina dissoluetur.

totam elementorum machinam, & quidquid supra elementa positum est. Omnino enim Mundi huius fabricam interire, quo non iam nanciscatur imaginem, necesse est: alioqui non dixisset Isaias, Quod cælum tanquam fumus deficiet, & terra tanquam vestimentum senescet. Quod porro senescit, aiebat Paullus, prope interitum est.

Ecquis unquam dixit vestem, ab aliquo mutari, nisi cum priori abiecta, aliam induerit? Ecce ait, creo cælos nouos, & terram nouam, & iam non erit priorum memoria.

Donec, inquit Iob, atteratur cælum, cum dormierit, non resurget homo. Quod si certe non atterendum esset cælum, prorsusque dissipandum, neque hominem resurre-cturum affirmare cogeremur.

Interibunt igitur cæli omnes, nobilissimum scilicet Dei opificium, nouamque assumet faciem vniuersus orbis. hæc ille. Approbatus est autem hic auctor Romæ à Sacri Apostolici Palatii Magistro.

Io. Bap. Folenghius.

Tota Mundi Machina dissoluetur.

Omnes cæli interibunt substantia-liter.

I

GENEBRARDVS CAELOS
natura corruptibiles docet,
&c.

Genebrard.

Genebrardus in psal. Centesimum
primum, editionis Lugdunensis 1600.
super verba, *Ipsi peribunt.*]

„ Caeli, inquit, à suo statu, in
„ quo nunc sunt recedent, & omnes
„ antiquabuntur instar vestimenti,
„ quod cum per vetustatem detri-
„ tum fuerit, innouari debet. Sic e-
„ nim & caeli, cum ad consummatio-
„ nem saeculi peruenerint, immutabun-
„ tur ad nouitatem maioris gloriae.

„ *Nam futura est & caeli, & terrae*
„ *mutatio, non in totum abolitio, ut*
„ *abiciant vestimentum corruptionis,*
„ *2. Petri 3. ver. 13. Ad Rom. 8. v.*
„ *20. & 21. & induant nouam vestem*
„ *incorruptionis, &c.*

„ Et in Psalm. 148. Corpora caelestia
„ non nisi secundum qualitates muta-
„ buntur, siue renouabuntur, (vtique
„ physice non localiter tantum)
„ igne conflagrationis. Etenim, vt paul-
„ lo post ait, *caelis non est naturale, ut*
„ *in æternum maneant, sed Dei bonita-*
„ *te id illis erogatur, &c.*

Caliconfla-
grabunt.

C A E L V M N A T V R A
corruptibile, & corrumpendum
agnouit, & docuit Mar-
tinus Becanus.

Martinus
Becanus.

Martinus Becanus Societatis nostrae,
in parte prima Theologiae Scholasticae,
quam Moguntiae anno 1612. publicae
utilitati emisit, de operibus sex die-
rum, in Opere diei secundi, pagi-
na 403. 404. 405. Ita philosophatur.

„ Secunda Conclusio. Per Firma-
„ mentum intelligi debet aggregatum;
„ ex aëre, igne, & omnibus caelis mo-
„ bilibus, &c.

„ Tertia Conclusio. *Hæc omnia*
„ *quæ nomine Firmamenti intelligun-*
„ *tur, facta sunt ex aqua, quæ prius*
„ *implebat totum spatium, à terra vs-*
„ *que ad caelum empyreum, &c.*

Obiectio tri-
plex.

„ Dices si caeli sunt producti ex a-
„ qua, sequuntur tria absurda.

II.

1 „ Primò, Quod habeant materiam
„ eiusdem speciei cum his inferioribus.
„ Secundò, Quod sint corruptibiles.
„ Tertiò, Quod non sint creati, sed
5 „ ex materia producti.

„ Respondeo, Nihil horum absur-
„ dum est.

„ Non primùm, Quia multi Phi-
„ losophi defendunt materiam caelo-
10 „ rum, & sublunarium esse eiusdem
„ speciei.

„ Nec secundùm; quia coeli etsi ab
„ agente naturali corrumpi nō possint,
„ & hac ratione dici soleant natura-
„ sua incorruptibiles, tamen à Deo
„ corrumpi possunt, & reuera cor-
„ rumpentur, vt ex Scripturis patet.

„ Psalm. 101. vers. 26. Isa. 51. vers. 6.
„ *Celi sicut fumus liquefcent. 2. Petri*
„ *3. vers. 10. Celi magno impetu tran-*
„ *sient. Celi ardentes soluentur.*

„ Nec tertium, Quia multi Patres
„ id docent, nec apparet vlla repu-
„ gnantia.

25 „ Sexta Conclusio. *Per aquas quæ*
„ *supra Firmamentum sunt, debent in-*
„ *telligi veræ aquæ, & eiusdem spe-*
„ *ciei cum his inferioribus.*

„ Ita plerique Patres apud Moli-
„ nam, disp. 10. Et probatur, quia
„ hoc est magis conforme Scripturæ,
„ quæ non vno, sed multis locis aper-
„ te asserit, esse aquas supra cælum.

35 „ *Et nihil obstat, quo minus proprie*
„ *id intelligatur; imo debet proprie in-*
„ *telligi, vt patet ex narratione Moysi.*

„ Nam aquæ primo die non fuerunt
„ diuise sed coniunctæ, & sine du-
„ bio eiusdem speciei: ergo postquam
„ diuise sunt, non potuerunt esse
„ diuersæ speciei, quia per solam sepa-
„ rationem localem non mutatur na-
„ tura specifica.

45 „ Dices, Aquæ elementares natura
„ sua corruptibiles sunt, & actu cor-
„ rumpuntur, quando adest aliquot
„ agens naturale, quod possit illas cor-
„ rumpere: sed radij solares perue-
„ niunt vsque ad aquas supercaelestes,
„ & habent vim corrumpendi aquas
„ elementares: Ergo si aquæ illæ su-
„ percaelestes sunt elementares, cor-
„ rumpentur à radijs solaribus: sed
„ absurdum est eiusmodi corruptio-

55 „ nem admittere supra cælos: ergo

B b b b 3 etiam

Cali corrū-
pentur.

Obiectio.

Solutio:

„ etiam absurdum est, concedere a-
 „ quas elementares supra cælos.
 „ *Respondeo, aquæ illæ supercaelestes*
 „ *sunt quidem corruptibiles, sed tamen*
 „ actu non corrumpuntur, vel pro-
 „ pter qualitatem loci conseruantem,
 „ vel propter summam resistantiam,
 „ vel propter qualitatem aliquam ip-
 „ sis impressam, qualem etiam habent
 „ corpora gloriosa, & damnatorum,
 „ vel denique quia Deus denegat suū
 „ concursum ad omnem alterationem,
 „ qua corrumpi possent.

Idem de Opere Quarti diei, id est
 de Astris, pag. 409. ita scribit.

„ Prima Conclusio. *Probabile est*
 „ *Deum quarto die produxisse astra tam*
 „ *quoad substantiam, quam quoad acci-*
 „ *dentia, quod sic declaro. Deus secun-*
 „ *do die produxit orbes caelestes ex aquis*
 „ *in equabili varietate ac densitate:*
 „ *quarto die fecit quasdam partes ra-*
 „ *riores, & alias densiores; & densio-*
 „ *ribus dedit nouas formas substantiales,*
 „ *figuram rotundam, lucem, & mo-*
 „ *tum.*

„ Cum ergo partes illæ densiores sint
 „ astra, sequitur astra quarto die pro-
 „ ducta esse secundum formas suas sub-
 „ stantiales, & secundum accidentia,
 „ iam dicta. Hæc conclusio proba-
 „ tur, Quia scriptura non aliter loqui-
 „ tur de productione aliarum rerum:
 „ sed aliæ res, non solum quoad sua
 „ accidentia, sed etiam quoad suam
 „ substantiam productæ sunt: ergo et-
 „ tiam astra.

*Astra sunt
 specie distin-
 cta à suis or-
 bibus.*

„ Dices: hæc sententia supponit,
 „ quod astra habeant formas substan-
 „ tiales distinctas à formis suorum
 „ orbium, ac proinde quod distinguantur
 „ specie à suis orbibus.

„ Respondeo: Ita est. Et probatur
 „ primo, Quia quod suapte natura lu-
 „ cidum est, specie differt ab eo, quod
 „ suapte natura non est lucidum: sed
 „ probabile est, Solem suapte natura
 „ lucidum esse, non autem orbem So-
 „ lis: Ergo probabile est, Solem spe-
 „ cie differre à suo orbe.

„ Idem dico de cæteris astris exce-
 „ pta Luna, quæ suapte natura non est
 „ lucida, sed illuminatur à Sole. Hactenus
 „ Becanus.

PRO CAELO CORRVPTIBILI,

Patris Ioannis Ludouici de

La Cerda Aucto-
ritas.

Ioannes Ludouicus de La Cerda Societatis nostræ, in suo Opere Ad-
 uersariorum Sacrorum, quod Lugduni
 anno 1626. in lucem emisit, capi-
 te centesimo quinquagesimoquar-
 to, pagina 380. numero 21. colum-
 na prima pro cæli natiua corruptibili-
 tate, grauitè sequentibus verbis pe-
 rorat.

„ Cælos natura sua esse corruptibi-
 „ les plurimi ex Patribus nituntur pro-
 „ bare, ex Scriptura; (nota Lector,
 „ ex Scriptura non ex Platonis Aca-
 „ demia) Ambrosius primo, Hexaem.
 „ capite 6. ubi eos irridet, qui dicunt
 „ cum Aristotele, cælum esse Quintam
 „ essentiam, non de natura elementor-
 „ um. Cassiodorus super psalmum
 „ centesimum primum. Opera ma-
 „ nuum tuarum sunt cæli, ipsi peri-
 „ bunt, tu autem permanes.

„ Ibidem Euthymius & Damasco-
 „ nus de Fide Orthodoxa 2. capite
 „ sexto. Gregorius Nyssenus de Crea-
 „ tione Hominis, capite 24. Chry-
 „ sostomus, Homilia 10. ad Popu-
 „ lum. Theodoretus, super Rom. 8.
 „ in illud, Creatura liberabitur à ser-
 „ uitate Corruptionis. Iustinus Mar-
 „ tyr, in responsione 93. 94. & 95. ad
 „ Quæstionem Orthodoxorum.

„ Altera sententia tenet cælos esse
 „ incorruptibiles, & esse cuiusdam
 „ essentia ab elementis remotæ, quam
 „ tenuit Aristoteles, & quem sequi-
 „ tur Diuus Thomas, & communis
 „ Schola Theologorum, & ad omnes
 „ Scripturas primæ Opinionis respon-
 „ dent, vel illis intelligi ærem, qui
 „ passim cælum appellatur; vel si cæ-
 „ lum verè intelligatur, intelligi de
 „ cælo, in quantum accidentia ha-
 „ bet motus, & claritatis, & alia
 „ huiusmodi, quia Sol obscurabitur,
 „ & Luna, & stellæ, & cessabit cæ-
 „ lorum motus: non autem quantum
 „ ad essentiam cælorum, qui incorru-
 „ ptibiles sunt.

*Ioannes Lu-
 douicus De
 La Cerda.*

*Sententia
 pro Cælo cor-
 ruptibili.*

*S. Ambro-
 sius irridet
 Quintam
 Cæli essen-
 tiam.*

*Sententia
 pro Cælo in-
 corruptibili.*

Hæc

I.

„ Hæc est vtraq. opinio, & mirum
 „ est quot ingenia exercuerit. Quid
 „ ego dicam in tanta varietate?

De La Cer- „ *Existimo sane priorem sententiam*
da sentit cæ- „ *esse verissimam, & omnino celos*
los esse cor- „ *esse corruptibiles, quanquam non*
ruptibiles; „ *corrumpentur ex Dei prouidentia.*

„ Nam quid ad ista responderi queat
 „ ignoro: nimirum ad Iob, 14.

Loca Scri- „ *Homo cum dormierit non resurget,*
ptura fortis „ *donec atteratur celum. Et Psalmi*
sima pro cæ- „ *centesimi primi. Opera manuum*
li corrupti- „ *tuarum sunt celi, ipsi peribunt, id*
bilitate. „ *est, poterunt perire. & clarum*

„ est de cælo loqui. Isaia, 34. *Et ta-*
 „ *bescet omnis militia celorum, &*
 „ *complicabuntur sicut liber celi.*

„ Item, *Et omnis militia eorum defluet.*

„ Et capite 51. *Celi sicut fumus li-*
 „ *quescent.* Ad quæ difficile respon-
 „ detur.

„ Et consulant (rogo) Ambrosium
 „ in 1. Hexaem. capite sexto qui-
 „ bus difficilis videtur hæc opinio.

„ Cur opere tanto institerint philoso-
 „ phi in probanda incorruptibilitate

„ cæli, diu hæsi, & quidem dispicere
 „ in quantum possum, nulla alia eos

„ res mouet, quam saluum & inte-
 „ grum Aristotelem præbere. *Egregia*

„ *quidem laus illum anteponeere tot cæ-*
 „ *lestibus. Ego nihil ambigo, eum er-*

„ *rasse, & quotquot eius sententiam*
 „ *defendunt.*

Ira Lacerda:

Concludo has de Cæli cor-
 ruptilitate auctori-
 tes cum Hym-
 no Vesper-
 ti-

no Ecclesiæ, & Lessu sa-
 cro mortuali, quo Cæ-
 lis ipsis Eccle-
 sia quotan-

nis
 sollempniter parentare, inte-
 ritumq, certum præ-

dicere vide-
 tur.

„

„

„

„

„

„

„

„

„

II.

Hymnus Ecclesiæ Ve-
spertinus.

„ Immense cæli Conditor,

„ Qui mixta ne confunderent,

„ *Aquæ fluentia diuidens,*

„ *Cælum dedisti limitem,*

„ Firmans locum cælestibus,

„ Simulque terræ riuulis,

„ *Vt vnda flammæ temperet,*

„ Terræ solum ne dissipent.

Animaduersio.

Hinc habes aquas veras supra Cæ-
 lum Firmamenti positas; habes cælum
 calidum, & aquas supercælestes frigi-
 das, quæ frigore suo æstum illum cæ-
 lestem temperent, ne terrenam molemi
 ardoris excessu comburant: & conse-
 quenter omnia ex natura sua corru-
 ptioni subiecta, idque ex mente & sen-
 su Ecclesiæ sacrosanctæ, & Hymni Ec-
 clesiastici, in laudem diuini huius O-
 peris die secundo patrati: quæ laus
 parua esset, si hæc vera non cense-
 rentur.

Audiuimus Hymnum Vesperarum;
 consideremus quoque, si graue non
 est, Sequentia mortualia Sacri Matu-
 tini seu Missæ Defunctorum carmina,
 & Caduco huic Mundo vna cum Eccle-
 sia tota, ritu cantuque lugubri paren-
 temus.

45 Hymnus Ecclesiæ Ma-
tutinus.

„ Dies iræ dies illa, *Soluet seculum*
 50 „ *in fauilla;* Teste David cum Sybil-
 la. &c.

Sic ruet orbis opus; verbum non
 amplius addo.

I.

Hosce autem versiculos eo gratio-
fiores futuros esse iudicavi, quod ex i-
pso florentissimo & fragantissimo hor-
ti Vrsini Roseto decerpi sint. Nam
teste Abr. Bzouio, tom. Annalium xiii.
anno Christi 1294. numero 37. & 39.
Fratres Latinus Episcopus Ostiensis,
Patre Frangipanius, Matre Vrsinus, à
Nicolao III. Pontifice Maximo, A-
uunculo suo & ipso Vrsino, in filium
& Familiam Vrsinam adoptatus, &

II.

ex Ordine Prædicatorum Cardinalis
creatus, hosce doctrinæ & pietatis suæ
monumenta nunquam interitura.
Lectus sacros condidit: quos Ecclesia
vniuersa cum paucis eiusmodi Hym-
nis, in partem Officij diuini pro De-
functis assumpsit, ut ipse semper vi-
uat, dum mors aliorum lugubri car-
mine ad occasum vsque Mundi deplo-
retur.

Hec autem omnia absque præiudicio partis alterius, & præseruato
S. Ecclesiæ sensu, dicta sunt.



DE CAELI LIQVIDA SVBSTANTIA.

PRO NATURA CAELI LIQVIDA.

CAP. XXVI.

Auctoritates ex Sacra Scriptura.

I.

Calorum
liquiditas
asseritur:
Primo, Ex
Etymologia



PRIMA Aucto-
ritas trahitur ex
Etymologijs no-
minum Hebrai-
corum, quorum
significatio ab
ipsomet Domino
Deo ipsis impo-

sita, auditorem quasi manu ipsa in o-
pinionem caeli fluidi videtur deducere.
De qua re copiose dictum est, ubi de
Natura caeli ignea ex auctoritate alio-
rum edisseruimus, quo & Lectorem
ablegamus.

Secundo, Ex
liquida E-
lementorum
natura, qua
caelestia con-
sistunt.

Secunda Auctoritas ex ijs Scripturae
locis eruitur, quibus caelum vel igneum
vel aereum, vel aqueum esse indicatur,
cuiusmodi plurima à SS. Patribus pro-
feruntur, quemadmodum in hoc toto
tractatu satis est videre. Isaia cap. 40.
caelum NIHILO; eiusdem cap. 51.
FUMO comparatur utique propter
liquidissimam tenuitatem, vel tenuissi-
mam liquiditatem. quemadmodum
SS. Patres explanant.

Tertia Auctoritas sumitur ex iis lo-
cis, quibus sacra Scriptura motum non
caelo, sed ipsis Planetis tribuit; quod i-

II.

dem & de statione Patres intellectum
volunt. Iosue 10. Eccles. 1. Psalm.
18. & 104. Iob. 38. Isa. 10. Habacuc. 3.
&c.

Hæc autem à Patribus ita intelligi,
docebunt ipsorum afferendæ auctori-
tates.

Quarta, Pro caelo liquido auctoritas
ex Scriptura vrgetur vehementissime
à SS. Patribus, quod ea caelorum mul-
titudine, quam motuum caelestium va-
rietas exigeret, à Mose & aliis Cano-
nicis Scriptoribus nequaquam sit ex-
pressa, cum tamen & caeli & omnis or-
natus eorum sufficienter sint expressi.
& cum præter tres caelos ex Scriptura
plures nesciantur; neque in primo seu
Empyreo, aut postremo siue aëreo stel-
lae vllæ vel sint vel moueantur, sed om-
nes in medio. Quod est Firmamentum
Scriptura teste existant: ut euitetur pe-
netratio corporum, oportet illud stel-
lis diuersimode motis, peruium adeo-
que flexile, & cessile permitti, prout
Sancti Patres totis velis remisque ex
ipsa Scriptura inferius suis locis cum
ipsorum testimoniis alleganda conten-
dunt.

Tertio, Ex
motu libero
Planetarum.

Quarto, Ex
numero ca-
lorum, &
motu vario
caelestium.

Quinta

Quinto
E celi duri
silentio in
sacris litt.

Quinta Auctoritas ex eo desumitur, quod Sacra Scriptura celi duri nusquam meminerit. Nam locum illum Iob, c. 37 v. 18. *Tu forsitan cum eo fabricatos es celos, qui solidissimi quasi ære fusi sunt;* ipsimet Peripatetici, pro liquiditate celi contra adamantinam illam duritiam explicant. Fr. Marinus Mersennus, pag. 836. 837. 838. 840. [Vt autem (inquit cum Pineda nostro) non est opus Firmamentum concipere durum, ut lapidem, ita neque celos, qui diuinam potentiam in eo prædicant, quod tamen fluxa sint labilisque naturæ, eorum tamen duratio non sit minus perpetua, quam si firmissimi essent, & velut ære fusi. Deinde ex Rabbiniis probat ex hoc loco cælum esse aërem tenuem. Et postea, locum hunc (inquit) Vatablus S. Inquisitionis iussu correctus & Salamantica editus anno 1584. sic reddit. *An cum ipso extendebas æthera ita solidum, ut videatur res fusilis.* Multis deinde translationibus præmissis, ita subdit. [Hunc locum non ita cælorum soliditati ac duritiei fauere puto, quin eorum liquiditatem ac fluidam naturam admittere possimus, &c. Quãdoquidem verus istius loci scopus ac sensus est, ut diuinæ Maiestatis infinitam potentiam suspiciamus atque veneremur, quæ in eo maxime perspicitur, quod *natura fluxilis qualis est aërea, æthereæ, & aquea*, tam firmiter in suo situ persistat, ac si ex fortissima Crystallo, aut alia quapiam durissima materia conflaretur. Et tandem post multa.

Aduertas, ait, ex illo Iobi loco nihil inferri, quia Iob vel Deus non loquitur, sed Elui, qui à c. 35. vsque ad 38. semper loquitur, cuius dicta omnia tanquam

vera probare non tenemur.]

Et sic ex ipsa Peripateticorum confessione, potissimus Scripturæ locus, ut alias quoque videbitur, contra ipsos per cælo liquido facit.

Sexta scriptura auctoritas profertur ex ipsa celi liquidi non duri Genesi; Genesis cap. 1. statim initio & ex Prou. c. 8. Quæ loca, utpote neruosa, postea

ad calcem huius de cælorum liquiditate tractationis, verbatim recitabuntur.

Plura & locupletiora qui volet, adeat Solem Illustratum, Illustris ac Generosi Domini, D. Ioan. Nicolai à Smogulecz Smoguleczi, &c. pag 53. 54. 55. Nunc ipsos sanctos Patres suam sententiam declarantes, audiamus.

Septima, Huc reuocari potest Esdras qui lib. 4. c. 6. v. 41. Eandem de cælo liquido sententiam satis clare prodit, hisce verbis. [Et die secundo creasti spiritum Firmamenti, & imperasti ei ut diuideret, & diuisionem faceret inter aquas, ut pars quædam sursum recederet pars vero deorsum maneret.] Hæc ille. Deinde subdit, tertio die septimam aquarum inferiorum partem esse congregatam in maria, sex autem alteras partes esse siccatas in altum. Per spiritum certe Firmamenti, quo aquæ cælestes à terrestribus diremptæ dicuntur, non potest intelligi nisi aër, aut ignis: vterq. autem est natura liquidus.

Auctoritas autem huius Viri, censetur. Scripturæ

Canonicae à

Theo-

lo-

gis proxima.

Sexto Ex ipsa calorum naturali & materiali genesi.

Septima ex Esdra.

Vatabli versio.



Pro Cæli liquida substantia Aucto- ritates sanctorum Pa- trum.

I.



QVAESTIONEM hanc de cælo duro, aut non duro, fluido aut non fluido, non esse nouam, sed ab antiquo inter doctos agitatam, & utcumque determinatam, satis patebit ex ijs quæ sancti Patres in monumentis suis posteritati tradiderunt, vti mox ipsorum verbis narrabitur.

PRO CAELO LIQVIDO Auctoritas sancti Augu- stini.

S. August. Sanctus enim Augustinus, l. 2. de Genesi ad litt. c. 1. 2. 3. 4. 5. super illa verba, *Fiat Firmamentum in medio aquarum, & sit diuidens inter aquam, & aquam: & sic factum est, & fecit Deus Firmamentum, & diuisit Deus inter aquam, quæ erat infra Firmamentum, & inter aquam quæ erat super firmamentum, & vocauit Deus Firmamentum cælum.* sic scribit.

[Vtrum autem nunc illud cælum fiat, quod excedit aëris omnia spacia, eiusque omnem altitudinem, ubi etiam luminaria stellæq; constituuntur quarto die, an ipse aër vocetur Firmamentum, quæri merito potest.] Multi enim asserunt istarum aquarum naturam super sidereum cælum esse non posse, quod sic habeant ordinatum pondus suum, vt vel super terram fluitent, vel in aëre terris proximo vaporali ter ferantur.

**S. Aug. ex-
cludit mira-
culosâ Dei
potentiam.** Nec quisquam istos debet ita refellere, vt dicat secundum omnipotentiam Dei cui cuncta possibilia sunt, oportere nos credere, aquas etiam tam graues, quam nouimus atque sentimus cælesti corpori in quo sunt sydera, superfusas.

Nunc enim quemadmodum Deus instituerit naturas rerum, secundum scrip-

II.

1 turas eius nos conuenit querere, non quid in eis vel ex eis ad miraculum potentia sua velit.

Neque enim si vellet Deus sub aqua
5 oleum aliquando manere, non fieret: non ex eo tamen olei natura nobis esset incognita, quod ita facta sit, vt appetendo suum locum, etiamsi subterfusa fuerit, perumpet aquas, eisque se superpositam collocet.

10 Nunc ergo querimus, [Vtrum Conditor rerum, qui omnia in mensura, & numero & pondere disposuit, non unum locum proprium ponderi aquarum circa terram tribuerit, sed & super cælum, quod ultra limitem aëris circumfusus, atque sol datum est? Quod qui negant esse credendum de ponderibus elementorū

20 desuper quasi quodam pavimento solidatum esse cælum, vt possit aquarum pondera sustinere, quia talis sol datus nisi terris esse non possit, & quidquid tale est, non cælum sed terra sit. Non enim tantum locis, sed etiam qualitatibus proprijs elementa distinguuntur, vt pro qualitatibus proprijs etiam loca propria sortirentur.] Id. quod ordine ibidem probant, à terra ad aquam, ab hac ad aërem, & ex hoc ad ignem, atque adeo ad cælum. post quæ omnia, sic iterum pergit D. Augustinus.

[Quapropter colligitur multo minus esse posse aquis [supra illud igneum cælum] aliquid loci, cum illic aër multo a-

35 quis leuior manere non possit.] Tatibus eorum disputationibus cedens laudabiliter, conatus est quidam demonstrare aquas super cælos, vt ex ipsis visibilibus conspicuisque naturis assereret Scripturæ fidem. Et cum ex variis Scripturæ locis probasset aërem dici cælū, & nubes supra aërem volui, subdit S. Augustinus; [Ergo ex aëre, qui est inter vapores humidos, vnde superius nubila conglobantur, & maria interfusa, ostendere ille voluit esse cælum inter aquam & aquam

**S. hic Do-
ctor, secun-
dū scriptu-
ras naturas
rerū inda-
gandas do-
cet, non se-
cundū pla-
cita Plato-
nis, &c.**

Sap. 11. d. 21

**Status Qua-
stionis.**

**Ex ponde-
ribus elemē-
torū argu-
mentantes,
cælo solidi-
tatem rigi-
dā adimūt,
soli terræ
concedunt.**

**Supra aërē
creditum est
esse cælum
igneum tē-
pore Augus-
tini ipsemet
idem sentit
August. vt
visum est in
prioribus.**

I.

& aquam. Hanc ergo diligentiam considerationemque laude dignissima iudico. Quod enim dixit, neque contra fidem est, & in promptu posito documento credi potest.

*Quamquam possit videri non impedire propria pondera elementorum, quomodo etiam super illud sublime cælum possint esse aque per illas minutias, per quas etiam super hoc spacium aëris esse potuerunt, qui quamuis grauior & inferior summo cælo subiaceat, procul dubio leuior est aquis, & tamen ut super eum sint vapores illi, nullo pondere prohibentur. Sic ergo & super illud cælum potest minutioribus guttis leuior halitus humoris extendi, qui pondere cadere non cogatur.

Ipsi quippe subtilissima ratione persuadent, nullum esse quamlibet exiguum corpusculum, in quo diuisio finiatur, sed infinite omnia diuidi: quia omnis pars corporis corpus est, & omne corpus habeat necesse est, dimidium quantitatis suæ: ac per hoc si potest aqua, sicut videmus, ad tantas guttarum minutias peruenire, ut super istum aërem vaporali feratur, qui natura leuior est aquis: *cur non possit & super illud leuius cælum minutioribus guttis & leuioribus immanare vaporibus?

*Argumentū
ex qualitate
& cursu Sa-
turni.*

Quidam etiam nostri, istos negantes propter pondera elementorum, aquas esse posse super cælum sidereum, de ipsorum siderum qualitatibus & meatibus conuincere moluntur.

*Iidem namque asserunt stellam, quam Saturni appellant, esse frigidissimam, eamque per annos triginta signiferum peragere circulum; eo quod superiore ac per hoc ampliore ambitu graditur. Nam Sol eundem circulum per annum complet, & Luna per Mensem, tanto ut dicunt breuius, quanto inferius, ut spatium loci spacium temporis congruat.

*Quæritur itaque ab eis, unde illa stella sit frigida, quæ tanto ardentior esse deberet, quanto sublimiore cælo rapitur.

Nam procul dubio cum rotunda moles circulari motu agitur, interiora eius tardius eunt, exteriora celerius, ut maiora spatia cum breuioribus ad eisdem gyros pariter occurrant; quæ autem celerius, utique feruentius.

II.

1 *Proinde memorata stella magis debuit calida esse quam frigida: quamuis enim suo motu, quoniam grande spatiū est, triginta annis totum ambitum permeet, * tamen cæli motu in contrarium rotata velocius, quod quotidie necesse est patiatur (quoniam, sicut dicunt, cæli singulæ conuersiones, dies singulos explicant) calorem maiorem debuit cælo concitatore concipere.

10 Nimirum ergo eam frigidam facit aquarum super cælum constitutarum illa vicinitas, quam nolunt credere, qui hæc quæ breuiter dixi, de motu cæli & siderum disputant. His quidam nostri coniecturis agunt aduersus eos, qui nolunt aquas super cælos credere, & volunt eam stellam esse frigidam quæ iuxta summum cælum circuit: ut ex hoc cogantur aquarum naturam credere, non iam illic vaporali tenuitate, sed glaciali soliditate pendere.

25 *Quoquomodo autem & qualeslibet aquæ ibi sint, esse eas ibi minime dubitemus: maior est quippe Scripturæ huius auctoritas, quam omnis humani ingenij capacitas.]

Idem sanctus Augustinus lib. 11. de Ciuitate Dei cap. 34. ita de aquis hisce supercælestibus scribit.

[Sed ij qui in nomine aquarum quæ super cælos sunt, Angelos intelligi volunt, ponderibus elementorum mouentur, & ideo non putant aquarum fluidam grauemque naturam in superioribus mundi locis potuisse constitui: qui secundum rationes suas, si ipsi hominem facere possent, non ei pituitam, quod græce *Phlegma* dicitur, & tanquam in elementis corporis nostri aquarum vicem obtinet, in capite ponerent; ibi enim sedes est Phlegmatis, secundum Dei opus utique aptissime: secundum istorum autem coniecturam tam absurde; ut si hoc nesciremus, & in hoc libro similiter scriptum esset, quod Deus humorem fluidum & frigidum, ac per hoc grauem, in superiore omnibus cæteris humani corporis parte posuerit: isti trutinatores elementorum nequaquam crederent. Et si auctoritati eiusdem Scripturæ subditi essent, aliquid aliud ex hoc intelligendum esse censerent.]

*Trutinato-
ribus elemē-
torum, oppo-
nit D. Aug.
fabricā cor-
poris huma-
ni.*

I.

SCHOLIA IN CITATOS

locos, & Corollaria.

Ex hisce constat Sancti Augustini temporibus hanc quæstionem de Cæli duritie non ignoratam, sed acriter agitatam, & veluti pro decisa ab omnibus habitam esse idque in partem negatiuam, nimirum in cælo duritiem nullam reperiri; quod verbis apertis scribit, * negatum esse vilo modo ita desuper quasi quodam pāuimento solidatum esse Cælum; vt possit aquarum pondera sustinere, & causam negationis huius indicat, quod eiusmodi duritia sit solius terræ proprietas, non autem Cæli: vnde super hanc negatam Cæli duritiem, & contrariam fluiditatem suppositam, sua de gravitate elementorum argumenta superstruxerunt; quæ profecto vim & pondus nullum habuissent, si vel ipsi, vel aduersarij ipsorum adamantinam Cæli firmitatem, quæ modo à Neotericis vrgetur, agnouissent. Nā vel cōtra semetipsos furioso more declamitassent, si per cælum durum à se agnitum, aquas siue delapsuras timuissent, seu ascensuras promouissent: vel irritato conatu id ipsum aduersarijs obtrussissent, si contra duri Cæli assertores, arma tam inepta expediuissent. Quis enim non videt, omnia illorum molimina, ex elementorum ponderibus deducta, ex sola Cæli duritie opposita, elidenda atque in nihilum redigenda fuisse? Quod cum non fecerit Sanctus Augustinus, sed amplius dicat, ipsorum disputationibus laudabiliter cessum & locum datum esse; patet fluidam Cæli naturam vtrinque admissam atque pro concessio fuisse habitam.

Et hinc euenit, vt aquas supra Firmamentum stellarum ex vi Sacrae Scripturæ collocandas, ne naturali pondere decasuras admittere cogerentur, infra Lunam & sphaeram ignis detraherent, supraque aërem in nubes aut vapores redactam cohiberent, ipso aëre in Cæli & firmamenti locum ex scripturæ explicatione substituto. Hinc etiam ipse sanctus Augustinus, ex ipsismet Mathematicorum illorum funda-

II.

I mentis, ait easdem naturales & graues aquas, vel calore in vapores subtilissimos attenuatas, vel frigore in glaciale rigorem condensatas posse in altissimis & vltimasaturnalibus Mundi regionibus suspensas & à casu liberas teneri; quod frustra diceret Sanctus Pater, nisi aquas vel non constrictas, vel non vapidas deorsum labiles existimaret. ex quo mox elucescit, Cælum hisce aquis subiectum, minime durum, sed liquidum & cessile ab ipso fuisse habitum.

Alioquin aquas, non casuras, non fuisset opus restringere ad hosce duos casus, sed poterat absolute dicere aquas nullo modo defluxuras, etiamsi in mare integrum colliguesfactæ & conglobatæ fuissent; quandoquidem Cæli ahenei aut adamantini siue denique crySTALLINI insuperabilis firmitas, ipsarum lapsum penitus inhibuisset.

Sanctus igitur Augustinus rigidam Cæli soliditatem neutrquam agnouit: quod ex eo quoque stabilitur, quod illis, qui vi argumentorum Mathematicorum pressi, ad metaphoricæ locutiones diuersi, per aquas supercælestes Angelos interpretati sunt, non opposuit indomitam Cæli duritiem, quod vtrique facere debuisset, si Cælum rigidum iudicasset; sed humani cerebri pituitam; quæ male rursus huc ab Augustino applicaretur; si interstitium aquarum cælestium, & terrestrium ita firmum credidisset, vt neque hæ supra illud euaporare, neque illæ inguttas grandiores resolutæ infra destillare potuissent: frustra sane inquam contra istos elementorum trutinatores humani corporis temperiem allegaret, quandoquidem similitudinis ratio nulla penitus daretur.

Ipsi quoque sensuum istorum allegoricorum inuentores, sui excusandi causam non haberent, siquidem Cælo duro vel posito vel agnito, à molestis Mathematicorum stateris atque librationibus nullo negotio sese expediuissent, dicendo per duram Cæli substantiam aquas supra retineri, tamen si graues & elementares, illuc à Deo semel positas.

Humiditatem humani cerebri frustra obijcit D. August. si cælum durum agnouisset.

I.

Quæ cum à nemine illorum prolata sint; patet neque cælum durum à quocumque probatum, sed fluidum habitum atque suppositum fuisse: id quod fufius paullo post ostendetur.

*S. August.
tempore agi-
tata Quæst.
An Firma-
mentū stet?*

Nam idem sanctus Augustinus de Genesi ad litteram, lib. 2. cap. 10. stomachatur in eos, qui similia præter suum officium nimis importune aut curiose exigunt.

[*De motu etiam celi, inquit, nonnulli Fratres Quæstionem mouent, vtrum stet an moueatur? Quia si mouetur, inquit, quomodo Firmamentum est? Si autem stat, * quomodo sydera quæ in illo fixa creduntur, ab oriente vsque ad occidentem circumeunt, Septentrionibus breuiiores gyros iuxta cardinem peragentibus, vt cælum, si est alius nobis occultus Cardo ex alio vertice, sicut Sphæra, si autem nullus alius cardo est, velut discus rotari videatur?

Quibus respondeo, multum subtilibus & laboriosis rationibus ista perquiri, vt vere percipiatur, vtrum ita an non ita sit: quibus ineundis atque tractandis, nec mihi tempus est, nec illis esse debet, quoad salutem suam & sanctæ Ecclesiæ necessariam vtilitatem cupimus informari.

*Responsio D.
August.*

* Hoc sane nouerint, nec nomen Firmamenti cogere, vt stare cælum putemus.

Firmamentum enim non propter stationem, sed propter firmitatem, aut * propter transgressionem terminum superiorum & inferiorum aquarum vocatum intelligere licet: nec si veritas cælum stare persuasit, impediri nos circuitu syderum, ne hoc intelligere possimus; & ab ipsis quippe, qui hoc curiosissime & otiosissime quæsierunt, inuentum est: etiam cælo non moro, si sola sydera verterentur, fieri potuisse omnia, quæ in ipsis syderum conuersionibus animaduersa atque comprehensa sunt.]

*Explana-
tur loc. cit.*

Ex hoc sancti Augustini loco constat cælo nomen Firmamenti videri posse inditum, vel ob stationem, quod ipsum constitueret immotum, stellis motis; de qua opinione duo dicit Sanctus Pater, alterum ex ipsa vocabuli notione, hoc necessario non

II.

consequi, eo quod vel firmitas materiæ, vel aquarum stabilis diremptio nomine Firmamenti possit intelligi; alterum, si quo tamen casu veritas ita erueretur, vt constaret, cælo non moto sydera verti, nihilominus ab Astronomis inuentos esse modos, quibus omnia Phænomena Solis ipsorum astrorum circuitionibus defenderentur.

Et hæc quidem prima huius vocabuli ratio poterat esse, immota scilicet Cæli statio: quam si veritas probet, ait Augustinus, nihilominus stellarum reuolutionibus & apparentiis cælestibus nihil obfuturam: & cursus enim astrorum liberos, & quæ inde pendent omnia defendi commodè posse, etiam si Firmamentum stet illis motis.

Et hæc, ait sanctus Augustinus se respondere solere Fratribus, id est, Christianis à sese similia percunctari solitis. Et quanquam non exprimat in specie quodnam illud eorum, qui hæc curiosissime & otiosissime quæsierunt, inuentum sit, quo omnia Cæli Phænomena, Firmamento stante, stellis motis defendantur; id ipsum tamen satis indicat, quando hoc ipso libro secundo, cap. 4. apertissime contra eos, qui aquas supra Firmamentum esse negabant, dicit illas posse vaporali tenuitate illuc naturaliter super illud * leuius & igneum cælum Firmamenti ascendere.

Sicut ergo supra Firmamentum vaporali tenuitate possunt ex mente sancti Augustini ascendere aquæ, ita in Firmamento & sub Firmamento ex Astronomorum sententia circuire possunt stellæ, siue iam ex in octaua, siue in sphaeris inferioribus esse ponantur.

Quodnam autem illud inuentum sit, non est arduum coniectari. Quippe si cælo stante astra mouentur, cælum oportet esse cessile, si quidem corpus, illud sit & corporum penetrationem euitare velis.

Vnde inferunt, * in Ecclesia Dei negare firmamentū Cæli esse durū, aut sentire vel dicere firmamentū esse corpus molle & fluidum, hoc non esse temerarium, sed vt sanam & suspicionem erroris carentē ab ipso D. August. afferri, & fidelibus Christi

Dicere Firmamentum esse fluidum nō est temerarium.

*Cælū igneū
S. August.*

I

Christi ab ipso tradi solitam, non tanquam articulum Fidei, sed veluti indifferentem & Astronomicam doctrinam, nec ab ipso, nec ab aliis improbatam, sed potius admissam.

Inferunt deinde, alteram rationem à S. Doctore afferri, cur videlicet Cælum sit appellatum Firmamentum, videlicet ob *Firmitatem*: quæ tamen ea firmitas sit, non exprimit, an ut solidi rigentis, an ut condensati, an ut qualitatibus mirificis ad agendum præditi? proinde nec ipse multum roboris in hac firmitate ponere visus, statim transit ad tertiam huius appellationis causam, aitque cælum stelliferum esse dictum Firmamentum, quod sit à Deo constitutus terminus intransgressibilis aquarum superiorum & inferiorum.

Cæterum ex eo, quod sanctus Pater ait, Si veritas stante Firmamento, stellas moveri persuaserit, inuentas esse vias à rerum harum tractatoribus, omnia nihilominus cæli Phænomena defendendi, plane significat Mathematicorum esse istas veritates inquirere, & ab ipsis Ecclesiasticos Scriptores, quæ in Scriptura dilucidè non inuenirentur, ea accipere non esse dedignatos, in quorum numerum & hanc ipsam de motu Cæli & syderum controuersiam haud dubiè esse referendam, neque libertatem hanc Mathematicis veri indagandi vnquam fuisse à Theologis ademptam aut accisam, in iis Quæstionibus, quæ auctoritate Fidei aut Ecclesiæ definitione non essent decise. Imò Christianos litteratos, ut visum in prioribus, ad libros sacros pro similibus indagandis, vehementer adhortatur. Ex dictis ergo instruitur tale argumentum.

*Si tempore Sancti Augustini Firmamentum fuisset agnitus durum & impermeabile, Sanctus Pater, utique non tantis sudoribus, contra infidelium Philosophorum obiectiones, conatus esset aquas naturaliter vaporali reuitate, absque vilo Dei miraculo illuc supra aërem, supra Cælum igneum ætheriumque educere, atque illuc euectas, vel eadem rarefactione subtiles, vel glaciali condensatione colligatas ne deciderent, cōseruare; si inquam D. Augusti-

I I.

nus sua tempestate opinionem illam de adamantina, quam nunc multi asserunt, Cæli duritie quidquam sub vlla probabilitatis ratione, in Ecclesia Dei vigere sciuiisset, non se contra Philosophos istos isto aquarum ascensu tutatus esset; sed vno verbo respondisset, aquas supra Firmamentum solidum & durum in creatione prima verbo Dei esse collocatas, & supra illud ne decidant detineri, impèruia atque incorruptibili eiusdemmet duritie; quod cum non respondisset S. Pater, sed concessisset aërem hunc ad Cælum igneum ætheriumque extendi, & semper altiora esse natura subtiliora atque leuiora, nihilominus tamen aquas rarefactas posse supra illa ascendere atque vi naturali, nulla accedente violentia vel Dei miraculo, consistere; cum inquam, hæc concederet aduersariis contraq. Scripturam argumentantibus, ipsumq. illud totum igneum ætheriumq. spatium nomine Firmamenti à Scriptura accipi vltro daret; euident est ab Augustino Firmamentum non durum, sed molle & permeabile habitum esse. Et hoc est vnum.

Deinde Si S. Augustinus Firmamentum durum agnosceret; non diceret stante Firmamento posse stellas moveri: dicit autem posterius prius ergo non agnoscit. Sequela probatur. Quia sine corporum penetratione non potest dici, stante Firmamento, stellas in eo moveri, ut fuscè demonstrant Mathematici. hoc autem sentire S. Patrem, quod detur naturalis corporum penetratio, est omnino à veritate, & tanti Patris eruditione alienum.

Eodem lib. 2. c. 9. disputat idem S. Pater de figura Firmamenti. Ait enim: [Quæri etiam solet, quæ forma & figura cæli esse credenda sit secundum scripturas nostras? Et cum multa disputasset, ait, iuxta nostras scripturas figuram cæli dici expansam ut pellem secundum planum, vel, ut cameram secundum fornicem, vnde dubitat an cælum sit planum, aut hemisphæricum, an sphericum totum? Et illa quidem apud nos, inquit, cameræ similitudo, etiam secundum litteram accepta, non impedit eos, qui (cælum) sphaeram dicunt. Bene quippe creditur secundum eam partem quæ super nos est de cæli figura scripturam loqui voluisse.

Argumentum aliud.

Locus alius Sancti Augustini.

I I.

Si ergo sphaera, ex vna parte camera est, ex qua parte caelum terram contingit: si autem sphaera est, vndique camera est. Sed illud quod de pelle dictum est, magis vrget, ne non sphaera, quod humanum est forte commentum, sed ipsi nostrae camerae aduersum sit. Quid autem hinc allegorice senserim, Confessionum nostrarum liber tertius decimus habet.

Siue igitur ita, vt ibi posui, siue aliquo alio modo intelligendum sit, caelum sicut pellis extensum, propter molestos & nimios exactores expositionis ad litteram; hoc dico, quod sicut arbitror omnium sensibus patet: vtrumque enim fortasse, id est, & pellis & camera figurate intelligi potest, vtrumque autem ad litteram quomodo possit, videndum est. Si enim camera non solum curua, sed etiam plana, recte dicitur; profecto & pellis non solum in planum, verum etiam in rotundum suum extenditur. Nam & vter, sicut & vesica pellis est.] haec ille.

S. Aug. Firmam. durum non agnouit &c.

Cum igitur ex hisce clarum sit, Sanctum Augustinum dubitasse an Firmamentum sit sphaericum, sed ex scriptura probabilius sensisse, ipsum super terram habitabilem expansum, esse tanquam hemisphaerium, vel ad formam disci, vt ipsemet eodem loco ait; clarum quoque est, ab Augustino Firmamentum non potuisse statui soliditatis impenetrabilis. Quia alioqui vel stellae non fuissent motae in Firmamento posita; vel Firmamentum ipsum cum stellis in oppositam partem abiisset, & sic terra à caeli regimine denudata fuisset, vt raceam figuram vel planam vel hemisphaericam absque infinitis absurdis circa terram moueri non posse. Ista autem inconuenientia affingere tanto Ecclesiae lumini, conueniens ego non puto.

* Vnde certum est, Sanctum Augustinum duritiem Firmamenti non agnouisse. Ideoque qui cum Sancto Augustino caelum durum non acceptant, aut saltem de caeli duritie dubitant, ex hoc certe capite temerarij non sunt. Etiam si apud Iob scriptum sit, Caeli solidissimi tanquam aere fusi.

Quis enim dubitat, hanc scriptu-

I II.

ram à Sancto Augustino probe cognitam fuisse? Et tamen ea non obstante, ait * caelum sphaericum esse, humanum forte commentum videri posse. Sunt verba ipsius Sancti Augustini.

Ad locum autem Iob alibi ex professo respondent, non tam Astronomi, quam Commentatores Scripturarij, & ipsimet Philosophi Peripatetici, qui clare dicunt & docent, ibi sermonem tantum de Aëre sublunari, nequaquam autem de caelo altiore & qualitate duritiei affecto, esse. Vt proinde gratis vigeant aduersarij hunc textum, contra ipsosmet militantes, &c.

PRO CAELO LIQUIDO

Sancti Basilij auctoritas.

Diuis Basilij Augustino antiquior, etsi Firmamentum, homilia tertia Hexaem. & nomine & officio, à caelo primo seu Empyreo diuersum, adeoque solidioris respectu naturae agnoscat, nihilominus tamen soliditatis impermeabilis aut nullo modo cedentis nequaquam admisit.

Ipsa enim, [Si Firmamenti, inquit, corpus globosum est, vt aspectus ipse declarat, aqua autem suapte natura fluxa cum sit, & è sublimi sidere soleat ac debeat delabi, quonam potuit in curua & superiore circumferentia Firmamenti solide ac stabiliter persistere?]

Postquam huic obiectioni ex figura & natura Firmamenti satisfacit, assignat aquarum supra Firmamentum euectarum causam, ad temperandum, mitigandumque Aetheris igniti calorem, & Solem ad finem vsque mundi nutriendum.

[Enimuero, inquit, qui pondere cuncta mensuraque disposuit (in numero namque ipsi secundum Iob & pluuiae guttae sunt) is plane cognorat quantum praescripisset temporis mundo ad durationem: & quantum etiam igni sumptus pabuliq. recondere oporteret, non ignorauit.

Haec est aquae redundantis & copiosae ratio circa creationem.] Et diu post;

S. Basilij.

D. Basil. ait aquas supra Firmam. positas esse pabulum ignis solaris.

I

post; [Aquam, inquit, nos ut aquam intelligamus, & segregationem factam humorum, à Firmamento ea causa, quam assignauimus, accipiamus. Atque etiam si quando aquarum illæ, quæ super cælos sunt collocatæ, communem omnium Dominum laudare tradantur, non naturas ratione prædittas ob id illas esse decernimus.] Et post. [Neque enim super cælos consistens aqua ab hoc quod inferiores antegreditur honoris præcipui dignitate, ipsa solum ob eximiam & insignem virtutis suæ prærogatiuam, diuinam adimplet laudem, &c.]

Sanctus igitur Basilus, ut ex his & alijs pluribus locis, imò tota hac Homilia euidentissimè constat, aquas veras, corporales, elementares, corruptibiles, graues, frigidas, limpidas non congelatas, supra ipsum Firmamentum positas, non ex Platone, sed Sacra Scriptura edoctus asseuerat, ut Mundum temperent, & Solis vehementiam retundant, & insatiabilem voracitatem ad extremum vsque diem nutrimenti instar sedent. Quæ cum ex Sancti Patris doctrina sint certissima, eulmodi inde instruo Syllogismum.

Si Sol aquas supra Firmamentum à Conditore Deo positas ad suum pabulum paullatim deducit & in substantiam vel suam vel ætheris igneam conuertit; Firmamentum quod aquas illas supra superficiem suam superiorem continet, non est durum aut impertransibile: atque Sol, ex mente Diui Basilij, (uti ex allegatis & non allegatis homil. 3. textibus euidenter constat,) aquas supra Firmamentum positas à Conditore Deo, ad suum pabulum paullatim deducit & in substantiam vel suam vel ætheris igneam conuertit: Ergo ex mente Diui Basilij, Firmamentum quod aquas illas supra superficiem suam superiorem continet, non est durum aut impertransibile. Maior est clara. Minor clarior, ex ipsa Sancti Patris Homilia. Clarissima ergo Conclusio. Et hæc quidem ratione ipso Firmamento solidiore.

Sed audiamus nunc iterum ipsum Sanctum Patrem, suam sententiam

II.

1 verbis apertis patefacientem. Homil. 1. Hexaëm.

[Sed de substantia cæli, satisfaciunt ea nobis, quæ ab Esaia propheta sunt dicta, qui vulgaribus verbis idoneum de ipsius natura sensum nobis aperuit, cum dixit: *Qui firmavit celum quasi fumum: id est, qui tenuem naturam, non solidam, neque crassam ad constituendam cæli substantiam fecit.*]

Esaia. 51. 6. & 40. 22.

Quid clarius hisce verbis? Idem Homilia tertia. Externi homines id firmum corpus dicunt, quod quasi solidum est, densum ac plenum, ut à Mathematico corpore distinguere. Est autem Mathematicum corpus, quod in dimensionibus solis consistit, latitudine inquam longitudine & profunditate.

Firmum autem solidumque, quod cum dimensionibus & reniti resistereque potest. Scriptura autem Sacra, quod perrobustum est, neque cedit, id omne firmamentum dicere consuevit: atque adeo, ut & in aëre addensato, hac ipsa voce plerumque uti videatur, veluti cum dicit: *Qui tonitruum firmat. Soliditatem enim & resistantiam eius spiritus, qui in nubium concauis finibus includitur, atque adeo ob violentam eruptionem inde, sonos ac strepitus eos efficit, quos tonitrua dicimus, firmitudinem tonitruum Scriptura nuncupauit.* Igitur & hic etiam pro quadam firma, solidaque natura, ad detinendas aquas ac coercendas idonea, quæ suapte natura dilabuntur, perfacilèque dissoluantur, hanc à Scriptura vocem ordinatam esse arbitramur.

Definitio Firmi secundum Basil. ex mente Philosophorum. Ex mente sac. Script.

Nec tamen ipsum Firmamentum cum iuxta communem & vulgatam acceptionem ex aqua videatur ortum habuisse suum, aut aqua in glaciem concreta, aut materia cuiquam tali, quæ sui principium ortus ex humore percolato sumit simile censendum est esse, qualem crystalli lapidis naturam esse constat: quem ob exuperantem aquæ congelationem in eam essentiam quam obtinet, asseuerant transmutari: aut specularis lapidis qualis est natura, qui inter metalla generatur.

Conglaciata à Firmamento duritiam remouet.

55 Et sane lapis hic transparens, ac pellu,

Cccc 3

Argumentum ex D. Basilij doctrina contra cæli duritiam.

D. Basilij de Firmam. sententia, ex sac. Script.

I.

pellucidus, & peculiari quadam ac purissima perspicuitate prænitus, adeo ut si is suæ naturæ numeris omnibus responderit, neque vlla exesus putredine, sed nec ad fundum perruptus, aut fissuris perforatus, cum aëre contendit, eique fere perspicuitate similis esse videtur.

Ex his igitur nulli simile Firmamentum esse censemus. * Est enim puerilis simplicisque profecto mentis, tales de corporibus cælestibus opiniones habere. Neque tamen, quoniam cuncta, in cunctis insunt, ignis in aëre, aër in aqua, cæterorumque aliud inest in alio, & nullum omnino eorum quæ sub sensum cadunt elementum syncerum, est mixtioneque caret, ut non sit aut medijs aut oppositi sibi particeps; Firmamentum ob id ipsum, aut ex vno simplicium corporum, aut ex omnibus mixtum esse asserere nobis placet, * qui iam ab ipsa diuina Scriptura ita instituti sumus, ut nihil permittamus menti nostræ ultra ea, quæ concessa sunt, imaginari, &c.]

Cæterum ne quis sibi idcirco falso imaginetur, Sanctum Basilium adscripsisse cælo nescio quam Quintam essentiam & naturam incorruptibilem, audi eundem, dicta sua quasi clarius explicantem, homilia eadem tertia. Quæ cum ita sint, ait magnus Pater, * infatuata illa sapientia (philosophorum aquas supercælestes & à Solis ardore absumi solitas negantium & deridentium) à te excussa, suscipe nobiscum veritatis doctrinam, imperitam quidem sermone, stabilem autem firmamque cognitione. Idcirco, Fiat Firmamentum in medio aquarum, & sit discriminans inter aquam & aquam. Diximus quid apud scripturam significati habeat Firmamenti nomen. * Nimirum, naturam insinuat neutiquam reluctan-
tem aut solidam, quæve suo pondere grauis sit aut renitens. Non eiusmodi dicit esse Firmamentum. Alioqui si sic grauem mole eius intelligis naturam, propius ac iustius hanc sibi vindicasset terra nomenclaturam firmamenti: * sed quod natura rerum nobis supereminens ac sublimium tenuis admodum, sit ac rara, nec vlllo sensu possit percipi,

II.

1 hoc appellauit Moses Firmamentum, corporum comparatione quæ tenuissima sunt, & quæ sensu facile comprehenduntur. Mihi nunc tu locum vnum
5 aliquem cogita humoris discernendi facultate præditum, qui quidem tenuē & percolatum (humorem) ad supera loca trajiciat: eum vero qui crassissimus est, ac terræ immixtus, ad infera demit-
10 tentem, ut ab initio finem vsque, eadem in vniuerso temperies conseruetur, calore paulatim humoris essentiam absumente.

Firmamento vim fecerendi aquas tribuit, &c.

Tu vero copiam quidem aquarum, tantam esse non credis: * ad caloris autem tantam copiam non respicis: qui tamersi paruus est magnitudine, multum tamen humoris sua vi natia consumere potest.

Igni caelesti vim aquas absumens transcribit.

20 Etenim attrahit quidem ad se propinquum humorem sibi, ut ipsæ cucurbitulæ Medicorum docent, attractum autem consumit, perinde atque in igne, lucernæ fieri solet, qui per ellychnium
25 ad se tractum adiacens alimentum cito admodum mutatum comburit.]

Ex his clarè habes S. Patris mentem, quod ipse naturam Firmamenti nullo modo velit esse duram, rigidam, resistentem, sed mollem, cessilem, permeabilem.

Deinde non esse impuram aut mixtam ex elementis, sed subtilissimū quid, & ex ipsis defæcatissimum: nam Quintam Aristotelis essentiam veluti * commentitiam & nugacem deridet hisce verbis:

[Homil. 1. Quidam, inquit, hac opinione (quod cælum ex quattuor elementis cōstet) velut nō probabili posthabita repulsaque, * Quintam quandam naturam corporis, ad cælum constituendum suapte ingenio atque se ipsis * commentitiam, & pro tempore excogitatam introduxerunt. & cum huius sententiæ argumenta copiosè & graphicè in medium produxisset, quid putas Sanctum Patrem conclusisse? ipsamne approbasse? audi ipsum.]

50 [Ob has itaque rationum (ut aiunt) necessitates, maiorum suorum rationibus reiectis, illis opus fuit, ut suffulcerent opinionem, * priua quadam ac peculiari suppositione, qui Quintam
55 quan-

D. Basilii.

I.

quandam corporis essentiam ad celi syderumque constituendam generationem supposuerunt.

Alius è diuerso ex ijs vnus, qui per ætatem se in argumentis exercere generis persuasorij, hos adortus, ista quidem & digessit in ordinem & mox dissoluit: neque id fecit modo, sed & suomet cōmentus ingenio propriam inuexit opinionem.]

Audisti inter sese digladiantes istos philosophos, quorum è parte statutum arbitrare Magnum Basilium? videamus.

[Hisce de rebus, (prosequitur ipse,) nunc si aggrediemur dicere, * in *Nugas* perinde atque illi incidemus. Quare illis omiſſis, sese vt mutuis elidant controuersiarum digladiationibus, sermone itidem de essentia posthabito, * *Moyſi* fidem habeamus.]

Ex his itaque clarissimum est. Sanctū Basilium cælum in Quintam essentiam neutiquam retulisse, alioquin & se ipsum in *Nugatorum* censum annumerasset. Quod autem ait non placere sibi asserere, cælum esse mixtum ex vno vel pluribus elementis, nil penitus pro aduersa parte facit, neque ex eo efficient vnquam, Diuum Basilium vel Quintam in cælo essentiam admisisse, vel cælum à natura elementorum penitus exclusisse. cum ex ipso contextu & vi argumenti hic, & alijs locis alibi, manifestū sit, Sanctum Doctorem plus non voluisse, quam cælum non esse compositum ex elementis impuris aut semimixtis, sed esse quid purissimum, simplicissimū & defæcatissimum. Neque textus iuxta Eustathij versionem allatus, aduersam partem quidquam iuuat. Nam neque versio germana, neque sententia illa Basilij, sed ex eorum qui Quintam essentiam propugnant mente, contra alios à Basilio affertur. Sed placet ipsa verba Græca afferre, ne iniuriosus in Eustathium videar.

Αλλὰ μὲν ἐστὶ ἐν τῶν πρώτων σωματικῶν ἀπὸ στοιχείων καλούμεν, οὐδέ τι εἶναι δυνατὸν ἡμῶν ὑποθέσθαι τὸν ὕδατος, &c. τὰ τὰ ἐν διαφόροις.

Quæ in primo Basilij Græcolatini tomo, Parisiis 1618. edito, è quo ista om-

II.

nia transcripsi, pag. 14. sic optima fide sunt reddita.

At neque supponere possumus, ex primis corporibus, quæ & elementa vocamus, cælum constare, propterea quod, &c. Eustathius autem, hæc eadem sic tranſtulit. Nec de illis principalibus corporibus, quæ vocantur elementa, possibile nobis est credere, cælum fuisse compositum, &c.

Relinquo Lectoris iudicio, an hanc versionem genuinam sentiat. Sententia certè ipsa Sancto Patri fide non bona adscribitur, quæ ab assertoribus essentia Quintæ, tanquam membrum argumenti Basiliani affertur, cum tamen Basilius esse non vt suam, sed vt aliorum afferat, & deinde reiiciat vt falsam, id quod Sole clarius est tam ex ipso contextu; quam verbis ipsius Basilij in fine argumentorum ita subscribentis.

[Ob has itaque rationum (vt aiunt) necessitates, illis opus fuit.]

Immerito igitur Sancto Basilio adscribuntur commentitiæ, quas ipse vocat & refellit, nugas, externorum seu Ethnicorum de cæli Quinta essentia opiniones. Sed stat firma ex ipsomet sententia, Firmamentum nec adamantina duritie rigidum, nec elementorum feculenta colluue sordidum, sed purgatissima subtilitate tenerum, molle, tractabile, ipsisque adeo aquis supernis & infernis peruium. Quod si dixeris, ipsum sanctum Patrem cæli naturam posuisse incognitam: id ad speciem infirmam non genericam est referendum, agnouit enim Firmamentum corpus fluidum, licet quale illud sit in specie se nosse diffiteri potuerit. ex hoc tamen Quintam essentiam ab ipso non extorquebis, alioquin & ipsam terram in catalogum Quintæ essentia adscribes; nā & huius essentiam specificam vltimam imperſcrutabilem afferit, ideoque à vano illius perscrutandæ conatu Christianos maximopere dehortatur. [In nihilum enim omnino desieris, ait ipse, si singulas eas quas obtinet (terra) qualitates ratiocinando coneris auferre.] & post. [Hoc enim pacto mens vertigine velut facta perturbabitur, ad nullum certum sane finem ratiocinatione tua proficiscente.] & post. [Hæc eadem quoque de cæli natura dixerimus: nam quod-

Eustathij versio.

S. Basil. di-
sta verba
non in suo,
sed aduersa-
riorum sen-
su adduxit.

Ait fidē ha-
bendam Mo-
ſi non Phi-
loſophis.

S. Basil. ma-
le versus ab
Eustathio.

I.

quodcunque tandem ingenium, inquit in fine hom. 1. non est satis idoneum, vt pro rei dignitate exequatur & explicet quiduis eorum, quæ in mundo sunt, minutissimum.

PRO CAELO LIQVIDO

Auctoritas Sancti Ambrosij.

Sanctus Ambrosius, sicut in alijs plerisque Sex dierum Commentarijs, ita etiam hic in cæli & Firmamenti natura, Magno Basilio non dissimilis, nec Quintam essentiam, nec cæli rigidam consistentiam agnoscit. Etenim Hexaem. lib. 1. cap. 6. *Ex elementis, inquit, generantur omnia ista, quæ Mundi sunt. Elementa autem quattuor, aer, ignis, aqua, & terra, quæ in omnibus sibi inuicem mixta sunt. Siquidem & in terra ignem reperies, qui ex lapidibus & ferro frequenter excutitur, * & in cælo cum sit ignitus & micans fulgentibus stellis polus, aqua esse possit intelligi, quæ vel supra cælum est, vel quæ de illo superiore loco in terram largo frequenter imbres demittitur.] & post. [*De qualitate igitur & substantia cæli satis est ea promere, quæ in Esaia scriptis reperimus, qui mediocribus & vñtatis sermonibus qualitatem naturæ cælestis expressit, dicens, quod firmauerit cælum sicut fumum, subtilem eius naturam nec solidam cupiens declarare.] Et l. 2. Hexaem. cap. 3. [*Nos autem, inquit, Scripturarum seriem atque ordinem sequimur (non philosophiam, vt aliqui Patribus affingunt, Platoniam) & opus contemplatione æstimamus auctoris, & quid dictum sit quærimus, & quis dixerit & cui dixerit : *quod sit cælum*

Cæli ignitū

Aqua supra cælum.

Esa. 51.

Cæli substantia subtilis nec solida.

Fiat, inquit, Firmamentum in medio aquæ, & sit discernens inter aquas : audio Firmamentum fieri per præceptum, quo diuideretur aqua, & ab inferiore superior discernetur. Quid hoc manifestius? Qui iussit discerni aquam interiecto & medio firmamento, prouidit quemadmodum diuisa atque discreta manere possit.

*Sermo Dei virtus naturæ est, & diuinitatis substantia, quoad vsque velit eam manere, qui statuit, sicut scriptū

II.

1 est : Statuit ea in sæculum sæculi, præceptum posuit & non præteribit. Et vt scias quia de istis aquis hoc dixit, quas tu negas posse in Superioribus cæli esse, audi superiora. Laudate cum cæli cælorum, & aquæ quæ super cælos sunt, laudent nomen Domini. Nonne quasi aduersanti tibi dixit: Quoniam ipse dixit & facta sunt, ipse mandauit & 10 creata sunt. Statuit ea in sæculum sæculi, præceptum posuit & non præteribit? An non viderur tibi auctor idoneus qui legem suo operi daret?] Et post. [Cum hæc audis quid miraris si supra Firmamentum cæli potuit tantæ Maie- 15 statis operatione, vnda suspendi?]

Deinde hoc non esse impossibile Deo, probat ex aquis maris rubri & Iordanis diuisis atque suspensis interiecto aëre, 20 item ex mutuo aquarum ascensu, & descensu; ex ipsius terræ statione. [Nam quo verbo, inquit Sanctus Pater, dicunt terram in medio suspensam, & immobilem manere, cum vtique grauior sit quam aqua; ea ratione possunt dicere, non præcipitari aquam orbis illius cælestis conuersione, quæ super cælos est. Sicut enim terra inani suspenditur, vel pondere librato immobilis vndique 30 perseverat: ita & aqua aut grauioribus aut æquis cum terra ponderibus examinatur.] & post. [Deinde cum ipsi dicant volui orbem cæli stellis ardentibus resurgentem, nonne diuina prouidentia 35 necessario prospexit, vt intra orbem cæli, & supra orbem redundaret aqua, quæ illa feruentis axis incendia temperaret? Propterea quia exundat ignis & feruet, etiam aqua exundauit in terris, ne eas 40 surgentis Solis & stellarum micentium ardor exureret, &c.]

Deinde circa finem huius capituli, ait ignitum ætherem, & in eo calidum Solem, prout ardentem esse contra antiquos fusissime probat, ex aquis supercælestibus refrigerium & nutrimentum assumere. Capite vero quarto ait Firmamentum à firmitate sic esse, denominatum, non tamen tali qualis sit 50 corporis rigidi, sed qualis sit spiritus fulminei intra sinum nubium conclusi, dicit enim Scriptura, [Deum firmare tonitrua, & sic etiam firmatum esse & dici Firmamentum: *vel quod diuina virtute firmatum sit, sicut Scriptura

Argumentū ex librata in aëre terra

Firmitas cæli nō rigida sed robusta, voluntate Dei.

I.

II.

nos docet: *Laudate eum in Firmamento virtutis eius.*]

Et sic ex mente Diui Ambrosij, firmamentum esset firmum non firmitate operis, sed firmitate operantis Dei. Ipsum ergo in se non solidum, non firmum, sed molle, flexile, & fluxile, minimeque durum aut renitens, sed cessile & permeabile, maneret astris & vndis,

Vnde pro Cæli & Firmamenti liquiditate, ex allatis in sententia Diui Ambrosij, tale licet deducere argumentum.

Ex doctrina D. Amb. pro cæli fluiditate argumentum.

Si Diuus Ambrosius adamantinam cæli duritiem vel ex Quinta essentia vel aliunde enatam agnouisset, cæli substantiam esse solidam non negaret: Firmamenti firmitatem solius esse Dei virtutem non assereret; aquas supra illud ascendere, & infra descendere posse non concederet; easdem à Sole & stellis totoque æthere incenso in pabulum assumi & substantialiter transmutari; ab iisdem vniuersi temperiem conservari non contenderet; contra molestas antiquorum incredulorum obiectiones tam laboriosis modis sese non defenderet: sed solius Cæli tanquam Aiacis clypeo obiecta duritie, sese contra omnes aduersariorum ictus, securum, illæsum, absque vlla difficultate custodiisset: hoc tamen non fecit; sed illa, vti ex allatis scripturis, & alijs multis breuitatis ergo omiſſis, plenissime & planissime constat, admisit quidem, sed ex sacra Scriptura illæsum se seruauit, contra intentata incredulorum iacula.

Igitur Diuus Ambrosius duritiæ Cæli nullo modo agnouit; sed illud liquidum censuit, atque ex hoc potentem Dei Maiestatem amplius celebrauit. * Verbo Domini Cæli firmati sunt, & spiritu oris eius, omnis virtus eorum. Sed in re clara, multum immorari non est necesse. Legantur Sancti Patres, & veritas videbitur.

Ad hanc eandem Basilij & Ambrosii classem pertinere videntur Patres sequentes.

PRO LIQUIDA CAELI SVB-
stantia auctoritates aliorum
sanctorum Patrum.

Sanctus Epiphanius in Epistola ad Ioannem Episcopum Hierosolymitanum à Sancto Hieronymo translata, contra placita Origenis. [Dicente Origene, aquas quæ super Firmamentum sunt, non esse aquas, sed fortitudines quasdam Angelicæ potestatis; & rursum, aquas quæ super terram sunt, hoc est sub Firmamento, esse virtutes contrarias, id est, Dæmones.

S. Epiphan.

* Et quomodo legimus in diluuiò apertas Cataractas Cæli, & aquas inundasse diluuii? vnde aperti sunt fontes abyssi, & totus Mundus opertus est aquis?]

Ex sententia igitur Epiphani Cælum non est durum, alioqui aquis diluuii transitum non dedisset. Quod autem loquatur de Aquis super Firmamentum statutis, patet ex eo, quia alioqui contra Origenem nihil effecisset. Ne vero aliquis imaginetur sibi facta aliqua per Cælum durum foramina; obstat quod simul vndique cælitus aqua diluuii deciderit.

Sanctus Cyrillus Hierosolymitanus, Catechesi nona. [Quid enim habent quod crimentur in hoc maximo Dei opificio? qui deberent ad conspectum sinuum cælorum, admiratione percellit eum adorare qui cælum statuit quasi fornicem: qui de aquarum fluxa natura, firmam & stabilem cæli naturam constituit. Dixit enim Deus, Fiat Firmamentum in medio aquarum. * Dixit enim Deus semel, & stetit, nec cadit aqua, Cælum, & ignei in eo Sol, & Luna, atque sidera.

S. Cyrillus.

Et quonam pacto ignea currunt in aqua? Si vero quis ob ignis & aquæ contrarias naturas, dubitat, is ignis meminerit qui tempore Moysis in Aegypto flammam fundebat in grandine, & sapientissimam omni ex parte, Dei fabricationem conspiciat.

* Nam cum aquis opus esset terræ in posterum colendæ, aquosum in sublimi parauit Cælum, vt cum imbrium humectatione foret opus regioni terræ,

Aqua supra caelestes in usum pluuiarum.

I.

na, paratum esset ad id & promptum
cælum.

Ex his evidens est, hunc sanctum
Patrem sensisse Firmamentum stabile
quidem in se, sed peruium & stellis in-
eo motis, & aquis celestibus ad usus hu-
manos descendentibus in terram. Nam
de supercælestibus loqui certum est, vi-
legenti patebit, &c.

Eucherius.

EVCHERIUS Comment. in Genes.
lib. 1. cap. 3. apud Martinen. [Vnde que-
ri potest, quomodo elementum aquæ
possit esse supra cælos? Aqua enim cedit
terræ, & aer cedit aquæ, & ignis cedit
aëri. Vnde impossibile videtur, ut se-
cundum elementum quod est aqua, sit
supra quartum, quod est ignis. Quo-
modo & quales sint aquæ illæ, quas scri-
ptura dicit supra cælos, esse eas ibidem
minime dubitamus: quæ non locorum
sedibus, sed dignitate naturæ, videntur
supra cælos.

*Sicut enim nubes istæ, quæ ubique
sunt, feruntur supra aërem, quod est
tertium elementum; ita fieri posse arbi-
tror, ut aquæ tenues, atque subriles fe-
rantur super cælum.

Nam ex hoc pondere elementorum,
multi philosophorum resurrectionem
carnis illudentes nō posse fieri inquiūt,
ut homo, qui utique ex terra factus est,
sit in cælo. Sed hos veritas conuincit,
qui facit multa animalia terrena volita-
re in aëre, & aquam esse supra aërem;
& ignem, quod est utique quartum ele-
mentum, esse in terra. Ergo Dei poten-
tia, quæ hæc facere approbatur, facit ut
& homo & aqua sit supra cælum.] Si
Cælum esset adamantinum, gratis phi-
losopharetur hoc modo iste Pater. Sup-
posuit ergo molle & permeabile, imo
fecit idem cum igne.

Iunilius.

IVNILIUS in Hexaem. [Qui infra
Cælum ligat aquas, ad tempus cū vult,
ut non pariter decendant, nullo firmioris
substantiæ crepidine sustentatas, sed va-
poribus solummodo nubium retentas:
ipse potuit aquas super rotundam cæli
sphæram, ne vnquam delabantur, non
vaporali tenuitate, sed soliditate suspen-
dere glaciali.

* Sed & si liquentes ibi aquas sistere
voluit, nunquid maioris hoc miraculi
est, quam quod ipsam terræ molem,

II.

1 (ut Scriptura dicit) appendit in ni-
hilo?]

Hæ argumentationes non habent lo-
cum si Firmamentum dicatur durum.

5 Glossa Ordinaria in Bedam, habet si-
milia, apud Martinengum parte prima, *Glossa ordi-
naria*,
pag. 643.

Sanctus BEDA, Questionibus in, *S. Beda*.

10 Genes. Eadem ferè habet ad verbum,
quæ supra ex Eucherio recitauimus, &
ait aquas supra Firmamentum positas,
ideo non decidere, quod glaciali solidi-
tate concretæ teneantur. Agnoscit er-
go deceduras, si resolutæ essent: vnde
& Firmamentum non durum agnoscat
oportet,

HAYMO in Psalm. 148. [Et aquæ
omnes quæ super cælos sunt, &c.

Aquæ quæ in rei veritate sunt super
Cælos (vnde nobis pluuia descendunt
per cataractas Cæli) laudent nomen
Domini: id est materia nobis fiat laudā-
di Deum, attendentes inter cætera,
quod cum illæ aquæ, quæ spissæ corporis
sunt, teneantur subtilissimo corpore cali
valde mirari possumus, & à laude Dei
cessare non debemus.]

30 Si Pater iste, philosophicam cæli du-
ritiem agnosceret, nec miraretur, quo-
modo aquæ spissæ supra subtilissimos
cælos tenerentur, neque inde laudandi
Dei singularem materiam traheret, ne-
que ex Scriptura aquas illas in terras
per cæli cataractas in pluuiam cum ve-
ritate deduceret. Cælum ergo liquidum
non durum agnouit.

40 RICHARDVS Pampolitan. in Psal. *Richardus
Pampolita-
nus*.
148. [Et aquæ omnes quæ super cæ-
los sunt, ad complendam elementorum
consonantiam, laudent nomen
Domini. Magna laus quod & tenui-
tas calorum firma consistit, & aquas
quæ grauēs sunt, sustinet; quæ aquæ non
nisi missæ defluunt per pluuias. Aut ergo
excusatio, aut Magnus iste Theologus
cælum non durum, sed fluidum ita
tuit.

I.

PRO CAELO LIQVIDO

Auctoritas Magistri Sententiarum.

Mag. Sent. Magister Sententiarum, in 2. Sententiarum, distinctione 14 [Fiat firmamentum in medio aquarum, & diuidat aquas ab aquis. Diuisitque aquas quæ erant sub firmamento, ab his quæ erant super firmamentum.

* Sciendum est, quod illius cæli describitur hic creatio, sicut ait Beda super Genesin, in quo fixa sunt sydera, cui suppositæ sunt aquæ in aëre & in terra, & superpositæ aliæ de quibus dicitur. Qui regis aquis superiora eius.

In medio ergo firmamentum est, id est, sydereum cælum, quod de aquis factum esse credi potest. Crystallinus enim lapis, cui magna est firmitas, & perspicuitas, de aquis factus est.

Si quem vero mouet, quomodo aque natura fluidæ & in ima labiles, super cælum possint consistere: de Deo scriptum esse meminerit, qui ligat aquas in nubibus suis. * Qui enim infra cælum ligat aquas ad tempus vaporibus nubium retentas, potest etiam super cæli sphaeram non vaporali tenuitate, sed glaciali soliditate aquas suspendere ne labantur, & post. * Ecce ostensum est his verbis, quod cælum factum sit, scilicet illud in quo sunt fixa sydera, id est, quod excedit aërem: & de qua materia, scilicet de aquis. & post.

Quidam vero cælum quod excedit aëris spatia, igneæ naturæ esse dicunt, asserentes super aërem purum ignem esse, qui dicitur esse cælum: de quo igne sidera & luminaria facta esse coniectant: quibus Augustinus consentire videtur. Vtrum vero nomine Firmamenti cælum quod excedit aërem, an ipse aër hic intelligatur, idem Augustinus querit nec soluit. Magis tamen approbare videtur, cælum illud hic accipi, quod spatia aëris excedit. Aquas autem quæ super illud cælum sunt, dicit vaporaliter trahi, & leuissimis suspendi guttis. Sicut aer iste nebulosus exhalatione terræ aquas vaporaliter trahit, & per subtiles minutias suspendit, & post corpulentius cōglobatas pluuias refundit. Si ergo

*Citat pro se
& explicat
S. August.*

II.

1 potest aqua sicut videmus ad tātas minutias peruenire, vt feratur vaporaliter super aerem aquis naturaliter leuiorē: cur non credamus etiam super illud leuius cælum minutioribus guttis & leuioribus emanare vaporibus? Sed quoquo modo ibi sint, ibi esse non dubitamus.] & post. [Queritur etiam, si stet, an moueatur cælum? Si mouetur in-
10 quiunt, quomodo est Firmamentum? Si stat, quomodo in eo fixa sidera circumeunt? Sed firmamentum dici potest, non propter stationem, sed propter firmitatem, vel terminum aquarum intransgressibilem.

*Etiam stāte
Firm. stell.
motus defē-
ditur.*

15 Si autem stat, nihil impedit moueri & circumire sidera.]

Hæc Magister sententiarum, quæ breuius quidem, sed pæne clarius prodit in
20 Psalmum 148. [Et aquæ, inquit, quæ super cælos sunt, diuisæ ab his, quæ sub firmamento sunt, laudent nomen Domini, & ita faciunt & cæli & aquæ.

25 * Nimia enim laus est, quod & tenuitas cælorum firma consistit, & aquas quæ grauioribus sunt sustinet: quæ nisi iussæ defluunt per pluuias: quæ sicut dicitur, apertis cæli cataractis, per pluuiam mittuntur.]

30 Ex his habes & explicatum & approbatum Sanctum Augustinum, in frontispicio huius agminis positum, meaque ex ipso deducta argumenta prorsus solidata. Ad quorum maiorem firmitatem sic ratiocinor.

35 Primo. Si cælum, secundum Magistrum sententiarum esset solidum, seu rigore consistente inflexibili obduratū, frustra is interrogaret, qua ratione aque ipso grauioribus supra ipsum consistentes, & gratis ipsas vel frigore congelatas, vel calore attenuatas illic detineret ne delaberetur; nam etiam in fluxilem humiditatem colliquefactæ non possent descendere, duritie illa cæli plus quam ænea cohibitæ. Ergo impossibile est, vt cælum durum agnouerit, alioqui philosophia ista inanis & ridicula prorsus
45 esset.

*Ex allegata
Mag. Sent.
doctrina
pro Cælo
fluido, Ar-
gum. primū.*

50 Secundo. Si Firmamentum, inquit stat, nihil impedit moueri & circumire sidera. At Firmamenti durities impedit moueri & circumire sidera, si firmamen-

Argum. Secū.

mentum stat. Ergo Magister Sententiarum Firmamenti duritiem nullatenus agnouit.

Argumentum 3.

Tertio. *Nimia*, inquit, *laus est, quod calorum tenuitas firma est, & aquas grauiore sustinet.*

At verò si illa calorum firmitas in adamantina duritie consistit, nulla laus est, quod aquas sustinet: sequitur enim hoc naturaliter: nec mirum est, quod fornix superpositas aquarum moles sustinet, qui etiam grauiore fert terrarum. Ergo firmitas illa non consistit in duritie, &c.

Argumentum 4.

Quartò. Istæ aquæ descendunt per pluuias ad nos vsque. Itaque clarum est ex Magistri Sententiarum mente, Cælum non durum, sed molle & permeabile esse.

Magister Historiæ Scholasticæ.

Magistro Sententiarum fauet Magister Historiæ Scholasticæ cap. 4. [Cur vero, inquit, ibi sint (supra firmamentum aquæ) Deus nouit; nisi quod quidam autumant, inde rorem descendere in æstate.] Ecce & hinc Cæli liquiditatem.

PRO CAELO LIQVIDO

depugnat Oleaster & alij.

Hieronymus Oleaster.

Hieronymus ab Oleastro in Genesin, super illa verba, Erit firmamentum aut extensio in medio aquarum, & erit diuisio inter aquas & aquas.

[Controuertunt hic aliqui, inquit, an verè sint aquæ super Firmamentum, seu extensionem, & cum scriptura ubique clamet, eas ibidem esse: malunt multi Theologi cacos Philosophos sequi, quam Scripturæ auctoritatem.]

In Psal. enim legimus. Aquæ quæ super cælos sunt laudent nomen Domini. Infra etiam cap. 7. habetur, cum de diluuiò est sermo: quod die illa rupti sunt fontes voraginis magnæ, & fenestræ Cæli apertæ sunt. Et Dan. 3. Benedicite aquæ quæ super Cælos sunt Domino.

Malim ergo cum Scriptura errare, (si illa errare posset) quam cum Philosophis vera dicere.

Quare autem sint aquæ, quæ ibi super extensionem sunt: nolo definire.

Puto tamen eas esse elementares, & eiusdem naturæ cum inferioribus.

Nam antea vt ex textu constat, continuæ cum inferioribus erant: factò vero firmamento, seu diuisione, non videntur mutasse naturam. Præterea tempore diluuii descenderunt, vt citatum est, sicut aliæ aquæ.]

Ex his euident est, hunc Theologum illam adamantinam cæli duritiem, & intricatas Planetariorum orbium molitiones non agnouisse, alioquin non dedisset ipsis in diluuiò descensum, &c.

Commentarijs in 7. caput Genesim, Idem Lufitanus. exponens illud, Ruptæ sunt Cataractæ Cæli.

[Non possum aliter inquit, quam vt littera habet, intelligere: supponit enim veras & elementares aquas super Firmamentum esse, vt tam Basilus quam Chrysostomus sentiunt: nihil mirum si Dominus fenestras in Firmamento ruperit, vt aquæ illæ descenderent, neque hic locum esse Meraphoris puto. Sanctus vero Thomas dicit fatendum omnino esse, ibidem aquas fore, sub dubio vero verti quales sint; an videlicet elementares, an crassæ potius ad modum crysalli. Quare taxandi sunt, qui potius volunt sacram Scripturam Philosophiæ Regulis subdere quam vt magis decet, Philosophiam tanquam ancillam, illi deferuire.]

Aqua supercalescentes diluuii tempore descenderunt.

Philosophia Scripturæ deferuire debet.

Si aquæ potuerunt per durum firmamentum descendere, credibile est Lufitanum cælum credidisse esse durum & impenetrabile. Vndique autem aquæ descenderunt simul, cataractæ ergo Cæli vndique apertæ sunt.

CASSIODORVS in Psalm. 148. [Aquas vero quæ super Cælos sunt, istas quæ depluunt, esse non dubium est: testante Genesi: Cataractæ Cæli apertæ sunt: & facta est pluuià super terram quadraginta diebus, &c.]

Si per Cælum adamantinum Diluuii tempore potuerunt aquæ descendere, vtique duri erunt secundum Cassiodorū. Ipsum vero intelligere per Cælum firmamentum in quo sunt stellæ, & aquas supra ipsum positas velle depluere legenti clarum est.

I.

IOSEPHVS lib. 1. Antiquitatum con-
sentire videtur. Nam cap. 1. sic ait.

[Post hæc secunda die, cælum vni-
uersitati rerum superimposuit (Deus) di-
cretum à cæteris, & in sublimi per se
collocatum, glacieque circumcompactum,
& humida, ac pluuia natura ob terram
irrotatione iuuandam competenter tē-
peratum, &c.]

PRO CAELO FLVIDO, AVCTO-
ritas Abbatis Tuitiensis.

RVPERTVS Abbas Tuitiensis do-
ctrina multa coruscans, sub annum Do-
mini 1124. lib. 1. in Genes. c. 22. hanc
de cæli liquiditate sententiam apertissi-
mè profitetur verbis sequētibz, quam-
quam in contrariam à nonnullis male
citetur.

Primum ergo quid vel vnde sit Fir-
mamentum, propter simplices di-
cendum est. * Firmamentum non soli-
dum quid aut durum, vt vulgo putatur
sed aër est extensus, & adeo subtiliatus,
vt licet videri queat, rectius tamen spi-
ritus dici possit, quam corpus, testante
Ecclesiaste, cum dicit in luminaribus,
* quæ visibiliter in eo feruntur: lustrans
in circuitu pergit spiritus, & in circulos
suos reuertitur. Hoc itaque cum solidū
non sit, sed neque ita corpulentum, vt
hæc inferior pars aëris, aliunde tamen
scriptura illud nuncupauit firmamen-
tum, videlicet eo, quod diuidat, aquas
ab aquis.]

Deinde cap. 23. refutat eos, qui no-
mine aquarum supra firmamentum po-
sitarum volebant intelligi Angelos ex
psal. 148. & hymno trium puerorum.
[Profecto, nomine aquarum, inquit ip-
se, aliud quam Angelos scriptura cogit
intelligi.] & post. [Porro alii Doctorū,
nomine aquarum quæ sunt super fir-
mamentum, nil aliud quam aquas sim-
pliciter intelligi volunt. * Eorum procul
dubio sentētia iustius atque tutius pla-
cet, videlicet vt à Sacrae historiae littera
sensus non discrepet. Veruntamen non
vsque adeo consentimus, aquas esse su-
per firmamentum, vt concedamus e-
tiam congelatas esse, quod aliqui ma-
gis coniecturaliter, quam rationabili-
ter opinati sunt.]

II.

Et cap. 24. [Quod si à nobis quæri-
tur, in qua ergo specie aquæ illæ super
firmamentum sunt, si congelatæ non
sunt? Interrogemus eos, in qua specie
fuerunt antequam fieret firmamentū?
& post. [Vnū hoc vt certū teneamus, ca-
meram huius mūdi positam esse in me-
dio aquarum, quia videlicet firmamē-
tum, quod quasi tectum eiusdem came-
ræ est, vndique ambiens auctoritate
Scripturæ factum est in medio aquarū.
At enim, quia dixit Deus: Fiat firma-
mentum in medio aquarum; ad quid?
Et diuidat, inquit, aquas ab aquis. Quod
ne parum firmitatis haberet, semel di-
ctum iterum scriptura hoc ipsum repe-
tiuit, dicens: Et fecit Deus firmamen-
tum, diuisitque aquas quæ erant sub
firmamento, ab his quæ erant super fir-
mamentum. Itemque quia in ore duo-
rum aut trium testium stabit omne ver-
bum, addidit, & factum est ita.]

Et c. 25. Et mirum quidem opus ma-
gnifici Dei, quod aquarum molem, sub-
terfusi sustinet. * Firmamēti natura sub-
tilis. Veruntamen hæc ipsa admiratio ex
præsenti exemplo tolerabilior sit, ne il-
lud cuiquā incredibile sit. * Quid enim
terram grauissimam, de qua postmodū
dicendum est, aliud sustinet, nisi vndiq.
circumfusus aër idem, licet crassior, &
aquæ partim circumfluentes?] Firm. natu-
ra subtilis.

Ex his ipso Sole clarius est, hunc au-
ctorem per aquas supercælestes non in-
telligere nubes in aëre nostro volantes,
sed super stellas ipsas insidentes, quem-
admodum ipsum rectè citat Martinus
del Rio. male autem pro aquis nubiū in
aëre volantium alii, ipse enim firmamē-
tum hinc supra ipsa sidera extendit, &
ab ipso aëre nisi sola subtilitate, more
eruditorum huius æui, non distinguit,
& quod ipsemet præter dicta, satis indi-
cat, eodem libro, cap. 28. * Sunt autem,
inquit celi superiores, in firmamento vi-
delicet, per quos feruntur Sol & Luna,
& præter hæc quinque stellæ, quas di-
cunt planetas, id est, erraticas. & post.
Proinde scrupulosa (vt iā dictū est) inter
doctos disceptatio est, utrū & ipsa lumi-
naria cum ipsis per quos feruntur cælis
siue circulis peritura sint? Eodē modo
quādo de stellarū & planetarū in firma-
mento cæli positione disputat, cap. 43.

D d d d ait

Aqua supra
Firm. sunt
eadem quæ
erant infra.

Firm. natu-
ra subtilis.

Quidā male
citant hunc
Auctore pro
nubibus aë-
ris.

Sol, & Luna
in Firm. etc.
sed liquido.

Josephus

Rup. Tuit.

Eccles. 1.

ait maximā diuinæ laudis materiam in eo esse, quod cum singuli planetae in firmamento cæli proprios circulos occupent & retineant ex ordinatione Dei, id maxime admirandum esse, quod à semita sibi præscripta nunquam exerrēt. sed audire præstat ipsū. [* Non enim parua materia, ait, diuinæ laudis est, firmamentum cursus eorum, quem nunquam excedunt, incessanter currendo, seq. in circulos suos reflectendo.] Vnde euident est, ipsum Rupertum supponere firmamentum esse liquidum, alioquin si durum statuamus, impossibile est, ut Planetae à cursu præstituto possint deflectere: neque ideo si non exorbitarent vel laudis diuinæ vel admirationis humanæ id magna materia esset, &c.

Hinc datur intelligere, quo sensu antiqui nomina circulorum in hac materia usurpauerint, videlicet non pro orbibus discretis solidis, sed imaginariis itinerum à planetis descriptorum vestigiis accipiendo. Quemadmodū hodieq. nauium vestigia maritima à Geographis in re nautica exprimuntur in mappis, &c. Quod autem quidam circulos nescio quos solidos inuehant, à vera Mathematicorum doctrina toto cælo deuiant; qui circulos solidos non magis agnoscunt, quam Physici Blictri. Patebit id ex Ptolemæo postea.

PRO CAELO LIQVIDO

Auctoritas Damasceni.

S. IOANNES Damascenus, lib. 2. c. 6. Orthod. fidei, cælum tam ex D. Basilii, quā S. Scripturæ & aliorum sententia liquidum agnoscit. [Huius porro naturā, inquit, D. Basiliius instar fumi tenuem ac subtilem esse tradit, à diuina scilicet scriptura id edoctus.] En D. Damascen. ait, à diuina Scriptura didicisse S. Basilium, cælum esse liquidum: moderni contradictores, ut inuidiam effugiant, dicunt D. Basilium id habuisse à Platone. Cui plus credendum, Damasceno an Neotericis? Sed audiamus eundem S. Patrem, eodē capite.

[Terram autem & aquam, ut grauiora & depressiora corpora, aiunt, in meditullio pendere, ita ut e regione inter se opponantur, deorsum nimirum

1 terra & aqua (aqua porro terram leuitate superat, ob idque etiam facilius quam ea mouetur) sursum autem in orbem vndique, integumentum cuiusdam instar, aërem, atque vndecunque circum aërem æthera: denique extra hæc omnia cælum in orbem expansum. * Circulari porro motu volui cælum docent, eaque quæ intra sunt, comprimere ac constringere, atque ita firma ea & à lapsu tuta manere.] Et post. [Omnia hæc diuino iussu facta ac stabilita sunt, * diuinamque voluntatem atque consilium pro firmissimo fundamento habent.] Et post. [Eodemque modo per aquas, quæ super cælos sunt, vel aërem, vel septem firmamenti orbis, vel denique firmamentum ipsum, intelligit.]

Consentit hisce HVGGO Carenensis in Postillis apud Martinengum, par. 1. pag. 56 1.

[Et dicitur firmamentum, quia firmum: & quia terminus est aquarū, quæ super ipsum sunt, intransgressibilis.]

Et infra.

Æther autem secundum S. Isidorum lib. 13. Orig. cap. 5. & in lib. different. numero 82. est aer igneus, in quo sunt sidera.

PRO LIQVIDA CAELI

natura, Auctoritas sancti

Chrysostomi.

35 Sanctus IOANNES Chrysostomus homilia 12. ad populum Antiochenum, ut demonstraret quomodo per cælum & terram, & mare Creator glorificetur.

40 [Hodie, inquit, paullisper in hanc rursus philosophati materiam, ad aliū transibimus sermonem: non enim tantum fecit mundum, sed etiam ut factus operaretur effecit: * neq. totum immobilem dimittens, neque totum iubens moueri: sed cælum quidem immotum permansit, sicut Propheta inquit: Qui statuit cælum tanquam testitudinem, & extendit ipsum tanquam tentorium

50 super terram. * Sol vero cum reliquis syderibus quotidie circumuoluitur. Et post. Et vnus quidem solaris splendoris est calor, sed differenter omnia, 55 maturat &c.

Quis

Sanctus Damascenus.

Sanctus Damascenus.

Sanctus Damascenus.

Quomodo sydera in Aethere firmata teneantur?

Hugo Carenensis.

S. Chrysostomus.

Cælum immotum.

Psal. 103.

I

Quis hæc non obstupeſcat ?

Idem homil. 14. ſuper illa Apoſtoli verba ad Hebræos, [Talem habemus in Pontificem, qui conſedit in dextera ſedis magnitudinis in cælis, Sanctorum Miniſter, & *Tabernaculi veri, quod fixit Deus & non homo.]

*Cælum im-
motum ex
Apoſt. Paul
lo.*

Quod fixit, inquit, Deus & non homo. Vbi ſunt qui dicunt moueri cælum ? vbi ſunt, qui pronunciant id eſſe ſphæricū ? Vtraq. enim hic ſunt ſublata.]

Idem homil. 6. ſuper illa verba Geneſeos. Et poſuit Deus illas in Firmamento cæli.

[Animaduerte hic, quantum & iſtarum uſum nobis declarauit. Poſuit illas inquit in firmamento cæli. *Quid eſt poſuit ? Nunquid quaſi diceret aliquis fixit ? Abſit. videmus enim ipſas vnico temporis momento magnum tranſire ſpatium, & nunquam in vno loco ſtare, ſed ſuum quem illis Dominus præcepit, curſum perficere.]

*Deus ſtel-
las non ali-
ter fixit in
Firmamen-
to, quam
Adamum
in Paradifo.*

*Quid igitur eſt, poſuit ? id eſt imperauit, vt ipſæ eſſent in cælo. Etenim hoc ex proceſſu Scripturæ licebit videre, quia alibi dicit: *Poſuit Deus Adam in Paradifo, non quod infixit eum Paradifo, ſed quod præcipit vt eſſet in Paradifo. Similiter & de ſtellis quiſpiam dixerit, quod imperauit eis, vt ſint in firmamento cæli, & ſuum lumen ſuper terram emittant.] Et paullo poſt, vocat omnes ſtellas elementa, & quod quæque intra terminos ſuos maneant, neque euagentur, diſpoſitioni & ordini voluntatis diuinæ ſingulari attribuit.

*Ex ſolis ſcri-
pturis pro-
nunciandū
inſinuat.*

Idem homil. 4. [Sed quid tandem eſſe dicemus hoc firmamentum ? aquæne denſatam, vel aërem conſtratum, vel aliam aliquam eſſentiam ? Haud quis prudentium hoc temere aſſeuerauerit. Oportet enim magna modestia & gratitudine, ea quæ dicuntur à nobis accipi, & non ultra naturam noſtram progredi, & ſcrutari quæ ſupra nos ſunt : * ſed hoc ſolum ſcire & tenere apud nos, quod præcepto Domini productum eſt firmamentum, ſeparatione aquarum faciens, quod valeat ſub ſe continere, alias vero in dorſo ſuo ferre. Et vocauit, ait, Deus firmamentum cælū.] & poſt [Et vocauit Deus firmamentum cælum, hoc quod videtur.]

*Et quomodo dicunt aliqui factos mul

II.

1 ros cælos ? Non ex diuina Scriptura hoc didicerunt, ſed ex ſuis opinionibus, vt ita dicant impelluntur. Beatus autem Moſes nihil his amplius docet : nam vt dixit : In principio fecit Deus cælum & terram, & dein cauſam docuit, quare terra ſit inuiſibilis, nempe quod ob-
10 tacta à tenebris & aquis abyſſi : poſt formationem lucis, ordine & conſe-
quentia quadam vtens, inquit ; Et dixit Deus fiat Firmamentum. Deinde poſtquam docuit diligenter uſum Firmamenti, & dixit, vt diſtinguat inter aquam & aquam, iſtuc ipſum Firma-
15 mentum, quod aquarum ſeparationem faciēbat, cælum vocauit. *Quis igitur poſt tantam doctrinam ferret eos, qui ex ſuo capite loqui & contra diuinam Scripturam multos cælos dicere audēt ?

20 Porro dicunt, Ecce beatus Dauid laudem Deo offerens, dixit : laudate eum cæli cælorum.

*Soluit ſcri-
pturam cō-
tra obiectā.*

*Ne turberis dilecte, neq; putes Sa-
eram Scripturam, ſibi ipſi alicubi ad-
25 uerſam, ſed diſce potius veritatem, & tenens diligenter ipſius doctrinam, ob-
tura aures illis contraria dicentibus. Et quid hoc ſit, quod dicere volo, audite magna attentione : vt ne facile mouea-
mini à volentibus violenta & aliena di-
cere. Omnes diuini libri veteris Teſta-
menti, Hebræorum lingua ab initio ſunt
compoſiti, & in hoc nobiſcum conſen-
tiunt omnes.] Et poſt.

35 [*Hæc autem non temere veſtrę charitati narrauerim, ſed vt ſcire poſſitis, quod non hac lingua, noſtra inquam, ſed Hebraica ſint hi libri compoſiti. Di-
cunt igitur qui linguæ eius gnari ſunt, Cæli nomen plurali numero ab Hebræis
40 vocari, quod conſententur qui & Syro-
rum linguam ſciunt. Et nemo ea lingua dicit cælū, ſed cæli. Et idcirco ſi dictum eſt, quod à B. Dauid dictum, cæli Cæ-
lorum : non quod multi ſunt cæli (non enim nos hoc docuit B. Moſes) ſed quia
45 mos eſt linguæ Hebraicæ, vnā rem
nominare plurali numero : *quia ſi mul-
ti eſſent, non omiſiſſet Spiritus Sanctus
per linguam Prophetæ, quin & illorum
50 formationem nos doceret. Hæc diligen-
ter ſeruate obſecro, vt poſſitis obſtrue-
re ora eorum qui contraria Eccleſiaſti-
cis doctrinis afferunt.]

*Ait plurali-
tatem cælo-
rum eſſe he-
braiſmum.*

55 Et videatis virtutem eorum, quæ in

Scriptura continentur; nam idcirco frequenter hic conuenitis: & nos vberiorē doctrinam communicamus, vt parati sitis omnipetenti vos rationem reddere.] Hæc magnum Ecclesiæ Lumen, aureo suo ore Sanctus Chrysostomus; quæ ita clara sunt, vt vltiore discursu non egeant.

Tametsi enim ipsam cæli substantiam specificam decidere noluerit, nihilominus tamen ab ipsa duritiem euidenter remouet.

Primo, Dum negat Stellæ in Firmamento fixas, sed haud aliter esse positas affirmat, quam Adamus fuerit positus in Paradiso. Certum autem est, Adamum in Paradiso ambulasse liberum, neque inter meatus certos inclusum circumiisse; sed in aëre libero, non cōgelato; certum igitur etiam est, Stellæ in Firmamento libere in Aethere molli non intra cauos & cuniculos conclusas incedere.

Secundo, Dum Cælo, ex Epistola Pauli ad Hebræos, & figuram plenam sphaeræ, & mobilitatem adimit, stellis autem concedit.

Tertio. Dum ex Scriptura sacra, non autem ex schola Platonica, imo contra Platonem & eius sectatores, cælum vnicum statuit. Cum autem astrorum non vnus, sed diuersissimi motus sint; impossibile est astra moueri stante cælo, vno, & non liquido, idq. ex huius Patris doctrina. Deinde & hoc notandum, tantū abesse, vt hic S. Pater cælum durum, vel mobile, aut multiplex astraque cum eo vel in ipso mobilia agnouerit, vt potius contrarium, id est, dicere vel sentire firmamentum esse durum, stellæ in eo fixas, & non nisi cum ipso mobiles, pro dogmate externo atque ab Ecclesia & Scriptura alieno proclamare non sit veritus. Ait enim id aduersari Ecclesiasticis doctrinis. Ecclesiasticas autem doctrinas, vtrique non ignorauit Ecclesiæ Doctor, & quidem tantus.

Negare firmamentum esse durum, non est temerarium.

*Vnde dicere vel sentire firmamentū non esse durum, nullo modo vel dici vel censerī debet temerarium, &c. Neque enim alia nunc est doctrina Ecclesiæ, quam olim huius S. Doctoris tempore.

S. Iustinus.

[S. IVSTINVS Martyr, q. ad Orthod. 57. Si duplicis nobis cæli creationem,

1 exposuit Moses: quomodo plures eos esse Scriptura docet aliquando tradens; Cæli cælorum: aliquando, aperti ei sunt cæli: &, video cælōs apertos; &, raptus 5 est in tertium cælum. Et non dixit in tertiam vsque cæli partem; sed absolute, in tertium vsque Cælum. Multa vero hisce similia in Scripturis reperiās. Quomodo igitur non sibiipsis repugnantia, 10 dicunt, & tamen vtroque modo vera dicunt?

RESPONSIO.

15 [Moses quidem cælōs dixit: numerato autem neque vnum, neque duos, neque plures tradidit. * Consuevit porro diuina Scriptura, interstitia partium superiora cælōs nominare: veluti volatilia cæli; & aquila de cælo; & Stellæ cæli. Et dictis ergo hisce, quæ posita sunt, 20 consequens est vt intelligamus, cælōs substantia quidem duos, interstitiis autem plures. Atque si cælōs ita accipiamus, nulla in verbis relinqueretur repugnantia. Ex his euidenter est, hunc S. Philosophum aërem cum firmamento pro vno continuo cælo recensuisse, & consequenter liquidum fecisse. Eadem probantur ex eodem q. 93. in q. vero 94. & 30 eius responsione. ait firmamentum in fine mundi penitus destructum iri. [*Vt eius interitu (sunt verba Martyris) vel tum demum coarguatur, vanum esse, quod de cælo, expers ipsum & generationis & corruptibilitatis esse, circumfertur eorum hominum dogma, qui id ingenitum æternumque esse, & fine carere dixerunt.]

40 DIODORVS Tarsen. apud Martinē. gum, pag. 1011. ex Catena Lippomani. [*Nemo igitur, cū audierit, & posuit ea in firmamento cæli, *existimet Solem ac Lunam & stellæ in cælo fixas, gentile dogma in Ecclesiam inducens, neque cælum moueri. Neque enim cum dictum est, & posuit Adam in Paradiso, Adam ibi fixisse credendum est, sed vt ibi vitā suam transigeret. *Quare intelligendum est, quemadmodum homines in terra, 50 ita luminaria in cælo posita esse supernum illud iter peragentia.] Satis latina sunt ista, pro firmamenti permeabilitate, neque vllius alterius interpretationis 55 indiga.

Eusebius

Diodorus.

I.

Eusebius Emiffenus Eusebius Emiffenus in Catena Martinengi, pagina 1011. & Lippomani, pag. 30. [*Quæritur utrum luminaria, ac stellæ infra Cælum distantia cursum peragant, an Cælo fixa sint, an veluti viatores in Cælo iter faciant? Ac si quidem dixerint infra Cælum currere, audiant Homerum apud quem Sol è fluentis Oceani ad medium Cæli ascendit, deinde cursu confecto occidit. Neque item Cælo fixa dici possunt, ea enim ratione alterum altero nunquam velocius esset, quod tamē adeo perspicuum est, ut negari non possit. *Sacra ergo ac diuina Scriptura testatur, Cælū firmum atque immobile esse, Solem vero ac Lunam, in Cælo moueri ac cursum suum peragere. Nā in Iosue dictum est; Sol & Luna stet: non ait, Cælum mouēs Lunam aut Solem, stet. Itē ab Ezechia dictum est; Sol retrocedat, non ait, Cælū mouens Solem, retrocedat. Cæcus est, qui ex his astra in liquido moueri non videt.

S. Philastrius. S. PHILASTRIUS Episcopus Brixien. qui claruit sub Theodosio Imperatore, anno Domini 380. quem se Mediolanicum S. Ambrosio vidisse testatur S. Augustinus, in epistola ad Quod Vult Deū, in Catalogo Hæreseon, Hæresi 82. ita scribit.

[Est Hæresis, *quæ stellæ infixas putat esse in Cælum, non de thesauris locisque absconditis, atque à Deo dispositis in vesperum iussu diuino repente procedere, statutisque horis suo lumine cursum ministeriumq. indictum agnoscere: *quod contrarium alienumq. Fidei Catholicæ inuenitur, si ita quis senserit, magisq. paganæ vanitatis, & philosophorum inanis sententiæ, quam Christianæ scientiæ habere consortium demonstrabitur. Scriptura enim omnipotentiam Dei, ita edocet, ut in breui è diuersis thesauris cōcurrere atque discurrere sydera nunciauerit, ornamentoque cæli, noctisque, ut lucis causa ex parte sint à Deo præstita atque commodata, diuersisq. horarum spatijs, velut ad sua loca, rursus redire statuta sint, ut ex quibus locis exire iubentur quotidie, ad ea loca reuerti iterum præsentente Angelo & compellente, cursum debitū præterire nullo modo possint, &c.]

II.

Huius itaque S. Patris tempore, in tota Ecclesia, tam Orientali quam Occidentali, uti ex Augustino, Ambrosio, Basilio, Chrysostomo alijsq. Sanctis Patribus atque Scriptoribus Ecclesiasticis constat, tam consona & certa de cæli immobilitate opinio fuit, ut S. Philastrius arbitratus sit eandem esse quasi dogma Fidei tenendam, ideoque & illam sententiam, quæ stellæ cælo infixas doceret, & consequenter cælum loco moueret, tanquam consequenter hæreticam redargueret.

In quem sensum verba S. Patris, Pererius lib. 2. in Gen. q. 9. Et Cornelius de Lapide in cap. 1. Genesis, itemq. Glossa marginalis ad textum, in Biblioth. Patrum, 10. 4. pag. 41. & alij, rectissime accipiunt: ut male à nonnullis verba S. Viri clarissimi torqueantur, quasi contra duritiem, & pro liquiditate cæli hinc nihil eliciatur. Nimis enim clara sunt S. Patris verba. Vsurpauit autem iste S. Pater hæresis vocabulum sæpe large, ut patet ipsum legenti, quod & hic fecisse, non est dubium.

DICTIS ASSENTITVR

Lactantius.

L. Cælius Lactantius Firmianus, (quemadmodum in Sole illustrato ipsū recte producit, Generosus Dominus, D. Ioannes Nicolaus à Smogulecz, Smogulecki Polonus, &c.) qui temporibus Hieronymi vixit, & circa annum Christi 320. floruit. agens contra eos, qui Antipodes asserunt lib. 3. de Falsa Sapientia, cap. 24. putabat & fortiter propugnabat cælum tantum esse hemisphæricum, immobile, & in substantia aërem, & sidera per eius spatia liberè deuolui, quæ cum animata concederet, & motus eorum voluntarios admitteret, ne in itineribus suis aberrare à statuta via, in amplissimis illis campis cælestibus motu arbitrario possent, legibus diuinis libertatem illorum coercuit, illisque ad illa decurrere stadijs, non per quæ impetus innatus impelleret, sed ratio diuina dirigeret. Sed præstat ipsum aliquantisper audire Oratorem, qui libro secundo de Origine erroris, cap. 5. sic scribit.

Pererius, Cornelius de Lapide, & alij ita intelligunt Philastriam de plano.

Lactantius.

I L

[Quomodo igitur (astra) in conficiē-
dis suis motibus constantiam seruant?
(intellige, si motus eorum voluntarij
non sunt, obicit enim sibi ex aduersa-
riorum sententia, qui astra ponebant
animata & soluit.) Nimirum Deus vni-
uersi artifex sic illa disposuit, sic illa
machinatus est, *ut per spatia Cæli, diui-*

*Stellas per
spatia cæli
liberè mo-
uet.*

*na & admirabili ratione decurrerent, ad
efficiendas succedentium sibi tempo-
rum varietates.] & paullo post. [Inest
ergo sideribus ratio ad peragēdos mea-
tus suos apta. Sed Dei est ista ratio; qui
fecit & regit omnia, non ipsorum side-
rum, quæ mouentur, nam si Solem
stare voluisset, perpetuus dies vtique
esset, &c.]*

Hinc autem pro hac sententia, nihil
probatum aliud, quam eum cælum non
solidum, sed liquidum asseruisse, adeo-
que pro hac non illa contraria sententia
stare, semper enim stellis motum attri-
buit, dicitque eas *per cæli spatia*, non
cum Cælo decurrere.

Procopius.

PROCOPIVS Commentariis in Ge-
nesin, cap. 1. apud Martinengum par. 2.
pag. 1012.

[Quæstio nunc nascitur, an illa Lu-
minaria Cælo fixa circumuoluantur,
vel Cælo stabili & immobili manente,
suas reuolutiones absoluant: deinde an
infra hoc cælum motus suos eient? &c.
Quidam pronunciant Luminaria lon-
ginquo à Cælo interuallo in aëre vaga-
ri, multum à Cælo remota. Itaque
vt ex prædictis apparet, pleramque lu-
cis partem, vt in superiorem regionem
transfunderent, & reliquam demum
deorsum ad nos transmitterent: præte-
rea magis Cælum quam nostram regio-
nem suo fulgore illustrarent. Vt mihi
videtur incedunt per cæli superficiem,
lucem ad nos porrigentia vniuersam.
Non enim frustra habet Scriptura: po-
suit ea in firmamento.]

*Astra non
sunt cælo
infixa.*

*Nec intelligenda est, vt quidam vo-
lunt, dictio, Posuit, pro fixit. Quapro-
pter & Iesus Filius Naue exclamat,
Stet Sol; nō dixit Stet Cælum quod ipsum
mouet, &c.]*

PRO CAELO LIQVIDO

S. Isidorus depugnat.

5 Sanctus Isidorus Episcopus Hispalen- *S. Isidorus.*
sis, qui floruit anno Christi 630, libro
tertio Originum, cap. 30. editionis Pari-
siensis, anno 1601.

[Cælum, inquit, Physici rotundum,
10 volubile atq. ardens esse dixerunt, &c.
Hoc Græcè *ἰσχυρὸς* dicitur, *ἀπὸ τῆς ὁραότητος*,
idest, à videndo, eo quod aër perspicuus
sit, & ad speculandum purior.]

*Cælum est
Aër purior.*

Eadem habet libro 13. cap. quarto.
15 Ex mente igitur huius sancti Patris; Cæ-
lum est aër purior, igitur liquidum,
quod ne sensu meo illi affictum putes,
en ex ipsomet.

Lib. 13. Originum, cap. 5. [Aether lo-
cus est, in quo sydera sunt, & significat
20 ignem qui à toto mundo in alterum
separatus est. Sane aether est ipsum ele-
mentum: *Aethra* vero splendor æthe-
ris, & est sermo Græcus.]

25 Et in libro differentiarum, de littera
C, numero 82. Inter Cælum & Aether
ita distinguitur, quod non tantum ille
astriferus locus, sed iste aër Cælum vo-
catur. * Aether autem sublimior Cæli
pars est, in quo sydera constituta sunt.
Sane & aether aër igneus est superior.
Aethra vero lux & splendor est Ae-
theris.]

*Aether in
quo sunt a-
stra, est aër
igneus.*

Ex his manifestum est, Cælum & aë-
rem apud hunc Sanctum Patrem quasi
æque late patere, & superiorem Cæli
partem dici Aethra siue aërem igneum,
inferiorem aërem turbulentum, quod
mox probo, ex Libro Originum 13.
40 cap. 7.

[Aër, inquit, est inanitas plurimum
habens admixtum raritatis quam cæ-
tera elementa, &c. * Hic autem partim
ad caelestem, partim ad terrenam ma-
teriam pertinet; nam ille subtilis, vbi
45 ventosi ac procellosi motus, nō possunt
existere, ad caelestem pertinet partem,
iste vero turbulentior, qui exhalationi-
bus humidis corporefcit, terræ deputa-
tur, &c. Eadem dicit de Cælo, lib.
eodem, cap. 4.]

*Aërem per
totum Vni-
uersum di-
spersit.*

Idem, lib. 3. Orig. cap. 4. [Mundus
est hic, inquit, qui constat ex Cælo, &
55 terra & mari, cunctisque sideribus.]

Qui

I.

Qui idcirco Mundus est appellatus, quia semper in motu est:] nulla enim requies eius elementis concessa est. Eadem & clarius repetit, lib. 13. Orig. c. 1. Numerat igitur Cælum inter elementa Mundi, & quod nomine Cæli aërem & ignem intelligat, audi quid dicat l. 13. Orig. c. 3. [Græci autem elementa, στοιχεῖα nuncupant, eo quod sibi societatis concordia & communione quadā conueniant. Nam sic & inter se naturali quadam ratione iuncta dicuntur, ut modo originem ab igne repetentes usque ad terram: modo à terra usque ad ignem; ut ignis quidem in aëra desinat, aër in aquam densetur, aqua in terram crassescat, rursusque terra diluatur in aquam, aqua rarefcat in aërem, aër in ignem extenuetur. Quapropter omnia elementa omnibus constat inesse: sed vnumquodque eorum, ex eo quod amplius habet accepisse vocabulum. Sunt autem diuina prouidentia propriis animantibus distributa: * nam Cælum Angelis, aërem volucris, mare piscibus, terram hominibus cæterisque animantibus Creator ipse impleuit.] En, quomodo hic Cælum loco ignis reponat.

Cælum & Ignis idem sunt secundum S. Isidorum.

Cælum autem in Scripturis sanctis, ait lib. Orig. 13. cap. 4. [Ideo firmamentum vocatur, quod sit cursu siderum & raris legibus fixisque firmatum: cuius esse subtilem naturam, (inquit lib. de Natura rerum, cap. 12. cum sancto Ambrosio) etiam scriptura demonstrat, dicens quod firmavit cælum sicut fumum.] Cuiusmodi autem sint isti siderum cursus, edocet lib. 3. Orig. cap. 62. [* Sidera autem feruntur, aut mouentur. Feruntur quæ Cælo fixa sunt, & cum Cælo voluuntur. Mouentur vero quædam, sicut planetæ, id est, erraticæ, quæ cursus suos vagos, certa tamen definitione conficiunt.] Nam lib. 3. Orig. cap. 49. & lib. de Natura rerum, cap. 17.

Sol per se ipsum mouetur.

[* Solem per se ipsum moueri, non cum Mundo verti dicunt. Nam si fixus Cælo maneret, omnes dies & noctes æquales existerent: sed cum alio loco cras occasurum, alio occidisse hesterno videmus; * apparet eum per se ipsum, non cum Mundo verti.]

II.

1 Eadem de septem planetis repetit, l. de natura rerum cap. 22. & illis suas partes in cælo & circulos homocentricos tribuit. Ut igitur cum eodem sancto Patre concludamus, [Mundus, inquit lib. de Natura rerum, cap. 9. est Vniuersitas omnis, quæ constat in Cælo & in terra.] Et cap. 11. Partes Mundi quatuor sunt. Ignis, Aër, Aqua, Terra. Quarum hæc est natura. Ignis tenuis, acutus, & mobilis. Aer mobilis, acutus & crassus.] Cumque lib. 13. originum, cap. 1. dicat, Mundus est Cælum, Terra, Mare, & quæ in eis sunt: quis non videt, sanctum Isidorum nomine Cæli, Aërem, & Ignem complecti? Cumque Aër & Ignis sint mobiles & liquidi natura, Cælum ergo à S. hoc habitum est liquidum non durum.

Cælum liquidum, in quo S. Isidorus sequitur S. Ambrosium.

Id quod amplius confirmatur, quia Sanctum Ambrosium lib. de Natura rerum, cap. 13. 14. 15. 16. &c. ad verbum citat & sequitur. Ex mente autem Diui Ambrosii Cælum esse fluidum, constat ex allatis prius.

Cæterum ne quis arbitretur ex eo quod Sanctus iste Pater sphaeras seu circulos septem Planetis assignauit, sequi Cælos ab ipso distinctos & duos agnitos, cauet hanc ipsam phantasiā Auctor ipse, dum expresse tradit, planetas in eodem cælo ferri secundum partes diuersas, magis scilicet superiores & inferiores: ipsos autem liberis & vagis discursibus non fixos contra motū ipsius in eodem moueri, &c.

CAELVM LIQVIDVM
celebrat Iunilius.

Iunilius his consona tradit, in Genesis, super illa verba, Fiant luminaria in firmamento Cæli.

Iunilius.

45 [Nam etsi nobis, inquit, sæpissime nox tenebrosa & cæca (fir) obscurato videlicet nebulosis turbinibus aëre, qui terræ proximus est: * superiora tamen illa spatia, quæ ætheris nomine censentur, & à turbulento hoc aëre usque ad sidereum pertingunt cælum, semper ob siderum circumeuntium redduntur lucida, fulgorem.]

Æther ad stellas usque extenditur.

55 Hinc patet spatium totum ab Atmospha.

sphæra quodammodo inchoâdo, vsque ad Cælum stellarum Firmamenti nomine comprehendi, & nil nisi liquidum ætherem esse, id quod ipse Auctor comprobât in sequentibus, super illa verba, Vt luceant in Firmamento cæli, &c.

[*Semper quidem ait, Luminaria in Firmamento Cæli lucent, vt diximus: & proxima ei loca, claro lumine perfunduntur, sed temporibus opportunis illuminant terram. Vnde patet Solem & Lunam in æthere liquido ferri. Etenim super illa verba, Dixit autem Deus, producant aquæ reptile animæ viuentis, & volatile super terram, sub firmamento Cæli.]

[*Cælo autem, ait, hoc modo iunguntur (elementa) quoniam adeo vicinus est ei aer iste, vt & ipse nonnunquam eius nomen accipiat. Sicut volatilia cæli cognominat Scriptura, quæ volare constat in aëre.] Et post. [Sane iuxta aliam translationem, mouet nonnullos, quod dictum est: & volatilia volantia secundum firmamentum, vel iuxta firmamentum cæli.]

Aether qui, & superior aer, ad astra vsque pertingit. Sed intelligendum est, quod ideo dictum sit volare aues secundum Firmamentum cæli, * quia hoc nomine & æther indicetur: hoc est superius illud aëris spatium, quod à turbulento hoc & caliginoso loco, in quo aues volant, vsque ad astra pertingit. Quod esse tranquillum prorsus, ac luce plenum, non immerito creditur. Nam errantia sidera septem, quæ in hoc ætheris spatio vaga ferri perhibentur, Scriptura in Firmamento cæli esse posita dixit. Ideo aues rectè dicuntur, secundum firmamentum cæli volare: quia vicina sunt, vt ita dixerim, ætheri, turbulenti hæc aëris spatia, quæ volatus auium sustinent.

Aether est Firm. cæli. Nec mirandum si æther firmamentum cæli nominatur, cum aer appellatur cælum, vt supra docuimus.

Ex his euident est, Solem, Lunam, & reliquos planetas in aëre puriore, adeoque Cælo liquido ferri, secundum lunilium. Sed & ipsas stellas non versari in duro, & hic, & superius ex eodem lunilio probatum habes. Vnde non rectè in contrarium citatur ab alijs.

Richardus.

RICHARDVS S. Victoris, qui flo-

ruit circa annum Domini 1140. lib. 2. Exceptionum cap. 7. super verba: In principio creauit Deus Cælum, & Terram.

[*Cælum vocat tria elementa, Ignem, Aërem, Aquam, quæ erant in vna confusione permixta, siue in vna permixtione confusa, circa quartum quod est terra fluctuantia.] & post. [In principio itaque creata sunt cælum & terra, id est, quattuor elementa, simpla omnium faciendorum materia.] & post. [*Quarta die fecit luminaria, quæ in firmamento probantur esse fixa, exceptis septem planetis, quorum ista sunt nomina, Luna, Venus, Mercurius, Sol, Mars, Iupiter, Saturnus.]

Richardus ergo Septem planetas ponit in firmamento non fixos, sed vagos & liberos, vnde illud secundum ipsum non durum sed permeabile oportet esse Cælum.

Quando autem dicit firmamentum ex stellis supra infixis esse volubile, loquitur de parte firmamenti superiore; & quando negat sciri ex qua factum sit materia, loquitur de materia in specie, quod ignoretur, an ex aqua, aëre, aut igne conflatum sit, ex horum autem vno vel aliquibus secundum ipsum factum oportuit.

S. ANSELMVS Archiepiscopus Cætuariensis, qui anno Domini 1109. obiit, libro primo De Imagine cap. 24. [Ignis, inquit, qui quartum elementum conscribitur, quasi non gignens dicitur, * à Luna vsque ad firmamentum extenditur. Is tantum est aëre subtilior, quantum aer aqua tenuior, aqua terrarior. Hic etiam æther, quasi purus aer dicitur, & splendore perpetuo latatur.]

De hoc Angeli corpora sumunt, cum ad homines missi veniunt. In hoc septem stellæ singulis circulis contra mundum feruntur, & ob vagum cursum planetæ, id est, erraticæ dicuntur. Hæ immensa celeritate firmamenti ab Oriente in Occidentem raptantur, tamen naturali cursu contra mundum ire comprobantur, sicut Musca si in rotamolendini circumferretur, ipsa tamen proprio motu contra reuolutionem eius

Omnia ex elementis creata sunt.

S. Anselm.

I.

eius ire videtur. Et cap. 25. Est autem
*cælum subtilis, igneæque naturæ.] Et
post. [Sunt enim stellæ firmamento in-
fixæ, & non cadunt, eo mira celeritate
currente.]

Habes hinc, cælum planetarium li-
quidum, est enim purus ignis, ignis au-
tem purus non potest esse durus. An-
autem firmamentum vndique durum
efficiat, dubitatur ex eo, quod ait stel-
las in eo infixas non cadere, ob incredi-
bilem motus celeritatem ex quo innuit,
cessante motu, casuras, & consequenter
neque ipsum, durum fatendum esset.
Nā quod ait ipsum ex aquis instar cry-
stalli solidatum, potest firmamento at-
tribui denominatiue, nimirum quod ip-
sum dicatur firmatum ex aquis superio-
ribus congelatis; & confirmatur hæc ex-
plicatio vehementer ex eo, quod paullo
ante Cælum dixit esse subtilis igneæque
naturæ, quæ cum solida crystalli densi-
tate parum conueniunt.

Hugo Ca-
rensis.

H V G O Carenensis in Postillis. apud
Martinengum parte 2. pag. 1014. Fiant
Luminaria, id est, Sol, Luna & Stellæ.
[Stellæ sunt in firmamento fixæ secun-
dum quosdam, vel prope ipsum secun-
dum alios; *Sol, Luna, & cæteri planetæ
sub stellis in æthere.]

Hic saltem constat, cælum planeta-
rium ab ipsis quos sine nomine citat, nō
durum sed liquidum esse iudicatum.
Nam æther, vt visum, est aer igneus, &
quando antiqui illum à firmamento di-
stinguunt, ordinarie ipsum pro igne vel
aëre purgatioris atque naturæ fluidæ su-
munt; vti legenti & bene perpendenti
haud obscure patebit.

Theophila-
ctus.

THEOPHILACTVS Bulgariæ Ar-
chiepiscopus in Epistolam secundam
ad Corinth. cap. 12. Ait ex Sacris litte-
ris non plures esse cælos quam tres, æ-
rium, firmamenti, & id quod die pri-
mo cum terra conditum fuit: cumque
in Epistolam ad Hebræos, cap. 8. super
illa verba, *Tabernaculi veri, quod fi-
xit Deus & non homo, cælum nec mo-
bile nec circulare, non tantum ex alio-
rum, sed & suamet opinione declaret;
euidens est, ipsum non potuisse sentire
Cælum esse durum: alioqui stellæ in i-

II.

1 pso moueri nō potuissent. Quod autem
ipse ex sua non aliorum tantum senten-
tia per modum nudæ citationis cælum
immobile fecerit, accipe verba ex editio-
ne Parisiensi, & prælo Ascensiano anno
Christi 1534. Romæ euulgata. Verba
Theophylacti à Fr. Christophoro Porse-
na Romano, è Græco in Latinum trans-
lata sunt hæc.

10 [*Hinc autem intelligi potest, quem-
admodum & Basiliius sentit, nec mobile
esse cælum, nec circulare: Fixit enim,
cum inquit, vtrumque tollit.] Hanc
autem translationem, quia prima, &
15 Romæ ex exemplari Vaticano traducta,
ipsique Pontifici dedicata fuit, quis ve-
ram & germanam esse ambigat? Vnde
non placent, editionum recentiorum
corruptelæ.

20 Aquæ fontibus viciniores, semper
sunt synceriores. Nam etiam si certum
sit, D. Chrysostomum eadem in episto-
lam ad Hebræos docere, nihilominus
& ipsum D. Basilium eandem tenuisse
25 sententiam non male colligitur ex Ho-
mil. 1. in Hexaem. vbi scribit. [De fi-
gura quoque (cæli) satis sunt ea, quæ
idem ille (Esaias) dixit, Dei gloriam
enarrando. Qui constituit, inquit, cæ-
lum vt fornicem.]

Martinengus Glossæ suæ parte prima.
Theophylactum iisdem citat in hanc
sententiam verbis, quibus ego ipsum,
non ex Martinengo, sed ex autographo
35 codice, vti significatum est, produxi.

Idem Martinengus eadem parte pag.
609. Pro eadem cæli immobilitate ex
Vielmio adducit Seuerianum & Acaciū
in Catena, &c.

40 EVTHYMIVS in Psalmum 103. sic
inquit [Esaias autem alia quadam, atq.
eleganti translatione vsus, *illius etiam
(cæli) immobilitatem ac figuram de-
monstrauit, dicens: Qui statuit cælum
quasi cameram. Quod si pellem pro
Tabernaculo intellexeris, dicemus fi-
guram cæli hoc sermone significari. E-
rat quippe Tabernaculum instar for-
50 nicis.]

PROCOPIVS Gazeus; Commenta-
rijs in Genesim libro primo, assertum
55 Isaiæ locum. * Qui statuit cælum vt
for-

Cælum im-
mobile.

Esa. 40. 22.

Seuerianus.
Acacius.

Euthymius.

Procopius.

I.

fornicem, & id extendit sicut tabernaculum super terram, hanc sententiam etiam tuetur.

[*Plurimi modo relatum Prophetæ testimonium imitati, asseruerunt cæli formam esse hemisphæricam, cum cæteri confirmant eius formam esse sphæricam.

Cæli stans. *Verum de eius statu & forma quid Apostolus prædicet, audiamus; ac veri Tabernaculi quod fixit Deus, & non homo. Vbi igitur sunt qui cælum quasi perpetua vertigine rapi, & sphæricum pronunciare audent? Vtrumque enim Paullus suo eloquio è medio tollit, & vtrumque firmissime refellit, &c.

Theodore-
sus.

THEODORETUS in Genesim, quæstioni 11. Sitne vnum cælum an duo? sic respondet, post multa. [Qui non credit secundum esse cælum, temerariam rectam transgreditur, qui vero plures numerare conatur, adhæret fabulis, postposita diuini spiritus doctrina.] Firmamentum itaque expresse docet vnum tantum esse cælum, & id ipsum repetit in psalmum 148. Igitur secundum ipsum, oportet planetas in eo libere moueri, & sic firmamentum permeabile esse.

PRO CAELO LIQVIDO

Auctoritas D. Bonauenturæ.

D. Bonauentura.

D. BONAVENTURA, lib. 2. sent. parte secunda, articulo primo, quæstione prima, Tractat & decidit hoc dubium ex instituto, cuius verba adscribere non piget, & quidem ad longum, quod aliqui ipsum in contrariam sententiam immerito allegent.

QVÆSTIO I.

An luminaria cæli in eodem continuo locentur?

[*Vtrum omnia luminaria cæli locentur in vno corpore continuo? Et quod sic, videtur per textum sacre Scripturæ quæ dicit omnia luminaria in firmamento posita esse. Fiant inquit luminaria in firmamento cæli, &c.

Item hoc videtur ratione. quæcunq.

II.

1 corpora distinguuntur ab inuicem, distinguuntur aut forma, aut superficie: sed corpus cæli à Luna vsque ad cælum stellatum est vniforme, & iterum non est corpus habens terminatam superficiem: ergo impossibile est ipsum habere pluralitatem, siue distinctionem: igitur omnia luminaria sunt in eodem corpore.

10 Item si aliqua corpora sunt distincta ab inuicem, ad motum vnius non sequitur motus alterius: sed vltima sphæra mouet totum quod infra ipsam est ab oriente in occidentem: ergo necesse est totam naturam cælestem esse vnum corpus continuum.

Item sicut aues sunt productæ ad ornatum aeris, ita luminaria ad ornatum cæli: sed vnū est corpus aeris quod ornatum omnibus auiibus: ergo pari ratione vnum corpus cæli, quod ornatum omnibus luminaribus.

Primo. Ad oppositum arguitur sic. Numerus venit in corporibus eiusdem naturæ ex diuisione continui: sed orbes planetarum dicuntur esse septem tam à naturalibus, quam à Mathematicis: ergo sunt discontinui, igitur luminaria cæli, non sunt in eodem corpore continuo.

Secundo. Item impossibile est duo corpora quæ mouentur diuersis omnino & disparatis motibus, secundum suum totum esse continua: sed orbes planetarum, sicut dicunt Astronomi, mouentur contra vltimam sphæram: ergo impossibile est ad inuicem continuari.

40 Tertio. Item, Damascenus in numeratione cælorum distinguit cælum septem planetarum, à cælo stellarum: sed non esset, si corpus illud in quo sunt planetæ, & stellæ, esset continuum: ergo, &c.

45 Quarto. Item, si omnia luminaria essent in firmamento posita, ita quod in vno corpore continuo, tunc omnes stellæ essent fixæ, & nullæ erraticæ: si ergo aliæ dicuntur fixæ, aliæ erraticæ: videtur quod posita sint in aliquo corpore.

CON-

I.

CONCLUSIO.

Cæli Luminaria posita sunt in pluribus orbibus in corpore tamen vno continuo, quod nomine firmamenti Scriptura vocat.

RESP. AD ARGVMENTVM.

[Ad prædictorum intelligentiam est notandum, quod secundum communem opinionem loquentium circa hanc materiam, siue Naturalium siue Mathematicorum, luminaria locantur in diuersis orbibus: hæc autem distinctio, siue diuersitas orbium secundum melius intelligentes non venit ex distinctione formarum, sicut distinguuntur aër, & aqua, nec venit ex discontinuatione superficie, sicut distinguitur lapis à lapide: sed venit ex diuersitate motuum: *diuersitas autem motuum non tollit continuitatem, in eo quod est subtile, & ad motum habile: sicut manifestè apparet in aqua quando secundum diuersas sui partes ad diuersas mouetur positiones, & similiter in aëre: ex hoc tamen non discontinuatur. Secundum hanc igitur positionem, dicendum est *luminaria cæli posita esse in pluribus orbibus, in corpore tamen vno continuo, quod Scriptura vocat nomine firmamenti: & ideo dicit omnia luminaria posita esse in firmamento cæli: vnde rationes ad hanc partem inductæ sunt concedendæ.

Respondetur ad argumēta contraria.

Primo. Ad illud quod obiicitur, quod numerus est ex diuisione continui, dicendum quod verum est de illo numero, in quo numerantur corpora eiusdem naturæ in genere entium: sed non est verum de numero quo numerantur corpora in genere mobilium: Ad hunc igitur numerum faciendum sufficit sola motuum distinctio: & sic est in proposito.

Cælum est fluidum, sicut Aqua, & Aër.

Secundo. *Ad illud quod obiicitur, quod orbis planetarum mouentur contrariis motibus sphaeræ ultimæ: ergo discontinuantur, dicendum quod non sequitur: hoc enim non habet veritatē nisi in corpore solido: *in corpore enim

II.

subtili, & raro sicut est aqua & aër, manifestam habet instantiam.

In his enim distinctio potest venire à virtute motoris salua continuitate mobilis, propter hoc quod est maximè obediens motori, nec habent superficiem sic terminatam, sicut habent corpora solida: & illud patet plane, cum duo venti oppositi perflant in aëre, ita quod vnus desuper, & alter subter.

Exemplum à ventis contrarijs.

Tertio. Ad illud quod obiicitur de Damasceno, quod cælum planetarum distinguitur à firmamento, dicendum quod distinctio cælorum plus attenditur secundum diuersitatem proprietatum & motuum, quam attendatur secundum discontinuationem corporum, licet vtroque modo possit attendi. Vnde & Rabanus in distinctione cælorum, cælum siderium, & cælum planetarum sub eodem cælo comprehendit.

Explicat Damascenū.

Quarto. Ad illud quod obiicitur, quod si planetæ sunt in firmamento, quod nullæ sunt stellæ erraticæ, dicendum quod non sequitur, quia in eodem corpore possunt contenta diuersimodè collocari, ita quod vnum alligatur inseparabiliter, reliquum verò minime. Et stellæ dicuntur fixæ immediate positæ in octaua sphaera, cuius motu mouentur: planetæ verò sunt in orbibus inferioribus, qui mouentur motu alio: ideo a spectui nostro erratici videntur, dum contra viam superioris orbis incedunt.] Hucusque sanctus Bonauentura, ex quo habes,

Primo. Cælum liquidum.

Quid ex D. Bonauentura doctrina sequatur

Secundo. Stellarum & Planetarum vnum & continuum cælum.

Tertio. Orbis, sphaeras seu Circulos à Mathematicis introductos, non reales sed imaginarios accipiendos esse.

Quarto. Explicatum sanctum Damascenum de septem planetarum circulis.

Quæstione autem secunda ait, planetas in suis orbibus imaginariis moueri sicut clauus fixus in rota, idque ex sententia Aristotelis propter cæli incorruptibilitatem, motum tamen illum & orbis omnes esse terræ homocentricos.

Et quamquam Mathematici velint illos orbis esse excentricos, & re ipsa discretos superficiebus; id tamen à Physicis ob Aristotelem verius negari, &c.

Hæc

I.

fornicem, & id extendit sicut tabernaculum super terram, hanc sententiam etiam tuetur.

[*Plurimi modo relatum Prophetæ testimonium imitati, asseruerunt cæli formam esse hemisphæricam, cum cæteri confirmant eius formam esse sphæricam.

Cæli stans. *Verum de eius statu & forma quid Apostolus prædicet, audiamus; ac veri Tabernaculi quod fixit Deus, & non homo. Vbi igitur sunt qui cælum quasi perpetua vertigine rapi, & sphæricum pronunciare audent? Vtrumque enim Paulus suo eloquio è medio tollit, & vtrumque firmissime refellit, &c.

Theodore-
sus.

THEODORETUS in Genesim, quæstioni 11. Sitne vnum cælum an duo? sic respondet, post multa. [Qui non credit secundum esse cælum, leuissimam rectam transgreditur, qui vero plures numerare cōatur, adhæret fabulis, postposita diuini spiritus doctrina.] Firmamentum itaque expresse docet vnum tantum esse cælum, & id ipsum repetit in psalmum 148. Igitur secundum ipsum, oportet planetas in eo liberè moueri, & sic firmamentum permeabile esse.

PRO CAELO LIQVIDO

Auctoritas D. Bonauenturæ.

D. Bonauentura.

D. BONAVENTURA, lib. 2. sent. parte secunda, articulo primo, quæstione prima, Tractat & decidit hoc dubium ex instituto, cuius verba adscribere non piget, & quidem ad longum, quod aliqui ipsum in contrariam sententiam immerito allegent.

QVÆSTIO I.

An luminaria cæli in eodem continuo locentur?

[*Vtrum omnia luminaria cæli locentur in vno corpore continuo? Et quod sic, videtur per textum sacre Scripturæ quæ dicit omnia luminaria in firmamento posita esse. Fiant inquit luminaria in firmamento cæli, &c.

Item hoc videtur ratione. quæcunq.

II.

1 corpora distinguuntur ab inuicem, distinguuntur aut forma, aut superficie: sed corpus cæli à Luna vsque ad cælum stellatum est vniforme, & iterum non est corpus habens terminatam superficiem: ergo impossibile est ipsum habere pluralitatem, siue distinctionem: igitur omnia luminaria sunt in eodem corpore.

10 Item si aliqua corpora sunt distincta ab inuicem, ad motum vnius non sequitur motus alterius: sed vltima sphæra mouet totum quod infra ipsam est ab oriente in occidentem: ergo necesse est totam naturam cælestem esse vnum corpus continuum.

Item sicut aues sunt productæ ad ornatum aeris, ita luminaria ad ornatum cæli: sed vnū est corpus aeris quod ornatum omnibus auiibus: ergo pari ratione vnum corpus cæli, quod ornatur omnibus luminaribus.

25 Primo. Ad oppositum arguitur sic. Numerus venit in corporibus eiusdem naturæ ex diuisione continui: sed orbes planetarum dicuntur esse septem tam à naturalibus, quam à Mathematicis: ergo sunt discontinui, igitur luminaria cæli, non sunt in eodem corpore continuo.

30 Secundo. Item impossibile est duo corpora quæ mouentur diuersis omnino & disparatis motibus, secundum suum totum esse continua: sed orbes planetarum, sicut dicunt Astronomi, mouentur contra vltimam sphæram: ergo impossibile est ad inuicem continuari.

40 Tertio. Item, Damascenus in numeratione cælorum distinguit cælum septem planetarum, à cælo stellarum: sed non esset, si corpus illud in quo sunt planete, & stellæ, esset continuum: ergo, &c.

45 Quarto. Item, si omnia luminaria essent in firmamento posita, ita quod in vno corpore continuo, tunc omnes stellæ essent fixæ, & nullæ erraticæ: si ergo aliæ dicuntur fixæ, aliæ erraticæ: videtur quod posita sint in aliquo corpore.

CON-

I.

CONCLUSIO.

Cæli Luminaria posita sunt in pluribus orbibus in corpore tamen vno continuo, quod nomine firmamenti Scriptura vocat.

RESP. AD ARGVMENTVM.

[Ad prædictorum intelligentiam est notandum, quod secundum communem opinionem loquentium circa hanc materiam, siue Naturalium siue Mathematicorum, luminaria locantur in diuersis orbibus: hæc autem distinctio, siue diuersitas orbium secundum melius intelligentes non venit ex distinctione formarum, sicut distinguuntur aër, & aqua, nec venit ex discontinuatione superficiæ, sicut distinguitur lapis à lapide: sed venit ex diuersitate motuum: *diuersitas autem motuum non tollit continuitatem, in eo quod est subtile, & ad motum habile: sicut manifestè apparet in aqua quando secundum diuersas sui partes ad diuersas mouetur positiones, & similiter in aëre: ex hoc tamen non discontinuatur. Secundum hanc igitur positionem, dicendum est *luminaria cæli posita esse in pluribus orbibus, in corpore tamen vno continuo, quod Scriptura vocat nomine firmamenti: & ideo dicit omnia luminaria posita esse in firmamento cæli: vnde rationes ad hanc partem inductæ sunt concedendæ.

Respondetur ad argumēta contraria.
Primo. Ad illud quod obijcitur, quod numerus est ex diuisione continui, dicendum quod verum est de illo numero, in quo numerantur corpora eiusdem naturæ in genere entium: sed non est verum de numero quo numerantur corpora in genere mobilium: Ad hunc igitur numerum faciendum sufficit sola motuum distinctio: & sic est in proposito.

Cælum est fluidum, sicut Aqua, & Aër.
Secundo. *Ad illud quod obijcitur, quod orbis planetarum mouentur contrariis motibus sphaeræ ultimæ: ergo discontinuantur, dicendum quod non sequitur: hoc enim non habet veritatē nisi in corpore solido: *in corpore enim

II.

subtili, & raro sicut est aqua & aër, manifestam habet instantiam.

In his enim distinctio potest venire à virtute motoris salua continuitate mobilis, propter hoc quod est maximè obediens motori, nec habent superficiem sic terminatam, sicut habent corpora solida: & illud patet plane, cum duo venti oppositi perflant in aëre, ita quod vnus desuper, & alter subter.

Exemplum à ventis contrarijs.

Tertio. Ad illud quod obijcitur de Damasceno, quod cælum planetarum distinguitur à firmamento, dicendum, quod distinctio cælorum plus attenditur secundum diuersitatem proprietatum & motuum, quam attendatur secundum discontinuationem corporum, licet vtroque modo possit attendi. Vnde & Rabanus in distinctione cælorum, cælum siderium, & cælum planetarum sub eodem cælo comprehendit.

Explicat Damascenū.

Quarto. Ad illud quod obijcitur, quod si planetæ sunt in firmamento, quod nullæ sunt stellæ erraticæ, dicendum quod non sequitur, quia in eodem corpore possunt contenta diuersimodè collocari, ita quod vnum alligatur inseparabiliter, reliquum verò minime. Et stellæ dicuntur fixæ immediate positæ in octaua sphaera, cuius motu mouentur: planetæ verò sunt in orbibus inferioribus, qui mouentur motu alio: ideo a spectui nostro erratici videntur, dum contra viam superioris orbis incedunt.] Hucusque sanctus Bonauentura, ex quo habes,

Primo. Cælum liquidum.
Secundo. Stellarum & Planetarum vnum & continuum cælum.
Tertio. Orbis, sphaeras seu Circulos à Mathematicis introductos, non reales sed imaginarios accipiendos esse.
Quarto. Explicatum sanctum Damascenum de septem planetarum circulis.
Quæstione autem secunda ait, planetas in suis orbibus imaginariis moueri sicut clauus fixus in rota, idque ex sententia Aristotelis propter cæli incorruptibilitatem, motum tamen illum & orbis omnes esse terræ homocentricos.
Et quamquam Mathematici velint illos orbis esse excentricos, & re ipsa discretos superficiebus; id tamen à Physicis ob Aristotelem verius negari, &c.

Quid ex D. Bonauentura doctrina sequatur

Hæc

I

Hæc ad longum referre operæ pretium existimaui, quod iste S. Pater ab alijs male in sententias alias distorquetur.

Huc pertinent omnes ij, qui cælum firmamenti à cælo Planetarum non distinguunt nisi solis mobilibus luminosis in eo positis, & illorum motibus: qui sphæras planetarias non reales, sed imaginarias tantum asserunt, inter quos est Franciscus Mayro, lib. 2. sent. dist. 14. quæst. 3. Qui ponunt vnum tantum cælum, vel duos tantum, vel etiam cres.

Franciscus
Mayro, cū
alijs, &c.

Exempla liquidorum continuorum, & diuersis motibus delatorum, habemus in Rheno, qui per totum lacum Acronianum, secundum multa millia Germanica decurrit; item in ventis qui sæpiissime vno eodemque tempore ab omni cæli parte, in altitudine tamen distincta vehementissime aguntur, prout ex nubibus ab ipsis delatis, aperte manifestatur, & in Germania frequenter euenit.

Origenes.

ORIGENEM Cælum arbitratum esse liquidum & non durum, passim auctores testantur, & ex eo satis deducitur, quod Solem & omnia astra putauerit esse animalia, &c. vt habetur apud ipsum libro primo, Peri Archon, cap. 7. & fusc citatur in Sole illustrato Ill. ac Gener. D. Ioannis Nicolai à Smogulecz &c. pag. 60. & 61. Vide etiam Commentaria ipsius in Ioannem, cuius verba non multum ante finem Commentariorum in Euangel. Ioannis lubet excipere, super illa Psalmi verba. * Sermo Dei Cæli firmati sunt, & spiritu oris eius omnis virtus eorum, [quæ quidam (inquit) existimant de Seruatore & Spiritu sancto posita esse, cum etiam hunc sensum habere possint, cælos Dei ratione firmatos fuisse, non secus ac dicimus domum ædificatam fuisse ratione, quæ est ars fabricandarum ædium, & nauim compactam fuisse ratione illa, quæ est ars fabricandarum nauium; sic etiam dicentes * Cælos Dei ratione firmatos fuisse: qui diuinius corpus assequuntur, quod etiam propter hoc Firmamentum vocatur, non habens quamplurimum fluxus, eamque facilitatem fluendi, quæ cætera inferiora; propter quam disse-

Cæli liquidum.

II.

rentiam ac præstantiam, dicimus etiam cælum eximie diuina ratione firmatum fuisse.]

En quomodo Pater hic cælum non durum, sed omnino liquidum facit, minus tamen fluidum quam inferiora. Ad hanc classẽ pertinent plures qui astra animata senserunt, &c.

Quales olim plurimos fuisse tum ex alijs, tum Cicerone de Natura Deorũ liquido constat. in quorum numero plurimi ponunt Aristotelem, certè si recte legatur, aliter intelligi vix poterit.

De eodem Origene noster P. Cornelius à Lapide, Comment. in Apocalip. cap. 6. pag. 129. sic ait.

Orig. cit. &
explicatus à
P. Cornelio
à Lapide.

[Origenes tract. 30. in Matth. Stellæ ait, de cælo ceciderunt, id est, lumen suum deficiente fomento amiserunt, ac quod in eis terrestre remansit, in terram decidit; putat enim ex sententia Platonis in Timæo, cælos & astra ex elementis esse composita & conflata; ac proinde egere nutrimento instar nostri ignis vel lampadis: quare sensim deficiente alimento in fine Mundi astrorum quoque lucem, siue quod in eis igneum est, defecturum: quod vero terrestre est, ad sua elementa & terram relapsurum.]

Ex his pater, Origenem stellas materiæ corruptibilis, naturæ ignitæ, & cælum pertranabile agnouisse.

PRO LIQUIDA CAELI SVBSTANTIA, Auctoritas sancti Gregorii Nysseni.

Sanctus Gregorius Nyssenus Frater Sancti Basilii Magni in libro in Hexæmeron. ex editione Parisiensi 1615.

S. Greg. Nyssenus.

[Verum ad institutum nostrum reuertamur, * videamusque quomodo supremo naturæ sensibilis termino ab igne semel occupato, Firmamentum deinceps factum sit, quod superiorum, & inferiorum aquarum confinium esse dicit.]

Cæli igniti.

* Ego enim existimo Firmamentum, siue sit vnum ex quattuor, siue aliud illa complectens, vt externi philosophi tradiderunt, non esse corpus solidum ac durum, sed comparatione sempiternæ & in-

I

I I.

& incorporeæ, & quæ tactu non percipitur proprietatis, extremum illud naturæ sensibilis, quod ignis vi sua perpetuo mobili ambit, firmamentum à Scriptura dici.

Quis enim nescit, quod quidquid solidum est, resistenti quadam duritie condensari? quod autem est densum & durum ac resistens, qualitate graui non vacat: quod vero natura graue est, sursum ferri non potest.

At rebus cunctis sensibilibus superius est Firmamentum, ex quo fit vt nihil in eo crassum aut corpulentum cogitari possit, sed vt dictum est, rerum quæ corpore vacant, & animo tantum comprehenduntur, comparatione, quidquid sensibus est obnoxium, solidum, firmumque dicitur, licet naturam quæ maxime cogitari possit, subtilem obtineat.

Firmamentum naturam maximè subtilem obtinet.

Merito igitur quod ignis ambitu comprehenditur, (comprehenditur autem quidquid ex crassa materia constat) id proprijs semel terminis circumscriptum, ob naturalem materiæ crassitudinem, ad superiorum differentiam, vocatum est firmamentum.]

Hæc sunt ita clara, vt maiore explicatione non indigeant, eadem ad verbum fere dixit & scripsit S. Basilus, quemadmodum in prius allegatis textibus satis est videre.

PRO CAELO LIQVIDO

affertur auctoritas Dionysij Carthusiani, in qua dictorum compendium habetur.

Dionys. Carthusianus.

Dionysius Carthusianus, in Cap. 1. Gen. art. 12. super illa verba; Et posuit eas in Firmamento cæli, &c. pag. 30. editionis Colonienfis.

Hic sumitur firmamentum pro cælo stellato seu sphaera octaua, nisi forte per stellas intelligantur non solum stellæ quæ dicuntur fixæ in firmamento, sed & alij quinque planetæ.

* Denique stellæ quæ sunt in sphaera octaua, secundum Aristotelem & eum sequentes, sunt fixæ in ipsa, nec habent proprium motum, sed motu sui

1 orbis mouentur.

Suntque de natura eiusdem orbis, & vnaquæque earum est densior pars ipsius. Vnde dispositæ sunt ad suscipiendum lumen præclarius, quam cæteræ orbis partes.

Planetæ vero dicuntur stellæ erraticæ, puta non infixæ in proprijs sphaeris, sed proprium motum habentes.

Planeta nō sunt fixi; sed motu proprio libere aguntur.

10 Veruntamen Plato in Timæo dicit, stellas non esse fixas in firmamento, sed meare & choream ducere in eodem. * & in hoc Ptolemæus Platonem secutus est. Vnde dicunt non cælum, sed stellas 15 cæli moueri & circumferri.] Hæc ibi.

Idem enarratione in caput primū Genesis articulo decimo super illa verba: Diuisitque aquas, quæ erant super 20 firmamentum, &c. Vocauitque Deus firmamentum cælum, &c.

Circa hanc litteram quæritur primo, An corpora cælestia sint naturæ elementaris. Et videtur quod immo, ex textu 25 præsentis, cum Firmamentum sit factum in medio aquarum. Vnde videtur sola diuisione ab eis differre, & iterum quoniam supra ipsum sunt aquæ.

Hanc Quæstionem Doctores super secundum Sententiarum satis discutiunt & communiter Aristotelem assequuntur, dicentes quod sint alterius naturæ quam elementa. Denique specialis est 35 Quæstio, An saltem Cælum crySTALLINUM seu aqueum designatum per aquas quæ supra firmamentum consistunt, sit vere de natura & specie aquæ? Et videtur quod immo, quia Scriptura ista, 40 apertissime dicit, quod supra firmamentum sint aquæ, & sub eodem contextu vtitur nomine aquæ, ita quod videtur de aqua vniuocè loqui.

Hoc quoque videntur pretendere 45 manifestè alia loca Scripturæ veteris testamenti, vt cum fertur in Psalmo 103. Qui extendis cælum sicut pellem & regis aquis superiora eius. Itemque: Laudate eum Cæli Cælorum, & aquæ 50 quæ super cælos sunt, laudent nomen Domini.

Et rursus, in trium Cantico Puerorū: Benedicite aquæ omnes quæ super cælos 55 sunt Domino.

Eccc

*Cum

Hæc ad longum referre operæ pretium existimaui, quod iste S. Pater ab alijs male in sententias alias distorquetur.

Huc pertinent omnes ij, qui cælum firmamenti à celo Planetarum non distinguunt nisi solis mobilibus luminosis in eo positis, & illorum motibus: qui sphæras planetarias non reales, sed imaginarias tantum asserunt, inter quos est Franciscus Mayro, lib. 2. sent. dist. 14. quæst. 3. Qui ponunt vnum tantum cælum, vel duos tantum, vel etiam tres.

Franciscus Mayro, et alijs, &c.

Exempla liquidorum continuorum, & diuersis motibus delatorum, habemus in Rheno, qui per totum lacum Acronianum, secundum multa millia Germanica decurrit; item in ventis qui sæpissime vno eodemque tempore ab omni cæli parte, in altitudine tamen distincta vehementissime aguntur, prout ex nubibus ab ipsis delatis, aperte manifestatur, & in Germania frequenter euenit.

Origenes.

ORIGENEM Cælum arbitratum esse liquidum & non durum, passim auctores testantur, & ex eo satis deducitur, quod Solem & omnia astra putauerit esse animalia, &c. vt habetur apud ipsum libro primo, Peri Archon, cap. 7. & fusc citatur in Sole illustrato Ill. ac Gener. D. Ioannis Nicolai à Smogulecz &c. pag. 60. & 61. Vide etiam Commentaria ipsius in Ioannem, cuius verba non multum ante finem Commentariorum in Euangel. Ioannis lubet describere, super illa Psalmi verba. * Sermo ne Dei Cæli firmati sunt, & spiritu oris eius omnis virtus eorum, [quæ quidam (inquit) exultant de Seruatore & Spiritu sancto posita esse, cum etiam hunc sensum habere possint, cælos Dei ratione firmatos fuisse, non secus ac dicimus domum ædificatam fuisse ratione, quæ est ars fabricandarum ædium, & nauim compactam fuisse ratione illa, quæ est ars fabricandarum nauium; sic etiam dicentes * Cælos Dei ratione firmatos fuisse: qui diuinius corpus assequuntur, quod etiam propter hoc Firmamentum vocatur, non habens quamplurimum fluxus, eamque facilitatem fluendi, quæ cætera inferiora: propter quam disse-

Cælū liquidum.

rentiam ac præstantiam, dicimus etiam cælum eximie diuina ratione firmatum fuisse.]

En quomodo Pater hic cælum non durum, sed omnino liquidum facit, minus tamen fluidum quam inferiora. Ad hanc classē pertinent plures qui astra animata senserunt, &c.

Quales olim plurimos fuisse tum ex alijs, tum Cicerone de Natura Deorū liquido constat. in quorum numero plurimi ponunt Aristotelem, certè si recte legatur, aliter intelligi vix poterit.

De eodem Origene noster P. Cornelius à Lapide, Comment. in Apocalip. cap. 6. pag. 129. sic ait.

Orig. cit. & explicatus à P. Cornelio à Lapide.

[Origenes tract. 30. in Matth. Stellæ ait, de cælo ceciderunt, id est, lumen suum deficiente fomento amiserunt, ac quod in eis terrestre remansit, in terram decidit; putat enim ex sententia Platonis in Timæo, cælos & astra ex elementis esse composita & conflata; ac proinde egere nutrimento instar nostri ignis vel lampadis: quare sensim deficiente alimento in fine Mūdi astrarum quoque lucem, siue quod in eis igneum est, defecturum: quod vero terrestre est, ad sua elementa & terram relapsurum.]

Ex his patet, Origenem stellas materiæ corruptibilis, naturæ ignitæ, & cælum pertranabile agnouisse.

PRO LIQUIDA CAELI SVBSTANTIA, Auctoritas sancti Gregorii Nysseni.

Sanctus Gregorius Nyssenus Frater Sancti Basilii Magni in libro in Hexæmeron. ex editione Parisiensi 1615.

S. Greg. Nyssenus.

[Verum ad institutum nostrum reuertamur, * videamusque quomodo supremo naturæ sensibilis termino ab igne semel occupato, Firmamentum deinceps factum sit, quod superiorum, & inferiorum aquarum confinium esse dicit.]

Cælū ignitū.

* Ego enim existimo Firmamentum, siue sit vnum ex quattuor, siue aliud illa complectens, vt externi philosophi tradiderunt, non esse corpus solidum ac durum, sed comparatione sempiternæ & in-

I

& incorporeæ, & quæ tactu non percipitur proprietatis, extremum illud naturæ sensibilis, quod ignis vi sua perpetuo mobili ambit, firmamentum à Scriptura dici.

Quis enim nescit, quod quidquid solidum est, resistenti quadam duritie condensari? quod autem est densum & durum ac resistens, qualitate graui non vacat: quod vero natura graue est, sursum ferri non potest.

Firmamentum naturam maximè subtilem obtinet.

At rebus cunctis sensibilibus superius est Firmamentum, ex quo fit vt nihil in eo crassum aut corpulentum cogitari possit, sed vt dictum est, rerum quæ corpore vacant, & animo tantum comprehenduntur, comparatione, quidquid sensibus est obnoxium, solidum, firmumque dicitur, licet naturam quæ maxime cogitari possit, subtilem obtineat.

Merito igitur quod ignis ambitu comprehenditur, (comprehenditur autem quidquid ex crassa materia constat) id proprijs semel terminis circumscriptum, ob naturalem materiæ crassitudinem, ad superiorum differentiam, vocatum est firmamentum.]

Hæc sunt ita clara, vt maiore explicatione non indigeant, eadem ad verbum fere dixit & scripsit S. Basilus, quemadmodum in prius allegatis textibus satis est videre.

PRO CAELO LIQVIDO

affertur auctoritas Dionysij Carthusiani, in qua dictorum compendium habetur.

Dionys. Carthusianus.

Dionysius Carthusianus, in Cap. 1. Gen. art. 12. super illa verba; Et posuit eas in Firmamento cæli, &c. pag. 30. editionis Colonienfis.

Hic sumitur firmamentum pro caelo stellato seu sphæra octaua, nisi forte per stellas intelligantur non solum stellæ quæ dicuntur fixæ in firmamento, sed & alij quinque planetæ.

* Denique stellæ quæ sunt in sphæra octaua, secundum Aristotelem & eum sequentes, sunt fixæ in ipsa, nec habent proprium motum, sed motu sui

I I.

1 orbis mouentur.

Suntque de natura eiusdem orbis, & vnaquæque earum est densior pars ipsius. Vnde dispositæ sunt ad suscipiendum lumen præclarius, quam cæteræ orbis partes.

Planeta vero dicuntur stellæ erraticæ, puta non infixæ in proprijs sphæris, sed proprium motum habentes.

Planeta nō sunt fixi; sed motu proprio libere aguntur.

10 Veruntamen Plato in Timæo dicit, stellas non esse fixas in firmamento, sed meare & choream ducere in eodem. * & in hoc Ptolemæus Platonem secutus est. Vnde dicunt non cælum, sed stellas 15 cæli moueri & circumferri.] Hæc ibi.

Idem enarratione in caput primū Genesis articulo decimo super illa verba: Diuisitque aquas, quæ erant super 20 firmamentum, &c. Vocauitque Deus firmamentum cælum, &c.

Circa hanc litteram quæritur primo, An corpora cælestia sint naturæ elementaris. Et videtur quod immo, ex textu 25 præsentis, cum Firmamentum sit factum in medio aquarum. Vnde videtur sola diuisione ab eis differre, & iterum quoniam supra ipsum sunt aquæ.

30 Hanc Quæstionem Doctores super secundum Sententiarum satis discutiunt & communiter Aristotelem assequuntur, dicentes quod sint alterius naturæ quam elementa. Denique specialis est 35 Quæstio, An saltem Cælum crySTALLINUM seu aqueum designatum per aquas quæ supra firmamentum consistunt, sit vere de natura & specie aquæ? Et videtur quod immo, quia Scriptura ista, 40 apertissimè dicit, quod supra firmamentum sint aquæ, & sub eodem contextu vtitur nomine aquæ, ita quod videtur de aqua vniuocè loqui.

Hoc quoque videntur pretendere 45 manifestè alia loca Scripturæ veteris testamenti, vt cum fertur in Psalmo 103. Qui extendis cælum sicut pellem & tegis aquis superiora eius. Itemque: Laudate eum Cæli Cælorum, & aquæ 50 quæ super cælos sunt, laudent nomen Domini.

Et rursus, in trium Cantico Puerorū: Benedicite aquæ omnes quæ super cælos 55 sunt Domino.

Eeee

*Cum

I.

* Cum igitur magis debeamus sequi auctoritatem Scripturæ diuinæ, quam distamen rationis humanæ; videtur absolute dicendum, quod super cælos sunt verè ac propriè aquæ, & quod cælum crystallinum sit de natura aquæ: Firmamentum quoque sit elementaris naturæ, videlicet igneæ, vt aliqui dicunt: vel partim igneæ, quantum ad stellas; partimque aqueæ, vtpote quantum ad reliquas eius partes.

Denique antiqui & Sancti Doctores Augustinus, Basilus, Gregorius, Ambrosius ita senserunt: quos Beda, Strabus, Damascenus, Magister Sententiarum, auctor Scholasticæ Historiæ, Glossa & alij multi secuti sunt. Circa huius Quæstionis decisionem scribit Bonaventura super secundum: In hac quæstione propter diuersitatem positionum & debilitatem rationum, vix certum aliquid dici potest. Deinde post multa verba declinat ad hoc, quod per aquas quæ super cælos sunt, intelligatur nona sphaera, quæ dicitur cælum crystallinum, non propter veritatem naturæ aquæ, sed propter similitudinem in diaphaneitate, qua aqua non solum est luminis receptiua, sed etiam aliquantulum retentiua, vt patet in quibusdam lapidibus, qui non videntur de nocte, nisi ponantur in aqua.

Deinde quasi concordando Theologos atque Philosophos, dicit quod sanctus Augustinus & alij Sancti dixerunt Firmamentum esse de natura ignis, non quod habeat formam substantialem & speciem specialissimam ignis, sed quia participat lucis naturam secundum Analogiam.

Et quamuis istud sit bene dictum, quantum ad hoc quod videtur verba sanctorum Theologorum pie saluare, & quantum ad homines concordare: veruntamen si quis plenius curiosusque voluerit informari, inueniet quod secundum intentionem & mentem Patrum iam præfatorum, cælum crystallinum sit verè de natura aquæ, atque formaliter frigidum, præsertim cum ponant aquas super Firmamentum, ad temperandum Solis, & aliorum cælestium corporum calorem.

Vnde affirmant cæteris planetis fri-

II.

gidio rem, quamuis eis velocius moneatur, vtpote altius situs, propter propinquitatem suam ad aquas illas.

Hinc Thomas scribit super secundum: Circa hanc quæstionem fuit Philosophorum diuersa positio. * Omnes enim ante Aristotelem dixerunt, cælum esse de natura elementorum, quod Aristoteles primitus improbavit, ponens cælum esse sine grauitate & leuitate alijsque contrarijs, vt patet primo Cæli, & Mundi. Et propter efficaciam rationum eius, posteriores philosophi, scilicet Peripatetici, consenserunt ei. vnde nunc omnes opinionem eius sequuntur.

Similiter expositores Scripturæ in hac diuersitate fuerunt, secundum quod diuersorum Philosophorum doctrinis erant instructi. Basilus enim, Augustinus ac plures Sanctorum, sequuntur in his quæ philosophiam concernunt, nec spectant ad fidem, opiniones Platonis, ideo ponunt cælum esse naturæ elementaris. Dionysius autem fere vbique in talibus Aristotelem sequitur, vt parè diligenter inspicienti libros ipsius. In talibus ergo dicta Sanctorum non sunt maioris auctoritatis, quam philosophi quos sequuntur, nisi quod sunt ab omni infidelitatis suspitione immunia. Hæc Thomas. Dicta autem Alberti libro de Coæuis, concordant dictis Bonaventuræ.

Denique Beda ait: Cælum sidereum constat esse in medio aquarum, quod de aquis factum credi potest. Nam lapis crystallinus, qui est magnæ firmitatis & perspicuitatis, de aquis est factus. Et secundum eundem Bedam, aquæ sunt super cælum instar glaciei firmæ ac solidæ. Hæc plura similia habentur in Glossa, & allegantur à Magistro in 2. sent. In Scholastica item Historia dicitur: Fecit Deus in aquarum medio firmamentum, id est, quandam exteriori Mundi superficiem, solidam ex aquis congelatis instar crystalli, & lucidam, super quam sunt aquæ ad modum crystalli congelatæ, ne igne soluantur.

Quibus consonare videtur quod Iosephus ait: Secunda die Deus cælum super omnia collocauit, illudque ab alijs

I.

alijs distinguens, in se ipso constitutum esse præcepit, & ei crystallum circumfigens humidum, & pluuiale, ad vtilitatem quæ fit ex imbris terræ, congruè fabricatus est.

Ecce quomodo eruditissimi, ac ingeniosissimi Viri, propter auctoritatem Scripturæ, postposita Philosophorum Peripateticorum doctrina, sentiunt cælos, idest, sidera esse elementaris naturæ.

Porro quam scribat sanctus Ambrosius in suo Hexaemeron contra aliter opinantes, patet in libro illo. Arbitror ergo in hac materia sobriè esse loquendum.

Rationes Arist. sunt tantum probabiles.

* Rationes quoque Aristotelis, quibus probat Cælum esse alterius naturæ, non sunt demonstratiuæ, sed solum probabiles: nempe quod arguit de specialitate motus cælestium corporum, quod non mouentur ad medium, nec à medio, sed circa medium, quid demonstrat, cum & ignis in propria sphaera, circa medium seu circulariter moueatur?

Et si dicatur hoc esse per accidens, utpote virtute sphaeræ superioris ipsum continentis, non tamen motus ille est igni violentus, aut penitus innaturalis. Denique in generationibus mixtorum, elementa leuia, scilicet ignis, & aër, naturaliter mouentur deorsum, qui motus est eis naturalis per respectum ad naturam vniuersalem.

Sic dici posset de motu Cælestium corporum, quæ etsi essent elementaris naturæ, non tamen sequeretur ea corruptibilia esse, cum nec ipsa elementa sint corruptibilia secundum se tota, & aliæ rationes incorruptibilitatis possint assignari in eis. Hinc Sanctus Thomas super Secundum, positionem Aristotelis vocat opinionem, atque in Prima parte, questione sexagesima octaua, multum sobriè loquitur de ista materia dicens:

S. Th. utraq. sententiã liberam relinquit, nec ad Arist. alligat.

[* Si dicamus Firmamentum esse Cælum sidereum, tunc aquæ quæ sunt supra Firmamentum, possunt dici illius naturæ cuius est hoc cælum. Vnde qui dicunt Cælum esse de natura

II.

elementorum, dicere possunt aquas illas esse elementares.

Qui autem asserunt Cælum esse specialis naturæ, dicunt has aquas non elementaris, sed cælestis naturæ esse: & qui ponunt aquas elementares supra cælum, dicere possunt, quod non sint graues, sed subtiles: nec fluidæ, sed tanquam glacies firmæ ac duræ. Vnde à quibusdam Cælum crystallinum vocantur.] hæc sanctus Thomas.

Amplius sicut Sanctus Bonaventura tangit, super Secundum: Hi dicunt, quod Deus in ordine vniuersi magis attendit commune bonum & finis vtilitatem, quam formæ qualitatem & bonum specialis naturæ. Ideo sicut in minori Mundo Deus posuit cerebrum sursum ad temperandum cordis calorem, * sic supra Cælum sidereum posuit aqueum Cælum ad ardorem ætheris refrigerandum. Atque per istud soluunt argumenta quæ contra hæc fieri solent.

Ego in ista materia assertiue nil dico; neque intentio mea est, in hoc loco horum discussioni plenè insistere. * Sed propter Sanctorum Patrum reuerentiam tetigi ista.

Hinc in discussione huius materiæ, ait Sanctus Bonaventura: hoc præcipuè attendendum est, ne in incerta materia aliquid certitudinaliter asseratur. Melius enim est pie dubitare, quam temerarie aliquid definire.] Hucusque Dionysius.

S. BRVNO CARTHVSIAE Patriarcha, in psalmum centesimum quadragesimum octauum: [Materiales vero Cælos, inquit, dicimus, & aërem, & æthera & ipsum Firmamentum, & etiam septem circulos septem Planetarum.] & post.

S. Bruno.

[Materia estote laudandi eum, vos Superiores Cæli, Cælorum inferiorum complexiui. Superiores qui Cælos inferiores ambiunt, dicit Firmamentum & Aethera; inferiores vero, circulos planetarum & aërem.] & post.

[In hoc (Creator) valde potens est & mirabilis apparet, quod non solum

Eccc 2 sub

I.

sub firmamento, sed etiam supra firmamentum aquas creavit, &c.

Hinc fit, hunc Sanctum Patriarcham Cælum liquidum amplexum esse:

Primo. Quod illud efformet ex æthere, id est, ut sanctus Isidorus explicat, aëre igneo: sic enim & hunc Patrem accepisse satis constat ex textu, & more illorum temporum.

Secundo. Quod Planetis non orbis sed tantum circulos attribuat, quos idcirco in rerum imaginariarum censu habendas, haud est vllum dubium, prout ex Ruperto, S. Bona-

II.

ventura, & alijs abunde intellectum est.

Tertio. Quod eosdem circulos, infra ætherem collocet, adeoque ad cælum aëreum haud obscure transferat. Antiquos autem per ætherem vel ignem, vel corpus quoddam caeleste liquidum intellexisse, quando de illo ita locuti sunt, ut contra Firmamentum distinguerent, prout iste Sanctus facit; facile videbit, qui ipsorum monumenta attente perculutabit, ut proinde necessarium non arbitrer, id multis verbis operosius comprobare.



PRO NATURA CAELI VEL LIQUIDA, VEL IGNEA, VEL VTRAQUE:

Auctoritates Theologorum Neotericorum,
Philosophorum & Physiologorum, &c.

CAP. XXVII.

Auctoritas Illustrissimi Roberti S. R. E. Card. Bellarmini, Illustriss.
atque Excellentiss. Federici Cæsij Principis S. Angeli, &c.
Auctoritate roborata.



VANQVAM
alias, cap. 21.
pagina 644. ut-
cunque insinua-
ui Illustriss. Car-
dinalem Bellar-
minum opinioni
cæli liquidi ad-

hæsisse, idque aliorum typis euulga-
tum esse; quia tamen nuper cum in hac
operis mei materia versarer, ab Excel-
lentissimo D. Ioanne Fabro, S. D. N.
Vrbano VIII. ab Herbariis studiis
Medico Doctore &c. bona sane fortuna
huius rei indaginem longè certissimam
fidemque omni exceptione maiorem
edoctus sum: facere non potui, quin
eam huc insererem. Narravit enim is
mihi Illustrissimum atque Excellentiss.
Federicum Principem Cæsium, viuen-
te adhuc Bellarmino, Opus quoddam
Astronomicum, de Recentibus Cæli
Apparentiis *Cælispectii* nomine adorna-
uisse, in eoque Cæli *Liquiditatem* as-
seruisse. Sed cum propter negotiorum
infinitam multitudinem, atque eam
etiam ob causam, à cura perficiendi o-
peris cessaret, quod nollet aliquo pacto
in Sacrorum locorum explicatione abs-
que insignis Theologi voto procedere

1 ob reuerentiam sacris paginis debitam:
eo Cardinalis intellecto, admodum est
lætatus, & Illustrissimi Principis He-
roicos Conatus mirum in modum col-
5 laudauit, atque ut absolueret incæptū
vehementer instigauit: neque enim
quidquam aiebat esse, quod vlla ipsum
sinistri suspicio à re bene inchoata ab-
sterreret. Se namque in eadem senten-
10 tia etiamnum persistere, quam olim
ante triginta annos ex Sanctis Patribus
& diuina Scriptura hausisset. Proinde
ad suum edendum fatum etiam atque
etiam hortari. His ego à clarissimo Do-
15 ctore Fabro perceptis, institi uti pro sua
humanitate ab Illustrissimo, Excellen-
tissimoque Principe, huiusce rei plenio-
rem confessionem fidemque indubita-
tam atque publicandi licentiam impe-
20 traret: quod & præstitit in subscriptum
modum.

Dottissimo Sig. Fabri mio.

25 Quello ch'io posso testificar per la
verità, è questo. Che essendo la Fel.
Mem. del Sig. Cardinal Bellarmino,
molto mio Signore, e che mi portaua
particular affetto, voleua spesso sentir
30 da me delli miei studij, e compositioni;

Eccc 3 e dan.

*Epistola Il-
lustrissimi
Principis
Cæsij, &c.*

I.

e dandoli ragguaglio della mia opra, dal Cielo, e particolarmente, ch'io teneuo che fusse *fluido*, qual opinione mi pareua molto ben confermata dalla Sacra Scrittura, e dall'auttorità de Santi Padri; ma però non voleuo asscurarmi nell'interpretation de luoghi sacri senza l'approuatione di Theologo di tal'eminenza, come era S. Sig. Illustrissima ne mostrò grandissima allegrezza, e mi disse, che questo haueua tenuto lui sempre, come conforme alle sacre carte, & interpretationi de Santi Padri, e che in ciò non haueua dubio, ma che non haueua premuto in promouerla, per l'opposizione che comunemente faceuano le scuole, coll'allegar demonstrationi Matematiche in contrario, e particolarmente che senza gli orbi solidi, & il loro moto, fusse totalmente impossibile il saluar le Apparenze. Al che replicando io, non solo hauer sodisfatto à pieno quanto alla parte Fisica, e Matematica, & à tutti li fenomeni, ma che per il contrario, era totalmente impossibile il sodisfar, & il saluar, come dicono, le Apparenze col porre li orbi: tanto maggior gusto ne riceueua, e me sollecitava al compimento dell'opera, nè mi vidde mai dopo tal ragionamento, che non me ne domandasse, e non mi ricordasse il darle compimento, con mostrarne desiderio grande, e dispiacere, che le mie infinite domestiche occupationi, me lo ritardassero. In conformità di che anco passorono fra lui e me lettere, mentre io ero in Acquasparta. Così V. S. potrà francamente asserire à chi glie ne ha dimandato, facendogliene piena fede; mentre di tutto cuore à V. S. bacio le mani. Dalla mia Rocca di S. Angelo questo dì primo di Giugno 1628.

Di V. S.

Affectionatis. sempre

Federico Cesio, Linceo

Prencipe di S. Angelo.

Hanc igitur humanis. Principis Epistolam ad D. Fabrum exarata, manuque & sigillo eiusdem communitam, ipse ad me misit, meique iuris esse iussit, quam ego proinde pro fide cuilibet facienda studiosè conseruo, & in gratiam Lectoris latinitate donatam, subiungo.

II.

Doctissime D. Faber.

Quod cum veritate testificari possum est istud. Cum felicissime memoriae Illustrissimus Cardinalis Bellarminus, &c. singulari me semper affectu beneuolentiae prosequeretur, auebat saepe scire, quoniam in statu studia mea & commentationes litterariae essent. Cui cum meum, quod de natura Caeli prae manibus habebam opus explicassem, & illud in primis aperissem, quod Substantiam eius *Fluidam*, idque ex sacris litteris, & Sanctorum Patrum monumentis ratum, firmumque tenerem, grauissimam tamen sacros locos interpretandi prouinciam, absque insigniti Theologi alicuius ductu, cuiusmodi ipse esset, nollem cum aliqua praesidentiae nota suscipere: ostendit se ea ex re maximam percipere voluptatem, insuperque adiecit, se in ea sententia semper fuisse: sacraeque Scripturae, & SS. Patrum interpretationibus conformem iudicasse, neque vllum vnquam de eius veritate dubium habuisse: in ea tamen perurgenda minus instituisse, quod videret communem oppositionem in scholis allegantibus in contrarium demonstrationes Mathematicas, praesertim quod sine orbibus solidis & eorum motu impossibile esset saluare Phenomena. Sed cum ego replicassem, me non tantum satisfecisse argumentis petitis ex Physica, & Mathematica atque Phenomenis, sed in contrarium potius militare omnia, atque adeo impossibile esse satisfacere & saluare Phenomena positis Orbibus tanto maiorem gustum percipiebat, & me ad absolendum Opus stimulabat. Neque vnquam deinde post hoc colloquium me ipse vidit, quin ex me de hoc opere sciscitaretur, & eius complendi mentionem ingereret, ostendendo se vehementi eiusce rei perficiendae desiderio teneri, doloreque maximo affici, quod innumerae domesticae occupationes meae ab incæpto me retardarent. In cuius quoque rei euidentiam maiorem, inter ipsum & me testes interceserunt epistolae, dum ego Aquaspartae commorarer. Itaque Dominatio Vestra poterit hoc audacter asserere ei qui id petijt.

I.

II.

petijt, faciendo illi plenam fidem, &c. 1
Ex arce mea Sancti Angeli, die prima,
Iunij 1628.

D. V.

Addictissimus semper
Federicus Cęsius, Lync.
Princeps S. Angeli.

Ex hisce igitur, amice Lector, senten- 10
tiam hanc de Cęli liquiditate, duorum
istorum Illustrissimorum Principum,
auctoritatibus roboratam habes, quo-
rum grauissimum vtrique existimabis ef-
se testimonium, de quibus illud vnicum 15
pronunciare satis sit, talia sensisse vi-
ros Principes, qui nihil gratiæ, nihil
dent auribus, rem veritate non affectu
metiantur. Bellarminus certe sacer Ec-
clesiæ Romanæ Princeps, sanctimonia, 20
vitæ celeber, eruditione singulari spe-
ctabilis, canitie Venerandus, doctrinæ
huic tanquam certissimæ neque in du-
bium vllatenus reuocandæ totus inhæ-
sit non sensu humano sed eloquio diui-
no, non opinione priuata sed consen-
tiente sanctorum Patrum spiritu, non
impetu aliquo repentino, sed longæuo
vitæ litterationis per annos plurimos a-
ctu, idque contra Scholarum vt arbi- 30
tratur ipse torrentem, perperam pro se
Mathematicos reluctantem raptantem,
cum ij in contraria prorsus omnia a-
beant. Sed & ipse Clarissimus Doctor
Ioannes Faber huic sententię plene sub- 35
scribit, quam etiam plures ex Illustrissi-
ma Lynceorum Academia amplecti af-
seuerabat. Tu quid facto opus sit, etiā
me tacente, facile discernes, Vtrum
Bellarmino tanto Viro Scripturam, 40
& Patres secundum se stare decernenti,
vel, vt loquar rectius, se secundum Pa-
tres & Scripturam decernere statuenti
accedas; An quibusdam Nouitijs Scri-
pturam inuitam torquentibus, Patres 45
obnitentes trahentibus adhærescendum
censeas. Si Bellarminus Sacra Biblia
non calluit, si sanctos Patres male in-
tellexit, quis illa sciet quis hos pene-
trabit? sed audiamus ipsum. 50

Bellarminus de Ascensione Mentis in
Deum, Gradu septimo, Ex
consideratione Solis.

Cap. I.

[Magna res est Sol, cui palatium am- Sol libere
plissimum, pulcherrimum & nobilissi- perambulat
mum Deus parauit. Voluit enim vt in suo calo.

Cælum ipsum esset Palatium Solis, in
quo Libere (Nota Lector) perambulet,
& operaretur: & ipse Sol esset Palatiū
summi Principis Dei.]

Ex eodem Gradu septimo.

Cap. IV.

[Non ignoramus quidem non defuisse, qui ex motu syderum, naturam
Cęli definierint Quintam Essentiam, 20
simplicem, incorruptibilem, & quæ
perpetuo moueatur in orbem: sed sci-
mus etiam non defuisse alios, qui Cę-
lum esse voluerint elementum ignis, 25
*quod non moueatur in orbem, nec sit
incorruptibile secundum partes. Nos
autem non opiniones, sed scientiam
certam, aut doctrinam Fidei quærimus,
vt ex ea nobis ad Deum cognoscendum
scalam solidam construamus. Ergo 30
contenti erimus Luna & stellis, quas
videmus scalam erigere cum Propheta,
vt paullo ante fecimus ex Sole, qui est
lux & Princeps luminum reliquorum.]
Hactenus Amplissimus iste Cardinalis:
qui naturam Cęli igneam satis insinua-
re, Liquidam certe supponere videtur,
dum Solem in Cælo tanquam suo Pala-
tio dicit libere perambulare. Libere 35
non perambulat, qui vt nodus tabulæ,
vel clauus rotæ infixus non mouetur
per se, sed ab orbe suo velut inclusus
ergastulo circumfertur, vti auicula in-
cauea, bulla vel arena in crassitie vitri,
æger in lectica, alimentum in vase. Ni- 45
hil horum *Libere mouetur: Sol autem
secundum Bellarminum, vt audisti, *in
Cælo mouetur libere, Cælum ergo So-
lis secundum ipsum est liquidum. Hæc
te latere nolui. 50

Fauet calo
Solis igneo.

Aucto.

AVCTORITAS VIELMII,
pro Cælo liquido.

*Hieron. Vi-
elm. Domi-
nicanus.*

Quamquam ex Hieronymo Vielmio Cæli liquiditatem satis liceat elicere ubi ipsum p. 649. & 673. de eiusdē corruptibilitate allegavi; quia tamen ipsam de extensione firmamenti clarissime prodit, haud piget eius verba Lectori transcribere.

[Quattuor igitur modis, inquit lect. 14. pag. 185. & 186. extendi res solent.

Rarefactione, incremento, tuncione, expansione, &c. Proferam ego proinde quod meditatus sum, & (ni fallor) probabilius. Hoc vero est, hanc extensionem non fuisse secundum contusionem aut expansionem, quomodo his Doctoribus visum est, sed potius secundum incrementum, non substantiæ (quæ nec magis recipit nec minus, & in indivisibili sita est) non quantitatis & molis (prodierunt etenim prima illa corpora omnia terminata, sicuti alias exposuimus, & in suis singula locis ac sitibus collocata) sed secundum qualitatem & virtutem, non ita quidem, ut nullas qualitates & vires corpora quæ firmamentum dicuntur, antea haberent; sed quod prioribus, quas cum formis initio receperunt, hanc quoque hodie ab Opifice nacta sint, * ut tantæ essent soliditatis videlicet ac roboris, ut aquis non cederent superpositis, ac citra vllum incommodum earum particularis naturæ eas graues quamvis, nedum sustinerent ac veluti gestarent, sed etiam tanquam traditum illis depositum tamdiu conseruarent, quoad illas Opifex ab eis repeteret, &c.

*Probatur
auctoritate
S. Ambrosii.*

Et pag. 187. Nec magnorum auctorum suffragiis destituta nostra hæc opinio est: si quidem D. Ambrosius cum vocem Firmamentum perpendisset, hæc denique meditatus addidit: * vel quod diuina virtute firmatum sit, indicans videlicet, sic forte fuisse nuncupatum, quod Dei virtute, & liberalitate firmitatem ac robur acceperit. Et post. Extensio enim hæc accessione virium, hoc est, soliditatis, firmitatis & roboris cum primis fuit, &c.

1 Vnde quod psalm. 17. legimus, Dominus Firmamentum meum, sunt, qui vertunt, Dominus robur meum; alij, Dominus rupes, aut etiam petra mea. 5 Coeunt igitur in vnum facile hæc omnia, * ut proinde liceat inferre, Deum ita solidum fecisse hodie aërem, hoc est, valentem, ac tanta virtute auctum, & locupletatum, ut aqueas impressiones 10 sustinere nullo negotio possit; ac ita validos illos nobilissimos cælos effecisse, & sua bonitate diuites, ut elementares aquas citra iniuriam, quoad vellet, superferrent: quomodo nimirum 15 durissima rupes, aut petra solet sibi imminentes aquas perferre, aut etiam excipere.

Item Scriptura.

Quare ut D. Basilii, ita hoc loco ait, * Scriptura sacra hoc nomine Firmamenti, in ijs rebus vititur, quæ robore viribusque exuperant.] & post. [Cælos igitur supernos & aërem qui cælum infernum est, recte ac per Metonymiam, firmamentum nostri vocarunt.]

D. Basilii.

SCHOLIA IN

Vielmii.

Vielmius itaque tam sensit firmamentum fluidum, quam non agnouit aërem qui nubes nebulasque supportat, esse durum. Eadem enim firmitate vtrumque à Deo affectum esse deprædicat. Certum autem est, firmitatem aëris non 35 tollere eidem liquiditatem, certum itaque pariter est, neque firmamentum eadem constitui durum. Neque est quod 40 quinquam vox soliditatis moueat; nam apud Latinos præsertim Geometras solidum non est idem quod durum, & ipse Vielmius expressè declarat, se solidi vocabulo non duritiem, sed vim quan- 45 dam intelligere, quia aër nubes supra se contineat, & firmamentum aquas. Quod amplius ab extraordinaria eaque 50 arbitraria Dei voluntate, aquas suspendente probat, quæ probatio frustra esset, si aërem cælumque durum intelligeret; nam aër cælumque durum aquas supernatantes necessario & sine miraculo cohibet.

*Viel. soliditas non est duritia, sed stat cū aëre atq. firmamento liqui-
do.*

Auctoritatem insuper sancti Ambrosii, atque Basilij approbat, quorum vterque aquas graues super firmamentū fluidum

I.

fluidum suspendit. Tandem id ipsum ex vno eodemque Cælo cum sancta antiquitate apertis verbis confirmat.

[*Sunt igitur, inquit lect. 18. pag. 222. ij in ea sententia omnes, vnum duntaxat esse Cæli corpus, vnamque massam non solidam & duram, sed permeabilem mobilem & raram, & vt D. Basilius ait, tenuem quasi fumum, per quam sydera, tanquam pilæ quædam & sphaerulæ, vel ab anima vel ab Angelo, siue manuillis ab intelligentia illis mancipata, certo ac inuiolabili quodam ordine à Deo illis præscripto & assignato perenniter conuertuntur, &c. Et non defuisse veteres quosdam Hebræorum Rabbinos, qui hæc ita se habere putauerint, testis est in sua Medulla Iacobus Naclantus Episcopus Clugiensis. &c. Sed & primis Ecclesiæ sæculis fuisse opinionem hanc Catholicis vulgatissimam & receptissimam, ego inde non multo negotio coniecto, quod Philastrius, qui teste D. Augustino in præfatione sui libri de hæresibus D. Ambrosij coætaneus fuit, inter hæreses opinionem illam reponit, quæ asserit astra cælo esse affixa.] Hucusque Vielmus, qui tandem pag. 226. Hanc Patrum antiquorum doctrinam vt minimum tanquam probabilem admittit.

Rabbini ex Naclanto.

DE CAELO LIQVIDO.

stat Folenghius.

Folenghius.

Ioannes Baptista Folenghius Mantuanus Monachus Casinas, Anno 1585. Romæ sub Gregorio XIII. in Psal. 148. super Laudate eum Cæli Cælorum, & aquæ omnes quæ super cælos sunt, &c. [A suprema quidem, inquit, cælorum molitione, per tractus aëreos ad terram vsque, ordine seruato naturæ descendit Propheta.

Si quidem cum à mentibus illis ætherijs capisset, ad cælestiaque mox transisset corpora, ab his iam ad cælos cælorum, nempe loca vbi sedes est ignis atque aëris delabitur.] Et post. [Vnde dictum est, & aquæ quæ supra cælos sunt: *quod & de primo illo firmamento die secundo condito intelligi volunt Hebræorum expositores, quodque expansum appellant.

Vbi sedes ignis est, ibi sit calicælorum.

II.

1 Fecit inquit Moses, Deus firmamentum, diuisitque aquas quæ erant sub firmamento, ab his quæ erant super firmamentum: *hoc est raras illas & tennes, proinde in sublimi ob leuitatem pendentes; ab illis alijs, posito inter se interstitio: quæ cum graues sint ac densæ, aut in pluuias conuertuntur & defluunt, aut infra nubibus retentæ 10 stagnant. Sunt qui cælum huc crySTALLINUM aduocent, quod supra sydereum locatum esse volunt. Verum non longius hic est philosophandum, de his maxime, quæ vt immensas Dei laudes sua 15 excitare queunt pulchritudine atque ornata, ita occulta propemodum sunt (blaterant vt lubet philosophi) incognita, &c.

20 *O varij igitur vagique cælorum orbes, o aquæ quæ supra cælos ipsos stupendo Dei miraculo manetis, Laudate Deum.]

Aqua miraculose super cælos pendet.

Si Theologus hic Cælos duos agnosceret, non illic eos statueret, vbi 25 sedes est ignis, atque aëris, hæc enim elementa dura non sunt; neque aquas supra firmamentum pensiles, stupendo Dei miraculo adscriberet: neque enim stupendum Dei miraculum est, si aqua 30 labilis supra corpus durum coercita non defuit sed conquiescit; imo stupendum Dei miraculum esset, si descenderet, quia id sine penetratione non accideret.

35

PRO NATVRA CAELI LIQVIDA, Auctoritas Mersenni.

40 Fr. Marinus Mersennus Ord. Minorum sancti Francisci de Paulla, Commentarijs in Genesin anno 1623. Lutetiae Parisiorum editis, quæstione septima, articulo nono, conclusione prima, pag. 843. pro cæli liquiditate inter Neotericos, omnium præclarissime ita 45 ferit.

Marinus Mersennus.

Prima Conclusio. [*Cælos omnes, in quibus astra moueri videntur, aëris instar liquidos esse, mihi non improbabile videtur, quorum partes statim coalescant, vbi sidera de loco in locum proprio motu trasuolarint.

50 Quandoquidem hæc sententia tot in commodis, quot aduersa non vrgetur, estque

I

estque omnium facillima, ut quoslibet astrorum motus, distantias, aspectus, cometarum agitationes & altitudines novarumque stellarum, & omnium Phænomenon productiones, & apparentias explicare possimus.

Enimuero cum ipsi Peripatetici cælorum intelligentias motrices admittant, à quibus nec philosophi nec Theologi Catholici abhorrent, quorsum, obsecro, nos ipsos Eccentricorum & Epicyclorū funiculis constringimus, quibus ita mens alligatur, ut vix illa fragmenta percipere possit, quascunque tandem in illorum circularum intelligentiam assequendam figuras, quascunque schemata, quoscunque circulos, & polos circino descripseris, vel ligno, charta & ære fabricaueris, vel etiam Archimedis instar, vitro concluderis? Nunquid Angelis munus id commissum est, ut stellas & erroneas globos huc illuc deferant, hac & illa pernecitate rapiant, quibus illos quotidie circumagi perspicimus? An ipsis industria, an sapientia, an vires deficiunt, quibus hasce motiones exequi valeant? Illud ergo demus Angelis, si cælum ab ipsis moueri concesserimus, ne contra Philosophorum decretum, entia sine vlla necessitate multiplicemus.

*Vel ab Ang.
vel a natu-
ra possunt
astra moue-
ri.*

Vel si neges eos cælis adesse, ut ex propria virtute sibi primitus à Deo concessa cælestes orbes se ipsos moueant, idem sideribus tribue, stellæ namque similem virtutem à Deo, quam cælis infusam affirmas, habere possunt, quæ statim nobis viciniore mox vero tardiores, aut velociores pro Dei voluntate, & imperio fiant; licet enim lapidi proiecto vim illam indere non possimus, ut statim tardius, statim velocius, idque per multa sæcula progrediatur, id tamen Deo facillimum est, cum infinita virtute, atque sapientia polleat.

*Neque profecto Phænomenis aptius consuli potest, quam ut cælum æthereæ naturæ constituamus, sic enim in illis facillimo negotio stellæ atque cometæ cursus omnes peragere valebunt, quod ut asseramus, Opticorum & Astronomorum demonstrationes nos etiam inuitos cogunt, ut apud eos videri potest,

II.

qui de stellis nouis, atque nouissimis cometis egerunt.] & post pauca.

[*Non est igitur, quod aliquis conqueratur, si cælorum soliditas auferatur, aut etiam numerus, cum satis superque sufficiat, si regio ætherea tam profunda liberum aditum faciat, ut hæc & illac, Sol, Luna, & Stellæ, prout Deus ab initio constituit, expatiantur, siue ab Angelis siue propria virtute sibi à creatione concessa motiones suas peragant. Imo longe facilius est cursus intelligere dempta soliditate, cum Epicyclorum & Excentricorum tanta multitudo minime necessaria sit.

Potest etiam facilius explicari, quomodo stellæ nouæ in cælis apparere valeant, quales fuere nouem, quarum vna circiter annos 125. ante Christi natalem ab Hipparcho deprehensa est.

Secunda. Tempore Adriani Imperatoris.

Tertia. Othonis ætate primi Imperatoris in Cassiopeia, teste Cypriano Leuitio apud Baranzanum.

Quarta. Circa eandem Cassiopeiam anno 1264.

Quinta. In eodem sidere in 7 gradu 6, anno 1542.

Sexta. Anno 1577. quæ per decem septimanas apparuit.

Septima. Anno 1600. in pectore Oloris, in 17. gradu Aquarij.

Octaua. In 18. gradu ♄, & constellatione serpentarij anno 1604.

Alia etiam ante excidium Troiæ, nēpe septima Pleiadum, cæteris lucidior apparuisse dicitur. Quæ cum in eadem cum cæteris Stellis altitudine visæ sint, plura longe confingenda sunt, ut illa noua sidera eorumque cursus explicentur, si cæli solidi fuerint, quam si æris instar facile peruij, &c.

*Denique nullum est, (inquit in fine art. 8. pag. 842.) Phænomenon, quod nō longe facilius, data cæli tenuitate seu liquiditate, concipi, saluari & explicari possit, quam si duos, & adamantinos esse cælestes orbes supponamus.

Nec enim difficilius est, (ait paullo ante) ut sidus per æthera sese moueat, aut moueatur, quam ut orbis ipse gyros suos perficiat, itaque facile negamus tot esse ponendos orbes cælestes, quot alia

Contra sententiam querelas amolitur.

Nouem stellæ nouæ enumerantur.

I.

astra fuerint, quæ sine orbibus illis fictitijs, si non *volūta*, vel *divina*, volutatione, aut circumgyratione, saltem *progressu*, seu progressu, vel processu cieri poterunt. Rationes autem pro hac cæli fluidi natura affert, articulo primo pagina 811. & sequentibus hæc.

Ratio prima.

*Prima ratio ducitur ab Optica, quâ late Pena præfatione Optices ad Carolum Lotharingum Cardinalem deducit: Si cælum sit diuersum ab aëre corpus, habeatque tot partes inter se contiguas, quot errantes siderum globos, sitq. solidum & durum, multa sequuntur absurda; nam stellæ fixæ, & aliæ per tot media tam late fuscæ, tot superficiebus distincta, visæ alibi quam in horizontis polo, nunquam suo loco cernentur, &c. Quæ si fiant, valeat Astronomia; valeant Hipparchi observationes, lacerentur Ptolomæi, &c.

Ratio secunda.

Secunda ratio sumitur tam ex parte Cometarum, quam stellarum de nouo Apparentium. Qui enim fieri potest, vt Cometæ huc illuc per cæli spatia discurrent, & vsque ad Veneris altitudinem, aut etiam maiorem euehantur, nisi cæli aëris instar fluidi constituantur? At eo vsque cometas exurgere testantur Astronomi de Cometa Anni 1577. quem initio sui ortus 210. terræ semidiametris ab oculo spectantium, tamen tunc vicinissimus esset, distare iudicarunt, id est, miliaribus Germanicis (quorum singula 4000. passus continent) 180690. vnde sequitur Cometam illum orbe lunari triplo altiore fuisse, si quidem iuxta Copernici sententiam Lunæ fornix à centro terræ 52 tantum terræ diametris distaret, seu miliaribus germanicis 44720. quod si Ptolemaicam mensuram sequamur, quæ Lunæ distantiam à centro terræ 33. duntaxat semidiametrorum admittit, Cometa sexies; Luna altior constitutus erit, & tertia vnus semidiametri parte, paulloque amplius, nec demissiore fuisse nouissimum anni 1618. Cometam, Fromondus tract. de ipso Cometa cap. 7. arbitratus est. imo si iuxta Tychonem maxima Solis distantia sit semidiametrorum 1179. duntaxat, certe Cometa ille Solis altitudinē superare debuit, sicut & distantiam,

II.

1 quam Clavius in primo capite sphaeræ conuexo solaris orbis tradit, vel potius ex Maurolyco reperit, quæ est semidiametrorum terræ 1216. cum duodecima vnus semidiametri parte.

10 Tertia ratio sumitur ex physica, si quidem eò res nobiliores esse videntur, quo minus densæ solidæque fuerint, quoque tenuiores & subtiliores, vt ab enumeratione partium totius vniuersi constat, &c.

Ratio tertia

15 Quarta ratio petitur ab ipsis nominibus Hebraicis, quæ significant cælum aëris, aut aquæ instar fluidū esse, &c.

Ratio quarta.

20 Quinta ratio sumitur ab auctoritate multorum Ecclesiæ Patrum, &c.

Ratio quinta.

25 Sexta. Quibus omnibus adde, si lubet plurimos huius sæculi præstantissimos Astronomos, & Philosophos huius sententiæ Patronos, vt iam cælorum soliditas in scholis rideri cæperit, siquidem longe facilius est ex fluidorum cælorum Hypothesi omnia cælestia Phænomena explicare, quam dum solidi supponuntur; quandoquidem si fluidi sunt, & velut aërei, tot Epicyclis, & eccentricis non indigemus: quid enim facilius, sed quid simul verosimilius esse potest, quam vnicuique stellæ præfixum fuisse Angelum à Deo, statim atque creatæ fuerunt, qui eas ad Imperiū Dei vsque ad mundi finem moueant?

Ratio sexta

30 Septima. Phænomena recentia in Planetis hæc enumerat, art. 9. pagina 846.

Ratio septima ex Phænomenis recentioribus planetarum

35 Primo. Lunam corniculatam, inæqualem, asperam, lacunis & vallibus vndique obsitam.

40 Secundo. Cometas Luna superiores, quos omnes sublunares fuisse Tycho negat, libro secundo, de recent. Phæn. mundi ætherei cap. 10. m. 1. pag. 246. qui epist. ad Rothman. anni 1595. Ian. 14. * pro stupidis & insulsis habendos ait, qui Cometas sublunares in posterū asseruerint.

45 Tertio. Maculas solares, quæ etiam in medio Solis disco sæpe disparent, vel de nouo conspiciuntur, quibus Faculas addunt, quæ varie occidunt & oriuntur.

50 Quarto. Stellæ γ , & η , corniculatæ & plenæ cernuntur: atque circa Solem veluti centrum circuitus suos peragunt;

I.

agunt: & ipse ☿ cælum ☿ magno spatio interfecat.

Quinto. 4. Planetæ Iouiales ☿ motu proprio circumeuntes, & duo Comites Saturni cum Satellitum instar circumstipantes de nouo visi sunt: quæ omnia putant Astrologi recentiores explicari non posse, nisi cælum cum liquidis, tum mutationi, generationi, atque corruptioni obnoxios esse statuerimus.

Octaua. Rationem sumit ex solutione facili & plana argumentorum, pro cæli soliditate allatorum. Inter quæ locum Iob, cap. 37. vers. 18. fuse explicat, & inter cætera sic ait:

[Quandoquidem verus istius loci sensus, atque scopus est, ut diuinæ Maiestatis infinitam potentiam suspiciamus, atque veneremur, quæ in eo maxime perspicitur, quod natura fluxilis, qualis est aërea, ætherea, & aquea, tam firmiter in suo situ persistat, ac si ex fortissima crysallo, aut alia quapiam durissima materia conflaretur.

* non ita cælum soliditati ac duritiei illum fauere puto, quin eorum liquiditatem, ac fluidam naturam admittere possimus.

Quod ex eo magis ac magis confirmo, quod translationes diuersæ, imo textus Hebraicus, & vulgata spectare videantur illam pulchritudinem, quæ per cælum luminis beneficio dispersa est cum cælum speculo conferant.

Et pag. 840 [Verum ad alias rationes, inquit, progrediamur, si tamen prius aduertat ex illo Iobi loco, nihil inferri; quia Iob vel Deus non loquitur, sed Eliu, qui à capite 35. vsque ad 38. semper loquitur, cuius dicta omnia, tanquam vera probare non tenemur.

Notent hoc bene, qui hunc locum nimis importune vrgent. Consule cap. 30. Obiectionem secundam.

RATIONES A MERSENNO PRO

Cæli liquiditate recensitæ, ex mente & sensu Astronomorum roborantur & augentur.

EX OPTICA.

Primo. Lux cælo conuenit, non quia

II.

1 vel corruptibile vel incorruptibile, sed quia corpus huius accidentis capax est, ita proprietates lucis, reuerberari, & refringi, non sunt corporis vel corruptibilis vel incorruptibilis, sed corporis 5 terminati vel interminati, diaphani vel adiaphani, densi vel rari: politi vel asperi.

Neque enim lux à Luna ad nos re- 10 flectitur, quia Luna natura sua incorruptibilis, sed quia opaca est, &c. quod idem de refractione dicendum: nam corpus diaphanum non ideo lucem acceptam refringit, quia corruptibile vel 15 incorruptibile, sed quia vel densius vel rarius radium oblique acceptum alio diuertit.

Ex hoc fundamento solidissimo ab Opticis alibi demonstrando, & demonstrato, patet inanissimum effugium il- 20 lorum, qui ut vim à Pena pro cælo liquido intentatam eneruent, aiunt cælestes sphaeras, eo quod incorruptibiles sint, lucem acceptam non refringere, &c.

Secundo. Supponendo ergo refractionem esse corporis perspicui sic vel sic densi, sic vel sic rari, sic vel sic configurari, læuigati, &c. proprietatem; continuo elucescit, qua ratione astra, 30 per orbem illos adamantinos, præsertim Epicyclares densitate & raritate differentes, quemadmodum illos multi ponunt, &c. in altitudine supra horizontem quacunque enormiter quidem, sed infallibiliter debeant refringi, præter ordinariam illam ab Atmosphæra causatam refractionem quæ negotij Mathematicis contra hanc rem nihil facessit; 40 illam extraordinariam vrget Penam; nam Luna, verbi gratia, versans in suo epicyclo ad latus & per ipsum ad nos traucens ex lege refractionis certissime sensibilis sui mutationem ostendet; sic Iupiter in suo, sic Venus, sic quilibet 45 erronum in suo: sic Sol & Stella quæuis ad nos delapsa per orbem Epicyclarem alienum, si duri, si discreti sunt uti ab aduersa parte ponuntur refringi debent. 50

Hæc autem nunquam facta sunt, nec modo fiunt. Nulla est ergo refraction: nullum igitur corpus refringens: nulli igitur epicyclares orbis: ergo cælum non

Exemplum
refractionis
ex Luna.

Locus ex S.
Iob afferri
solutus ex-
plicatur.

I.

non durum, sed liquidum. His instant illi telis; quæ obiter tantum, aperta pharetra insinuo. Et hoc vnum pro Pena.

DE APPARENTI LVNAE inæqualitate.

Secundo. Geminum huic est de Lunæ apparentijs ex radiorum reflexione argumentum. Etenim globum ipsius Lunæ menstrue circa centrum suum cõuertere certum est ex eo, quod eandem semper faciem ad nos conuertat, & motu epicyclari agatur; si igitur Luna aspera est, prout illam esse tubus opticus ostendit, & multi concedunt, neque etiam ipsi Peripatetici nonnulli omnem omnino inæqualitatem adimunt; impossibile est ipsam moueri circa suum centrum in suo orbe epicyclari, vel absque vacuo, quod rerum natura non patitur; vel absque corporum penetratione, quod philosophia vna cum natura respuit; vel absque corpore liquido interiecto, id quod quæritur. Si vero Luna Mathematicè polita & geometricè spherica est: nihil in ea præter imaginem Solis ad nos reflexam eamque semper alio loco versantem conspicietur; aut certe ipsa multum præ alia Lunæ illustratione semper elucebit; & Lunæ Maculas sibi subiectas penitus obscurabit.

Pater hoc in globis auratis turrium; in globis marmoreis politis; in ampullis vitreis aqua repletis, aut diuersicoloribus, in alijs denique corporibus politis; &c. Cũ autem Solis imago à Luna ad nos dicto modo non reiiciatur; negant Lunam superficie spherica leui amictam, sed omnino inquirunt asperam, & verè lacunosa præditam esse.

Quod si obijcias solarem in leui Lunæ superficie efformatam imaginem ad nos non peruenturam ob sui exiguitatē, vti Aquilonio, & nonnullis probabile videtur; negant tamen id alij rerum opticarum periti, eo quod spherulæ etiam parue Solem satis sensibilibiter representent, & aquæ stagnantes tantum, quantus directo videtur: Lunæ vero globositas magna est: sed & sub situ euerso radijsque confusa illa Solis species ad nos trajici posset, quemadmodum & stellarum, quarum corpuscula minima non

II.

comprehendi evidens est. Tubi saltem optici in Lunā directi illa Solis in Lunā impressa idea efficaciam non effugeret, eo quod luculas, minores & debiliores manifestet: id quod tamen non fit. Alij quidam ex Astronomis, concessio quod Solis imago huc à Luna non posset perungere, propterea nihilominus inferunt Lunam si exacte læuis esset, omnino non visum iri, ideoque cum eodem Aquilonio inæqualitatem nubeculæ aut nebulae similem eidem attribuunt. Quod autem de Luna, intelligi volunt Astronomi de stellis omnibus, cum ratio ubique idem probet.

Aristoteles certe cum Lunam terræ homocentricam supposuisset, & ex eadem eiusdem facie ad terram semper conuersa ipsiusmet in sphaera sua stabilitatem conclusisset; idem aiebat statuum esse de omnibus planetis atque stellis, quod comprobatum foret de vno. Igitur cum Astronomi Lunarem & Solarem quoque conuersionem ostendunt, similiter arguendum erit, iudicio seu modo argumentandi Aristotelico de omnibus.

Solem autem in suo cælo neque fixum neque æquabili superficie præditum, ipsius aspectus, & conuersio menstrua probat, Et annuit Mercennus. Simile de Ioue arguunt ex inæquali suorum lateronum circuitione, & luce, &c. siue enim in duro, siue in liquido ipsos circumagas, Iupiter certe singulis ipsorum lationibus circumferri nequit. Fixus ergo ætheri non est.

Quanquam dici fortasse posset, Iouem cum sphaera satellitis intimi continuatum esse. Sed an hoc cum ratione dici valeat considerandum est. Sic enim satelles, & sphaera intermedia ipseque Iupiter vnus continuus globus efficeretur.

Deinde Satelles ille Ioui in eodem semper puncto immobiliter immineret, contra quam alij tres facerent. Tandem Iupiter appareret quodammodo regi à Satellite, non satelles à Ioue. Sed hæ sunt ratiocinationes & coniecturæ ingeniosæ quidem, non illationes tamen necessariae: simulque sumptæ suo pondere apud æquos rerum aestimatores carere non videntur. Quorum similia de Saturno concludunt.

F f f f

Hæc

I.

Hæc igitur & huiusmodi similia pro cælo liquido præiudicia magna apud eruditos afferunt. Imo Galilæus & Kepler, apud Simonem Marium, Phænomeno 7. & alibi, Iovem Atmosphæra liquida affeueranter circumdant, quibus Astronomi certatim consentiunt. Et Raphaël Auerſa vult omnes omnino stellas circa suum centrum conuerti, & sic scintillare, &c.

DE CAPITE COMETARVM

superlunarium.

Pro cælo liquido argumentum ex capite Cometæ.
Tertio. Aliud argumentum in medium proferunt Astronomi, ex capite Cometæ in Cælo constituti. Cum enim vt ex Cometa anni 1618. constat communi doctrina, atque indubitato experimento ipsius caput auctum sit circum circa æqualiter ad omnem loci differentiam: quærent Astronomi, quomodo id fieri potuerit in cælo duro? idque solo motu locali, corpusculorum seu partium densiorum ex omni loco versus vnum centrum concursus? Infinitas igitur oportet esse cælestes sphaeras, quæ portiones hæcæ densiores singulas inuisibiles congerant, motibus heteroclitis, inauditis, impossibilibus, nulli hæcenus neque homini neque Angelo cognitæ, per quos aut corporum penetratio, aut cæli adamantini scissio est concedenda, aut quod intendunt Astronomi, fluiditas amplectenda: Similia de decremento inquirunt Astronomi. Nerus huius argumenti perpendi potest ex augmento & decremento Macularum solarium, eadem namque vtrobique ratio militat. Multa hic de accensione, & splendore Cometæ disputari possent in rem præsentem, sed argumenta Astronomorum eminus tantum indico, non plene pando. Nam Cometa iste anni 1618. à polo ad polum per omnes cælos transuersum iter instituit: quod liquiditate negata sine cælorum penetratione fieri non potuit.

Quarto. Cauda etiã Cometæ & barba pro cælo fluido, iudicio Astronomorū, plurimum videtur facere. Ea enim è solis radijs solaribus conſtat, qui in medio illo vaporoso conspicui fiunt: cuius curuitas & in acinacis formam inflexio, qualem cometa anni 1618. formidoloso

II.

aspectu strinxit, cælo duro defendi nequit, potest autem commodissime dato liquido. Quod idem de fluctuante ipsius reciprocatione, repentina disparitione, subitanea cōparitione, productione, contractione, ampliatiōe, coarctatione, & accidentibus huiusmodi assertum volunt. Nā hæc omnia si in cælo duro fieri ponatur, explicationem difficillimā aut nullam admittent; si in liquido, per se facillima cuilibet occurrunt.

LVNAE SOLEM ECLIPSANTIS INsolita circa margines trepidatio.

Quinto. Huc pertinet lunaris perimetri in solaribus eclipsibus sub Sole positi insolita fluctuatio, & maior vehementiorque quam sit limbi solaris trepidatio, ex quo Astronomi arguunt Atmosphæram lunarem.

Audi quid hac de re insignis Mathematicus scribat ex Eclipsi Barcinone à se obseruata ipso Natalis Domini die, anno elapso 1628. [Deniq. in eadem Eclipsi, ait, obseruavi, rem in Luna Soli supposita admirandam: nimirum peripheria Lunæ fluctuabat & trepidabat plurimū, Solis peripheria vel nihil vel valde parū trepidante, non aliter atque mare fluctibus agitātū & vnda vadā pellente. Vade ego collegi sphaerā Lunæ Atmosphæra quadam non minore & fortasse crassiore circumfusam esse, quam sit terra. Videat quæso R. V. an bene collegerim. Certe non reperio aliam causam, cur semper in eadem Solis altitudine Lunæ peripheria multo magis trepidauerit, quam peripheria Solis, nisi hanc, quod radii solares à vaporibus Lunam ambientibus fuerint intercisi. Vade pro Maculis solaribus, & Cometis maior lux videtur oriri, si vt è terræ Lunæq. globo, ita è reliquorum planetarū globis vapores expirent. Hæc eruditus ille Mathematicus Obseruator exactus, anno 1629. 12. Ian. Romam perscripsit. Cuius acuto discursui quid insit fallaciæ Astronomi nec dū inuenerunt. Refricat mihi huius experientiae enarratio in memoriam, simile quoddam experimentum in Sole ab initio inuenti à me solaris Phænomeni hucusque semper animaduersū & est hoc, quod Sol præter tremorem suum

I.

marginalem, quem tamen non semper spectandum præbet, præter exasperationem frequenter exhibitam, de quibus alibi sæpe; etiam quasi quadam repentina fulguratione toto suo parente hemisphærio quaquaversus ex æquo coruscat, haud aliter ac si intus concepta intumescens luce rumperetur & in fulgetri morem effulgesceret, iubare momentaneo subfultans: de cuius phæcos origine, causa, modoque merito posset aliquis ambigere: Vtrum ex Sole an aliunde prodiret?

Simon Marius. Simon Marius in Mundi Iouialis ad Lectorem præfatione, putat hoc provenire ex interna Solis scintillatione quam ait esse quasi quandam fulminationem siue ebullitionem materiae solaris. [Hac enim, inquit, ratione vidi superficiem Solis commoveri, non aliter ac aurum à summo calore liquefactum, in quo fluxu similis commotio & quasi fulminatio existit in superficie aurum, &c.]

In rebus solaribus considerate procedendum est. Hæc Marius experientiam rectè describens, cui consentit etiam Reuerendus Pater Raphaël Auersa, vti suis dicitur locis; An autem cætera omnia, hinc illata, ita sese, vel secus habeant, partim Astronomis dijudicandum relinquo, partim in aliud tempus sententiam meam exactiori disquisitioni reseruo. Nihil enim temere, nihil præcipitater assertum, sed omnia præmeditata & matura in medium allata vellem. Effectum certum video, causam ipsius liquidam utcumque in obscuro versari haud inuitus agnosco. Hæc per transennam: nunc ad Martem accedamus.

MARS CAELI SOLARIS

Antiquus Incola.

Mars pugnat pro caelo liquido. Sexto. Quod autem Tycho Braheus Martem Cælo Solis inuexit, nec Solus neque more nouo id ex obseruationis suis attentauit. Nam multis ante ipsum sæculis Princeps Astronomorum Ptolomæus, vti postea patebit, (contra quam Mercennus æstu communis torrentis abreptus opinatus est) ex motibus cælestibus à se deprehensis atque definitis, & sphæras planetarum sphæ-

II.

ris commisceri, (Nota hæc bene Lector) & circulos circulis implicari, & axes axibus intercurre, polosque polis occurfare expressissime dixit; quibus tamen euenientibus ab omni sese incommodo solius cælestis corporis mobilitate, atque loco cedendi facilitate, adeoque liquiditate, liberauit. Errones itaque alioquin duos, & sibi mutuo cedere nescios, per auras illas tenuissimas nullo negotio liberrime circumduxit, tametsi vnus alterius circos subinde per transversum interfecaret; ex hoc enim absurdi nil penitus in rerum naturam admitti aiebat: *Materia illa spirabili transitum facillimum cælestibus istis cursoribus præbente.* Vide Solem illustratum, Illustris ac Generosi Domini, Domini Ioannis Nicolai à Smoguleck Smogulecki, qui pro hac doctrinâ citat etiam Copernicum, Keplerum, Sarsium, Rothmannum, aliosque; aitque communem esse apud omnes fere Astronomos sententiam. [Hoc certum est, inquit, si cælum Solis propter Epicyclos Veneris atque Mercurij ponatur maius, vt fieri debet necessario, quemadmodum supra diximus, & infra dicemus, tum non solum iuxta Ptolomæum, sed etiam iuxta Thebitiū, Albategnium & Alphraganum Ptolomæo posteriores, Mars infallibiliter, & quidem profunde ingreditur cælum Solis. Hæc ibidem, &c.]

35 Possset hoc loco afferri difficultas Physica contra cæli duritiam, quam nonnulli suscitant ex contactu mutuo corporum durorum exorta; cum enim duæ quælibet sphæræ cælestes adamantinæ continens & contenta simul habeant superficies suas conuexas; viderur fieri non posse, & ob amplitudinem sphaerarum, & motuum localium contrarietates, multa que alia inconuenientia inde secutura, vt motus diuersi locales contingant. Sed hosce multorum discursus, ex natura contactuum superficialium desumptos in præsentiarum Lectoris arbitrariæ speculationi committo; erit alius fortassis ea excutiendi locus. nunc telam acceptam ex auctoritate aliorum prosequi tempus monet.

I.

PETRVS HVRTADVS A
cælo liquido non
abhorret.

*Petri Hur-
tadi de calo
sententia.*

Petrus Hurtadus de Mendoza Socie-
tatis nostræ, in sua philosophia, quam
anno 1624. reuisam & auctam Lugdu-
ni recudit, Disputatione secun. de Cæ-
lorum proprietatibus, sect. 1. per varios
§. non agnoscit nisi vnicum numero cæ-
lum pro stellis omnibus tã fixis, quam
erraticis, pag. enim 368. §. 9. ita scribit.
[Colligunt Astronomi octo cælos ex
septem Planetis & stellis fixis. Porro
leue esse hoc argumentum ostendo:
quia in eodem cælo possunt esse plures
Planetæ aut errones, siue stellæ ober-
rantes. Nam cum cælum sit latæ pro-
funditatis, possunt in medio corpore
partes assignari diuersæ, vbi sint erro-
nes: & ex varia eorum gyratione per
eas partes, efficiunt varios aspectus,
atque congressus: non minus quam si
essent in cælis diuersis; ergo non sunt
multiplicandi cæli, quia in philosophia
sine necessitate non admittitur rerum
multiplicitas.]

*Vnum sta-
tuit cælum
pro stellis tã
fixis quam
erraticis.*

Omnes autem Astronomicæ demon-
strationes, stant cum paucitate cælo-
rum, dum assignentur diuersæ partes
cursibus Planetarum. Et postea §. 10.
sicut aër à nobis tripartitur in regio-
nem aëream, quæ est nobis vicinior, &
olympicam, quia cacumen tangit O-
lympi; & ætheream, quia est prior
igni, nec tamen propterea tres aëres di-
stinctos adstruimus: idem omnino cæ-
lo contingit.

Et mox §. 11. Nec possunt Astrologi
ostendere nisi octo partes cæli, vnam
infimam, alias ordine suo superiores:
eas autem esse partitas in octo cælos
distinctos non probant, alioquin iam
essent adnumerandi sex alij noui cæli;
(nempe ex sex nouis Planetis &c.) quod
ipse tamen pro absurdo habet. Vnde
spatia illorum nouorum Planetarum
vtrique vel liquida vel caua facit. Dein-
de §. 12. suam de tribus cælis senten-
tiam probat ex SS. Patribus, sic per-
gens.

[Huic nostræ sententiæ adstipulantur
aperte plures Patres, Chrysostomus

II.

1 Homilia 4. in Genesin, his verbis:

Et quomodo dicunt aliqui factos
multos cælos? Non ex diuina scriptura
hoc didicerunt, sed ex suis opinionibus

5 vt ita dicant, impelluntur. Quod ibi-
dem confirmans subdit.

*Quis igitur post tantam doctrinam
ferret eos, qui ex suo capite loqui, &
contra diuinam Scripturam multos cælos
dicere audent.*

Vbi respondet argumentis factis, pro
cælorum multitudine. Et Ambrosius
2. Hexaem. capite 2. & 3. tres tantum
enumerat cælos, quos infra admitte-
mus.

Hos Patres exponit Sanctus Tho-
mas 1. p. Quæstione 68. Articulo 4.
de pluralitate corporum distinctorum
ab his, quæ includuntur in cælestibus
sphæris, ita vt non sit alius Mundus
præter hunc.

Verum Sanctus Thomas præ modestia
hanc explicationem addit, ne aperte vi-
deatur ab his Patribus discedere, in quos
25 talis explicatio nō caret difficultate: tum
quia Ambrosius aperte disputat con-
tra assertores aliorum Mundorum; qua
disputatione absoluta, aliam instituit
de cælorum pluralitate, & distinctione
firmamenti à cælo, quod primum
30 produxit Deus. Et affirmat se non pos-
se negare tres cælos, quia Apostolus
dicit se raptum ad tertium, inter quos
connumerat aërem: ergo non loquitur
35 Ambrosius de alijs Mundis, alioquin
tres Mundos constitueret.

§. 14. Chrysostomus vero non me-
minit alterius mundi, sed corporis cæ-
lestis: distinguit enim cælum à terra
& de cælo disputat, vt de parte mundi
40 distincta. (idque contra eos, etiam
Christianos, qui plures cælos ex suis o-
pinionibus, esse volebant. nemo au-
tem Christianorum volebat plures esse
mundos &c.)

45 Adde Theodor. quæst. 12. in Gene-
sin sic aientem. Qui igitur non credit
secundum esse cælum, semitam rectam
transgreditur, qui vero plures numera-
re conatur, adhæret fabulis, postposita
50 diuini spiritus doctrina &c.

Basilius autem in Hexaem. duos
cælos admittit hom. 1. imo & tres, hoc
autem & tertium in fine homiliæ ait el-
se

I.

se aërem. Nec plures admittit calos. imo irridet eos, qui septem orbes inter se immixtos & inclusos more plurium calorum, aut vasculorum, assignant septem erronibus. Refert enim totam illorum sententiam de numero & musica calorum; eam autem explodit.]

S. 15. probat etiam ex Sancto Clemente, Recog. l. 2. duos tamen esse calos, ita docente Sancto Petro &c.

Tres cali, aëreum syderium, & empyreum.

S. 16. Itaque tres sunt celi ex horum Patrum sensu.

[Primum vocatum aëreum &c. Secundum cælum est stellatum, continens stellas in octaua & suprema parte, quæ ab Astrologis vocatur Firmamentum, seu octaua sphaera vel A-plane, continetque Lunam in vltima superficie concaui, in medio autem cæteros planetas.

Tertium est cælum Empyreum, de quo dicitur Genesis 1. in principio creauit Deus cælum & terram, vt exponunt Pater Martinus del Rio, & Pereira ibidem, & Molina 1. p. de opere sex dierum, de quo cælo agemus disputat. 3.

S. 17. Hos tres calos admittit Ambrosius, sicque Pater Molina exponit Paulum asserentem se raptum vsque ad tertium cælum. Neque in Scriptura aut Patribus inuenitur fundamentum ad plures calos; oportetque Astrologos se subicere Patribus. Quod si aliquando secundum Cælum dicitur plures celi intelligi debent plures partes eiusdem cæli &c.

Ceterum Astronomi Sanctis Patribus & ipsi etiam Hurtado sese libentissime commodabunt, vel ipsius Hurtadi docti atque tracti exemplo. Qui cum exoticam illam de celi duri canalibus opinionem satis euentilasset & vtcunque duriusculam atque ab eruditorum auribus abhorrentem animaduertisset, Sactorum Patrum de cælo cessili adeoque fluido vnanimi doctrine, vna cum Astronomis haud obscure subscipit. Ita enim scribit S. 24.

[Quod si hac minus arrident (sunt etenim aliena à communi Astronomorum opinione, nec nisi soluendi difficultates, & argumenta, caussa, propositui) facile se expediunt Græci Patres, admit-

II.

tentes cali corruptibilitatem, & sectionem planetarum rotatione. at licet findantur, dici etiam potest, eos non esse corruptibiles, vt materia prima est incorruptibilis, quamuis sit diuisibilis. Nec ea sectione corrumpitur vlla pars materia, aut forma calica, sed tantum indiuisibilia continuantia: planeta autem progrediente, continuantur partes calica, vt aqua pratergrediente nani.

Vult ergo Hurtadus cælum posse esse liquidum, neque ideo necessario corruptibile; sed posse manere incorruptibile vti & Bellarminus censuit.

PRO NATURA SOLIS

liquida, doctrina Raphaëlis

Auerfæ.

Reuerendissimus Pater Raphaël Auerfæ à San Seuerino Clericorum Regularium Minim. Generalis edidit Romæ anno 1627. Philosophiæ Tomum Secundum, in quo Quæstione 34. pag. 160. ex Macularum solarium Phænomeno Solē non solidum sed fluidum facit: hac enim ratione & veritati Macularum & indemnitati corporis solaris satis superque consultum iri putat. Cuius marginalia per totam Sectionem nonam de Maculis pronunciata sunt ista.

Primo, Maculæ in Sole deprehensæ, sunt variabiles, irregulares & mobiles.

Secundo, Non sunt ludibria visus aut vitri.

Tertio, non sunt elementares vapores sub cælo.

Quarto, Non sunt elementares vapores in cælo.

Quinto, Non sunt cælestes ipsius Solis vapores.

Sexto, Non sunt partes opacæ inferiorum orbium.

Septimo, Non sunt partes opacæ vel stellæ gyrantes circa Solem.

Octauo, Videntur esse, & moueri in ipso Sole.

Nono, Vel sunt partes opacæ ipsius Solis, vel Opacitates in patribus Solis.

Quod vt melius intelligatur, ita ratiocinatur, pag. 159. & 160.

Ffff 3 T. 11.

I.

Tandem ergo fateri oportebit ; tales Maculas vere & realiter esse in ipso Sole. Atque solem ipsum in se circa proprium centrum peculiarem peragere motum, quo in inferiori suo hemisphaerio defert Maculas ab oriente versus occidentem, spatio quattuordecim dierum.

Quod ulterius confirmari potest : quia cum per eundem tubum, & in eadem imagine Solis excepta in Tabula, inspicitur vehemens scintillatio & velut ebullitio Solis in toto circuitu ; hæc eodem prorsus modo inuenitur in omnibus Maculis, per totum Solis medium dispersis. Hæ ergo Maculæ sunt realiter in ipso sole, & ideo simul cum ipso agitantur ac dimouentur.

Macularum solarium varietas.

At vero hæ maculæ non possunt constitui in Sole tanquam firmæ & perpetuæ affectiones eius ; quia ut iam antea narrauimus, non inueniuntur eadem sæpius reuerti, sed semper variæ ac diuersæ sunt quæ sibi succedunt, ut ex earum figura, & alijs circumstantijs cognoscitur : & eodem ipso tempore quo sub Sole visuntur transcurrere, sensibilibus in figura, & alijs conditionibus variari noscuntur. Omnino ergo hæ Maculæ de nouo in Sole formantur, & aliquid quantum durant, ac deinde euanescent, & aliæ rursus de nouo succedunt.

Quomodo autem hoc fiat, & quæ tandem sit tota harum Macularum ratio : duo modi occurrunt, qui sine præiudicio substantialis incolumitatis celestium corporum cogitari possunt.

Primus est, si dicatur Sol non esse corpus quoddam solidum, sed potius fluidum, in suo loco tanquam in vase contentum, & in se ipso agitari instar metalli feruentis : atque in illo inueniri partes quasdam opacas & obscuras, quæ subinde ad externam Solis faciem deducantur, & rursus postea reducantur, atque cum variatione figuræ & aliarum conditionum redire soleant. Sic bene saluari possent omnes earum apparentiæ antea relatæ : & bene posset exerceri dictus motus Solis in seipso, vel quod per se absolute ipse Sol in proprio loco intelligentiæ motricis virtute voluatur, vel quod intra quendam veluti epicy-

II.

clum inclusus, per reuolutionem ipsius epicycli conuertatur in gyrum circa proprium centrum.

Secundus modus erit si dicatur, vere de nouo virtute caussarum celestium produci opacitatem quandam, lucis impediuitiam, in aliqua particula Solis, & hanc aliquamdiu durare, ac postea deleri, & sic successiuè per tempora renouari, atque contingere cum tota illa varietate & variatione, quæ in his Maculis obseruata est, & Solem in se ipso cum ijs Maculis gyrari, iuxta omnem apparentem illarum motum. Ita hoc totum fieret per solam accidentalem mutationem, salua tota substantia Solis.

Modus secundus, per nouam opacitatis productionem, etc.

Neque enim hæc accidentalis variatio, arguere debet substantialem inno-
uationem, sed sicut fit in cælis mutatio lucis & obscuritatis absque variatione substantiæ, ita intelligi potest hæc mutatio opacitatis. Et neque etiam fieri deberet per variationem, & additionem quantitatis, sed satis erit quædam immutatio in qualitate, ut colligitur ex dictis sect. 2. Quod si demum, neque hi modi satisfaciant, nihil aliud supererit, quam fateri rem ignoratam, esse donec aliquid melius innotescat.]

NOTAE.

35 Ex hac huius Theologi Doctrina satis aperta sunt sequentia.

Primum. Secundum ipsum tam Maculas solares quam Solem ipsum censeri incorruptibilia, &c.

40 Secundum. Solem nihilominus esse substantiæ perspicuæ, lucidæ & liquidæ.

45 Tertium. Solem vel circa suum centrum, vel in peculiari epicyclo conuer-
ti, & Maculas una secum deuehere, spatio quasi menstruo.

Quartum. Maculas in corpore Solis vere inesse, non tamen fixas, sed mobiles eiusdem Solis partes habendas.

50 Quintum. Omnem autem ipsarum varietatem posse defendi vel solo motu locali, qui fiat ipsarum ex profundo Solis emersione & immersione in idem ;
55 vel opacitatis nouæ generatione atque cor-

I.

corruptione, absque vlla solaris substantiæ lésione vel mutatione physica.

Cæterum quamquam auctor hic de Maculis solaribus breui cõpendio multa & præclara dixerit; tamen an omnia veritati & Phænomeno consentanea existant, facile iudicabit qui ROSAM VRSINAM inspexerit. In ea namque Maculas in & cum Sole circa centrum suum ordinariè viginti sex aut septem diebus gyrato circumduci cognoscet: quarum varietatem incredibilem, apparitionem & disparitionem sollènem, non posse defendi ex interno Solis meditullio in superficiem extremam processione sola, & ab hac iterum versus interiora discessu; præter ea quæ in toto opere sponte occurrunt, euincunt etiam sequentia.

Difficultates contra emersionem, & immersionem Macularum.

Primo. Ex eo quod Maculæ Soli innatantes non gyrentur in se ipsis circa centrum proprium, vti fuscæ probauit suo loco, item quod non congregentur è fortuito paruularum cõcursu, pro vt ipse etiam auctor recte probat, tandem quod eadem magnitudine, figura, & situ vix vlla diu compareat, sed semper forma habituque diuerso, vti ex tot annorum septendecim continuis observationibus deprehendi; sequitur omnes Maculas, si pauculas reduces demas, inter se distinctas esse. Vnde vltèrius sequitur, cum à Sole condito semper fuerint & comparuerint aliæ atque aliæ, debere quodammodo esse infinitas, ita vt Sol illas nequaquam nunc caperet. Neque dicas ipsas intra Solem verti, & deinde alio schemate ex situ variato comparere; nam obstat quod macula quælibet ab ortu solaris limbi ad occasum eiusdem progressa, omnem corporis sui situm obseruatori exhibeat; vti demonstraui; cur igitur macula nulla vnquam instar lineæ gracilis in medio Sole, cur non lata ad oras Solis appareret? si quidem ipsa perpetuo rotatu circa suum centrum voluitur, dum circa Solem comseat? cur omnes suam latitudinem semper explicant in medio? cur tenuitatem & gracilitatem ostendunt tantum circa Solis extrema? Responsio accomodata deest. Maculæ igitur si in Sole perennant, tot nunc erunt, vt in Sole præter maculas com-

II.

parere nihil debeat: imo eundem magnitudine excedent.

Secundo. Ratio nulla dabitur, cur ad viciniam Poli solaris Borealis, & Australis Maculæ primariæ nullæ emergant, sed intra Zonam Solis torridam sese tantum contineant.

Tertiò, Macularum prima apparitio, & vltima disparitio, in prioribus explicata, per emersionem, & immersionem non stat. Vti legenti patebit.

Quartò, Sæpe dum Macula augeatur, alicubi finditur, illud emersione, hoc immersione deberet fieri; simul ergo emergeret extra, simul immergeretur intra Solem; quod fieri nequit.

Quintò, Sæpe aliqua Macula dum augefcit, intra se in Faculam alicubi exardescit; hæc cum emersione & immersione non stant.

Sextò, Maculæ, æquabiles, admodum tenues, augefcunt, & decrefcunt sensim per circuitum, quæ fieri nequeunt emersione, & demersione, nam propter subtilitatem simul totæ mergentur, &c.

Septimò, Maculæ nucleos acquirunt postquam creuerunt, amittunt antequam intereant; quæ emersione, & emersione fieri non possunt.

Octauò, Multæ Maculæ nucleosæ dum sunt in statu, id est, dum neque crescunt, neque decrefcunt sensibilibiter, nucleos tamen intra positos, & figura & nigrore mirifice alterant; id quod adscribi nequit vllò modo immersioni, vel emersioni: Ponitur enim Macula in statu.

Nonò, Pleræque Maculæ in Faculas degenerant; & maximæ sæpe Maculæ vel nullas, vel paruas, minimæ Maximas Faculas post se relinquunt. Hæc cum emersione non stant.

Decimò, Maculæ secundariæ, quibus Sol totus fere semper scatet, hisce emersionibus defendi nequeunt.

Vndecimò, Faculæ solares tam puræ, quam impuræ, per hosce emergendi & demergendi modos, satis explicari & defendi nequaquam possunt. Vti consideranti patebit.

Duodecimò, Ista emersio, & demersio motum Phænomeni solaris regularem funditus euertit, vti consideranti

I.

ranti palam fit; Dum enim emergunt extra Solem Maculae, dum in statu versantur in superficie extrema eiusdem, & rursus quando demerguntur, intra eundem & cum eodem voluuntur, hæc autem motum irregularem exhibent, quod Phænomeno repugnat.

Decimotertiò, Maculae reduces hanc emerfionem, & demerfionem clarè euertunt. Semper enim in Solis superficie manent.

Decimoquartò, Huius tandem emerfionis & demerfionis Macularum solarium cogitatio, tametsi inter elucubrandū sæpe animo occurreret meo, mentionem tamen nullam feci, quia nunquam futurum putabam, ut opinatio per se tam absurda vel patronum, vel assertorem inueniret. Non equidem me latebat, non deesse, qui putent Maculas solares esse quasdam in Sole prominentias & veluti montes; sed cum hæc ex anticipata mentis affectione, Phænomenique solaris ignoratione procedant, neglexi; præsertim cum modi tam huius quam illius fundamentum ex ipso Phænomeno aut indicium vel leuissimum nullum penitus reppererim: fingere autem ex solo arbitratu, & aliquid ita esse affirmare, quia ita esse mihi possum imaginari, non videtur in re præsertim tam ardua, philosophicum: alioquin & sic argumentabuntur Astronomi: ista Macula-

II.

rum emerfio, & immerfio potest non esse; igitur non est. Potest ipsius contrarium esse; igitur contrarium ipsius in Sole est. Si non valet hæc argumentandi ratio, neque illa: cum eadem sit vtroque. Astronomi synceri est Phænomenon sequi non anteuertere: veritatem ex obiecto accuratè obseruato, non obiectum inuitum ad arbitraria figmenta trahere.

Strinxi ista breuiter, quia cum Viris prudentibus ago: si vero oportebit vnumquodque singillatim ostendam.

De opacitate Macularum tam vera, quam apparente, satis disputauim in prioribus, quæ videri possunt.

Quid autè Apelles de Maculis senserit, & quod eas neque extra Solem, neque in censum stellarum vnquam collocauerit, declaratum est Lib. I.

Quod insuper dictus Auctor Protogenem Venetum in Macularum inuentione Apelli supparem aut etiam priorem videtur facere; fateor me, præter ea manuscripta quorum Apelles in Epistola anno 1612. die 25. Iulij data, meminit, à Protogene nihil typis editum vidisse, illa autem erant ad Velsorum missa, post & super primam Apellis Tabulam editam inuenta; si vero Raphael antiquiora scit, miror à Venetis de homine Veneto tantas res ignoratas esse. Sed suspicor potius errare hunc Scriptorem.



PRO CAELO LIQVIDO

Antiquorum Philosophorum

Auctoritates.

CAP. XXVIII.

I.



AD Philosophos antiquos quod attinet, omnium, ut saepe dixi, ea concors sententia fuit, caelum ex aliquo elementorum constare, adeoque ex aëre aut igne, &c. id quod

ipse Aristoteles testatur, lib. 2. de Caelo, text. 56. ubi ait: [Quid si ferrentur corpora horum, (siderum) siue in aëris multitudinem fusa per vniuersum, siue ignis, quemadmodum omnes dicunt, &c.] En, ut Aristoteles ipse fateatur, omnes alios caelum liquidum facere. Adstipulatur Cicero libro secundo de Natura Deorum. Vbi ait, Totum mundum à Deo creatum ex nihilo, & constare quatuor elementis, quorum ignis sit summum, ex quo caelum & aether, in quo astra ignea sint animalia.

[Atque hac, inquit, Mundi diuinitate perspecta, tribuenda est sideribus eadem diuinitas: quæ ex nobilissima purissimaque ætheris parte gignuntur, neque vlla præterea sunt admixta natura, totaque sunt calida atque perlucida, ut ea quoque rectissime & animantia esse, & sentire atque intelligere dicantur. Atque ea quidem tota etiam ignea duorum sensuum testimonio confirmari Cleanthes putat, tactus & oculorum. Nam, Solis candor illustrior est, quam vllus ignis, quippe qui immenso Mundo tam longe lateque colluceat: & is eius tactus est, non ut tepesciat solum, sed etiam saepe comburat, quorum neutrum faceret, nisi esset igneus, &c. deinde ait ali ab Oceani humoribus, &c.] & post ait, [reliqua astra oriri in ardore celesti, qui aether, vel caelum nominetur. Et mox: Absurdum esse Aristoteli videretur, in ea parte, quæ sit ad gignenda

II.

1 animalia aptissima, animal gigni nullum Cicero Aristoteles putare. Sidera autem æthereum locum obtinent: qui quoniam tenuissimus est, & se citat. semper agitur, & viget, necesse est, quod animal in eo gignatur, idem quoque sensu acerrimo, & mobilitate celerissima esse. Quare cum in æthere astra gignantur, consentaneum est, in ijs sensum inesse intelligentiam. Idem multo post.

15 Nec vero stellæ eæ, quæ inerrantes vocantur, non significant eandem mentem atque prudentiam: quarum est quotidiana conueniens constantque conuersio: Nec habent æthereos cursus, neque calo inherentes, ut plerique dicunt. Tempore physicae rationis ignari. Non est enim Ciceron. caelum liquidum à doctis est habitum, ab ignaris rerum physicarum durum. Habent igitur suam sphaeram stellæ inerrantes ab æthere conuersione secretam & liberam. Earum autem perennes

25 cursus atque perpetui, cum admirabili incredibilique constantia, declarant in his vim & mentem esse diuinam &c. Et post. Luna omnium vltima est, in terrisque versatur. Idem multo post. Et cum quattuor sint genera corporum, vicissitudine eorum, Mundi continuata natura est. Nam ex terra aqua, ex aqua oritur aër, ex aëre aether: deinde retrorsum, vicissim ex æthere aër, ex 35 aëre aqua, ex aqua terra infima. Sic naturis his, ex quibus omnia constant, sursum deorsum, vltrocitroque commean- tibus, mundi partium coniunctio continetur. hæc ibi.

40 Idem in Som. Scipionis, ex lib. 6. de Republ. Hisque animus datus est, ex illis sempiternis ignibus, quæ sidera &

Totum Vniuersum ex quattuor Elementis constat.

Prisci Philosophi &c.

Aristotelis pro antiquis Philosophis testimonium.

Cicero.

Cleanthes.

I.

& stellas vocatis, quæ globosæ & rotundæ, diuinis animarum mentibus, circulos suos orbesque conficiunt celeritate mirabili.] Ibidem agnouisse videtur Venerem & Mercurium circa Solem. volui, vocat enim ambos Solis comites.

Idem de Vniuersitate, ait, totum constare ex terra, aqua, aëre, igne, quem claudit extremo cælo, intra quod astra ponit.

[Has igitur ob causas, inquit, nata astra sunt, quæ per cælum penetrantia, solstitiali se & brumali reuocatione conuerterent, &c.] Hæc Cicero pauca ex innumeris.

PRO CAELO LIQVIDO

Auctoritates ex Seneca.

Apud Senecam Naturalium quæstionum libro septimo, cap. 12. 13. 14. 15. Quidam antiquorum dixerunt Cometas generari ex errantium stellarum mutuis congressionibus, & ut hoc amplius persuaderent, aiebant non has tantum quinque stellas in æthere discurrere, sed innumerabiles ferri per occultum, & tunc quando se altera alteri applicat, intervallum quod inter illas est, illustrari, inflammarique, & sic longum ignem effici. Omnes isti, una cum Seneca cælum in quo erronei isti vagarentur, fluidum supponunt. Contra quos varie nihilominus Seneca disputat cap. 15.

[Post mortem, inquit, Demetrii Syriæ Regis, cuius Demetrius & Antiochus liberi fuere, paullo ante Achaicum bellum *Cometes effulsit non minor Sole*. Primo igneus ac rubicundus orbis fuit, clarumque lumen emittens, quanto vinceret noctem. Deinde paulatim magnitudo eius districta est, & evanuit claritas. Nouissime autem totus intercidit.

Quot ergo coire stellas oportet, ut tantum corpus efficiant? Mille in vnum licet congreges, nunquam hunc habitum Solis æquabunt. Artalo regnante, initio Cometes apparuit modicus. Deinde sustulit se, diffuditque & usque in æquinoctialem circulum venit, ita ut illam plagam cæli, cui Lactea nomen est, in immensum extentus æquarer.

II.

1 Quot ergo conuenisse debent erraticæ, ut tam longum cæli tractum occuparent igne continuo?]

Ex his & alijs ibidem fuisse disputatis, manifestum est, cæli substantiam liquidam supponi, &c.

Tametsi Artemidorus supremam eius oram duram esse voluerit, quem tamen ita explodit Seneca, ut ne responso quidem dignum iudicet. [Hoc ex his, (inquit cap. 13.) quæ mentitur (de Cometis nimirum) læuissimum est: *Tota eius narratio mundi, mendacium impudens est*. Nam si illi credimus, summa cæli ora solidissima est, in modum tecti durata, & alti crassique corporis, quod atomi congestæ coaceruatæque fecerunt. Huic proxima superficies est ignea, ita compacta, ut solui vitarique non possit.

20 Habet tamen spiramenta quædam, & quasi fenestras, per quas ex parte exteriori mundi influant ignes, non tam magni, ut interiora conturbent. Rursus ex Mundo in exteriora labuntur. Itaque hæc quæ præter consuetudinem apparent, induxerunt ex illa utraque mundi iacente materia. *Soluere ista, quid aliud est, quam manum exercere, & in ventum iactare brachia?*]

30 Deinde tamen ex instituto duritiem cæli oppugnat per totum fere caput 14. Pro cælo autem liquido suam sententiam passim declarat, toto Naturalium Quæstionum volumine. Ipse enim vniuersum hoc componit ex terra, aqua, aëre, & igne puro siue æthere. in quo tanquam cælo stellas locat. Audi ipsam lib. 1. cap. 2.

40 [In vicinia autem, inquit, Solis, & stellarum nihil tale potest fieri (loquitur de area circa Solem) quia illic æther tenuis est.

Libro secundo cap. 4. Aër autem, ut dicebam, & cælo & terris cohæret. Eodem libro, cap. 10. Summa pars eius, est siccissima calidissimaque, & ob hoc etiam tenuissima, propter viciniam æternorum ignium, & illos tot motus siderum, assiduamque cæli circumactum, &c. Nam superiora eius calorem vicinorum siderum sentiunt. Eodem libro cap. 13. Huic simile nihil accidit in igne purissimo, in quo nihil est quod deprimatur. & post. Ordo rerum est, & expurga-

Cometa visa lactea æquales.

I.

*tus ignis in custodia mundi, summas for-
piter oras, operas pulcherrimè circumit:
hinc discedere non potest, sed ne ab ex-
terno quidem exprimi: quia in æthere
nulli incerto corpori locus est. Eadem
confirmat libro sexto, capite 16. Totum
hoc calum, inquit, quod igneus æther,*

*Calum siue
æther, Sol
& sydera
ex halitu
terreno nu-
triantur.*

*Mundi summa pars claudit, omnes hæ
stellæ, quarum iniri non potest nume-
rus, omnis hic cælestium cætus, & ut
alia præteream, hic tam propè à nobis
agens cursum Sol, omni terrarum ambi-
tu non semel maior, alimentum ex ter-
reno trahunt, & inter se partiuntur, nec
ullo alio scilicet quam halitu terrarum
sustinentur. Hoc illis alimentum, hic
pastus est.*

Eadem cap. 2. lib. 2. etiam inculcat.
Hinc (id est à terra) profertur quo susti-
neantur tot sidera, tam exercitata, tam
auida, per diem noctemque, ut in ope-
re, ita & in pastu. Et omnium quidem
rerum natura, quantum in nutrimentū
sui satis sit, apprehendit. Mundus au-
tem, quantum in æternum desiderabat,

*Cometas in
cælo ponit.*

inuasit. Idem libro septimo cap. 8. Cometas
autem, inquit, immixtos stellis vide-
mus per superiora labentes.

*Obiectione
refutat.*

Non enim existimo, ait cap. 22. Co-
metem subitaneum ignem, sed inter æ-
terna opera naturæ. Et cap. 23. Come-
tes, inquit, habet suam sedem: & ideo
non cito expellitur, sed emeritur spa-
tium suum: nec extinguitur sed excedit.
Si erratica, inquit, stella esset, in signi-
fero esset. Quis vnum stellis limitem
ponit? Quis in angustum diuina com-
pellit? Nempe hæc ipsa sydera, quæ sola
moueri credis, alios & alios circulos
habent. Quare ergo non aliqua sint, quæ
in proprium iter, & ab istis remotum
secesserint? Quid est quare in aliqua
parte calum peruium non sit.

*Calum ubi-
que peruiū.*

Et cap. 24. Vide ne hoc magis de-
ceat magnitudinem Mundi, ut in multa
itineria diuisus sit: nec hanc vnam dete-
rat semitam, cæteris partibus torpeat.
Erit, inquit, cap. 26. qui demonstret ali-
quando, in quibus Cometae partibus er-
rent, cur tam seducti à cæteris eant,
quanti, qualesque sint. Contenti sumus
inuentis: aliquid veritati & posteris con-
ferant.] Hactenus Seneca: ex quo cæ-

*Posteritati
multa inue-
nienda de-
ferri.*

II.

lum liquidum indubitanter agnoscas.
Primo, Quia assertam ipsius ab Ar-
temidoro duritiam aperte oppugnat,
imo irridet.

5 Secundo, Quia supremam vniuersi
oram facit ignem purissimum, quem
æthera calumque vocat.

Tertio, Quia hunc immediate aëri
subiecto copulat.

10 Quarto, Quia & calum & sydera
ex halitu terræ per aërem delato alit.

Quinto, Quia in cælo Cometas loco
& tempore quouis vagantes, quan-
quam non semper apparentes ponit, il-
ludque illorum itineribus ubique per-
uium & consequenter liquidum facit.

15 Hinc autem, id quod aliàs sæpe mo-
nui, facile intelligi datur, antiquos
scriptores, ætheris vocabulo, plerum-
que substantiam aliquam cæli tenuem
& fluidam significasse.

Præterea si dicunt planetas simplici-
ter in cælo moueri, stellas autem ferri;
tantundem esse, atque hæc quidem
fixas circumferri, illos vero pro se libe-
ros meare. id quod ad veritatem & sin-
ceram Scriptorum intelligentiam plu-
rimum facit, & obseruari summe ne-
cessarium est.

30 PLINIUS Naturalium Histor. lib. 2.
cap. 5. [Nec de elementis video dubitari,
quattuor ea esse; ignium summum, inde
tot stellarum collucentium illos oculos.
Proximum Spiritus, quem Græci nostri-
que eodem vocabulo aëra appellant. Idem
cap. 6. Inter hanc (terram) calumque
eodem spiritu pendent, certis discreta spa-
tiis, septem sydera, quæ ab incessu voca-
mus errantia.]

Plinius

40 Omitto nunc Plutarchum de placitis
philosophorum, alios apud Diogenem
Laërtium, Dionem, Cedrenum, alios
que multos; hoc vnum, & Paradoxi
instar, multi afferunt & asserunt do-
ctrinam istam, quæ supposito Phæno-
meno assertur, Aristoteli non repugna-
re, & eam doctrinam, quæ nunc ut Ari-
stotelica de Cæli incorruptibilitate ad
rauum usque defenditur, non esse Ari-
stotelicam, nisi nomine tenus: quæ non
tam probant quam ex Aristotele ipso
transcribunt.

Alij Scri-
ptores Na-
turales, &
philosophici

I.

MENS ET DOCTRINA ARISTOTELIS de Caeli corruptibilitate vel contra.

Mēs & textus Arist. de caelo corruptibile & incorruptibile

Aristoteles lib. primo de caelo, t. 113. [Corruptibile autem, inquit, & incorruptibile similiter. Aut enim quod prius aliquid est, posterius autem non est, aut contingit non esse, corruptibile esse dicimus, siue corruptionem subiens aliquando, & mutationem, siue non. Est autem quando & quod per corruptionem contingit non esse, corruptibile esse dicimus; & adhuc aliter, quod facile corrumpitur, quod dixerit aliquis facile corruptibile.

Eodem t. 114. Et de incorruptibili eadem ratio. Aut enim quod sine corruptione quandoque quidem est, quandoque autem non est, ut tactus ipsos, quia cum prius sine corruptione sint, posterius non sunt. Aut existens quidem, possibile autem non esse; aut etiam non futurum aliquando, nunc autem existens: tu enim es & tactus nunc, sed tamen corruptibiles: quia erit aliquando, quando neque te verum erit dicere, neque hanc tangere. *Maxime autem proprie quod quidem est, sed impossibile est corruptum esse sic, ut nunc existens, posterius non sit, aut contingat non esse.* Aut & id, quod nondum corruptum est, contingit autem posterius non esse. Dicitur autem incorruptibile, & quod non facile corrumpitur.

Eodem text. 121. *Impossibile est ergo, & semper quidem aliquid esse, atque corruptibile esse. similiter autem neque generabile: duorum enim terminorum si impossibile sit posteriorem sine priorē existere: si hunc impossibile existere & posteriorem. Quare si quod semper est, non contingit aliquando non esse, impossibile est & generabile esse.*

Eodem text. 125. *Ingenerabile & incorruptibile conuertuntur.*

Eodem text. 133. Manifestum est autem & aliter, quod impossibile sit, quod corruptibile est, non corrumpi aliquando &c.

Eodem text. 134. *Est autem & sic considerare, quod impossibile est, aut factum aliquando quidpiam incorruptibile*

II.

1 *perdurare, aut quod ingenerabile est, & semper prius existens, corrumpi.*

Idem Lib. 2. de caelo, tex. 1. &c. Subsumit ad istas factas generales propositiones, & ait, Caelum nec generabile nec corruptibile esse. Deinde saepe alibi motum caeli necessario & ab aeterno, neque unquam cessaturum dicit.

Prout videre est, toto capite 10 lib. 1. de caelo, ex quo aliquot exscribere textus Lectori non ingraturum fore arbitror. Textu igitur 102. ita scribit. [Genitum igitur esse Mundum, sempiternum tamen esse dicere, impossibile est. Et

15 textu toto 103. hisce consimilia referuntur. Textu 104. Auxilium autem, quod quidam eorum conantur asserere sibi ipsis, qui dicunt incorruptibilem quidem esse, sed factum, non est verum.

20 Et textu 106. Quod igitur sit impossibile simul sempiternum esse ipsum, & factum esse, manifestum est.] Consentanea asserit textu 109. imo hoc toto capite aliud nihil conatur asserere Philo-

25 sophus, quam mundi incorruptibilitatem stare non posse, cum eiusdem productione temporali: quae ad finem libri primi usque, instantissime urget: ad quorum lectionem veritatis studiosum etiam atque etiam hortor.

30 Hinc sequitur primo. Si Aristoteles supposita fide in Deum, caelum credidisset factum à Deo in tempore; secundum suam doctrinam dixisset simpliciter illud esse corruptibile, & aliquando corrumpendum.

35 Secundo. Si cognouisset Phaenomenon Solis, utique incorruptibile non fecisset. Unde,

40 Tertiò. Qui & sacra Scriptura, & fide Christiana, & tot tantisque Phaenomenis suppositis, nihilominus caeli incorruptibilitatem sartam tectam voluit, idque ex mente & in gratiam Aristotelis, ab Aristotele & à vero tantum aberrant, quantum aeternum à temporario distat.

45 Nam evidens est, Aristotelem caelo incorruptibilitatem aeternam & necessariam, simpliciter indestructibilem principio siueque carentem attribuisse, qualem nulli creato concedit, &c. Sed haec obiter: qui legerit Aristotelem videt me vera loqui: in cuius confirmatio-

Secundū doctrinā Aristotelis, supposita Mundi creati fide, caelum fuisset simpliciter corruptibile

I.

mationem maiorem laudo ipsos tam Aristotelis quam Peripateticorum fautores & patronos primarios, paucos è multis.

FRANCISCVS Suarez lib. 1. de Vniuerso, seu de Opere sex dierum, cap. 1. nu. 2. pag. 3. & 4. [Multi, inquit, putant Aristotelem consequenter sensisse, Mundum non fuisse factum, vel productum ab alio, sed ex se sempiternum esse habuisse. Alij vero credunt, eum non ignorasse dependentiam æternam totius Vniuersi ab Auctore Deo, tanquam à principio, à quo veluti per naturalem emanationem proflexerit. Et postea, p. 4 num. 3.

Principium illud, ex nihilo nihil sit cum vera creatione siue liberè & in tempore facta, siue æterna per quandam naturalem emanationem cogitata, subsistere non potest. Illo vero admissio, fortasse dici posset (Aristotelem) vel dubitando & problematicè disputando dixisse, posse principium illud negari, vel certe negasse illud quoad emanationem naturalem, etiam si in cæteris proprijs actionibus illud admiserit: quod qua consuetudine possit dici, vel qua ratione subsistere possit, non video.]

GABRIEL Vasquez tom. 1. q. 19. Disput. 81. cap. 1. num. 3. pag. 493. ita scribit.

[Cum Aristoteles lib. 1. de celo, & 8. Physicorum censeat Mundum fuisse æternum, nec potuisse in tempore incipere: videtur abtulisse de medio actionem primæ causæ omnino, aut actionem per intellectum & voluntatem ita vt, vel totum vniuersum quoad partes perpetuas à se ipso fuerit, vel si à Deo, non voluntate sed necessitate nature processerit: nam si per voluntatem Dei esset putaret Aristoteles, facile videret potuisse incipere in tempore, & non fuisse necessario ab æterno. Mibi admodum probabile sit cum Greg. Arim. in 2. distinctione 1. questione prima, articulo primo. Aristotelem plane sensisse, cali intelligentias & elementa, & quæcunque ab æterno esse dixit, non esse à Deo facta; putauit enim Aristoteles, Ex nihilo nihil fieri, 2. Physicorum text. 33. quare text. 62. inde probat necessarium esse subiectum, ex quo aliquid fiat, & ideo mai-

II.

teriam esse ingentiam. Lege Gregorium Arim.]

PETRVS Hurtadus de Mendoza de Opere sex dierum, Disputat. tertia, sect. prima. §. 2. pag. 376. ita ait.

[Aristoteles de Deo & Mundi creatione errauit turpiter; in physicis enim ostendit causam primam ex repugnantia infinitudinis causarum successuarum; at vero in libro de Cælo, & Mundo arbitratus est Mundum ab æterno fuisse, cum successione motuum.] & paullo post.

[Quod vero Aristoteles asseruit, celum non fuisse factum, est tam celebris insania, vt non egeat confutatione: ac multo minus, quod dixit Deum fatali necessitate ita mouere celum, vt non possit à motu cessare.]

Pererius libro quinto, capite septimo ait [Aristoteli nunquam venisse in mentem, vt existimaret creationem ex nihilo esse possibilem: quinimo nihil reperiri posse magis contrarium eius doctrinæ, quam creationem: quia Aristoteles vbique supponit, Ex nihilo, nihil fieri. Atque expresse 2. Metaphysic. text. 4. ait: Principia eorum quæ semper sunt, nullam habere causam, &c. Dumque voluit Mundum fuisse ab æterno, perinde voluisse videtur, ac Mundum necessario & à se ipso fuisse; simul enim ait, Mundum esse ingenerabilem, esse ingentum.] hæc ex Pererio summam Raphaël, tomo secundo, questione 31. sect. 6. pag. 18. Benedictus autem Pererius ista fusius persequitur loco citato de Communibus rerum naturalium principijs, libro 15. Romæ anno 1579. editis, cum Priuilegio Gregorij XIII. Igitur idem Pererius loco citato. [Quid, inquit, ratio illa, qua in 1. lib. de Cælo (Arist.) confutat sententiam Platonis, qui fecit cælum ab aliquo principio natum, sed nunquam interiturum, Omne, inquit, quod incipit esse, aliquando desinet esse, nam quod tale est, factum est ex materia, quare corruptibile; quod autem corruptibile est, aliquando corrumpetur: hæc inquam ratio quam vim habet, admissa creatione nullam sane.] Ita Pererius.

Hæc porro Aristotelica principia, & Mundi æternitatem ita intellectam,

Pet. Hurti
de Aristot.
erroribus
circa Mundi
creationem

Obiectioni
satisfit,

Gggg

ex

Franciscus
Suarez, de
Aristotele
circa Mundi
conditionem.

Gabriel Vasquez, de
Aristotelis
doctrina circa
Mundi
creationem.

Elementa
& quæ ab
æterno esse
sentit Aristoteles,
& à Deo non
pendent, secundum
Aristotelem, &c.

I.

ex eo redarguunt aliqui, quod alioquin animæ humanæ mortalitas sequeretur, id quod tanto Philosopho affingendum non est.

Ad quam obiectionem Pererius lib. 12. cap. 19. pag. 338. ita respondet.

[Diuus Thomas, qui opinatur etiam secundum Aristotelem, intellectum hominis esse immortalem, & vnum in vnoquoque hominum, vehementer hæret in solutione huius difficultatis.] & post. [Quamobrem multi ausi sunt dicere, Aristotelem sibi contradixisse, in duobus decretis suis. Nam facere intellectum hominis immortalem, vnumque in singulis hominibus, & rursus statuere Mundum æternum, non coherere inter se, sicut linum cum lino, ut est in proverbio: sed quia hæc quæstio pertinet ad libros de anima, præmittatur hoc loco. *hoc tantum in præsentia dici potest, prædicto argumento cogi quemlibet Peripateticum confiteri unum aliquod horum trium; vel Aristotelem non sensisse animos nostros & esse immortales, & sigillatim multiplicari secundum multiplicationem hominum; vel non existimasse absurdum, esse infinitam aliquam multitudinem rerum materia moleque carentium, nec ullum locum occupantium; vel denique ipsum sibi imprudenter inscienterque contradixisse.* Quod autem horum de Aristotele sentiendum & pronūciandum sit, non est huius loci decernere.] hucusque Pererius.

Raphaël Auerfa eadem cum Pererio scribit. Has easdem difficultates in omnem partem nouissime versat, sæpe laudatus Pater Raphaël Auerfa, tom. Philos. 2. quæstione 57. sectione quinta, qui cum varios & suos & aliorum dicendi modos in medium protulisset, tandem in fine pagina 787. columna prima, ita concludit. [Verum non solum ex immortalitate animæ nostræ, sed in vniuersum ex successione rerum per totam Mundi eternitatem in sententia Aristotelis, oritur hæc difficultas, quomodo posuerit Mundum ab æterno, & negauerit infinitum: nam perinde se habet multitudo rerum, siue simul existentium, siue successiue transeuntium. Ideo circa ipsum infinitum quæst. 24. sectione tertia, varios dicendi modos, vel ad

II.

1 reprehensionem, vel ad excusationem Aristotelis recitauimus.

Et sane quidquid aliud erit tolerabilius, quam tam execrandum errorem de mortalitate animæ tanto Philosopho attribueret. Minorisque iniuriæ erit, si dicatur non coherentem philosophatum esse, ponendo eternitatem Mundi, & negando infinitatem rerum; aut ignorasse. Aristoteles circa Mundi eternitatem non coherentem philosophatus est.

10 se qualiter ad hæc satisfaceret, & ideo hanc difficultatem dissimulasse: aut permissurum potius fuisse repetitionem earundem rerum & transmigrationem animarum: aut excessisse in denegando infinito, dum vniuersaliter in omnibus rebus, & omnem multitudinem infinitam impugnasse videbatur: dummodo immortalitas nostræ animæ in sententia ipsius Aristoteles teneatur.]
20 Hactenus iste magnus Aristotelis propugnator.

Vnde Astronomi gratis exagitantur, & quasi nouorum dogmatum Architecti sugillantur, si supposita Fide Christiana, cælum firmamenti ex alia materia à Deo in tempore factum, natura sua cum sanctis Patribus ex eloquio diuino corruptibile statuant, atque hanc suam doctrinam Aristotelis insuper auctoritate comprobent. Aristoteles enim, dato cælum in tempore incepisse, statim contra Platonem intulit, ut paulo ante ex Pererio audiuius, aliquando etiam & naturaliter quidem desituru.
35 Et hanc esse Aristotelis seriam & genuinam philosophiam, ex citatis grauissimis auctoribus Peripateticis, satis ostensum est, & ex alijs quamplurimis demonstrari posset.

40 Non est igitur quod vllus Mathematicis succenseat, si cælum in tempore factum, corruptibile agnoscant, cum hæc ipsius sit Aristotelis consequentia, ex hypothesi, *Cæli in tempore & non ab æterno producti*: & data hac hypothesi, contraria cæli natura incorruptibilis, ab Aristotele prorsus aliena est.

Disputant etiam multi multa de Cælorum & siderum animatione ex mente Aristotelis, & inde cæli corruptibilitatem & liquiditatem conatur inferre; quæ quantam vim aut veritatem habeat, ego nunc nolo prosequi, erit fortasse alius

I.

alius hæc examinandi locus. Hoc certissimum est, liquiditatem corporum, incorruptibilitati penitus nihil officere. Nam corpora Beatorum & sanguinem suum minime corruptibilem possidebunt. & interiora pectoris, pulmonum, stomachi, viscerum &c. non vacua utique, sed corpore quodam cælesti spiritoso non caduco sed eterno replebuntur; & ipsum cælum Empyreum, secundum Diuum Thomam, & communem Theologorum, totamque Sanctorum Patrum doctrinam subtilissimo sed incorruptibili spiritu constabit. Eodem modo, etiam si stellæ in cælo liquido per se mouerentur, & cæli partes finderent uti aues aërem & pisces aquam, [illa tamen scissio & diuisio, (ait Pater Raphaël, q. 32. sect. 6. p. 68.) per partes,

Ex Raphaëlis Auerse sententia liquiditas non præiudicaret & eius incorruptibilitati obstat immutabilitati &c.

Et Sol & omnes Firmamenti stellæ sunt secundum ipsum liquidæ.

si cælum esset fluidum, nihil de reliquo præiudicaret & eius incorruptibilitati & immutabilitati.] Imo idem auctor non tantum Solem liquidum & nihilominus incorruptibilem vult esse, ut antea visum; sed id ipsum omnibus & singulis stellis inerrantibus attribuit q. 34. sect. 3. p. 135. vbi de scintillatione ipsarum sic discurret. [Sed quid tandem, si quis dicat, stellæ ita re vera agitari & fluctuare in se ipsis, sicut visu ipso apparet & nempe dicendo, illas non esse solida corpora, sed fluida intra suum locum, velut in vase contenta, & sic per motum ipsum velocissimum cæli taliter fluitare. Et præsertim Solem ipsum hoc pacto se habere, & ita tam patenter omni tempore & loco præsertim Telescopio cerni veluti ebullire: cum nihil tale ne leuiter quidem conspiciatur in Luna, quæ tamen videtur à nobis per eundem utique aërem intermedium. Et hoc præterea non parum conferret ad saluandas apparentias de Maculis Solis, de quibus postea in speciali loquemur. Hoc totum inquam, posset aliquis cogitare. Et fortasse non ita facile posset refelli, sicut illa positio, quæ faciebat cælum ipsum fluidum.]

Ita Raphaël Auerse, qui licet hanc cæli liquidi sententiam absolute non sequatur, penitus tamen non rejicit, sed saltem ut probabilem videtur admittere.

Porro ex Aristotele talia proferuntur

II.

1 loca, quæ sine omni cælestium corporum liquiditate difficilem explicationem admittunt, audiantur aliqua.

Aristotelis loca in liquiditatis fauore adducta.

[Eorum autem, inquit libro secundo de Cælo, text. 42. quæ sursum sunt vnumquodque in sphaera fertur, ut ipsa quidem non igniantur, aërem autem, cum sub corporis circulariter moti sphaera existat, necesse est, cum illa fertur, incallescere, & hac maxime, qua Sol extat infixus, hæc Aristoteles, quibus affinia affert in lib. 1. Meteor. cap. 3. vbi sic ait.

Sed quam ob causam oriatur calor, cum corpora illa cælestia haudquaquam eiusmodi suapte natura sint, dicendum nunc quoque. Videmus itaque motum posse aërem segregare atque incendere in tantum, ut sæpius & quæ motu ciantur liquefieri videantur. Ut igitur tepor gignatur atque calor, Solis latitudo taxat satis est efficere. Nam & celerem esse lationem, nec longius abesse oportet. Stellarum itaq. latio celeris est, sed abiuncta procul: Lunæ vero deorsum quidem est, pigra tamen. at solari lationi utraque hæc abunde competunt. Porro calorem vna cum ipso Sole potissimum gigni, consentaneum est rationi, sumpta ab hisce quæ hic fiunt similitudine. Etenim cum quædam hic vi feruntur, vicinus aër maxime calidus effici solet: id quod haud sine ratione contingit. Nam solidæ rei motio aërem in primis segregare potest. Igitur tam hæc ob causam caloris feruor ad hunc pertingere locum assolet: tum quod ignis aërem complexus, motionis ratione crebriter segregetur dissipeturque atque vi deorsum feratur.]

Ex hisce Aristotelis locis arbitrantur auctores cæli liquiditatem satis eliquidari posse. Inter quos sic doctissimus quidam Scholasticus commetatur. [Cū Aristoteles lib. 1. Meteor. quæsisset, quare nam Sol potius calorem gigneret, quam vel Luna vel stellæ quæ fixæ dicuntur? Respondet oportere corpus quod mouetur vel calorem gignat esse proximum & celeriter moueri. Stellæ quidem fixas celerrimas esse, sed remotissimas à terra; Lunam vero proximam, sed tardissimam.

Soli autem hæc duo inesse, ut & propior sit & celerior; atque hanc esse causam

G g g g 2 sam

Raphaël in cæli liquidi naturam vehementer inclinatur.

I.

fam, cur calor cum ipso corpore Solis moueatur. Qui ergo voluerit cælorum duritiem Aristotelicam esse arbitrari, conetur huic loco satisfacere. ego sane quid respondeam non inuenio.

Idem Aristoteles libro primo de Cælo capite octauo, textu 96. [Rursus autem, inquit, alio modo (dicitur cælum) corpus continuum (τὸ συνεχὲς σῶμα) extrema circumlacioni, in quo Luna, & Sol, & quædam astrorum sunt. etenim hæc in cælo esse dicimus.]

Deinde libro primo Meteor. cap. 4. [Ignis enim, ait, cum eo quod sursum est elemento, cum igne autem aër continuus est.] Hisce similia habet Philosophus frequenter. Libro de Mundo, inquit; Cæli porro siderumque substantiam, appellamus ætherem: vbi multa in hanc rem dicuntur; ita sane, vt ex Aristotele pro rigida cæli duritie nihil omnino solidi reperiatur, cuius neque verbo quidem expresse meminit: pro liquido autem præter hæc multa alia, alias fortasse explananda. Nam quod stellas in Firmamento stabiliat, ab eo non differt, quo idem philosophus Cometarum materiam exhalationem lentam aëri liquido tenaciter inhaerentem iudicat, & regularissime nihilominus ad motum primum vna cum aëre circum raptat. Sed de hisce con-

II.

1 fule Solem illustratum, pag. 74. Neque Diuus Bonauentura supra adductus Aristotelem aliter explicat, cum tamen Aristotelicus sit vel maxime. Fauet etiam plurimum Albertus Magnus, dum corpus spirabile inter sphaeras cælestes interponit.

PRO CAELO LIQVIDO

stant Aegyptiorum Hieroglyphica.

Apud Ioannem Pierium Valerianum editionis Lugdunensis 1586. sunt duo libri annexi, ab homine anonymo, sed erudito conscripti, anno 1567. is igitur Lib. 1. Solem describit verbis sequentibus.

[Solem, inquit, pingebant (Aegyptij) iuuenili & rotunda facie, eumque in naui collocabant, quam Crocodilus ferebat.

Per nauigium motum eius in humido significantes, hoc est in æthere, vel intelligentis. Nam & ætherem multi humidum esse putarunt: & in sicco tam diuturnum motum fieri non posse, & calos aqueos dixerunt. Vnde in sacris litteris tam sæpe cælestium aquarum nomine à Dauide comprehenduntur. Per Crocodilum vero aquam pluuiam, cuius causa Soli tribuitur.

Anonymus quidem ex arcanis Aegyptiorum no- tis. Cælū liquidū facit.



PRO CAELO LIQVIDO

Auctoritates Astronomorum.

CAP. XXIX.



A B initio excoltae Astro-
nomiae, Astronomos
semper caelum & stellas
pro praestantissima Mū-
di parte tenuisse in con-
fesso est; duritiam ta-

men illam, quae ab aliquot antecessis
saeculis multorum animis, ex occasione
sphaerarum materialium, & descriptio-
nibus Theoriarum, modisque loquen-
di nonnullorum Astronomorum inse-
dit, semper auersatos, sed caelum te-
nuissimum, limpidissimum, subtilissimū,
permeabile, celsile, spirabile amplexa-
tos esse, manifesta ipsorum monumēta,
vel ab aliis traducta documenta testan-

*Ptolemæo
cali dur i sē-
tentia falso
affingitur.*

tur. In quorum genere Ptolemæum, tā-
quam Antesignanum in frontispicio iu-
re merito statuo, & ab aliorum iniuria
diu nunc irrogata prudens vindico: tan-
tum enim non oppresserunt hactenus
innocentem, dum suas isti caelorum
Architecti, tanquam Atlanti, corporū
superiorum Excentrepicyclares, intri-
catas atq; indigestas moles imponunt:
& calamo audenti magis quam docto,
suorum machinamentorum non tan-
tum patronum, sed & auctorem statuūt
nihil tale cogitantem, contraria scriben-
tem Ptolemæum. Nec moror quid scri-
pserint aliqui, quid dixerint, aut non
legerunt Ptolemæum, aut non intelle-
xerunt, sed communem auditus famā
secuti illorum opinionem roborauerunt
scripto, quorum errorem debebant e-
mendare doctrina. Nos autem Virum
iustum à culpa & onere, tam ex ore a-
liorum, quam ex sua ipsiusmet confes-
sione clarissima liberemus.

S. Igitur Thomas, æquis utique ar-
bitrator, & cui plus quam recentiorum
verbis credendum, parte prima, quæst.

*Ptolemæo ad
ritie cali li-
berant.*

70. art. 1. ad tertium, hanc controuer-
siam sic dirimit. *Dicendum quod secun-
dum Ptolemæum, luminaria non sunt fi-*

II.

1 *xa in sphaeris, sed habent motum seorsum
à motu sphaerarum.]*

Igitur sanctus Thomas Ptolemæum *D, Thomas.*
à duritie caeli liberat, nec alios ibidem
ad eandem adigit, sed istam rem quasi
problematicè disputat, & cuilibet relin-
quit liberum sequi quod vult. Accedat
nunc alter iudex.

10 *DIONYSVS Carthusianus, in cap. 1. Dionysius
Genesis art. 10. super illa verba, Fiant Carthus.*
luminaria in firmamento caeli, &c. ita,
præter cætera scribit.

[Plato in Timæo dicit, stellas non esse
fixas in firmamento, sed meare & cho-
ream ducere in eodem, & in hoc Ptole-
mæus Platone insecutus est. Vnde dicunt
non calum, sed stellas caeli moueri & cir-
cumferri.] Mollius ergo posthac susti-
nebit onus Ptolemæus, nec amplius à

20 *caelo durissimo premetur. Tertium no-
bis adducunt arbitrum aliqui suis in
Genesis commentationibus hisce ver-
bis. [Sidera pasci humoribus, vel ex O-
ceano haustis, vel quos alterum ex alte-
ro traheret, celeberrima fuit apud an-
tiquos opinio. Quæ si caeli durities ada-
mantina sit, nullo pacto constare pos-
sit; negante vaporibus aditum Lunæ or-
be solidissimo: ac quos viros putas id
credidisse? totius antiquitatis doctissi-
mos. Sane Ioannes Lorinus in 2. Petri 3. Ioā. Lorinus
citatur Homerum, Anacreontem, Ptole-
mæum, Virgilium, Lucretium, Lucium,
Plinium, Manilium, adde Senecam,
Metrodorum, Heraclitum, Stoicos omnes,
omnes Aegyptios, ac de-
mum vix non omnes philosophos, &c.]*

25 *En cum quanto comitatu & applauden-
tium choro causam suam pro caelo li-
quido agat Ptolemæus?*

30 *Quarto. HIERONYMVS Vielmius Ve-
netus, de Sex diebus, lect. 20. [Certū est
inquit, Ptolemæum Astronomorum
Principem, Excentricos & Epicyclos ne-
quaquam re vera esse affirmauisse]*

Ioā. Lorinus

Vielmius.

40 *quaquam re vera esse affirmauisse;*
45 *Gggg 3 sed*

I.

sed hæc duntaxat dixisse satisfacere, si ponantur, ad effectus erraticorum syderum dignoscendos.] hæc ille.

Cornelius à Lapide.

Accedit quintus Iudex CORNELIVS à Lapide, qui in epistolâ sancti Petri secundam, capite tertio post plurimos recensitos, ait Ptolemæum in Quadripart. & alios, censuisse sidera ali vaporibus, quibus in fine Mundi sublatis & exustis, illa interitura, &c. Hæc autem sine cæli liquiditate non stant, &c.

Sed nunc in medium prodeat ipse Ptolemæus, & pro se loquatur ætatem namque habet annorum 1498. & multa canus sapientia viuit adhuc: & hominis (ait in præfatione Almagesti) disciplina sui intellectus socius est, & apud homines intercessor. Et, Non fuit mortuus qui scientiam viuificauit. Hæc ipse Ptolemæus pro concilianda Lectoris fide & beneuolentia, nunc vterius pro causâ sua perorantem audiamus.

EX CLAVDII PTOLEMAEI

Lib. Mag. Constructionis

13. Cap. 2.

ΚΑὶ μὴδὲς τὰς ποικίλας τῶν ὑποθέσεων ἐργασίας νομιμάτω, σκοπῶν τὸ τῶν παρ' ἡμῖν ἐπιτεχνήματων κατασκελές. οὐ γὰρ θεωρητικῆς ἀφ' ἀβάλλειν τὰ ἀνθεωρητικὰ τοῖς θεοῖς, οὐδὲ τὰς ἀπὸ τῶν τιλικούτων πίσεις, ἀπὸ τῶν ἀπομοιοτάτων ἀφ' ἀβάλλειν λαμβάνειν. (π γὰρ ἀπομοιοτότερον τῶν ἀεικῶν ὡσαύτως ἐχόντων θεωρεῖται μὴδὲ ποῖ; & τῶν ὑποθέσεων αὐτῶν κωλυσιμωμένων, θεωρεῖται μὴδὲ ὑφ' αὐτῶν;) ἀλλὰ περὶ αὐτῶν, ὡς ἐνὶ μέγιστα τὰς ἀπληστέρας τῶν ὑποθέσεων ἐφαρμόζαν τὰς ἐν τῇ οὐρανῷ κινήσεις, εἰ δὲ μὴ τὸ πρὸς τὴν ἀντιθέσιν, τὰς ἐνδεχομένας. εἰ γὰρ ἀπὸ τῶν ἐκείνων τῶν φαινομένων καὶ τὸ ἀκόλουθον τῶν ὑποθέσεων διασώζηται, πᾶν ἐπὶ θαυμαστὸν ποσὶ δοκῶν τὸ δυνατὸν τὰς ποικίλας συμπλοκάς, ταῖς τῶν οὐρανίων κινήσεων συμβεβηκέναι, μὴδὲ μίαν ὑπαρχούσης παρ' αὐτοῖς φύσεως, κωλυτικῶς, ἀλλὰ συμμέτρως πρὸς τὸ αἶψαι, & ἀφ' ἀφαιρῶν τὰς καὶ φύσιν ἐκείνων κινήσεις. καὶ αἰτιᾶν τυγχάνωσιν, ὡς πάντα διὰ πάντων ἀπλῶς τῶν χυμῶν καὶ διακινῶσθαι καὶ διαφαινέσθαι δύνασθαι. καὶ μὴ μόνον πρὸς τὰς καὶ μέγας κύκλους τὸ τοιοῦτον δοδεῖν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς σφαίρας αὐτὰς, καὶ τοὺς ἄξονας τῶν ἀποθεῶν αὐτῶν καὶ

II.

1 αὐτῶν τὴν ἐν ταῖς διαφόροις κινήσεσι συμπλοκὴν καὶ ἐπαλληλίαν ἐν μὲν ταῖς καὶ σκευαζομέναις παρ' ἡμῶν εἰκόσιν ὡς ἀπὸ ἐργασίας καὶ ἀποθέσεων πρὸς τὸ τῶν κινήσεων ἀκόλουτον
5 ἐν δὲ τῇ οὐρανῷ μὴδὲ μὴδὲ μὴδὲ μὴδὲ μὴδὲ μὴδὲ τῆς τοιαύτης μίξεως ἐμποδιζομένῳ, μάλλον δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἀπλῶν τῶν οὐρανίων, οὐκ ἀπὸ τῶν παρ' ἡμῶν οὕτως ἐχόντων δοκούντων πρὸς τὴν κίνησιν, ὅποτε μὴδὲ ἐφ' ἡμῶν τὸ αὐτὸ πᾶσιν ὁμοίως ὅτιν ἀπλῶν. οὕτω γὰρ σκοποῦσιν οὐδὲν αὐτῶν διὰ τῶν καὶ τὸν οὐρανὸν γινόμενων ἀπλῶν, καὶ αὐτὸ τὸ τῆς θεωρίας ποσὶς ἀμετάστατον. ἐπειδὴ καὶ τὸ αὐτὸ, τὸ παρ' ἡμῶν τὸν οὐρανὸν ὡσαύτως ἐχόν, ἐφ' ἡμῶν δὲ εἶναι, ὅτιν ἐνδεχομένων μόνον, ἀλλὰ καὶ πάντας πᾶσιν ἀδυνατῶν. οὐκ ἐνδεχόμενον γοῦν, ἀπὸ δὲ τῆς τῶν ἐν αὐτῇ τῇ οὐρανῷ φύσεως, & τῆς τῶν κινήσεων ἀμεταβλησίας κίνησιν εἰς αὐτῶν γὰρ αὐτῶν καὶ ἀφαιρῶσθαι ἀπλῶν. & μάλλον ἢ τὰ παρ' ἡμῶν οὕτως ἐχόντων δοκούντων, μὴδὲ ποῖν μὴ δὲ δυσχερέας πρὸς τὰς ἀποθέσεις αὐτῶν ὑπονοεῖν ἀδυναμένῳ.

Et nemo existimet huiusmodi Hypotheses esse operosas aut captu difficiles, visa nostrarum inuentionum exsucca quodammodo subtilitate. Non enim conuenit vt humana diuinis comparentur, aut eius, quam de diuinis habemus opinionem, humana cum sint dissimillima tāquam paradigmata seu formæ exemplares nobis proponantur. (Quæ enim maior potest inueniri dissimilitudo, quam sit inter ea quæ æterna sunt & eodem modo se habent, & ea quæ his vtrisque destituuntur? Et rursus inter ea, quæ ab aliis vndique, & ea, quæ neque ab aliis, neque à semet ulla impedimenta patiuntur?) sed eniten-
30 dum est, vt quam potest fieri Hypotheses maximè simplices accommodentur motibus cælestibus, quæ res si oprato frustretur successu, eæ sunt accipiendæ & admittendæ suppositiones, quæ ap-
45 positæ haberi possunt. Si namque singula Phænomena secundum assumptas hypothesef sine villo impedimento omnimode saluentur, mirum aut incredibile cuiquam videri non debet, possibile esse, vt eadem complicationes in motibus
50 cælestium corporum inueniantur, præsertim cum ipsorum natura nulla penitus resistendi vi polleat, sed summa proportionē & facilitate sese accommodet, & eo-
55 rum

I.

rum. quæ secundum naturam motibus
cadendo locum præbeat, etiam si inter se
contrarii inueniantur, ita ut omnes flu-
xus per quosuis permeare & transperere
valeant. Et hæc mobilium in superando
medio facilitas non tantum competit par-
ticularibus circulis, sed & ipsis sphaeris,
& circulationum axibus; quorum qui-
dem in diuersis motibus implicationem
atque permixtionem mutuam, & alter-
nam in nostris quas adornauius imagi-
nibus vicissitudinem videmus laboriosam
& determinatu difficilem, ad seruandum
motuum libertatem; in caelestibus autem
nullum ulli ab eiusmodi circulo-
rum, sphaerarum aut axium, permixtione in-
fertur impedimentum.

Amplius & hoc ipsum, quod caele-
stium simplicitas, non sit æstimanda ex
ijs quæ apud nos talia videntur, ex eo
patet, quod apud nos inter omnes de
ipso simplici non similiter conueniat:
vnde hoc modo progredientibus acci-
deret, ut in cælo nihil simplex inuenire-
tur, neque ipsius primæ lationis immu-
tabilis conuersio: siquidem aliquid a-
pud nos inuenire, quod eodem modo
se semper habeat, non solum est diffici-
le, sed simpliciter impossibile. Nō igitur
hinc, sed ex naturis in ipso cælo existen-
tibus, necnon motuum immutabilitate
oportet iudicare: Sic enim omnes appa-
ruerint nobis simplices, & magis quidē
quàm ea quæ apud nos talia videntur,
exclusa procul omnis laboris & difficul-
tatis circa reuolutiones illarum perio-
dicas quibus obnoxie videri possent su-
spicione.

S C H O L I V M.

Ex his habes primo. Ptolemæum
verbis expressis negare substantiam cor-
porum caelestium esse duram, aut resi-
stentem, sed affirmare mollem, tracta-
bilem, flexilem, cedentem, sine vllō
obstaculo axibus, circulis sphaeris, mo-
bilibusque quibusuis permeabilem.

Secundo. Et ob hanc causam nihil
referre, etiam si axes axibus, circuli cir-
culis, sphaeræ sphaeris, ita motibus caele-
stibus exigentibus, simul implicentur
inter se non tamen idcirco vel motum
stitutum, vel corpora caelestia penetratū

II.

iri, eo quod sine vlla obfistentia in ipsis
vltro cedentibus astra, ut dictum est, fe-
rantur.

Tertio. Et quanquam in istis phy-
sics sublunaribus crassis & materiali-
bus rebus, absque mutuis impediti-
bus hæc fieri aut repræsentari sit diffi-
cile; nihilominus si inuentis his Ptole-
maicis hypothesebus caelestia in moti-
bus corresponsdeant, ibi ita fieri, non esse
ambigendum. Neque tamen ab hisce
materialibus ad illa trahendum esse ar-
gumentum. nostra enim ob duritiam,
obluantur, & resistunt sibi mutuo:
illic autem in materia tenui, omnia,
absque vllō renisu sibi statim loco ce-
dunt, & sic motus indemnes absque
corporum penetratione fiunt.

Quarto. Quod autem ab hisce infe-
rioribus naturis ad illas superiores non
sit argumentandum, confirmat ex eo,
quod alioqui etiam cæli simplicitas tol-
leretur.

Quinto. Hinc quoque bene obser-
uent isthæc, ij præsertim, qui sub Pto-
lemaici systematis defendendi & propu-
gnandi prætextu, inextricabilem cælo-
rum duritiem machinantur, ij enim
Ptolemæo è diametro repugnant.

Agnosceit enim Ptolemæus mutuas
quidem suarum Theoriarum permix-
tiones, in circulis, in axibus & polis,
eorumque motibus; corporum tamen
caelestium durorum positiones respuit,
atque adeo ipsorum motuum retarda-
tiones per hoc solum euitat, quod caele-
stia corpora fluida, & quidem sine vlla
resistentia ob naturæ subtilitatem, mo-
bilibus astris cessilia facit. Hoc autem
est cælum fluxile & flexile agnoscere.
Ptolemaicam ergo isti Astronomiam
non sectantur, sed nouam & Astrono-
mis antiquis incognitam obtrudunt, cæ-
lorum structuram, sui nimirum cerebri
phantasiam.

Sexto. Patet hinc Tychonicas Hy-
potheses Ptolemaicis in hoc affines esse,
dum Tycho motuum caelestium impli-
cationes etiam adstruit, sola tamen li-
quiditate absurda omnia euitat.

Septimo. Quod autem Ptolemæus
& hic & cap. I. Libri primi, corpora caele-
stia diuina & immutabilia deprædicat;
facit idem quod Plato & omnes Plato-
nici,

I.

sed hæc duntaxat dixisse satisfacere, si ponantur, ad effectus erraticorum syderum dignoscendos.] hæc ille.

Cornelius à Lapide.

Accedit quintus Iudex CORNELIVS à Lapide, qui in epistolâ sancti Petri secundam, capite tertio post plurimos recensitos, ait Ptolemæum in Quadripart. & alios, censuisse sidera ali vaporibus, quibus in fine Mundi sublatis & exustis, illa interitura, &c. Hæc autem sine cæli liquiditate non stant, &c.

Sed nunc in medium prodeat ipse Ptolemæus, & pro se loquatur ætatem namque habet annorum 1498. & multa canus sapientia viuit adhuc: & hominis (ait in præfatione Almagesti) disciplina sui intellectus socius est, & apud homines intercessor. Et, Non fuit mortuus qui scientiam viuificauit. Hæc ipse Ptolemæus pro concilianda Lectoris fide & beneuolentia, nunc vltcrius pro causâ sua perorantem audiamus.

EX CLAVDII PTOLEMAEI

Lib. Mag. Constructionis

13. Cap. 2.

ΚΑὶ μὴδὲς τὰς ποικίλας τῶν ὑποθέσεων ἐργασίας νομισάτω, σκοπῶν τὸ τῶν παρ' ἡμῖν ἐπιτεχνήματων κατασκελές. οὐ γὰρ θεωρήσει τὸν ἀβέβητον τὰ ἀνθρώπινα τοῖς θεοῖς, οὐδὲ τὰς αἰετῶν τῶν περικύβητων πίσεις, ἀπὸ τῆς ἀνομοιοτάτου ἀβελαντίας λαμβάνειν. (πὺ γὰρ ἀνομοιοτάτην τῶν αἰετῶν ὡσαύτως ἐχρίπτει πρὸς τὰς μὴδὲ ποικίλας, & τῶν ὑποθέσεων αὐτῶν κωλυσιμύων, πρὸς τὰς μὴδὲ ὑπὸ αὐτῶν;) ἀλλὰ πειράσθω μὲν, ὡς ἐνὶ μέγιστα τὰς ἀπληρέεις τῶν ὑποθέσεων ἐφαρμόζαν τὰς ἐν τῇ οὐρανῷ κινήσεις, εἰ δὲ μὴ τὸ πρὸς τὴν ἀστρονομίαν, τὰς ἐνδεχομένας. εἰ γὰρ ἀπὸ τῆς ἐκείνου τῶν φαινομένων καὶ τὸ ἀκόλουθον τῶν ὑποθέσεων ἡσυχάζηται, πᾶν ἐπὶ θαυμαστόν ποτε δοκοῖν τὸ δύνασθαι τὰς ποικίλας συμπλοκάς, ταῖς τῶν οὐρανίων κινήσεις συμβεβηκεναι, μὴδὲ μίαν ὑπαρχούσης παρ' αὐτοῖς φύσεως κωλυτικῆς, ἀλλὰ συμμέτρως πρὸς τὸ ἕκαστον, & τὸν ἀπὸ τῶν αἰετῶν φύσιν ἐκείνων κινήσεις. καὶ ἐκείνην τυγχάνουσιν, ὡς πάντα ἡ ἀπὸ τῶν αἰετῶν τῶν χυμῶν καὶ διακρίσεων καὶ ἀσφαλείας δύνασθαι. καὶ μὴ μόνον πρὸς τὰς καὶ μίαν κύκλῳ τὸ τοιοῦτον ὁδοῖν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς σφαίρας αὐτὰς, καὶ τοὺς ἄλλους τῶν ἀστρονομῶν αἰετῶν καὶ

II.

1 αὐτῶν τῶν ἐν ταῖς ἀστρονομίαις κινήσεις συμπλοκῶν καὶ ἐπαλληλίων ἐν μὲν ταῖς ὑποθέσεσιν αἰετῶν παρ' ἡμῶν ἐκείνων ὡς αἰετῶν ἐργασίας καὶ ἀσφαλείας πρὸς τὸ τῶν κινήσεων ἀκόλουθον
5 ἐν δὲ πρὸ οὐρανῶ μὴδὲ μίαν ὑπαρχούσης τῆς ποικίλης μίξεως ἐμποδιζομένων, πολλοὺς δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἀπλοῦν τῶν οὐρανίων, οὐκ ἀπὸ τῶν παρ' ἡμῶν οὕτως ἐχρὶν δοκοῦντων πρὸς τὴν κίνησιν, ὅποτε μὴδὲ ἐφ' ἡμῶν τὸ αὐτὸ πᾶσιν ὁμοίως ὅτιν ἀπλοῦν. οὕτως γὰρ σκοποῦσιν οὐδὲν αὐτῶν δὲ τῶν καὶ τὸν οὐρανὸν γινόμενων ἀπλοῦν, καὶ αὐτὸ τὸ τῆς θεωρίας ποικίλης ἀμειψίας. ἐπειδὴ καὶ τὰ αὐτὰ, τὰ παρ' ἡμῶν τῶν αἰετῶν ὡσαύτως ἐχρὶν, ἐφ' ἡμῶν δὲ
15 εἶναι, ὅτιν ἀπλοῦν μόνον, ἀλλὰ καὶ πάντα πᾶσι ἀδυνατῶν. οὐκ ἐνδεχόμενον γάρ τὸ δὲ τῆς τῶν αὐτῶν τῶν αἰετῶν φύσεων, & τῆς τῶν κινήσεων ἀμειψίας κίνησιν δὲ αὐτῶν γὰρ αὐτῶν πᾶσι καὶ φανεροῦν ἀπλοῦν. & πολλοὶ ἢ τὰ παρ' ἡμῶν οὕτως ἐχρὶν δοκοῦντα, μὴδὲ ποικίλα μὴ δὲ δυσχερέας πρὸς τὰς αἰετῶν αὐτῶν ὑπονοήσιν ἀδυνατέων.

Et nemo existimet huiusmodi Hypotheses esse operosas aut captu difficiles, visa nostrarum inuentionum exsucca, quodammodo subtilitate. Non enim conuenit vt humana diuinis comparentur, aut eius, quam de diuinis habemus opinionem, humana cum sint dissimillima tāquam paradigmata seu formæ exemplares nobis proponantur. (Quæ enim maior potest inueniri dissimilitudo, quam sit inter ea quæ æterna sunt & eodem modo se habent, & ea quæ his vtrisque destituuntur? Et rursus inter ea, quæ ab aliis undique, & ea, quæ neque ab aliis, neque à semet ulla impedimenta patiuntur?) sed eniten-
30 dum est, vt quam potest fieri Hypotheses maximè simplices accommodentur motibus cælestibus, quæ res si oprato frustretur successu, eæ sunt accipiendæ & admittendæ suppositiones, quæ appositæ haberi possunt. Si namque singula Phænomena secundum assumptas hypotheses sine villo impedimento omnimode saluentur, mirum aut incredibile cuiquam videri non debet, possibile esse, vt eadem complicationes in motibus
45 cælestium corporum inueniantur, præsertim cum ipsorum natura nulla penitus resistendi vi polleat, sed summa proportionē & facilitate sese accommodet, & eorum

I.

rum quæ secundum naturam motibus cedendo locum præbeat, etiam si inter se contrarii inueniantur, ita ut omnes fluxus per quosvis permeare & transperere valeant. Et hæc mobilium in superando medio, facilitas non tantum competit particularibus circulis, sed & ipsis sphaeris, & circulationum axibus; quorum quidem in diuersis motibus implicationem, atque permixtionem mutuam, & alternam in nostris quas adornauimus imaginibus vicissitudinem videmus laboriosam & determinatu difficilem, ad seruandum motuum libertatem; in caelestibus autem nullum ulli ab eiusmodi circularum, sphaerarum aut axium, permixtione infertur impedimentum.

Amplius & hoc ipsum, quod caelestium simplicitas, non sit æstimanda ex ijs quæ apud nos talia videntur, ex eo patet, quod apud nos inter omnes de ipso simplici non similiter conueniat: unde hoc modo progredientibus accideret, ut in cælo nihil simplex inueniretur, neque ipsius primæ lationis immutabilis conuersio: siquidem aliquid apud nos inuenire, quod eodem modo se semper habeat, non solum est difficile, sed simpliciter impossibile. Nō igitur hinc, sed ex naturis in ipso cælo existentibus, necnon motuum immutabilitate oportet iudicare: Sic enim omnes apparuerint nobis simplices, & magis quidē quam ea quæ apud nos talia videntur, exclusa procul omnis laboris & difficultatis circa reuolutiones illarum periodicas quibus obnoxie videri possent suspicione.

S C H O L I V M.

Ex his habes primo. Ptolemæum verbis expressis negare substantiam corporum caelestium esse duram, aut resistentem, sed affirmare mollem, tractabilem, flexilem, cedentem, sine villo obstaculo axibus, circulis sphaeris, mobilibusque quibusvis permeabilem.

Secundo. Et ob hanc causam nihil referre, etiam si axes axibus, circuli circulis, sphaeræ sphaeris, ita motibus caelestibus exigentibus, simul implicentur inter se; non tamen idcirco vel motum, situm, vel corpora caelestia penetratū

II.

iri, eo quod sine vlla obfistentia in ipsis vltro cedentibus astra, ut dictum est, ferantur.

Tertio. Et quanquam in istis physicis sublunaribus crassis & materialibus rebus, absque mutuis impeditiōibus hæc fieri aut repræsentari sit difficile; nihilominus si inuentis his Ptolemaicis hypothesibus caelestia in motibus corresponsdeant, ibi ita fieri, non esse ambigendum. Neque tamen ab hisce materialibus ad illa trahendum esse argumentum. nostra enim ob duritiam, obluantur, & resistunt sibi mutuo: illic autem in materia tenui, omnia absque villo renisu sibi statim loco cedunt, & sic motus indemnes absque corporum penetratione fiunt.

Quarto. Quod autem ab hisce inferioribus naturis ad illas superiores non sit argumentandum, confirmat ex eo, quod alioqui etiam cæli simplicitas tolleretur.

Quinto. Hinc quoque bene obseruent isthæc, ij præsertim, qui sub Ptolemaici systematis defendendi & propugnandi prætextu, inextricabilem cælorum duritiem machinantur, ij enim Ptolemæo è diametro repugnant.

Agnoscat enim Ptolemæus mutuas quidem suarum Theoriarum permixtiones, in circulis, in axibus & polis, eorumque motibus; corporum tamen caelestium durorum positiones respuit, atque adeo ipsorum motuum retardationes per hoc solum euitat, quod caelestia corpora fluida, & quidem sine vlla resistentia ob naturæ subtilitatem, mobilibus astris cessilia facit. Hoc autem est cælum fluxile & flexile agnoscere. Ptolemaicam ergo isti Astronomiam non sectantur, sed nouam & Astronomis antiquis incognitam obtrudunt, cælorum structuram, sui nimirum cerebri phantasiam.

Sexto. Patet hinc Tychonicas Hypotheses Ptolemaicis in hoc affines esse, dum Tycho motuum caelestium implicationes etiam adstruit, sola tamen liquiditate absurda omnia euitat.

Septimo. Quod autem Ptolemæus & hic & cap. I. Libri primi, corpora caelestia diuina & immutabilia depredicat, facit idem quod Plato & omnes Platonici,

I.

nici, qui nihilominus eadem ex elementis facta & compacta agnoscunt. Ptolemaeum autem esse Platonis sectatorem, habes ex allegatis testibus, atque ipsiusmet libris.

Hoc idem de Ptolemaeo Peripatetici deprecantur.

Subscribit huic de Ptolemaeo sententiae recentissimus auctor P. Raphaël Auer, anno 1627. Romae editus, to. Phil. 2. quaest. 33. sect. 1. pag. 76. ubi sic ait:

[Plato in Timaeo docuit, caelum constare ex omnibus quattuor elementis, ex purioribus tamen illarum partibus, & magis participare ex terra & igne. Sic etiam refert Alcino cap. 12. de doctrina Platonis. Et praeterea ex posterioribus Philosophis eum secuti sunt Plotinus, Phicinus super Timaeum. Philopon. lib. de aeternitate mundi contra Proclum, Plin. libro secundo Nat. Histor. cap. 8. & quidam alij. Insuper Ptolemaeus lib. 1. Quadripartiti, & alij Astronomi videntur similiter sentire, caelos constare ex omnibus elementis.] Patet ergo dictorum veritas etiam ab ipsis Peripateticis constabere. Ptolemaeum videlicet Quinque essentiam nunquam agnouisse, &c.

SENTENTIAE PRO CAELO

liquido, Ad stipulatur Vitruuius.

Ex M. Vitruvio, qui libros suos Caesari Augusto dedicauit, excerpta sunt ista lib. 9. c. 4.

Venus, & Mercurius circa Solem voluuntur.

[Mercurij autem & Veneris Stellae, circum Solis radios, Solem ipsum, vti centrum itineribus coronantes, regressus retrorsum & retardationes faciunt, etiam stationibus propter eam circinationem morantur in spacijs signorum, &c.]

Hinc habes Veneris & Mercurij circa Solem conuersiones, non esse noua vel Tychois figmenta, vel Galilaei inuenta, sed Antiquorum Astronomorum dogmata. Deinde pergit idem Auctor describere Motuum apparentium, inaequalitatem, regressiones, moras, incitationes celeriores, &c. quorum omnium causam non excentricis orbitis, quos non agnouit, sed calidae So-

II.

lis tractioni adscribit his verbis:

[Ergo potius ea ratio nobis constabit quod feruor quemadmodum omnes res euocat, & ad se ducit (vt etiam fructus

Sol feruidus astra trahit &c.

5 ex terra surgentes in altitudinem per calorem videmus, non minus aquae vapores a fontibus ad nubes per arcus excitari) eadem ratione Solis impetus vehemens radiis trigoni forma porrectus, insequentes stellas ad se perducit, &

10 antecurrentes veluti refrenando retinendoque non patitur progredi, sed ad se cogit regredi, & in alterius trigoni signum esse. Fortasse desiderabitur quid

15 ita Sol quinto a se signo potius quam secundo aut tertio, quae sunt propiora, faciat in his feruoribus retentiones? ego quemadmodum id fieri videatur exponam. Eius radij in mundo, vti trigoni

20 ni paribus lateribus forma lineationibus extenduntur; id autem nec plus nec minus est ad quintum ab eo signo: igitur si radij per omnem mundum tuli circinationibus vagarentur, neque ex-

25 tentionibus porrecti ad trigoni formam linearentur; propiora flagrant: id autem etiam Euripidis Graecorum poeta animaduertisse videtur, ait enim: Quae longius a Sole essent, haec vehementius ardere, propiora vero temperata habere, &c.]

Deinde dat rationem, cur planetae Soli viciniores suum cursum proprium citius, remotiores, tardius absoluant.

35 [Quemadmodum, inquit, si in rota, quae iugulatur, imposita fuerint septem formae, canalesque totidem in rota facti, sint circum centrum in imo, ad crescentes ad extremum, in quibus haec co-

40 gantur circinationem facere, verseturque rota in alteram partem; necesse erit eas contra rota versationem nihil minus aduersus itinera facere, & quae proximum centrum habuerit, celerius peruagari,

45 quaeque extremum orbem rota peragat, etiamsi aequae celeriter ambulet, propter magnitudinem circinationis, multo tardius perficere cursum.]

Similiter astra nitentia contra Mundi cursum, suis itineribus perficiunt circuitum, sed caeli versatione redundationibus referuntur quotidiana temporis circulatione.]

55 Ex his patet ipsas libere motu proprio non

Calum liquida hinc satis elicitur.

I.
non fixas ferri. sed pergit. [Esse autem
stellas temperatas, alias feruentes, etiam-
que frigidas, hæc esse causa videtur,
quod omnis ignis in superiora loca habet
scandentem flammam: ergo Sol æthera,
qui est supra se radiis exurens efficit can-
dentem, in quibus locis habet cursum
Martis stella, itaque feruens ab ardore
Solis efficitur: Saturni autem, quod est
proxima extremo mundo, tangitque
congelatas cæli regiones, vehementer
est frigida: ex eo lous, cum inter vtriuf-
que circuitiones habeat cursum, à refri-
geratione caloreque eorum medio, cõ-
uenientes temperatissimosque habere
videtur effectus. De Zona XII. signo-
rum, & septem astrorum, contrarioque
eorum opere ac cursu, quibus rationibus
& numeris transeant ex signis in signa,
& circuitum suum perficiant, uti à præ-
ceptoribus accepi, exposui.]

Vitruvius
hæc affert ex
traditione
suorum præ-
ceptorum.

N O T A E.

Hinc rursus datur intelligi, antiquos
Mathematicos, septem planetas non tã-
tum vagos iudicasse, sed etiam libere
in æthere motos, ipsumque ætherem
ab ardore Solis accensum quasi incan-
duisse, & à radijs solaribus reliquos
planetas, vel tentos, vel propulso vel
retractos esse habitos: naturamque ip-
sorum vel frigidam, vel mediocritate
temperatam. Extimas denique mundi
partes post Saturniam regionem, gelu
cohorruisse, ex eorundem doctrina.

Similia de vi Solis per radios tracti-
ua multi scribunt, veterum, inter quos
Isidorus libro tertio, Originum, cap. 22.
hæc ex aliquo poetarum antiquorum:

— Sol tempora diuidit, atque
Mutat nocte diem, radiisque po-
tentibus astra
Ire vetat, cursuque vagos statione
moratur.

PRO CAELO LIQVIDO

Ex Hyginio eadem pro-
bantur.

C. IVLIVS Hyginus, Augusti Li-
bertus, circa Christi nascentis tempo-
ra, Poëticon Astronomicon libro pri-

mo, cum Synopsi breui quæ scripsisset
enumeraret; [Deinde, inquit, perscripsi-
mus, utrum Sol. cum Mundo fixus Sol per se
verteretur, an ipse per se moueretur: & libere mo-
uetur. 5 cum per se moueatur, & contra 12. si-
gnorum ortus eat, quare cum Mundo
exoriri & occideret.]

Idem libro quarto De Sole & Luna
& cæteris planetis, fusc probat, eos per
se, non cælo fixos, ut stellæ solent, mo-
ueri. [Sed ut ante dixi, inquit, nunc pro-
tinus de Solis cursu dicemus. Necessè
est enim Solem, aut ipsum per se moueri,
aut cum Mundo veri uno loco manen-
tem. Quod si maneret, necessè erat eodem
loco occidere & exoriri, quo pridie fuerit
exortus, quemadmodum signa eodem loco
semper oriuntur & occidunt. Præterea,
si ita esset, necessè erat dies & noctes
omnes æquales; ut quam longus ho-
diernus dies fuerit, tam longus semper
sit futurus.

Item nox simili ratione semper æqua-
lis permaneret. Quod quoniam non
est, illud quoque necessè est, cum vi-
deamus esse dies inæquales, & Solem
alio loco hodie occasurum, & alio heri
occidisse. Si igitur alijs locis oritur &
occidit, necessè est eum moueri, non stare.
30 Solem autem contra Mundi motum
currere, sic possumus intelligere;] &c.
Vbi fusc tam de Sole quam Luna & alijs
quinque planetis motum liberum pro-
bat: & exemplum producit de nauta,
35 è prora nauis currentis ad puppim am-
bulante. Sic ait Solem & planetas in
cælo ab ortu in occasum verso, suos cur-
sus proprios in contrarium peragere.
40 Vbi bene nota, S. Patres huius ipsius
auctoris verba sæpe citare, & eodem
sensu & modo probare, planetas in li-
quido ferri, &c. Vnde recte inferitur il-
los eadem omnino sensisse, quod atti-
net ad hanc controuersiam, qui suas sen-
tentias iisdem verbis declararunt.

Secundū an-
tiquos Pla-
neta mouē-
tur in cælo,
ut nauta in
nauis, &c.

Hyginij ver-
bis & ratio-
nibus sæpe
vniuntur S.
Patres.

E X A R A T I

Paraphrasi.

50 Eadem habentur ex Fragmento Arati
Phænomenon, Germanico
Cæsare interprete, in quo, super il-
lud, A loue principium, &c.
55 Quærit cur à loue incæperit? & re-
spon-

I.

spondet in hæc verba:

[Crates ait Iouem dictum cælum, inuocatum verò merito, quia in aëre, & aethere sunt sidera. Et non multum ante finem, post versum vltimum, Hæc eadem tibi signa dabunt non irrita Pisces. Solem inquit per se ipsum constat moueri, non cum Mundo verti, sed in Zodiaci circuli obliquitate cursum peragrarẽ,

II.

1 paullo superius diximus. Et post. Sol interea dum igneus sit, præ nimio motu conuersionis suæ amplius incalescit. cuius ignem dicunt philosophi aqua nutriri, & 5 e contrario elemento virtutem luminis & caloris accipere, &c.

Ex hoc etiam auctore, multi Sanctorum Patrum sua verba videntur esse mutuati, &c.

EX MANILIO SIMILIA PRO

Cælo liquido accinuntur.

M. MANILIVS, quem alij C. Manilium dicunt, Qui non diu ante Christum natum floruit, cæli liquiditatem ante alios multo elegantissimè cecinit, varijs in locis suorum Astronomicorum. Non multum post initium ita canit.

Pagina 5.

*Ignis in aethereas volucer se sustulit auras,
Summaque complexus stellantis culmina Cæli,
Flammæ vallo Natura mania fecit.
Proximus in tenues descendit spiritus auras,
Aëraq. extendit medium per inania Mundi.
Ignem flatus alit vicinis subditus astris, &c.*

Pag. 6.

*Quod nisi librato penderet pondere tellus,
Non ageret cursus Mundi subeuntibus astris
Phæbus ad occasum, & nunquā remearet ad ortus;
Lunave submersos regeret per inania cursus.
Nec matutinis fulgeret Lucifer horis,
Hesperus immerso dederat qui lumen Olympo.
Nunc quia non imo tellus deiecta profundo,
Nec medio suspensa manet, sunt peruia cuncta.*

Pag. 7.

*Nec vero tibi natura admiranda videri
Pendentis terræ debet, cum pendeat ipse
Mundus, & in nullo ponat vestigia fundo;
Qua caderet, subeat cælum, rursusque resurgat;
Quod patet ex ipso motu, cursuque volantis:
Cum suspensus eat Phæbus, cursuque reflectat
Huc illuc, agiles & seruet in aethere metas:
Cum Luna & stellæ volitent per inania Mundi.
Terra quoque aëreas leges imitata pependit.
Est igitur Terra mediam sortita cauernam
Aëris, & toto pariter suspensa profundo,
Nec patulas distenta plagas, sed condita in orbem
Undique surgentem pariter, pariterque cadentem.
Hæc est naturæ facies.*

Lib. I. pag. 15.

*Sunt alia aduerso pignantia sidera Mundo,
Quæ cælum terramque inter volitantia pendent,
Saturni, Iouis, & Martis, Solisque, sub illis
Mercurius Venerem inter agit, Lunamque locatus.*

Tu modo

I.

II.

Tu modo corporeis similes ne quære figuras,
Omniaque æquali fulgentia membra colore,
Deficiat nihil vt, vacuumque à lumine cesset.
Non poterit Mundus sufferre incendia tanta,
Omnia si plenis ardebunt sidera membris.
Quidquid subduxit flammis natura, pepercit
Succubitura oneri, formas distinguere tantum,
Contenta, & stellis ostendere sidera certis.
Igneæ designat species, atque ignibus ignes
Respondent, &c.

Lib. I. pag. 17.

Nunquam transuersos Solem decurrere ad Arctos,
Nec mutare vias, & in ortum vertere cursus,
Auroramque nouis nascentem ostendere terris:
Nec Lunam certos excedere luminis orbes,
Sed seruire modum quo crescat, quoque recedat,
Nec cadere in terram pendentia sidera Cælo,
Sed dimensa suis consumere sidera signis
Non opus est magni casus, sed Numinis Ordo.
Hæc igitur texunt æquali sidera tractu
Ignibus in varias Cælum laqueantia formas,
Altius his nihil est; hæc sunt fastigia Mundi.

Egregius igitur iste auctor, ita clare,
notunde atque eleganter omnia de Cæ-
lo, Sole & stellis complexus est, vt alia
interpretatione non indigeat, hoc solo
infelix, quod audacem illum & super-
ciliosum nactus sit Criticum, Iosephum,
Scaligerum, qui dum materiam suis hu-
meris imparem aggreditur, imperitè cē-
set, quod male intelligit, & dum poē-
tam doctissimum castigat, & misere la-
cerat, ipse censoriam virgulam inpri-
mis meretur. Sed hæc obiter, ne alij
notis illis nimium credant, dicam for-
tassis in specie aliquid si Deus vitam &
tempus largietur. Nam antiquos de re
litteraria bene meritos, honorare non
lancinare æquum est.

PRO CAELO LIQVIDO

Ex Philologia Martiani Capel-
læ eadem afferuntur.

MARTIANVS Capella, qui secun-
dum Iosephi Blancani Chronologiam,
paullo ante Imperatorem Heraclium
floruit, æuo Cycli Christiani sexto, an-
te annos scilicet mille in suæ Philologiæ
libro octauo, breui sed non minus fe-
cundo quam facundo sermone cælum
ex parte rei vnum & continuum ex æ-

1 there puro & fluido facit, circulos au-
tem & sphaeras imaginarias ob motuū
varietatem in ipso per planetas descri-
ptorum à Mathematicis effingi dicit,
5 &c. Sed præstat hæc ab ipsomet Aucto-
re audiri.

Capite ergo De Mundo, sic ait, A-
stræam loquentem inducens. Quanquā
auscultare Physicis in ipso astruendi li-
mine non dedigner, qui subtilium cor-
10 porum teneritudinem suis coactibus cir-
cumductam in quasdam sectas vias &
circularum intercapedines non æstimant
disparari; sed suis fluctibus adhærentes
15 naturas vndique * secus, globoso ambi-
tu orbibusque diffundi: quarum circa
medium, quod dixere centron, aquæ pri-
mum, ærisque sequens, tertium ignis cy-
ma commemorat. Et nunc quinto quodam
20 corporea substantia temperamento æthe-
reos circumuolare fulgores: Quo loco, So-
lis, Lunæ, ac siderum signiferique orbis
se obliquitas circumducit, &c. cuius na-
tura tranquillitas etiam illum extimum
25 tenet ambitiohemque cursum, qui ex eo
quod nullis sideribus occulatur ἀόρατος,
perhibetur.

Si igitur sui similis omnis circuma-
gentium naturam ambitus reperitur,
30 nulli possunt æthereum tractum circuli
va-

Tempore
Capella Phy
sici vnum
continuum
cælum fece-
runt.

** Fortasse*
secum.

I.

Circuli non variare. Nos igitur circulos non ita di-
reales sed i- *cemus, ut linquentes naturae discrimina*
maginarij. *corpulenta fingamus, sed ut ascensus de-*

scensusq. ad nos errantium demonstramus.

Sola terra
dura, cali
subtiles.

Neque enim vel axem polosque, quos
in sphaera aenea, quae Circite dicitur,
ad intelligentiae compendia affixere
mortales: ego robori mundanae ratio-
nis apponam, cum nihil solidius terra sit,
quod eam valeat sustinere. Deinde
cū poli velut perforatae exterioris sphæ-
rae cauernis emineant, & hiatus quidā
cardinesque fingantur.

Circuli, a-
res, positi
maginarij.

Celum con-
tinuum.

Quod utique subtilibus ethereisque ac-
cidere non potuisse compertum. Sicubi igi-
tur intelligentiae edisserandique propo-
sito, vel axem, vel polos, vel circulos
perhibebo, ideali quidam prudentia,
non diuersitate caeli discreta, sed spa-
ciorum rationibus dispensetur. Sicque
habeatur, cum euexum deuexumque
mundum dixerō: cum similis, cunctis
suis partibus sit, sublimeturque vel la-
teat pro conditione horizonis, positio-
neque terrarum.]

SCHOLIUM.

Hinc euident est, ex huius auctoris
opinionē, ætherem continuum, natu-
raeque igneae, & solis planetarum moti-
bus, non re ipsa discretum esse. Vbi no-
ta, cum dicitur, *Linquentes*, nonnemini
videri mendum, pro quo legendum
fortasse sit, *Liquentis*, id quod sensum
auctoris planissimum, illud autem ob-
scurissimum, & locutionem latinam
difficillimam reddit.

Capite autem de Planetarum orbi-
bus, hanc inter sidera fixa, & planetas
differentiam affert, quod illa cum sua
sphæra circumagantur, hi propria mo-
tione liberè ferantur.

[Horum igitur septem (inquit Plane-
tarum) illa eo maxime cum fixis sideri-
bus habenda est distantia; quod illa
caeli tantummodo cursibus commouen-
tur propria statione ornata: hi vero tā
mundanis raptibus auferuntur, quam
proprijs cursibus commouentur. Nam
quantum eos retulit diei noctisque ro-
tatio, tantum nituntur diuersis com-
pensare temporibus, id est, aut mense
ut Luna; aut anno, ut Sol; aut trigin-

II.

ta annis, ut Saturnus: & cæteris tem-
poribus attributis, pro spaciorem quae
circumeunt latitudine aut breuitate.

Quae cuncta sidera, licet in ortum per-
gere videantur, non tamen aduersum
mundum rigido motu, sed obliquo per
Zodiaci defixa moluntur. Alioquin
ex contrario partium suarum motu mū-
dus stare non posset. Denique etiam
Peripateticorum dogma contendit, non
aduersum mundum hæc sidera promo-
ueri, sed celeritate mundi, quam sequi
non potuerunt, præteriri. Quod quidē
etiam ut verum sit, meis non poterit

Retardatio
etiam anti-
quis nota, et
Peripateti-
cis ascrip-
ta.

rationibus obuiri.

Sive enim Saturnus nimia cum Mū-
do celeritate concertans, vix exiguis
cursibus superatur: ac Luna quod tar-
dius incedat intra trigessimum diem à
Mundi parte eadem præteritur. Sive
contra Mundum nitentibus ideo cele-
rior, quia breuiore ambitu orbem cir-
cuit Luna, tardiusque Saturnus, propter
latitudinem orbis effusi: utrum velis,
meis regulis non obstitit. Siquidem
suis motus istorum rationibus, dispen-
satur.

Quibus tamen septem sideribus vnus
est communis motus, quod omnes or-
tum petunt: alius quod temporum om-
nes diuersitatibus atque accidentibus
variantur. Nam ex his quinque sidera,
stationes recursusque patiuntur. Sol ve-
ro Lunaque cursu continuo rapiuntur.
Item hæc lumina vicibus obscurantur
occultantur.

Quinque vero sidera nesciunt obum-
brari. Tria item ex his cum Sole, Lu-
naque orbem terrae circumeunt: Venus
verò ac Mercurius, non ambiunt ter-
ram.] & post.

[Et illud generaliter septem omni-
bus aduertendum, quod cum mundus
eiusdem ductus rotatione vnimoda
torqueatur: planetae quotidie tam lo-
ca quam diuersitates arripiant circulo-
rum, &c. & post.

Nam Venus, Mercuriusque licet or-
tus occasusque quotidianos ostendunt, ta-
men eorum circuli terras omnino non am-
biunt, sed circa Solem laxiore ambitu
circulantur. Denique circulorum suorum
centron in Sole constituunt: ita ut supra
ipsam aliquando, intra plerumque pro-

Venus &
Mercurius
circa Solem
mouentur.

pin-

I.

pinquiores terris ferantur, à quo quidem signo vno & parte dimidia Venus disparatur. Sed cum supra Solem sunt, propinquior est terris Mercurius: cum intra Solem, Venus: utpote quæ orbe castiore diffusioreq. curuetur. Et in fine libri. Sed cursus diuersitates, altitudinisq. causas consistendi, retrogrediendiq. atque incedendi omnibus supradictis importat radius Solis affulgens, qui eas percutiens, aut in sublime tollit, aut in profundum deprimit, aut in latitudinem declinare, aut retrogradare facit.

Hinc ipso Sole clarius est, hunc auctorem sanè doctum, nō agnouisse vllos orbis celestes aut sphaeras distinctas, prout nunc Mechanici isti orbium caelestium fabricatores moluntur, sed totius cæli sphaeram ætheream, subtilem, fluidam, continuam, vnam fecisse, in eaque stellas & planetas pensiles suspendisse, natura igneos, & illas quidem stables, in suis locis, hosce autem vario motu vagos. Conuenit ergo Martianus Capella cum Doctrina D. Bonauenturæ, qui pari modo cælum vnum, continuum, liquidum agnouit, &c.

CICCVS Esculanus in Vniuersitate Patauina Professor. [Enarratione in sphaeram, anno 1519. Venetijs editam pag. 6. Ad secundum, inquit, dico, quod orbis (planetarum) non sunt continui, nec contigui, sed est corpus medium inter eos, recipiens compressionem, secundum sententiam Thebit & Alberti.] Et hæc in publica Academia dicta & docta sunt, circa annum Domini 1507.

MICHAEL Scotus, in quæstionib. super sphaeram. pag. 105. super definitionem sphaeræ. [Nota, quod solidum dicitur tribus modis. Vno modo est idem quod durum sicut terra. Alio modo solidum, idem quod continuum, & sic elementa & corpora supercaelestia solida dicuntur. Tertio modo id est, quod trina dimensio, & sic idem quod corpus.]

NICOLAVS Copernicus, & omnes ipsius sequaces, quos in disponendis planetarum motibus habet plurimos, in cælo liquido Solem igneum collocant.

Quorum choragum agit Ioannes Keplerus, in suis Paralipomenis, in Myste-

II.

rio, in Hyperaspiste, In Epitome Astronomica, fusissimè autem & ex instituto in Marte. VVillebrordus Snellius in dissertatione Batava, & apud Mercennum quæst. 7. ar. 9. pag. 829. Simon Stevinus in Hypomnematis Mathematicis. Ioannes Remus Quietanus, Philosophiæ ac Medicinæ Doctor.

GALILAEVS de Galilæis, in suo Nuncio, in Historia de Maculis solaribus & alibi. Lyncei, quos noui, plurimi.

TYCHO Brahe, ex cuius auctoritate, (ait Raphaël Auerfa recentissimus, quæst. 32. sect. 6.) alij plures recentiores non solum Astronomi, sed etiam Philosophi, & Peripatetici in eandem sententiam abierunt; quicunque scilicet cometas gigni & esse in cælo, & per illud hinc inde discurrere receperunt, in Epistolarum tomo, cum Rothmanno disputans, hanc de cæli liquiditate sententiam fortissime tuetur, tametsi neget cælum esse substantiæ æreæ, sed ait esse nobilioris cuiusdam liquidæ quasi quintæ essentiæ, non autem Aristotelicæ, ut aliqui sibi perperam de illo imaginantur, sed talis quodammodo qualem Chymici sublimationibus è rebus sublunaribus extrahunt, qualemque ait à Sole in sublunaribus istis gigni. Idè igitur Tycho, cælum sicut Martianus Capella tenuem & depuratum ætherè, Solemque natura igneum atque incōbustibilem facit. Quem, vti paulò ante dixi, sequuntur hoc tempore plerique Astronomi alicuius notæ, qui Copernicanum terræ motum non admittunt, & eius Systema apud nostros passim usurpatur. Ex quo enim sententiam Copernici publico Senatus Purpurati interdicto profiteri nefas, omnes ferè illius Hypotheses de cælo liquido, de Cometis in eo nascentibus, de Marte cælum Solis peruadente, de Venere & Mercurio in idem translatis, &c. amplectuntur, easque publicè editis hac de re scriptis certatim propugnant, ita factum in Belgio, in Italia, in Germania, in Gallia, & alibi Viris eruditis, etiamnum superstitis, viuisque horū testibus ut taceam multas Theses typis mandatas.

Eadem docent Cornelius Gemma, H h h h Vviti-

II.

Astronomi
ali.

VVitichius, Michaël Mæstlinus, inprimis vero fortissime Christophorus Rothmannus, Mathematicus prænotabilis, ut patet ex multis locis Epistolarum citato codice Tychoniano contentarum. Item Ioannes Pena, præfatione in Opticam Euclidis. Hieronymus Munosius, Marcellus Squarcialupus, Redempus Baranzanus Vranosc. epist. 1. dub. 9. memb. 1. Longomontanus, O-
riganus. Ex instituto eadem prosequitur in suo erudito fundamento Astronomico Nicolaus Raymarus Vrsus, Diethmarsus, discipulus Tychonis Brahe, cuius inuentionem & acumen ingenij etiam Clavius noster, Astrolabij lib. 1. Lem. 53. p. 178. celebrat; is igitur Thesi Astronomica 2. sic habet. [*Ipsi mûdus seu totum naturæ Systema distinguitur in aërem & in aëre pendentia corpora, quæ corpora mundana dicuntur.*

Nicolaus
Raymarus.

Thesi 6. Corpus mundanum, ait, est substantia sua ipsius vi in aëre pendens: ut sunt stella fixæ, planeta, Sol, Luna, Terra una cum aqua.] Hæc ille, apud quem horum similia qui volet plura reperiet. Edidit autem suum Fundamentum anno 1588. & varijs Mathematicis, ipsi quoque Clauio per partes dedicauit. Systema autem proprium, inter Copernicarum & Tychonicarum medium prosequitur.

Doctores
Medici &
præsertim
Chimie de-
diti.

In eisdem Tychonis epistolis est inuenire sententiam Empiricorum, qui cælum naturæ igneæ & fluidæ, Solemque ignitum docent, & omnes huius temporis Doctores Medici Chimie studiosi, quorum prouentu non paruo gaudet hæc ætas nostra, qui Viri cum sint naturæ exploratores strenui, & experientiam cum ratione coniungant, in rem physicam momenta non exigua proferre videntur: nam dum artem auri conficiendi quærunt experimenta naturalia mirifica, & arcana auro æquiparanda aut fortasse etiam præferenda inueniunt. Hi communiter cælos tres agnoscunt, Empyreum, Sidereum, Aërium, omnes eiusdem materiæ, dicuntque Solem planetasque reliquos vi quadam magnetica in limpido æthere suspensos teneri, & à Sole reliquos planetas tanquam asseclas in immensis cælestis auræ spatijs circumferri.

II.

1 Et quia ipsi Quintæ quam extrahunt ex rebus essentia virtutem mirificam experiuntur; idcirco cæli & cælestium essentiam ab illo spiritu haud differre, putant, quem ipsi è corporibus terrenis eliciunt, & ob naturæ excellentiam, vim & viuacitatem quam ostendat, essentiam quintam seu cælestē appellāt.

10 A S T R O L O G I.

Eandem sententiam, de Sole igneo, stellis frigidis, aut medio modo sese habentibus, itemque cæli saltem planetarij mobili fluxaque materia, ex Ptolemaeo, aut supponunt aut docent, plerique Astrologi, atque Ephemeridum cōcinnatores, vnde stellis tam mirabiles naturas, proprietates, atque affectiones tribuunt.

Scriptores Physiologi de Cometis
caelestibus.

25 Conspirant in hanc eandem doctrinam omnes illi, qui cometas in cælo nasci, & super planetas, vel cum iisdem circumferri docuerunt, Cuiusmodi præter aliquos ex enarratis enumerantur, Ficinus, Plinius, Albumasar, Cardanus, Hipparchus, Anaxagoras, Democritus, Hyppocrates, Apollonius, recentiores plerique. Et apud Raphaële Auersa, Philos. tom. 2. quæst. 32. sect. 6. Antonius Mizaldus in Planctologia, c. 3. Et Paradoxo 2. de Rebus Cæli.

35 Nam quod aliqui è minutijs quibusdam inter obseruandum vel neglectis vel non satis accurate perpensis, Tychonis idcirco nomen proscissum eunt atque magnitudinem viri apud alios imminutam esse concupiscunt ij, hac tantilla re, neque illi multum, neque veritati quidquam detrahunt, neque sibi stabile quid certive acquirunt: argumentationes enim ad hominem raro vniuersim probant. Maiora fecit Tycho, quam quod Cometas cælo intulit, confectaria sunt hæc laborum ipsius. Errores Erronum cælestium, præsertim, 45 Martis multis gradibus deuiantis, emendauit, Aequinoctia temporumque rationes restituit, Stellas Firmamēti numero auxit, Venerē, & Mercuriū Soli circumposuit, Studium deniq. Astronomiæ restau-

I.

restauravit in se, excitavit in alijs, ut p-
inde gratias maiores illi debeamus, quā
similes referre. Qui observandi labores
experientia propria didicit, & molestias
annexas degustavit, is sudores Tycho-
nicos pro dignitate melius aestimabit:
quanquam hæc non affero, ut ipsius si
quos contraxit naevos, propugnem: sed
ut erga bene meritum de re Astronomi-
ca, grati animi significationem depro-
mam; L. Annæi Senecæ prouocatus e-
xemplo: qui libro sexto naturalium
quaestionum, cap. 5.

[Cum excusatione, inquit, veteres au-
diendi sunt. Nulla res consummata est,
dum incipit. Nec in hac tantum re,
omnium maxima atque inuolutissima,
in qua etiam cum multum actum erit,
omnis tamen ætas quod agat inueniet,
sed in omni alio negotio, longe semper
à perfecto fuere principia. Noua omnia
erant primo tentantibus, post eadem
illa limata sunt & si quid inuentum est,
illis nihilominus referri debet acceptum,
Magni animi res fuit, rerum naturæ la-
tebras dimouere, nec contentum exte-
riori eius conspectu, introspicere, & in
deorum secreta descendere. Plurimum
ad inueniendum contulit, qui sperauit
posse reperiri. Hæc ille: quæ pro Ty-
chone in gratiam vel potius ruborem
eorum recitavi, qui tam huius quam
aliorum labores sanè viles vellicare
non verentur, cum ipsi de suis inuen-
tis in commune nil possint aut conferre
vnquam audeant. Scilicet est leuius di-
cere quam facere: laudabilia carpere,
quam laude digna parare. Si conatus
serius in magnis commendationem
meretur; qua tandem reprehensione
dignus est; qui ab alijs recte inuenta
maledictis proscindit?

Interim siue errauerit aliquando Ty-
cho siue non; Cometas aliquos certe
supralunares esse, apud Astronomos in-
dubitatum, & nunc communis recep-
tissimaque illorum est doctrina, neq; so-
lide contrarij posse facile crediderim:
huius rei exemplum recens habemus in
Cometa anni 1618. quem probati
astronomi omnes in cælum colloca-
runt.

Et hanc quidem vti & de cælorum li-
quiditate sententiam tenent communi-

II.

ter, hac ætate nostra Mathematici,
In Germania, Belgio, Rheno, Gallia,
Italia, Hispania, Lusitania, & alibi ad
primum vsq; orientem. Sinarum quippe
populi, cum Academijs florentissimis
in infinitis abundant, in nulla tamen illa-
rum, vnquam de incondita ista cælorum
duritie quidquam docuerunt, quemad-
modum ex libris illorum amplius abhinc
quam bis mille annis editis constat.
ex quo sane antiquissima de cælo li-
quido sententia, & naturali quasi lumi-
ne omni nationi insita haud parum
probatum.

In qua Sine omnes adeo immoti per-
sistunt, vti contrariam à ratione pror-
sus alienam existiment, & in suis pro-
uincijs hanc veluti nouam & exoticam
de cælorum multiplicatione & duritie
doctrinam, Mathematicæ suæ tot an-
norum experientia confirmatæ, repu-
gnantem ab aduenis, introduci, & sibi
persuaderi non sinant, prout qui ab illis
redierunt, referunt.

P. IOSEPHVS Blancanus in Sphæra,
& in explicatione locorum Aristotelico-
rum in locum Aristotelis, vbi docet A-
stra Cælo infixæ volui. [Hæc quidem
Aristotelis ait, consentanea sunt ob-
seruationibus veterum Astronomorum:
at vero nostræ ætatis obseruationes re-
pugnant, præsertim illæ, quæ fiunt cir-
ca stellas errantes, ex quibus fatendum
esse videtur, cælum qua parte planetas
continet liquidum esse, ac per illud pla-
netas proprio motu progredi &c. & statim
subdit, his obseruationibus conantur re-
centiores probare, cælum esse liquidum
atque in eo planetas permeare: quorum
solutio nulla mihi occurrit.]

Pater IOANNES Bapt. Cysatus in
Cometa anni 1618. ait, Cometas in
limpidissima Aetheris expansione suos
choros peragere, phrasi vsus Platonica.
Et hoc ipso quod illum Cometam in
cæli regione tam varios motus qui vllis
cælorum orbibus attribui nequeunt, ad
omnem loci differentiam sese dilatan-
do habuisse demonstravit, credunt
multi cælum non durum, sed necessa-
rio permeabile fuisse.

Eadem supponit & docet sæpe in
suo Lothario noster Horatius Grassius.

H h h h 2 Eadem

Academia
apud Sinas
cælum liqui-
dum ab an-
tiquo tenet.

Iosepbus
Blancanus.

Inuentori-
bus primis
etiam posse
rorū elima-
tiones, sunt
imputanda.

I.

Eadem alij alibi publicè euulgatis Theſibus, aut ſcriptis alijs frequenter tradiderunt: quibus, ne longior ſim, allegandis ſuperſedeo. Vnum enim uero, quem pridem productum oportuit, tacitus præterire, neque uolo neque debeo.

CHRISTOPHORI CLAVII DE Cæleſtibus nouitatibus iudicium.

Chriſtophorus nimirum Clavius vir iudicij acerrimi, Tomo 3. edit. Mogunt. pag. 104. & 105. in primū cap. Sphærae, Ioannis de Sacro Boſco, agens de noua ſtella, quæ anno 1572. in Caſſiopeia apparuit, poſtquam de loco eius in cælo multa diſputaſſet, quid de Cometis, & materia cæli hinc ſentiendum cenſeat, ita declarat.

[Itaque ut breuiter quod ſentio dicā cenſeo ſtellam illam, quæcunque illa fuerit, in firmamento, ubi ſtella fixæ ſunt, exiſtiſſe. Nam eam in regione ætherea, & non in elementari apparuiſſe, conſtat ex ijs quæ paullo ante in conſutatione tertiæ ſententiæ, eorum nimirum, qui eam Cometam faciebant in ſuprema æris regione exiſtente adduximus: propterea uidelicet, quod in ea non ſit depreheſa aſpectus diuerſitas. & paullo poſt. Iam uero ut credam ſtellam illam nouā in firmamento non in alio quouis orbe cæleſti exiſtiſſe, hoc maxime adducor argumento, quod neque ego, neque ullus omnino Aſtronomus, quod quidem ſciam, alium motum in ea animaduertiſſet, præter eū, quæ in fixis ſideribus obſeruamus. Nam conſtātem ſemper motum, eundēq. plane ſitum inter alias ſtellas fixas totum biennium (tamdiu enim ferme durauit) retinuit. Quod ſi in orbe alicuius planetæ fuiſſet, cum orbis ille ſane alienum à ſtellis fixis motum habeat, procul dubio & ſtella ipſa eundem motum curſumque habuiſſet: ſecus autem rem ſe habuiſſe, Aſtronomi deprehenderunt. Atque hoc idem argumentum euidenter concludit, multo minus ſtellam illam in elementari regione exiſtiſſe: quod ibi nulla ratione eundem ſemper ſitum, ac diſtantiā cum ſtellis fixis potuiſſet retinere.

Quæ cum ita ſint, ita mihi perſuadeo, ſtellam illam uel tunc à Deo Opt. Max.

II.

1 procreatam eſſe in cælo octauo, ut magnum aliquid portenderet (quod cuiusmodi ſit adhuc ignoratur) *vel certe in ipſo cælo gigni poſſe Cometæ, ſicut in aëre.*
 5 *licet rarius id contingat:* quod quidem aperte fatentur non pauci ex antiquis philoſophis, multique ex recentioribus complures auctoritates & hitorias adducunt, quibus perſuadeant, ſæpius ſtellas eiſmodi longis temporum interual-
 10 lis, alias ad aliud ſignificandum, in cælo exortas eſſe. Hoc ſi uerum eſt, *uideāt Peripatetici, quomodo Ariſtotelis opinio- nem de materia cæli defendere poſſint.* Di-
 15 *cendum enim forteſſe erit cælum non eſſe Quintam quandam eſſentiam, ſed muta- bile corpus, licet minus corruptibile ſit, quam corpora hæc inferiora:* quod ſane ante Ariſtoelem Plato cum multis alijs
 20 philoſophis ſenſit, & poſt Chriſtum nō pauci, inter quos B. Ambroſius, Baſilius, Gregorius Niſſenus, & cætera fere Ec- cleſiæ lumina non obſcure docuerunt. Et pag. 221. Idem, inquit, dicendum eſt,
 25 de ſtella illa noua, quæ (ut ex Germania ad me perſcriptum eſt) anno 1600. in Cygno iuxta eam, quæ in pectore lu- cer apparuit, & adhuc perſeuerat. Item
 30 de alia, quæ primum anno 1604. in Mēſe Octobri viſa eſt, inter gradum 17. & 18. Sagittarij, habens latitudinem bo- realem gradus 2. aut circiter: quamuis nunc ita (cum hæc ſcribo) imminuta ſit, ut uix appareat. Idem, inquam di-
 35 cendum eſt. *Vtraque enim ſtella propter eadem argumenta in firmamento collo- canda eſt, propterea quod ubiuis locorum in eadem diſtantiā ab alijs ſtellis fixis de- preheſa eſt, ita ut nullam admiſerit a-*
 40 *ſpectus diuerſitatem, & nullus alius mo- tus, præter eum, quem in ſtellis fixis nota- mus, in ea eſt animaduertus.]* Et hæc qui- dem Clavius viſis tot nouis in cælo ſeu ſtellis, ſeu cometis, de cæli materia, &
 45 corruptibilitate philoſophatus eſt: qui ſuccedente deinde tempore, poſt illatū Orbi nouum Tubi optici oculum, de tota cæli machina, à ſe tot orbibus tam laborioſe conſtructa addubitare, noua-
 50 que erigenda Aſtronomos, ipſe iā uere- ranus & rude donatus militiæ Magiſter excitare cepit, ſic enim tomo eodem, pag. 75. ſcribit.

55 [Nolo tamen hoc loco Lectorem la- tere,

Cælum non eſt Quinta eſſentia.

Stella noua in Cygno, & alia in Sagittario etiam in Fir- mamēto col- locanda eſt.

I.

tere; non ita pridem ex Belgio appor-
tatum esse instrumentum quoddam in-
star tubi cuiusdam oblongi, in cuius ba-
sibus compacta sunt duo vitra seu per-
spicilla, quo obiecta à nobis remota val-
de propinqua apparent, & quidem lon-
ge maiora, quam re ipsa sunt. Hoc in-
strumento cernuntur plurimæ stellæ in
firmamento, quæ sine eo nullo modo vi-
deri possunt, &c. Luna quoque quando
est corniculata aut semiplena, mirum in
modum refracta & aspera apparet, ut
mirari satis non possim, in corpore luna-
ri tãtas inesse inæqualitates, &c. & post.
Inter alia quæ hoc instrumento visun-
tur, hoc non postremum locum obti-
net, nimirum Venerem recipere lumen
à Sole instar Lunæ, ita ut corniculata,
nunc magis nunc minus, pro distantia
eius à Sole, appareat. Id quod non semel
cum alijs hic Romæ obseruavi. Deinde
cum Saturni duos comites, & Iouis qua-
tuor Satellites recensuisset, ita cõcludit.
*Quæ cum ita sint, videant Astronomi, quo-
modo orbes cælestes constituendi sint, ut
hæc Phænomena possint saluari.*

Si Clavius hinc visis nouitatibus, Sy-
stematis & materiæ cælestis immutan-
dæ cogitationes suscepit, quid non fe-
cisset visa tanta Phænomeni solaris, ea-
que continua varietate? Illud certè,
quod olim in cap. 4. spheræ, pag. 300.
per modum repugnantis scripsit, nunc
adhortatione seria sui, huiusque disci-
plinæ studiosis inculcasset.

Si commodiorem, inquit, viam ha-
bent, exhibeant illam nobis (Astrono-
mi) contentique erimus, & illis maxi-
mas agemus gratias. Nihil enim aliud
contendunt Astronomi, quam ut om-
nia Phænomena in cælo quam commo-
dissimè tueantur, siue hoc fiat per Ex-
centricos orbes & Epicyclos, siue alio
modo.

SCHOLIUM IN DICTA CLAVII.

Nota Lector Clavius (uti non tan-
tum ipsius scripta satis attestantur, sed
viua etiamnum supersticum oracula,
vnanimiter de ipso enunciant) in profe-
renda, de rebus præsertim dubijs & cõ-
trouersis sententia admodum cautum
& circumspectum fuisse. Cumque stel-

II.

1 lam anni 1572. in cælum tam asseue-
ranter posuerit, cogitandum non est,
id ab acerrimi iudicij Viro, incogitan-
ter atque sine fundamentis certissimis
5 solidissimisque factitatum esse. Neque
enim rem tantam ex auditu visuque
alieno, sed obseruatione propria eaque
frequente comprobauit, prout ipse de
se clare & sæpe testatur.

10 Argumenta autem Clauij quibus ip-
sam cælo infert, sunt duo præcipue.
Alterum quod in locis Europæ diuer-
sissimis in eodem Cassiopeiæ loco & si-
tu simul sit deprehensa ab Astronomis
15 peritis: alterum, quod neque Ego, inquit,
ipse, alium motum in ea animaduertentim,
præter eum, quem in fixis sideribus ob-
seruamus. Nam constantem semper mo-
tum, eundemque planè situm inter alias
20 stellas fixas totum biennium (tamdiu e-
nim ferme durauit) retinuit.

Nota Lector, verba Clauij, constan-
tem inquit semper, semper constantem
motum noua stella inter stellas fixas
25 per totum biennium retinuit. Semper
inquit retinuit constantem motum, ab
hoc constanti motu non recessit vn-
quam tempore vllò, non æstate, non
hieme, non vere, non auctumno; non
30 in ortu, non in meridie, non in occa-
su, non in media nocte; non altissima,
non humillima, non mediocriter supra
horizontem eleuata: vno verbo semper,
semper eundem & constantem motum
35 exhibuit, quem ipsæ fixæ, cum quibus
in Cassiopeia ferebatur: sed & eundem
semper planè situm cum iisdem & ad
easdem retinuit, atque ipsi Clauio Ro-
mæ obseruanti per biennium constan-
tissimè ostendit. quæ sane simpliciter
40 impossibilia sunt, si stella illa vllam len-
sibilem, qualis etiam Lunaris est, pa-
rallaxim subiuit. Nam & motum quo-
tidianum inconstantem atque à sideri-
bus in Cassiopeia constitutis diuersum;
45 & situs atque configurationis mutatio-
nem omnino vel ipso libero aspectu per-
ceptibilem euenire oportuit: quod cum
Clavius vna cum oculatissimis illius tẽ-
poris astronomis constantissime neget;
50 plus credo ipsis negantibus, atque adeo
stellam ex hoc consensione sũma in cæ-
lum reponentibus; quam contrarium,
55 quibuscunque friuolè opinantibus.

*Clavius stel-
lam anni
1572, ipse-
met obser-
uauit.*

I.

Clauium hæc Romæ scribentem paullo post, anno huius sæculi 1613. quando Telioscopij admirabilis efficacia maximos in eruditorum animis motus efficiebat, excepere theses Parmenses in Academia publice disputatæ, è quibus in rem nostram sequētes decerpere visum est.

Noua in Cælo Phenomena antiquas hypotheseas dubias reddunt.

In Naturalis Philosophiæ libro secundo, capite primo, Thesi 293. & 294. pag. 51.

[Astrologia, inquit, Cælorum altitudinem, situm, interualla, figuram, motum, seu potius astrorum attentissime rimatur, &c.

Siderum, inquam, potius quam Cælorum: quæ enim superioribus sæculis de cælestium orbium numero, & qua idem centrum cum terra totaque hac rerum Vniuersitate habent, & qua Eccentrici dicuntur, deque Epicyclis rectè constituta videbantur; noua sydera in dubium reuocarunt: tum quæ incertis temporum interuallis sub omnium aspectum veniunt, mox recedunt: tum quæ circa Iouem inclusa bicubitali tubo perspicilla demonstrarunt.

Ibidem Thesi 295. Ergo de Astris Astrologia sit, deque Astrorum Principe Sole, cuius luce non solum Luna, statim incrementis ac decrementis lucet; sed etiam Venus. Quid quod idem Sol crebris Maculis aspergitur? certe opacum quid opponitur, ut sit adhuc incertior Astrologia secundum antiquam ac iam receptam cælestium orbium dispositionem. De Cælorum vero distinctione, magnitudine, item solidine sint, an fluentes, videant Astrologi quid pronuncient.

Materia cæli eadem quæ sublunarium.

Idem libro secundo, capite decimo tertio, pag. 114. Thesi 736. Denique etiam placent, qui in cælo materiam ponunt eiusdem cum nostra nature, &c. Aegydius tractatu de Materia Cæli, Scaliger exercit. 61. & his antiquiores Nominales, Okam, Gabriel, & complu-

II.

res Scriptores in Sacram Genesin.

Ibidem Thesi 740. Denique cum quis asserit cælestem materiam cur reliqua conuenire, Scoto interprete, ratisper digreditur ab Aristotele, ut accedat ad veritatem: ait enim verè id dici, sed non ex mente Philosophi. Sed quid si ea materia à cælesti forma actiuata, naturam non mutet quidem, unde dici queat homogenea inferiori, mutet verò naturæ conditiones, & ex his materiæ nomen amittat; unde dicatur non esse, vel minus rationis eiusdem. Ego sic assero, & hanc sententiam dum tueor, sic Aristotelem interpretor.

Ibidem pagina 115. Thesi 742. Si tamen placeat altera pars, quam noua nouorum astrorum ostenta, nouique eorundem motus persuadent; vna est cælo materia, eademque homogenea in toto illo spatio, quod ab imo astrorum domicilio vsque ad supremum est. per hanc fluentem & liquidam astra feruntur, vnumquodque eo cursu, in quem intelligentia direxerit.

Ibidem Thesi 743. Et quia violentum esse hunc motum credibile nō est, astra, quæ non eundem seruant motum, inter se specie differre, credibile est, itemque à cæli substantia, in qua non nisi locum habent, sicut in mari pisces.

Ibidem Thesi 783. Mouentur ergo siue astra, siue cæli ab intelligentijs, tanquam principio extrinseco.

Ibidem Thesi 788. Si nullam facias orbium partitionem, sed astra per liquidum eant, nihil item censeo repugnare, ab vna intelligentia plurium Astrorum quasi chorum duci.

Ibidem libro secundo, capite decimo quarto, Thesi 828. Antiquissima sententia est, amplissimum esse ignis locum supra aërem, huiusque densiores illustrioresque partes esse ipsa astra. Nec plane antiquata est hæc sententia, quam contra Aristotelem, Aristotelis Interpres, Philoponus asserit veram esse. Commentar. in prim. Meteor.]

Antoni

Astra in cælo fluido incedunt, sicut pisces in mari.

Astra ignea.

I.

ANTONIUS MAGINUS CAELVM
liquidum admittit.

ANTONIUS Maginus nobilissimus
nostri temporis Mathematicus, præci-
puusque cælorum durorum protector
& multiplicator, tandem in Systema
& sententiam quoque Tychonis con-
cessit, cælumque fluidum seu spirabile
complexus est.

Denique hæc sententia videtur nunc
communis & omnium Astronomorum
recepta doctrina, qui contrarium tenen-
tes vtcunque admirantur, propterea,
quod veritatem, vt ipsis videtur, planā,
Sacra Scripturæ & Sanctis Patribus cō-
formem, rationibus firmissimis stabili-
tam, experimentis irrefragabilibus in-
structam, absque caussa sufficiente re-
pudient. Præsertim cum Mathematici,

*Argumenta
Astronomo-
rum pro cæ-
li duritia
& orbibus
caelestibus hy-
pothetica &
ad hominem
potius, quā
absoluta.*

cæli duritiem, nisi hypothetice, si scili-
cet sphaeræ siue orbis discreti sint asse-
rendi, nunquam admiserint, sed solos
Motus, & Theorias circulorum imagi-
narias, cum Ptolemæo protulerint. Po-
sitos autem, cælos physice duos esse,
necessario vt motuum apparentiæ sal-
uentur, orbis reales statuendi fuerunt;
& rursus, si orbis reales discreti intro-
ducendi fuerunt, id absque cæli duritie
fieri non potuit. Et tales quidem A-
stronomorum argumentationes contra
Physicos semper fuerunt & adhuc sunt.
Si cælum durum est, orbis excentrici
atque epicycli reales discreti necessario
dantur: Et conuertendo: si orbis excen-
trici atq; Epicycli discreti dantur, cælum
durum esse oportet: atqui priora sunt
secundum Physicos; ergo & postero-
ra. Cæterum neque Cælum durum, ne-
que orbis istos reales posse statui, o-
stendunt Astronomi ex tot & tam va-
riis Phænomenis, eo quod sine mutua
corporum penetratione isthæc asseri
nequeant. De qua re, noster Blancanus
in sphaeræ, parte 3. capite 4. ita monet.

*Iosephus
Blancanus.*

[Sciendum igitur primo est, veteres
Astronomos, Hipparchum, Ptolemæum
& alios, de hac cælorum distinctione, ni-
hil certi locutos esse, vt videre est apud
Ptolemæum & alios; verum ipsi hypo-
thetice loquebantur, id est, posita tali
cælorum diuisione aut numero excusan-
tur apparentiæ & obseruationes. imò

II.

ipsi, vt videre est apud Ptolemæum, &
Proclum, hæc cælorum fabricas hypo-
theses vocabant, hodieque eruditiores
vocant. Hanc vero opinionem de reali ca-
lorum distinctione in populum sparsere o-
lim Eudoxus & Calippus, & postea semi-
prisci, ac semibarbari scriptores tractatu
de sphaera, aut de Theoricis planetarum,
qui vt populo atque aliis Astronomia i-
gnaris res miras venditarent, tales cælo-
rum constructiones, eccentricis, atque
Epicyclis veris, & realibus refertas pro-
palarunt, & quas veteres hypotheses ap-
pellabant, ipsi successu temporis tanquā
assertiones sine vlla euidenti ratione e-
nunciarent; iisque simpliciores ac rudio-
res fidem vltro adhibuerunt, adeo vt phi-
losophorum etiam complures iisdem paul-
latim assenserint.

Ex hac cælorum hypothese in asser-
tionem transformata, factum est etiam,
vt complures cælos ad inuicem non so-
lum diuisos, sed etiam duos esse dedu-
xerint: dum enim intelligebant cælorū
distinctionem atque eorum munia in
astris deferendis, consequenter etiam
de eorum soliditate philosophati sunt.
Verumenimvero antiquorum ac recen-
tiorum doctissimi, vt sunt Ptolemæus,
Copernicus, Tycho & alij, per solas li-
neas, aut circulos, motus planetarum
optime explicarunt, vt in eorum monu-
mentis videre est.] Hæc ille.

Quidam insignis Theologus, in suo
hac de re discursu, [Arabes, inquit, ma-
xime qui in Hispania late imperio flo-
ruerunt, in Astronomia Ptolemaica
multum operæ studijq. posuerunt. At-
que vt erant Barbari & agrestes, quæ il-
le circulis ac lineis designauerat, ea di-
xere solidis in cælo globis expressa con-
sistere: seu quod ita putarent, seu quod
ea facilius videretur ista intelligendi ac
tradendi via. quo paulatim inualescē-
te figmento, & barbaris alijs alios, vt
solent pecudum more sectantibus, om-
nium fere Astronomorum illius generis
auctoritate firmata cæli durities vulgo
plaudente concreuit. Postquam igitur
ex Arabum manibus ac lingua Aristo-
teles, Ptolemæus, ac boni auctores in
Latium euasere, detulere secum com-
mentaria Scriptorum Arabum: atque
adeo infedere nostrorum hominum
animis

*Hypotheses
Astronomo-
rum nil po-
nunt reale
necessario.*

*Auctores
cæli duri.*

*Quomodo
cæli durities
per Arabes
introducenda
sit.*

I.

animis eadem illæ de adamantino cælo
fabulæ: quas facile quidem fuisset de-
prehendere, nisi temporum illorum, fa-
talis quædam barbaries obstitisset.

Scholasticis ergo, quibus vnum ne-
gotium est diuina speculari, sapienter
visum est hisce in rebus, quæ ad Theo-
logiam non magnopere pertinerent, ea
quæ ab Astronomis dicerentur ample-
cti. Quin Sanctus Thomas alicubi cæ-
lum stabile aliqua ex parte agnouit,
quia id Astronomi dicerent. Nam uti
probarer Empyreum posse liquidum
esse, & tamen incorruptibile, in 2. dist.
2. Sicut, inquit, Astrologi, inter duas spha-
ras, quæ scindi nequeunt, aliquod ponunt
spacium repletum corpore diuisibili, cum
in spacio illo sit motus planetarum in
Epicyclo.

S. Thomas
spacium E-
picyclo
corpore di-
uisibili a-
deoque li-
quido reple-
uit.

Hæc de Scholasticis adiungere pla-
cuit: non esset tamen adeo absurdum
aut insolens, Si ut Sanctus Thomas in
2. distinct. 14. quæst. 3. auctoritatem
Patrum cælum corruptibile ponentium,
reijcit hoc nomine, quod illi ex Plato-
nica disciplina erant: ita scholasticorum
nos testimonium reijceremus, cælum
durum esse dicentium, quod hi coacti
fuerint id dicere, cum hoc Aristoteles
dixisse tum putaretur. Hæc ille.



II.

Qui deinde mox Proposit. IX. fuisse &
ex instituto probat, [cæli duri aucto-
res maximè fuisse fabulosos poëtas, ut
in cælestium domorum descriptione eo
amplius oblectarent rudem plebeculā:
tum deceptores Cabalistas, qui nescio
quibus coloribus, duodecim cæli tabu-
las à se ad Aræ similitudinem confi-
ctas depingunt: & tandem superstitio-
sos Magos, qui easdem litteris & cha-
racteribus maleficis, inscribunt: è qui-
bus tam hi quam illi sua figmenta ad
infatuandos imperitos artificiose atque
fraudulenter colorant. Hinc ortæ cum
aliæ multæ ineptiæ, tum illa maximè,
quæ Imagines astronomicas pingit, quas
Arabes vocant Talismanicas, Græci ve-
ro *σοφία*. Nam cum imagines cælo in-
sculptas non inertes otiosasve sibi per-
suasissent, sparsere in vulgus mira, ac
prodigiosa posse effici, si quis eadem
figura, quæ cælum esset insculptum, la-
pidem cælatum gestaret] Atq. in hunc
quidem sensum plura docte contra ho-
sce fumiuendos ille disputat: à quorum
fraudibus sibi nihil timent, qui cælum
fluidum agnoscunt. Nunc vnā alte-
ramve obiectionem oportet diluere, ex
eorum qui illud liquidum statuunt sen-
tentia.

Cæli duri
auctores Fa-
bulosi poëta
& Supersti-
tiosi Caba-
listæ.

Obiectio-

Obiectiones contra cælum fluidum diluuntur, & Libro finis imponitur.

CAP. XXX.

I.

OBIECTIO PRIMA.

Ex Nomine Firmamenti.



CAE L V M dicitur in sacra Scriptura Firmamentum, ergo est durum, non liquidum. Respondent contrariae sententiae assertores, Concesso antecedente, negando consequentiam. Quia nomen hebraicum *רַקִּיָּה* Rakiah, attenuationem atque expansionem, non duritiem sonat: ex aqua enim aut alia liquida substantia, factum attenuatione quadam esse cælum. Septuaginta autem verterunt *σφιγγύς*, ut trinam caelestis corporis dimensionem declararent, quod & Gellio teste, lib. 1. cap. 20. latine solidum dicitur; solidum enim, ut ex Plinio notavit Henricus Stephanus, vacuo & cōcauo opponitur, & trinæ dimensionis continuationem denotat. Sancti Patres, uti ex adductis patuit, aiunt cælum firmamentum dici, non quia durum, sed quia terminus atque limes intransgressibilis a Deo constitutus sit, inter aquas superiores & inferiores, &c.

OBIECTIO SECVNDA.

Iobi cap. 37. ver. 18. *Cæli dicuntur solidissimi, tanquam ære fusi*. Ergo sunt duri.

Respondent communiter contrariae sententiae auctores.

Primo. Eam sententiam non esse Iobi, sed Eliudi ex eius amicis Sophistæ, quem Deus reprehendit, *Quis est hic inuoluens sententias sermonibus imperitis?* Itaque non sequitur illam sententiam esse canonicam.

II.

Secundo. Per cælum hoc loco intelligitur aër, ut omnes fere Græci atque Hebræi interpretes docent, præter Leui filium Gerson. ita Biblia Tigurina, ex Paraphrasi Chaldaica, sic explicante nostro Patre Pineda, & alijs in hunc locum. Nam toto eo capite de cælo aëreo tantummodo sermo est. Miratur autem Eliud aërem posse sustinere nubes maximas, non secus ac si æneus esset: certe vox hebraica *רַקִּיָּה* Sachak, quæ in sacris litteris vicies legitur nusquam aliud significat, quàm aërem, & nubes.

Tertio. Si hoc loco de cælo siderio ageretur, posset hoc testimonio maxime probari cælum siderium esse stabile ac liquidum. Nam quod hebraice est *רַקִּיָּה* Tarkiah, latine fabricatus es, verti potest ad vocis sonum, attenuasti. Et quod sequitur, solidissimi sicut ære fusi, Septuaginta verterunt, *validi sicut aspectus effusionis*; in Hebræo *fortes sicut visio fusilis*: ex Græco, *fortes ut inspectiones infusionis vel effusionis*. Quia tamen ea effusio constans est atque perpetua, ideo eam æri comparauit noster interpres, non duritiem in ære, sed stabilitatem quærens. Sciendum

Pineda.

Augustinus
Torniellus.

ergo, inquit Pineda, multum commendari Creatoris potentiam atque sapientiam, quod non minus constans perpetuaque sit res fluxa & labilis, quam solidissima ex ære fusa esset, &c. Et Augustinus Torniellus to. 1. Annal. sacrorum, fol. 32. Sed si citata verba, inquit S. Iob (ut multi probatique auctores tradiderunt) ita interpretari debent, ac si dicere voluisset, quod cæli licet videantur, sintve substantiæ ad modum aëris & fumi, fluxæ, mobilis, labilis, leuissimæ, ac tenuissimæ: nihilominus per diuinam potentiam sic sunt durabiles atque perpetui tanquam si ex durissimo ac solidissimo ære fuso, concretoque conflati essent: si, inquam

hic

I.

hic est legitimus ac verus prophetae sensus, utique cessant omnes memoratae difficultates, & cuncta redduntur consona, ita ut nihil prohibeat dicere cum Philosophis, astra quidem esse propriis calis densiora & solidiora, calorum vero substantiam (ut ex allegatis Isaiae verbis colligunt citati Patres, & ex adducta verborum S. Iob expositione elicitur) esse subtilissimam & ubique peruiam, quemadmodum tam multi ac varii motus Astrorum, quae per ipsam circumferuntur plane indicant, non tamen ipsis astris minus esse durabilem, ac perpetuam. Fusio-rem tam huius argumenti, quam aliarum obiectionum, solutionem qui vult, adeat Merfennum ubi supra cap. 27. ex ipso nonnihil citavi, adeat alios Peripateticos, qui passim in hoc responso conveniunt.

Alias etiam obiectiones sibi quisque facile, vel soluet, vel etiam pro sensu suo faciet. Nunc promissas cap. 26. pro caelo liquido auctoritates, ex sacra Scriptura adduco, & fidem datam libero, Librumque finio.

Genesis cap. 1. ver. 1. & 2. [In Principio creavit Deus caelum & terram. Terra autem erat inanis & vacua, & tenebrae erant super faciem abyssi, & spiritus Dei ferebatur super aquas. Dixitque Deus, fiat lux & facta est.] Habes hic omnia liquida, praeter terram, quam ambit abyssus aquarum fluidarum, hac circumdat spiritus Domini siue aer, uti sancti Patres & Scripturae expositores quamplurimi, inter quos & Augustinus, optime interpretantur; aeri superadditur lux, siue ignis, ex eorundem sensu: cui superstat caelum empyreum, intra cuius sinum seu superficiem infirmam concavam, omnia usque ad terram sunt liquida. Quarum aliqua, an, quando, quomodo & qua de causa obdurerint, in soliditatem nescio quam adamantinam, ut quidam volunt, scripturae non indicant, si Patrum auctoritate Scripturas rimantem, prout visum, consulimus.

Accedit quod ipsi, qui caeli duritiem mordicus propugnant, ultro dant, Caeli Emphyrei spacium intermedium corpore quodam spirabili plenum; & reliqua omnia in mundi creatione ad terram

II.

usque fuisse fluida, rursusque talia secundum suam naturam post extremum Iudicii diem futura & in aeternum permanitura: dura autem fuisse, dum mundus iste ad usum hominum serviret. Igitur caelum contra naturalem suam inclinationem secundum hos induratum est, toto Mundi utilis tempore; quando autem homini servire desinet, ad naturam fluidam redibit. De his Aristoteles nil somniauit, qui caelum immutabile simpliciter docuit, &c.

Accinit praefato textui, Salomon in Prouerbijs cap. 8. ver. 27. & 28.

15 [Quando praeparabat caelos (inquit diuina Sapientia) aderam: quando certa lege & gyro vallabat abyssos: quando aethera firmabat sursum.] ita vulgata editio. Pagninus ex Hebraeo sic vertit.

20 [Quando praeparabat caelos ibi eram; quando describebat circino superficiem voraginis. Quando firmabat caelos desuper. Quando roborabat fontes voraginis.] Septuaginta vero pro caelo liquido valde clare ita loquuntur: [Cum pararet caelum aderam illi, Et cum secer-
neret sedem suam super ventos, & cum, validas faceret desuper nubes.] Hunc locum, quia tam validus & liquidus est
30 pro caelo Firmamenti liquido, aliqui in aliam lectionem commutare conantur: sed iussu Sixti Quinti Biblia Romae 1588. edita, ita, sicut citavi habent.

Consentiunt Aquila & Symmachus
35 [Cum secerneret turrin suam super ventos.] Nec dissentit Aries Montanus, qui sic vertit Septuaginta interpretes. [Quando praeparabat celum simul aderam ipsi, & Quando secernebat suam sedem super ventos.] Caietanus apud Ferdinan-
40 Quirin. de Salazar, illa verba, aethera firmabat sursum, de Caelo extremo interpretatur, scilicet aut de primo mobili, aut de Caelo Emphyreo. Caietano Rabi-
45 bini atque alij multi Doctores suffragantur: quos laboriose attexere non est opus. Auctores tot, & auctoritates tam solidas, pluribus velle stabilire, esset meo iudicio, & illis veluti parum firmis, & lectori tanquam indocili, iniuriam nonnullam irrogare.

50 Ceterum, [Hae sunt (ut auctoritates cum Auctoritate Senecae, libro septimo naturalium quaestionum cap. 29. concludam)]

I.

cludam) quæ aut alios mouere ad Co-
metas (ad solare Phænomenon) perti-
nentia, aut me. Quæ an vera sint, di-
scutiant, quibus est sententia tueri. No-
bis rimari illa & coniecturare in occulto
tantum licet. Quandoquidem non de-
sunt alij, qui contrarium sentiant, &
has auctoritates interpretentur, atque
alias in suam sententiam afferant, quas
hic recensere non est otium, videat qui
vult apud Tannerum in Dissertatione
de Cælis. Quid autem ego sentiam, alio
tempore & scripto in hunc finem dige-
sto, Deo fauente & Superioribus ap-
probantibus, aperiam. Nunc enim in-
re graui & plerisque noua, temporisque
angustia tanta, non videtur consultum
decisionem meam interponere, & alijs
velut omne in iudicando libertatis filij
præscindere, neque rem vlllo modo de-
finire: præstat etiam cordati Lectoris
ingenio suum cursum relinquere. Ego
mihi sufficiens operæ prærium prestis-
se hac vice videor, si apparentiam ex se
inuentu difficilem ad eam facilitatem;
tractatu obscuram, ad eam claritatem
deduxi, quam quilibet in hisce versatus
desiderare potest: si proprietates ipsius
potissimas delibauim, & apparentes effe-
ctus in Vrbe atque Orbis amphitheatrum
oculis eruditotum spectandos palam
produxi, si tandem ipsam ab alienis ob-
locutionibus liberaui. Nunc audire quæ
audiri, & symbolas aliorum corrogare
quam erogare meas paratior sum. neque
enim in sapientissimi huius seculi Litte-
ratorum senatum hac mea scriptione
edicta, sed vota contuli.

*Magnus Aurelius Cassiodorus ex Vrbe
Senatore, & Consule Monachus.
Libro de Astronomia.*

Editionis Aurelianensis 1609. pag. 1127

Nobis (Christianis) sufficit, quan-
tum in Scripturis sacris legitur, tantum
de hac arte sentire; quia nimis indecorum
est, hinc humanam sequi sententiam, un-
de quantum nobis expediat diuinam no-
scimur habere doctrinam.

II.

EPILOGVS TOTIVS OPERIS.

HAbes hic, amice Lector, ex-
pansum tandem ROSAE
VRSINAE sinum, in omnes
effusum, erga vniuersos vbe-
rem, munificum & facundum, fragran-
tiæ suæ suauitate cunctos aspergentem;
neque mirum: Rosa enim hæc Soli æ-
quæua, simul cum illo lucem aspexit,
simul orbem circuiuit, simul infera &
supera non tantum lustrauit, sed & il-
lustrauit, eosdem cum ipso choros, si-
milesque gyros confecit, odorisque &
venustatis suæ magnitudine, ipsos pla-
netas secum per amplissimos illos æthe-
ris campos traxit, hodieque trahit, qui
haustam ab illa virtutem in hæc subla-
naris mundi corpora copiosè infundit;
vt non tantum se ipsa, sed per alios
quoque benefica existat. Quod si Vrsa
in cælos inuecta, regimenque polorum
nacta, noctiuagos hominum terra ma-
rique cursus fidelissimè dirigit; hæc Ro-
sa medium cæli, ipsamque regiam &
gremium Solis adepta, diurnos morta-
lium labores aspectu suo amabilissimo
& afflatu iucundissimo consolatur &
benigne demulcet. Vnde quemadmo-
dum nautæ oculos noctu in Vrsam, ita
Philosophi aciem mentis intendunt in
hanc de die Rosam. Ab hac Astronomi
Systematis motuumque cælestium mo-
tiuæ & subsidia ampla sument; ab hac
Physici cælorum materiem, & continuam
per omnes diffusam substantiam spirabi-
lem inquirent, normamque solidæ
philosophiæ à natura fluxa addiscent;
ab hac è contrario iudicarij suarum
prædictionum vanitates dediscent; ex
hac Ethicus animum suum à rerum ca-
ducarum inanitate, in solum ipsarum
incommutabilem auctorem Deum cō-
uertet, dum neque Solem ipsum hunc
aspectabilem semper eundem reperiet;
per hanc Theologus, lucem sine tene-
bris, candorem sine labe, Deum vide-
licet ipsum, vnum solum requirit; aliud
enim Christiano homini quid splendear,
si Solem ipsum tenebris natiuis imbu-
tum cernat? Ab hac vanus idolatra
suos errores auersetur, qui Solem tantis
varietatibus obnoxium pro Numine
immortali coluit.

Sed

I.

Sed abrumpo, & potentissimos huius ROSAE fructus, Orbi vniuerso præbitos & probatos, neque hoc calamo exarare, neque hac charta complecti, neque ingenio meo adæquare vquam præsumam. Sufficit mihi thesauri huius latebras, & mineræ ditissimæ prægnantes venas aperuisse, pro maiore Dei gloria, qui lucem inaccessibilem inhabitat, ad laudem Christi Solis iustitiæ, in bonum totius Ecclesiæ & rei litterariæ atque Societatis nostræ publicum; cuius communibus votis responsurum me censui, si ipsi huic thesauro cælesti, cælestes ab Vrsis cælestibus tutelas prouiderem. Si, inquam, Illustrissimæ atque Excellentissimæ Domus Vrsinæ gloriam, nobis qua cohonestandis qua fouendis vere Solem, in astrorum Principis Regia, iure meritissimo collocarem, cuius luminibus nullæ inuidiæ nubes, nullæ noctes obliuionis obstruerent: propter tuam denique

II.

1 quisquis hæc legis vtilitatem; quam si consecutus fueris, immortalis Deo, grates debitas vna mecum rependes; si voti compos minus efficiaris, animum certe meum, & promptum tibi gratificandi studium hac in re non defuisse, satis, opinor, superque testatum feci. Romæ partim in Collegio Romano Societatis IESV, partim in eiusdem Domo Professæ, ab anno exeunte 1624. vsque ad annum præsentem 1629, studio quinquenniali indefesso, neque vnquam interrupto. Die 20. Martij.

Iob cap. 38. vers. 33.

15 Nunquid nosti ordinem cæli, & pones rationem eius in terra?

Psal. 148.

Laudate eum Sol & Luna: laudate eum omnes stellæ & lumen.

20 Laudate eum cæli cælorum, & aquæ omnes quæ super cælum sunt, laudent nomen Domini.

Cuius laudem & iste liber annunciet.

OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM.



CV M iam totum opus & scribendo & imprimendo finitum esset, accessi Illustrissimum atque Excellentissimum Principem Federicum Cæsium Lynceum, Principem S. Angeli, &c. acturus pro accepto testimonio, cuius cap. 27. fit mentio, debitas gratias; quod dum agerem, humanissimus Princeps non tantum coram omnia mihi confirmavit, sed & ipsas etiam suas ea de re ad Bellarminum, & huius ad se extare dixit authenticas Epistolas; quarum cum incredibili me teneri desiderio ostendissem, Optimus Princeps voti reum me fecit die 3. Iulij, quo eas ad me per Clarissimum Virum D. Ioannem Fabrum Doctorem Medicum & ipsum Lynceum amicumque meum singularem transmisit. Ego igitur nulla interposita mora, Illustrissimi Cardinalis venerandam scripturam vna cū sigillo Patribus nostris Ioanni Brisselio, Iacobo Fuligato, Nicolao Lancicio, exhibui, qui statim vno ore eam tanquam sancti viri veram manum exosculati sunt. Hæc autem non eo feci, quod de fide Epistolarum vlla ratione ambigerem, sed vt Lectoris certitudini consulerem; in cuius gratiam vtramque subnecto. Latinam Principis Cæsij, Italicam Card. Bellarmini; cuius tamen versionem latinam subiungo, & sic auctoritatibus hisce nihil addo, ne lucem tenebris illustrare velle videar.

PRINCIPIS
FEDERICI CAESII
LYNCEI

Princ. S. Angeli & sancti Poli I. March. M. Cælij II. &c.

BARONIS ROMANI.

DE CAELI VNITATE, TENVITATE,

fusaque & peruia Stellarum motibus
Natura.

EX SACRIS LITTERIS

Ad Illustriss. & Reuerendiss. D. D.

ROBERTVM
BELLARMINVM
S. R. E. CARD. AMPLISSIMVM
EPISTOLA.

PRINCIPIS
FEDERICI CAESII
LYNCII

Princ. S. Angeli & sancti Polii March. M. Castell. H. & Co.

BARONIS ROMANI
DE CASTELLIVNITATE, TENNITATE

Inspice & perita Stellarum monibus
Natura.

EX SACRIS LITTERIS

Ad Illustris. & Reverendiss. D. D.

ROBERTVM
BELLARMINVM
S. R. E. CARD. AMPLISSIMVM
EPISTOLAM

Illustrissimo, & Reuerendissimo Domino

D. ROBERTO BELLARMINO

S. R. E. Cardinali Amplissimo



Federicus Cæsius Lyne. Princeps S. Angeli Felicitatem.

I.

EN ab vrbanis iam ciuiliū negotiorum cumulis, semoto aliquantulum mihi, coelestibus contemplationibus serius dare operam licet, dum liberiori quadam aura fruatur animus; dum nil magis auct quam per amplissimas altioris illius naturæ regiones expatiari. Desideratum quidē hoc diū sed & curandum maximē eaq; præsertim de causa tuis Princeps Illustrissimē monitis vt paream, & satisfaciam, quibus alacrius, audaciusq; rem adortus sum. Cælestis equidem Prouincia cui non difficilis videri poterat? cui non difficiliore Physiologorum mentes in præstitutis eius legibus? cui non multiplices in scholis rumores ex nouis à Galileo detectis? Olympica planē certamina restituta, seu potius medijs in scholis constituta, dixisse quis poterit. Verū nihil durum, nihil difficile te adhortante; plana omnia. Meam cum audire sententiam voluisti, neque dumtaxat, Vnicum, Tenue, peruiumque Cælum, à me propositum te probare Orbium & orbiculorum tam multas, tā perplexas moles è naturæ puritate eliminatas, sed etiam proprio ex voto id esse affirmasti, & sacrae paginæ oraculis maximē consonum: tunc certē ad complendum opus exarsi, tunc iniectæ à negotiorum tricis moræ maximē displicere. Eo quoque magis insumptus hodie labor oblectat, & ad eum recessus in hisce meis Vmbriæ montibus gratior & iucundior existit; quamuis sero à molestis illis curis fuerit obtentus. Ipsius modo operis aliqua ratio tibi Illustriss. Domine reddenda est. Quod vt hisce litteris præstare possim, quid potius of-

II.

feram? ipsasne Physiologorum con-
tationes expressero, quibus quasi inex-
plicabilibus densissimisque sentibus iter
vndecunq; constipantibus asperior fit ad
rem accessus? vel potius variam Cæli
historiam adumbravero, prout diuersè
illud adornatum ab elatioribus hominū
ingenijs effectumq; operosè inuenimus.
Abuti certe hoc esset tua illa humanita-
te qua ab illustrioribus illis laboribus,
& altioribus curis, quibus vniuersæ Rei-
pub. Christianæ bono assidue prospice-
re satagis; non rarò demitti soles, vt di-
strahentium quamuis minus opportu-
nis alloquijs, omni ex parte satisfacias.
Porro hisce te detinere minimē equum
est; quæ satis erit ipso in opere conscri-
pta opportunius aspicere: Illud nunc tā-
tum significare liceat: Physicè, Mathe-
maticèq; quæsitum Cælum. Cælum nu-
bibus stipatum, & caliginemersum al-
tiori, nec quidem ea naturali in corpo-
re vnde quaque fulgenti, immo vniuersæ
huius lucis origine; sed ab humanis mē-
tibus ratiocinationum ambage, ipsi au-
spersa atq; obuoluta ita nobismet ipsis
medio in splendore tenebras facimus,
ipsumq; quod petimus, quæstione nobis
abscondimus & celamus. Serenitatis ta-
men spem quærenti mihi affulgere non
negauerim, sique dignitati, si amplitu-
dini obiecti corporis satisfacere, prorsus
supra vires fuerit; conatum sanè illis ex
omnibus futurum. Ab inferiorum ha-
rum discussione ad summam illā ac pri-
mam sacrorum librorum veritatem abri-
pior. Inde plenissimæ authoritatis te-
stimonium quibus refragari nefas; inde
confirmationes plures quibus reniti
impium est, depromuntur. Quia verò

I.

aliqua sunt quæ varij variè interpre-
tantur, nec parum in scholis agitantur
ea hic exponere & fusè quidem consi-
lium est tuo digniora conspectu, tuo di-
gnissima iudicio; nec enim mihi ratæ
omni ex parte explicationes videri po-
terint nisi diuini alicuius Interpretis &
examen, & autoritas intercesserit. Cu-
ius vero id potius quam Illustris. Bel-
larmini? per eam igitur qua me semper
prosequutus es beneuolentiam, præsta-
re hoc mihi digneris Illustris. Princeps
te rogo, & obtestor, vt omnia ritè expo-
sita & apposita sint seruatō semper ge-
nuino sacrarum litterarum sensu à quo
sicubi vel minimum discessum fuerit, ad
illum reducas opto, & quodcumque
censueris significes.

Gen. 1. hom.
4.

Cæli unitatem primo cum D. Bona-
uëura assumo in primo Genes. D. Chry-
sostomum in primis antesignanum se-
quutus, qui multitudinis Cælorum
assertores acius vt pote veritati sacra-
rum litterarum contrarios reprehendit.
Hic obiectum illud plurium numero,
Cælos in sacris sæpè sæpius dici; ex He-
braicæ linguæ proprietate diluo, nec
inusuatum quoq; apud Latinos adnoto,
rem plurali numero vnā indicare, qui
Venetias, Athenas dicimus. Respicere
quoque modum hunc, rei ipsius longè
latèq; expansæ ac fusæ magnitudinem,
quæ vastitate sua multarum rerum quo-
dammodo vices sortiatur, dum in mul-
tas partes, easque ingentes diuisa con-
cipi potest: ita Aquarum vniuersitas in
sacris Maria, & Aquas communiter ap-
pellamus. Quod si duale hebraicum
agnoscatur, duas Cæli physici partes
seu regiones exprimi aduerto, sydeream
& Aëream vt tertio Cælum Cælorum
Empyreum nempe sit, ad quod raptus
D. Paulus, cui distinctioni D. Damasce-
nus D. Basilii, Theodoretus, & Phila-
strius adstipulantur.

Gen.

Ortod. 2. 6.
in Gen. hom.
3.
in Gen. q. 11.
in Catalog.
hæres.

ΥΠΕΡ rem expansam, extensam late-
que diffusam significare aduerto, vt ei
substituta Firmamenti vox, parum re-
spondere videatur; nec vllō pacto ada-
mantina inde orbium soliditas concludi
possit, potius si ex Græco stereomatis,
ex latino Firmamenti, vocabulo, firmi-
tatis aliquid habendum sit, illud ipsum
esse, quo rapidus in gyrum cursus, &
multiplex circumuolutio ab Aethere

II.

1 prorsus auferri debet, de quo scripsum, D. Chrysosf.
Aethera firmabat sursum, & Taber-
naculum fixum, tribui verò ipsis syde-
rum solis, lunæque corporibus, sacræ
5 paginae autoritate, in qua motus,
gyrus, cursus de ipsismet stellis, non de
orbibus vllis dicuntur: quorum in sa-
cris mentio prorsus nulla, sicuti in phy-
sici aspectus nullus, indicium nullum,
10 habemus quoque ex D. Augustino iam
pridem diligentissimè obseruatum esse
Cælo non moto, sed ipsis tantum syde-
ribus quæcumque apparent optimè ex-
plicari. Sed & hoc recentius visis ma-
gis, magisque comprobatum.

Ita cælum immobile sydera verò mi-
nimè affixa ad peruium illud percuri-
tia non solum agnoscunt, sed summa
nobis asseueratione determinant D.
20 Chrysostomus, Iustinus Martyr, Dio-
dorus Tarsensis, Eusebius Emislenus,
Origenes, Procopius Gazeus, Theodo-
retus Tyrensis, Theophylactus, Lactan-
tius, Philastrius alijque.

In Gen. ho. 6
& 13. ad
ant. 12.
ad 93. q. Or.
thod.

25 Talem Cæli naturam vllius proprii
motus expertem, dubiam quoque figu-
ram consequi obseruo, vt acquiescere
prorsus debeant Orbistæ Sanctorum,
Patrum autoritati, qui ex sacris
30 litteris sphaerica ornamenta iamdiu
exploserant; pertinacemque elegan-
tium globorum, & multiplicium
defensionem derelinquere cogantur.
minus enim rectè, minus quoq; piè

in Gen. 1.
l. 5. con. Cel.
c. 1. periar.
in Gē. 1. & 7
in Catalog.
hæres.

35 in ea actum videtur, nec vllō phœno-
meno, aut firma ratione suadente. Scis
Illustris, Domine quam vnanimis idem
D. Chrysostomus, D. Ambrosius, D. Ba-
silius, Theophylactus, Iustinus; acius
40 vero Lactantius, & Procopius Gazeus,
sphaericam hanc figuram reprobauerint.
Hæc autem abolita præter ipsam expan-
sionem, dilatationem, diffusionem vno
nomine ΥΠΕΡ apprimè expressam, a-
45 liam determinatè nostris Vranometris
cognitam, aut quæ apprehendi possit,
nullam induci posse existimauerim. Il-
lud scilicet tantum constare Cælum cir-
cumquaque fusum & super omnia ex-
50 plicatum esse, vt modi, & vices Taber-
naculi, Fornicis, Cortinæ, Tentorii, Pel-
lis, de eius hac nobis super extensione,
& superinductione, satis appositè in
sacris habeantur.

ho. 14. & 27
hexam. 1.
hom. 1. sup.
Gen.
in ep. ad
Hebr. 8.
ad q. 130.
Orth.
Diu. inst. 3.
13.
Com. in
Gen.

Qui

I.

Qui alibi præcisius eius partibus nubibus inquam ipsis applicantur. Siquidem legere est: si voluerit extendere, nubes quasi Tentorium suum. & cum ponerem nubem vestimentum eius, & caligine illud quasi pannis infantiae obvoluerem, pluries vero, expandere, tegere, operire de nubibus, nebula, & caligine dictum.

Nec quoad molis amplitudinem tantum, sed etiam quoad dispositorum in eo corporum stellarum nempe multitudinem, minimè definito aliquo termino comprehensum esse Cælum videtur. Receptus enim in scholis viginti & duorum supra mille numerus, & in Astronomorum tabellis editus; ausu prorsus temerario præfigitur. Non, mancus, mutilusque, sed vix vilius numerationis initium. Eam quippe mortalium sensibus minimè permissam, prout in sacris habetur, & ex Patribus complures docent: ita observationum pluribus experimentis constare video, quibus & distinctas innumeras, & indistinctas plures stellas conspiciere est, & latentium plurimarum, plurima habentur indicia, ut omnino admirabilis ea multitudo sit, quæ merito, & arenæ maris, & semini Abraham comparetur. Erat autem Hebræorum Militum tempore Moïsis numerus ad sexcenta millia & ultra. Stellæ itaque ut optimè D. Augustinus ait dinumerari non possunt, quia nec omnes eas videri posse credendum est, nam quanto quisque acutius intuetur, tanto plures videt. Deus enim numerat multitudinem stellarum, & omnibus eis nomina vocat. Sed certe non possum non deplorare, eam nostro sæculo complurium philosophantium ægritudinem, qua ab experimentis, & observationibus non solum abstinere, sed plurimum abhorreere solent, non enim pauci sunt qui non modo Telescopium quo visus hominum altius protolitur, Galileumque ipsum, qui tam multa in Cælo priscis abscondita, nunc nobis Planetas, noua fixa, nouas Astrorum facies detexit, execrantur; sed simplici etiam oculorum inermium observatione destituti, potius velint sponte cæcutire, & in antiquam sylvam ire, quorundam Veterum scriptorum,

II.

opinionibus fascinati, quam ab illis tantillum discedere, sensu, & ratione duæ, & præsumptis decretis, aut regulis aliquid adiungere vel immutare.

Cæterum ex his omnibus Vnitatibus, Immobilitate, Fusaque natura, nullo solido figuræ termino coercita, sed stellarum, & apparentium nobis, & abditarum multitudinis, varijs motibus cedente, & peruia, quæ & hoc propositum singula & se mutuò comprobare valent: colligi in sacris litteris, & plenissimè posse existimo, Cælum minimè durum lapidis ad instar, pluresque in orbis specie, motu, alijsque differentes dissectum, assidua rotatione infixas stellas circumducens, ut à pluribus magno plausu expositum fuit: Sed Fluidum Tenueque existere, & ipsius aëris in modum, qui & Cæli nomine inde donatur, parumquæ ab eo distinguitur, & eo ferè modo, quo inferior pars alicuius corporis à superiori discerni solet. Firmamenti verò & nomine dici in sacris plenè doctissimus ille Pererius ostendisse videtur. in quo firmamento tum aquas, tum stellas positas legimus; sicuti & in Cælo, & stellas, & volucres, & Aquilæ viam notamus.

רקיע שחקים שמים

communes fere voces. quarum non minus propositum confirmant, celestisque Naturæ indicia exhibent, peculiare significationes, & origines; Unde eas omnes opere in ipso minutius observare libet.

Fusum quidem, & fluidum, Cælum, omnibus exprimitur, præsertim vero ex רקיע quæ expansum extensumque notat. Quid enim quæso magis expansum aut dilatatum esse poterit ut per excellentiam ita vocetur quam tenuissimum, & rarissimum, quid aëri simile; Quomodo ve vnquam summa duritie ac densitate [quæ terreum quid omnino erit] constrictum corpus, expansum dici poterit? Habemus fumi apud Isaiam cum Cælo expressam similitudinem, vel in ipsa dissolutione affinitatem, unde aliundeque D. Basilio, & D. Ambrosio alijsq. Sanctis Patribus compages Aetheris non alia quam tenuissimi cuiusdam fumi, Qualis, & Aëris. Exposita quoque

Iob. 36.
Iob. 38.

Gen. 15.
Deut. 10.
Hierem. 33

Cant. Dei
16. 23.

Pf. 146. 4.

I.

40. 22.

tenuitas & raritas huius auræ mira apud eundem Isaiam his verbis: Qui extendit velut nihilum Cælos, quod de vniuerso Cæli corpore dictum legenti patet, nec corpulentum aliquod durum, multiplex, ingentiaque spatia occupans, simile nihilo, vilo pacto dici poterit, sicuti è contra, optimè nihilo assimilabitur, extenuatum quid, & ita diductum vt nihil impediatur, & nobis insensibile ferè sit. Eodem quippe modo Antiqui ipsum aërem inane dicebant, & in scriptura legimus: Qui extendit Aquilonem super vacuum, & appendit terram super nihilum. En aër hic vacui & nihili nomine dicitur, appensa. super eum terra non supra aliquod solidum, durumque, quod sustinere potuerit.

Iob 26. 7.

37. 18.

14. 12.

Et quamuis hæc exposita nullum soliditati inducendæ locum relinquunt, quia tamen eius Authores nonnulli, quasi ab his omnibus clanculum irrepentes, aut effugia frustra quaritantes, aliqua ad eam imponendam inducunt; videlicet apud Iobum: Tu forsitan cum illo fabricatus es Cælos qui solidissimi quasi ære fusi sunt, & alibi: donec atteratur Cælum, ingens in primo subsidium soliditate æreque dicto; alio attritio notata quæ duorum est corporum: remouendam hanc qualemcumque ansam omnino cogitavi locorum consideratione, & explicatione, certus superius adductis hæc minimè aduersari posse. Eapropter primam lectionem ipsosque Interpretes consului.

Primum varie expositum notavi. alijs: Soliditates cum ipso in verustates validæ sicut aspectus effusionis. alijs: Firmabis cum eo in antiquitates validæ &c. alijs: Ipse firmavit Cælum in conuersiones validæ sicut aspectus effusionis. alijs: Extendisti cum eo nubes fortes sicut speculum pellucidum, vel tanque aspectus, seu species speculi, vel Fusibilis. alijs. Ipse firmavit Cælum robusta compage, velut aspectus Fusionis, sed Hebræa ipsa verba

תְּרַקִּיעַ עִמּוֹ לְשִׁתְּקִים הַקִּיָּם כְּרֵאִי מוֹצָק

Tu expandisti cum illo Cælos validos specie fusionis: planè sonare videntur, quod optimè Illustrissime Domine percensere poteris.

II.

1 Hisce quidem ego consideratis, æris aut metallicæ soliditatis quemuis sensum satis exclusum existimo, fusionemque insuper ipsam, & expansionem magis confirmatam. Ex Hebræis certè nonnulli ita exponunt vt talis sit sensus: An tu auxiliaberis illi ad effundendas nubes, & efficiendas eas fortes vt sint velut speculum eoque ex eis lumen transmittat in terras. Sed tria ego considerauerim hoc in contextu. Quod enim alijs: Firmare soliditates, Fabricare, & extendere ex תְּרַקִּיעַ dicunt, id ad expansionem מוֹצָק deducendum, nec mirum si Firmare, & ei similia hoc loco ex verbo, sicuti alibi ex nomine Firmamentum non adeò proprie deriuatum. Deinde Robustum illud, Forte, Violentum, alijs solidum, alijs Durans, quod ex חֲזָקִים sumitur aptissime Validitate reponi, vt valida, fortis, & perseverans in sua puritate natura intelligatur, vt D. Bonauentura facit, vel etiam de rato firmoque quouis tempore ordine. Tertio quod Aeris fusi, seu Speculi, vel Fusibilis similitudinem attingit, Speciem tantum, vel Similitudinem, vel aspectum Fusionis, haberi. Aes vero & Speculum ex eo inducta, 30 quod ab eadem voce מוֹצָק tam speculum quod videmus, quam visio ipsa deduci possit; vt Pineda optimè notat. inde quia specula ærea, aut vitrea, sunt; suborta est alijs vitrea vel ærea soliditas, fundendi verbo commodè iuncta, vt 35 dum vox מוֹצָק rem ipsam fusam, & liquidam significat, in Fusibilem & Liquidabilem illis traducta fuit, quibus forte Cæli ipsa durities adamantina, menti 40 durius inhæserat. Quod si nimis fortasse alicui fusi æris aut speculi similitudo arriserit, non desunt qui seclusa, quauis duritie & densitate, ad perspicuitatis, nitoris, splendorisque constantiam perennemque naturam decentius referant. Præter hæc autem illud rem 45 prorsus confirmet שִׁתְּקִים Cælos hic dici. Vox hæc si rectè obseruauim, eam præcise firmamenti partem signat quæ 50 Meteora gignuntur, aërem nempe nec supremum, alibi vero sæpè & proxime superiori cap. Iobi pro aëre versa est, & propriè tenues, comminutos, subriles 55 אֶרֶץ quod comminuere, contunde-
re,

I.

re, extenuare, valet. Vnde penitus quivis duræ solidæque compaginis intellectus cesset, Mecum præter alios Viri illi doctrina insignes sunt, Ioannes Pine-da qui copiosissimè, & diligentissimè in Iob scripsit, & Benedictus Arias Montanus in sua naturæ historia. hic expositum locum ita legit: Extendistine, cum illo Sahhakim perseverantes ut specula fusionis. Ille verò soliditatis loco, Forte, Validum, Violentum, intelligit, aërique applicat. Ambo fusè eodemque sensu locum explicant.

Iam quoad attritionem facit secundo loco positam, eius vice consumptio, dissolutio, inueteratio, seu immutatio vestium similitudine, ab alijs dicitur; ut nullo pacto durum corpus inducere debeat vis illiusmet vocis. Pro casu etiam minimè possibili dictum intelligi posset: donec atteratur Cælum. Verum minimè necessarium est visum hisce explicationibus uti, cum à plurimis verba hæc: donec atteratur, vel: quousque consumatur non apponantur, nec legantur, ut apud Comitulum observavi, Hebræaque ipsa verba

וְאִשׁ שָׁבַב וְלֹא יָקוּם עַד בְּלִתִּי שָׁמַיִם

& homo dormiuit, non surget donec nō Cælum: sonant scilicet subaudito verbo substantiuo, donec non sit Cælum, si rectè percipio. ut alibi legimus: Donec auferatur Luna pro hebræis verbis significantibus tantum: Donec non Luna: ut ita Cæli ipsa annihilatio seu consumptio ex toto, intelligenda veniat, eique in Naturæ viribus resurrectio comparetur. Et hisce quidem omnibus hæc subingesta durities satis mollita mihi videtur, retortaque ita in aduersos spicula ut nihil tenuissimè expanso Aetheris fluiori obicis, aut impedimenti remaneat; Quinimo magis magisque elucescere videatur. Sed qui profecto vnquā, quoniam illi tandem esse poterunt, qui inter nos, & beatam illam Empyreï Patriam Gloriæque & promissas, & expectatas sedes, hos plusquam ferreos octoginta ferè enormis crassitudinis parietes interpositos concipere maluerint, ipsius aditus & descensionum, ascensionumque penetrationis miracula adau-

II.

gere, & multiplicare, Anne pulchrum concinnumque videbitur; Miranda & ab alijs omnibus diuersissima corpora, quamuis in sacris paginis præterita, a-
5 struere illisque multis, magnisque præter vllam necessitatem, naturam grauare, Nosque terricolas corticoso quodā quasi nucleo, multiplicis tegumenti, & durissima cauea vndique concludere?
10 Anne verò nulla ratione motus, nulla pulchritudine illectus animus, talibus ita adhæsisse poterit ut & res ipsas, & rationes, sacrosque textus, operosè accommodare conetur, ne ab illis vllō modo discedat aut deturberetur. Duriter certè à durissimis hisce conditionibus longiusque repelli existimauerim, ut nec vel minimum accessisse queat, ni alio affecta voluntas quam sciendi desiderio
20 vel inuitum impulerit atque coegerit.

Porro motus stellarum, lucentium nempe ipsorum corporum, quam orbium simplicior, faciliior, concinnior, & efficacior, sacris testimonijs comprobatus;
25 quomodo peragatur; quæstio eadem, est quæ in orbium apud Sphærologos motu, Mihi quidem ut tibi iam olim exposui Illustrissime Domine, & hoc etiam in sacris litteris haberi videtur. An-
30 gelos syderibus ipsis insidere, qui motores etiam ab ipsis Aristotelicis agniti quamuis perperam rotandis orbibus quasi pistrino adhibiti. Pluribus igitur in locis nomine stellarum Angelos sub-
35 notari in sacris utpote qui plures, in stellis sedes habeant, easque moueant obseruo. Quibus ex antiquis & nuperis non pauci, dum Angelos non intellexerunt, sed ipsas dumtaxat stellas voce
40 expressas, eo lapsi videntur ut animatas asseruerint. De Angelis enim mouentibus, & assistentibus hæc dicta sunt quibus & competunt. & quidem hisce Angelorum prælium, & lapsus. Draco
45 tertiam stellarum partem traxit. pugnavit ipse & Angeli eius. quo & referri debere videntur stellæ immundæ apud Iob. quibus Origenes consideratis Vitij, Virtutisque capaces stellas existimauit,
50 & illud Iobi, & in Angelis eius reperit prauitatem. alibi verò: de Cælo dimicatum est contra eos stellæ stantes in ordine & cursu suo aduersus Sisaram
55 pugnaverunt. qua autoritate in-
cassum

Apoc. 12.

25. 5.

1. Com. in Iob.

4. 18.

Iudic. 5.

I.

45. 12. caelum abuti Genethliaci solent : inde
 40. 26. Militia Caelorum quæ Stellarum expli-
 catur & de ea apud Isaiam omni Mili-
 tia Caelorum præcepi: D. Hieronymus:
 Comm. At 1. omnibus stellis præcepi: exponit. An-
 gelicæ quoque laudes. In Iob, cum me
 3. 34. laudarent astra matutina, & iubilarent
 omnes filij Dei. Angelicæ custodiæ &
 ministeria. apud Baruch. Stellæ autem
 dederunt lumen in custodijs suis & læ-
 tata sunt & vocatæ sunt & dixerunt ad-
 sumus. Tandem præcisè stellarum mo-
 tus ab Angelis apud Iob sub quo cur-
 vantur qui portant Orbem. qui enim
 portantur orbes, sunt ipsa sydera, quæ
 de loco ad locum transferuntur; nam
 fictitij illi orbes minimè è suo loco mo-
 uentur; sed in eo tantum quoad partes
 suis authoribus rotantur. planè vero a-
 pud Isaiam. Lucifer qui manè oriebaris.
 14. 33. & in Ecclesiaste. Gyranus gyran-
 do vadit spiritus de Sole dictum. Quæ omnia
 mutud etiam se declarant: vnde & pro-
 positum plenissimè colligi & oppositum
 quoque magis semper excludi videtur.

Hæc sunt Illustrissime Princeps quæ
 in sacris litteris habui pro cælestis cor-
 poris consistentia, numero, & motu;
 Quibus Physica, & Mathematica ap-

II.

1 primè congruere phænomena, expe-
 rimentaque omnia plenè respondere non
 semel animaduerti. Ita quidem attuli,
 ita explicaui. quid censeas modo perci-
 5 pere anxius auco, si placuerint opera-
 pretium me non leue fecisse arbitrabor
 maioriq; feruore & spiritu ad huiusce
 circa cælestia laboris complementum,
 incumbam, tuis semper vegetior, prom-
 10 ptiorque redditus auspicijs. Sin autem
 minus aliqua in parte satisfeci, moneas,
 doceas, iuues. Vnius quidem Veritatis
 amore ducor, eamque libentissimè sem-
 per amplector; cuius me satis amplum
 15 arrhabonem obtinuisse in cælestibus
 his existimaui quoniam illorum puri-
 tati, tenuitati, simplicitati assentien-
 tem te inueni.

Vale Illustrissime Domine meque
 20 omni animi affectu tibi deuotum porro
 amare iuuareque perge, dum Deum.
 Opt. Max. veneror, Ecclesiæ suæ vniuer-
 sæ bono, te faustis auspicijs natum pro-
 bitatis ac doctrinæ exemplum futuris
 25 etiam sæculis admirandum, incolumem
 adhuc diutissimè prosperet, Maiora, me-
 lioraque omnia contribuat. Aquasparto
 die 14. Augusti 1618.



All' Illustriss. & Eccellentiss. Sig. il sig Federico
Cesi Principe di santo Angelo &c.

Acquasparta.

I.

II.

Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor mio.

HO letto con molto gusto la
scrittura, che V. E. m'ha
mandata, come è veramente
molto dotta, e molto nuoua, e per il
più, conforme à quello, ch'io tengo per
vero. Vna sola cosa non mi finisce di
contentare, & è la figura del Cielo,
qua e V. E. nega essere rotonda, allegan-
do S. Gio. Chrisostomo, & altri.

Io in contrario hò la scrittura del-
l'Ecclesiastico al c. 24. che dice *Gyrum*
Celi circuiui sola: e vediamo, che il So-
le, la Luna, e le Stelle girano intorno al
globo della terra, e Salomone nell'Ec-
clesiaste dice, che il Sole *gyrat per meri-*
diem, &c. e finalmente non è dubbio,
che la figura rotonda è la più perfetta, e
sappiamo, che *Dei perfecta sunt opera*.
Ma quello ch'io desiderauo da V. E.
non è sapere, che la sacra scrittura, e li
santi Padri tengano, che il Cielo stia fer-
mo, e le stelle si mouino, & anco che il
Cielo non sia duro, & impenetrabile,
come il ferro ma molle, e facilissimo à
penetrarsi, come l'aria, che queste cose
già le sapeuo, ma desiderauo di impa-
rare da V. E. come si saluino li moti del
Sole, e delle stelle, e massime de le stel-
le fisse, che sempre vanno insieme, e
fanno i loro circoli più grandi, ò più pic-
coli, secondo che sono più lontane, ò più
vicine al Polo, che questa è la causa, che
li Filosofi, & Astrologi danno alli sette
Pianeti, sette Cieli, & à tutte le stelle
fisse vn Cielo solo, e principalmente de-
siderauo intēdere, come si saluino li di-
uerfi moti in vn'istessa stella, se non vi è
se non vn Cielo, e quello immobile.

Io quando ero giouane procurauo di
saluar il moto de' Pianeti da Occidente
a Oriente, contrario al moto dell'istessi
da Oriente ad Occidente, con dire, che
il moto loro dall'Oriente all'Occidente
non era in tutti di ventiquattr'hore, ma

1 del Sole era di 24. hore; della Luna, era
di 24 hore, & vn quarto, e però pareua,
che la Luna con il proprio moto fusse
tornata alquanto in dietro, e così pian-
5 piano si discostasse, e poi si accostasse
al Sole. Quanto al moto delli Pianeti
dal mezzo giorno al Settentrione, pro-
curauo saluarlo con dire, che il moto de'
Pianeti non era vn perfetto circolo, ma
10 vna spira, e così pian piano passassero
dal mezzo giorno al settentrione, e poi
ritornassero per la medesima via. Ma
questa mia inuentione non satisfaceua
in tutti li Pianeti: ne anco nelle stelle
15 del firmamento, che con far e moti nel
circolo meridiano longhissimi, pare, che
euidentemente dimostrino, che siano
portate dal Cielo, e però nel mezzo fac-
cino li circoli longhissimi, nelli estremi
20 breuissimi. Queste, e simili cose desi-
derauo imparare da V. E. se forsi lei ha-
uesse fatte considerationi particolari in-
torno al saluare talmente li moti delle
stelle che si potesse insieme saluare l'o-
25 pinione delli santi Padri, che mette il
Cielo immobile, e le stelle mobili. Ma
non voglio però occuparla in queste
speculationi, se lei hà altre occupationi
di maggior momento. Procuriamo, Si-
30 gnor mio, di viuere con il santo timor
di Dio, talmente, che arriuiamo al Cie-
lo, che all'hora in vn punto ci chiarire-
mo d'ogni cosa. Iddio la conserui sana,
e mi comandi: rimando la scrittura di
35 V. E. acciò forse lei non si habbia rife-
rata copia, e per sorte tra li miei infiniti
scartafacci non si perdesse.

Di Roma li 25. d'Agosto 1618.

D. V. E.

Seruitore Affettionatiss.

Il Cardinale Bellarmino.

Illustriss. & Excellentiss. Domino

D. FEDERICO

CAESARIO

Principi sancti Angeli.

Illustrissime, & Excellentissime Domine mi.

I.

LEgi cum magno gustu scriptum à V. E. mihi missum, verè est valde eruditum, & nouum & vt plurimum conforme sententiæ quam ego pro vera habeo. Vna tantum res non est plenè ad gustum meum, figura Cœli quam V. E. negat esse rotundam, allegando S. Chrysostomum & alios. Ego in contrarium habeo scripturam Eccl. c. 24. vbi dicitur; Gyrum cœli circuiui sola. Et videmus Solem, Lunam, & Stellæ volui circa globum terræ. Et Salomon in Ecclesiaste ait, Sol gyrans per meridiem &c. Tandem dubium non est, figuram circularem esse perfectiorem: & scimus perfectam esse Dei opera. Sed illud quod ego desiderauì à V. E. non est, intelligere, à S. Scriptura, & SS. Patribus asseri, cœlum esse firmum & stellæ moueri, & cœlum non esse durum, & impenetrabile instar ferri, sed molle & facillime penetrabile instar aëris: *hec enim omnia sciebam*: verum volebam discere à V. E. quomodo saluentur motus Solis, & Stellarum præsertim fixarum, quæ semper erunt simul, & conficiunt suos circulos maiores vel minores prout sūt remotiores vel viciniore polo. Hæc enim est causa ob quam Philosophi, & Astrologi dant septem planetis septem cœlos, & omnibus stellis fixis, vnum solum cœlum. Præcipuè desiderabam intelligere, quomodo saluentur diuersi motus in vna eademque stella, si non est nisi vnum cœlum illudque immobile. Ego cum iuuenis essem conabar saluare motum planetarum ab Occidente ad Orientem, contrarium motui eorundem ab Oriente ad Occidentem, dicendo, motum illorum ab Oriente a O:

II.

1 cidentem, non esse in omnibus 24. horarum, sed Solis fuisse 24. horarum, Lunæ 24. horarum & vnus quadrantis. Et ideo videbatur Lunam cum proprio
5 motu, aliquantum retrocessisse, & ita sensim sensim recedere, & postea accedere ad Solem. Quantum ad motum planetarum a meridie ad septentrionem procurabam eum saluare, dicendo, motum planetarum non esse perfectum
10 circulum, sed spiram, & ita paulatim progredi à meridie ad septentrionem & postea redire per eandem viam. Sed hæc mea inuentio non satisfaciebat in
15 omnibus planetis, nec in stellis firmamenti, quæ cum habeant motus in circulo meridiano longissimos, & versus polos breuissimos, videntur euidenter demonstrare, se ferri a cœlo, & ideo in
20 medio facere circulos longissimos, in extremis breuissimos. Has & similes res volui discere à V. E. si forte illa peculiare considerationes adhibuit, ad saluandos eo modo motus stellarum, vt
25 simul possit saluari opinio SS. Patrum asserens cœlum immobile & stellæ mobiles. Sed nolo eam occupare his speculationibus, si alijs occupationibus maioris momenti distinetur. Procuremus
30 Domine mi. viuere in sancto timore Dei ita, vt perueniamus ad cœlum, nam tunc in vno puncto intelligemus omnia. Deus eam sanam conseruet, & mihi imperet. Remitto scriptum V. E. ne si
35 forte eius exemplum non reseruauit pro se, inter meas infinitas apfodias periret. Romæ 25. Augusti 1628:
V. Excell.

Seruus addictiss.

Card. Bellarminus.



INDEX

P R A E C I P V A R V M R E R V M

In quo etiam Auctores sub nomine Aquæ,
& Cæli & propria Littera
habentur.



CACIVS pro cælo
liquido affertur . pag.

723. colum. 2. vers. 38

Actus videndi non est
species visibilis . pag.

120. col. 1. vers. 42. &

pag. 121. col. 2. vers. 36

Accumenius pro cælo corruptibili. pag.

689. col. 1. pag. 15

Aegyptij pro cælo liquido. pagina 754.

columna 2. versiculo 10. & pagina

755. colum. 2. vers. 30

Aequilibrium Macularum quod sit. pag.

432. col. 1. vers. 5

Aequilibrium cursus Macularum sola-

rium quando fiat . pagina 431. col.

1. vers. 35

Aequilibrij affectio. pagina 161. colum.

2. versiculo 55. & pagina 304. col.

2. vers. 15

Aequilibrium motus Macularum inter

Augustum & Septemb. pagina 254.

col. 1. vers. 1

Aequilibrium Autumnale & Venum

conferuntur . pagina 254. columna

2. vers. 2

Aequilibrium Venum . pag. 431. col.

1. vers. 35

Aequilibrium Mac. Autumnale in ini-

tio Septembr. incipit . pag. 161. col.

2. vers. 53

Aequilibrium Mac. est annum . pagina

254. 1. 16

Aequilibrium cursus Macularū non diu

durat. 254. 1. 12

ab **Aequilibrio** magnus recessus . pag.

260. 2. 16

Aether quasi æthon quod ardeat di-

ctus est. 640. 1. 46

Aethera ex aquis factum antiquissimi

Græci docuerunt . pag. 649. col. 2.

vers. 10

Albategnius Martem in cælo Solis po-

nit. 741. 2. 30

Alcuinus pro cælo igneo. 628. 2. 10. &

633. 2. 35

Alphraganus Martem in cælo Solis po-

nit. 741. 2. 30

Kkkk

Alber-

I N D E X.

I.

Albertus pro cælo liquido. pag. 763. col.
1.35
Albertus Rutilensis pro Cometis supra
cælos. 691. 2.15
Albumasar pro cælo liquido. pag. 764.
2.30
Alphonſus Salmeron vnus è decem pri-
mis Societatis Ieſu cælum corrupti-
bile defendit. 686. 1. 40
Altitudinem Solis supra horizontem
enunciare. pagina 149. columna 27.
verſ. 50
Altitudinem Solis meridianam minimā
& maximam enunciare, pag. 149.
col. 29. 45
Altitudinis & verticalis meridiani in-
uentio, 149. col. 5. 1
Altitudines Solis pro angulis æqualibus
149. col. 28. 25
Altitudines duas inuenire intra quas
contactus phyſicus ad datum diem
contingat. pagina 149. columna 28.
verſ. 5
Aluarez pro cælo corruptibili. pag. 691.
1.30
s. Ambroſius Aquas supra cælos agno-
ſcit. 642. 1. 21. & pag. 643. 2. 10. &
pag. 710. 1. 45
pro cælo corruptibili. pag. 663. col.
2. 40
pro cælo igneo. p. 627. 2. 10. & p. 643
2. 10
pro cælo liquido. 710. 1. 10
Anacreontes pro cælo liquido. p. 755.
2.30
Anaſtaſius Synaita pro cælo igneo. pag.
628. col. 1. verſ. 50. & pag. 633. col.
1.20
Anaxagoras pro cælo igneo. pag. 640.
2.35
Anaximander pro cælo igneo. pag. 640.
2. 35
Andreas Archiepiſcopus Cæſareæ Cap-
padociæ cælum corruptibile dicit.
670. 1. 45
Angelus Apellem nominatim Cenſori
in inuentione macularum poſtponit.
4. 2. 20
Angelus Apelli primam inuentionis glo-
riam permittit. 22. 2. 15
Angulus obſeruatorius quis ſit. pag. 91.
2. 10
Anguli verticales. 94. 1. 20
Anguli verticales in ſphæra recta mini-

II.

mi, in parallela maximi. 94. 2. 38
Anguli Ingolſtadiani à Romanis non
differunt. 222. 1. 48
Angulum quem Ecliptica deſcribit cum
circulo verticali mechanice inuenire
144. 2. 40. & 145. col. 3. 20
Angulus ex Solis altitudine. 144. 3. 10
Angulus ex ſola hora præcognita, ibid.
verſ. 45
Angulum quem verticalis cum eclipti-
ca facit in analemmate eclipticæ in-
uenire. 146. 2. 20
Angulum inueniendi modus quartus ex
aſtrolabio Gemmæ Friſij. 147. 1. 5
Angulum orientis Solis oſtendere. 148.
col. 4. 40
Angulum Solis occidentis dare. p. 149.
1. 1
ad Angulum hunc inueniendum non
eſſe neceſſarium globum, ſed pla-
num ſufficere, pagina 145. columna
4. 20
Angulum meridianum inuenire. pagina
149. col. 7. 25
Angulus ſub ortum & occaſum. p. 149.
col. 28. 50
Anguli ſub meridiem minimi & maxi-
mi. 149. col. 29. 30
Angulus quem ecliptica cum circulis
verticalibus facit. pagina 149. colum.
33. 1
Angulus quem circulus meridianus fa-
cit ad quoduis punctum cum eclipti-
ca. 354. 1. 45
s. Anſelmus pro Aquis supra cælos. 645.
1.30
pro cælo liquido. 722. 2. 35
pro cælo igneo. 628. 2. 8. & p. 633.
2. 51
*Annorum diuerſorum Macula in ipſo
Sole viſa.*
Anni 1611. pag. 63
Anni 1618. pag. 229
Anni 1621. pag. 281
Anni 1622. pag. 199. tabella quarta, &
quinta. & pagina 217. tabella
quarta, & quinta. & pagina
229
Anni 1623. pag. 197. & 199. tabella
ſexta.
Anni 1624. pag. 165. & pag. 217. tabel-
la ſecunda, & ſexta. & pagina
229. & pagina 257. & pagina
281.
Anni

I N D E X.

I.

Anni 1625. à pag. 167. vsque ad pag. 291. & 345
 Anni 1626. à pag. 291. ad pag. 343
 Anni 1627. pag. 229. & 325. vsque ad 343
 Antonius Mizaldus pro cælo liquido. 764.2.30
 Antonius Lucianus pro cælo corruptibili, 699.1.13
 Antonius Maginus pro cælo liquido. p. 769.1.1
 Apelles ab Angelo Censori in inuentione macularum postponitur. pag. 4. col. 2.25
 Apelles alieno fucò non eget. pag. 8. colum. 2.33
 Apelles à Censore nil habere potuit. 14. 1.15. & col. 2.35
 Apelles ante Censorem de phænomeno scripsit. pag. 12.1.5. & pag. 17.2.3. & pag. 18.1.25. & colum. 2.42. & pag. 21.2.10
 Apelles ante Censorem modum eruendi phænomenon docuit. pag. 10. col. 1.12
 Apelles ex Censoris scribendis aliquid abstulisse nequit. 20.1.1
 Apelles de phænomeno scripsit anno 1611. Censor anno 1612. pag. 9. 2.30
 Apellis & Censoris sententiæ contrariæ 17.2.22. & 43.1.30
 Apellis contra Censorem demonstratio practica. 46.1.46
 Apelles nominatim impetitur. 3.1.30. & 7.2.38
 Apelles solus sub nomine *Quorundam* impetitur. 4.1.10. & vers. 26. & pag. 5.2.5. & pag. 25.1.4
 in Apellem summa dictorum. pag. 5. col. 1.51
 Apelles Harpias præuidens sua mature edit. 19.1.25. & 27.2.35
 Apelles iniuriam propulsare tenetur. 6.1.5
 in Apellem inepta cauillatio. 59.2.1. & 61.1.1. & 64.1.36
 Apellis inculpatæ tutelæ defensionem suscepit. 65.2.10
 Apellis innocentia ostenditur. pag. 54. 1.50
 Apelles innocentia æquo lectori committitur. pag. 53. colum. 1. ver. 10. & pag. 55. 2.15

II.

Apelles locum macularum tamquam maximum examini reseruat. pag. 52 1.27
 Apelles maculas figuræ sphæricæ esse nunquam scripsit. pagina 62. colum. 2. vers. 15
 Apellis modi varij in eruendo phænomeno. pag. 10. colum. 1. vers. 16. & pag. 11.1.40
 Apellis modus obseruandi omnibus præstat. 220.1.50
 Apelles de motu macularum nil decernit. 41.1.12
 Apelles motum inæqualem affirmat. pag. 41.2.12
 Apelles multa ex aliorum sensu scripsit. pag. 36. 1.50. & pag. 40. colum. 1. vers. 30. & pag. 51. col. 2. vers. 40. & pag. 58.2.9
 Apelles nulli tabulam suffurari potuit. 9.1.50
 Apelles nullo vsus est magistro in eruendo phænomeno. pag. 9. colum. 1. vers. 6
 Apelles omnia sua scripsit antequam Censor stabile quidquam sciret. pag. 17. 1.1
 Apellem omnia sua edidisse priusquam Censor scripserit ostenditur. pag. 56. 1.15
 Apelles Phænomeni inuentor. pag. 6. 2.14
 Apelles Phænomeni inuentor ex Angeli indulto. 14.1.47
 Apelles primus Phænomeni euulgator. 155.1.28
 Apelles Phænomenon à nullo didicit, multos docuit. pag. 10. col. 1. vers. 12. & p. 11.1.30. & col. 2.48
 Apelles primam inuentionis gloriam Censori auferre non contendisse demonstratur. pag. 23.2.35. & pag. 26. 1.50
 Apelles propria scripsit ex Censoris sententia. pag. 53. colum. 1. vers. 53. & pag. 54. 1.10
 Apelles Plagiarius si aliena pro suis venditat. 8.2.7
 Apelles quis sit à plerisque ignoratur. 26.2.40
 Apellis scripta à Censore citantur. 54. 2.50
 Apellis scripta semper continuata esse ostenditur. 57.1.35

I N D E X.

I.

Apelles manum à Tabula nunquam de-
posuit, pag. 1. col. 2. vers. 10
Apellis quando Tabulam pinxerit, pag.
9. 2. 35
Apellis Tabula. Vide Tabula.
Apollonius pro cælo liquido. 764. 2. 30
Apollinarius pro cælo igneo. pag. 632.
col. 2. vers. 15
Aprilis Maculæ anni 1624. pag. 217.
Tabella prima, & secunda. & pag.
199. Tabella octaua. & pag. 229
Aprilis Imago Macularum solarium pri-
ma anni 1625. pag. 191
Aprilis Imago secunda, 195
Tertia, 201
Quarta, 203
Quinta, 207
Aprilis Tabellæ, pagina 199. & pagina
217
Aprilis Imago Solis prima anni 1626.
à die quarta ad decimamoctauam,
pag. 311
Secunda, à die septima, ad decimam-
nonam, pag. 313
Aquæ veræ elementares super cælos ef-
se probantur. 941. 2. 1
cur Aquæ supra cælos sint, 642. 2. 5. &
643. 1. 1
Aquas supra cælos esse volunt
sanctus Ambrosius, pag. 642. colum.
1. vers. 20. & pag. 643. colum. 2. vers.
10. & pag. 710. col. 1. vers. 45
Sanctus Anselmus, pag. 645. colum.
1. vers. 30
Sanctus Augustinus, pag. 645. colum.
2. vers. 25. & pagina 702. colum.
1. vers. 1
Sanctus Basilius, pag. 641. colum.
2. vers. 50. & pagina 643. columna
1. vers. 15. & pagina 707. columna
1. vers. 1. & pagina 645. col. 1. 15
Sanctus Basilius Seleuciæ Episcopus. p.
679. 2. 20
Sanctus Beda, p. 642. 2. 20. & p. 643.
1. 8. & col. 2. 28. & p. 712. 2. 10
Martinus Becanus, pag. 644. colum.
2. vers. 45. & pag. 695. 2. 25
Card. Bellarminus, 644. 1. 45.
Iacobus Bonfrerius, pag. 646. 2. 10
Sanctus Bruno, 645. 1. 30
Cassiodorus, p. 714. 2. 41. & pag. 645.
1. 30
Cæsarius, 642. 1. 30
Chrysostomus. 645. 1. 15. p. 716. 2. 40

II.

Cabalistæ, 643. 1. 10
Claudius Marius Victor, 643. 2. 40
s. Clemens, 645. 1. 15
s. Cyrillus Hierosolymitanus, 711. 2. 51
& 645. 1. 20
s. Damascenus, 642. 2. 5
Dracuntius, 645. 1. 35
Dionysius Carthusianus, pag. 727.
2. 40
Drepanius Florus, 645. 1. 35
Ecclesiæ s. hymni, 697. 2. 1
Martin. del Rio, 645. 1. 1
s. Epiphanius, p. 711. 2. 7. & pag. 645.
1. 15
s. Eucherius, 712. 1. 10. & 645. 1. 30
Franciscus Forerius, 648. 2. 1
Guilelmus Antisiodoren. 648. 1. 50
Haymo, 645. 1. 30. & 712. 2. 20
Hieronymus ab Oleastro Lusitanus,
714. 1. 30
s. Hilarius, 641. 2. 40
s. Hyppolitus, 645. 1. 20
Hugo Carenfis, 716. 2. 20
s. Hieronymus, 645. 1. 25
Hugo de s. Victore, 645. 1. 30
Iunilius, 712. 1. 45
Iosephus, 715. 1. 1
s. Iustinus, pag. 642. 2. 20. & pag. 645.
1. 15
Magister Historiæ Scholasticæ, pag.
714. 1. 20
Magister Sententiarum, 713. 1. 1
Mendoza, 646. 2. 45
Molina, 646. 1. 1
Fabritius Paulutius Foroliuiensis E-
piscopus primus Ciuitatis plebis.
693. 1. 5
Procopius, pag. 642. 1. 40. & col. 2.
50. & pag. 643. 2. 20. & pag. 645.
1. 20
Richardus Pampolitanus, 712. 2. 40.
& 645. 1. 30
Richardus de s. Vict. 645. 1. 35
Rupertus Abbas Tuitien. 715. 1. 45
Strabus, 645. 1. 30
Ferd. Quirinus Salazar. 693. 2. 40
Seuerianus, 645. 1. 20
Theodoretus, 645. 1. 20
s. Thomas, 643. 2. 31
Tertullianus, 645. 1. 25
Vielmius Dominicanus Venetus Ae-
monix Episcopus, 648. 1. 40
Aquæ supra cælos nostris homogeneæ
sunt, 628. 2. 20

Aquæ

I N D E X.

I.

Aquæ supra cælos è facto diluuiò probantur, 685. 1. 30
 Aquæ supra cælos ex hebræis fontibus probantur, 652. 1. 20
 Aquila pro cælo liquido, 772. 2. 35
 Aratus pro cælo liquido, pag. 759. col. 2. vers. 50
 Arcus regressionis macularum ostenditur, 149. 27. 35
 Argumenta pro cælo incorruptibili soluntur, pag. 695. colum. 2. vers. 1. & pag. 771. 1. 1
 Arias Montanus pro cælo liquido, 772. 2. 35
 Aristoteles pro cælo incorruptibili allatus reijcitur, 675. 1. 1
 Cælum liquidum astruit, 747. 1. 10. & pag. 753. 2. 1
 pro cælo corruptibili, 750. 1. 1
 ipsius de Mundi æternitate opinio examinatur, 751. 1. 1
 Arnobius pro cælo igneo, pag. 628. col. 1. vers. 55
 Ars in lentibus relioscopicis naturam imitatur, 106. 1. 30
 Articus in Sole polus descendit, 268. 2. 35. & pag. 220. 2. 34
 Astra. Vide Stellæ.
 Astrologia diuinatrix mendax est, 604. 2. 25
 Astronomi qui cælum liquidum defendunt, 755. 1. 1
 s. Athanasius pro cælo igneo, pag. 633. 1. 31
 Atmosphæra terræ quæ dicatur. 599. 1. 30
 Atmosphæra differentem Solis in terram actionem caussat. pagina 598. 2. 20
 Atmosphæra Lunæ etiam ab aliquibus tribuitur, 740. 2. 20
 Auctores qui aquas supercælestes in diluuiò euocatas dicunt, 685. 2. 20
 Auctores pro aquis supra cælos, 728. 1. 12. & p. 641. 2. 1. Vide aquæ supra cælos.
 Auctores pro cælo corruptibili. 658. Vide pro cælo corruptibili.
 Auctores pro cælo liquido, 699. Vide pro cælo liquido Auctores.
 Auctores qui cælum realiter mutandū, seu igne comburendum dicunt, 689. 1. 15. & col. 2. 25
 Auctores cæli duri, 769. 2. 5. & 770. 2. 1

II.

Auctoris in scribendo fides, 142. 2. 30. & pag. 224. 1. 20
 Augusti imago Solis prima, 147
 Secunda, 249
 Tertia, 251
 Quarta, 253
 Quinta, quinque Tabulas diuersorū auctorum complectitur, 257
 Augusti Maculæ anno 1626. pag. 329. & 333
 s. Augustinus pro aquis supra cælos. 645. 2. 25. & pag. 701. 1. 10
 pro cælo corruptibili, pag. 671. col. 1. 20
 pro cælo igneo, pag. 628. colum. 2. vers. 25
 pro cælo liquido, pag. 701
 Augustinus Eugubinus pro cælo corruptibili, 690. 2. 50
 pro cælo igneo. pagina 639. colum. 2. vers. 25
 Auster in Solis imaginibus est, A, N, B. seu inferior pars, 153. 2. 27
 Axis solaris Eclipticæ & eius officium. 154. 2. 33
 Axis in Sole & poli mobiles. pag. 434. col. 2. vers. 41
 Axis circa quem maculæ voluuntur inuestigatio, 554. 1. 25
 Axis idem omnium mac. est. pag. 559. col. 1. vers. 40

B

S. BASILIUS Magnus quintâ cæli essentiam refutat, 709 col. 1. vers. 1
 Idem s. Basilius pro cælo corruptibili, 662. 2. 40
 pro cælo liquido, pagina 706. col. 2. vers. 20
 pro aquis supra cælos. pag. 641. col. 2. vers. 50. & pag. 643. col. 1. vers. 15. & pag. 707. 1. 1
 pro cælo igneo. 627. 2. 5. & 632. 1. 30 & 643. 1. 15
 s. Basilius Seleuciæ Episcopus pro cælo corruptibili. pagina 679. colum. 2. vers. 20
 pro aquis supra cælos. ibid.
 Basis communis visionis quæ sit. pag. 118. 2. 20
 Basis coordinatæ & confusæ cum oculo collatio. 116. 2. 1

K k k k 3

Becanus

I N D E X.

I.

Becanus pro aquis supra cælos affertur,
pag. 644. 2. 45. & pag. 695. 1. 35
& pro natura cæli corruptibili, pag.
695. 2. 20
Beda pro aquis supra cælos, pagina
642. col. 2. vers. 20. & pag. 643. 1. 8.
& colum. 2. vers. 28. & pag. 712. 2. 10
pro cælo corruptibili. ibid.
pro cælo igneo. pag. 628. 2. 10. & p.
633. 2. 45. & 642. 2. 20. & 643. 1. 10
Bellarminus aquas supra cælos esse asse-
rit, pag. 644. 1. 45
Cæli naturam liquidam asserit. pag.
731. & pag. 733. 2. 1
S. Bonaventura pro cælo liquido, pag.
724. 1. 30
pro cælo igneo. 630. 1. 50. & pag. 631
2. 55. & 633. 2. 12.
de numero cælorum. 724. 1. 30
Boreus in Sole semicirculus est pars su-
perior, A, Z, B, pag. 154. 2. 26.
S. Bruno pro cælo liquido 729. 2. 40
pro cælo igneo, 634. 1. 50
pro aquis supra cælos, ibid.
Burgensis testatur S. Thomam Solem e
nube factum non negasse, pag. 630.
3. 10

C

Carolus Archidux Austriae. pag. 1.
colum. 1. vers. 7. & pag. 217. co-
lum. 1. vers. 1
Caballistæ pro aquis supracælestibus.
643. 1. 10
Caietanus pro cælo liquido. 772. 2. 40
Cardanus pro cælo liquido. 764. 2. 30
Cassiodorus pro aquis supra cælos. 645
1. 30. & pag. 714. 2. 40
pro cælo liquido. ibidem.
Catharinus pro cælo corruptibili. 689.
1. 15
Causa quare Romæ auctor scripserit.
1. 1. 1.
Cedrenus pro cælo igneo. 653. 2. 15
De Cælo corruptibili.
pro Cælo corruptibili auctoritas sacrae
Scripturae. 658. 1. 1.
s. Ioannes Chrysostomus. 660. 2. 30.
s. Basilius, 662. 2. 40
s. Ambrosius. 663. 2. 40
s. Hieronymus. 665. 2. 40
s. Hilarius. 667. 2. 30
s. Epiphanius, 668. 1. 10

II.

s. Ephraem, 668. 2. 45
s. Irenæus, 669. 1. 10
s. Cyrillus Alexandrinus. 669. 2. 10
s. Ioannes Damascenus. 670. 1. 20
Andreas Archiepiscopus Cæsariæ.
pag. 670. 1. 45
s. Augustinus, 671. 1. 20
Hieronymus Vielmus. 673. 1. 15
s. Iustinus Martyr. 675. 2. 40
s. Gregorius Magnus. 679. 1. 1.
s. Patherius. 679. 1. 45
s. Macharius, ibid. col. 1. 50
s. Gregentius, ibid. 2. 1.
s. Basilius Seleuciæ Episcopus. eadem
pag. col. 2. 16
Zacharias Episcopus Mitylenes.
679. 2. 30
Ascanius Martinengus, 680. 2. 35
Philippus Solitarius, 680. 2. 35
s. Dionysius, 681. 1. 26
Hermas s. Pauli discipulus, 681. 1. 35
s. Petrus Apostolus, 682. 2. 10
s. Clemens Papa, 683. 2. 30
Alphonfus Salmeron, 686. 1. 40
IO. Baptista Laurus, 687. 1. 1
Quidius. ibid. col. 2. 25
Io. Maldonatus, 687. 2. 40
Ludouicus Molina, 688. 1. 3
Cornelius à Lapide, 688. 1. 20
Aecumenius 689. 1. 15
Catharinus, ibidem.
Hieronymus Magius, ibid.
Franciscus Valesius, ibid.
Sybilla, ibid. col. 2. 35
Franciscus Suarez, 690. 2. 10
Leo Castrus, ibid. vers. 40
Augustinus Eugubinus. ibid. vers. 50
Horatius Grassius, 691. 1. 3
Io. Antonius Roffenus, ibid.
Antonius Lucianus, ibid.
Albertus Rutilensis, ibid.
Michaël Petrus, ibid.
Ioannes Alvarez, ibid.
Iacobus Salianus. ibid. vers. 25
Emmanuel Sa. ibid. col. 2. 35
Cæsarius, ibid. vers. 45
Nicolaus Serarius, 692. 1. 35
s. Hyppolitus, ibid. col. 2. 50
Proclus, ibid.
Fabritius Paulutius, 693. 1. 5
Marinus Mersennus, ibid. col. 2. 10
Ferdinandus Quirinus de Salazar,
ibid. vers. 40
Io. Bapt. Folenghius, 694. 2. 1
Genebrardus

I N D E X.

I.

Genebrardus, 695. 1. 1
 Martinus Becanus, 695. 1. 35
 Io Ludouicus de la Cerda, 699. 2. 1
 Plotinus, 758. 1. 15
 Phicinus, ibid.
 Philoponus, ibidem.
 Hymnus Ecclesiæ, 697. 2. 1
 Latinus Card. Vrsinus Episcopus O-
 stiensis, 698. 1. 6
 Loca sacre Scripturæ quæ contra cæli
 corruptibilitatem afferri solent sol-
 uuntur, 690. 1. 10
De Natura Cæli ignea.
 pro Cælo igneo auctoritas Ecclesiæ.
 626. 1. 1
 Sanctorum Patrum, 627. 1. 5
 Sacre Scripturæ, & Hebræi fontes.
 651. 1. 1
 Auctores recentiores, 639. 2. 25
 Philosophi, 653. 2. 1
 Mathematici, 755.
 Alexander Alensis, 627. 1. 30. & pag.
 631. 2. 45
 Tertullianus, 627. 2. 1
 s. Basilius ibid. vers. 1. & pag. 632. 1. 30.
 & pag. 643. 1. 15
 s. Iustinus, pag. 627. 2. 10. & pag. 642.
 col. 2. 25
 s. Ambrosius, pag. 627. 2. 10. & pag.
 643. 2. 10
 Cyrillus Hierosolymitanus, pag. 627
 col. 2. vers. 10
 Cæsarius, pag. 627. 2. 25. & pag. 642
 col. 1. 30
 Theodoretus, 627. 2. 50. & pag. 633
 col. 1. 3
 s. Ioannes Chrysostomus, 628. 1. 15
 s. Gregorius Nyssenus, 628. 1. 33. &
 pag. 631
 Procopius, 628. 1. 37. & p. 633. 1. 50.
 & pag. 642. 1. 40. & p. 642. 2. 50.
 & pag. 643. 2. 20
 Anastasius Synaita, 628. 1. 50. & pag.
 633. 1. 2
 Arnobius, 628. 1. 55
 Lactantius, ibid. col. 2. 1
 Anselmus, ibid. vers. 8. & pag. 633
 col. 2. vers. 51
 Alcuinus, pag. 628. 2. 10. & pag. 633.
 col. 2. vers. 35
 Beda, 628. 2. 10. & p. 633. 2. 45. & p.
 642. 2. 20. & p. 643. 1. 10
 s. Isidorus, pag. 628. 2. 10. & pag. 634.
 1. 10

II.

Hugo Victorinus, pag. 628. 2. 12. & p.
 631. 2. 13
 Iacobus Saliarius, 628. 2. 15. & pag.
 641. 1. 46
 s. Augustinus, 628. 2. 25
 s. Thomas, pag. 630. 1. 30. & pag. 643.
 col. 2. vers. 35
 s. Bonaventura, 630. 1. 50. & seqq.
 Magister sententiarum, 631. 2. 25. &
 p. 634. 1. 15
 Petrus Comestor, 631. 2. 33
 Lyranus, 632. 1. 15
 Toftatus, ibid. col. 1. 25
 Didymus, ibid. col. 2. 5
 Apollinarius, ibid. vers. 15
 s. Damascenus, ibid. vers. 20. & pag.
 642. 2. 5
 s. Athanasius, 633. 1. 31
 Iuuenius, ibid. col. 2. 20
 Iunilius, 634. 1. 30
 s. Bruno, ibid. col. 1. 50
 s. Dionysius, 635. 1. 50. & 639
 Rupertus Abbas Tuitien. pag. 635.
 1. 20
 s. Maximus, pag. 636. 2. 30. & pag. 638
 1. 45
 Martinus Ant. del Rio, 637. 2. 40
 Augustinus Steuchus Eugubinus.
 639. 2. 25
 Empedocles, 640. 2. 35
 Anaximander, ibid.
 Xenophanes, ibid.
 Plato, ibid.
 Stoici, ibid.
 Anaxagoras, ibid.
 Philolaus, ibid.
 Ascanius Martinengus, 641. 1. 20
 s. Hilarius, ibid. col. 2. 40
 Clau. Marius Victor, 643. 2. 40
 Plutarchus, 653. 2. 15
 Seneca, 653. 2. 15. & pag. 748. 1. 20
 Plinius, 653. 2. 15. & 742. 2. 30
 Cicero, 653. 2. 15. & 747. 1. 20
 Aristoteles, 653. 2. 15. & 747. 1. 1.
 Cedrenus, 653. 2. 15
 Cleanthes, 747. 1. 30
Liquida Cæli substantia probatur.
 1. Ex Ethymologia, 699. 1. 1
 2. Ex Elementorum liquida substan-
 tia, ibid. vers. 15
 3. Ex motu Planetarum libero, ibid.
 col. 2. vers. 1
 4. Ex numero & motu cælorum.
 ibid. vers. 10
 5. Ex

I N D E X.

I.

5. Ex Auctoritate sacrae Scripturae.
700. 1. 1
6. Ex caelorum genesi. ibid. col. 2. 5
7. Ex Esdra, ibid. 20
Caelum liquidum esse docent.
- SS. Patres. 701
- Recentiores Theologi. 731
- Recentiores Philosophi. ibid.
- Philosophi antiqui. 747
- Mathematici. 755
- s. Augustinus, 701
- s. Basilius, 706. 2. 20
- s. Ambrosius, 710. 1. 10
- s. Epiphanius, 711. 2. 1
- s. Cyrillus Hierosolymitanus. ibidem
vers. 30
- Ioannes Baptista Laurus Perusinus.
687. 1. 1
- Eucherius, 712. 1. 10
- Iunilius, ibid. vers. 45
- s. Beda, ibid. col. 2. 10
- Haymo; ibid. vers. 20
- Richardus Pampol. ibid. vers. 40
- Magister Hist. schol. 714. 1. 20
- Magister sentent. 713. 1. 1
- Hieronymus ab Oleastro, 714. 1. 30
- Cassiodorus, ibid. col. 2. 40
- Rupertus Abbas Tuitien. 715. 1. 10
- s. Damascenus, 716. 1. 35
- Hugo Carenfis, 716. 2. 20
- s. Chrysostomus, 717. 1. 30
- s. Paulus Apostolus, ibid. 1. 10
- s. Iustinus, 718. 1. 55
- Diodorus Tarsen. ibid. col. 2. 40
- Eusebius Emiffenus, 719. 1. 1
- s. Philastrius Episcopus Brixien. ibidem
vers. 25
- Lactantius, ibid. col. 2. 30
- Procopius, pag. 720. 1. 25. & pag. 723
2. 55
- s. Isidorus, 720. 2. 1
- Richardus S. Vi&t. 722. 1. 55
- s. Anselmus, ibid. col. 2. 35
- Theophilactus, 723. 1. 43
- Seuerianus, ibid. col. 2. 38
- Acacius, ibidem
- Euthymius, ibidem
- Theodoretus, 724. 1. 20
- s. Bonauentura, ibid. vers. 35
- Franciscus Mayro, 726. 1. 10
- Origenes, ibid. vers. 25
- s. Gregorius Nyffenus, ibid. col. 2. 40
- Dionysius Chartusianus, 727. 1. 40,
& 755. 2. 10

II.

- Ptolomæus, 727. 2. 15
- s. Thomas, 729. 1. 50
- s. Bruno, ibid. col. 2. 40
- Bellarminus, 731. 1. 1
- Federicus Cæsius, 732. 1. 1
- Hieronymus Vielmus, 734. 1. 1
- Io. Bapt. Folenghius, 735. 1. 35
- Marinus Merfennus, 735. 2. 40
- Galilæus, pag. 740. 1. 1, & pag. 763.
2. 10
- Simon Marius, 741. 1. 15
- Raphaël Auerfa à Sanseuerino, 741. 1
25, & pag. 743. 2. 20, & pag. 752,
1. 20
- Tycho Braheus, pag. 741. 1. 45, & p.
763. 2. 15
- Ioannes Nicolaus à Smogoleck, 741.
2. 20
- Copernicus, ibid. & pag. 763. 1. 50
- Keplerus, ibid. & 763. 1. 55
- Sarsius, ibid.
- Rothmannus, ibidem
- Petrus Hurtadus Mendoza, pagina
742. 1. 1
- Aristoteles, pag. 747. 1. 1. & pagina
750. 1. 1
- Cicero, 747. 1. 20
- Cleanthes, ibid. col. 1. 30
- Seneca, 748. 1. 20
- Plinius, 749. 2. 30, & 764. 2. 30
- Aegyptii, pag. 754. col. 2. vers. 10. & p.
755. 2. 30
- Homerus, ibid.
- Anacreontes, ibid.
- Virgilius, ibid.
- Lucretius, ibid.
- Lucinus, ibid.
- Metrodorus, ibid.
- Heraclitus, ibid.
- Stoici, ibid.
- M. Vitruuius, 758. 1. 35
- C. Hyginus, 759. 1. 50
- Aratus, ibid. col. 2. 50
- M. Manilius, 760. 1. 10
- Crates, ibid. vers. 1
- Martianus Capella, 761. 1. 20
- Cicco Esculanus, 763. 1. 30
- Thebit. 763. 1. 35
- Alberus, ibid.
- Michaël Scotus, ibid. vers. 40
- VVillebrordus Snellius, ibid. colum.
2. vers. 5
- Symon Steuinus, ibid.
- Ioannes Remus Quietanus, ibid.
- Cornelius

I N D E X.

I.

Cornelius Gemma, 763.2.55
 VVitichius, 764. 1.1
 Michaël Mæstlinus, ibid.
 Christophorus Rothmannus, ibid.
 Ioannes Pena, ibid.
 Hieronymus Munosius, ibid.
 Marcellus Squarcialupus, ibid.
 Redemptus Baranzanus, ibid.
 Longo montanus, ibid.
 Origanus, ibid.
 Nicolaus Raymarus Vrsus, ibid.
 Dietmarfus, ibid.
 Ficinus, 764.2.30
 Albumasar, ibid.
 Cardanus, ibid.
 Hipparchus, ibid.
 Democritus, ibid.
 Hyppocrates, ibid.
 Apollonius, ibid.
 Antonius Mizaldus, ibid.
 Trimegistus, 640.2.10
 Rabanus Abbas, 725. 2.20
 Georgius Pachimerius, 637. 1.1
 Caietanus, 772.2.40
 Aquila, ibid. vers. 35
 Symmachus, ibid.
 Arias Montanus, ibid.
 Rabbini vers. 45
 Europæ Academiæ, 765.2.1
 Sinarum Academiæ, ibid.
 Ioseph. Blancanus, 765.2.25
 Ioannes Baptista Cysatus, pag. 765.
 2.45
 Christophorus Clavius, 766.1.10
 Theses Parmenses, 768. 1.10
 Antonius Maginus, 769.1.1
*Obiectiones contra cælum fluidum
 diluuntur.* 771.1.1
 Cælum fluidum probatur ex Cometis,
 737.1.25
 Ex nouis Planetarum Phænomenis,
 737.2.40. & 738. & 739
 Ex Cometarum capite, 740.1.15
 Ex Cometarum motu, 740.1.43
 Ex cauda Cometarum, 740.1.50
 Ex Lunæ Solem eclipsantis circa mar-
 ginem trepidatione, 740.2.15
 Ex Martis motu, 741.1.40
 Ex cælorum motu & numero natu-
 ra cæli liquida probatur, pag. 699
 2.10
 Ex cælorum genesi eorum natura li-
 quida probatur, 700. 2.5
 Ex Cometis cælum liquidum esse

II.

ostenditur, 737.1.25
 Cælum ex elementis factum est. 679.2.
 19. & 673.1.25
 Cælum essentialiter mutabitur, pag.
 689.1.45
 Cæli mutabuntur non in nihil redigen-
 tur. 666.2.25. & 667.1.20. & 670.
 1.31
 Cæli maior quam corporum beatorum
 mutatio erit, 689.1.41
 Cælum & terra igne conflagrabit. 665.
 col. 1.20. & pag. 683.1.5. Vide cæli
 ignei.
 Cæli specie alij erunt. 688.1.15
 Cælum & terra eiusdem materiæ sunt.
 647.2.16. & p. 686.2.35. & pag. 693.
 1.37
 Cælum & terra ex aqua sunt. pagina
 688.1.50
 Cæli tempore diluuij resoluti fuerunt.
 ibid. col. 2.30
 Cæli quinq; essentia improbatur. 681.1
 1. & 766.2.15
 Cælum stellas generare potest. 687. 2.
 20. & 766.2.1
 Cælum aliud inuisibile & æternum, a-
 liud visibile, & caducum est. 683. 2.
 40. & 684.2.20
 Cæli nomine Augustinus ignem intelli-
 git. 672.1.15
 Cælorum interitus de ipsis non de eorū
 motu prædictus est. 673.1.50
 Cælum si creatum secundum Aristote-
 lem corruptibile est. 750.2.14
 Cæli quot sint. 717.2.35. & 718.1.55.
 & 723.1.45. & 724.2.28. & 720.
 1.20
 Cælestes orbes fictitij sunt. 716.1.25. &
 725.1.1
 Cæli orbes reijciuntur. 736.1.1
 pro Cæli orbibus rationes probabiles
 non demonstratiuæ sunt, 729.1.20
 Cæli duri auctoritates, 769.2.5. & 770
 2.1
 Cælum solidos non esse probatur. pag.
 414.2.1. & 15
 Cæli motus regulares sunt. 148.1.45
 Casarius pro aquis supra Cælum. 642.
 1.30
 pro cælo igneo. 627. 2.25. & 642.
 1.30
 Censor Apellis scripta citat. 54.1.50
 Censor Apellem propria scripsisse testa-
 tur, 53.1.53. & 54.1.10

Censor

I N D E X.

I.

Censor Apellem suorum non auditore,
sed lectorem facit. 2. 1. 24
Censor Apelli prioritatis palmam con-
cedit, 22. 1. 12
Censor in Apellem, 23. 2. 50
Censor & Apelles, sententijs dissident,
17. 2. 22. & 43. 1. 30
Censor post Apellem scripsit. 12. 1. 5. &
16. 1. 10
Censor de Phænomeno scripsit an. 1612.
Apelles anno 1611. pag. 9. 2. 30
Censor Apellis Tabulam habuit quat-
tuor mensibus antequam verbum
scripserit. 15. 1. 18. & p. 62. 2. 3. & p.
20. 1. 35
Censor ante Apellis Tabulam editam
Phænomenon non vidit. pag. 26. col.
1. vers. 1
Censor ab Apelle Phænomenon didi-
cisse videtur. 10. 2. 28
Censor adhuc silet dum Apelles omnia
euulgavit. 20. 1. 51
Censoris scripta Censura sunt de Apel-
lis tabula. 25. 2. 10
Censor serius Apellem docet. 9. 2. 25
Censoris amicus nominatim Apellem
impugnat. 3. 1. 30. & 7. 2. 38
Censoris contra se ipsum scripta. 14. 2.
41. & 22. 1. 12. & col. 2. 45
Censor & Marius conferuntur inter se.
29. 1. 35
Censor in Simonem Marium. 29. 1. 8
Censoris fundamenta. 49. 2. 40
Censoris imperfectæ observationes. 13.
1. 30
Censor an aliquas observationes fece-
rit? 13. 2. 30. & pag. 14. 1. 40
Censor maculas solares non inuenit. 28
1. 15. & p. 31. 2. 35
Censor macularum motum curvilineū
ignorat. 11. 2. 9. & 34. 1. 20
Censor Macularum motum ad Eclipti-
cam obliquum negat. 33. 1. 51. & 34
1. 20. & 32. 2. 15
Censor macularum motum annuum
ignorat. 32. 2. 10
Censor macularum motum inæqualem
ignorat. 32. 2. 18. & 11. 2. 10. & 39.
col. 2. vers. 1
Censor maculas vult esse quid fumi-
dum. 50. 2. 50
Censor omnibus nude asserentibus fidē
derogat. 30. 2. 34
Censor nil de Phænomeno affirmare

II.

audet. 13. 2. 1
Censor Phænomeni essentialia ignorat.
52. 2. 23. & 32. 1. 50
Censor Phænomeni substantiam in hoc
statu perfectè intelligi posse negat.
51. 1. 17
Censor propter difficultatem Phæno-
meni fluctuat. 12. 1. 5. & 14. 2. 20. &
vers. 50. & p. 15. 2. 15
Censor de Phænomeno an. 1612. cum
Apelles omnia euulgavit nihil stabili
sciuit. 17. 1. 1
Censor de Phænomeno 18. mensibus si-
let. 16. 1. 9
Censoris de Phænomeno sententiæ im-
probabiles. 43. 1. 30
Censor se primum Phænomeni inuento-
rem facit, queritur alios sibi inuen-
tionis gloriam eripere voluisse. pag.
2. 2. 1
Censor se primum Tubi Optici inuen-
torem facit. p. 31. 2. 22. & 130. 1. 47
Censor præter Telioscopij vsum nil do-
cet. 11. 1. 55
Censor Solem circulo inclusum quando
non habuerit? 14. 1. 13
Censor sua an. 1613. edidit, Apelles
sua 1612. pag. 28. 1. 45
Censoris scripta. p. 2. 1. 50. & p. 10. 1. 42.
& p. 12. 2. 15. & p. 13. 1. 52. & p. 14. 1.
41. & p. 15. 2. 12. & p. 16. 1. 27. & p. 18.
2. 23. & p. 22. 1. 12. & p. 23. 2. 50. & p.
24. 2. 20. & p. 28. 2. 1. & p. 32. 2. 10. &
p. 33. 1. 25. & col. 2. 25. & p. 34. 1. 18.
& col. 2. 10. & p. 35. 1. 37. & p. 37. 2.
45. & p. 38. 2. 42. & pag. 39. 1. 10. &
vers. 42. & vers. 53. & p. 51. 1. 12. &
53. 1. 36. & p. 54. 2. 50. & p. 61. 2. 8.
& p. 65. 1. 24. & col. 2. 30
Charta concaua melius species repræ-
sentat. 110. 2. 15
Chartæ agitatione macule magis se pro-
dunt. 138. 4. 1
Christophorus Rothmannus pro cælo
liquido. 764. 1. 1. & 741. 2. 20
Christophorus Clavius pro cælo liqui-
do. 766. 1. 10
s. Chrysostomus pro aquis supra cælos.
645. 1. 15. & p. 716. 2. 40
Pro cælo corruptibili. 660. 1. 30
pro cælo igneo. 628. 1. 15
pro cælo liquido. 717. 1. 30
Cicco Esculanus pro cælo fluido. pag.
763. 1. 30

Cicero

INDEX

I.

Cicero pro cælo igneo. 653.2.15. & 747.
1.20
pro cælo liquido. ibid.
Cinis in igne non consumitur, pag. 655.
1.25
de Circellis polaribus in Sole circa quos
voluuntur Maculae annuæ. 554.2.20
Circelli quot sint. 555.1.15
vbi Circellorum poli consistant. ibid.
an Circelli inter se sint æquales. ibid. co-
lum. 2.20
Circellorum quis sit axis. ibid. col. 2.30
Circellus quantus sit. ibid. col. 2.45
Circelli magnitudo inter 6. & 8. gradus
versatur 556.1.15. & col. 2.40
Circelli quantitas quibus rationibus in-
uestigata sit. 556.1.40
Circelli quantitas cur aliquando maior
aliquando minor sit. 557.1.1
Circellus quanto tempore periodum
absoluat. 557.1.30
Circelli motus vnde, quo, & qualis sit.
557.2.5
Circellus quanta celeritate feratur in
milliaribus & passibus. 557.2.25
Circelli motus initium vnde faciendum
558.1.15
Circelli motus initium quando fiat. p.
558.1.40
Circellorum poli. 560.1.26
Circuli parui ad obseruandum Phæno-
menon in sufficientes. 208.2.25. &
220.2.1. & vers. 19. & p. 170.1.35.
& 186.2.35. & 258.1.12
Circuli æquales in æqualibus præferun-
tur in obseruando. 137.1.25
Circuli obseruatorij minores non sunt
penitus reiiciendi. 137.3.5
Circuli per verticem vsus. 147.4.10
Circulo in plano æqualem in sphaera
describere. 144.2.1
Circulos obseruatorios ab eodem telio-
scopio prodire præstat. 137.1.40
in Circulum eundem plures obserua-
tiones colligere præstat. 137.2.40
Circulus obseruatorius quis dicatur. 91
2.5
Circulus obseruatorius & solaris quo-
modo distinguantur. 136.1.40
Circulus obseruatorius maior minori
præfertur. 136.2.20
Circulus obseruatorius practice desi-
gnatur. 137.4.25
Circulus annuus macularum post lon-

II.

guti tempus vix sit perceptibilis. p.
440.1.30
Claudius Marius Victor pro aquis su-
pracælestibus. 643.2.40
Cleantes pro cælo igneo. 747.1.30
pro cælo liquido. ibid.
s. Clemens pro aquis supra cælos, 645.
1.15
pro cælo corruptibili. 683.2.30
Color minus intensus intensiori super-
additus illum auget. 128.4.53
Color vniformis non confunditur, pag.
101.1.1
Color lucis. Vide Lucis.
Color Solis. Vide Solis.
Cometæ nouem in cælo supra Lunam
visi. 736.2.20. & 737.2.40. & 766.
1.10
Cometæ è Maculis Solis ortum habe-
re videntur. 612.2.30
Cometa anni 1618. à Marte aut Mer-
curio procreatus creditur. pag. 687.
1.34
de Cometarum causa. 748.1.20
Confusio specierum quando fiat. 100.1.
5. & 116.1.35. & 119.2.2
Confusio speciei vnde oriatur. 118.2.35
Confusionis prima statio. ibid. col. 1.1
Copernicus pro cælo liquido. 741.2.20
& 763.2.40
Cornelius Gemma pro cælo liquido.
763.2.55
Cornelius à Lapide pro cælo corrupti-
bili. 688.1.20
Corollaria ex disputatore Florentino in
Apellem. 3.1.15
Corruptibile, & incorruptibile quid sit
secundum Aristotelem. 750.1.1
Corruptibilia omnia sunt præter Deum
665.1.11
Crates pro cælo liquido. 760.1.1
De Macularum solarium cursu.
Cursus centro viciniore minores, ab e-
cliptica remotiores maiores. p. 248.
1.47
Cursus subcontrarij. 331.2.1
Cursus subcontrarij mensibus contra-
rijs. 320.1.10
Cursus subcontrarij annorum diuerso-
rum. 334.1.40. & 324.2.40
Cursus subcontrarij, anno & mense eo-
dem. 328.2.30.
Cursus ab Aquilone in Meridiem. 224.
2.47

Cursus

I N D E X

I.

Cursus seu motus Macularum solarium
 ab Ecliptica multum declinans. 282.
 2.26
 Cursus Macularum tredecim in anno
 absoluuntur. 440. 1.8
 Cursus ad Eclipticam magis conuexi
 maiorem moram causant. pag. 296.
 2.25
 Cursus ad sensum rectilinei. 208. 2.44.
 & 210. 2.20. & 214. 1.10. & 220. 1.
 15. & 224. 1.27. & 225. 1.35. & 230
 2.30. & col. 1.51. & 262. 2.28. & 272.
 1.5. & 274. 2.23. & 276. 1.1. & 278.
 2.13. & pag. 286. 2.31. & pag. 318.
 col. 2.40
 Cursus rectilineus idem post sex men-
 ses redit. 437. 1.16
 Cursus ad sensum rectilineos diuersae
 vniuersitates & obseruationes docet.
 220. 1.15
 Cursus quando maxime rectilinei. 225.
 2.22
 Cursus rectilinei non sunt in orbibus so-
 li maioribus. 424. 1.30. & columna
 2.15
 Cursus curuilinei semper existunt. 224
 2.25. & 290. 1.1. & 228. 1.45
 Cursus Macularum bis in anno rectili-
 nei apparent. 423. 2.1
 Cursuum rectilineorum differentia fer-
 me diem adaequat. pag. 288. colum.
 2.25
 Cursuum rectilineorum differentia vix
 aliquot horarum. pag. 288. colum.
 2.20
 Cursus rectilinei temporibus aequalibus
 aequalia conficiunt spatia. pag. 318.
 1.10
 Cursus Macularum solarium annuus in
 Decembri initium sumit. pag. 163.
 col. 1.23
 Cursus aliquis Macularum est annuus.
 422. 2.50
 Cursus totalis inter 26. & 27. dies ver-
 satur. 549. 2.45
 Cursus integri sunt dierum 12. 13. 14. &
 15. p. 412. 1.32
 Cursuum annua, semestris, & trimestris
 vicissitudo perpetua est. pag. 162.
 1.11
 Cursus à Martio ad Septemb. ex aequi-
 lone in austrum à Septemb. ad Mar-
 tium ex austro in aquilonem fiunt.
 161. 2.42

II.

Cursus annorum diuersorum similes. p.
 225. 1.35. & 228. 1.45
 Cursus annorum. Vide Annorum.
 Cursui Macularum vnius anni similis
 est cursus aliorum annorum tempo-
 re eodem. 422. 2.25
 Cursus locorum diuersorum similes. p.
 172. 1.25
 Cursus inaequales. 246. 2.5. & 260. 2.3.
 & 335. 2.1
 Cursus inaequales eodem tempore. 290.
 1.5. & 330. 1.53
 Cursus inaequalis in eodem parallelo.
 316. 2.50. & 190. 1.15. & pag. 146.
 2.25
 Cursus circa aequilibrium vernum super-
 rat cursus boreales plusquam die. p.
 304. 1.12
 Cursus Decembris. Vide Decembris.
 Cursus dierum 13. Vide Dierum.
 Cursuum distantiae. Vide Distantiae.
 Cursus Duaceni. Vide Duaceni.
 Cursus Friburgani. Vide Friburgani.
 Cursuum fragmenta. Vide Dierum.
 Cursus ellipticis haud absimiles sunt. p.
 308. 2.40. & 260. 2.19
 Cursus in aequilibrio. 186. 1.1
 Cursus incipientes eodem in puncto,
 mense & die similes erunt. pag. 160.
 1.35
 Cursus inter Maium, & Iunium rectili-
 neus fit semper oblique ex Borea in
 Austrum. 225. 2.1
 Cursus inter Nouembrem, & Decemb.
 ex Austro oblique tendit in Boream.
 225. 2.2
 Cursus mensibus tribus conuexi in A-
 quilonem & alijs tribus concaui. 161
 2.41
 Cursus Martio, Aprili, & Maio concaui
 sunt in Austrum. ibid. vers. 42
 Cursus Iunio, Iulio, & Augusto conuexi
 sunt in Austrum. 161. 2.46
 Cursus Septem. Octob. & Nouemb. con-
 uexi sunt in Austrum. 162. 1.1
 Cursus Decemb. Ian. & Febr. concaui in
 Austrum occiduum, conuexi in Se-
 ptentrionem ortiuum. 162. 1.6
 Cursus vbi, quando, & quomodo curue-
 scere incipiant. 225. 1.15
 Cursus hyemalis rectilineus fit initio
 Decemb. 225. 2.25
 Cursus rectilineus aestiuus à Iunio inci-
 pit. 225. 2.15

Cursus

I N D E X.

I.

Cursus diuerforum annorum similes. p.
 197. 199. 201. 207. 209. 211. 215.
 217. 229. 231. 233. 239. 241. 243.
 247. 249. 251. 253
 Cursus diuerforum locorum similes. Vi-
 de Ingolstadiani, Duaceni, Romani.
 Cursus macularum etiam vnus diei si-
 miles. 186. 1. 48
 Cursus macularum, facularum, & vm-
 brarum idem. 225. 2. 25. & 226. 2. 30
 & 310. 2. 9
 Cursus macularum se mutuo secant. p.
 264. 1. 42
 Cursus macularum dierum minimum
 decem sunt. 218. 1. 1
 Cursus orbibus planetarum non insunt.
 424. 1. 20
 Cursus quando alterari incipiat. p. 564.
 1. 50
 Cursus cur tantum bis in anno rectili-
 neus sit. 566. 1. 10
 Cursus paralleli. pag. 246. 1. 39. & pag.
 292. 1. 21. & pag. 298. 2. 25. & 312.
 2. 1. & 318. 1. 32. & col. 2. 42. & 278
 2. 14
 Cursus alijs paralleli, alijs non paralleli
 eodem tempore. pag. 290. columna.
 2. 12
 Cursus non paralleli. 200. 2. 35. & 264.
 2. 13. & 268. 1. 8. & 272. 2. 40. & p.
 330. 2. 5
 Cursus paralleli maximi dierum 13. &
 aliquot horarum sunt. 308. 2. 35
 Cursuum proprietates. 430. 2. 45
 ex Cursuum proprietatibus conclusio-
 nes. 434. 2. 31
 Cursus redit, maculae non redeunt. 160.
 1. 30. & 156. 2. 15
 Cursuum diuersitas. 224. 2. 50
 Cursus vniiformes quod rarissimum est.
 312. 2. 5
 Cursus macularum nec totus infra, nec
 totus supra Solem. pag. 424. colum.
 1. 50
 Cursus macularum circa Solem, vnde
 conclusus sit. 434. 2. 31
 Curuitates motuum non sunt circula-
 res. 260. 2. 19
 Curuitas minima. 274. 2. 23. & 276. 1.
 17. Vide cursus rectilinei.
 Curuitas decrescit, polus patens descē-
 dit. 260. 2. 32
 Curuitas ad eclipticam crescit. p. 176.
 1. 33

II.

s. Cyrillus Alexandrinus pro caelo cor-
 ruptibili. 669. 2. 10
 s. Cyrillus Hierosolimitanus pro aquis
 supra caelos. 645. 1. 20. & 711. 2. 51
 pro caelo igneo. 627. 2. 10
 pro caelo liquido. 711. 2. 50
D Amascenus pro aquis supra
 caelos. 642. 2. 5
 pro caelo corruptibili. p.
 670. 1. 45
 pro caelo igneo. pag. 632. 2. 20. & p.
 642. 2. 5
 pro caelo liquido. 716. 1. 35
 Demones in aëre habitasse, ait S. Aug.
 627. 2. 25
 in Decembri & Nouembri summa ma-
 cularum ab ecliptica declinatio. 276
 1. 9
 in Decembri aliquot diebus Sol à macu-
 lis vacuus. 163. 2. 20
 in Decembri initium sumit motus ma-
 cularum annuus. 163. 1. 15
 Decembris Imago Solis à 14. ad 16. diē
 anni 1624. p. 165
 Decemb. Imago Solis prima an. 1625.
 ad 5. diem. p. 277
 Secunda ad diem 8. 279
 Tertia à die 3. ad 14. 285
 Quarta à die 7. ad 16. 287
 Quinta à die 13. ad 23. 289
 Sexta à die 15. ad 7. Ianuar. 291
 Decembris maculae Solis anno 1626 p.
 321.
 Democritus pro caelo liquido. p. 764.
 2. 30
 Dicta Censoris in Apellem. 3. 2. 25
 Dicta Angeli in Apellem. 4. 2. 20
 Dictorum Censorinorum in Apellem
 summa. 5. 1. 51
 Didimus pro caelo igneo. 632. 2. 5
 Dierum minimum decem omnium ma-
 cularum cursus. 218. 1. 1
 Dierum 10. & horarum 9. cursus. 317.
 1. 10
 Dierum vndecim & horarum 9. cursus.
 317. 1. 3
 Dierum 12. cursus. 184. 2. 13. & 262. 2. 1
 & 302. 1. 40
 maior Dierum 12. cursus. 175. num. 7.
 & 190. 2. 55. & 318. 1. 19
 LIII Dierum

I N D E X.

I.

Dierum duodecim & semis cursus. 318
 1.45. & 292.1.14
 Dierum tredecim cursus rarus. pag. 292.
 2.10
 Dierum tredecim cursus. pag. 298. col.
 2.10
 minor quam Dierum 13. cursus. 232.1
 9. & col. 2. vers. 13. & 45. & p. 278. 2.
 17. & p. 300. 2.30. & 292.2.9. & 232
 2.45.
 maior Dierum quam 13. cursus. 298.2.
 16. & pag. 312. 1.30. & pag. 260. col.
 1.22
 Dierum 13. hor. 8. cursus. 308.2.30.312
 2.30
 Dierum 13. & semis cursus. pag. 318.
 2.39
 Dierum fere quatuordecim cursus. 186
 1.20. 248.1.24. 264.1.25. 300.2.
 38.302.2.43
 Dierum quatuordecim cursus, pag. 304
 1.6
 vnus Diei facula & vmbra. 238.2.25
 & 274.1.19
 Dierum duorum facula. 202.2.6. 238.
 2.20. & p. 272. 2.32. & pag. 274. col.
 1.25
 Dierum trium facula. 244.1.20
 Dierum 13. facula. 190.2.4. & 204.2.
 21.
 Diei vnus macula. 274.2.29
 Dierum duorum macula. 238.2.16. &
 244.2.48. & pag. 264. 2.39. & 281.
 1.18
 Dierum trium macula. 186.1.42. 209.
 1.1. & 233.1.8. & 262.1.23. & 274.
 2.18
 Dierum quattuor macula. 277.2.1
 Dierum sex macula. 260.2.3
 Dierum septem macula. 260.2.4. & 278
 1.1
 Dierum octo macula. 274.2.12
 Dietmarus pro celo liquido. p. 764.
 1.1
 Diodorus Tarsensis pro celo liquido.
 718.2.40
 Dionysius pro celo corruptibili. p. 681
 1.26
 pro celo igneo. p. 635. 1.50. & 639.
 2.20
 Quintam celi essentiam non docuit.
 ibid. col. 1.50
 Dionysius Carthusianus pro aquis su-
 pra celos. 727.2.40

II.

pro celo liquido. 727.1.40. & 755.
 2.10
 Distantia mac. triplo aucta. 298.1.15.
 & 266. 2.22
 Distantia sextuplo aucta. 298.1.25
 Distantia macularum aequales quod
 rarum est. 312.2.5
 Distantia orientales ampliores, strictio-
 res occidentales. 208.2.46
 Distantia aucta. 246.2.25. & 270.1.11.
 & 298.2.5
 Dracuntius pro aquis supra celos. 645.
 1.35
 Drepanius Florus pro aquis supra ca-
 los, ibid.
 Duacena obseruationes macularum so-
 larium. 181. pag. 195. p. 229. p. 257. &
 pag. 281

E

S. **E**cclesia hymni pro aquis su-
 pra celos. pag. 697. 2.1
 pro celo corruptibili. ibid.
 pro celo igneo. 626. 1.1
 Eclipsis Solis facta in passione Domini
 à maculis solaribus causata fuit. 611
 2.50
 plures Solis Eclipses non à Luna. 609
 1.20
 Ecliptica Solis quæ dicatur. pag. 154.
 2.25
 Eclipticam in circulum obseruatorium
 inducere. 149.2.5
 Eclipticam inducendi praxis. 144. 1.1.
 149.2.5. & 467.2.1
 sub quanta ad Eclipticam inclinatione
 Sol quotidie oriatur aut occidat. 149
 col. 28.45
 Elementum nullum purum est. 710.1.21
 ex quatuor Elementis omnia sunt. 635.
 col. 1.5
 ex Elementorum natura celorum li-
 quida substantia probatur. 699.1.15
 Emanuel Sa pro celo corruptibili. pag.
 691.2.35
 Empedocles pro celo igneo. pag. 640.
 2.35
 s. Ephraem pro celo corruptibili. p. 668.
 2.45
 Epicycli omnes à phænomeno solari e-
 ijciuntur. 420.1.23
 s. Epiphanius pro aquis supra celos. 711
 2.1.645. 1.15
 ex Esdra celorum liquiditas probatur.
 700.2.20

S.Eu-

I N D E X.

I.

S. Eucherus pro aquis supra cælos. 655.
1.30.712.1.10

pro cælo corruptibili. 668.1.10

pro cælo liquido. 711.2.11

Europæ Academiæ cæli liquiditatem
plerumque docent. 765.2.1

Eusebius Emyssenus pro cælo liquido.
719.1.1

Euthymius pro cælo liquido. pag. 723.
2.38

Excentrici omnes à Sole remouentur.
428.1.1. & 430.1.1

Excentrici nulli mac. causare possunt.
420.1.23.

F

F Abritius Paulucius Foroliurensis.
pro aquis supra cælos. 693.1.5
pro cælo corruptibili. ibid.

pro cælis elementaribus. ibid.

De Faculis quæ in Sole apparent.

Faculæ ab horizonte præcisæ luculen-
tæ. 294.1.13

Faculæ borealissimæ. 234.1.15

Facularum extra horizontem Solis nil
penitus videtur. 186.2.20. 188.1.7.

204.2.25. 226.1.40. 274.1.35. &
308.1.24

Faculæ per integros dies in horizonte
hæret. 188.1.5. 200.2.55. 226.1.35

& 204.2.23

Faculæ cometæ instar. 202.2.4. 234.1.
46.

Facula colorata. 192.2.15

Facula adæquat quartam solaris dia-
metri partem. 206.1.45

Faculæ vnius diei. 238.2.25

Faculæ dierum 2. &c. Vide dierum.

Faculæ è maculis natæ. 230.1.20. Vide
Maculæ in faculas.

Faculæ in maculas abeunt. 234.2.4. &
232.2.16. & 244.1.45. Vide Macu-
lis è Faculis.

Faculæ in medio macularum. 206.1.20
& 319.1.5

Facula inter maculas. 276.2.14. & 192
2.15

Facula circa maculam. pag. 272. col.
2.22

Faculæ cum maculis æquali passu ferū-
tur. pag. 190. colum. 1.12. & pag. 308

1.28

Faculæ vt maculæ mouentur. pag. 178.
colum. 2. vers. 35. & pag. 226. col. 2.

vers. 30. & pag. 190. 2. 6

II.

Faculæ & vmbre maculas magis sequū-
tur quam præcedunt. pag. 248. col. 1

vers. 17. & colum. 2. vers. 1. & p. 260.

col. 1.6. & p. 286. 1. 12. & colum. 2.

18. & pag. 300. colum. 2.6. & pag.

292. 2.17

Faculæ maculas præcedentes. pag. 294.
1.1

Faculæ vt maculæ mouentur. pag. 419.
2.15

Faculæ non vt maculæ in horizonte gra-
cilescunt. 187.2.5

Faculæ gracilescunt. p. 264. 2.41. & 204
1.40

Faculæ sine maculis. pag. 200. 1.50. &
163.2.45

Faculæ magis mutantur quam maculæ
202.1.14

Facularum iubar magis versus orientē
dilatatur. 192.2.10

Faculæ intra nucleos. 306.2.10

Faculæ dilatantur. 272.2.19. 276.1.35.
& 260.1.10

Faculæ puræ. pag. 202. 2.6. & 226.2.
35. & 228.1.1. & 234.1.15. & 272.2

32. & 296.2.13. & 198.2.38. & 238

2.20. & 274.1.19. & vers. 25. & 184

2.5

Faculæ per totum Solem. 190.1.32

Faculæ in Sole triginta. 226.2.4

Faculæ puræ in Sole viginti. 228.1.1

Faculæ in medio Sole natæ. ibid. ver. 2

Faculas in Sole esse è sacra Scriptura
probat. 652.2.20

Faculæ in medio Sole pereunt. pag. 227
2.4

Faculas secundarias qua arte auctor lu-
stret. 130.1.2

Faculæ separantur. pag. 234. colum. 1.
vers. 35

Faculæ solis punctulis notatæ quid si-
bi velint. 156.2.47

Faculæ si extra Solem sunt necessario
apparebunt. 418.1.48

Faculæ & vmbre in partibus polaribus
304.2.10

Facularum & vmbrearum insignis mu-
tatio. 318.1.35

Faculæ vmbreis commixtæ. pag. 238.
2.25

Facularum relicta vestigia. pag. 227.
2.1

Februarij Imago Macularum solarium
prima an. 1625. ad 7. diem. pag. 175

LIII 2

Secunda

I N D E X.

I.

Secunda ad 6. diem 175
 Tertia ad 7. diem 177
 Quarta ad 6. diem. 179
 Quinta ad 7. diem 181
 Sexta ad 13. diem. 183
 Septima à 5. ad 23. diem. 185
 Octaua à 24. die. 187
 Februarij Tabellę. 199
 Februar. imag. Solis prima an. 1626. ad
 secundum diem. 297
 Secunda à 2. die ad 14. 299
 Tertia à 12. ad 27. 301
 Quarta à 24. ad 15. Mart. 303
 Februarij an. 1627. 329
 Federicus Cęsius Princeps s. Angeli pro
 cęlo liquido. 732. 1. 1. & 775.
 Eius de natura cęlorum epistola. 777
 Ficinus pro cęlo liquido. 764. 2. 30
 Firmamentum quod sit. 647. 1. 20
 Firmamentum quare dicatur. 707. 2. 21
 & 713. 2. 13. & 716. 2. 22
 Firmamentum non ex nihilo est. 646. 1
 55
 Firmamentum ex aquis est. 634. 2. 1. &
 647. 2. 10
 Firmamentum fluidum est. 634. 1. 40
 Igneum est. 672. 1. 5. & col. 2. 5
 Congelatum non est. 707. 2. 41.
 & 710. 2. 50
 Firmamentum an moueatur. 704. 1. 10.
 713. 2. 10
 Flaedo macularum solarium . 219. 1.
 35. & col. 2. 30
 Florentinus Disputator incognitum A-
 pellem taxat. 3. 1. 25
 Folenghius pro cęlo corruptibili . 694.
 2. 1
 pro cęlo liquido. 735. 1. 35
 Franciscus Forerius pro aquis supra cę-
 los. 648. 2. 1
 Friburganę obseruationes. p. 199. 217.
 229. 281
 Fulgur Sole velocius est. 656. 1. 35

G

Galilęus pro cęlo liquido. 740
 1. 1
 Galilęus Solem gyrari probat
 419. 2. 10
 Genebrardus pro cęlo corruptibili. pag.
 695. 1. 1
 s. Gregorius Nyssenius pro cęlo igneo.
 628. 1. 33. & 631

II.

pro cęlo liquido. 726. 2. 40
 s. Gregorius Magnus pro cęlo corrupti-
 bili. 679. 1. 1
 s. Gregentius Archiepiscopus Aethiopię
 pro cęlo corruptibili. 679. 2. 1
 P. Georgius Schöenberger obseruator
 Macularum solarium. 217. 1. 8
 P. Gruenberger obseruator Macularum
 in Collegio Romano. 242. 1. 5
 P. Gruenberger demonstrationes de
 triangulis 366. 1. 1
 Guilhelmus Antistodorenسيس pro aquis
 supra cęlos. 648. 1. 50

H

S. Hilarius pro cęlo corruptibili
 667. 2. 30. pro cęlo igneo
 641. 2. 40
 Halitus seu vapor in Sole se ad nuclei
 figurę fere accommodat, 210. 1. 33
 Halitus seu vapor circa Nucleos. p. 290.
 1. 40
 Halo aut nimbus circa maculas. p. 306:
 2. 47
 Haymo pro aquis supra cęlos. p. 645. 1.
 30. & 712. 2. 20. pro cęlo liquido. p.
 712. 2. 20
 Helioscopium quod dicatur. 132. 2. 30
 & 131. col. 4. 20
 Helioscopij vsus. pag. 71. 1. 40. & 132.
 2. 30
 Helioscopium res minutas in Sole de-
 tegit. 220. 1. 50
 Heliotropicum Telioscopium quod sit.
 348. 1. 50
 Heliotropici fabrica. 348. 2. 25
 Heliotropici alia constructio. pag. 450.
 2. 45
 Heraclitus pro cęlo liquido. pag. 755.
 2. 30
 Hermas sancti Pauli Discipulus pro cę-
 lo corruptibili, pagina 681. columna
 1. vers. 35
 s. Hieronymus pro aquis supra cęlos. p.
 645. 1. 25
 pro cęlo corruptibili. pag. 665. col.
 2. 40
 Hieronymus ab Oleastro pro aquis su-
 pra cęlos. 114. 1. 30
 Horę quibus Auctor vtitur sunt Ger-
 manicę à meridie in mediam noctę,
 & inde in meridiem. pag. 94. 2. 14.
 & 166. 2. 20

Hippar-

I N D E X.

I.

Hipparchus pro cælo liquido. 764. 2. 30
 Hippocrates pro cælo liquido. ibid.
 s. Hippolitus pro aquis supra cælos. 645
 1. 20. pro cælo corruptib. 692. 2. 50
 Homerus pro cælo liquido. 755. 2. 30
 Honchala pro aquis sup. cæl. 645. 1. 45
 Horatius Grassius pro cælo corruptibili
 691. 1. 13
 Horizon Solis quis. 154. 2. 50
 Horologij noua descriptio. 606. 1. 20
 Hugo Carenfis pro aquis supra cælos.
 716. 2. 20 pro cælo liquido. ibid.
 Hugo de S. Victore pro aquis supra cæ-
 los. 645. 1. 30
 pro cælo igneo. 628. 2. 12. p. 631. 2. 13
 Humor crySTALLINUS, non est formale
 organum visus. 120. 1. 50
 Humor crySTALLINUS confusa ordinat or-
 dinata confundit. 100. 2. 33. & 127.
 col. 4. 25

I

Iacobus Bonfrerius pro aquis supra
 cælos. 646. 2. 10
Macula anni lubilai 1625
 Ianuarij imago macularum solarium an-
 ni 1625 prima, à die prima ad vnde-
 cimam. pag. 167
 Ian. imago 2. à die 7. ad 18. p. 169
 Ian. imago 3. à die 13. ad 23. p. 171
 Ian. imago 4. à die 14. ad 20. p. 173
 Ian. imago 5. à die 26. ad 7. Feb. p. 175
 Ian. imago 6. à die 26. ad 6. Feb. p. 175
 Ian. imago 7. à die 26. ad 7. Feb. p. 177
 Ian. imago 8. à die 27. ad 6. Feb. p. 179
 Ian. imago 9. à die 26. ad 7. Feb. p. 181
 Ian. imago Solis 1. an. 1626. ad diem 7.
 pag. 291
 Secunda à 1. ad 15. p. 293
 Tertia à 17. ad 29. p. 295
 Quarta à 20. ad 2. Febr. p. 297
 Ian. an. 1627. pag. 325
 Ignis sublunaris diem efficit. 657. 2. 15
 Ignis esse potest quem oculus intueri nō
 possit. 656. 1. 1
 Ignis noster portio Solis est. 634. 2. 26
 Ignis accensus aër est. 641. 1. 15
 Ignis vnum è quattuor elementis est.
 632. 2. 30
 Ignis & lux idem sunt. 632. 2. 36
 Imago Solis quid, & quid in ea notan-
 dum. 154. 1. 50. & 161. 1. 80
 Imago Macularum solarium anno 1611.
 21. Octob. Ingolstadij, visa. p. 63

II.

Mac. diuerforum annorū. Vide Annorū.
 Imag. Solis mens. Dec. p. 165. 2. 77
 Imag. Solis Ian. p. 167. 2. 91. & 325
 Imag. Solis Febr. p. 175. 2. 97. & 329
 Imag. Solis Mar. p. 187. 3. 03. 333. & 337
 Imag. Solis Apr. p. 191. & 311
 Imag. Solis Maij. p. 209. & 315
 Imag. Solis Iun. p. 215. 3. 15. & 321
 Imag. Solis Iul. p. 233. & 325
 Imag. Solis Aug. p. 247. 3. 29. & 333
 Imag. Solis Sept. p. 253. & 333
 Imag. Solis Octob. p. 263
 Imag. Solis Nouemb. p. 273
 Collationes imaginum Iunij, & Decēbr.
 321. Iul. & Ian. 325. Aug. & Feb. 329
 Aug. Sept. & Mar. 333
 Immissio specierum plura ostendit quā
 emissio. 220. 1. 40. & 221. 1. 36
 Inclination. Vide curuitas.
 Ingolstadij Phænomenon primo inuen-
 tum. 6. 2. 11
 Ingolstadianæ obseruationes. 173. 179.
 197. 199. 217. 223. 257. & 281
 Ingolstadianæ & Romanæ obseruatio-
 nes concordant. p. 171. 177. 179. 197
 199. & 217
 Ingolstadij pauciores mac. visa. 208. 1. 5
 Intensio, remissio, condensatio & rarefa-
 tio quomodo differant. 503. 2. 45
 Intercapedo alba inter maculas. 278. 1.
 15. & vers. 23. & p. 316. 1. 14
 Intercapedo faculae instar. 278. 1. 23. &
 290. 1. 30
 Intercapedo filij araneæ instar. 292. 2. 5
 Vide spatium.
 Intercapedinis vehemens iubar. p. 219.
 1. 30
 Intercapedo in dies aucta. 233. 1. 3. Vide
 distantia.
 Ioannes Aluares pro cælo corruptibili.
 691. 1. 30
 Ioannes Baptista Laurus Perusinus pro
 cælo corruptibili. 687. 1. 1
 pro cælo igneo, ibid.
 Ioannes Baptista Cysatus pro cælo li-
 quido. 765. 2. 45
 Io. Faber pro cælo liquido. p. 733. 1. 35.
 Ioannes Ludouicus de la Cerda pro cæ-
 lo corruptibili. 696. 2. 1
 Io. Pena pro cælo liquido. pag. 764. 1. 5
 Ioannes Quietanus pro cælo liquido. p.
 763. 2. 5
 Ioseph. Flavius p. aquis sup. cæl. 715. 1. 1
 Iosephus Blancanus pro cælo liquido.

I N D E X.

I.

pag. 765. colum. 2. vers. 25
 Iouem Astronomi atmosphaera circum-
 dant. 740. 1. 5
 s. Isidorus pro caelo igneo. 628. 2. 10. &
 634. 1. 10
 pro caelo liquido. 720. 2. 1
 s. Irenaeus pro caelo corruptibili. p. 669.
 1. 10
 Iunij imago Solis prima ad 18. diem. 215
 Secunda ab 8. ad 24. diem. 231
 Tertia à 19. die. 233
 Quarta à 27. die. 235
 Tabula Tertia. p. 229
 Iunij macul. an. 1626. p. 315. & 321
 Iunij macul. an. 1627. p. 341
 Prima Iulij ad 2. diem. ann. 1625. p.
 233
 Secunda ad 12. p. 235
 Tertia à die 3. ad 6. 237
 Quarta à 5. ad 12. p. 239
 Quinta à 3. ad 12. diem. p. 241
 Sexta à 3. ad 15. diem. 243
 Septima Iulij à 12. ad 24. diem. 245
 Octaua Iulij, à 25. die. p. 247
 Iulij imag. an. 1626. p. 325
 Iunilius pro aquis supracaelestibus. 712.
 1. 45
 pro caelo liquido. 712. 1. 45
 s. Iustinus martyr pro aquis supra caelos
 642. 2. 20. & 645. 1. 15
 pro caelo corruptibili. 675. 2. 40
 pro caeli natura ignea. 627. 2. 10. &
 642. 2. 25
 pro caelo liquido. 718. 1. 55
 de numero caelorum, ibid.
 Iuuenius pro caelo igneo. 633. 2. 20

K

K Eplerus pro caelo liquido. 741
 2. 20. & 740. 1. 1
 Mac. sub Sole vidit an. 1607
 pagina 609. col. 1. vers. 1

L

L Astantius Firmianus pro caelo
 igneo. 628. 2. 1
 pro caelo liquido. 719. 2. 30
 Laterales tabulae quid sint. 216. 1. 50
 Latinus Card. Ursinus pro caelo corru-
 ptibili. 698. 1. 6
De Lentibus Opticis.
 Lentium vsus. 741. 50

II.

Lentium forma. 98. 1. 20
 Lentium materia. 97. 1. 45
 Lentium magnitudo. 98. 2. 10
 Lentium globositas. 99. 1. 13
 Lentium politio. 99. 2. 5
 Lentium collocatio & ad eam necessaria.
 103. 1. 35
 Lentium diuersae coordinationes. 127.
 col. 3. 50
 Lentes discernendi modus. 99. 2. 50
 Lentes quando politae sint. 102. 2. 16
 Lens caua quomodo probanda. p. 103.
 1. 15
 Lentium experientiae practicae. p. 128.
 1. 20
 in Lentibus, naturae & artis mirabilis
 conspiratio. 106. 1. 25
 Lentium cum oculo humano collatio.
 106. 2. 8
 Lentes minorum sphaerarum acutiores
 sunt. 99. 1. 32
 de Lentibus conuexis duabus regulae
 practicae. 115. 1. 36
 Lens conuexa species confusas in char-
 tam ordinatè pingit, ordinatas con-
 fuse. 121. 1. 1
 Lens conuexa cum oculo comparatur.
 121. 2. 15
 Lentis vnus conuexae vsus. pag. 137.
 col. 3. 40
 Lentium trium conuexarum vsus nouus.
 131. col. 3. 50
 de Lente caua. 124
 Lens caua & eius effectus. 122. 1. 10
 Lens caua species dissipat. 124. 2. 15
 Lens caua post conuexam confundit. p.
 125. 1. 35
 Lens caua quo magis ad conuexam ac-
 cedit hoc imaginem maiorem facit,
 sed minus puram 126. col. 4. 35
 Lens caua respiciat chartam conuexam
 obiectum. 133. 3. 19
 Lentis minima detectione Sol nouus lu-
 stratur. 132. 1. 41
 Lentium refractio. Vide refractio.
 Leo Castrus pro caelo corruptibili. 69
 2. 40
 Liber primus. p. 1
 Liber secundus. 67
 Liber tertius. 149
 Liber quartus. 403
 Libri quarti secunda pars. 553
 Libri apographi quid auctoritatis ha-
 beant. 681. 2. 6

Libri-

IXNDIEXI

I.

Libripendens. 1.2.30
 Lineæ verticalis inductio. 73.1.1
 Linea verticalis quæ sit. 91.1.54
 Lineæ duæ rectæ parallelæ sunt in eodẽ plano. 442.2.45
 Liquiditas corruptibilitatem non arguit 753.1.1
 Liquidum cælum. Vide Cælum.
 Lōgomōtanus pro cælo liquido. 764.1.1
 Lorinus pro cælo liquido. 755.2.30.
 pro cælo corruptibili. ibid.
 Locus macularum. p. 335.2.5. & 443. 1.42
 Locum Solis in Zodiaco dare. 148. col. 3.38
 Longitudo macularum quo ordinariẽ vergat. 176.2.20
 Lucretius pro cælo liquido. 755.2.30
 Lucinus ibidem.
 Luculæ quid. 346. 1.35
 Luculæ in Sole semper esse videtur. 344. 2.35
 Lunæ excentricus maculas non caussat. 408.1.10
 Lunę epicyclus maculas non caussat. 408.1.18
 Lunæ duo orbes augem excentrici deferentes maculas non caussant. 408. 1.25
 Lunæ orbis deferens caput Draconis maculas non caussat. ibid. col. 2.5
 ex Lunæ Solem eclipsantis circa margines trepidatione cælum liquidum defenditur. 740.2.15
 Luna aspera est. 739.1.15
 e Lunæ asperitate cæli liquiditas ostenditur. ibid.
 Luna circa suum centrum fertur. 739 1.12
 Luna atmospheram circum habet. 740 2.20
 Luna ignea & aquea est. 634. 1.1
 Luna circa terram planetæ circa Solem feruntur. 600.1.25
De Luce.
 Lux nunquam confusa apparet. p. 100. 2.36
 Lucis propagatio est rectilinea. p. 120. 1.27
 Lux minor maiori addita splendorem augeat. ibid. vers. 32
 Lux luci addita physice non miscetur. ibid. vers. 35
 Lux in aëre nostro vicino caussa est cur.

II.

stellæ in meridie non videantur. 417 2.41
 Lucida non lucidorum species suffocant. 655.2.15
 Lux facularum solarium superat lucem diurnam. 418.1.17
 Lux facularum maior est reliqua Solis luce. 418.1.25
 Lux facularum intensior est lumine auræ cælestis. 418.1.30
 Lux facularum maior est planetarum. ibid. vers. 40
 de Luce primo die creata. 614.1.1
 de Luce in abstracto seu sine vilo subiecto. 614.1.20
 an Lux nulli inherens sit visibilis. 614. 1.20
 an Lux Solis eiusdem cum alia quavis speciei sit. 614.2.35
 Lux Solis eiusdem cum alijs speciei est. 615. 1.1
 Lucis color inter flauum & album consistit. ibid. vers. 30
 Lucis color intenditur. ibid. vers. 31
 Lux in subiecto diaphano colorem non mutat. ibid. vers. 40
 Lux in corpore simplici adia phano mutat colorem. ibid. 54
 Lux in omni diaphano non mutat colorem. 615.2.15
 Lux in raro non plus aut minus lucet quam in denso. ibid. vers. 46
 an Lux contracta intendatur. 616.1.10
 Lux primo creata quæ fuerit. 638. 1.1.
 Lyncei pro cælo liquido. 733.1.35
 Lyranus pro cæli natura ignea. p. 632. 1.15

M

S. **M** Acarius pro cælo corruptibili. 679.1.50
M Machina optica eiusque aptatio. 104.1.1
 Machinæ partes. 103.2.30
 Machina Heliotropici. 349
De Maculis Solaribus.
 Maculæ aliæ alijs citius deficiunt. pag. 533.1.12
 Maculæ alterantur physice. 505.1.15. & 503.2.20
 Macula æqualis Europæ. 589.2.15
 Macula Africa tota maior. ibid. vers. 30
 Macula æqualis Asiæ. 590.1.1
 Macula æqualis terrestri superficie. pag. 590

I N D E X.

I.

pag. 765. colum. 2. vers. 25
Iouem Astronomi atmosfera circum-
dant. 740. 1. 5
s. Isidorus pro cælo igneo. 628. 2. 10. &
634. 1. 10
pro cælo liquido. 720. 2. 1
s. Irenæus pro cælo corruptibili. p. 669.
1. 10
Iunij imago Solis prima ad 18. diem. 215
Secunda ab 8. ad 24. diem. 231
Tertia à 19. die. 233
Quarta à 27. die. 235
Tabula Tertia. p. 229
Iunij macul. an. 1626. p. 315. & 321
Iunij macul. an. 1627. p. 341
Prima Iulij ad 2. diem. ann. 1625. p.
233
Secunda ad 12. p. 235
Tertia à die 3. ad 6. 237
Quarta à 5. ad 12. p. 239
Quinta à 3. ad 12. diem. p. 241
Sexta à 3. ad 15. diem. 243
Septima Iulij à 12. ad 24. diem. 245
Octaua Iulij, à 25. die. p. 247
Iulij imag. an. 1626. p. 325
Iunilius pro aquis supracælestibus. 712.
1. 45
pro cælo liquido. 712. 1. 45
s. Iustinus martyr pro aquis supra cælos
642. 2. 20. & 645. 1. 15
pro cælo corruptibili. 675. 2. 40
pro cæli natura ignea. 627. 2. 10. &
642. 2. 25
pro cælo liquido. 718. 1. 55
de numero cælorum, ibid.
Iuuenius pro cælo igneo. 633. 2. 20

K

K Eplerus pro cælo liquido. 741
2. 20. & 740. 1. 1
Mac. sub Sole vidit an. 1607
pagina 609. col. 1. vers. 1

L

L Actantius Firmianus pro cælo
igneo. 628. 2. 1
pro cælo liquido. 719. 2. 30
Laterales tabulæ quid sint. 216. 1. 50
Latinus Card. Ursinus pro cælo corru-
ptibili. 698. 1. 6
De Lentibus Opticis.
Lentium vsus. 74. 1. 50

II.

Lentium forma. 98. 1. 20
Lentium materia. 97. 1. 45
Lentium magnitudo. 98. 2. 10
Lentium globositas. 99. 1. 13
Lentium politio. 99. 2. 5
Lentium collocatio & ad eā necessaria.
103. 1. 35
Lentium diuersæ coordinationes. 127.
col. 3. 50
Lentes discernendi modus. 99. 2. 50
Lentes quando politæ sint. 102. 2. 16
Lens caua quomodo probanda. p. 103.
1. 15
Lentium experientiæ practicæ. p. 128.
1. 20
in Lentibus naturæ & artis mirabilis
conspiratio. 106. 1. 25
Lentium cum oculo humano collatio.
106. 2. 8
Lentes minorum sphaerarum acutiores
sunt. 99. 1. 32
de Lentibus conuexis duabus regulæ
practicæ. 115. 1. 36
Lens conuexa species confusas in char-
tam ordinate pingit, ordinatas con-
fuse. 121. 1. 1
Lens conuexa cum oculo comparatur.
121. 2. 15
Lentis vnus conuexæ vsus. pag. 137.
col. 3. 40
Lentium trium conuexarum vsus nouus.
131. col. 3. 50
de Lente caua. 124
Lens caua & eius effectus. 122. 1. 10
Lens caua species dissipat. 124. 2. 15
Lens caua post conuexam confundit. p.
125. 1. 35
Lens caua quo magis ad conuexam ac-
cedit hoc imaginem maiorem facit,
sed minus puram 126. col. 4. 35
Lens caua respiciat chartam conuexa
obiectum. 133. 3. 19
Lentis minima detectione Sol nouus lu-
stratur. 132. 1. 41
Lentium refraction. Vide refraction.
Leo Castrus pro cælo corruptibili. 69
2. 40
Liber primus. p. 1
Liber secundus. 67
Liber tertius. 149
Liber quartus. 403
Libri quarti secunda pars. 553
Libri apographi quid auctoritatis ha-
beant. 681. 2. 6
Libri-

IXND EXI

I.

Libripendens. 1.2.30
 Lineæ verticalis inductio. 73.1.1
 Linea verticalis quæ sit. 91.1.54
 Lineæ duæ rectæ parallelæ sunt in eodẽ plano. 442.2.45
 Liquiditas corruptibilitatem non arguit. 753.1.1
 Liquidum cælum. Vide Cælum.
 Lōgomōtanus pro cælo liquido. 764.1.1
 Lorinus pro cælo liquido. 755.2.30.
 pro cælo corruptibili. ibid.
 Locus macularum. p. 335.2.5. & 443.1.42
 Locum Solis in Zodiaco dare. 148. col. 3.38
 Longitudo macularum quo ordinariẽ vergat. 176.2.20
 Lucretius pro cælo liquido. 755.2.30
 Lucinus ibidem.
 Luculæ quid. 346. 1.35
 Luculæ in Sōle semper esse videtur. 344. 2.35
 Lunæ excentricus maculas non caussat. 408.1.10
 Lunę epicyclus maculas non caussat. 408.1.18
 Lunæ duo orbes augem excentrici deferentes maculas non caussant. 408.1.25
 Lunæ orbis deferens caput Draconis maculas non caussat. ibid. col. 2.5
 ex Lunæ Solem eclipsantis circa margines trepidatione cælum liquidum defenditur. 740.2.15
 Luna aspera est. 739.1.15
 e Lunæ asperitate cæli liquiditas ostenditur. ibid.
 Luna circa suum centrum fertur. 739.1.12
 Luna atmosperam circum habet. 740.2.20
 Luna ignea & aquea est. 634.1.1
 Luna circa terram planetæ circa Solem feruntur. 600.1.25
De Luce.
 Lux nunquam confusa apparet. p. 100.2.36
 Lucis propagatio est rectilinea. p. 120.1.27
 Lux minor maiori addita splendorem auget. ibid. vers. 32
 Lux luci addita physice non miscetur. ibid. vers. 35
 Lux in aëre nostro vicino caussa est cur.

II.

stellæ in meridie non videantur. 417.2.41
 Lucida non lucidorum species suffocāt. 655.2.15
 Lux facularum solarium superat lucem diurnam. 418.1.17
 Lux facularum maior est reliqua Solis luce. 418.1.25
 Lux facularum intensior est lumine auræ cælestis. 418.1.30
 Lux facularum maior est planetarum. ibid. vers. 40
 de Luce primo die creata. 614.1.1
 de Luce in abstracto seu sine vilo subiecto. 614.1.20
 an Lux nulli inherens sit visibilis. 614.1.20
 an Lux Solis eiusdem cum alia quavis speciei sit. 614.2.35
 Lux Solis eiusdem cum alijs speciei est. 615.1.1
 Lucis color inter flauum & album consistit. ibid. vers. 30
 Lucis color intenditur. ibid. vers. 31
 Lux in subiecto diaphano colorem non mutat. ibid. vers. 40
 Lux in corpore simplici adiaaphano mutat colorem. ibid. 54
 Lux in omni diaphano non mutat colorem. 615.2.15
 Lux in raro non plus aut minus lucet quam in denso. ibid. vers. 46
 an Lux contracta intendatur. 616.1.10
 Lux primo creata quæ fuerit. 638.1.1.
 Lyncei pro cælo liquido. 733.1.35
 Lyranus pro cæli natura ignea. p. 632.1.15

M

M Acarius pro cælo corruptibili. 679.1.50
 Machina optica eiusque aptatio. 104.1.1
 Machinæ partes. 103.2.30
 Machina Heliotropici. 349
De Maculis Solaribus.
 Maculæ aliæ alijs citius deficiunt. pag. 533.1.12
 Maculæ alterantur physice. 505.1.15. & 503.2.20
 Macula æqualis Europæ. 589.2.15
 Macula Africa tota maior. ibid. vers. 30
 Macula æqualis Asiæ. 590.1.1
 Macula æqualis terrestri superfici. pag. 590

INDEX

I.

590. columna 2. versiculo 25
 Macularum multæ terræ æquales sunt.
 603. 2.50
 Maculæ Austrinæ quinque, Boreæ vi-
 ginti. 221. 2.37
 Macula austrina fit borealis. 274. 1.1
 Macula ex austrina borealis inde rursus
 austrina. 182. 1. 10. & 308. 1.4. &
 310. 2.15
 Maculæ australes citius mouentur quā
 Septentrionales. 260. 2.25
 Maculæ biduo latent. 264. 2.36
 Maculæ quæ in parte borea, arcus adie-
 clipticam concauos faciunt, quæ in
 australi sunt conuexos. 290. 1.8
 Maculæ in æquilibrio verno. 304. 2.5
 Maculæ æquabilis raritatis. 264. 2.28
 Macularū claritas. Vide Macularū lux.
 Maculæ augescunt. Vide Maculæ cre-
 scunt.
 Macula circa omnem dimensionem au-
 cta. 298. 1.20
 Maculæ in classes distinctæ, aliæ simpli-
 ces, aliæ mixtæ sunt. 587. 1.10
 Maculæ simplices. 587. 1.11
 Maculæ mixtæ. 587. 1.17
 Maculæ circulariter rotundæ. 166. 1.24
 & 310. 2.5
 Maculæ triangulares. 314. 1.10. & 316.
 2.35
 Maculæ quomodo in charta colorandæ
 139. col. 4.53
 de Macularum colore. 503. 1.25
 Maculæ coloratæ. 192. 2. 17. & 219. 1.
 35. & 248. 1.40. & 509. 2.35
 Macularum crassiorum color subalbus,
 subuiridis, cæruleus, flauus, & furvus.
 160. 2.42. & 509. 2.40
 Maculæ densiores ordinariè coloratæ.
 219. 1.40
 Maculæ versus centrum plerumque cæ-
 ruleæ sunt ex alia parte furuescunt.
 160. 2.48. & 166. 1.46
 Maculæ continuæ separantur. 234. 1.26
 & ver. 41. & 284. 1.15. & 262. 1.30.
 & 264. 1.5. & 272. 2.36. & 278. 2.13
 Maculæ crescunt. 230. 2.25. & 232. 2.
 35. & 264. 2.8. & 266. 2.15. & v. 24.
 & v. 35. & p. 270. 1.15
 Maculæ decrescunt. 272. 2.4. & 276. 2.
 vers. 42
 Maculæ aliæ crescunt, aliæ deficiunt in
 eodem Solis loco. 490. 2.5
 Maculæ crescunt & deficiunt per to-

II.

tam Solis regiam. 490. 2.22
 Macula crescit & iterum decrescit. 274.
 1.23
 Maculæ crescunt versus omnem circū-
 ferentiam. 491. 1.48
 Non crescunt sola rarefactione. 492.
 1.25. & 503. 2.35
 Non crescunt sola superficialium ex-
 tensione. 492. 1.50
 Non crescunt sola alteratione. 492.
 2.10
 Non crescunt solo motu locali. 492.
 2.50
 Crescunt variè, duplo, triplo, quatu-
 plo, & aliquando decuplo. p. 491.
 1.25
 Crescunt optice. 481. 1.1
 Crescunt physice. p. 484. 2.8. & 490.
 1.10
 Augmentatio optica quomodo de-
 prehendatur. 481. 2.15
 Macularum decrementa fiunt ex omni
 circumferentia. 491. 2.6
 Maculæ crassities minor apparet quam
 sit. 512. 2.40
 Maculæ crassities minor est quam lon-
 gitude aut latitudo. 513. 1.20
 Maculæ centrum primo nascitur & vl-
 timo deficit. 530. 1.30
 de Maculis cuiusq. centri generatione.
 530. 2.25
 Maculæ à centro Solis non magis distāt,
 quam faculæ in quas degenerant. p.
 526. 1.15
 Maculæ, & faculæ centra in eadem su-
 perficie sunt. 524. 1.55
 Maculæ non gyrauntur circa sua centra.
 604. 1.10
 Maculas in cælo incorruptibili ponendi
 duo modi. 744. 1.35
 Macularum cursus dierum minimum
 decem. 218. 1.1
 Macularum cursus dierum. 12. 13. 14.
 & 15. sunt. 412. 1.32
 Macularum cursus. Vide Cursus.
 Macularum cursus inter dies 26. & 27.
 versatur. 549. 2.45
 Macularum descriptio. 495. 1.20
 Maculæ diuiduntur in classes. 495. 2.20
 Maculæ dilatantur. 234. 1.25. Vide Ma-
 culæ crescunt.
 Maculæ dierum. Vide Dierum.
 Maculæ disiunctæ nucleis, corporibus
 coniunctæ sunt. 298. 2.38
 Maculæ

I N D E X.

I.

Maculæ separatæ iterum coniunguntur. 270. 1. 28. & 234. 2. 35.
 Maculæ plures in vnam coeunt. 192. 1. 44. & 230. 1. 30. & c. 2. 1. & 234. 2. 1. & 232. 2. 10. & 298. 1. 45. 491 2. 20.
 Maculæ sub exitum coeunt ideoque nigriores fiunt. 288. 2. 19.
 Maculæ, faculæ, & vmbrae in summa ab Ecliptica declinatione australi, & boreali. 276. 1. 10.
 Maculæ, & faculæ sunt Phœnomeni essentialia. 40. 2. 1.
 Maculæ à faculis. 232. 2. 32. & 234. 2. 5. & 244. 1. 45. & 231. 1. 5.
 Macula è facula nata in faculam redit. 214. 2. 7.
 Maculæ in faculas abierunt. 208. 2. 33 & 220. 2. 43. & 230. 1. 20. & 232. 1. 50. & c. 2. 50. & 246. 1. 30. & 256. 2. 31. & 264. 2. 40. & 274. 2. 10. & 294. 2. 1. & 298. 1. 23. & 292. 1. 17.
 Maculæ in faculas & vmbra. 184. 2. 5. & 232. 2. 55. & 248. 2. 15. & 268. 2. 21. & 270. 2. 2. & 276. 2. 21. & 298. 1. 48. & 300. 2. 27. & 302. 1. 35. & 310. 1. 13. & 304. 1. 20.
 Maculæ in vmbra. 232. 2. 11. & 233 2. 8. & 272. 2. 21. & pag. 276. col. 2. 30.
 Macula in Maculas tum faculas tum iterum in maculas & tandem secundo in faculas è quibus in nihil abiit. 292. 1. 25.
 Maculæ cum faculis exorta. 208. 2. 35 & 294. 1. 16.
 Maculæ cum faculis. 221. 2. 1.
 Maculæ plenæ faculis. 192. 2. 15.
 Maculæ faculas pone trahunt. 274. 1. 15.
 Maculæ & faculæ in medio Sole deficiunt. 234. 1. 6.
 Macula cum faculis & vmbra in medio Sole interit. 264. 1. 1.
 Macula intra faculas exorta. 234. 1. 1. & 272. 2. 35.
 Macula inter faculas & vmbra. 260. 1. 1.
 Maculæ quattuor intra luculentas faculas, 276. 1. 44.
 Maculæ in faculis horizontem exeunt. 274. 2. 31.
 Maculæ cum faculis & vmbra egressæ.

II.

288. 2. 10. & v. 16. & 294. 1. 24.
 Maculæ, faculæ, & vmbra simul mouentur. 246. 1. 1.
 Maculæ & faculæ vicissim sibi succedunt. 230. 2. 15.
 Maculæ triginta sine faculis. 208. 1. 35.
 Macularum figura. 510. 1. 10.
 Figuræ mutatio. 510. 1. 45.
 Macula fili instar. 256. 2. 38.
 Macula liniolæ instar 220. 1. 47.
 Macula puncti instar nigerrima. 298. 2. 42.
 Macula fissuram facit luce valde splendidam. 272. 2. 1.
 Macularum gracilitas vnde oriatur. 510. 2. 1.
 gracilescunt omnes in occidente. 448. 2. 25.
 gracilescentes nebulis inuoluuntur. 485. 15.
 nulla gracilescit in medio Sole. 485. 1. 40.
 Macularum genera varia. 219. 1. 55. & 230. 2. 40.
 Macularum quot genera & qualia sint? 156. 2. 20.
 Maculæ tot gradus in suo parallelo motu diurno conficiunt quot reuolutiones sunt in anno, quot dies absumit periodus media, quot in circulo polus mobilis vteruis. 550. 1. 25.
 Maculæ ad horizontem solis lento gressu feruntur. 240. 2. 42.
 Macula per duas horas in horizonte hæret. 182. 2. 7.
 Macula in horizonte quinque horis hæret. 192. 2. 25.
 Macularum ad horizontem inclinatio admiranda. 288. 1. 15.
 Maculæ in horizonte versantis maior ab Ecliptica in horas digressio. 308. 1. 35.
 Maculæ in horizonte auctæ. 274. 2. 34.
 Macularum multarum initia tenuia & vmbrosa sunt. 536. 1. 5.
 Macularum initia alia alijs maiora sunt. 490. 1. 45.
 Macularum itinera eodem die æqualia apparent. 421. 2. 25.
 Maculæ Iunij. Vide Iunij.
 Maculæ Iulij. Vide Iulij.
 Maculæ liniolæ instar. 220. 1. 47.
 Macularum longitudo quo ordinariè vergat. 176. 2. 20.

Ma:

I N D E X.

I.

Macule Maij. Vide Maij.
 Maculæ Marrij. Vide Martij.
 Maculæ non Mercurius fuit quam Ke-
 plerus 1607. vidit. 609. 1. 1
 Maculæ maculas præuertunt. 264. 2. 21.
 Vide cursus inæquales.
 Macularum particularium magnitudo
 mensuratur. 588. 1. 1
 Maculæ maiores diutius durant. p. 216
 1. 25
 pro mensurandis maculis regulæ gene-
 rales. 587. 2. 1
 Macularum motus regularis est. p. 478.
 1. 20
 Macularum motus. Vide Cursus. Vide
 motus.
 Macularum maxima mutatio. 221. 2. 16
 & 266. 1. 10. & 268. 1. 15. 278. 1. 25.
 284. 1. 1. 298. 1. 1. & 300. 2. 1
 cur Maculæ & nuclei in formam nube-
 cularum intumescant ad marginem
 circuli. 508. 1. 25
 Maculæ motus alius alio celerior est.
 559. 1. 35
 Maculæ maiores sunt quam apparent.
 513. 1. 8
 Macul. motus systema. pag. 560. col.
 1. 1
 Maculas nasci & corrumpi confirma-
 tur ex modo incipiendi, & desinendi.
 534. 2. 20
 Macule nebulis inuolutæ. 221. 1. 20. &
 vers. 37. 282. 2. 7. 276. 2. 22
 Maculæ in nebulas & fumum degene-
 rant, tandemq. in faculas accendun-
 tur. 246. 1. 34
 Maculæ nimbo fulgido circumdata. p.
 276. 2. 23
 Maculæ è nubecula. pag. 220. colum.
 2. 45
 Macula per nubes visa. p. 280. 2. 36. &
 pag 282. 1. 8. & vers. 15. & columna
 2. 20
 de Macularum nucleis. Vide Nuclei.
 Macula vna geminum nucleum habet.
 274. 1. 7. & 278. 2. 20
 Maculæ à nucleo figuram accipiunt. p.
 296. 2. 1. & p. 306. 2. 17. & pag. 312.
 2. 21
 in Maculis nigriora nuclei sunt. pag. 157
 1. 16
 Maculæ sunt mediocriter nigra. ibid.
 vers. 18
 Macul. nigredo vnde oriatur. 504. 1. 25

II.

Maculæ nigrescunt verè & physicè. 504
 2. 25
 Macularum ortus, & occasus physicus
 quis. 155. 1. 20
 Macularum ortus & interitus physicus.
 pag. 190. 1. 26. p. 314. 1. 10. 230. 2. 6.
 Vide Maculæ in medio Sole natæ.
 Macularum ortus à minimis. pag. 229.
 1. 10
 Maculæ simul ortæ non simul pereunt.
 246. 2. 30
 Macularum ortus & occasus vbi fiat. p.
 154. 2. 54
 Maculæ in ortu & occasu graciles. 206.
 1. 1
 Maculæ in ortu & occasu visæ in medio
 non comparent. p. 184. 2. 1. & 272. 1
 15. & 264. 2. 36
 Macula in exitu maior quam ingressu.
 274. 1. 13. & col. 2. 34
 Maculæ ad interitum tendentes in vm-
 bras abeunt. 302. 2. 40
 Maculæ in ortu vicinæ, postea interual-
 la amplificant. 182. 1. 30. & 235. 1. 1
 266. 2. 6. & 294. 2. 17. & 304. 1. 23.
 Vide cursus non paralleli.
 Maculæ in exitu viciniores quam in-
 ingressu. pag. 176. 2. 9. & 312. 1. 17
 Macularum obscuritas an sit mera vm-
 bra. 499. 1. 45
 Obscuritas an fiat ex obiectu corpo-
 ris opaci. 500. 2. 20
 Obscuritas an sit mere apparens dia-
 phani opacitas. col. 1. 1
 Obscuritas est physica & realis. 502.
 1. 1
 Obscuritas est verus color. pag. 502.
 2. 20
 Obscuritas est opaci physica quali-
 tas. 501. 2. 45
 Macula eadem nunc obscurior, nunc il-
 lustrior sæpe apparet. 495. 1. 25
 Maculas obseruandi praxis. Vide obser-
 uandi, aut modus obseruandi.
 Maculæ vnus obseruationes plures, in
 vnum circulum redigendi praxis.
 149. col. 41. 1
 Maculæ quando securus obseruentur.
 149. 1. 10. & col. 2. 50
 Maculæ per nudum foramen obseruatæ
 non fiunt præcipites in oriente &
 occasu. 450. 2. 30
 Maculæ per totum orbem absq. diuer-
 sitate visæ sunt. 405. 2. 40
 Maculæ

I N D E X.

I.

Maculæ in ortu & occasu sibi viciniore
quam in medio cursu . pag. 184. col.
2.30
Maculæ in medio sibi viciniore, quam
in ortu & occasu . pag. 260. colum.
2.vers.7
Maculæ in occasu vt nebulæ extenuan-
tur . 308.1.50
Maculæ cito natæ, cito pereunt . p.294.
2.5
Maculæ versus occasum genitæ. 235.1.
1.& 274.2.31. Vide Macularum or-
tus & occasus physicus.
Maculæ parallelæ.284.2.10. Vide cur-
sus paralleli.
Macula in eodem parallelo difformiter
mouentur.188.2.26.& 235.1.3.Vi-
de Cursus inæquales.
Maculæ in parallelo minori latæ diu-
tius hærent , quam quæ in maiori
feruntur. pagina 330.colum. 1. ver-
sic.6
Maculæ omni parallaxi carent. p.180.2.
40.& pag.198.1.42.& pag.200.col.
2.1.
Maculæ per partium aggestionem
nigrigores fiunt.pagina 531.colum.
1.10
Maculæ non perennant. 280.2.1. Vide
infra Maculæ non redeunt.
Maculæ præcedentibus annis non visæ .
280.1.37
Maculæ non præcitari, stare aut regredi
visæ sunt.420.2.19
Macula puncti instar quatuor milliaria
Germanica exæquat . pag. 588. col.
2.30
Macula puncti instar nigerrima . p.298.
2.41
Maculæ primariæ ad partes Solis pola-
res nullæ sunt.528.1.12
Maculæ quare punctim sint signatæ . p.
160.2.30
Macularum progressum, stationem &
regressum ostendere . pag. 149. col.
8.5
Maculæ non redeunt, cursus Macularū
redit . p.156.2.15.& pag.160.1.30.
& 280.2.1
Maculæ aliquæ redeunt . pag. 546. col.
1.10
Macula redux.206.2.20.210.2.5.214.
2.20.216.1.1.241.1.5.242.1.5.248
2.25.302.2.28.318.2.25.546.2.35.

II.

547.1.10. 548.1.1
Maculæ reduces esse probantur à loco
548.2.25
A qualitate.549.1.10
A tempore . ibid.vers.20
Macularum regularitatis signa manife-
sta.479.1.30
Maculæ nigrescunt dum augentur,albe-
scunt, dum deficiunt . pag. 533. col.
1.25
Maculæ nullæ quibusdam Decembris
diebus in Sole apparent.163.2.20.&
164.1.10
Maculæ secundariæ in singulas fere ho-
ras mutantur. 530.1.25
Maculæ in Sole duæ tantum. 166.1.10.
234.2.3
Maculæ in Sole viginti duæ . pag. 272.
1.34
Maculæ in Sole triginta sine faculis . p.
208.1.35
Maculæ in Sole quinquaginta . pag.192.
1.20
Maculæ parvæ innumerabiles. pag. 230.
1.28
Maculæ Solis fulgori immerse.166.1.10
314.1.15
Maculæ in medio Sole mutatæ.294.Vi-
de Macularum maxima mutatio .
Maculæ in medio Sole prognatæ.184.2
16.186.1.26.& col.2.4.208.2.33.&
228.2.43.232.1.45.col.2.47.234.
2.42.268.2.5.270.2.5.272.2.13.&
744.1.30
Maculæ in medio Sole disparent.232.1
18.& col.2.3.264.2.4
Maculæ in medio Sole enatæ & corru-
ptæ.262.1.5.264.2.34.277.2.3.280
1.35
Maculæ in superficie Solis sunt . 602.
2.42
Macula evanescit & redit.184.2.1.264
2.36. Vide Macula redux.
Maculæ intra Solem sunt . 455.1.45. &
col.2.14.& v.35.& p.456.1.15. &
25.col.2.30.457.1.26.col.2.1.&30
pag.458.2.15.pag.459.2.15.p.744.
1.1
Maculæ superficiei Solis insunt. 419.1.
10.447.1.20.457.1.19.484.1.37.
485.2.40
Maculæ cum Sole mouentur. 340.2.40
p.416.2.23.p.422.1.28.& colum.2
vers.46

Maculæ

I N D E X.

I.

Maculæ per excentricos circa Solem
non mouentur. 420. 1. 23. & 421. 1. 40. & col. 2. 10
Maculæ quotidie cum Sole oriuntur, &
occumbunt. 405. 1. 20
Maculæ in Sole sunt, si earum motus
regularis est. pag. 479. 2. 42. & p. 480
1. 32
Maculæ in Sole non sunt si motus earum
irregularis est. 480. 1. 41
Maculæ inæqualiter à centro Solis di-
stant. 485. 2. 30
Maculæ plus temporis decurrunt in pla-
ga poli patentis, quam semicirculus
exigat. 476. 2. 30
Macularum soliditas non est fouea aut
hiatus. 510. 2. 12
Soliditas non est labes in superficie
Solis. ibid. vers. 35
Soliditas est corpus solidum, opacum,
obscurum aliqua parte extra Solem.
ibid. vers. 50
Maculæ in sphaeris ferri non possunt. p.
494. Vide Epicycli, Excentrici.
Maculas in Sole esse demonstratur pri-
mo ex nulla parallaxi. 537. 1. 25
Secundo ex lentium inæquali refra-
ctione. 541. 1. 30
Tertio, per faculas. 542. 1. 1
Quarto, per gracilitatem in horizon-
te. ibid. vers. 40
Quinto, per motum diurnum. ibid.
col. 2. 25
Sexto, ex cursu rectilineo. pag. 542.
2. 50
Septimo, ex motu curuilineo quasi
elliptico. 543. 1. 40
Octauo, ex curuilineis arcuum pro-
prietatibus. 543. 2. 30
Nono, ex interuallis cursuum diur-
nis. 544. 1. 1
Decimo, ex circello polari. ibid. vers.
30
Vndecimo, ex reditu quarundam
mac. 544. 2. 45
Duodecimo, è secundarijs Phæno-
meni phasibus. 550. 2. 1
Macula in Sole visa est an. 807. 6. Kal.
Martij. pag. 608. 2. 45
Maculas è Sole non emergi & immergi
argumentis probatur. 745. 1. 20
Macularum semicirculus dierum sex, &
horarum sex. 288. 2. 11.
Macularum idem est omnium subiectum.

II.

pagina 423. columna 1. vers. 40
Macularum superficies alia in ortu, alia
in occasu videtur. 490. 1. 1
Macula nulla stare visa est. pag. 420.
2. 1
Maculæ stellæ non sunt. pag. 420. col.
1. 35
Maculæ superficies ad nos cōuersa gib-
bosa est. 513. 2. 10
Maculæ ubi sint. 335. 2. 5
Maculæ trinam corporum dimensio-
nem habent. 511. 1. 1
Maculæ ex vmbris. pag. 234. 2. 45. & p.
266. 2. 12
Maculæ cum plurimis vmbris & faculis
284. 2. 24
Macula in vmbrâ gracilescit. pag. 316.
1. 49
Maculæ intra vmbras & faculas. pag.
260. 1. 1
Macul. Zona. 568. 1. 25
Macul. Zonæ quinque. pag. 568. col.
2. 21
Magister historiæ scholasticæ pro aquis
supra caelos. 714. 1. 20
pro caelo liquido. ibid.
pro caelo igneo. 631. 2. 33
Magister sententiarum pro aquis supra
caelos. 713. 1. 1
pro caelo liquido. ibid.
pro caelo igneo. p. 631. 2. 20. & 634
1. 15
Maij maculæ. Imago prima an. 1625.
à die 2. ad 14. pag. 209
Secunda ab 11. ad 23. diem. 211
Tertia à 19. ad 31. diem. 213
Quarta à 31. die. 215
Maij Tabellæ. 217
Tabula secunda. 229
Maij maculæ an. 1626. p. 315
Maij maculæ an. 1627. p. 341
Mayro pro caelo liquido. pag. 726. col.
1. 10
P. Malaperfij obseruationes macularum
solarium. 180. 1. 1. Vide Duacænas
obseruationes.
M. Manilius pro caelo liquido. pag. 760.
1. 10
Marcus VVelferus primus Tabulam A-
pellæam in vulgus dedit. 7. 1. 1
Mare in fine mundi abolendum est. p.
665. 1. 36
C. Marius Victor pro caelo igneo. p. 643
2. 40

Mars

I N D E X.

I.

Mars in cælo Solis est. pag. 741. 2.
40. & 2. 30.
Auctores qui Martem in cælo Solis
ponunt, ibid.
ex Martis motu cælum liquidum pro-
batur. 741. 1. 45.
Martij Maculæ imago prima an. 1625.
ad nonam diem. pag. 187
Secunda à die 4. ad 21. p. 189
Tertia à 20. die 191
Quarta à 24. die. p. 195
Quinta à 26. die. p. 197
Martij Tabellæ plures. p. 199
Tabula prima p. 229
Martij maculæ an. 1626. imago prima
ad 15. diem. 303.
Secunda à 10. ad 22. p. 307
Martij Maculæ ann. 1627. pag. 333.
& 337
Martianus Capella pro cælo liquido. p.
761. 1. 20
Martinus del Rio pro aquis supra cælos
645. 1. 1
pro cælo igneo 637. 2. 40
Martinus Becanus pro aquis supra cæ-
los 644. 2. 45
& pro cælo corruptibili. 695.
1. 35
Materia prima incorruptibilis est. 666.
2. 50
Mathematici qui cælum liquidum de-
fendunt. 755.
Maximilianus Archidux Austriæ. 110. 2.
20. 130. 2. 35.
s. Maximus pro cælo igneo. 636. 2. 30.
638. 1. 45.
Mendoza pro aquis supra cælos. 646.
2. 45.
Pro cælo liquido. 742. 1. 1.
De numero cælorum, ibid.
Mercurius circa Solem voluitur. 412. 2.
17. 758. 1. 40
Mercurij maxima & minima à Terris
distantia. 413. 1. 1
Meridiani temporis in obseruando in-
commoda. 79. 1. 15
Meridies ad obseruandum incommo-
dus. 79. 2. 30
s. Methodius pro cælo corruptibili. 670
2. 25
Metrodorus pro cælo liquido. pag. 755
2. 30
Michaël Petrus pro cælo corruptibili.
691. 1. 13
Michaël Scotus pro cælo liquido. 763.

II.

1. 40
Michaël Mæstlinus pro cælo liquido. p.
764. 1. 1
Miopes quomodo ab arte adiuuentur.
112. 2. 8.
Miopes cur minore Tubi diductione
vtantur quam presbytæ. 128. 1. 50.
Microscopium. 130. 1. 33.
Modus videndi phænomenon. 10. 1. 16.
& col. 2. 35. & p. 11. 1. 42. & col.
2. 20.
Modum videndi Phænomenon Apelles
primus docuit. 10. 1. 12.
Modus immittendi Solem per nudum
foramen cum suis commodis, & in-
commodis. 72. 2. 10.
Modus dirigendi Telioscopium in So-
lem. 81. 2. 43.
Modus maculas punctatim signandi.
95. 2. 20.
Modus mac. principia tenuissima agno-
scendi. 536. 1. 5.
Modus obseruandi Apellis optimus.
220. 1. 50.
Modus assignandi locum macularum,
in Sole. 443. 1. 42.
Molina pro aquis supra cælos. 646. 1. 1.
pro cælo corrupt. 688. 1. 3.
Motus Solis triplex. 780. 1. 20.
Motus quotidiani Solis. pag. 80. 1.
45.
Motus macul. circa centrum Solis. 81.
2. 15.
Motus circa centrum Solis causa. 82.
1. 6.
Motus mac. circa centrum Solis ex
proprio, & diurno compositi exem-
plum. 84. 1. 1.
Motus macularum proprius. 95. 1.
40.
Motus macularum proprius intra ho-
ram fit sensibilis. 95. 2. 1.
Motus mac. systema. 569.
Motus mac. compositus est ex annuo,
& menstruo. 603. 1. 1.
Motus mac. præcipitatio motui vnifor-
mi non obstat. 446. 1. 25.
Motus præcipitatio non probat ma-
culas Soli non inesse. 446. 2.
35.
Mundus cur corruptibilis creatus sit.
680. 2. 1.

M m m m

Nebulæ

I N D E X.

I.

N

Nebulæ in Sole . 218. 2. 30.
 Nebulæ circa mac. 276. 2. 22.
 Nebulæ circa maculas quid sint . 219.
 1. 45.
 Nebulæ macularum instar. 221. 2. 4.
 Necessitas scribendi . 6. 1. 5.
 Nicolaus Raymarus Vrsus pro coelo li-
 quido . 764. 1. 1.
 Nimbus fulgidus circa maculas . 276.
 2123.
 Nota generales in Solis imagines . 154.
 1. 1.
 Notæ particulares in imagines Solis an-
 norum . 1618. 1621. 1622. 1623
 1624. 1625. 1626. 1627. p. 163.
 Notæ in imaginem primam &c. Vide
 imago Solis prima.
 Nouembri & Decembri summa ab E-
 cliptica macularum declinatio hi-
 berna . 276. 1. 9.
 Nouembris imago Solis prima ad 14.
 diem. 273.
 Secunda à 6. ad 22. diem. 275.
 Tertia à 22. die. 277.
 Quarta à 25. die. 279.
 Nou. tabellæ . 281.
 Nouemb. mac. an. 1627. p. 341.
 de Nucleis, & eorum proprietatibus .
 505. 1. 20.
 Nuclei sunt densiora in maculis . 157.
 1. 17. & 506. 2. 30.
 Nuclei sunt intra maculas. 278. 1. 22.
 Nuclei nigerrimi . 248. 1. 1.
 Nuclei coalescunt . 231. 2. 3.
 Nucleus fili serici instar. 240. 2. 8.
 Nuclei vtrum circa suum centrum gy-
 rentur ? 507. 1. 20
 Nuclei circa exitum vt maculæ gracile-
 scunt . 290. 1. 38.
 Nuclei vt maculæ crescunt, & deficiunt.
 306. 1. 36.
 Nucleus in medio albescens. 214. 2. 4.
 & 219. 2. 15
 Nuclei multum mutati . 306. 1. 14.
 à Nucleis maculæ figuram accipiunt .
 296. 2. 1. & p. 306. 2. 17. & p. 312
 2. 21
 Nucleus nullus sine macula visus est .
 505. 1. 45
 Nuclei maculis immerfi sunt. 505. 1. 50
 Nuclei in nebulis. 282. 2. 37
 Nuclei sine nebulis. 219. 2. 15
 Nuclei in occasum proni, & magis nudi

II.

sunt . 210. 1. 42. & p. 260. 1. 25. &
 p. 316. 1. 25.
 cur Nuclei in formam nubecularum in-
 tumescant ad marginem circuli. 508
 1. 25.
 Nuclei in epicyclis non feruntur . 507.
 1. 50.
 Nuclei in superficie Solis sunt . 507.
 2. 48.
 cur Nuclei in margine Solis subalbe-
 scant. 507. 2. 40.
 Nucleorum color niger est. 506. 1. 45.
 Nucleorum nigredo verus color est .
 505. 2. 1. & 506. 1. 10.
 Nucleorum nigredo non superficialis
 tantum est. 506. 2. 1.
 Nucleorum obscuritas physica & realis
 est. 502. 1. 1.

O

Obiectum quando confusum appa-
 reat . 100. 1. 5.
 Obiectum cur confusum in oculo. 100.
 2. 30.
 Obiecti imago tota in toto & tota in
 qualibet parte est . 118. 1. 23.
 Obiecti imaginem augere . 135. 1. 5.
 minuire . 135. 1. 15.
 semper æqualem representare . 135.
 1. 25.
 Obiectum quando in charta erectum est
 oculus illud euersum videt. 128. col.
 3. 20. & 129. 1. 10.
 Obliquitas vide curuitas
 Obseruationum imagines . 165.
 Obseruationes Duacanæ vide Duace-
 næ obs.
 Obseruationes Ingolstadianæ, vide In-
 golstadi.
 Obseruationes Ianuarij, vide Ianuarij.
 Obseruationes illæ è tribus millibus
 collectæ sunt . 156. 1. 5.
 Obseruationes in toto orbe factæ sunt .
 155. 2. 35.
 Obseruatio quando securius fiat. 149. 1
 10. & c. 2. 50.
 Obseruationem cæcam illuminare. 139.
 col. 4. 15.
 Obseruatorius circulus quis dicatur ?
 154. 1. 55.
 Obseruandi modi varij . 151.
 Obseruandi maculas praxis. 138. c. 3. 20
 Obseruationum examen à loco tēpo-
 re, &c. 143. 1. 101

Obser-

I N D E X.

I.

Observationes. Vide Mac. obseru. & Modus Obseruat. Tempus.
 Occasio scribendi in Vrbe. 1.1.1
 Oculi cum Tubo comparatio. 112.1.25
 114.2.5
 Oculus cum Lente conuexa comparatur. 121.2.10
 Oculi cum Tubo inuerso collatio. 114.1.54
 Oculus videt distincte cum in humore crySTALLINO est confusio. pag. 125. col. 2.34
 Orbes Lunæ. Vide Luna.
 Orbes Planetarum ad phænomenon Solis inepti. 436.1.10
 Orbes Mercurij. Vide Mercurij.
 Oriens & Occidens in Sole quis sit. 154.2.10
 Origanus pro cælo liquido. 764.1.1
 Origenes pro cælo liquido. 726.1.25
 Ouidius pro cælo corruptib. 986.2.25

P

Paradoxa in hoc Sole. Primū. lux & tenebræ simul sunt. 591.1.26
 Paradoxum secundum, lux in tenebras, & tenebræ in lucem degenerant. 591.2.2
 Tertium. motus oppositi in eodem subiecto. 591.2.7
 Quartum. Augumentatio & diminutio incredibilis. ibid. vers. 10
 Quintum. rarefactio & condensatio maxima. 591.2.15
 Sextum. in constantia immutabilis. ibid. vers. 16
 Septimum. opacitas & perspicuitas. ibid. vers. 18
 Octauum. mutatio continua phænomeni, nulla tamē augmentatio aut consumptio sphaeræ solaris. ibi. 20
 Nonum. Sol idem semper alius. vers. 23.
 Decimum. Sol mensura temporis mensuratur. vers. 27
 Parallaxeos deprehendendi modi tres. 526.1.50
 ss. Patres qui aquas supra cælos esse volunt. 642
 Qui cælum corruptibile dixerunt. 658
 qui cælum igneum defendunt. 626
 qui cælum liquidum docent. 701

II.

Parallaxis à Maculis remouetur. 447.1.45. & 539.1.1
 Paralleli descriptio quomodo fiat. 476.1.40
 Eiusdem per verticem descriptio: 146.2.40
 quare Paralleli maximi declinatio, semper sequitur complementum altitudinis axeos. 566.1.40
 quare Paralleli maximi meridiana altitudo semper sequitur altitudinem poli mobilis in circello. 566.2.6
 s. Patherius Eccl. Ro. Notarius pro cælo corruptibili. 679.1.45
 s. Paulus pro cælo liquido. 717.1.10
 Perpendicularum quomodo inducendum 139.2.10
 Perpendicularum ad motum indagandū seruit. 159.1.34
 s. Petrus Apostolus pro cælo corruptibili adducitur. 982.2.10
 s. Philastrius Episcopus Brixien. pro cælo liquido. 719.1.25
 Philippus Solitarius pro cælo corruptibili. 682.2.8
 Philolaus pro cælo igneo. 640.2.35
 Philosophi recentiores qui cælum liquidum defendunt. 731
 Antiqui pro cælo liquido. 747
 Phænomen. solare sunt maculæ & faculæ. 52.1.50
 Phænomeni essentialia quæ sint. 51.2.50
 Phænomeni prima euulgatio. 7.1.5. & vers. 30
 Phænomenon Apelles primus detexit. 6.2.10. & 152.2.40
 Phænomen. in Tabula Apellis probatum est. 2.2.30
 Phænomenon hoc æternum est. 152.2.40. & 344.2.30
 Phænomeni varietas in motu annuo & mextruo consistit. 52.2.10
 Phænomeni atas. 592.1.1
 Phænomenon non fictum sed à parte rei esse demonstratur. 152.1.33
 Phænomenon prius in sensu esse debet quam ad placitum fingatur. 68.1.15
 Phænomenon cometas pro generare videtur. 612.2.30
 Phænomenon ex septem obseruandi modis stabilitur. 132. col. 3.15
 Phænomenon nullum vnquam stabilitum fuit tot rationibus. 467.1.10
 Phænomeni alterati fontes generales.

M m m m 2 pag.

I N D E X.

I.

pagina 1. colum. 1. 40
 Phænomeni Theoria. 554
 Phænomen. decem paradoxa. 591.1.25
 Phænomenon ipsius Solis superficies
 est. 603.2.1
 ex Phænomeno locorum distantiae in-
 quiruntur. 606.1.55
 ex Phænomeno veritates physiologicae.
 606.2.20
 ex hoc Phænomeno veritates physice.
 607.1.1
 ex Phænomeno multae historiae probabi-
 les fiunt. 608.2.40
 Phænom. hoc eclipsim generalem in-
 passione Domini causauit. 612.1.1
 Phænom. contra idololatrias est. 612.1.30
 Pineda pro caelo liquido. 771.2.30
 Plagae in Sole. 226.2.6
 Plagae unicolores in Sole quid & ubi
 sint. 346.2.1
 Plagae in Sole in dies alterantur. p. 514.
 2.10
 ex Planetarum motu libero caelorum
 substantia liquida probatur. 699.2.1
 ex Planetarum nouis phænomenis cae-
 lum liquidum probatur. 737.2.40. &
 738.739
 Planetæ ex igne sunt. 631.1.35
 Planetæ circa Solem feruntur. 600.1.25
 Plato doctrinam suam ex sacris litteris
 habuit. 675.2.25
 Plato pro caelo igneo. 640.2.35
 Plinius pro caelo igneo. 653.2.15
 pro caelo liquido. 749.2.30
 Plotinus pro caelo corruptib. 759.1.15
 Plutarchus pro caelo igneo. 653.2.15
 Polus Solis quis dicatur. 154.2.34
 Polorum solarium semper alius latet se-
 mestri, alius patens est qui ab occasu
 in ortum mouetur. 162.2.25
 Polus latens in Decembri egreditur, al-
 ter descendit. 163.1.25
 Polus horizonti insidet. 276.1.19
 Poli in Sole mobiles sunt. 434.2.41
 Præbytae cur longiore Tubi deductio-
 ne vrantur, quam Miopes. 128.2.15
 Problemata practica. 148.col.4.30
 Procopius pro aquis supra caelos. 642.1
 40. & col. 2.50. & 643.2.20. & 645.
 1.20.
 pro caelo liquido. 720.1.25. & 723.
 2.55.
 & pro caelo igneo. 628.1.37. 633.1.
 50. 642.1.40. & col. 2.50. 643.2.20

II.

Proclus pro caelo corruptibili. 692.2.50
 Progressio macularum ordinaria quæ
 dicatur. 149.col.16.5
 Progressionis variae acceptiones. 149.
 col.15.1
 Ptolomæus pro caelo liquido. 727.2.15
 & 756.1.25
 Ptolomeus ab iniuria vindicatur. p. 755.
 1.40
 Ptolomæus Quintam cæli essentiam nō
 agnouit. 758.1.25
 Puncta Disputatoris contra Apellem.
 3.1.51
 Punctum contactus ad diem datum e-
 xhibere. 149.col.27.10
 Punctum contactus meridiani. 149.col.
 7.6
 Punctum incidentiæ in superficie est.
 452.2.40

Q

Quinta cæli essentia impugnatur
 664.2.1
 Quinta cæli essentia à sancto
 Basilio refutatur. 709.1.1
 Quintam cæli essentiam Ptolomæus nō
 agnouit. 758.1.25
 Quinta cæli essentia male ex D. Diony-
 sio arguitur. 639.1.46

R

Rabanus pro caelo liquido. 725.
 2.20
 Rabbini pro caelo liquido. 772
 2.45
 Radius consistentiæ quis sit. 452.2.50
 Radius visorius in diaphana recte inci-
 dens, recte transit. 452.1.12
 Radij solares in directum progrediun-
 tur. 594.2.2
 Radium refraction. Vide Refractio.
 Radius triplex est directus, refractus, &
 reflexus. 594.2.15
 Raphaël Auerſa à Sanſeuerino pro caelo
 liquido. 743.2.20
 De maculis solaribus. ibid.
 Redemptus Baranzanus pro caelo liqui-
 do. 764.1.10
 Refractio radiorum fit à Lentibus. 451.
 1.20
 Refractione species augentur. pag. 453
 2.30

Refra-

XI N D E X.

I.

Refractionis fabrica experimentalis.
460.1.30.467.2.45
Refractionis aequalitatem inuenire.
465.1.10.483.1.39
Refractionis inaequalitatem ad aequalitatem reducere. 464.1.35
Refractione fit in lentium crassitie ad perpendicularares, 452.1.48
Refractione fit quod radius in aliud medium oblique incidat, pag. 452. col. 1.35
Refractione caussat quod Sol maior appareat, 453.2.50
Refractione ad tertiam partem maculas in margine auget, pagina 483. colum. 1.35
Refractione fit per lineam conuexam ad centrum, concauam versus marginem, 468.1.5
Refractionum inaequalitas experientia comprobatur, 468.1.30
Refractione eadem in eodem loco redit. 470.2.25
Refractione maior fit in circulo maiori. 469.1.1
Refractione in circulo fit inaequaliter quod Solis puncta inaequaliter distent, 454.1.25.462.1.25
Refractiones versus margines vehementer crescunt, 452.2.10.462.1.15. & 468.2.47
propter Refractionem interualla horizontalia medijs maiora sunt, pag. 454.2.50
Refractione maior fit per lentes minorum sphaerarum segmenta, pag. 453. col. 1.15
Refractione maior fit in hyeme, quam aestate, 469.1.20
in Retina fit visio, p. 128. 2.28. & 120.1.50
post Retinam non fit visio, eadem pagina.
Richardus Pampol. pro aquis sup. caelos 712.2.40
pro caelo liquido. ibid.
Richardus de sancto Victore pro aquis supra caelos, pagina 645. columna. 1.35
pro caelo liquido, pag. 722. colum. 1.54
Romae plures maculae visae sunt quam Ingolstadij, 208.1.15
Romanus macularum cursus Ingolsta-

II.

diano similis, 171, 177, 183, 185, 187, 191, 193, 249, 251
Romanus Duaceno similis. pagina 177
Romanus Ingolstadiano & Duaceno similis, 209.247
ROSA Vrsina & Tabula Apellis vna pictura est, 42.1.4
Rosa Vrsina ex toto Orbe collecta est, 155.2.30
Rothmannus pro caelo liquido, p. 741.2.20.764.1.1
Rupertus Abbas Tuitiensis pro aquis supra caelos, pagina 715. colum. 1. vers. 45
pro caelo igneo, pag. 635. colum. 1. vers. 20
pro caelo liquido, pag. 715. colum. 1.10
S
ex **S**acra scriptura celum liquidum probatur, 700.1.1
Sarsius pro caelo liquido, 741.2.20
Saturnus à Vitruuio frigidus putatur, quod aquis congelatis vicinus fit, 759.1.10
Seuerianus pro aquis supra caelos, 645.1.20
pro caelo liquido, pag. 723. colum. 2.38
Seneca pro caelo igneo. 653.2.15, & 748.1.20
pro caelo liquido, pag. 748. colum. 1.30
de Cometarum caussa. 748.1.20
Stellas terreno halitu ali ait. 749.1.15
Septembr. imag. Solis seu Meditullium à die 3. ad 16. an. 1625. p. 345
Septemb. imago Solis prima ad diem 16 pag. 253
Secunda à 13. ad 26. diem, p. 261
Tertia à 22. ad 6. Octob. 263
Quarta, à 28. ad 14. Oct. 265
Septemb. mac. an. 1626. 333
Sidera. Vide Stellæ.
Simon Marius. 741.1.15
Simon Stevinus pro caelo liquido, 763.2.5
Smogulecz Smogulecki de Mercurio, & Venere, 412.1.45
pro caelo liquido, pag. 741. colum. 2.20

I N D E X.

I.

Sol ellipticus mane & vesperi tubo arguitur. 131.3.25
 Sol Romæ altitudinis quatuor graduū sphaericus Ingolstadij sub eleuatione 30. graduum ellipsatus fuit. pag. 78. 2.5
 Sol excentricus esse deprehenditur. 130. 2.45
 Sol æstate minor hyeme maior allucet. 130.col.3.20
 Sol in nullis circulis, sed per spiras voluitur. 467.1.23
 Sol tres motus sunt. pag. 80. columna 1.43
 Solis duo motus vnum mixtum efficiūt 439.1.40
 Sol totus heterogeneus est. 72.1.1. & p: 344
 Sol in dies alius est. 72.1.5. & p. 512.1. 25.& 462.1.45
 Sol in medio sui clarior est. pag. 508. 2.20
 Sol qualis per helioscopium videatur. 71.1.50
 per nudum foramen immissus. p. 72. 2.10
 nullo quasi sensu perceptibilis est. p. 68.2.30
 quando ad obseruandum aptissimus fit. 79.2.33
 quando satis eleuatus fit ad obseruationes faciendas. 78.1.35. Vide obseruatio.
 nullam parallaxim ex phænomeno hoc patitur. 182. 2.45. & 225.2. 35.& 282.1.34
 Sol circa margines furuus est. pag. 623. 1.40
De Solis colore. 613. 1.30
 Solis colores qui sint. pag. 613. colum. 2.30
 Solis color talis est vt naturam igneam arguat. 616.1.50
 Solis color circumfusus æther accensus non est. 623.2.35
 Solis conus cur in medio clarior. pag. 618. 2.1
 Sol corruptibilis ex D. Thoma probatur 630.1.1
 Sol corruptibilis est. p. 651.1.45. & 662. 2.50. Vide cælum corruptib.
 Solis defectus maximus ann. 786. sub Constantino Imperatore. pag. 609. 1.45

II.

Solis defectus sub Cæsare Dictatore .p. 609.1.55
 Solis alius defectus sub Augusto. eadem pag.
 Solis integri anni defectus in Conuentu Vtricensis. ibid.
 Solis defectus tantus vt stellæ visæ fuerint. ann. 955. pagina 609. columna 2.30
 Solis defectus Christo Domino patiente à maculis causatus. pag. 610. col. 1.10
 Sol totus agit in terram, sed diuersimode. 595.1.30
 quod Sol diuersimode agat in Sole non est. pag. 596. colum. 1.10. & pag. 597. 1.1
 nec terra est. pag. 596. col. 1.50. 597. 2.30
 Sol agit per vim corpoream. pag. 594. 1.50
 Solis diuersa agendi ratio, vnde proueniat 595.2.20
 Sol in idem terræ hemisphaerium diuersimode agit. 595.1.30
 Solis in agendo diuersitatem atmosphaera causat. 598.2.20
 Solis actio in terras fit per speciem radiosam. 594.2.30
 Sol simul agit per radios directum, refractum, & reflexum. pag. 594. col. 2.42
 Sol gyratur circa suum centrum. p. 419. col. 1.20. & pag. 422. col. 1.25. & p. 603.1.48
 Solis radius reflexus debilissimus est. 595.1.5
 Solis hæc gyratio 27. diebus absoluitur. 601. 1.1
 Solis alia circa centrum gyratio annua. est. ibid. vers. 30
 Sol primarium Dei instrumentum est. 594.1.1
 Solem verum, realem, & materialem, ignem esse ss. Pat. dicunt. pag. 627. 1.5
 idem ex s. Ecclesiæ auctoritate, 626. 1.1
 idem ex s. Litteris, & Hebræis fontibus, 651.1.1
 pro Sole igneo auctores recentiores. p. 639.2.25
 pro Sole igneo philosophi. 653. 2.1.
 Vide cælum igneum.

contra

I N D E X.

I.

contra Solem igneum argumenta facta
soluuntur. 654. 1. 1
Solem naturæ igneæ ij etiam docent,
qui eum quarto die è nube factum,
dicunt, 629. 2. 15
Sol feruidus est. pagina 635. colum. 1.
vers. 30
Sol feruidus astra trahit. pag. 758. col.
2. 5
Sol formaliter calidus est. 632. 2. 1. &
641. 1. 20
Solem formaliter calidum asserit Aug.
629. 1. 1
Solem ex nube factum ait Bonauentura
630. 2. 33
Sol ex nube ignea factus est. pag. 631.
2. 15
Sol idem quod lux est. pag. 640. col.
1. 5
Sol idem est cum luce primo creata. p.
636. 1. 7. & col. 2. 43
Sol ex primi diei luce factus est. pag.
633. 1. 5
Solis lux eiusdem cum alijs speciei est.
615. 1. 1
Solis imago cur semper rotunda, 620
2. 25
Solis imago cur circa margines aspera.
620. 2. 36. & 576. 1. 40
Solis asperitas marginalis experientia
docetur. 622. 1. 20
cur Solis asperitas per maius foramen
non appareat. pag. 621. 1. 20. & pag.
622. 1. 1
Solis per foramen immissi proprietates
574. 2. 15. 617. 1. 25
Solis imago per minus foramen fit ma-
ior sed obscurior. pag. 617. 2. 15. &
576. 2. 5
Solis immissi limbus per minus foramen
fit mundior. pagina 617. columna
2. 17
cur Sol per minus foramen obscurior in-
tret. 617. 2. 35
Sol cur in medio lucidior sit. pag. 619
col. 1. 1
Sol tralucidus intus lucidior est. 619.
2. 30
pars aliqua luminis solaris Lunæ lu-
men non adæquat. pag. 656. colum.
2. 25
ex Solis motu quæstiones physicae. 607
col. 1. 1
Sol motu suo planetas non mouet. pag.

II.

604. 1. 31
Solis motus ad quantitatem. pag. 601
2. 1
Solis motus alterationis. pag. 601. col.
2. 35
Sol multo maior est quam creditur. 578
1. 20. & 584. 1. 15
Solis diameter visibilis quanta sit. pag.
571. 1. 1
Solis diameter atque perimenter in pas-
sibus & milliaribus expressa. pag. 586
1. 25
Solaris circuli margines colore rufæ &
furuæ sunt. 574. 2. 30
Sol magnitudo hactenus incerta fuit. p.
573. 1. 20
Solis diameter nouo instrumento inda-
gatur. col. 2. 10
cur Sol per figuras angulares illapsus cir-
cularis appareat. 580. 2. 55
lumen aliunde admissum basin sola-
rem imminuit. 582. 2. 5
in Solis imaginem per foramen immis-
sam annotationes. 580
Sol terræ vicinior est, quam credatur. p.
584. 1. 25
Solem maculæ toti mundo eclipsant. p.
605. 1. 1
Solis magnitudo per phænomeni ob-
seruationem acquiritur. pag. 605.
1. 30
si Sol mutabilis & astra & reliquum cæ-
lum simile erit. 608. 1. 10
Sol perigæus & apogæus vt deprehen-
datur. 606. 1. 40
Solis quanta pars appareat. pag. 570.
1. 5
Sol radijs suis diuersos cursus Planeta-
rum causatæ ait s. Isidorus. pag. 759.
1. 45
Sol sphæricus est. pagina 603. colum.
2. 40
Solis superficies crispa est. pag. 604. col.
1. 20
Solem scintillare ait Simon Marius. p.
741. 1. 15
Sol non ex sua natura, sed propter ma-
gnitudinem oculum ferit. pag. 656.
2. 5
Sole stante adhuc generationes fierent.
599. 1. 55. & col. 2. 30
quod Sol vicinior sit maioris actiuitatis
causa non est. 598. 1. 6
Sol substantia corporea est. 594. 1. 47
Sol

I N D E X.

II.

Sol in Zonas diuiditur, pag. 568. col. 1.25.
 Spatia alba maculis interstita, pag. 276. 2.25.
 Spatia alba inter nucleos, 210.2.31. & 256.2.30.
 Spatium album reliquo Solis corpore lucidius, 219.2.15.
 Spatium æquabile an semper in Sole sit incertum est, 344.2.40.
 Species sine vlllo colorum discrimine per tubum transeunt, pag. 503. col. 1.5.
 Sphæram in qua maculæ mouentur nō esse Sole maiorem, pag. 428. colum. 2.15.
 Squarcialupus pro cælo liquido, p.764. 1.1.
 Stella noua in Cassiopeia ann. 1572. à Clauio obseruata fuit, pag.766. col. 1.20.
 Stellas in cælo nouas generari posse dicit Clauius, col.2.5.
 Stellam nouam anni 1600. in Cygno visam in Cælo ponit Clauius, colum. 2.25.
 Stellam nouam in Sagittario anni 1604 in Cælo fuisse ait Clauius, pag.766. 2.30.
 Stellæ nouem enumerantur quæ in Cælo apparuerunt & disparuerunt, 736. 2.20.
 Stella in Cassiopeia visa Cælum corruptibile arguit, pagina 689. colum. 2.1.
 Stellas halitu terreno ali, ait Seneca, 749.1.15.
 Idem sentit Ptolemæus, pag.756. 1.10.
 Stellas à Sole accendi, dixit Vitruuius, 759.1.15.
 Stellæ naturæ igneæ sunt, pag.662. col. 1.25.
 Stellæ vere de cælo cadent, vers.35. & p. 689.2.40.
 Stellæ lumen omne à Sole accipiunt, 600.2.30.
 Stellæ à Sole radios hauriunt & sua proprietate affectos in terram remittunt. col.1.30.
 Stellæ proprias influentias habent, col. 2.38.
 Stellarium tremorem vapores in atmosphæra causant, vers.20.

Stellæ in meridie lucent vt in eclipsibus solaribus patet, pag. 417.1.5. & 418. 1.10.
 Stellas videndi in meridie modus, 417. 1.53.
 Stili in margine Solis erectio, pag.72. 2.46.
 Stoici pro cælo igneo, 640.2.35.
 pro cælo liquido, 755.2.30.
 Strabus pro aquis supra cælos, pag.645. 1.30.
 Sybilla pro cælo corruptibili, pag.690. 2.10.
 Symmachus pro cælo liquido, p.772. 2.35.

Tabellæ laterales quid sint, pag. 216. 1.50.
 Tabellæ laterales diuerforum locorum, 199.217.229.257.281.
 Tabula Apellis quid sit, 7.2.15. cur sic dicta, col.1.25. quando scripta & edita, 56.1.30.
 Tabula à Marco VVelfero edita est, 7.1.36.
 in Tabula quæ doceantur, 15.1.30. & 17.2.22.
 Tabula Apellis à Censoris Saggiatore multum discrepat, 2.2.35.
Telioscopium quod dicatur, pag.131. col.4.20.
 Telioscopij vsus, 71.1.15. & 130.2.30.
 Telioscopium in Germania primo inuentum est, 68.2.14.
 Telioscopij inuentorem Censor se facere voluit, 5.1.4.
 Telioscopij partes materiales, 133. col. 3.35.
 Telioscopij annuli quales esse debeant, 133. col.4.7.
 Telioscopium omni sano oculo seruit, 451.1.46.
 Telioscopium quæ oculorum aciem fugiebant detegit & obiectum magis & clarius ostendit, 451.1.36.
 Telioscopium miopes contrahunt, deducunt presbytæ, pagina 451. col. 1.53.
 Telioscopium ad vicina contrahitur deducitur ad remota, p.131. col.4.35. & 135.1.35. & 451.2.1.
 Telioscopij alia & alia apertura præferuntur, 137.2.10.

Tempus

I N D E X.

I.

Tempus in fine obseruationis signandū
est. 149. col. 3. 40
Tempus incommodum ad obseruandū
dignoscere. 149. col. 3. 10
Tempus opportunum ad obseruandum
149. col. 4. 20. & col. 30. 1. & colum.
31. 1. Vide Obseruatio.
Terra simul cum cælo cōflagrabit. 665
1. 20. 683. 1. 5
Terræ magnitudo quæ sit. 585. 2. 16
Terra opaca est, radijs solaribus imper-
uia est. 594. 1. 53
Terra Sole minor, regione atmosphæræ
circumdatur. 594. 2. 5
Terra & cælum ex & per aquam sunt.
668. 1. 50
Tertullianus pro aquis supra cælos. 645
1. 25
pro cælo igneo. 627. 2. 1
Thebit pro cælo liquido. 763. 1. 35
Theodoretus pro aquis supra cælos.
645. 1. 30
pro cælo igneo. p. 627. 2. 50. & 633.
1. 3.
pro cælo liquido. 724. 1. 20
Theologi qui cælum liquidum defen-
dunt. 731
Theophylactus pro cælo liquido. p. 723.
1. 43
s. Thomas inter epicyclos ætherem flui-
dum interponit. 770. 1. 10
Idem pro aquis supra cælos. p. 643.
2. 31
pro cælo igneo. 630. 1. 30
pro cælo liquido. 729. 1. 50
Toftatus pro cæli natura ignea. p. 632.
1. 25
Triangulorum quorundam spherico-
rum vsus. 371.
Tubus quis melior sit. 136. col. 4. 10
ex Tubi apertura deprehenditur distan-
tia loci. 132. 1. 5. 131. 1. 45
Tubi cum oculo collatio. 114. 1. 54. &
col. 2. 10
Tubi inuersi regulæ practicæ. 114. 1. 1
Tubus nimium deductus cur nihil præ-
stet. 127. col. 4. 53
Tubi quomodo & ex qua materia fiât.
133. col. 3. 45
Tunica retina est formale organum vi-
sus. 120. 1. 50
Tycho Braheus pro cælo liquido. 741.
1. 45. & 763. 2. 15

II.

V

Vapor circa nucleos. pag. 290.
1. 40
Vapor circa maculas. pag. 298
1. 20
Venus circa Solem voluitur. 758. 1. 40
Venus maculas in Sole non causat. 410
1. 1
Verticalis meridiani inuentio. pag. 149.
col. 5. 1
Verticalium ad eclypticam minimam
& maximam totius anni inclinatio-
nem enuntiare. 149. col. 29. 1
Verticales circuli. Vide Circuli.
Vielmius Dominicanus Aenomiæ Epi-
scopus pro aquis supra cælos. p. 648.
1. 40
pro cælo corruptibili 673. 1. 15
pro cælo liquido. 734. 1. 1
Virgilius pro cælo liquido. 755. 2. 30
Visio sequitur picturam, clara claram. p.
120. 1. 47
Visio quare picturæ in charta contradi-
cat. 128. col. 3. 20
Visibile totum in toto & totū in quali-
bet parte est. 116. 2. 50
Vitrorum vsus & accommodatio. p. 96.
2. 40
Vtrum quod obiectum magis ampliat,
minorem ex obiecto partem ostendit
128. col. 4. 28
Vitruuius pro cælo liquido. 758. 1. 35.
Vmbrarum descriptio. 157. 1. 1
Vmbræ secundariæ quid sint. 346. 1. 10
Vmbræ secundariæ vbi sint. ibidem ver-
sic. 20
Vmbræ secundariæ vt primariæ mouen-
tur. 346. 2. 25
Vmbræ diuersæ. 226. 2. 8
Vmbræ dierum trium. 244. 1. 20
Vmbræ medij diei. 233. 2. 2
Vmbræ quædam per plures dies, quædā
per vnum, quædam vix horam supe-
rant. 344. 2. 50
Vmbræ Faculis flagrans. 272. 2. 22
Vmbræ & Facula Maculam sequentes
in occasu præcedunt. 262. 2. 20. 246
1. 16
Vmbræ sæpe maculæ sunt. 246. 1. 10
Vmbræ macularum semen sunt. p. 290.
2. 39

Vmbræ

I N D E X.

I.

Vmbræ & Maculæ mouentur. pag. 290
2.38
Vmbræ in maculas commutantur. 234.
2.45. & 270.2.22.318.1.50
Vmbræ in Maculas & hæc rursus in Vm-
bras. 306. 2. 40
Vmbræ in Maculam & hæc in Faculam
abiuit. 262. 2.10
Vmbræ physice exorta. 318.2.28
Vmbræ, Luculæ, Plagæ semper in Sole a-
liæ sunt. 344.2.45
Vmbræ redux. 318.2.20
Vvelferus Apellem Censoris scripta nō
vidisse testatur. 21.2.1
Vvelferus primus Tabulam Apellis in-

II.

vulgus dedit. 7.1.1
Vvilebrordus Snellius pro cælo liqui-
do. 763.2.5
Vvitchius pro cælo liquido. 764.1.1

X

X Enophanes pro cælo igneo. pag.
640.2.35

Z

Z Acharias philosophus Christia-
nus Episcopus Mitilenes pro
cælo corruptibili. 679.2.30

F I N I S.

Erratorum Correctio.

Q Vandoquidem in tanto volumine, et mea præsertim absentia, errores nonnulli Operarum incuria irrepperunt, eos hic emendandos propono, initio sumpto ab ipsis paginarum numeris, sine quibus ante omnia correctis, aliorum erratorum loca nec inuenies neque castigabis. Numeri igitur veri in loca mendosorum reponendi sunt isti. In lib. 3. 366. 367. loco numerorum 368. 369 immediate post numeros 365. positorum. In lib. 4. numeri veri reponendi sunt hi 511. 512. 513. 514. 519. 520. 521. 522. 527. 528. 529. 530. in loco numerorum falsorum, 459. 460. 461. 462. 467. 468. 469. 470. 475. 476. 477. 478. incipiendo immediate post numerum 510. In lib. 2. à pag. 125. numeri inscribuntur in vnam tantum eamque priorem paginæ faciem, vsque ad paginam 149. et ob hanc causam paginæ istæ singulæ columnis suis quaternis præfigunt notas numerales ordine quaternas hæc, I. II. III. IV. secundum quas in hisce paginis, numeratio instituitur. Eadem ratione à pagina 149. vsque ad finem libri, hic solus idemq. numerus 149. omnibus et singulis paginis duodenis præfigitur, columnæ vero, secundum quas hic numerandum est, characteribus numericis ab I. ad XLII. insigniuntur. In litteris præterea Græcis et Latinis ββ, γγ, ηη, υυ, H. Item X et χ, &c. confusio frequens accidit; quæ Lectorem moneo, vt si quid in mendis annotandis meam industriam effugerit, ipse pro sua eruditione et sagacitate sciat resarcire. Vt autem loca erratorum cito inueniantur, in vertice pono Paginam, Columnam, Versum, Erratum, Correctum. Præterea in auctoritatibus citatis nonnunquam mea tanquam ab alijs producta, aliorum veluti mea consignata sunt: quæ prudens discernere facile scies, inspectis præsertim citatis Auctorum fontibus. Vale et ante omnia correctis frui. Si te laboris correctæ reponendi tæduerit, me certè in tuam gratiam non piguit corrigendi. Vale iterum amice Lector.

Pag. Col. ver.	Errata.	Correcta.	Pag. Col. ver.	Errata.	Correcta.	Pag. Col. ver.	Errata.	Correcta.	Pag. Col. ver.	Errata.	Correcta.
2 2 4	ad, ed		103 1 51	ipse, ipse		149 11 52	Verticalem A. 30 C.		296 2 5	neque notandū, be-	
2 2 2	in margine sit, sit		103 2 18	perstinctas, pstrictas			Verticalē A. 25. C.			neq. notandum	
3 1 9	imprimis, in primis		104 1 8	striati, striati		149 12 24	collocauerunt, col-		308 1 3	Macule, Macula.	
3 2 7	vlliq. lestone, vllius		107 1 3	n 3 n d, n 3 n d			cauerunt centra		314 2 37	c, c	
	læione		108 1 46	remotiore, remotio-		149 12 50	interceptos, intercep-		312 1 37	qui, quæ	
3 2 46	constructi, constructi		108 2 5	tamen, tantū (ra			pto		316 2 47	vnam, vna	
8 1 26	libellam, libellam		110 2 50	Anatome à (adde)		149 15 40	et σ, et σ		338 1 13	in Eclipticam, inter	
8 2 22	impastor, impostor			quodā Sapientia		149 15 42	ad σ, ad σ			Eclipticam	
10 2 52	centui, centui			Romanæ Doctore		149 15 45	vsq. in σ, vsq. in σ		348 1 9	multos, multas	
11 1 42	perpediculi, perpen-			Corneam non esse,		149 15 49	A a C, A σ C		357 1 28	69 vel LXIX	
	diculi			(adde) consolidati-		149 15 54	σ A B, σ A B		362 1 52	femicirculi, qua-	
12 1 3	multos, multas			tiæ concentricæ,		149 20 18	φ γ σ, φ γ 2,		366 0 12	drantis	
14 1 7	suparem, supparem			sed foras per mo-		149 36 47	CAF, GAF		366 0 22	IR, IE	
28 2 18	cronologica, chro-			dū ferme supficiæ		149 36 48	a, b, c, a, b, c,		366 0 26	ZY, in Z, Y;	
	nologica (uisset)			hyperbolicæ, pru-			EX LIB. III.		366 0 40	ad KN, ad HN	
24 2 12	in marg. nil, nil sci-			berare. Alterum		163 2 27	Mac. a, Mac. a		367 0 4	QR, QP	
26 1 3	præfisset, præfisset			nerum opticum			in minore		367 0 1	B D, E D	
26 2 51	summa, summo			non esse		172 2 40	exhorta, exorta		368 0 11	B F, O F	
28 1 33	1610., 1611 (menō					174 0 3	constat, constant		368 0 14	M S, M, S,	
30 2 6	Phænomen. Phæno-					176 1 24	conuenire, conueni-		368 0 16	iphi KI, iphi RI.	
36 2 7	variabili. Inuariabili					184 1 6	re sit difficillimum		368 0 16	KS, KS,	
40 2 26	qui est, q est Iunius					184 1 28	vt, &c		369 0 6	EM, NG, IM, EG,	
40 2 27	diem, diem 6. Iunij					185 2 3	arctuum, arctuum		370 0 17	EH, DG,	
51 1 10	disq. tione, disq. tione					186 2 29	Tobella, Tacella		372 0 1	H D O, H B O,	
57 2 48	huius, huius (ne					188 2 35	idoque, ideoque		374 0 11	declinationes, de-	
58 2 17	obsolutes, absolute					189 2 3	politio, politio			clinationis	
59 2 55	errores, erroneæ					190 2 35	in Eclipticâ & chor-		374 0 15	hoc sinus, hoc est si-	
60 1 17	errores, erroneæ						darū quis, inter			nus	
61 1 31	nimis prouide, ni-						Eclipticâ & chor-		380 0 5	Ga, a, deest in fi-	
	mis improuide						das qualis arcuū		380 0 8	GA, Ga, (gura	
	EX LIB. II.								380 0 16	æquinoctialis, dele-	
68 2 43	vsu, visu									punctum, & scri-	
69 1 19	obratu, obrutu									pturam cum se-	
69 1 41	ius, via									quenti versu con-	
69 1 48	maius, maior									tinua hoc modo.	
69 2 43	stadium, studium									ad puncta æquino-	
69 2 21	nūquam frustra, nū-									ctialis B, C. sunt	
	quam; frustra.									e nim &c.	
69 2 43	Elliptica, Elliptico								380 0 30	gh, gh,	
71 2 20	Solo, Sole								380 0 44	HE, He	
73 2 7	Sole, Soli								380 0 47	OR, he, gR, He	
74 1 44	Cap., Cap. XXIII.								382 0 43	OR, gR,	
74 1 53	quis, qui								383 0 6	HI, NI.	
75 1 39	quas, per quas								384 0 5	Ptolemæico, Ptole-	
75 2 46	locis, lucis (mēta									maico	
76 1 30	ipeditētis, impedi-								384 0 35	od, ad	
76 1 35	Telioscopio, Telio-								385 0 3	horarios, horarias	
76 1 37	G. H, GH (scopica								385 0 4	FC, FC.	
76 1 41	asserere, asserere								388 0 15	NGK, MGK	
76 2 18	Num. 1. Num. 6.								388 0 19	EG, NG	
79 1 41	excipietur Sol, ex-									EX LIB. IV.	
	ciptetur Sol										
79 2 48	occupationes alias,								410 2 9	e que, neque	
	occupationes aliæ								415 2 33	Martias, Martios	
89 2 13	diueneri, deueniri								416 2 17	Clarius, Clauus	
91 2 51	uestigies, uestiges								416 2 29	Ex a, Ex a,	
92 1 14	cuiusmodi, cuius-								424 2 34	ec, deest in figura	
	modi sit									littera c.	
94 2 14	moræ, more								425 2 1	Macula, Macula b	
94 2 52	colum, colurum								427 2 2	3, 3, 3, 3,	
96 2 12	immissio, immissio								427 2 4	3, 3	
97 2 20	inclinationes, incli-								427 2 6	ad a, ad a	
	nationes								427 2 7	et i, et i,	
99 1 19	non esse, non est								427 2 10	in a, in a,	
99 1 43	qui, quæ										
101 2 25	qui, quæ										
101 1 15	optime, optime										

I N D E X.

I.

Vmbræ & Maculæ mouentur. pag. 290
2.38
Vmbræ in maculas commutantur. 234.
2.45. & 270.2.22.318.1.50
Vmbræ in Maculas & hæc rursus in Vm-
bras. 306. 2.40
Vmbra in Maculam & hæc in Faculam
abiuit. 262. 2.10
Vmbra physice exorta. 318.2.28
Vmbre, Luculæ, Plagæ semper in Sole a-
liæ sunt. 344.2.45
Vmbra redux. 318.2.20
VVelferus Apellem Censoris scripta nō
vidisse testatur. 21.2.1
VVelferus primus Tabulam Apellis in-

II.

vulgus dedit. 7.1.1
VVillebrordus Snellius pro cælo liqui-
do. 763.2.5
VVitichius pro cælo liquido. 764.1.1

X

X Enophanes pro cælo igneo. pag.
640.2.35

Z

Z Acharias philosophus Christia-
nus Episcopus Mitilenes pro
cælo corruptibili. 679.2.30

F I N I S.

Erratorum Correctio.

Q Vandoquidem in tanto volumine, et mea præsertim absentia, errores nonnulli Operarum incuria irrepererunt, eos hic emendandos propono, initio sumpto ab ipsis paginarum numeris, sine quibus ante omnia correctis, aliorum erratorum loca nec inuenies neque castigabis. Numeri igitur veri in loca mendosorum reponendi sunt isti. In lib. 3. 366. 367. loco numerorum 368. 369 immediate post numeros 365. positorum. In lib. 4. numeri veri reponendi sunt hi 511. 512. 513. 514. 519. 520. 521. 522. 527. 528. 529. 530. in loco numerorum falsorum, 459. 460. 461. 462. 467. 468. 469. 470. 475. 476. 477. 478. incipiendo immediate post numerum 510. In lib. 2. à pag. 125. numeri inscribuntur in vnam tantum eamque priorem paginæ faciem, vsque ad paginam 149. et ob hanc causam paginæ istæ singulæ columnis suis quaternis præfigunt notas numerales ordine quaternas hæc, I. II. III. IV. secundum quas in hisce paginis, numeratio instituitur. Eadem ratione à pagina 149. vsque ad finem libri, hic solus idemq. numerus 149. omnibus et singulis paginis duodenis præfigitur, columnæ vero, secundum quas hic numerandum est, characteribus numericis ab 1. ad XLII. insigniuntur. In litteris præterea Græcis et Latinis $\beta\beta$, $\gamma\gamma$, $\eta\eta$, $\theta\theta$. Item X et x, &c. confusio frequens accidit; quæ Lectorem moneo, vt si quid in mendis annotandis meam industriam effugerit, ipse pro sua eruditione et sagacitate sciat resarcire. Vt autem loca erratorum cito inueniantur, in vertice pono Paginam, Columnam, Versum, Erratum, Correctum. Præterea in auctoritatibus citatis nonnunquam mea tanquam ab alijs producta, aliorum veluti mea consignata sunt: quæ prudens discernere facile scies, inspectis præsertim citatis Auctorum fontibus. Vale et ante omnia correctis frui. Si te laboris correctæ reponendi tæduerit, me certè in tuam gratiam non piguit corrigendi. Vale iterum amice Lector.

Pag. Col. ver.	Errata. Correcta.	Pag. Col. ver.	Errata. Correcta.	Pag. Col. ver.	Errata. Correcta.	Pag. Col. ver.	Errata. Correcta.
2 2 4	ad. ed	103 1 51	ipsa, ipse	149 11 52	Verticalem A. 30 C.	296 2 5	neque notandū, be-
2 2 4	in margine sit, sit	103 2 18	perstinctas, pstrictas	149 11 52	Verticalē A. 25. C.	296 2 5	neq. notandum
3 1 9	imprimis, in primis	104 1 8	itriati, itriati	149 12 24	collocauerunt, col-	308 1 3	Macule, Macula.
3 2 7	viliq. lesione, vilius	107 1 3	$\eta\eta$, $\theta\theta$, $\eta\eta$	149 12 24	collocauerunt centra	314 2 37	c, c
3 2 7	lesione	107 1 3	$\eta\eta$, $\theta\theta$, $\eta\eta$	149 12 50	intercepros, interce-	314 2 37	qui, quæ
3 2 46	constructi, constructi	108 1 46	remotiore, remotio-	149 12 50	pro	316 2 47	vnam, vna
8 1 26	libellam, libellam	108 2 5	tamen, tantū (ra	149 15 40	et o, et o	318 1 13	in Eclipticam, inter
8 2 21	impastor, impastor	110 2 50	Anatome à (adde)	149 15 42	ad o, ad o	318 1 13	Eclipticam
10 2 33	consui, sensui		quodā Sapientia	149 15 45	vsq. in 2, vsq. in o	348 1 9	multos, multas
11 1 42	perpediculi, perpen-		Romanz Doctore	149 15 49	A o C, A o C	357 1 28	69 vel LXIX
11 1 42	diculi	110 2 55	Corneam non esse,	149 15 54	o A B, o A B	362 1 52	semicirculi, qua-
12 1 3	multos, multas		(adde) consolidati-	149 20 18	o y s, o y 2,	366 0 13	drantis
14 1 7	suparem, supparem	110 2 48	tiuz concentricā,	149 36 47	CAF, GAF	366 0 22	IR, IE
18 2 18	chronologica, chro-	115 1 51	sed foras per mo-	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	366 0 26	ZY, in Z, Y;
24 2 12	nologica (uisset)	115 1 55	dū ferme supliciei		EX LIB. III.	366 0 40	ad KN, ad HN
26 1 3	in marg. nil, nil sci-	116 1 1	hyperbolica, pru-	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	366 0 40	QR, QP
26 1 3	præfisset, præfisset	119 1 38	berare. Alterum		EX LIB. III.	367 0 4	BD, ED
26 2 51	summa, summo	120 2 30	nerum opticum	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	367 0 4	BF, OF
28 1 33	1610., 1611 (menō		non esse	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	368 0 11	MS, MS,
30 2 6	Phænomen. Phæno-	122 1 22	prudent, prudentur	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	368 0 11	MS, MS,
36 2 7	variabili, invariabili	122 2 29	speculari, specillo	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	368 0 14	ipsi KI, ipsi RI,
40 2 26	qui est, q est Iunius	122 2 9	proportionata, pro-	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	368 0 16	KS, KS,
40 2 26	diem, diem 6. Iunij	122 2 9	portionato	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	369 0 6	EM, NG, IM, EG,
51 1 10	disquisitione, disquisi-	122 2 9	Coroll. I. Coroll. II.	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	370 0 17	EH, DG,
57 2 48	hujus, huius (ne	122 2 9	ex qua, ex qua	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	372 0 1	HDO, HBO,
58 2 17	obsoletæ, absolute	122 2 9	interfectio in-	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 11	declinationes, de-
59 2 55	errores, erronea	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	declinationis
60 1 17	errores, erronea	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
61 1 31	nimis prouide, ni-	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	nus
61 1 31	mis improuide	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
61 1 31	EX LIB. II.	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
68 2 43	vsu, visu	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
69 1 19	obtratu, obtratu	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
69 1 41	ius, via	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
69 1 41	maius, maioris	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
69 2 11	studium, studium	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
69 2 21	nūquam frustra, nū-	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
69 2 21	quam; frustra,	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
69 2 43	Elliptica, Elliptico	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
71 2 20	Solo, Sole	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
73 2 7	Sole, Soli	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
74 1 44	Cap., Cap. XXIII.	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
74 1 51	quis, qui	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
75 1 39	quas, per quas	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
75 2 46	locis, lucis (mēta	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
76 1 30	ipeditētis, impedit-	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
76 1 35	Telioscopio, Telio-	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
76 1 37	G.H. GH (scopica	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
76 1 41	asserere, asserere	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
76 2 13	Num. 1. Num. 6.	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
79 1 41	excipientur Sol, ex-	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
79 1 41	cietur Sol	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
79 2 48	occupationes alias,	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
79 2 48	occupationes aliæ	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
89 2 13	diueniri, deueniri	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
91 2 51	uestigies, uestigies	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
92 1 14	cuiusmodi, cuius-	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
92 1 14	modi sit	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
94 2 14	more, more	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
94 2 52	colum, colurum	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
96 2 12	immissio, immissio	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
97 2 20	inclinationes, incli-	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
99 1 19	non esse, non est	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
99 1 41	qui, quæ	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
101 2 25	qui, quæ	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-
101 1 15	optime, optime	122 2 9	terfectio g	149 36 48	a, b, c, a, b, c,	374 0 15	hoc sinus, hoc est si-

Erratorum Correctio.

Pag. Col. ver. Errata. Correcta.	Pag. Col. ver. Errata. Correcta.	Pag. Col. ver. Errata. Correcta.	Pag. Col. ver. Errata. Correcta.
428 I 2 ad η , ad μ ,	465 2 12 obnoxia, obnoxium	488 2 29 ra; ras,	562 I 12 K, k,
429 2 3 in ξ , in ζ ,	469 2 13 monendo, mouendo	488 2 32 u θ , η θ ,	562 2 10 d i, d f,
429 2 3 per Z, μ θ , per Z, μ θ ,	470 I 25 quiqua versus, quiqua versus	488 2 38 μ a f, μ a f,	564 I 32 imaginarij, imaginari
429 2 5 μ , μ ,	473 2 54 planum axem, planum, & axem,	488 2 44 β - β	574 I 45 x, x l,
442 2 46 recta, recta	474 I 28 γ ϵ , γ ϵ ,	489 I 1 ex ϵ -ex ϵ ,	580 2 53 discurremus, discurremus,
443 I 48 o v, ou	474 I 32 β , β ,	489 I 4 ex μ pergit in μ ,	582 I 46 ex industria, ex industria com effo
444 I 35 12. o, 12. e,	474 I 36 β , β ,	ex μ pergit in μ	583 I 4 iudicatum, iudicatum
444 I 38 12. o, 12. e,	474 I 38 β γ , β γ ,	489 I 5 γ , γ ,	610 2 22 vmbis, vrbis
444 2 41 vicibus, vicibus:	474 I 55 θ a, θ μ ,	489 2 4 medio, modo	620 2 37 asper & male terminatus? - aspera & male terminata?
446 I 39 sana, sane	474 2 12 μ , μ ,	501 2 23 ablescerent, ablescerent:	643 2 8 demonstraui, demonstraui
446 2 51 inter media, intermedia	Ib. 2 20 μ , μ ,	508 2 51 albicante, albicante	653 2 21 seniores, saniores
462 I 30 a o, a ϵ ,	Ib. 2 23 μ , μ ,	516 I 28 orbibus, orbibus	659 I 37 illustres, illustres
462 2 1 a o, a ϵ ,	Ib. 2 24 μ , μ ,	518 I 21 est, qui est	659 2 21 litteram intel. - litteram intellectis,
462 2 2 β o, β ϵ ,	Ib. 2 27 μ , μ ,	521 2 9 rarefactione ordinata, rarefactionem ordinatam	662 I 33 Stellæ veræ, Stellæ veræ
462 2 23 loco γ , loco γ ,	Ib. 2 48 ab, cd, ef, gh, ik; ab, cd, ef, gh, ik	522 2 44 tam, quam	663 I 37 animam nostrarum statu, animarum nostrarum statui
462 2 36 o 2, s 2,	475 I 6 ν ϕ , η ϕ ,	525 I 2 T; γ ;	663 I 39 tantam, tantum
462 2 44 si ϕ , si ϕ ,	Ib. I 7 μ , μ ,	525 I 5 T, γ ,	666 2 51 incorruptibilis, incorruptibilis est
462 2 48 loca γ , loca γ ,	Ib. 2 1 μ , μ ,	525 I 6 TY, γ ϵ ;	677 2 36 asperitate, asperitate
462 2 49 β , β ,	476 I 14 eodem, eadem	525 I 9 DST, DSy	682 2 3 ipse, ipse
462 2 51 β γ , et β γ , β γ , et β γ ,	Ib. I 38 e x y, ex y,	525 I 11 V X, et T β Y, - VmX et β γ	691 I 23 aperte, aperta
462 2 52 β γ , γ μ ; β γ , γ μ ,	Ib. I 45 nectæ, nectæ	525 2 13 D, T, DSmy	694 I 36 fusc, fusc
463 2 6 versus, verus	Ib. I 48 u x q, u x q,	525 2 16 μ , γ	702 & seqq. Stellæ notabilia significant, quæ characterem alio fuissent imprimenda.
464 I 11 ϕ σ , inter a ϕ , et a σ - ϕ 6 in er a ϕ , et a 6,	Ib. 2 16 u q, u q,	526 2 35 Y, γ	704 I 37 transgressionem, intransgressibilem
464 I 17 a γ , a γ ,	Ib. 2 31 q x u, q x u,	526 2 36 T locū verū γ ;	718 I 23 Et, Ex
464 2 2 11. s 11. s	477 2 4 u x q, u x q,	γ , locū verū μ .	735 I 31 DE, PRO
464 2 10 vely, vely	479 I 30 perpetuè, perpetua	532 2 26 non esse, non esse	738 2 29 configurati, configurati
465 2 36 refractionem, refractionum	488 I 32 igitur intelligitur-igitur intelligitur	535 I 14 agitatione, instrum. agitatione instrum.	751 I 27 consuetudine, consuetudine
	Ib. 2 8 β γ , ex γ - β γ , ex γ	535 2 51 ambieno, ambiens	761 I 6 Iosephum, Iulium
	Ib. 2 10 γ - γ ,	536 2 49 celestes, celestis	764 I 18 Ipsi, Ipse
	Ib. 2 11 γ - γ ,	540 I 9 illius, vilius	764 I 31 Copernicarum, & Tyconicarum Copernicanum & Tyconicanum.
		540 I 31 istarum, istorum	
		544 I 5 æquabilis, æqualib	
		546 I 25 præmeret, premeret	

Scheiner, Christoph,

Christophori Scheiner Rosa Ursina sive sol ex admirando facularum et
macularum suarum phoenomeno varius, necnon circa centrum suum et axem
fixum ab occasu in ortum annua, circaque alium axem mobilem ab ortu in
occasum conversione quasi menstrua, super polos proprios, libris quatuor

Bracciani 1630

Passau, Staatliche Bibliothek -- S nv/a Sa (b) 7
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11348805-6